

REPUBBLICA ITALIANA  
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

# **CAUSE DI MORTE**

# **NEGLI ANNI 1943-1948**

SERIE III VOL. I



ROMA - TIPOGRAFIA FAUSTO FAILLI - 1952

All'On. Dott.  
ALCIDE DE GASPERI  
Presidente del Consiglio dei Ministri

Ho l'onore di presentarLe il volume riguardante la statistica delle cause di morte negli anni 1943-1948, il quale esce con notevole ritardo rispetto al precedente riguardante gli anni 1941-1942 e pubblicato nel maggio 1948.

Tale ritardo è da attribuirsi agli eventi bellici i quali causarono una vera paralisi dei servizi statistici locali, determinando quindi, alla ripresa, da parte dell'Istituto Centrale di Statistica, un assai lungo e paziente lavoro di raccolta ed in parte di ricostruzione del materiale demografico presso i Comuni.

Il presente volume consta di due parti. In una prima parte introduttiva vengono brevemente studiati, l'andamento nel tempo della mortalità secondo le cause, la distribuzione territoriale delle principali cause di morte, le cause di morte in relazione all'età ed al sesso, con particolare riferimento alla mortalità infantile; tale disamina ha portato alle conclusioni che le condizioni belliche influirono in misura poco sensibile sulla mortalità generale per cause e che la mortalità infantile subì, dopo il 1943, una continua diminuzione. Una seconda ampia parte tabellare contiene i dati assoluti per i singoli anni dal 1943 al 1948, riguardanti i decessi per cause nelle Regioni, nei Comuni con oltre 100.000 abitanti, secondo l'età ed il sesso, secondo il mese di morte ed, in particolare, i morti nel primo anno di vita per cause, mese di morte, Regione, età e sesso.

Roma, 29 febbraio 1952

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
LANFRANCO MAROI

# I N D I C E

AVVERTENZE . . . . . Pag. 9\*

## NOTA INTRODUTTIVA

Andamento della mortalità secondo le cause dal 1900-02 al 1948 . . . . . » 11\*

Distribuzione territoriale delle cause di morte . . . . . » 14\*

Distribuzione delle cause di morte per età e sesso . . . . . » 32\*

Le cause di mortalità infantile . . . . . » 48\*

Conclusioni . . . . . » 53\*

## APPENDICE

A) Numeri indici regionali della mortalità per cause : Mortalità del 1900-02 = 100 . . . . . » 56\*

B) Numeri indici regionali della mortalità per cause : Mortalità in Italia = 100 . . . . . » 63\*

C) Morti e mortalità per cause dal 1943 al 1948 . . . . . » 70\*

## T A V O L E

	1943	1944	1945	1946	1947	1948
PARTE I - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE						
Tav. 1 - Morti per causa - Regioni . . . . . Pag.	2	22	42	62	82	102
» 2 - Morti per causa - Comuni con oltre 100.000 ab. . . . . »	122	124	126	128	130	132
PARTE II - DISTRIBUZIONE PER ETÀ E SESSO						
» 3 - Morti per causa, età e sesso . . . . . »	134	174	214	254	294	334
» 4 - Femmine morte per tumori degli organi genitali e delle mammelle per età e stato civile . . . . . »	374	374	374	375	375	375
PARTE III - DISTRIBUZIONE PER MESE DI MORTE						
» 5 - Morti in complesso distinti per mese, per alcune cause e gruppi di cause . . . . . »	376	376	376	377	377	377
PARTE IV - MORTI NEL PRIMO ANNO DI VITA						
» 6 - Morti nel primo anno di vita, in complesso e per alcuni gruppi di cause, per mese - Regioni . . . . . »	378	379	380	381	382	383
» 7 - Morti e mortalità nel primo anno di vita, per causa, età e sesso . . . . . »	384	386	388	390	392	394
» 8 - Morti nella prima settimana di vita, per causa, età e sesso . . . . . »	396	398	400	402	404	406

## AVVERTENZE

1. — I dati contenuti nel presente volume, fino al 1920, si riferiscono al territorio nazionale nei confini esistenti anteriormente alla prima guerra mondiale, dal 1921 al 1942, si riferiscono ai confini stabiliti dopo la prima guerra mondiale.

Dal 1943 al 1948 i dati si riferiscono ai confini stabiliti col trattato di pace del 1947 ad eccezione dei dati concernenti i Comuni capoluoghi di Provincia, i quali, invece, sono riferiti alle circoscrizioni territoriali al 31 dicembre di ciascun anno.

2. — Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti **segni convenzionali** :

Due puntini (..), per i numeri relativi quando non raggiungono la cifra significativa nell'ordine minimo considerato.

La linea (—), quando non è stato registrato alcun caso.

3. — I periodi di tempo sono indicati, salvo avvertenza in contrario, in valori interi, i quali debbono interpretarsi come comprendenti tutti i valori che essi possono assumere dall'inizio alla fine del periodo indicato. (Così, ad esempio, l'età 4 anni, compiuti, arriva fino alla soglia del 5° anno).

4. — Nel numero dei morti non sono compresi i deceduti in zone di operazioni di guerra e in territorio straniero.

5. — I quozienti di mortalità sono calcolati sulla popolazione presente media (data dalla semi-somma della popolazione al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno).

6. — Le nomenclature nosologiche adottate nel presente volume sono quelle approvate nella V Conferenza internazionale per la revisione delle nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte (Parigi : ottobre 1938).

# NOTA INTRODUTTIVA

## ANDAMENTO DELLA MORTALITÀ SECONDO LE CAUSE DAL 1900-02 AL 1948

Il materiale statistico raccolto nel presente volume dà ampia documentazione sulla mortalità secondo le cause durante il sessennio 1943-1948 nella sua dislocazione territoriale, nella distribuzione per sesso ed età, e nella distribuzione mensile dei morti per principali cause. Tutti i dati assoluti sono esposti nelle Tavole statistiche.

Nelle pagine che seguono è tracciato in grandi linee l'andamento della mortalità ed il suo comportamento secondo le caratteristiche più salienti. Affinchè si possa giudicare più compiutamente l'evoluzione del fenomeno, sono stati calcolati quozienti anche per periodi antecedenti e precisamente per i trienni attorno ai censimenti demografici rimontanti sino al 1901, di modo che le manifestazioni del fenomeno con gli anni 1943-1948 possono dare un quadro generale della mortalità per quasi un mezzo secolo.

L'andamento della mortalità viene esaminato principalmente a mezzo di quozienti generici (rispetto, cioè, alla popolazione totale e soltanto per le malattie materne e per la mortalità infantile, si sono istituiti quozienti specifici di derivazione); la vera entità dei fenomeni può essere analizzata, invece, solo mediante l'uso dei quozienti specifici, ed in alcuni casi, specie per quelli relativi a particolari malattie (quali, ad es., quelle dell'infanzia), la mancanza di essi può condurre anche ad una errata interpretazione dei fenomeni. Lo scopo della presente illustrazione è però di dare solo una guida informativa di carattere generale, per cui sono largamente soddisfacenti anche i quozienti adoperati.

*L'andamento della mortalità generale*, considerato attraverso i dati dei trienni attorno ai censimenti del 1901, 1911, 1921, 1931 e 1936 e per i singoli anni dal 1943 al 1948, mostra una notevole e co-

stante diminuzione, salvo un aumento poco accentuato nel periodo cruciale della seconda guerra mondiale (1943 e 1944): da 2.270 morti su 100 mila abitanti del triennio 1900-02 il quoziente di mortalità scende a 1.395 nel 1935-37 e a 1.064 nel 1948. La differenza tra i due valori iniziale e terminale, che sono poi il massimo e il minimo della serie considerata, indica una contrazione del 53% (Prosp. 1).

Analizzando l'andamento della mortalità dal 1900-02 al 1948 per le 17 grandi classi di cause, (la 18ª è quella delle cause non determinate) si nota un comportamento contrario a tale tendenza generale in tre classi: un aumento (con qualche oscillazione però) per i vizi di conformazione congenita, un aumento ininterrotto fino al 76% per il cancro ed altri tumori, mentre per le malattie dell'apparato circolatorio si nota una tendenza alla stazionarietà con oscillazioni (Prosp. 2). Le restanti 14 classi di cause hanno tutte un andamento decrescente di differente intensità e regolarità. La diminuzione, verificatasi dal 1900-02 al 1948, è la più elevata per le malattie della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo (78%), molto rilevante pure per le malattie dell'apparato digerente (76%), per quelle del sangue e degli organi ematopoietici (75%), per quelle delle ossa e degli organi della locomozione (74%), per le malattie infettive e parassitarie (73%) e per quelle dell'apparato respiratorio (69%); abbastanza accentuata per le malattie reumatiche (50%), per gli avvelenamenti cronici, per le malattie particolari della prima infanzia, per la senilità (47%), per le malattie della gravidanza parto e puerperio (42%), per quelle del sistema nervoso ed organi dei sensi (36%); più modesta per quelle dell'apparato urinario e genitale (22%) e minima, invece, per le morti violente o accidentali (10%).

Prosp. 1. — Mortalità per classi di cause  
Per 100.000 abitanti

Classi	CAUSE DI MORTE	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
I	Malattie infettive e parassitarie . . . . .	388,6	326,6	298,0	216,9	173,7	172,3	166,1	154,8	146,6	125,8	104,6
II	Cancro ed altri tumori . . . . .	59,8	67,6	70,9	74,9	87,7	92,1	91,0	96,3	98,7	102,7	105,0
III	Malattie reumatiche, della nutrizione, ghiandole endocrine, altre malattie generali e avitaminosi . . . . .	30,4	24,6	17,1	23,3	24,4	21,5	19,9	17,9	15,4	15,9	15,2
IV	Malattie del sangue e organi ematopoietici . . . . .	31,2	33,0	26,0	(c) 7,3	7,1	7,2	7,8	8,4	7,4	7,8	7,7
V	Avvelenamenti cronici e intossicazioni . . . . .	1,5	2,4	1,7	1,4	1,4	1,3	1,0	0,7	0,6	0,8	0,8
VI	Malattie sistema nervoso e organi dei sensi . . . . .	218,1	205,2	178,8	171,5	168,3	165,0	158,5	145,9	143,4	142,9	139,0
VII	Malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	198,2	222,7	211,0	185,3	197,3	231,8	232,7	224,6	215,1	220,4	210,9
VIII	Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .	457,9	389,9	324,2	257,0	261,9	209,7	179,4	171,5	168,1	151,5	140,1
IX	Malattie dell'apparato digerente . . . . .	417,6	312,5	286,2	217,9	179,7	169,8	137,9	133,2	124,1	112,1	99,1
X	Malattie dell'apparato urinario e genitale . . . . .	50,0	55,7	52,1	50,3	55,7	57,2	56,1	49,1	41,1	39,6	39,0
XI	Malattie della gravidanza, parto e puerperio (a) . . . . .	25,9	23,4	25,5	27,6	28,7	17,5	17,4	18,7	16,0	15,2	15,0
XII	Malattie della pelle e tessuto cellulare . . . . .	9,5	7,3	6,1	5,0	5,6	5,8	4,9	4,5	3,2	2,8	2,1
XIII	Malattie delle ossa e organi della locomozione . . . . .	3,4	2,9	2,1	2,4	2,5	2,0	1,8	1,8	1,4	1,1	0,9
XIV	Vizi di conformazione congeniti . . . . .	4,1	5,1	4,7	6,2	7,0	6,8	7,7	7,2	9,1	9,3	8,9
XV	Malattie particolari della prima infanzia (b) . . . . .	498,9	369,7	288,4	285,0	279,5	320,3	314,6	327,7	291,3	279,5	262,2
XVI	Senilità, vecchiaia . . . . .	144,2	142,7	135,1	95,7	96,0	115,2	118,9	106,9	83,1	80,6	76,0
XVII	Morti violente o accidentali . . . . .	42,5	43,3	45,2	47,3	43,2	143,1	220,8	145,4	50,3	44,2	38,2
XVIII	Cause di morte non determinate . . . . .	38,9	12,3	25,8	13,2	12,5	54,1	61,3	33,2	32,8	24,9	15,4
<b>Complesso . . . . .</b>		<b>2.269,6</b>	<b>1.981,5</b>	<b>1.780,9</b>	<b>1.454,5</b>	<b>1.394,8</b>	<b>1.522,3</b>	<b>1.526,5</b>	<b>1.364,9</b>	<b>1.211,2</b>	<b>1.148,0</b>	<b>1.064,2</b>

(a) Per 10.000 parti. — (b) Per 10.000 nati vivi. — (c) La notevole differenza fra la mortalità per «malattie del sangue ed organi ematopoietici» dal 1930 in poi, in confronto dei periodi precedentemente considerati, deve attribuirsi a differenti criteri di codificazione della causa di morte, adottati nel 1924, per il cambiamento delle nomenclature nosologiche.

Prosp. 2. — Mortalità per classi di cause  
Mortalità 1900-02 = 100

Classi	CAUSE DI MORTE	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
I	Malattie infettive e parassitarie . . . . .	100	84	77	56	45	44	43	40	38	32	27
II	Cancro ed altri tumori . . . . .	100	113	119	125	147	154	152	161	165	172	176
III	Malattie reumatiche, della nutrizione, ghiandole endocrine, altre malattie generali e avitaminosi . . . . .	100	81	56	77	80	71	65	59	51	52	50
IV	Malattie del sangue e organi ematopoietici . . . . .	100	106	83	23	23	23	25	27	24	25	25
V	Avvelenamenti cronici e intossicazioni . . . . .	100	160	113	93	93	87	67	47	40	53	53
VI	Malattie sistema nervoso e organi dei sensi . . . . .	100	94	82	79	77	76	73	67	66	66	64
VII	Malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	100	112	106	93	100	117	117	113	109	111	106
VIII	Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .	100	85	71	56	57	46	39	37	37	33	31
IX	Malattie dell'apparato digerente . . . . .	100	75	69	52	43	41	33	32	30	27	24
X	Malattie dell'apparato urinario e genitale . . . . .	100	111	104	102	111	114	112	98	82	79	78
XI	Malattie della gravidanza, parto e puerperio . . . . .	100	90	98	107	111	68	67	72	62	59	58
XII	Malattie della pelle e tessuto cellulare . . . . .	100	77	64	53	59	61	52	47	34	29	22
XIII	Malattie delle ossa e organi della locomozione . . . . .	100	85	62	71	74	59	53	53	41	32	26
XIV	Vizi di conformazione congeniti . . . . .	100	124	115	151	171	166	188	176	222	227	217
XV	Malattie particolari della prima infanzia . . . . .	100	74	58	57	56	64	63	66	58	56	53
XVI	Senilità, vecchiaia . . . . .	100	99	94	66	67	80	82	74	58	56	53
XVII	Morti violente o accidentali . . . . .	100	102	106	111	102	337	520	342	118	104	90
XVIII	Cause di morte non determinate . . . . .	100	32	66	34	32	139	158	85	84	64	40
<b>Complesso . . . . .</b>		<b>100</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>47</b>

Per quattro classi, delle diciassette, e precisamente per le malattie infettive e parassitarie, per le malattie del sistema nervoso e organi dei sensi, per le malattie dell'apparato respiratorio e per quelle dell'apparato digerente, la successione dei quozienti mostra una ininterrotta diminuzione.

Per cinque classi, ed esattamente per le malattie reumatiche, della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali ed avitaminosi, per gli avvelenamenti cronici, per le malattie dell'apparato urinario, della pelle e delle ossa, i quozienti segnano una tendenza decrescente, ma con diverse oscillazioni.

Le malattie particolari della prima infanzia e senilità mostrano pure una riduzione, interrotta dalla guerra specie negli anni 1943-45, per riprendere poi la diminuzione.

I casi di morti violente e accidentali dopo un comportamento oscillatorio hanno mostrato una

ovvia recrudescenza negli anni 1943-45 per risendere poi al precedente livello.

Esaminiamo ora le principali cause con riguardo al loro contributo al totale dei decessi (Prosp. 3). Ai primi quattro posti si trovano, in generale, le enteriti, le polmoniti, le malattie del cuore e le lesioni intracraniche di origine vascolare. Più particolarmente, soltanto nei trienni 1900-02 e 1930-32 la tubercolosi dell'apparato respiratorio occupa il quarto posto, mentre negli altri periodi considerati passa al quinto posto e negli ultimi anni al sesto. Le enteriti, che nei trienni 1900-02, 1910-12 e 1920-22 occupano il primo posto, passano al secondo nel 1930-32, al quarto nel 1935-37 e negli anni 1943 e 1944 e al quinto negli anni 1945-48; le polmoniti che occupano il secondo ed il primo posto nei periodi dal 1900 al 1937 e negli anni dal 1943 al 1946, passano nel 1947 e 1948 al terzo posto. La diminuzione dell'impor-

Prosp. 3. — Principali cause di morte

Per: 1.000 morti in complesso

CAUSE DI MORTE	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Febbre tifoide e paratifi . . . . .	17	13	14	10	8	11	10	10	10	10	6
Difterite . . . . .	7	6	4	5	5	5	4	4	4	4	2
Morbillo . . . . .	11	12	6	7	4	1	1	1	3	1	1
Scarlattina . . . . .	2	4	3	3	1	..	..	..	..	..	..
Pertosse . . . . .	9	9	5	5	4	2	2	3	5	1	2
Tubercolosi dell'apparato respiratorio . . . . .	49	51	58	55	46	53	52	54	53	53	45
Altre forme tubercolari . . . . .	27	30	24	19	16	14	14	15	16	14	13
Influenza . . . . .	11	6	21	19	19	6	6	5	7	6	11
Sifilide . . . . .	7	9	6	4	5	5	5	5	5	6	5
Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	30	24	26	22	17	17	16	18	18	15	13
Tumori maligni . . . . .	23	33	38	50	60	57	55	66	77	85	94
Lesioni intracraniche d'origine vascolare . . . . .	45	54	63	92	96	83	83	86	97	104	112
Malattie del cuore . . . . .	77	94	102	111	114	128	134	145	160	173	178
Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	11	19	16	17	27	24	18	20	17	19	20
Diabete mellito . . . . .	1	2	3	6	7	6	6	6	6	6	7
Polmoniti . . . . .	102	109	116	133	143	102	89	95	107	101	100
Enterite . . . . .	147	117	122	111	89	75	57	61	63	56	51
Nefriti . . . . .	(a)	(a)	(a)	26	30	29	29	27	24	25	27
Infezione puerperale e altre forme settiche . . . . .	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio . . . . .	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2
Suicidi . . . . .	3	4	4	7	6	3	3	3	4	5	6
Omicidi . . . . .	2	2	4	2	1	3	18	18	4	3	2
Accidentali . . . . .	14	16	17	24	24	31	45	49	33	31	28
Rimanenti altre cause . . . . .	400	381	343	269	273	343	352	308	283	280	274
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

(a) Non è possibile fornire i dati perchè le «nefriti» sono codificate nella voce della nomenclatura nosologica «malattie dei reni» che comprende anche la pielite, l'albuminuria, l'uremia e i tumori non cancerosi né tubercolari.

tanza relativa delle enteriti e delle polmoniti è senz'altro da riportarsi ai successi che si sono ottenuti nella lotta contro tali malattie con la scoperta e l'introduzione in terapia dei sulfamidici, prima, e degli antibiotici poi.

Di fronte a tali cause, la cui frequenza va diminuendo, altre ve ne sono, invece, che segnano una importanza crescente: le malattie del cuore, le lesioni intracraniche di origine vascolare (legate al reumatismo articolare, all'arteriosclerosi, alla ipertensione arteriosa), ed i tumori maligni.

Le malattie del cuore che occupano il terzo posto fino al 1920-22 con in media il 9,1% del

complesso dei morti, passano al secondo nel 1930-32 (11,1%) e 1935-37 (11,4%) ed al primo negli anni dal 1943 al 1948 con una percentuale sempre crescente sul complesso dei morti (dal 12,8% nel 1943 al 17,8% nel 1948); le lesioni intracraniche di origine vascolare, dal quinto posto nel 1900-02 (4,5%) passano, con un aumento ininterrotto, al secondo negli anni 1947 e 1948 (rispettivamente il 10,4% e l'11,2%), come anche i tumori maligni che, dall'ottavo posto nel 1900-02, passano al quarto negli anni dal 1945 al 1948. Sull'aumento della mortalità per tumori maligni si dirà particolarmente più avanti.

#### DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE CAUSE DI MORTE (\*)

##### Malattie infettive e parassitarie

Se lo studio della mortalità per malattie infettive e parassitarie permette un giudizio sulle condizioni sanitarie di una popolazione, quello della sua distribuzione territoriale può far scoprire focolai endemici o epidemici e quindi indicare alle Autorità sanitarie, provvedimenti di ordine igienico-profilattico.

*Febbre tifoide e infezioni paratifiche.* — Pure avendo presentato una notevole diminuzione della mortalità per tali cause dal 1900-02 al 1948 (82%), esse sono tra le malattie infettive, quelle che segnano un maggior numero di morti dopo la tubercolosi dell'apparato respiratorio e le altre forme di tubercolosi (Prosp. 4). Una diminuzione si osserva, negli anni dal 1943 al 1948, in misura più o meno notevole, in tutte le Regioni ed è particolarmente accentuata in Lombardia, Sicilia, Piemonte, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Umbria. In tale periodo la Sicilia supera la mortalità media nazionale, in tutti gli anni; in 4 dei detti anni considerati la Sardegna e gli Abruzzi e Mo-

(\*) Oltre ai prospetti che contengono i quozienti di mortalità calcolati per i vari gruppi di cause e per le principali cause di morte si trovano esposti nell'Appendice i numeri indici calcolati in base ai dati di tali prospetti per le singole regioni, assumendo come base e la mortalità riscontrata per tali cause in Italia (Appendice A) e la mortalità del triennio 1900-02 (Appendice B).

lise; in 3 la Basilicata, la Puglia, la Campania, la Liguria e la Lombardia. Si rileva, di conseguenza, che la mortalità per febbre tifoide e paratifi, è, in genere, più elevata nelle Regioni meridionali ed insulari in relazione, evidentemente, con le particolari condizioni ambientali.

Negli anni cruciali della seconda guerra mondiale (1943-45) si nota una recrudescenza della mortalità per febbre tifoide e paratifi in tutte le Regioni, recrudescenza, però, che si dimostra molto meno accentuata e quasi sempre scompare nelle Regioni meridionali in cui, è notorio, i rigori della guerra furono più lievi e di più breve durata.

Nel 1948 i minori quozienti di mortalità si hanno nell'Emilia-Romagna (3,0 decessi su 100.000 abitanti), i maggiori nella Puglia (13,8).

*Difterite.* — La mortalità per difterite diminuisce fortemente dal 1900-02 al 1935-37 (60%) e la diminuzione va accentuandosi nel corso degli ultimi anni fino a raggiungere l'86% nel 1948 (Prosp. 5). Negli anni dal 1943 al 1948, anche nelle singole Regioni, si ha, generalmente, una diminuzione, ma sembra che una certa influenza abbiano esercitata le condizioni belliche sulla mortalità per difterite; in quanto si nota un aumento di essa negli anni 1943-1945 nelle Regioni settentrionali e centrali, mentre nelle altre continua l'andamento decrescente.

#### Prosp. 4. — Febbre tifoide e infezioni paratifiche

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte . . . . .	18,6	15,6	19,6	10,9	7,5	18,6	9,4	11,2	7,7	6,4	3,9
Valle d'Aosta . . . . .	—	31,2	—	—	—	12,1	7,6	17,2	7,5	9,7	4,3
Lombardia . . . . .	42,2	—	41,3	19,8	13,8	24,2	18,4	19,9	11,5	11,3	4,9
Trentino - Alto Adige . . . . .	—	—	—	9,3	8,6	12,6	10,1	16,0	8,4	9,8	5,5
Veneto . . . . .	—	—	—	—	—	13,3	13,1	15,4	9,4	10,0	4,5
Friuli - Venezia Giulia . . . . .	34,2	26,8	26,3	14,7	9,8	14,9	10,0	10,7	5,0	4,7	4,1
Liguria . . . . .	16,0	15,0	17,2	13,2	6,7	13,5	21,6	15,5	15,9	10,1	5,7
Emilia - Romagna . . . . .	28,9	21,0	22,0	14,7	7,9	8,9	11,0	17,4	6,0	4,8	3,0
Toscana . . . . .	43,0	22,8	22,5	11,9	6,1	10,5	25,8	14,3	6,3	6,8	4,4
Umbria . . . . .	40,0	37,1	32,9	22,5	9,8	14,9	20,0	13,0	10,2	9,1	4,5
Marche . . . . .	34,3	25,4	27,8	16,5	10,2	11,4	22,3	9,8	7,6	7,6	4,6
Lazio . . . . .	41,1	29,5	22,8	13,0	16,2	10,5	19,5	12,4	10,4	7,9	6,5
Abruzzi e Molise . . . . .	45,0	32,6	28,3	22,4	14,5	15,2	21,7	12,8	17,3	17,9	8,8
Campania . . . . .	35,0	18,4	17,0	16,0	13,3	16,1	13,3	8,2	13,1	17,5	11,1
Puglia . . . . .	64,9	25,3	18,2	17,5	13,9	14,5	8,2	9,7	21,9	25,6	13,8
Basilicata . . . . .	37,5	19,8	25,2	18,4	12,0	16,3	12,2	6,3	15,5	17,2	11,5
Calabria . . . . .	44,2	26,0	26,4	13,6	9,6	11,2	7,3	7,2	9,9	7,1	6,4
Sicilia . . . . .	61,9	35,7	23,5	14,0	12,7	25,7	15,4	16,6	17,7	12,0	10,7
Sardegna . . . . .	16,3	13,1	25,8	11,4	7,3	22,6	14,2	23,2	27,6	9,8	10,8
<b>Italia . . . . .</b>	<b>39,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>15,2</b>	<b>11,0</b>	<b>16,3</b>	<b>15,2</b>	<b>14,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,1</b>	<b>6,9</b>

#### Prosp. 5 — Diffterite

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte . . . . .	15,3	9,3	8,1	4,5	4,3	11,1	7,5	7,7	4,9	2,4	1,1
Valle d'Aosta . . . . .	—	—	—	—	—	35,2	24,0	16,1	6,4	4,3	2,2
Lombardia . . . . .	33,9	13,5	7,4	8,7	10,6	10,0	7,0	6,2	5,6	5,0	1,8
Trentino - Alto Adige . . . . .	—	—	—	10,8	6,2	10,8	14,2	14,8	10,7	9,2	6,2
Veneto . . . . .	—	—	—	—	—	9,1	7,2	8,9	6,6	4,6	1,7
Friuli - Venezia Giulia . . . . .	18,9	13,5	11,9	10,1	7,0	7,6	5,8	7,5	4,6	3,5	2,3
Liguria . . . . .	14,6	11,4	7,3	4,3	4,7	7,7	9,4	5,1	3,9	2,5	1,2
Emilia - Romagna . . . . .	17,0	13,4	9,3	7,3	4,6	7,2	12,2	14,9	4,6	2,2	1,4
Toscana . . . . .	21,5	7,9	8,4	6,1	4,2	6,3	11,5	6,3	3,5	2,2	0,9
Umbria . . . . .	15,3	8,4	12,0	9,7	8,7	8,4	9,6	8,3	4,1	2,6	1,3
Marche . . . . .	8,8	11,1	8,9	11,4	8,0	7,2	9,3	5,6	3,5	1,3	0,8
Lazio . . . . .	10,2	14,1	9,0	11,7	7,8	8,1	8,2	4,6	4,6	3,6	2,0
Abruzzi e Molise . . . . .	9,0	16,0	8,2	9,9	9,9	8,7	5,4	3,1	3,2	4,2	1,7
Campania . . . . .	8,7	10,8	6,6	8,9	5,5	4,3	3,2	2,3	4,1	5,9	4,1
Puglia . . . . .	12,2	10,0	6,1	4,0	4,4	3,5	2,3	1,4	2,2	2,8	2,5
Basilicata . . . . .	9,0	10,9	7,1	7,6	5,2	1,9	3,1	2,4	1,5	0,7	2,3
Calabria . . . . .	12,4	13,2	7,7	8,4	4,9	6,3	3,6	3,1	4,0	3,5	4,0
Sicilia . . . . .	10,3	12,0	5,2	6,4	4,7	3,2	2,8	2,1	3,9	3,6	2,8
Sardegna . . . . .	5,0	7,2	6,1	7,6	6,0	5,3	3,9	5,1	9,4	7,7	6,9
<b>Italia . . . . .</b>	<b>16,2</b>	<b>11,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>5,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,3</b>

Nel corso del tempo si ha uno spostamento dei massimi della mortalità per difterite: mentre, dal 1943 al 1947, i valori più elevati si verificano nelle Regioni settentrionali, nel 1948 si osservano, invece, nelle Regioni meridionali ed insulari. Può, quindi, dirsi che variano, da un periodo all'altro, le Regioni a più forte incidenza, per cui si

deve pensare, più che a fattori ambientali costanti che influiscono sulla malattia, a particolari condizioni epidemiologiche, meno legate all'ambiente.

Nel 1948 i più bassi quozienti di mortalità sono segnati nelle Marche (0,8) e nella Toscana (0,9); i più alti nella Sardegna (6,9) e nel Trentino-Alto Adige (6,2).

**Morbillo.** — La mortalità per morbillo segna, nel complesso del Paese, una diminuzione del 97% dal 1900-02 al 1948. Nelle singole Regioni, si verificano negli anni dal 1943 al 1948, sensibili oscillazioni, ciò che è una caratteristica del genio epidemico, estremamente variabile, di tale malattia; in genere, però, la mortalità diminuisce notevolmente anche nelle singole Regioni (Prosp. 6).

La mortalità negli anni dal 1943 al 1948 è più elevata nella Puglia, nella Basilicata e nella Calabria. Nessuna influenza ha su tale malattia il periodo bellico, mentre nel 1946 si verifica sull'intero Paese (eccettuato il Trentino-Alto Adige), un aumento della mortalità in confronto dell'anno precedente.

Il minimo quoziente di mortalità si verifica, nel 1948, nella Toscana (0,03), il massimo nella Basilicata (6,6 decessi su 100.000 ab.).

**Scarlattina.** — La mortalità per scarlattina diminuisce notevolmente ed il quoziente del 1948 segna, in confronto del 1900-02, la diminuzione del 98%. Analogo comportamento, all'incirca, si verifica negli anni dal 1943 al 1948, nelle singole Regioni, e sembra che il periodo bellico abbia poco influito sull'andamento della mortalità per tale malattia (Prosp. 7).

Nel periodo 1943-1948 la mortalità per scarlattina si presenta più elevata nelle Regioni centro-settentrionali, ed in special modo nel Trentino-Alto Adige e nel Lazio.

Il minimo quoziente di mortalità è segnato, nel 1948, nella Sicilia (0,02), il massimo nel Trentino-Alto Adige (0,7), mentre, in tale anno, non si verificano decessi per scarlattina nella Campania e nella Sardegna.

**Pertosse.** — La mortalità per pertosse presenta una notevole diminuzione (91%), dal 1900-02 al 1948 (Prosp. 8). Tale andamento negli anni 1943-1948, si riscontra pressappoco nei medesimi termini anche nelle singole Regioni, però è da notare che nel 1946, a confronto dell'anno precedente, in numerose Regioni (eccettuate la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Lazio, la Campania e la Sicilia) e nell'intero Paese si verifica un brusco e, delle volte, notevole aumento della mortalità. In genere, si può dire, che nel sessennio 1943-1948, la maggiore mortalità per pertosse si verifica nella Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Abruzzi e Molise e Campania.

Nel 1948 segnano i più bassi quozienti di mortalità la Sardegna (0,1) e le Marche (0,2); il più alto la Campania (4,1).

Prosp. 6. — Morbillo

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	22,7	12,6	5,1	3,9	1,5	0,5	0,2	0,4	2,2	0,1	0,1
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,1	—	—
Lombardia	30,5	29,5	9,2	8,5	5,6	1,3	1,8	0,9	2,0	0,5	0,7
Trentino - Alto Adige	—	—	—	3,4	1,1	1,2	0,9	2,7	1,6	0,4	1,0
Veneto	—	—	—	—	—	—	0,9	0,7	1,2	0,6	0,4
Friuli - Venezia Giulia	21,3	12,9	4,5	6,1	4,0	0,2	0,1	1,5	4,6	0,6	1,6
Liguria	23,9	12,4	4,1	2,5	1,4	1,8	2,8	—	2,6	0,5	0,1
Emilia - Romagna	17,3	21,0	5,7	6,6	3,3	0,7	0,7	2,1	2,8	0,3	0,1
Toscana	17,5	13,4	8,0	4,4	2,1	1,2	0,4	0,2	3,7	0,8	—
Umbria	16,2	12,8	8,1	3,0	2,9	1,2	0,8	0,1	3,8	1,8	0,1
Marche	19,4	11,1	6,6	4,8	4,2	1,0	0,5	1,0	2,1	0,4	0,5
Lazio	44,9	38,9	18,2	13,7	7,3	1,5	4,4	1,7	3,6	0,4	0,6
Abruzzi e Molise	24,7	23,7	11,4	11,1	7,1	1,1	1,0	0,2	7,6	3,6	0,2
Campania	34,6	25,4	12,2	14,6	7,3	5,9	0,2	0,6	10,3	1,1	0,4
Puglia	23,5	58,5	17,1	27,9	12,7	3,6	1,4	3,4	5,2	3,3	4,5
Basilicata	76,6	51,9	38,0	33,9	16,3	1,7	0,2	4,1	7,9	1,7	6,6
Calabria	28,3	34,3	21,3	9,5	7,4	1,3	0,5	1,7	5,4	1,1	2,9
Sicilia	18,5	31,4	9,6	14,1	3,0	0,5	—	—	3,9	0,4	0,3
Sardegna	10,7	22,3	17,4	13,9	5,5	0,7	—	—	2,2	—	0,2
<b>Italia</b>	<b>25,0</b>	<b>24,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>

Prosp. 7 — Scarlattina

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	1,0	1,6	0,8	0,6	0,8	0,3	0,1	0,1	0,4	0,4	0,1
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1
Lombardia	0,7	1,7	2,9	0,7	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Trentino - Alto Adige	—	—	—	2,6	0,9	0,9	1,6	0,3	0,6	0,7	0,7
Veneto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli - Venezia Giulia	2,6	3,1	0,7	1,4	0,5	0,2	0,1	—	0,3	0,2	0,2
Liguria	3,6	1,6	0,9	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	0,5	0,4	0,1
Emilia - Romagna	2,0	3,2	1,4	0,8	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2
Toscana	4,4	1,9	0,9	0,7	0,9	0,3	—	0,2	0,3	0,3	0,1
Umbria	1,0	2,2	11,7	1,3	0,3	0,5	0,9	0,5	—	0,3	0,1
Marche	4,4	1,8	2,5	1,4	0,6	0,3	0,2	—	0,2	0,2	0,3
Lazio	1,3	3,5	32,0	11,3	4,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Abruzzi e Molise	5,7	8,7	5,2	3,5	2,6	0,6	—	—	—	0,1	0,1
Campania	5,1	8,1	4,0	4,2	6,1	0,4	0,1	—	0,1	0,1	—
Puglia	11,9	11,1	15,0	5,9	0,8	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Basilicata	14,9	11,4	6,2	22,7	2,1	0,2	0,3	—	0,2	—	0,2
Calabria	16,3	31,1	5,8	22,2	0,8	0,1	—	0,2	0,1	—	0,1
Sicilia	4,1	32,5	10,1	7,5	0,9	0,1	—	—	—	—	—
Sardegna	0,3	0,2	0,1	16,1	7,3	—	0,3	—	0,1	—	—
<b>Italia</b>	<b>4,1</b>	<b>8,1</b>	<b>5,3</b>	<b>4,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>

Prosp. 8 — Pertosse

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	27,6	22,9	10,6	9,2	6,7	4,1	4,6	4,1	5,3	1,9	2,0
Trentino - Alto Adige	—	—	—	8,7	7,2	5,5	1,6	10,3	9,2	1,3	1,6
Veneto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli - Venezia Giulia	30,9	32,0	14,7	8,5	6,9	3,3	4,7	2,6	5,6	1,9	2,9
Liguria	17,3	13,1	8,4	4,6	3,1	2,0	6,5	1,1	2,5	0,7	1,5
Emilia - Romagna	28,3	23,4	12,8	6,9	5,6	2,6	1,2	2,2	8,8	1,0	1,0
Toscana	23,1	18,7	8,6	6,0	4,0	2,5	1,3	2,6	5,5	0,6	1,1
Umbria	23,2	15,4	9,9	8,4	6,0	2,6	1,6	3,8	8,3	0,9	0,4
Marche	22,4	22,2	11,1	6,8	6,0	1,8	2,4	3,9	8,1	0,2	0,2
Lazio	12,9	16,4	8,3	5,9	5,9	2,8	4,4	6,1	4,8	1,2	2,5
Abruzzi e Molise	17,6	14,6	11,7	6,6	5,8	5,2	1,8	3,9	8,4	2,2	3,3
Campania	10,8	8,1	5,3	5,2	4,9	4,7	1,9	5,3	2,9	1,7	4,1
Puglia	11,1	10,6	8,0	5,5	3,8	1,8	1,5	2,5	3,0	1,4	2,7
Basilicata	13,5	16,9	6,0	8,3	5,0	6,4	2,4	2,2	4,2	1,5	2,8
Calabria	20,8	14,9	5,8	9,1	6,0	2,0	1,6	3,3	5,0	1,0	0,8
Sicilia	15,6	11,6	6,0	3,2	4,1	1,9	1,0	2,7	2,6	1,0	1,5
Sardegna	33,3	26,4	19,6	10,3	12,8	1,1	0,7	12,8	14,2	1,7	0,1
<b>Italia</b>	<b>21,2</b>	<b>18,2</b>	<b>9,3</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>

**Tubercolosi dell'apparato respiratorio.** — L'andamento della mortalità per tale causa è stato sempre seguito con la più grande attenzione in quanto essa costituisce una delle più importanti malattie sociali, specialmente per il fatto che elimina soggetti giovani o nella pienezza della loro attività lavorativa. La prevenzione di questo danno e la cura della malattia che lo provoca rivestono,

quindi, una particolare importanza dal punto di vista economico-sociale.

Le cifre riportate dimostrano come la lotta intrapresa contro tale piaga sociale abbia riportato soddisfacenti successi, che, come è prevedibile, si affermeranno ancora maggiormente coi nuovi metodi di cura (Prosp. 9 e Graf. 1). Esse, infatti, indicano chiaramente come la mortalità dal 1900-02

## Prosp. 9. — Tubercolosi dell'apparato respiratorio

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte . . . . .	136,7	123,5	122,3	86,9	71,5	76,0	80,0	76,6	68,7	69,5	53,1
Valle d'Aosta . . . . .	—	—	—	—	—	69,3	52,3	64,5	41,8	49,5	33,4
Lombardia . . . . .	147,9	128,4	126,1	92,9	69,8	95,6	102,4	96,7	77,2	74,3	58,9
Trentino - Alto Adige . . . . .	—	—	—	125,9	111,1	139,0	121,4	152,4	117,4	100,9	86,6
Veneto . . . . .	—	—	—	—	—	90,9	97,3	85,0	73,4	72,3	58,4
Friuli - Venezia Giulia . . . . .	116,9	116,0	124,4	100,0	78,8	92,9	86,5	55,1	73,5	66,3	62,0
Liguria . . . . .	171,0	152,4	146,0	100,5	80,6	111,4	110,8	107,1	84,2	74,9	56,1
Emilia - Romagna . . . . .	118,0	101,9	99,2	74,9	60,8	88,0	88,4	79,6	66,8	61,3	44,4
Toscana . . . . .	139,2	126,4	120,6	95,7	76,8	109,6	117,9	96,9	77,9	63,8	53,7
Umbria . . . . .	83,3	84,8	97,5	69,5	55,4	64,4	73,3	54,1	52,6	41,1	34,4
Marche . . . . .	82,6	73,4	84,3	63,5	49,3	63,9	60,0	48,0	46,7	44,0	32,2
Lazio . . . . .	117,0	113,6	111,0	74,4	64,6	95,0	111,4	83,4	75,9	68,1	50,6
Abruzzi e Molise . . . . .	69,8	66,6	65,9	52,6	42,3	46,6	38,5	39,6	41,0	40,7	28,7
Campania . . . . .	81,4	72,2	72,6	55,3	50,9	68,4	59,8	53,0	52,3	53,8	41,8
Puglia . . . . .	94,0	84,3	91,5	72,5	58,8	66,7	59,8	55,9	53,6	55,4	43,9
Basilicata . . . . .	52,2	52,1	60,6	41,4	29,5	24,4	24,9	24,4	24,5	25,5	20,8
Calabria . . . . .	69,6	58,0	65,5	48,8	37,9	32,0	29,5	31,0	30,9	33,7	23,1
Sicilia . . . . .	85,6	70,7	70,8	60,2	51,9	58,0	41,1	46,8	47,2	44,3	38,0
Sardegna . . . . .	118,6	121,6	149,9	123,7	100,7	88,6	53,4	75,3	88,2	74,5	61,0
Italia . . . . .	111,6	101,3	102,9	79,8	64,6	80,2	79,1	73,1	64,3	60,8	47,8

in poi, è andata notevolmente diminuendo, pure avendo accusato una sensibile recrudescenza nell'ultimo periodo bellico 1943-45; il quoziente di mortalità del 1948 (47,8) segna, invece, una diminuzione del 58% in confronto di quello del 1900-02 (111,6).

Volendo esaminare la distribuzione territoriale della mortalità per tale malattia, è bene avvertire che i dati si riferiscono alla mortalità secondo il luogo dove avvenne il decesso e non secondo l'abitual residenza del deceduto. La maggiore o minore incidenza della mortalità in una determinata Regione può essere notevolmente influenzata dal fatto che in essa esistono numerosi luoghi di cura, sia pubblici che privati, che richiamano un maggior numero di ammalati. Ciò si verifica, presumibilmente, nel sessennio 1943-1948, nelle Regioni settentrionali e nel Lazio, in cui si nota una mortalità per tubercolosi dell'apparato respiratorio particolarmente elevata, mentre per la Sardegna ciò deve attribuirsi ad una maggiore reale diffusione della malattia.

In ogni modo è confortevole constatare che in tutte le Regioni la mortalità per tubercolosi polmonare, dopo un aumento verificatosi nel pe-

riodo bellico 1943-45, mostra, in genere, un andamento discendente. Il più basso quoziente di mortalità si ha, nel 1948, nella Basilicata (20,8), il più alto nel Trentino-Alto Adige (86,6).

*Tutte le altre forme di tubercolosi.* — Notevolmente diminuita — ed anzi relativamente in misura maggiore di quella per tubercolosi polmonare — è anche la mortalità per le localizzazioni tubercolari extraripiratorie poiché il quoziente di mortalità del 1948 (13,7) segna una diminuzione del 78% in confronto di quello del 1900-02 (61,3) (Prosp. 10 e Graf. 1).


Anche nelle singole Regioni si nota, grosso modo, nel sessennio 1943-1948, un andamento a tendenza decrescente e solamente in alcune di esse (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Marche, Lazio) si verifica, negli anni 1943-1945, una lieve recrudescenza della mortalità. La maggiore mortalità per tubercolosi extraripiratorie si verifica, nel sessennio 1943-1948, in genere, nelle Regioni centro-settentrionali e nella Sardegna, e il più basso quoziente di mortalità è, nel 1948, quello del Piemonte e dell'Umbria (10,3), il più alto è quello della Sardegna (22,6).

## Prosp. 10. — Tutte le altre forme di tubercolosi

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte . . . . .	40,8	43,2	31,8	22,8	18,2	17,1	16,2	15,6	16,4	12,7	10,3
Valle d'Aosta . . . . .	—	—	—	—	—	13,2	34,9	21,5	11,8	19,4	15,1
Lombardia . . . . .	68,5	67,0	49,2	29,2	22,7	22,3	23,0	22,5	20,1	18,6	13,1
Trentino - Alto Adige . . . . .	—	—	—	33,0	28,9	23,4	25,0	23,9	24,8	21,7	14,9
Veneto . . . . .	—	—	—	—	—	31,3	29,2	26,8	27,2	21,7	17,2
Friuli - Venezia Giulia . . . . .	72,9	77,3	60,9	37,9	29,0	28,1	20,5	21,7	20,0	16,3	15,9
Liguria . . . . .	57,6	58,5	37,1	25,4	21,1	23,2	25,1	21,9	21,5	15,2	13,7
Emilia - Romagna . . . . .	69,7	64,9	48,5	29,7	27,1	28,4	27,4	23,4	23,0	18,2	13,9
Toscana . . . . .	60,5	66,0	49,8	29,8	24,4	26,7	27,3	22,2	21,8	16,1	12,8
Umbria . . . . .	61,3	54,2	45,3	29,5	24,5	23,5	21,6	20,7	19,5	14,1	10,3
Marche . . . . .	58,8	53,6	45,3	27,1	22,6	24,2	27,3	23,7	20,7	18,4	13,8
Lazio . . . . .	82,9	65,4	47,2	27,7	22,1	23,6	24,9	24,0	23,3	16,2	12,7
Abruzzi e Molise . . . . .	72,9	59,2	41,6	27,8	20,5	18,4	13,4	15,7	17,7	16,0	14,3
Campania . . . . .	68,9	56,6	36,9	21,5	18,2	17,6	16,4	15,4	15,5	14,7	13,8
Puglia . . . . .	84,4	69,1	50,6	33,6	24,6	19,7	15,9	19,0	19,0	16,5	17,4
Basilicata . . . . .	49,9	48,5	33,2	22,1	21,4	13,8	18,0	15,3	17,1	16,9	17,0
Calabria . . . . .	42,6	41,2	29,4	19,1	15,9	13,4	9,8	12,3	11,2	11,0	10,4
Sicilia . . . . .	37,1	39,8	23,1	18,6	15,8	14,0	10,4	12,0	15,2	12,0	11,1
Sardegna . . . . .	54,9	86,1	62,1	48,5	42,5	34,7	21,8	27,4	29,0	24,0	22,6
Italia . . . . .	61,3	59,5	43,2	28,1	22,8	22,0	20,7	19,9	19,9	16,4	13,7

Graf. 1. — Mortalità per malattie infettive e parassitarie, per polmoniti e broncopolmonite



**Influenza.** — L'andamento epidemiologico di tale malattia, nella quale sono spesso comprese dai medici varie affezioni che non sono di tale natura e non hanno, perciò, alcuna attinenza col virus influenzale, è fortemente oscillante. Nel sessennio 1943-1948 si hanno, in particolare, due rialzi della mortalità per influenza nel 1946 e nel 1948, di fronte agli anni rispettivi 1945 e 1947, molto notevoli in alcune Regioni: Liguria, Toscana, Lazio, nel 1946; Trentino-Alto Adige, Lazio,

Abruzzi e Molise, Calabria, Sardegna nel 1948; ma in nessuna Regione nel periodo indicato la mortalità è superiore a quella del triennio 1900-02. (Prosp. 11). I quozienti più elevati si osservano, nel sessennio 1943-1948, generalmente, nel Piemonte, nel Trentino-Alto Adige, nelle Regioni meridionali e nella Sardegna. Nel 1948, il più basso quoziente di mortalità si verifica nel Friuli-Venezia Giulia (5,7), il più alto nella Sardegna (28,0).

Prosp. 11. — Influenza

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	25,9	6,6	33,0	31,8	31,9	9,2	11,4	6,8	9,7	8,4	13,0
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	5,5	2,2	3,2	—	5,4	7,5
Lombardia	21,1	8,8	35,9	26,2	26,1	6,1	8,5	4,2	6,7	6,7	8,1
Trentino - Alto Adige	—	—	—	24,2	23,7	7,8	20,6	12,9	9,4	11,8	26,4
Veneto	25,2	10,0	26,0	19,6	19,1	6,3	7,8	4,2	5,1	6,4	10,6
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	4,7	5,7	3,0	3,9	4,3	5,7
Liguria	21,6	7,0	40,7	15,6	18,7	4,1	4,7	2,6	5,9	5,8	8,3
Emilia - Romagna	21,6	7,1	31,8	19,2	21,0	7,7	8,9	5,8	6,7	8,3	8,4
Toscana	23,9	7,2	39,0	27,0	24,4	7,4	7,2	4,4	8,2	5,7	9,2
Umbria	33,6	9,4	50,4	29,3	32,8	6,4	6,9	6,1	9,8	7,4	10,8
Marche	26,7	10,0	43,2	22,9	23,7	6,7	6,3	6,3	10,2	7,1	10,3
Lazio	24,4	11,6	43,9	21,2	22,9	8,3	6,5	3,9	6,2	5,6	13,9
Abruzzi e Molise	31,9	14,8	48,3	29,5	28,4	10,6	7,2	7,0	10,3	8,6	16,1
Campania	23,0	12,9	49,2	37,2	34,1	14,5	9,1	8,0	9,2	6,1	11,7
Puglia	26,0	18,7	35,1	51,8	48,3	21,4	21,0	16,4	13,2	11,2	12,6
Basilicata	41,4	23,3	59,3	41,9	25,6	11,1	14,8	11,6	7,8	8,0	14,3
Calabria	51,5	20,2	47,1	33,3	33,1	9,7	5,5	5,8	6,5	5,0	12,6
Sicilia	21,6	11,3	26,3	21,2	18,9	7,8	4,3	4,3	7,2	5,6	9,8
Sardegna	39,7	25,6	61,7	27,4	35,7	11,8	7,5	10,5	12,2	7,1	28,0
<b>Italia</b>	<b>25,9</b>	<b>11,1</b>	<b>37,5</b>	<b>27,3</b>	<b>26,7</b>	<b>9,1</b>	<b>8,7</b>	<b>6,2</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>11,4</b>

**Sifilide.** — In questa voce sono compresi sia i decessi ascritti alla sifilide, come quelli ascritti all'atassia locomotrice progressiva o tabe dorsale ed alla paralisi progressiva degli alienati, considerando queste due ultime malattie costantemente di natura luetica. Anche per la sifilide si ha una notevole diminuzione della mortalità nel 1948, a confronto del 1900-02, pari al 63%. (Prospetto 12). I quozienti più elevati si hanno, nel sessennio 1943-1948 nella Campania, nella Liguria, nel Lazio, nella Lombardia, nel Piemonte. La guerra pare abbia influito sull'andamento della mortalità per sifilide, in quanto, nel 1944, in tutte le Regioni, eccettuato il Friuli-Venezia Giulia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, si verifica un più o meno notevole aumento della mortalità in confronto dell'anno precedente. Nel 1948 il

più basso quoziente è segnato nelle Marche (2,2), il più alto nella Campania (11,2).

**Rimanenti malattie infettive e parassitarie.** — La mortalità per questo grande gruppo di malattie (1) è notevolmente diminuita ed il quoziente del 1948, in confronto di quello del 1900-02, segna una diminuzione dell'80%. (Prosp. 13 e Graf. 1). Nel sessennio 1943-1948 la maggiore mortalità

(1) Vi sono comprese: la febbre ondulante, la meningite cerebro spinale epidemica, la pustola maligna, l'erisipela, il tetano, la lebbra, le infezioni purulente e setticemie, l'infezione gonococcica, le altre malattie batteriche, la dissenteria, la malaria, le altre malattie dovute a protozoi, le altre malattie dovute a spirochete, il vaiolo, la poliomielite anteriore acuta, l'encefalite infettiva acuta, le altre malattie da virus filtrabili, il tifo petecchiale, le altre rickettsie, le malattie dovute ad elminti, le micosi e le altre malattie infettive e parassitarie.

Prosp. 12. - Sifilide (a)

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	12,6	15,3	7,3	5,6	6,9	7,7	8,6	7,5	7,1	7,0	6,1
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	5,5	7,6	5,4	6,4	4,3	3,2
Lombardia	12,4	15,0	7,5	5,8	7,0	9,3	10,2	7,9	7,2	7,9	6,7
Trentino - Alto Adige	—	—	—	4,8	5,1	6,2	6,5	4,7	4,0	5,2	5,4
Veneto	10,6	14,2	7,0	4,2	5,4	4,3	6,4	5,0	4,5	4,1	3,9
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	6,3	5,1	5,7	4,8	5,9	3,5
Liguria	15,9	17,9	7,9	5,9	8,7	10,4	11,3	9,8	8,6	9,8	8,3
Emilia - Romagna	20,4	22,4	10,0	4,0	4,4	5,8	6,8	5,3	5,0	5,7	4,0
Toscana	17,2	20,2	8,3	4,3	4,6	4,7	6,3	4,3	4,0	3,2	3,1
Umbria	19,7	25,0	21,1	3,1	4,0	3,9	5,5	3,9	2,7	3,5	2,7
Marche	21,7	25,9	13,2	3,8	3,2	4,5	5,8	4,5	3,9	2,7	2,2
Lazio	28,8	26,8	23,1	7,8	10,2	10,1	10,1	8,0	7,3	8,1	6,8
Abruzzi e Molise	12,6	12,0	6,2	5,9	5,8	4,2	4,9	4,8	5,0	5,8	4,6
Campania	19,5	23,7	19,7	12,6	13,4	11,7	11,7	13,2	12,5	12,5	11,2
Puglia	10,8	12,0	7,9	6,3	6,6	5,3	6,5	6,7	5,7	5,4	5,3
Basilicata	9,7	10,9	6,5	6,4	6,7	4,7	5,8	6,8	6,2	5,3	5,1
Calabria	16,4	18,0	11,0	6,6	7,6	6,8	6,2	6,6	6,4	6,9	5,6
Sicilia	25,2	25,8	14,9	5,4	5,9	5,9	5,1	5,8	4,9	5,6	5,2
Sardegna	7,7	13,9	6,4	3,7	3,6	2,0	1,7	3,2	2,8	4,2	4,0
<b>Italia</b>	<b>15,3</b>	<b>18,7</b>	<b>10,8</b>	<b>5,9</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>5,7</b>

(a) Compresi i morti per « Atassia locomotrice progressiva e per paralisi progressiva degli alienati ».

Prosp. 13. — Rimanenti malattie infettive e parassitarie.

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	22,6	18,4	19,9	19,8	15,9	19,9	18,4	18,2	15,9	14,4	12,1
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	26,4	10,9	10,8	11,8	10,8	6,5
Lombardia	28,9	23,2	22,5	23,4	19,7	19,3	18,5	17,6	16,4	15,1	12,6
Trentino - Alto Adige	—	—	—	20,2	16,8	17,8	20,2	18,0	14,3	10,6	10,6
Veneto	31,5	25,3	32,7	25,4	20,1	22,0	17,7	20,0	17,6	16,2	13,5
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	20,1	18,2	20,4	18,9	16,4	12,0
Liguria	23,0	27,0	19,8	17,9	15,8	15,2	17,0	19,2	17,3	14,6	11,9
Emilia - Romagna	35,7	30,2	27,1	25,4	20,6	18,7	19,3	20,5	16,9	15,7	11,8
Toscana	28,8	29,7	24,0	26,1	20,7	22,4	24,3	22,9	18,3	15,9	12,9
Umbria	25,7	22,1	29,2	22,4	18,7	13,9	18,5	17,7	13,5	12,7	8,0
Marche	21,7	24,0	26,2	24,9	19,1	20,3	23,7	16,2	16,9	15,2	11,8
Lazio	65,1	48,0	42,9	33,2	22,5	19,6	30,3	36,1	20,8	15,1	10,8
Abruzzi e Molise	60,9	39,4	38,0	27,4	18,7	18,4	17,3	15,4	16,8	16,1	11,8
Campania	87,1	81,1	38,9	27,8	22,6	34,1	37,5	29,0	26,0	22,0	18,4
Puglia	186,8	69,2	104,8	54,3	28,5	27,6	26,2	24,0	24,3	23,2	17,0
Basilicata	214,5	57,9	73,4	93,6	34,9	34,1	27,6	28,3	29,5	21,9	16,0
Calabria	134,2	76,9	77,2	51,0	34,3	32,9	31,0	28,4	26,6	21,7	18,1
Sicilia	121,3	104,2	99,6	45,1	33,7	40,0	32,3	32,0	36,1	22,7	16,1
Sardegna	236,3	131,6	125,7	74,3	55,9	71,3	32,8	46,5	39,4	24,3	16,4
<b>Italia</b>	<b>68,8</b>	<b>48,0</b>	<b>45,8</b>	<b>31,7</b>	<b>23,3</b>	<b>25,5</b>	<b>24,3</b>	<b>23,9</b>	<b>21,5</b>	<b>17,8</b>	<b>13,8</b>

si verifica, in genere, nelle Regioni meridionali ed insulari. Il periodo bellico non influisce notevolmente, in genere, sull'andamento della mortalità per questo gruppo di malattie, nonostante una più o meno notevole recrudescenza della mortalità per alcune di dette malattie, verifica-

tasi in tale periodo, come ad es., nel Lazio; nella Campania, nella Sicilia e nella Sardegna.

Nel 1948 i più bassi quozienti di mortalità si verificano nella Valle d'Aosta (6,5) e nell'Umbria (8,0), i più alti nella Campania (18,4) e nella Calabria (18,1).

### Tumori maligni

Come si è già detto, la mortalità per tale causa segna un forte aumento (Prosp. 14 e Graf. 2). Varie sono state le ipotesi invocate per giustificare l'imponente e quasi costante aumento di tale morbo, come la maggiore moderna finezza dei mezzi di indagine — e particolarmente quelli radiologici — che permettono di scoprire e diagnosticare tumori che prima sfuggivano all'esame del medico, e l'invecchiamento della popolazione, considerando che tale causa di morte è molto frequente nelle età adulte ed avanzate.

La prima ipotesi, che può invocarsi se si fa il confronto fra la mortalità qual'era 10-15 anni fa e quella attuale, non regge, quando si constata che da un anno all'altro la mortalità è sempre in costante aumento (vedi gli anni dal 1944 al 1948). La seconda ipotesi dell'invecchiamento della popolazione sarà illustrata quando si esamineranno le cause di morte secondo l'età. Inoltre il peso che può attribuirsi a dette ipotesi potrà, ovviamente, anche essere chiarito, quando si esaminerà la mortalità per i tumori in sedi poco accessibili e di difficile diagnosi e per i tumori in sedi accessibili e di facile diagnosi.

Prosp. 14. — Tumori maligni

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte						131,9	133,4	142,4	140,4	144,8	150,2
Valle d'Aosta	52,5	73,3	81,7	94,7	115,7	74,8	89,4	79,6	71,7	77,5	101,3
Lombardia	70,5	85,5	93,6	95,7	113,2	123,5	124,6	137,4	136,0	140,1	143,9
Trentino - Alto Adige				120,7	125,2	125,7	129,3	126,8	121,4	135,6	133,8
Veneto	55,9	65,8	64,5	78,2	90,5	90,0	89,6	94,2	96,1	97,8	99,1
Friuli - Venezia Giulia						115,0	100,0	108,7	116,0	120,7	124,9
Liguria	63,0	76,6	84,1	92,6	112,9	110,7	108,0	116,1	129,2	136,0	131,1
Emilia - Romagna	77,7	94,5	97,9	102,7	117,6	127,4	122,3	126,6	129,9	135,8	137,5
Toscana	83,5	97,4	105,9	112,7	131,0	138,0	131,3	133,4	143,0	145,8	147,9
Umbria	47,9	58,1	58,3	64,2	70,3	75,7	73,9	81,2	89,1	88,5	86,3
Marche	61,7	70,6	72,1	70,5	80,1	88,2	90,1	86,0	90,9	94,8	94,8
Lazio	55,4	68,4	76,1	70,0	79,4	78,1	73,3	72,8	81,5	89,4	91,0
Abruzzi e Molise	37,2	47,7	47,2	45,0	48,0	48,6	37,9	45,0	55,6	57,5	60,5
Campania	39,1	46,0	44,9	35,7	40,8	38,4	35,1	41,7	45,6	49,4	51,7
Puglia	33,2	41,3	38,6	36,4	43,0	40,0	36,9	43,7	46,0	52,3	53,7
Basilicata	32,0	40,4	41,0	33,7	37,1	39,5	32,3	35,6	36,0	43,7	41,4
Calabria	30,2	38,1	38,6	33,8	35,9	34,8	31,8	37,3	39,3	42,3	45,7
Sicilia	33,9	44,4	41,6	38,7	47,6	48,7	46,1	50,3	53,3	57,2	62,0
Sardegna	20,9	34,0	36,6	40,1	49,6	48,3	32,2	47,8	53,3	53,5	57,6
<b>Italia</b>	<b>53,0</b>	<b>65,7</b>	<b>68,5</b>	<b>72,2</b>	<b>83,9</b>	<b>87,3</b>	<b>84,2</b>	<b>90,1</b>	<b>93,4</b>	<b>97,6</b>	<b>99,8</b>

Osserviamo ora i dati sulla mortalità per il complesso dei tumori maligni nel Paese e nelle singole Regioni. Il continuo sensibile aumento, si constata, all'incirca, in tutte le Regioni anche nel sessennio 1943-1948, quantunque negli anni più turbolenti della guerra, una certa deflessione della mortalità si è riscontrata in alcune Regioni.

La mortalità, negli anni dal 1943 al 1948, è molto elevata nelle Regioni settentrionali, mentre nelle Regioni centro-meridionali ed insulari si registrano quozienti sensibilmente inferiori (fa eccezione la Toscana che si trova al primo posto negli anni 1943, 1946 e 1947, al secondo posto nel 1944 e 1948 ed al terzo posto nel 1945). Le ragioni di tale comportamento della mortalità per tumori maligni non sono state ancora oggetto di speciale indagine e quindi, attualmente, sfuggono a qualunque spiegazione, puranco ipotetica. I più bassi quozienti sono segnati, nel 1948, dalla Basilicata (41,4) e dalla Calabria (45,7), i più alti dal Piemonte (150,2), Toscana (147,9) e Lombardia (143,9).

Merita una particolare attenzione l'esame della mortalità per tumori maligni, separatamente nelle localizzazioni in sedi accessibili e di facile diagnosi

Prosp. 16. — Tumori maligni  
sedi poco accessibili e di difficile diagnosi  
Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	88,5	88,7	92,4	94,4	94,5	98,6
Valle d'Aosta	40,7	57,8	42,0	45,0	47,4	60,3
Lombardia	85,2	86,2	93,3	92,1	95,7	101,0
Trentino - Alto Adige	78,5	80,6	82,6	78,9	91,0	86,0
Veneto	56,0	55,9	58,8	57,8	61,1	63,5
Friuli - Venezia Giulia	74,8	64,6	69,9	73,4	79,0	84,9
Liguria	70,1	67,4	75,6	79,3	84,5	84,8
Emilia - Romagna	92,0	89,3	90,0	91,5	97,2	97,5
Toscana	99,1	95,7	96,1	102,6	103,3	106,5
Umbria	48,5	48,5	51,1	56,3	59,0	57,2
Marche	57,7	61,6	58,9	61,4	64,1	65,3
Lazio	50,2	46,0	45,9	50,8	55,9	59,9
Abruzzi e Molise	26,9	21,5	25,9	31,0	33,4	35,6
Campania	18,8	17,4	21,5	23,2	26,4	27,4
Puglia	20,5	18,4	22,3	23,8	27,1	28,1
Basilicata	21,6	15,8	18,7	20,1	25,2	21,6
Calabria	17,8	16,2	20,5	19,9	23,0	25,5
Sicilia	25,1	24,4	26,3	28,8	33,7	35,1
Sardegna	26,8	20,6	29,2	31,1	31,9	33,6
<b>Italia</b>	<b>56,6</b>	<b>54,9</b>	<b>58,1</b>	<b>59,8</b>	<b>63,2</b>	<b>65,4</b>

(Prosp. 15) ed in sedi poco accessibili e di difficile diagnosi (Prosp. 16) (1).

Quantunque il periodo di osservazione sia breve (un sessennio), si nota però, che l'aumento della mortalità per i tumori maligni in sedi accessibili è di poco maggiore (20%), in confronto all'anno base 1943; di quello in sedi poco accessibili (16%); ciò che, con le dovute riserve, fa pensare che i maggiori mezzi diagnostici a nostra disposizione hanno poco influito sull'aumento constatato dell'incidenza della mortalità per tumori maligni. Questo non si verifica, però, nelle singole Regioni, in quanto solamente in 6 di esse (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Basilicata, Sardegna) l'aumento della mortalità, prendendo come base il 1943, è, nel 1948, maggiore

Prosp. 15. — Tumori maligni in sedi accessibili e di facile diagnosi

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	34,2	37,4	39,3	36,9	41,8	44,1
Valle d'Aosta	25,3	26,2	33,3	22,5	22,6	31,2
Lombardia	31,0	32,0	36,3	35,6	37,2	36,7
Trentino - Alto Adige	38,3	38,8	34,4	35,9	37,6	40,8
Veneto	27,1	27,5	28,8	30,5	29,7	29,2
Friuli - Venezia Giulia	31,1	28,2	29,9	32,7	31,9	33,8
Liguria	33,0	33,6	32,8	39,5	42,5	39,6
Emilia - Romagna	27,6	27,4	29,1	30,7	30,8	32,8
Toscana	29,9	27,7	29,1	31,6	34,8	34,8
Umbria	22,0	21,2	25,0	26,5	25,1	25,3
Marche	25,3	23,9	22,9	23,3	25,7	24,5
Lazio	22,7	22,2	22,8	23,9	27,5	25,5
Abruzzi e Molise	17,4	12,7	15,5	19,4	19,4	20,8
Campania	14,5	14,3	16,9	17,5	19,0	20,2
Puglia	15,7	14,5	17,5	17,5	21,6	21,7
Basilicata	14,0	13,0	14,5	13,3	14,5	16,8
Calabria	12,1	12,0	13,4	14,8	15,6	16,0
Sicilia	16,9	15,6	17,5	19,0	18,4	22,0
Sardegna	14,4	7,8	13,1	15,3	16,4	18,4
<b>Italia</b>	<b>24,1</b>	<b>23,6</b>	<b>25,6</b>	<b>26,6</b>	<b>28,2</b>	<b>28,8</b>

(1) Non è stato possibile procedere, col massimo rigore scientifico, a questa distinzione e raggruppamenti in sedi accessibili e poco accessibili per periodi più remoti, in quanto non l'hanno permesso le nomenclature nosologiche, che in alcuni anni, tenevano unite, in un'unica voce, sedi poco accessibili con sedi accessibili. Si è limitato, perciò, l'esame agli anni dal 1943 al 1948, considerando come sedi accessibili e di facile diagnosi; la cavità boccale e faringea; l'esofago, l'utero e gli altri organi genitali femminili, le mammelle, gli organi genitali maschili, la pelle, le ossa e la tiroide; come sedi poco accessibili e di difficile diagnosi: lo stomaco e duodeno, l'intestino, il retto, il fegato, il pancreas, il peritoneo, gli altri organi dell'apparato digerente, laringe e trachea, bronchi, polmoni, pleura, organi urinari maschili e femminili, cervello e altre parti del sistema nervoso centrale, capsule surrenali.

per i tumori maligni in sedi accessibili che per i tumori maligni in sedi poco accessibili; nelle rimanenti Regioni si constata, invece, il comportamento contrario.

Per entrambi i grandi gruppi di tumori maligni, nel sessennio preso in considerazione, la mortalità è notevolmente elevata nelle Regioni settentrionali e nella Toscana.

Per un confronto con il passato si è calcolata la mortalità per tumori maligni di alcune sedi poco accessibili e per tumori maligni di alcune sedi di facile diagnosi, di cui le voci delle nomenclature nosologiche permettono la comparazione nel tempo, nel triennio 1900-02 e nell'anno 1948.

Esaminando le voci delle nomenclature nosologiche si è potuto stabilire che sono comparabili tra loro nel tempo, i decessi attribuiti a tumori maligni degli intestini, retto, fegato, vie biliari, pancreas, peritoneo, come sedi di difficile diagnosi, ed i decessi attribuiti a tumori maligni dell'utero, altri organi genitali femminili e mammelle, come sedi di facile diagnosi.

Visto, però, che quest'ultimo gruppo di localizzazioni si riferisce ad organi del sesso femminile, in quanto pochi sono i casi di tumori maligni delle mammelle dell'uomo, si è limitato il calcolo dei quozienti di mortalità soltanto al sesso femminile anche per l'altro gruppo dei tumori ma-

ligni a sedi poco accessibili. Si avverte, inoltre, che nel gruppo dei tumori maligni a sedi poco accessibili sono compresi, nel 1900-02, anche i neoplasmi maligni della milza, che sono però di una estrema rarità, per cui le voci delle nomenclature nosologiche del 1900-02 possono ritenersi comparabili alle corrispondenti voci del 1948.

Eseguito dunque tali calcoli, si ottengono i seguenti dati: per i tumori maligni in sedi poco accessibili e di difficile diagnosi (intestino, retto, fegato, vie biliari, pancreas, peritoneo) i quozienti sono per il periodo 1900-02 e per il 1948, rispettivamente, 19,7 e 22,8 su 100.000 ab.; per i tumori maligni in sedi accessibili e di facile diagnosi (utero, altri organi genitali femminili, mammelle), rispettivamente, 21,1 e 31,7. Per i tumori in sedi poco accessibili l'incremento percentuale della mortalità è, quindi, del 113% e per i tumori in sedi accessibili solo del 50%.

Ciò, con le dovute riserve, starebbe a dimostrare che pur ammettendo un reale effettivo aumento, una parte imprecisabile di esso è dovuta ai più fini mezzi diagnostici a nostra disposizione, specialmente per quel che riguarda i tumori localizzati in sedi poco accessibili e di difficile diagnosi.

#### Malattie dell'apparato circolatorio

*Malattie del cuore.* — L'aumento della mortalità per malattie del cuore (1), che è stato già da anni considerato con allarme dalla classe sanitaria, è tale da far assurgere queste malattie ad affezioni di importanza sociale.

Tale allarme sembra giustificato in quanto dette malattie sono strettamente legate, come si è più sopra accennato, al reumatismo ed alle malattie reumatiche in genere, all'arteriosclerosi, all'ipertensione arteriosa, ed anche alla lue cronica, affezioni favorite ed incrementate dai sistemi di vita moderna e dall'usura fisica e psichica dell'organismo umano.

(1) In questo gruppo di malattie sono comprese la pericardite, l'endocardite acuta non reumatica, le affezioni croniche delle valvole cardiache e dell'endocardio, nonché le malattie del miocardio, comprese quelle da reumatismo articolare acuto, le malattie delle arterie coronarie ed angina di petto e le altre malattie del cuore, comprese quelle specificate come di natura reumatica.

La mortalità per malattie del cuore, nel 1948, segna un aumento dell'11%, in confronto del triennio 1900-02, e nel 1943-1948 assume un andamento crescente e, specialmente nel periodo bellico 1943-45, segna alti quozienti di mortalità (oltre a circa 200 decessi su 100.000 ab.) per diminuire lievemente nel 1948 (Prosp. 17, Graf. 2). Negli anni dal 1943 al 1948 i quozienti più elevati si osservano, in genere, nelle Regioni settentrionali. Il più basso quoziente, nel 1948, si verifica nella Sardegna (116,6), il più alto nel Piemonte (289,4).

*Altre malattie dell'apparato circolatorio.* — Al contrario delle malattie del cuore, la mortalità per questo gruppo di malattie (1) presenta una lieve diminuzione ed il quoziente del 1948 è del 10% inferiore a confronto del triennio 1900-02 (Prosp. 18).

Nell'anno 1944, in tutte le Regioni si osserva a confronto dell'anno precedente, una sensibile diminuzione, che, in alcuni casi, raggiunge e supera il 40%. A tale diminuzione seguono, in genere, un sensibile aumento nel 1945 ed un andamento oscillante negli anni 1946, 1947 e 1948. La maggiore mortalità si verifica, nel sessennio 1943-1948, nell'Emilia-Romagna, nella Toscana e nella Sicilia. Il più basso quoziente di mortalità è segnato, nel 1948, nella Basilicata (12,0) e il più alto nel Piemonte (27,8).

*Lesioni intracraniche di origine vascolare.* — L'insieme di queste malattie che determina un gran numero di morti improvvise, presenta una mortalità in aumento, ed il quoziente del 1948 (118,9) è superiore del 16% in confronto di quello del triennio 1900-02 (102,4) (Prosp. 19 e Graf. 2). Negli anni dal 1943 al 1948 la mortalità nelle singole Regioni dimostra, in genere, un andamento oscillante, ma con evidente tendenza all'aumento.

La maggiore mortalità per tali malattie si verifica, nel sessennio 1943-1948, nel Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. I più bassi quozienti sono segnati, nel 1948, dalla Sardegna (73,2) e dalla Valle d'Aosta (84,0); i più alti dall'Umbria (167,8) e dalle Marche (157,4).

(1) Vi sono comprese l'aneurisma, l'arteriosclerosi, la gangrena, le altre malattie delle arterie, le malattie delle vene, le malattie del sistema linfatico, l'ipertensione arteriosa idiopatica, le altre malattie dell'apparato circolatorio.

#### Prosp. 17. — Malattie del cuore

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	210,8	238,2	235,1	215,9	212,6	319,9	297,3	302,2	314,8	309,3	289,4
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	351,0	303,1	322,7	324,5	314,2	279,0
Lombardia	196,6	206,5	198,7	170,9	171,6	221,2	241,5	228,0	238,4	262,2	233,4
Trentino - Alto Adige	—	—	—	196,9	207,6	236,6	266,6	255,1	235,5	258,9	245,8
Veneto	157,0	167,3	157,8	143,8	142,4	169,0	194,6	179,2	179,3	202,6	196,4
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	210,9	221,2	216,5	238,4	236,8	245,7
Liguria	181,5	196,6	201,0	190,1	188,4	245,6	258,3	247,6	265,9	264,6	244,3
Emilia - Romagna	165,2	167,7	161,2	144,2	131,9	167,3	228,8	209,4	193,3	199,6	183,9
Toscana	182,4	158,5	166,0	141,0	131,7	182,7	229,5	201,7	181,0	183,5	172,6
Umbria	179,1	188,7	185,6	150,3	141,8	169,4	208,1	184,7	188,1	188,5	150,9
Marche	190,0	195,5	193,7	140,4	127,8	147,7	185,0	168,2	151,9	160,2	137,9
Lazio	148,5	154,9	148,3	127,2	118,4	132,5	139,8	151,5	145,0	150,4	146,2
Abruzzi e Molise	172,6	191,8	193,9	173,0	159,3	177,8	162,6	169,3	193,6	204,0	185,0
Campania	209,0	210,1	194,5	167,2	162,6	208,6	212,7	177,8	164,3	168,2	172,9
Puglia	137,2	158,0	152,4	138,7	135,0	163,9	160,2	172,2	162,3	157,2	171,5
Basilicata	180,8	193,2	205,4	162,4	155,1	187,2	200,6	184,9	188,7	180,4	178,8
Calabria	144,8	161,0	178,1	137,8	141,2	162,0	145,4	152,8	148,7	143,9	141,6
Sicilia	107,3	141,5	145,3	122,5	125,4	187,5	158,7	167,8	151,9	136,2	144,3
Sardegna	94,4	130,5	122,0	99,2	107,9	134,8	111,8	136,0	133,3	113,1	116,6
<b>Italia</b>	<b>169,8</b>	<b>181,9</b>	<b>178,0</b>	<b>153,7</b>	<b>149,8</b>	<b>194,9</b>	<b>204,9</b>	<b>197,4</b>	<b>194,1</b>	<b>198,3</b>	<b>189,3</b>

#### Prosp. 18. — Altre malattie dell'apparato circolatorio

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	19,3	35,6	28,8	25,0	44,6	40,7	24,8	29,8	26,4	27,7	27,8
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	25,3	20,7	25,8	19,3	18,3	21,5
Lombardia	26,7	39,6	31,4	23,2	36,2	33,8	24,1	25,9	21,0	24,5	23,6
Trentino - Alto Adige	—	—	—	22,5	34,8	34,0	24,3	26,3	21,6	22,6	25,5
Veneto	44,6	56,0	34,6	27,4	41,1	35,6	27,2	27,3	21,9	23,5	21,9
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	46,2	28,0	28,9	22,3	27,8	26,5
Liguria	27,0	40,1	31,9	21,7	37,5	34,9	23,6	27,8	22,9	21,0	18,8
Emilia - Romagna	32,8	45,9	35,8	27,3	42,5	41,8	34,9	38,6	24,2	27,9	25,4
Toscana	25,7	40,6	35,9	25,6	41,4	45,2	43,6	33,6	24,8	29,2	25,5
Umbria	18,9	27,6	20,8	22,5	32,3	26,4	24,2	23,3	18,4	15,3	17,1
Marche	23,5	36,7	25,2	21,6	34,9	35,6	30,9	36,0	23,9	22,3	24,5
Lazio	32,7	77,5	60,2	27,1	38,7	35,3	33,0	25,1	17,8	20,3	20,9
Abruzzi e Molise	19,4	36,4	27,3	21,1	37,8	32,1	24,6	19,0	20,4	20,9	18,8
Campania	25,7	41,0	32,4	25,1	40,7	35,8	25,9	18,9	14,1	15,9	16,5
Puglia	14,2	17,6	14,7	18,9	27,9	26,1	15,6	18,3	13,7	14,5	13,8
Basilicata	17,5	24,0	18,9	24,9	26,7	24,7	16,6	18,7	11,1	14,2	12,0
Calabria	14,7	19,9	15,3	19,8	29,7	28,3	21,7	19,2	14,8	15,2	16,5
Sicilia	10,1	14,2	14,8	26,8	43,8	53,2	38,0	37,1	29,8	24,0	25,2
Sardegna	11,6	23,1	16,3	16,7	22,2	20,9	11,2	16,5	12,8	9,5	12,4
<b>Italia</b>	<b>24,0</b>	<b>37,1</b>	<b>28,9</b>	<b>24,4</b>	<b>38,3</b>	<b>37,0</b>	<b>27,9</b>	<b>27,2</b>	<b>21,0</b>	<b>22,1</b>	<b>21,6</b>

#### Diabete mellito

La mortalità per diabete mellito segna un progressivo aumento fino al 1935-37, in cui raggiunge il valore massimo di 10 morti su ogni 100.000 ab. (Prosp. 20 e Graf. 2). A partire da tale pe-

riodo si verifica una diminuzione, che resta però, sempre superiore a quella del periodo iniziale 1900-02 (il quoziente del 1948 è superiore del 103% a quello del triennio 1900-02). Negli anni dal 1943 al 1948 si osserva, nelle singole Regioni un andamento oscillante e, se si eccettuano la,

Valle d'Aosta e la Basilicata, i quozienti segnati nel 1948 risultano inferiori a quelli del 1943.

La mortalità più elevata si verifica, nel sessennio 1943-1948, nel Piemonte, nel Friuli-Venezia

Giulia, nella Liguria, nella Sicilia, ed in genere, nelle Regioni centrali.

Nel 1948 il più basso quoziente è segnato nella Calabria (3,8), il più alto nella Liguria (11,1).

Prosp. 19. — Lesioni intracraniche di origine vascolare

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	100,3	101,2	110,7	140,3	143,4	149,3	156,9	149,8	150,9	153,4	150,0
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	99,0	85,0	79,6	78,2	89,3	84,0
Lombardia	120,7	119,7	124,6	132,2	134,7	130,5	132,1	122,8	128,1	133,9	133,2
Trentino - Alto Adige	—	—	—	119,4	114,2	98,4	112,3	98,0	107,0	107,2	112,7
Veneto	93,9	95,3	92,4	104,0	105,3	108,4	109,9	99,9	101,1	109,9	110,2
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	94,8	89,3	77,6	87,2	92,1	96,6
Liguria	78,2	82,8	92,8	113,2	123,6	116,3	106,1	104,9	117,2	115,9	118,7
Emilia - Romagna	117,0	124,0	129,1	151,0	146,4	132,5	154,3	128,9	130,3	137,6	126,9
Toscana	118,5	121,0	125,1	144,2	142,8	128,9	155,5	125,2	128,2	128,8	128,0
Umbria	130,1	133,8	139,9	188,1	196,0	179,2	197,3	167,4	179,8	181,1	167,8
Marche	149,9	156,3	172,1	194,4	191,6	168,2	202,7	173,8	158,7	165,8	157,4
Lazio	102,8	106,2	104,1	130,7	128,6	102,5	101,2	100,9	100,0	95,5	103,6
Abruzzi e Molise	118,6	132,2	148,4	184,6	174,2	150,4	125,5	137,1	143,9	148,6	140,4
Campania	98,6	113,2	112,5	138,6	134,7	122,5	120,6	99,1	94,2	99,2	100,6
Puglia	96,0	104,7	99,9	133,5	137,1	128,1	110,4	120,6	108,5	105,5	109,6
Basilicata	90,5	98,5	115,2	137,8	131,6	132,7	126,1	121,8	112,1	105,6	102,7
Calabria	68,2	79,7	86,5	109,7	111,2	104,5	84,9	93,9	89,0	87,0	93,5
Sicilia	80,8	81,4	89,8	123,9	133,8	131,5	121,5	121,4	113,8	109,3	109,2
Sardegna	59,1	59,3	63,1	79,3	85,2	85,8	60,7	74,8	70,7	60,9	73,2
Italia	102,4	107,0	111,4	133,2	134,3	126,1	126,7	117,9	117,4	119,2	118,9


Prosp. 20. — Diabete mellito

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
	(a)	(a)	(a)								
Piemonte	2,9	5,1	4,9	9,9	12,1	11,3	12,8	10,3	8,3	8,6	8,9
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	3,3	4,4	4,3	4,3	3,2	7,5
Lombardia	2,8	4,2	4,4	7,6	8,8	7,7	7,8	8,4	5,7	6,8	6,2
Trentino - Alto Adige	—	—	—	5,7	7,6	8,1	9,3	6,8	7,0	6,6	7,2
Veneto	—	—	—	—	—	7,5	9,2	8,8	6,8	6,6	5,2
Friuli - Venezia Giulia	2,7	4,1	3,6	7,0	8,9	11,0	11,3	10,7	7,8	7,9	8,6
Liguria	5,7	8,3	8,3	16,0	17,6	12,8	13,8	11,8	11,0	10,6	11,1
Emilia - Romagna	3,0	4,0	4,3	8,1	9,4	10,5	10,3	10,2	6,9	7,8	6,2
Toscana	4,0	5,6	5,0	8,9	11,3	9,9	11,1	8,2	7,1	7,8	6,3
Umbria	3,5	4,2	5,7	10,4	9,7	12,1	11,0	9,1	9,6	8,3	9,5
Marche	3,5	4,7	4,6	8,8	9,2	11,1	15,0	9,5	9,9	9,4	9,5
Lazio	5,2	8,5	8,0	12,5	14,4	12,0	10,7	8,8	7,2	8,7	9,0
Abruzzi e Molise	3,1	4,2	4,7	6,5	7,6	9,7	5,9	6,5	5,7	6,0	5,5
Campania	3,9	5,1	5,7	9,9	10,1	7,7	6,3	6,0	5,1	4,4	5,4
Puglia	3,0	3,2	3,6	5,9	6,5	6,0	5,6	5,1	5,4	4,4	5,5
Basilicata	3,1	2,4	3,0	5,1	4,9	4,2	4,3	4,6	3,2	4,2	5,1
Calabria	2,7	3,4	3,1	5,6	5,7	5,7	3,9	4,0	3,5	3,7	3,8
Sicilia	3,7	5,2	5,6	9,8	12,2	13,6	10,8	9,5	8,5	8,0	9,1
Sardegna	4,0	5,5	6,0	7,6	7,6	8,9	5,3	7,2	5,0	4,5	6,4
Italia	3,4	4,8	4,9	8,6	10,0	9,5	9,1	8,2	6,8	6,9	6,9

(a) Compresi i morti per diabete insidioso (cifre trascurabili).

Graf. 2. — Mortalità per alcune importanti cause



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

### Broncopneumonite e polmoniti

È interessante osservare l'andamento della mortalità per queste due affezioni acute dell'apparato respiratorio, in quanto sono due malattie tipicamente influenzate dalla terapia penicillinica.

Già nel 1943 si verifica un notevole decremento a confronto del periodo 1935-37 e questo comportamento continua più o meno accentuato negli anni successivi (Prosp. 21 Graf. 1). Nel 1947, quando cioè, com'è noto, la terapia penicillinica è stata introdotta in Italia, il quoziente di mortalità segna 116 decessi su 100.000 ab. e nel 1948 106,3 con una sensibile contrazione a confronto dell'anno precedente (129,8) rispettivamente dell'11% e dell'8%. Nel 1948 la mortalità diminuisce del 54% a confronto del triennio 1900-02.

Nelle singole Regioni si nota una notevole diminuzione nel 1947, rispetto all'anno precedente, nella Sicilia, nella Sardegna, nella Calabria e nella Campania. I più alti quozienti si verificano durante il 1943-48, nelle Regioni meridionali ed in-

sulari, dove, cioè, è generalmente più bassa la mortalità per tubercolosi polmonare; ed in Valle d'Aosta. Il più basso quoziente è segnato, nel 1948, dalle Marche (60,3), il più alto dalla Puglia (177,7).

### Malattie della gravidanza, parto e puerperio

Questa classe di malattie si può scindere in due gruppi componenti: le malattie settiche e le altre malattie di origine non infettiva.

Tale distinzione oggi si impone, ancor più che dopo l'era dell'antisepsi e dell'asepsi, in quanto si dispone di un'altro e più efficace mezzo di difesa, gli antibiotici in generale e la penicillina in particolare, contro le complicazioni settiche.

*Infezione puerperale ed altre forme settiche.* — La mortalità per infezione puerperale e per altre forme settiche, legate alla maternità, è assai fortemente diminuita: da 12,1 decessi su 10.000 parti nel 1900-02 a 3,5 nel 1948, con una diminuzione del 71% (Prosp. 22 e Graf. 3). Si nota

## Prosp. 21. — Broncopolmonite e polmoniti

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	236,7	208,2	198,3	171,9	186,3	136,6	130,1	120,2	119,6	116,9	102,2
Valle d'Aosta	236,7	208,2	198,3	171,9	186,3	169,4	213,7	137,7	134,9	161,4	154,0
Lombardia	233,9	222,3	197,4	191,9	206,4	128,2	130,2	112,2	99,2	120,5	94,9
Trentino - Alto Adige	—	—	—	166,1	163,5	120,8	137,3	134,6	96,2	104,7	86,9
Veneto	167,9	165,6	167,1	146,8	153,7	110,3	110,1	95,4	96,9	101,2	80,7
Friuli - Venezia Giulia	167,9	165,6	167,1	146,8	153,7	115,2	102,6	97,5	99,3	96,8	85,4
Liguria	302,6	255,9	226,2	158,2	165,2	126,1	129,1	108,6	106,2	104,1	85,1
Emilia - Romagna	212,9	200,6	178,6	164,0	158,5	93,7	99,0	104,6	91,0	88,6	67,3
Toscana	216,2	194,7	192,6	156,6	157,6	123,4	136,1	112,4	99,1	91,6	84,6
Umbria	180,2	143,8	160,6	152,6	169,1	99,8	105,1	91,5	99,6	102,9	79,1
Marche	159,9	151,0	146,4	142,2	151,7	93,6	82,1	80,6	85,2	75,6	60,3
Lazio	231,5	211,4	211,1	169,2	171,5	104,6	124,0	99,5	93,4	84,3	90,2
Abruzzi e Molise	205,4	195,7	200,4	187,4	180,0	126,7	91,3	95,1	109,2	104,8	87,2
Campania	296,4	290,6	286,6	288,2	285,2	292,4	196,5	171,9	195,1	151,7	146,2
Puglia	284,6	261,7	254,9	285,6	289,1	244,8	192,7	206,9	186,0	166,1	177,7
Basilicata	267,1	212,4	207,7	269,3	252,9	224,8	169,4	162,1	164,6	158,5	155,0
Calabria	248,9	222,1	217,8	218,3	228,0	199,6	146,2	150,5	175,3	132,6	140,3
Sicilia	211,2	222,6	202,0	224,3	220,9	198,7	150,4	169,8	196,5	129,1	129,9
Sardegna	258,3	231,2	245,4	210,5	227,2	195,3	127,7	197,3	181,4	116,8	126,9
Italia	230,6	216,2	206,4	194,0	198,9	155,7	135,5	129,6	129,8	116,0	106,3

## Prosp. 22. — Infezione puerperale ed altre forme settiche

Morte per 10.000 parti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	12,9	14,0	13,2	13,0	15,3	8,8	8,0	9,3	5,5	5,7	5,4
Valle d'Aosta	12,9	14,0	13,2	13,0	15,3	17,8	—	37,9	13,5	—	12,1
Lombardia	13,7	10,5	14,0	11,9	13,1	5,9	5,9	7,7	5,0	4,5	3,5
Trentino - Alto Adige	—	—	—	14,5	14,4	7,1	7,1	5,8	4,2	2,7	2,0
Veneto	9,3	6,0	7,2	10,3	9,6	4,7	2,5	5,3	3,9	2,0	2,4
Friuli - Venezia Giulia	9,3	6,0	7,2	10,3	9,6	2,2	1,7	6,2	2,0	6,1	1,2
Liguria	13,9	12,3	13,2	10,8	16,0	7,5	9,4	19,0	5,5	4,3	4,6
Emilia - Romagna	13,4	9,0	12,8	11,8	13,6	4,7	4,5	8,7	5,8	2,2	4,8
Toscana	9,7	8,3	12,0	10,7	12,3	8,2	4,7	6,6	5,1	4,6	4,9
Umbria	12,5	14,5	15,4	10,7	14,9	6,5	4,9	8,6	5,9	5,8	3,7
Marche	10,0	8,3	10,2	8,5	7,4	5,0	5,8	5,5	4,3	2,6	2,7
Lazio	14,0	10,3	14,5	12,6	12,1	4,8	5,6	6,8	3,5	3,6	5,1
Abruzzi e Molise	12,8	11,2	13,0	10,2	12,9	6,2	3,2	6,7	5,7	5,1	3,1
Campania	10,5	8,7	10,4	9,6	9,9	4,3	3,2	4,0	3,8	2,7	1,9
Puglia	12,0	9,2	8,9	7,8	8,1	3,4	3,5	4,5	3,1	2,6	2,9
Basilicata	14,4	11,8	13,3	11,5	8,4	6,2	4,5	4,3	7,5	3,8	5,5
Calabria	15,7	14,3	13,4	11,5	11,8	6,4	2,9	3,4	5,2	2,8	3,0
Sicilia	10,0	9,9	9,1	9,1	12,2	6,4	5,8	5,4	3,8	3,8	3,5
Sardegna	19,4	14,9	16,8	11,7	11,6	5,8	2,6	5,3	2,2	0,9	4,2
Italia	12,1	10,0	11,4	10,6	11,6	5,6	4,6	6,2	4,4	3,4	3,5

però in quasi tutte le Regioni, che nel 1945 si ha una sensibile recrudescenza della mortalità per tali cause, da riportarsi indubbiamente alla rilassatezza della osservanza delle scrupolose e necessarie norme d'asepsi ed antisepsi, determinata dalle caotiche condizioni belliche. Dal

1945 al 1948 si nota, al contrario, nelle singole Regioni, in genere, un decremento della mortalità.

La mortalità più elevata per tali affezioni si verifica, in genere, nel sessennio 1943-1948, nelle Regioni centro-settentrionali. Nel 1948 il più

basso quoziente è segnato nel Friuli-Venezia Giulia (1,2 decessi su 10.000 parti); il più alto nella Valle d'Aosta (12,1).

— Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio. — La mortalità per queste malattie subisce nel


tempo una diminuzione meno notevole di quella verificatasi nel gruppo delle malattie settiche (Prosp. 23 e Graf. 3). Essa infatti diminuisce nel 1948, rispetto al 1900-02, solo del 17%: ciò sta a comprovare che, pur avendo l'assistenza sociale e medica, migliorate le condizioni

## Prosp. 23. — Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio di origine non infettiva

Morte per 10.000 parti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	—	—	—	—	—	15,0	13,1	13,4	10,6	12,1	15,2
Valle d'Aosta	17,3	15,7	13,9	18,3	16,5	5,9	18,9	53,0	13,5	6,3	18,2
Lombardia	13,0	13,2	14,6	16,4	16,8	9,8	12,6	10,7	10,7	12,0	11,0
Trentino - Alto Adige	—	—	—	24,3	23,9	14,9	19,8	18,2	13,2	19,3	10,9
Veneto	12,7	11,9	11,1	14,6	14,2	11,2	12,3	9,8	10,7	10,2	10,5
Friuli - Venezia Giulia	12,7	11,9	11,1	14,6	14,2	7,8	10,6	8,9	4,9	13,8	12,9
Liguria	14,2	15,2	11,9	18,7	22,6	13,1	14,1	10,6	13,7	11,1	14,3
Emilia - Romagna	15,9	13,9	14,1	18,1	18,5	14,6	14,8	11,7	10,9	12,4	11,6
Toscana	12,0	13,1	13,4	17,3	17,8	10,6	9,4	14,0	11,8	11,6	10,5
Umbria	16,0	14,8	14,3	18,0	20,7	11,7	16,2	18,1	15,6	12,9	16,2
Marche	13,1	13,3	13,3	13,9	16,6	10,3	16,5	14,0	17,6	13,3	13,7
Lazio	12,9	12,3	13,4	18,2	16,4	9,3	13,8	11,1	10,6	13,1	10,4
Abruzzi e Molise	17,3	19,2	19,3	21,2	20,2	17,0	18,3	20,1	15,3	14,0	12,2
Campania	12,3	13,4	14,3	18,5	17,7	10,8	11,4	11,8	10,3	9,6	10,3
Puglia	10,9	11,7	12,2	14,9	16,0	10,5	11,5	10,4	11,1	10,0	11,2
Basilicata	17,3	12,9	19,1	17,7	18,2	15,2	20,8	21,6	15,5	16,7	15,6
Calabria	15,8	15,4	16,2	15,8	14,8	16,2	12,6	17,6	11,7	12,6	12,3
Sicilia	11,1	9,4	13,4	15,6	17,3	11,8	12,4	12,1	12,6	12,8	11,2
Sardegna	25,6	22,5	18,5	20,7	17,8	15,3	7,8	11,8	17,2	11,3	9,8
Italia	13,9	13,4	14,0	17,0	17,1	12,0	12,9	12,6	11,7	11,9	11,5

Graf. 3 — Mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio



delle gestanti, la scienza medica ha potuto con più successo agire contro la mortalità per malattie settiche.

La mortalità più elevata per tali malattie si ha, nel sessennio 1943-1948, negli Abruzzi e Molise, nella Basilicata; nel Piemonte, nel Trentino-Alto Adige, nell'Umbria, nelle Marche.

Nelle singole Regioni, in genere, si verifica un aumento più o meno sensibile negli anni più duri della seconda guerra mondiale, che spesso si protrae e raramente si accentua negli anni post-bellici. Il minimo quoziente si ha, nel 1948, nella Sardegna (9,8 su 10.000 parti); i massimi nell'Umbria (16,2) e nella Valle d'Aosta (18,2).

### Cause violente

Esse comprendono il suicidio, l'omicidio e le morti violente accidentali. Le prime due cause, suicidio ed omicidio, interessano dal punto di vista etico-sociale, in quanto sono indici della

sanità morale e psichica della collettività; le morti violente accidentali sono in rapporto soprattutto con gli infortuni verificatisi sul lavoro e con gli accidenti per mezzi di trasporto.

**Suicidio.** — Dopo aver mostrato un andamento crescente fino al 1930-32, la mortalità per suicidio decresce fino all'anno 1944 per segnare negli anni successivi un nuovo aumento tanto da superare lievemente nel 1948 il livello del triennio 1900-02 (Prosp. 24 e Graf. 4). Negli anni dal 1943 al 1948 si ha, in genere, nelle Regioni una tendenza all'aumento, pur notandosi nel maggior numero di esse una lieve flessione negli anni più duri della seconda guerra mondiale. Nel sessennio 1943-1948 la mortalità più elevata si verifica, in genere, nelle Regioni centro-settentrionali.

Il minimo quoziente è segnato, nel 1948 in Calabria (2,3 decessi su 100.000 ab.), il massimo nella Valle d'Aosta (14,0).

Prosp. 24. — Suicidio

Morti per 100.000 abitanti

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	9,3	12,3	11,3	14,5	12,0	9,0	6,4	8,4	8,8	10,3	11,0
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	7,7	7,6	7,5	12,9	15,1	14,0
Lombardia	6,5	9,3	8,4	10,4	7,8	4,7	3,4	4,7	5,9	6,3	6,3
Trentino - Alto Adige	—	—	—	12,1	9,6	5,0	5,3	6,8	6,3	6,4	10,1
Veneto	—	—	—	—	—	4,6	3,7	4,1	4,1	5,4	5,4
Friuli - Venezia Giulia	6,6	8,4	7,6	11,0	8,8	7,3	3,9	5,6	7,5	7,5	7,2
Liguria	8,9	16,0	13,3	14,9	11,7	7,2	5,3	6,4	6,7	6,3	7,9
Emilia - Romagna	9,6	10,9	11,2	15,3	12,3	9,2	6,2	9,3	8,9	10,5	10,6
Toscana	7,7	9,4	8,7	10,1	8,2	5,5	5,1	5,7	5,1	6,6	6,4
Umbria	7,5	8,0	7,1	11,2	8,3	5,3	4,2	3,9	5,3	5,3	6,2
Marche	7,0	7,3	7,9	9,2	6,4	5,7	4,3	4,9	5,6	5,9	7,4
Lazio	9,7	12,2	10,9	8,5	6,2	4,5	3,1	3,4	4,1	5,2	5,2
Abruzzi e Molise	4,0	4,6	4,3	7,0	5,4	3,5	2,8	3,2	4,7	4,0	5,5
Campania	3,9	6,0	6,4	6,6	5,0	2,5	3,0	2,9	3,4	3,0	3,8
Puglia	3,7	4,1	4,4	5,8	4,8	2,9	2,4	2,7	3,5	3,4	3,0
Basilicata	3,0	4,6	5,1	6,1	5,0	3,6	3,9	2,7	3,4	4,8	5,6
Calabria	2,1	2,3	2,5	3,7	3,0	2,1	2,4	1,5	2,8	2,4	2,3
Sicilia	3,6	5,9	4,9	7,0	6,1	3,5	3,4	3,5	4,4	4,4	5,1
Sardegna	4,8	6,1	4,5	8,4	6,2	3,9	3,2	4,5	5,2	5,5	7,2
Italia	6,2	8,3	7,7	9,8	7,7	5,0	4,0	4,8	5,3	5,8	6,3

**Omicidio.** — La mortalità per omicidio, nel 1948, segna il cospicuo decremento del 40% a confronto del triennio 1900-02. Nel periodo della seconda guerra mondiale, aumenta notevolmente, come è ovvio, specie nelle Regioni centro-settentrionali per poi diminuire dal 1946 (Prosp. 25

e Graf. 4). Nel sessennio 1943-1948 la mortalità più elevata si verifica, in genere, nelle Regioni meridionali ed insulari e nella Valle d'Aosta.

Il minimo, nel 1948, è segnato nel Friuli-Venezia Giulia (0,5 decessi su 100.000 ab.), il massimo nella Sicilia (6,2).

Prosp. 25. — Omicidio

Morti per 100.000

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	2,7	1,8	4,2	1,8	1,4	7,1	65,8	68,0	4,9	1,9	1,2
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	9,9	102,5	40,9	6,4	2,2	2,2
Lombardia	1,4	1,3	4,2	1,4	1,0	3,8	13,3	36,3	3,2	1,5	1,5
Trentino - Alto Adige	—	—	—	1,2	1,6	3,1	13,8	13,0	6,5	1,9	1,3
Veneto	—	—	—	—	—	2,0	29,1	33,6	2,9	1,6	1,1
Friuli - Venezia Giulia	1,1	1,0	3,3	1,6	1,2	6,8	47,2	30,7	4,2	2,6	0,5
Liguria	2,2	2,6	5,1	1,6	1,1	2,7	27,8	53,5	5,1	2,3	1,8
Emilia - Romagna	1,9	1,6	6,6	1,7	1,0	3,6	60,9	58,3	4,6	1,8	1,4
Toscana	2,4	1,7	5,7	1,5	0,9	2,2	74,0	7,4	2,7	2,2	1,0
Umbria	2,8	2,5	4,8	2,1	1,6	3,3	35,2	2,7	1,9	1,3	0,8
Marche	3,2	1,5	4,6	1,7	1,1	1,7	38,9	3,9	2,9	1,2	1,3
Lazio	6,5	4,9	8,1	2,8	1,6	6,1	31,1	5,3	3,1	2,0	1,3
Abruzzi e Molise	5,5	3,5	4,9	3,8	2,3	10,7	13,4	2,6	3,4	2,1	1,3
Campania	7,0	5,1	7,3	4,3	3,1	7,9	5,8	7,8	6,9	4,2	3,4
Puglia	5,3	3,5	6,4	2,7	2,2	2,8	4,4	5,7	6,7	3,8	2,8
Basilicata	5,6	5,3	7,5	6,1	4,3	7,1	3,3	6,3	7,8	5,7	3,3
Calabria	8,0	6,7	10,6	7,3	5,6	5,3	5,5	8,7	7,3	7,6	5,3
Sicilia	7,8	7,9	19,6	3,7	2,8	5,5	8,2	12,0	11,2	6,5	6,2
Sardegna	4,8	4,7	4,4	5,1	4,5	4,3	5,9	8,1	8,3	6,5	6,1
Italia	4,0	3,2	7,1	2,6	1,9	4,7	27,9	24,2	5,2	3,0	2,4

**Morti accidentali.** — La mortalità per cause violente accidentali, che già dal 1930-32 aveva dimostrato una tendenza all'aumento, segna, nel periodo bellico, un ancor più notevole incremento per diminuire notevolmente dal 1946 in poi e

segnare nel 1948 un decremento del 10% a confronto del triennio 1900-02 (Prosp. 26 e Graf. 4).

Negli anni 1943 e 1944 è da notare il notevole aumento, verificatosi nelle singole Regioni centro-settentrionali e nella Puglia, aumento che si

Prosp. 26. — Morti accidentali (a)

Morti per 100.000

REGIONI	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Piemonte	36,1	33,0	34,9	37,3	38,7	49,2	68,5	59,9	41,0	40,3	36,0
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	89,1	113,4	135,5	76,0	64,6	65,7
Lombardia	32,6	34,2	32,5	38,0	38,2	42,3	49,1	64,2	41,9	41,5	35,7
Trentino - Alto Adige	—	—	—	50,0	55,5	51,8	58,7	91,9	62,9	58,3	53,0
Veneto	29,1	30,3	33,2	33,8	35,9	34,6	43,7	68,5	37,6	36,5	33,4
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	55,3	58,0	84,4	54,7	48,5	37,5
Liguria	35,1	31,6	35,6	32,8	34,6	50,1	67,2	98,4	40,7	41,3	33,4
Emilia - Romagna	29,8	31,0	31,4	34,8	34,8	35,9	80,2	120,2	50,4	38,6	32,7
Toscana	28,4	27,5	29,7	30,4	31,3	41,0	111,1	87,4	38,8	35,2	28,1
Umbria	36,9	36,9	33,5	37,6	39,9	49,7	103,2	55,7	36,0	35,5	31,3
Marche	33,1	33,4	32,7	36,4	31,5	34,3	103,0	76,8	42,0	29,4	27,5
Lazio	34,5	32,8	32,1	35,8	35,7	49,7	104,2	72,8	44,5	39,3	29,3
Abruzzi e Molise	35,7	33,7	30,2	33,6	31,4	37,9	68,7	45,3	37,5	28,3	23,8
Campania	34,6	36,1	30,2	31,6	29,4	57,3	93,2	58,4	41,2	31,4	23,2
Puglia	29,7	29,4	25,4	27,6	26,0	38,3	59,0	59,3	33,9	26,8	22,1
Basilicata	46,5	42,1	36,8	40,7	32,5	41,9	43,1	37,1	32,6	26,4	25,4
Calabria	34,3	34,5	27,6	32,3	28,9	50,0	34,7	31,8	24,8	24,1	21,2
Sicilia	28,7	26,4	20,9	26,5	24,7	66,5	44,6	34,8	27,2	27,7	23,0
Sardegna	29,5	27,2	25,0	33,2	32,3	47,1	41,7	36,9	39,3	33,9	25,0
Italia	32,3	31,8	30,3	33,8	33,4	46,4	68,2	66,3	39,5	35,3	29,5

(a) Compresi i decessi per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta - Esclusi i morti per cataclisma (terremoto, alluvione, nubifragio, ciclone, ecc.).





## Segue: Prosp. 27. — Morti per età secondo le cause

Per 1000 decessi delle rispettive classi di età

CAUSE DI MORTE	1936-38	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
55 - 64 anni											
Tubercolosi dell'apparato respiratorio . . . . .	37	36	35	38	45	42	43	47	44	44	42
Tutte le altre forme di tubercolosi . . . . .	8	7	7	8	9	7	8	9	9	7	6
Sifilide . . . . .	8	8	8	9	11	9	10	9	8	10	9
Influenza . . . . .	17	15	9	9	5	5	4	3	5	4	8
Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	17	16	13	14	19	19	20	21	21	17	14
Cancro e altri tumori maligni . . . . .	153	158	158	163	158	147	135	162	190	195	206
Diabete mellito . . . . .	19	19	19	20	18	15	14	15	14	14	14
Lesioni intra-craniche di origine vascolare . . . . .	138	138	148	141	135	125	117	125	142	145	148
Meningite semplice e malattie del midollo spinale, ecc. . . . .	18	17	20	21	30	25	19	18	15	15	14
Malattie del cuore . . . . .	168	178	191	187	177	183	179	196	212	225	222
Broncopolmonite e polmoniti . . . . .	126	121	94	93	80	76	70	69	68	59	63
Appendicite, malattie del fegato e delle vie biliari, ecc. . . . .	70	66	68	68	73	65	58	62	66	67	69
Nefriti e altre malattie dell'apparato urinario, ecc. . . . .	56	53	51	51	54	50	50	49	44	43	45
Suicidio . . . . .	9	8	7	6	6	5	4	5	6	7	8
Omicidio . . . . .	1	1	1	1	1	3	13	12	3	2	2
Tutte le altre morti violente e accidentali . . . . .	24	23	25	27	31	83	120	72	30	31	26
Restanti cause . . . . .	132	136	146	144	149	142	135	128	122	115	105
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
65 anni ed oltre											
Tubercolosi dell'apparato respiratorio . . . . .	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	6
Influenza . . . . .	16	16	11	12	6	6	7	4	7	5	12
Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	13	10	9	9	13	13	12	13	13	10	9
Cancro e altri tumori maligni . . . . .	69	71	68	70	70	68	64	76	86	92	97
Lesioni intra-craniche di origine vascolare . . . . .	179	178	178	175	165	156	154	158	172	178	180
Malattie del cuore . . . . .	191	200	211	210	200	217	225	239	260	268	260
Bronchite . . . . .	39	39	38	37	32	25	21	20	18	17	18
Broncopolmonite e polmoniti . . . . .	108	108	95	93	85	80	80	77	80	77	85
Diarrea ed enterite . . . . .	15	13	13	14	15	15	14	14	11	8	7
Appendicite, malattie del fegato e vie biliari, ecc. . . . .	31	29	28	29	32	29	27	27	29	30	30
Nefriti e altre malattie dell'apparato urinario, ecc. . . . .	49	47	44	42	48	47	49	46	43	43	44
Suicidio . . . . .	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Omicidio . . . . .	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..
Tutte le altre morti violente e accidentali . . . . .	10	10	10	10	12	27	40	23	12	11	11
Restanti cause . . . . .	273	272	288	292	314	308	297	292	261	252	239
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

quenza dei decessi per morti violente accidentali (escluso il suicidio e l'omicidio) a cui seguono, in genere, le polmoniti e broncopolmonite e le localizzazioni tubercolari extrarespiratorie; anche nelle classi 10-14 e 15-19 anni la maggiore frequenza è segnata dai decessi per cause violente accidentali (escludendo, nella prima classe di età, il suicidio e l'omicidio ed includendoli nella seconda classe di età) a cui seguono, in genere, la tubercolosi dell'apparato respiratorio e le localizzazioni tubercolari extrarespiratorie, le febbri tifoide e paratifoide, le polmoniti e broncopolmonite (Prosp. 27).

Per le classi 20-24, 25-34 e 35-44 anni la massima frequenza dei decessi è dovuta alla tubercolosi polmonare, eccettuati gli anni dal 1943 al 1945, nei quali si ha, in genere, un notevole aumento della frequenza relativa dei morti per cause violente ed accidentali (compreso il suicidio e l'omicidio), cui seguono, grosso modo, le malattie del cuore, le localizzazioni tubercolari extrarespiratorie, il cancro ed altri tumori, la febbre tifoide e paratifoide, le polmoniti e broncopolmonite, che mostrano, in genere, una progressiva diminuzione della loro frequenza. Per la classe 45-54 anni si accentua la frequenza dei decessi per cancro ed altri tumori maligni e per malattie del cuore, mentre diminuisce il peso dei decessi per tubercolosi dell'apparato respiratorio.

Per la classe 55-64 e per quella dai 65 anni ed oltre prevalgono, per frequenza, i decessi per malattie del cuore a cui seguono, in genere, il cancro e gli altri tumori maligni e le lesioni intracraniche di origine vascolare. La frequenza dei decessi per i detti tre gruppi di cause, va aumentando nel volger degli anni.

## 2) Distribuzione delle varie cause di morte secondo l'età.

Variazioni degne di rilievo non si presentano negli anni considerati e le varie cause di morte seguono le linee ormai classiche e, cioè, possono essere divise in:

a) Cause di morte che presentano andamento decrescente col crescere dell'età (vizi di conformazione congeniti, diarrea ed enterite, difterite) (Prosp. 28).

È da rilevare che i morti per difterite nelle classi 0-1 e 1-4 anni presentano una tendenza all'aumento nel corso del tempo (da 686<sup>0</sup>/<sub>100</sub> nel 1943 a 869<sup>0</sup>/<sub>100</sub> nel 1948), mentre vanno diminuendo, come è ovvio, i morti nelle altre classi di età (da 155<sup>0</sup>/<sub>100</sub> a 74<sup>0</sup>/<sub>100</sub> in quella di 5-9 anni, da 57 a 12<sup>0</sup>/<sub>100</sub> in quella di 10-14).

b) Cause di morte che presentano andamento crescente col crescere dell'età (cancro ed altri tumori maligni, diabete mellito, lesioni intracraniche di origine vascolare, malattie del cuore, nefriti e altre malattie dell'apparato urinario e genitale). Circa la metà, infatti, del complesso dei morti per cancro ed altri tumori maligni (massimo 492<sup>0</sup>/<sub>100</sub> nel 1948) e la metà ed oltre la metà del numero dei morti per diabete mellito (massimo 577<sup>0</sup>/<sub>100</sub> nel 1948), si hanno in età superiore ai 65 anni.

Le lesioni intracraniche di origine vascolare e le malattie del cuore, sono le più tipiche di tale gruppo di cause, in quanto maggiormente si concentrano nelle età avanzate: oltre i tre quarti dei morti per lesioni intracraniche di origine vascolare si hanno a 65 anni ed oltre (massimo 774<sup>0</sup>/<sub>100</sub>). Per le malattie del cuore oltre i due terzi dei decessi si verificano in età di 65 anni ed oltre (massimo 699<sup>0</sup>/<sub>100</sub>); e per le nefriti oltre la metà dei decessi è concentrata nella classe 65 anni ed oltre (massimo 571<sup>0</sup>/<sub>100</sub>).

c) Cause di morte che presentano andamento decrescente dalle prime età alle età centrali e crescente dalle età centrali a quelle più avanzate e pertanto con un minimo nelle età centrali (influenza, sifilide, bronchite, polmoniti e broncopolmonite).

L'influenza segna le punte massime nelle classi comprese tra 5 e 54 anni; la sifilide nelle classi tra 1 e 34 anni; la bronchite, nelle classi tra 5 e 44 anni; e la broncopolmonite e polmoniti dai 5 ai 54 anni.

d) Cause di morte con un massimo nelle età centrali. — Tali cause sono quelle che presentano andamento crescente dai primi anni di età alle età centrali e decrescente dalle età centrali a quelle più avanzate, e pertanto con un massimo nelle età centrali (malattie della gravidanza, parto e puerperio, tubercolosi dell'apparato respiratorio, febbre tifoide e paratifoide, omicidio).

Le malattie della gravidanza, parto e puerperio, legate naturalmente al periodo di età feconda,

Prosp. 28. — Morti per cause secondo l'età  
Per 1000 decessi delle rispettive cause

CLASSI DI ETÀ ANNI (1)	1936-38	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Febbre tifoide e paratifoide											
- 1. . . . .	3	4	3	3	4	2	3	3	5	3	6
1- 4. . . . .	63	63	59	55	42	41	34	38	46	50	62
5- 9. . . . .	105	103	101	86	65	74	63	66	80	85	94
10-14. . . . .	125	126	114	112	116	119	113	98	111	106	104
15-19. . . . .	171	196	206	215	221	223	207	202	192	192	184
20-24. . . . .	118	97	107	118	139	144	147	146	151	158	145
25-34. . . . .	198	192	196	190	169	156	151	141	142	144	139
35-44. . . . .	96	100	104	102	121	119	136	137	121	121	122
45-54. . . . .	57	53	53	59	55	60	67	82	72	69	66
55-64. . . . .	40	47	32	36	42	35	44	48	45	40	45
65 ed oltre. . . . .	24	21	26	23	25	27	35	39	36	31	34
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Difterite											
- 1. . . . .	96	108	134	134	131	133	185	196	226	238	202
1- 4. . . . .	634	618	605	648	617	553	565	546	613	625	667
5- 9. . . . .	199	208	188	156	158	155	105	97	75	64	74
10-14. . . . .	40	36	41	33	42	57	40	34	20	15	12
15-19. . . . .	9	9	14	9	18	30	29	30	14	9	12
20-24. . . . .	5	4	6	6	13	20	15	21	11	9	6
25-34. . . . .	7	7	6	4	8	19	18	23	11	10	9
35-44. . . . .	3	4	4	4	7	11	15	17	12	9	4
45-54. . . . .	2	2	1	3	1	10	12	13	8	6	5
55-64. . . . .	2	1	1	1	3	7	11	13	7	8	7
65 ed oltre. . . . .	1	3	1	1	2	5	5	11	3	8	5
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Tubercolosi dell'apparato respiratorio											
- 1. . . . .	5	5	6	5	5	4	3	3	5	6	6
1- 4. . . . .	12	11	13	13	13	11	12	13	18	16	16
5- 9. . . . .	7	7	6	7	7	7	8	9	10	8	7
10-14. . . . .	19	15	18	17	17	16	15	14	13	14	10
15-19. . . . .	82	100	100	99	98	94	83	80	77	71	58
20-24. . . . .	154	125	123	130	146	165	166	166	166	157	132
25-34. . . . .	276	288	282	274	265	252	240	235	246	247	238
35-44. . . . .	179	182	178	186	184	189	193	194	184	192	196
45-54. . . . .	127	127	134	130	129	132	140	139	139	139	162
55-64. . . . .	86	88	88	89	86	83	89	93	89	93	110
65 ed oltre. . . . .	51	52	52	51	50	48	52	55	53	58	65
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

(1) Esclusa l'età ignota.

Segue: Prosp. 28. — Morti per cause secondo l'età  
Per 1000 decessi delle rispettive cause

CLASSI DI ETÀ ANNI (1)	1936-38	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Tutte le altre forme di tubercolosi											
- 1. . . . .	67	63	62	54	45	48	45	48	51	56	57
1- 4. . . . .	152	136	136	135	135	125	124	136	146	151	165
5- 9. . . . .	97	97	90	91	83	81	88	88	101	97	94
10-14. . . . .	83	75	78	72	73	74	73	64	71	66	69
15-19. . . . .	87	113	114	110	116	109	102	105	111	107	97
20-24. . . . .	104	86	88	108	124	132	115	117	111	114	96
25-34. . . . .	141	149	149	160	158	158	142	136	134	137	120
35-44. . . . .	90	96	97	92	93	95	102	107	89	89	107
45-54. . . . .	70	71	72	67	63	66	77	74	70	65	72
55-64. . . . .	55	55	58	57	53	53	66	63	58	57	59
65 ed oltre. . . . .	54	59	56	53	56	59	66	63	58	60	64
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Sifilide											
- 1. . . . .	236	237	254	216	166	166	180	243	272	264	253
1- 4. . . . .	33	25	25	35	24	23	31	28	31	29	28
5- 9. . . . .	5	6	4	4	2	3	2	4	4	4	3
10-14. . . . .	4	4	3	2	3	5	3	4	3	1	2
15-19. . . . .	4	7	4	5	4	6	7	6	6	5	2
20-24. . . . .	5	7	3	7	7	10	10	11	12	12	13
25-34. . . . .	9	7	3	7	7	10	10	11	12	12	34
35-44. . . . .	45	43	41	35	33	38	40	46	41	35	34
45-54. . . . .	162	169	154	167	157	153	132	121	91	111	91
55-64. . . . .	196	204	202	216	235	226	221	202	184	194	202
65 ed oltre. . . . .	171	173	183	186	201	205	217	180	169	192	198
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Influenza											
- 1. . . . .	163	157	194	187	206	214	181	236	206	324	172
1- 4. . . . .	132	107	118	100	122	126	94	113	95	101	70
5- 9. . . . .	21	16	20	20	24	28	17	21	22	21	15
10-14. . . . .	14	11	14	15	14	15	13	14	12	13	9
15-19. . . . .	19	20	20	20	20	21	17	21	21	17	14
20-24. . . . .	18	12	11	11	15	14	15	17	15	14	13
25-34. . . . .	43	40	31	24	27	29	24	32	24	18	19
35-44. . . . .	47	48	34	36	28	38	31	35	34	24	27
45-54. . . . .	63	60	48	46	48	50	52	45	42	37	41
55-64. . . . .	102	100	87	81	85	79	80	79	76	67	83
65 ed oltre. . . . .	378	427	424	460	410	385	477	387	452	363	536
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Altre malattie infettive e parassitarie											
- 1. . . . .	235	230	242	233	198	187	184	189	256	201	185
1- 4. . . . .	283	255	233	264	207	171	158	174	231	158	258
5- 9. . . . .	57	59	56	65	58	52	52	64	56	64	43
10-14. . . . .	32	33	37	34	34	37	40	42	32	36	29
15-19. . . . .	24	32	34	36	34	43	44	38	35	44	27
20-24. . . . .	25	20	20	25	31	43	39	40	32	37	31
25-34. . . . .	48	55	52	53	71	79	68	65	52	59	51
35-44. . . . .	48	52	56	49	74	82	90	81	60	85	67
45-54. . . . .	50	53	53	49	60	70	81	79	59	81	70
55-64. . . . .	57	64	62	54	71	75	91	81	68	85	71
65 ed oltre. . . . .	140	147	156	138	162	162	153	147	120	149	168
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

(1) Esclusa l'età ignota.

Segue: Prosp. 28. — Morti per cause secondo l'età

Per 1000 decessi delle rispettive cause

CLASSI DI ETÀ ANNI (1)	1936-38	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
<b>Cancro ed altri tumori maligni</b>											
- 1. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1- 4. . . . .	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
5- 9. . . . .	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10-14. . . . .	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15-19. . . . .	3	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2
20-24. . . . .	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3
25-34. . . . .	22	21	20	21	20	18	18	18	17	17	16
35-44. . . . .	67	66	67	66	64	66	68	69	66	67	66
45-54. . . . .	154	158	154	153	152	153	153	155	158	155	153
55-64. . . . .	261	261	263	263	263	264	264	262	264	255	260
65 ed oltre. . . . .	478	478	480	482	487	482	482	481	478	491	492
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Diabete mellito</b>											
- 1. . . . .	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1
1- 4. . . . .	1	2	2	1	3	3	3	2	1	1	1
5- 9. . . . .	4	5	7	7	4	6	5	5	6	5	2
10-14. . . . .	6	7	6	6	9	11	14	9	8	6	4
15-19. . . . .	9	11	8	6	9	11	14	9	8	6	10
20-24. . . . .	10	14	10	9	13	20	19	16	12	8	10
25-34. . . . .	26	29	30	28	27	36	34	27	24	9	11
35-44. . . . .	38	36	33	35	39	47	52	50	39	36	33
45-54. . . . .	107	90	93	99	100	103	101	93	88	82	81
55-64. . . . .	271	276	275	275	261	242	255	268	270	262	252
65 ed oltre. . . . .	528	530	535	530	534	516	500	513	538	570	577
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Lesioni intra-craniche d'origine vascolare</b>											
- 1. . . . .	..	..	1	..	1	1	..	1	1	..	..
1- 4. . . . .	..	..	1	..	1	1	..	1	1	..	..
5- 9. . . . .	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..	1
10-14. . . . .	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..
15-19. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20-24. . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25-34. . . . .	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	3
35-44. . . . .	14	13	13	13	14	15	15	15	16	14	14
45-54. . . . .	51	51	52	50	52	55	50	52	53	50	52
55-64. . . . .	149	148	152	147	152	156	152	155	157	156	156
65 ed oltre. . . . .	779	780	776	782	773	765	774	767	763	772	770
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Meningite semplice e malattie del midollo spinale e altre malattie del sistema nervoso e organi dei sensi</b>											
- 1. . . . .	325	326	319	287	245	270	271	289	341	351	315
1- 4. . . . .	156	144	146	154	115	128	123	152	154	140	140
5- 9. . . . .	41	37	38	41	27	31	36	42	49	42	35
10-14. . . . .	30	27	28	28	20	23	27	28	31	30	26
15-19. . . . .	29	34	34	35	27	33	31	35	36	32	32
20-24. . . . .	29	27	26	29	31	34	35	38	37	32	34
25-34. . . . .	64	66	64	71	87	78	73	61	56	55	55
35-44. . . . .	67	67	68	77	111	98	96	81	62	65	74
45-54. . . . .	68	72	70	76	109	99	99	84	61	67	77
55-64. . . . .	75	79	87	85	108	99	99	92	75	78	87
65 ed oltre. . . . .	117	121	121	117	120	107	110	98	98	111	125
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

(1) Esclusa l'età ignota.

Segue: Prosp. 28. — Morti per cause secondo l'età

Per 1000 decessi delle rispettive cause

CLASSI DI ETÀ ANNI (1)	1936-38	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
<b>Malattie del cuore</b>											
- 1. . . . .	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2
1- 4. . . . .	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3
5- 9. . . . .	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
10-14. . . . .	7	6	6	6	6	6	5	6	6	6	5
15-19. . . . .	7	8	8	8	8	9	8	8	8	7	6
20-24. . . . .	9	6	6	6	7	8	9	10	10	8	8
25-34. . . . .	24	24	22	21	22	22	20	21	21	20	19
35-44. . . . .	37	36	36	36	36	38	38	39	37	36	38
45-54. . . . .	67	66	66	66	66	68	69	68	67	68	68
55-64. . . . .	150	151	149	145	147	147	144	145	142	145	148
65 ed oltre. . . . .	689	693	698	700	696	690	699	691	699	699	699
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Bronchite</b>											
- 1. . . . .	228	219	225	224	225	257	215	248	270	276	204
1- 4. . . . .	89	81	78	80	84	89	68	74	85	66	59
5- 9. . . . .	6	6	6	7	7	7	6	6	7	5	4
10-14. . . . .	3	2	3	2	4	5	4	4	4	3	2
15-19. . . . .	3	3	4	4	4	7	8	7	5	5	4
20-24. . . . .	4	3	3	4	5	6	10	8	7	9	4
25-34. . . . .	9	8	9	11	9	13	17	16	13	11	11
35-44. . . . .	14	14	14	15	16	18	27	22	20	17	12
45-54. . . . .	28	29	30	31	31	29	35	33	29	29	32
55-64. . . . .	73	75	73	73	68	69	78	71	62	64	79
65 ed oltre. . . . .	543	561	556	549	549	499	531	512	499	515	588
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Broncopneumonia e polmoniti</b>											
- 1. . . . .	242	249	295	291	291	286	248	290	313	353	293
1- 4. . . . .	179	171	167	178	165	154	125	137	158	115	111
5- 9. . . . .	18	17	16	18	18	19	18	18	20	15	13
10-14. . . . .	9	8	8	9	10	11	10	10	10	9	9
15-19. . . . .	12	14	12	13	12	17	15	14	13	11	9
20-24. . . . .	15	10	8	9	11	13	15	15	13	12	8
25-34. . . . .	34	32	24	23	23	24	25	23	20	16	15
35-44. . . . .	41	39	30	29	31	35	37	31	27	25	24
45-54. . . . .	53	52	41	38	42	44	48	44	38	36	38
55-64. . . . .	89	88	76	74	73	76	85	78	68	65	75
65 ed oltre. . . . .	308	320	324	318	324	320	375	341	320	343	405
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Diarrea ed enteriti</b>											
- 1. . . . .	618	627	641	617	585	605	605	589	602	679	684
1- 4. . . . .	254	248	232	262	241	231	211	244	265	214	214
5- 9. . . . .	10	9	9	7	7	9	9	11	11	7	6
10-14. . . . .	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2
15-19. . . . .	2	2	3	2	3	4	4	4	3	3	2
20-24. . . . .	2	2	2	2	4	4	4	3	3	2	2
25-34. . . . .	5	5	5	6	11	10	8	7	5	4	3
35-44. . . . .	5	5	6	7	14	14	13	10	7	5	6
45-54. . . . .	8	8	8	8	16	17	12	8	8	8	7
55-64. . . . .	15	15	16	14	23	20	20	17	13	13	12
65 ed oltre. . . . .	78	75	76	72	92	83	101	96	76	62	62
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

(1) Esclusa l'età ignota.



presentano il massimo peso nelle classi 25-34 anni (variabile da 401‰ nel 1945 a 438‰ nel 1943) cui seguono le classi di 35-44 anni (da 356‰ nel 1946 a 384‰ nel 1944) e di 20-24 anni.

Per la tubercolosi dell'apparato respiratorio il numero dei morti nelle classi 15-19, 20-24 e 25-34 anni pur attraverso oscillazioni, presenta una tendenza alla diminuzione per la classe 15-19, essa passa da 94 a 58‰; per quella da 20-24 da 166 a 132‰; e per quella da 25-34 da 252 a 235‰; va aumentando invece nell'età da 35 anni in su. Si verifica quindi, uno spostamento dell'età di massima punta della tubercolosi, fatto questo, che ha una notevole importanza epidemiologica. La febbre tifoide ha i valori massimi nelle classi di età tra 10 e 44 anni con un massimo che si verifica costantemente per la classe 15-19 anni. L'omicidio ha i maggiori valori tra i 25 e i 44 anni.

### 3) Quozienti specifici di mortalità per grandi classi di età.

L'esame di tali quozienti, ottenuti mediante popolazione calcolata distinta per classi di età (Prosp. 29), conferma all'incirca quanto constatato nel precedente paragrafo e, cioè, si nota che vi sono:

a) *Malattie con la massima mortalità nei primi anni di vita* (meno di 1 anno; da 1 a 4 anni) come la pertosse, il morbillo, la difterite, la scarlattina. La pertosse ed il morbillo, presentano i quozienti più elevati nel primo anno di età; la difterite, segna nel 1936-38, i quozienti più elevati nell'età da 1 a 4 anni, che a partire dal 1942-44 si spostano nel 1° anno di vita; la scarlattina presenta i massimi quozienti da 1 a 4 anni.

b) *Malattie per le quali la massima mortalità è registrata nelle età avanzate* (65 anni ed oltre) come il cancro ed altri tumori maligni, le lesioni intracraniche di origine vascolare, le malattie del cuore, le altre malattie dell'apparato circolatorio, il diabete. Si deve rilevare che, mentre per i tumori maligni e le malattie del cuore i quo-

zienti specifici di mortalità, per l'età di 65 anni ed oltre, presentano un progressivo aumento nel corso degli anni considerati, per le lesioni intracraniche di origine vascolare e per le altre malattie dell'apparato circolatorio, come anche per il diabete, si ha invece una diminuzione.

c) *Malattie la cui mortalità massima si verifica ai due estremi delle età*, come la sifilide, l'influenza, le polmoniti e broncopolmonite. Per tutte le dette malattie i quozienti del primo anno di vita sono nettamente superiori a quelli di 65-ω anni. Inoltre, per tutte si osserva, in entrambe le età, una diminuzione della mortalità specifica particolarmente notevole per le polmoniti e per la broncopolmonite, il cui quoziente segna una diminuzione del 31,9% nel primo anno di vita, e del 35,1% a 65-ω anni.

d) *Malattie che presentano la mortalità più elevata nelle età centrali*, come la febbre tifoide e paratifi, la tubercolosi dell'apparato respiratorio, le infezioni puerperali e le altre malattie della gravidanza, parto e puerperio.

Si deve rilevare che, in base alla classificazione per età, è possibile seguire la mortalità per tubercolosi dell'apparato respiratorio che presenta i valori più elevati nelle classi da 15-24, 25-44 e 45-64 anni. Ora mentre nella prima di tali classi di età il quoziente di mortalità del 1948 (50,7 per 100.000 ab.) è inferiore del 44,3% in confronto di quello del 1936-38 (91,0), per la classe di età di 25-44 anni, la diminuzione è del 28,9% e per la classe di età di 45-64 solo del 9,8%. Pertanto si ha uno spostamento del rapporto tra le mortalità specifiche nelle tre classi di età, nel senso di un aumento, che ha una notevole importanza nella epidemiologia di tale malattia.

La diminuzione che si osserva per le altre malattie della gravidanza, parto e puerperio, inoltre, è molto inferiore a quella presentata dalla infezione puerperale.

e) *Malattie o cause di morte con andamento irregolare senza un massimo netto*, come le localizzazioni tubercolari extraripiratorie, il suicidio, l'omicidio, le altre cause violente accidentali.

### Prosp. 29. — Mortalità secondo l'età e le cause

Per 100.000 abitanti di ciascuna classe di età

CAUSE DI MORTE	Meno di 1 anno						1 - 4 anni					
	1936-38	1942-44	1945	1946	1947	1948	1936-38	1942-44	1945	1946	1947	1948
Febbre tifoide e paratifoide	1,5	2,5	2,0	3,3	1,8	2,1	9,0	7,5	7,3	8,1	8,4	6,3
Scarlattina	2,8	0,6	0,4	0,9	0,9	0,5	5,1	1,2	0,6	1,1	0,8	0,6
Pertosse	137,3	94,4	125,4	204,2	43,1	67,6	31,5	15,5	18,9	30,3	6,3	8,0
Difterite	27,1	52,7	64,7	61,2	42,7	22,7	49,7	49,4	44,1	41,0	35,4	22,4
Tubercolosi dell'apparato respiratorio	14,8	17,0	13,9	20,1	16,3	14,9	9,6	12,0	12,9	16,6	14,2	11,4
Tutte le altre forme tubercolari	67,0	53,6	53,1	59,3	43,5	39,3	42,2	36,5	37,2	41,9	37,2	33,6
Sifilide	77,1	68,4	93,7	100,1	82,4	72,1	3,0	2,5	2,6	2,8	2,8	2,3
Influenza	178,9	95,6	82,5	96,0	107,2	98,0	40,5	13,3	9,7	11,0	10,5	11,8
Morbillo	52,5	24,1	14,2	59,1	12,3	12,5	46,7	14,4	10,1	34,8	7,0	7,5
Altre malattie infettive e parassitarie	173,5	177,9	165,6	209,2	136,6	101,8	39,3	37,0	39,2	38,9	33,8	27,2
Tumori maligni	3,2	2,9	3,1	4,4	3,5	4,2	3,8	3,5	4,3	4,1	3,9	4,4
Diabete mellito	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Lesioni intra-craniche d'origine vascolare	2,1	3,4	5,3	5,0	2,5	2,5	0,7	0,9	1,5	0,7	0,8	1,0
Malattie del cuore	16,1	27,9	36,5	37,7	28,1	20,1	5,8	8,9	10,0	9,8	8,9	6,4
Altre malattie dell'apparato circolatorio	6,3	6,5	6,9	6,1	3,6	2,4	2,5	1,7	1,6	1,7	1,2	1,0
Broncopolmonite e polmoniti	2.289,4	2.198,6	2.103,5	2.378,6	1.945,8	1.558,8	469,1	288,6	243,6	297,3	199,2	176,1
Infezioni puerperali ed altre forme settiche (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suicidio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidio	4,0	3,4	4,9	3,0	3,0	4,9	0,4	0,8	0,5	0,8	0,3	0,3
Morti accidentali e altre morti violente	22,6	66,6	46,8	28,3	24,4	14,9	56,9	82,3	71,8	49,6	47,9	46,1
Altre cause	7.987,8	8.441,6	7.721,1	8.481,9	6.458,2	5.897,1	642,8	561,6	519,9	519,1	401,4	331,6
<b>Totale</b>	<b>11.044,2</b>	<b>11.338,1</b>	<b>10.543,7</b>	<b>11.758,7</b>	<b>8.956,1</b>	<b>7.936,5</b>	<b>1.458,8</b>	<b>1.137,8</b>	<b>1.036,0</b>	<b>1.109,9</b>	<b>820,3</b>	<b>698,4</b>

CAUSE DI MORTE	5 - 14 anni						15 - 24 anni					
	1936-38	1942-44	1945	1946	1947	1948	1936-38	1942-44	1945	1946	1947	1948
Febbre tifoide e paratifoide	12,8	14,6	12,0	12,2	11,4	7,6	20,1	30,8	25,7	21,9	20,9	12,7
Scarlattina	1,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Pertosse	0,5	0,3	0,4	0,5	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—
Difterite	7,3	6,6	4,0	2,3	1,6	1,1	0,5	1,6	1,6	0,6	0,4	0,2
Tubercolosi dell'apparato respiratorio	8,1	9,7	8,7	7,7	7,0	4,7	91,0	112,5	94,9	83,2	74,5	50,7
Tutte le altre forme tubercolari	19,5	18,6	15,9	18,2	14,4	12,5	25,9	29,6	23,4	23,4	19,5	14,7
Sifilide	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
Influenza	4,2	1,8	1,1	1,5	1,3	1,6	5,5	1,8	1,2	1,5	1,2	1,8
Morbillo	2,2	0,7	0,5	2,7	0,6	0,4	0,4	0,2	0,1	0,6	0,2	0,1
Altre malattie infettive e parassitarie	10,9	13,0	15,0	11,2	9,8	7,3	9,7	12,7	11,7	10,3	8,4	6,2
Tumori maligni	2,0	1,7	2,1	2,3	2,1	2,1	4,3	3,4	3,3	3,7	3,9	3,5
Diabete mellito	0,5	0,8	0,6	0,5	0,4	0,5	1,1	1,7	1,4	0,9	0,6	0,8
Lesioni intra-craniche d'origine vascolare	0,6	0,7	0,9	0,8	0,7	0,6	1,3	1,5	1,8	2,0	1,5	1,5
Malattie del cuore	9,5	10,2	10,2	11,0	10,4	9,5	16,0	17,9	18,8	17,9	16,6	15,2
Altre malattie dell'apparato circolatorio	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,6	0,5	0,6	0,6	0,2	0,3
Broncopolmonite e polmoniti	28,0	23,2	18,8	20,4	14,9	12,6	34,7	23,6	19,7	18,3	14,1	10,6
Infezioni puerperali ed altre forme settiche (1)	—	—	—	—	—	—	6,7	2,3	3,4	2,6	2,2	2,0
Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio (1)	—	—	—	—	—	—	7,8	4,0	4,7	5,4	5,2	5,3
Suicidio	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	6,1	3,4	3,5	4,7	4,4	5,2
Omicidio	0,5	1,4	2,0	0,7	0,6	0,4	1,9	18,6	35,8	6,1	3,6	2,9
Morti accidentali e altre morti violente	17,2	73,1	75,9	27,5	23,1	19,1	25,4	119,9	137,4	36,2	28,6	21,9
Altre cause	69,4	69,1	58,9	56,1	47,2	40,3	68,1	76,9	65,2	59,1	50,5	44,7
<b>Totale</b>	<b>195,3</b>	<b>246,5</b>	<b>228,0</b>	<b>176,7</b>	<b>146,8</b>	<b>121,1</b>	<b>320,7</b>	<b>460,6</b>	<b>450,8</b>	<b>295,9</b>	<b>253,4</b>	<b>197,0</b>

(1) Calcoli eseguiti sulla popolazione femminile della stessa età.

Segue: Prosp. 29. — Mortalità secondo l'età e le cause  
Per 100.000 abitanti di ciascuna classe di età

CAUSE DI MORTE	25 - 44 anni						45 - 64 anni					
	1936-38	1942-44	1945	1946	1947	1948	1936-38	1942-44	1945	1946	1947	1948
Febbre tifoide e paratifoide . . .	12,0	14,6	13,7	11,0	10,2	6,3	6,3	8,3	9,7	7,4	6,4	4,1
Scarlattina . . . . .	0,1	0,1	..	0,1	0,1	0,1	..	..	..	..	0,1	..
Pertosse . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Difterite . . . . .	0,2	0,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,2	0,5	0,8	0,4	0,3	0,1
Tubercolosi dell'apparato respiratorio . . . . .	102,4	119,9	109,7	95,9	91,9	72,8	76,3	94,8	90,2	77,0	73,5	68,8
Tutte le altre forme tubercolari . . . . .	18,3	19,1	16,9	15,4	12,8	10,9	15,8	15,3	14,5	13,3	10,4	9,6
Sifilide . . . . .	5,3	4,8	4,0	2,9	3,3	2,5	15,0	18,2	14,0	11,6	13,2	12,1
Influenza . . . . .	7,8	1,8	1,5	1,6	1,0	1,9	23,1	6,5	4,1	4,9	3,8	7,5
Morbillo . . . . .	0,1	..	..	0,2	..	..	..	..	..	..	..	..
Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	11,7	15,7	14,6	11,9	9,9	8,1	21,0	24,1	24,5	20,8	17,4	14,7
Tumori maligni . . . . .	27,5	25,6	27,3	27,1	28,2	28,7	203,5	197,9	199,7	206,8	208,8	217,6
Diabete mellito . . . . .	2,3	2,6	2,2	1,5	1,3	1,3	21,8	18,5	15,8	12,7	12,4	12,2
Lesioni intra-craniche d'origine vascolare . . . . .	8,6	8,4	8,4	8,4	7,3	7,1	154,5	144,5	129,4	129,6	127,9	131,0
Malattie del cuore . . . . .	36,1	38,9	41,5	39,1	38,4	37,6	203,1	225,0	224,4	211,9	220,1	216,3
Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	2,4	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	28,0	20,2	15,8	12,1	12,7	13,0
Broncopolmonite e polmoniti . . . . .	55,7	30,1	24,4	20,8	16,5	14,4	169,1	101,3	84,3	71,9	61,4	63,3
Infezioni puerperali ed altre forme settiche (1) . . . . .	12,6	5,6	5,5	5,3	3,8	4,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	..
Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio (1) . . . . .	22,1	13,6	12,7	15,0	14,5	14,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4
Suicidio . . . . .	9,0	5,2	5,5	6,2	6,6	7,1	15,3	8,8	8,4	8,8	10,5	11,6
Omicidio . . . . .	2,7	15,2	35,2	7,5	4,6	3,6	2,2	12,7	27,7	6,3	3,4	2,6
Morti accidentali e altre morti violente . . . . .	26,0	107,6	111,7	32,9	28,1	23,1	39,6	146,2	124,1	43,2	40,8	34,6
Altre cause . . . . .	115,8	128,5	107,8	91,5	85,5	76,4	350,0	384,9	317,4	270,1	257,6	249,5
<b>Totale . . . . .</b>	<b>461,9</b>	<b>550,1</b>	<b>536,2</b>	<b>385,7</b>	<b>355,5</b>	<b>312,8</b>	<b>1.345,3</b>	<b>1.428,3</b>	<b>1.305,2</b>	<b>1.109,1</b>	<b>1.081,0</b>	<b>1.068,9</b>

CAUSE DI MORTE	65 anni e oltre						COMPLESSO (*)					
	1936-38	1942-44	1945	1946	1947	1948	1936-38	1942-44	1945	1946	1947	1948
Febbre tifoide e paratifoide . . .	3,7	5,8	7,2	5,7	4,4	3,1	11,4	14,9	13,7	11,8	10,9	6,9
Scarlattina . . . . .	..	..	..	..	..	..	0,8	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Pertosse . . . . .	0,1	..	0,1	..	..	0,1	5,7	3,0	3,6	5,6	1,3	1,9
Difterite . . . . .	0,1	0,3	0,9	0,2	0,4	0,1	6,2	6,6	5,8	4,5	3,7	2,3
Tubercolosi dell'apparato respiratorio . . . . .	43,4	52,7	52,7	45,0	45,5	40,7	63,0	78,2	71,7	63,2	59,6	48,0
Tutte le altre forme tubercolari . . . . .	16,0	17,9	16,5	15,2	12,8	11,5	22,1	22,0	19,6	19,5	16,1	13,8
Sifilide . . . . .	12,9	16,6	14,0	15,4	13,0	12,9	7,2	7,6	6,8	6,2	6,4	5,7
Influenza . . . . .	123,5	51,1	31,9	47,1	32,7	79,6	24,3	9,0	6,1	7,8	6,8	11,5
Morbillo . . . . .	..	..	..	..	..	..	5,4	1,8	1,1	4,0	0,9	0,8
Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	64,8	63,0	55,7	49,7	39,0	31,7	22,6	24,4	23,4	21,1	17,4	13,9
Tumori maligni . . . . .	553,2	559,8	571,8	586,4	619,9	639,1	86,1	86,0	88,4	91,7	95,7	100,2
Diabete mellito . . . . .	71,8	65,7	55,8	47,8	51,0	52,0	10,1	9,4	8,1	6,6	6,8	6,9
Lesioni intra-craniche d'origine vascolare . . . . .	1.423,3	1.318,6	1.193,7	1.175,0	1.189,7	1.192,3	136,0	127,0	115,7	115,1	116,8	119,4
Malattie del cuore . . . . .	1.524,1	1.783,0	1.798,6	1.778,5	1.793,5	1.722,8	164,7	190,5	193,5	190,3	194,4	190,0
Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	440,4	432,0	308,0	234,6	245,6	241,4	38,9	36,6	26,7	20,6	21,6	21,7
Broncopolmonite e polmoniti . . . . .	862,6	681,4	582,4	545,4	514,3	560,4	208,8	149,8	127,1	127,2	113,7	106,7
Infezioni puerperali ed altre forme settiche (1) . . . . .	..	..	..	..	..	..	5,7	2,4	2,6	2,3	1,8	1,8
Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio (1) . . . . .	..	..	..	..	..	..	9,3	5,7	5,4	6,3	6,2	6,1
Suicidio . . . . .	18,5	12,9	11,9	11,9	13,4	14,0	7,6	4,7	4,6	5,2	5,7	6,3
Omicidio . . . . .	2,3	8,4	10,5	4,4	2,2	1,7	1,8	10,9	22,9	5,0	3,0	2,4
Morti accidentali e altre morti violente . . . . .	81,2	219,0	176,4	79,3	76,4	73,9	33,0	115,8	112,9	38,9	34,5	29,7
Altre cause . . . . .	2.719,8	3.031,6	2.645,1	2.191,5	2.048,9	1.944,5	549,4	560,6	481,0	438,7	405,4	375,3
<b>Totale . . . . .</b>	<b>7.961,7</b>	<b>8.319,8</b>	<b>7.533,2</b>	<b>6.833,2</b>	<b>6.702,6</b>	<b>6.621,7</b>	<b>1.411,5</b>	<b>1.462,4</b>	<b>1.336,2</b>	<b>1.187,1</b>	<b>1.124,5</b>	<b>1.066,9</b>

(\*) Esclusa l'età ignota. — (1) Calcoli eseguiti sulla popolazione femminile della stessa età.

## Cause di morte per sesso

Una prevalenza di morti di sesso maschile si riscontra, come nei periodi passati, anche negli anni considerati (1943-1948). Per le singole classi di cause, tale rapporto s'inverte per la senilità e la vecchiaia, per le malattie dell'apparato circolatorio, per le malattie reumatiche, della nutrizione, ghiandole endocrine, altre malattie generali e avitaminosi, per cancro ed altri tumori maligni e, se si eccettua il 1948, per le malattie del sistema nervoso e organi dei sensi. La preva-

lenza dei decessi nel sesso femminile per malattie del cuore, si spiega con la maggiore incidenza nel sesso femminile dell'infezione reumatica; per il cancro, con la maggiore notevole frequenza del cancro degli organi genitali femminili.

Particolarmente accentuata la prevalenza nel sesso maschile dei decessi per avvelenamenti cronici e intossicazioni, per cause violente e accidentali, per le malattie delle ossa e organi della locomozione, per malattie della pelle e tessuto cellulare, per malattie particolari della prima infanzia (Prosp. 30).

## Prosp. 30. — Le cause di morte in relazione al sesso

Maschi per 100 morti in complesso

CLASSI DI CAUSE DI MORTE	1936-38	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
I - Malattie infettive e parassitarie . . . . .	51,0	51,3	51,7	52,2	54,4	54,7	53,6	53,0	53,6	54,5	54,7
II - Cancro ed altri tumori . . . . .	47,1	47,3	47,8	48,0	47,2	47,2	47,9	47,0	47,9	47,9	48,4
III - Malattie reumatiche, della nutrizione, ghiandole endocrine, altre malattie generali e avitaminosi . . . . .	45,9	45,5	45,6	45,7	43,8	43,3	44,4	44,3	43,7	44,6	42,3
IV - Malattie del sangue e organi ematopoietici . . . . .	50,4	53,8	51,3	51,5	51,4	50,8	50,0	50,4	50,2	53,3	50,1
V - Avvelenamenti cronici e intossicazioni . . . . .	85,7	86,2	84,9	86,0	88,0	88,2	84,5	82,0	86,3	86,9	85,7
VI - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi . . . . .	52,2	51,8	52,0	52,3	53,7	52,0	51,5	50,2	50,3	50,1	49,6
VII - Malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	45,4	45,5	45,7	45,8	47,1	46,5	45,3	44,1	45,1	45,5	45,1
VIII - Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .	53,6	53,0	53,0	53,0	54,1	53,6	52,6	52,4	52,7	53,7	52,4
IX - Malattie dell'apparato digerente . . . . .	54,0	54,2	54,6	54,3	55,1	54,1	53,8	54,0	54,2	55,5	55,4
X - Malattie dell'apparato urinario e genitale . . . . .	55,1	55,5	55,4	55,8	57,5	56,0	55,8	55,6	57,0	56,5	55,9
XI - Malattie gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII - Malattie della pelle e tessuto cellulare . . . . .	58,8	58,1	57,9	56,8	59,4	56,1	55,3	54,2	55,8	54,5	52,9
XIII - Mal. delle ossa e organi della locomoz. . . . .	61,8	59,5	63,1	60,1	57,2	62,3	57,8	59,1	59,9	56,0	56,4
XIV - Vizi di conformazione congeniti . . . . .	53,9	53,2	54,1	53,4	54,4	54,0	54,1	53,7	55,4	54,9	53,5
XV - Malattie particolari della 1ª infanzia . . . . .	55,2	55,5	55,4	55,7	54,9	55,1	54,6	54,6	55,4	55,3	55,8
XVI - Senilità, vecchiaia . . . . .	44,3	43,8	44,5	44,1	45,3	43,8	44,5	43,3	43,5	43,2	43,0
XVII - Morti violente o accidentali . . . . .	75,0	76,0	76,6	75,9	74,9	68,8	72,5	79,6	78,5	77,7	76,4
XVIII - Cause di morte non determinate . . . . .	59,5	58,7	56,7	57,2	58,3	54,2	55,5	53,8	54,2	53,9	55,7
<b>Totale . . . . .</b>	<b>51,4</b>	<b>51,3</b>	<b>51,4</b>	<b>51,6</b>	<b>52,6</b>	<b>52,8</b>	<b>53,7</b>	<b>52,8</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,0</b>



Segue: Prosp. 31. — Mortalità infantile per alcune cause.

Per 10.000 nati vivi

REGIONI	1936-1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
<b>Malattie particolari della prima infanzia</b>											
Piemonte . . . . .	256,6	249,5	272,9	256,3	303,9	292,9	257,2	287,4	267,7	273,2	238,0
Valle d'Aosta . . . . .	299,2	277,1	305,7	307,1	323,3	284,4	310,5	492,8	230,2	239,7	239,3
Lombardia . . . . .	326,1	287,3	298,2	310,4	319,1	327,7	298,5	325,3	284,7	321,3	289,1
Trentino-Alto Adige . . . . .	300,1	285,2	294,2	295,4	309,5	263,5	304,4	337,0	294,9	330,5	300,9
Veneto . . . . .	242,3	241,9	253,0	235,2	232,9	260,9	277,6	313,7	261,4	280,4	251,2
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	332,7	308,7	315,6	307,9	322,2	298,1	330,1	374,0	305,6	315,1	283,0
Liguria . . . . .	278,7	287,2	296,1	299,0	305,9	273,6	320,8	354,6	315,9	290,5	264,9
Emilia-Romagna . . . . .	305,6	303,8	354,2	353,8	348,2	338,0	335,7	368,3	345,4	343,3	265,4
Toscana . . . . .	310,9	291,2	320,2	333,7	338,0	299,9	335,3	324,0	352,5	317,3	254,3
Umbria . . . . .	250,3	239,4	266,1	265,1	284,4	280,2	315,1	313,9	260,9	232,9	227,5
Marche . . . . .	295,7	308,7	351,2	309,7	398,1	380,4	328,4	365,3	330,7	343,2	301,8
Lazio . . . . .	232,2	238,5	269,7	289,9	319,3	276,7	310,4	271,4	234,1	224,1	231,9
Abruzzi e Molise . . . . .	318,6	316,2	354,6	352,6	427,7	401,9	376,9	368,6	320,6	290,2	296,5
Campania . . . . .	355,7	355,4	366,1	439,6	493,4	437,8	447,8	452,0	397,6	328,2	342,7
Puglia . . . . .	262,8	263,3	289,6	308,3	388,5	358,1	321,8	324,4	305,6	282,4	272,9
Basilicata . . . . .	264,2	272,1	296,0	310,7	412,7	413,5	352,6	342,3	326,9	268,4	256,3
Calabria . . . . .	259,4	251,4	250,9	285,1	326,8	316,8	243,6	305,1	305,9	216,6	212,1
Sicilia . . . . .	283,0	276,5	299,3	303,4	343,3	320,3	314,6	327,7	291,3	279,5	262,2
Sardegna . . . . .											
<b>Italia</b>	<b>283,0</b>	<b>276,5</b>	<b>299,3</b>	<b>303,4</b>	<b>343,3</b>	<b>320,3</b>	<b>314,6</b>	<b>327,7</b>	<b>291,3</b>	<b>279,5</b>	<b>262,2</b>
<b>Altre cause</b>											
Piemonte . . . . .	133,3	130,3	128,7	135,1	145,8	144,6	147,1	144,5	132,9	122,5	97,2
Valle d'Aosta . . . . .	181,3	151,1	168,4	183,5	173,9	154,0	177,4	128,9	81,2	100,9	98,2
Lombardia . . . . .	179,4	141,7	127,7	169,0	167,6	149,8	185,9	167,1	146,5	158,8	116,5
Trentino - Alto Adige . . . . .	153,5	130,5	147,2	165,8	141,2	134,4	140,7	156,9	141,1	135,9	108,2
Veneto . . . . .	128,2	113,7	120,4	139,1	162,9	143,5	198,5	164,6	136,1	117,5	108,7
Friuli - Venezia Giulia . . . . .	145,7	129,8	135,9	163,6	137,5	136,5	154,4	182,2	142,1	136,1	89,9
Liguria . . . . .	117,2	124,8	113,8	131,8	122,2	124,4	168,2	135,2	141,3	113,6	89,1
Emilia - Romagna . . . . .	150,0	150,7	147,2	160,2	148,3	131,2	150,7	158,4	151,0	125,4	95,7
Toscana . . . . .	164,8	152,0	154,3	156,8	181,3	153,8	186,7	166,3	151,5	144,3	94,7
Umbria . . . . .	177,7	154,2	194,1	185,3	179,9	212,4	266,8	205,2	186,2	160,7	132,7
Marche . . . . .	239,6	194,7	246,1	255,1	245,3	276,6	281,0	287,6	229,3	205,4	169,3
Lazio . . . . .	232,2	219,1	228,3	255,9	259,1	317,9	289,2	225,2	228,1	193,9	174,1
Abruzzi e Molise . . . . .	234,6	211,3	227,9	245,2	230,9	265,8	252,9	205,9	178,5	156,6	143,0
Campania . . . . .	246,3	209,3	232,4	316,3	246,4	274,9	209,3	249,0	254,9	185,5	168,7
Puglia . . . . .	209,0	221,2	235,1	296,3	238,8	290,0	240,4	198,8	195,6	174,0	140,9
Basilicata . . . . .	177,0	169,9	155,3	196,2	225,3	201,8	177,4	151,8	144,3	125,0	115,7
Calabria . . . . .	188,2	155,8	132,7	198,7	204,8	187,4	355,6	179,4	199,2	124,3	117,6
Sicilia . . . . .	182,0	165,3	175,0	198,1	192,1	203,2	207,5	185,0	169,1	151,6	126,3
Sardegna . . . . .											
<b>Italia</b>	<b>182,0</b>	<b>165,3</b>	<b>175,0</b>	<b>198,1</b>	<b>192,1</b>	<b>203,2</b>	<b>207,5</b>	<b>185,0</b>	<b>169,1</b>	<b>151,6</b>	<b>126,3</b>

talità infantile per tale gruppo di cause. Pertanto, si è determinata una diminuzione della variabilità regionale nel corso del tempo.

Per le malattie dell'apparato digerente si ha una minore regolarità: mentre, nel 1947, le diminuzioni più forti si hanno in Sardegna ed in Sicilia, nel 1948, in tali Regioni si ha un aumento, per cui in detto anno, le più forti diminuzioni si verificano, rispetto al 1943, in Liguria, nel Tren-

tino-Alto Adige, nel Piemonte, nelle Marche, mentre in Sardegna la diminuzione è minima.

Ne segue, quindi, che, essendo la mortalità per enterite diminuita maggiormente in Regioni nelle quali era già inferiore alla media, si ha, al contrario, delle malattie respiratorie, un aumento della variabilità, accentuandosi le differenze tra le singole Regioni.


Per le malattie particolari della prima infanzia,

invece, le diminuzioni più forti, nel 1948, come anche nel 1947, si hanno in Puglia, Basilicata, Calabria e, particolarmente, in Sicilia e Sardegna. Nelle Regioni settentrionali ed in Toscana si hanno, invece, diminuzioni minime. Si deve, però, considerare anche il fatto che nelle Regioni meridionali (Puglia, Basilicata, Sicilia) si era verificato un notevole aumento della mortalità infantile per tale gruppo di cause, per cui le diminuzioni significano anche un ritorno alla normalità.

Per il complesso della mortalità infantile, infine, le diminuzioni più forti si verificano in Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata, in Regioni ad elevata mortalità infantile, per cui può dirsi che in complesso la diminuzione della mortalità infantile, dal 1943 al 1948, nelle singole Regioni, ha un'azione livellatrice.

Analizzando la mortalità infantile nel 1° anno di vita, secondo l'età in mesi ed il sesso, (Rosp. 32) per i suddetti tre gruppi di cause (malattie dell'apparato respiratorio, malattie dell'apparato digerente, malattie particolari della prima infanzia) si nota che in complesso la mortalità infantile è nei singoli mesi del 1° anno di vita maggiore nel sesso maschile; nei pochi casi in cui si verifica il contrario, l'eccedenza della mortalità femminile, è di lievissima entità; la mortalità a meno di 1 mese di età è notevolmente più forte di quella delle altre classi di età prese in considerazione, in rapporto certamente alle frequenti cause di morte che già esplicano la loro influenza nella vita intrauterina e nei primi giorni di vita extrauterina (Prosp. 32). Nell'età di 1 mese la mortalità subisce una notevolissima diminuzione e nelle età successive (di 2 e 3, da 4 a 6, da 7 a 11 mesi) essa va,

Graf. 5 — Mortalità infantile per cause





APPENDICE

---

NUMERI INDICI E QUOZIENTI DI MORTALITÀ  
PER CAUSE















APPENDICE C. — Morti e mortalità per cause (a)

Table with columns: Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. interm.), CAUSE DI MORTE (b), Mortali (c) (1943-1948), and Quozienti per 1.000.000 di abitanti (1943-1948). Rows include categories like Malattie infettive e parassitarie, Cancro ed altri tumori, Malattie reumatiche, etc.

Segue: APPENDICE C. — Morti e mortalità per cause (a)

Table with columns: Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. interm.), CAUSE DI MORTE (b), Mortali (c) (1943-1948), and Quozienti per 1.000.000 di abitanti (1943-1948). Rows include categories like Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie dell'apparato digerente, Malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale, etc.

(a) Per i dati relativi ai trienni dal 1887 al 1913 ed ai singoli anni dal 1914 al 1930 cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Statistica delle cause di morte negli anni 1929-1930, Parte I, Introduzione, pagg. 12\* e seguenti; per i dati relativi ai singoli anni dal 1931 al 1942 cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Movimento della Popolazione e Cause di morte negli anni 1941-1942 - Parte II - Cap. I, Notizie retrospettive, pagg. 188 e seguenti. — (b) Per i morti negli anni 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 e 1948, distinti secondo la nomenclatura dettagliata cfr. per ciascun anno la tav. 1. — (c) Nelle cifre dei morti non sono compresi i morti in zone di operazioni di guerra.

(a) (b) (c) Vedi note a pagina precedente. (d) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta palesemente di un delitto, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da una lesione o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano o no dolosi. Soltanto l'Autorità giudiziaria, spesso dopo lunghe e accurate ricerche, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Si spiega pertanto come i risultati delle due statistiche differiscano specialmente nel numero degli infanticidi e degli omicidi per avvelenamento, per i quali occorrono indagini che occupano molto tempo per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

TAVOLE

















Segue: Tav. 1. — Morti per causa - Regioni  
Segue: Anno 1943

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	Regioni							ITALIA	Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
		Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria		
155	Altre malattie delle ossa	8	—	17	4	8	—	13	80	155
156	Malattie delle articolazioni e degli altri organi della locomozione	5	—	27	1	11	5	3	203	156
	a) articolazioni (eccettuata la tubercolosi e il reumatismo)	5	—	23	1	11	2	2	176	a
	b) altri organi della locomozione	—	—	4	—	—	3	1	27	b
	<b>XIV — Vizi di conformazione congeniti.</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>404</b>	<b>57</b>	<b>256</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>3.030</b>	
	Quozienti per 100.000 abitanti	5	6	7	8	7	6	4	7	
157	Vizi di conformazione congeniti	177	5	404	57	256	55	65	3.030	157
	a) idrocefalia congenita	8	—	37	7	25	4	7	278	a
	b) spina bifida e meningocele	14	—	41	11	35	8	2	491	b
	c) malformazioni congenite del cuore	105	4	227	23	114	26	43	1.433	c
	d) mostrosità	2	—	14	4	18	4	3	129	d
	e) stenosi congenita del piloro	12	—	10	3	7	3	—	77	e
	f) fessura del palato, becco di lepre	14	—	24	2	12	3	—	188	f
	g) imperforazione dell'ano	4	—	4	—	7	—	—	61	g
	h) malattia cistica dei reni	1	—	1	—	—	—	—	5	h
	i) altre malformazioni congenite specificate	15	1	39	4	33	6	9	310	i
	j) malformazioni congenite non specificate	2	—	7	3	5	—	1	58	j
	Vizi di conformazione congeniti in bambini al disotto di 1 anno	151	4	344	50	222	49	52	2.544	
	Quozienti per 10.000 nati vivi	35	24	34	33	27	28	33	29	
	<b>XV — Malattie particolari della prima infanzia.</b>	<b>1.254</b>	<b>48</b>	<b>3.076</b>	<b>503</b>	<b>2.174</b>	<b>396</b>	<b>411</b>	<b>28.258</b>	
	Quozienti per 10.000 nati vivi	293	284	306	328	264	223	261	320	
158	Debolezza congenita	357	13	899	183	837	120	77	13.515	158
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	637	20	1.507	190	987	184	252	10.327	159
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti)	73	2	155	32	86	26	27	834	160
	a) emorragia intra-cranica o spinale	12	—	40	7	10	9	9	196	a
	b) altre lesioni intra-craniche o spinali	61	—	3	—	—	—	—	7	b
	c) altre lesioni dovute al parto	61	2	112	25	76	17	18	691	c
161	Altre malattie particolari della prima infanzia	187	13	515	98	264	66	55	3.522	161
	a) asfissia durante o dopo la nascita	125	7	317	64	162	36	32	1.902	a
	b) intossicazione da tossiemia materna	3	—	4	1	4	1	—	48	b
	c) infezioni	19	2	54	10	21	4	9	450	c
	d) melena dei neonati	5	—	8	—	6	2	1	97	d
	e) altre malattie specificate	35	4	132	19	71	23	13	1.025	e
	<b>XVI — Senilità, vecchiaia</b>	<b>3.610</b>	<b>113</b>	<b>3.488</b>	<b>557</b>	<b>2.314</b>	<b>789</b>	<b>813</b>	<b>51.108</b>	
	Quozienti per 100.000 abitanti	104	124	57	82	63	87	53	115	
162	Senilità, vecchiaia	3.610	113	3.488	557	2.314	789	813	51.108	162
	a) vecchiaia	50	1	82	21	97	9	1	974	a
	b) senilità con indicazione di demenza senile	127	—	204	5	83	19	51	973	b
	c) senilità senza indicazione di demenza senile	3.433	112	3.202	531	2.134	761	761	47.161	c
	<b>XVII — Morti violente o accidentali</b>	<b>3.667</b>	<b>98</b>	<b>4.421</b>	<b>856</b>	<b>2.097</b>	<b>797</b>	<b>1.768</b>	<b>43.500</b>	
	Quozienti per 100.000 abitanti	105	108	73	127	57	88	116	143	
163-164	Suicidi	314	7	284	34	170	66	110	2.214	163-164
163	Suicidi per avvelenamento	21	—	36	1	8	3	10	157	163
	a) veleni solidi o liquidi, sostanze corrosive	15	—	19	1	6	3	5	117	a
	b) gas tossici	6	—	17	—	2	—	5	40	b
164	Altri suicidi	293	7	248	33	162	63	100	2.057	164
	a) impiccagione e strangolamento	121	5	71	13	62	20	35	732	a
	b) annegamento	51	1	37	7	31	16	9	350	b
	c) armi da fuoco ed esplosivi	57	1	59	6	34	10	22	450	c
	d) strumenti da taglio o punta	14	—	9	1	9	5	3	92	d
	e) precipitazione da un luogo elevato	29	—	37	3	11	7	23	259	e
	f) schiacciamento	13	—	27	2	10	4	5	95	f
	g) altri e non specificati	8	—	8	1	5	1	3	79	g
165-168	Omicidi (b)	247	9	234	21	75	62	41	2.105	165-168
165	Infanticidi (bambini al disotto di un anno)	2	—	1	—	2	1	—	29	165
166	Omicidi con armi da fuoco (persone d'un anno e più)	217	8	209	15	56	52	33	1.658	166
167	Omicidi con strumenti da taglio o punta (persone d'un anno e più)	15	1	8	4	5	2	3	185	167
168	Altri omicidi e non specificati (persone d'un anno e più)	13	—	16	2	12	7	5	233	168

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. — (b) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta palesemente di un delitto, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da una lesione di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Si spiega pertanto come i risultati delle due statistiche differiscano specialmente nel numero degli infanticidi e degli omicidi per avvelenamento, per i quali occorrono indagini che occupano molto tempo per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.



































Segue: Tav. 1. — Morti  
per causa — Regioni  
per Anno

Table with 8 columns: Cause di morte (a), Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria. Rows include various diseases like 'Altre malattie dello stomaco', 'Diarrea ed enterite', 'Appendicite', etc., with corresponding numerical values.

Table with 15 columns: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA, Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.). Rows correspond to the same causes of death as the left table, with regional breakdowns and totals.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 42,







Segue: Tav. 1. — Morti per causa — Regioni 1946

Table showing causes of death by region (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria) for various categories like Malattie infettive e parassitarie, Tuberculosis, and others.

Segue: A n n o 1946

Table showing causes of death by region (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA) for various categories like Malattie infettive e parassitarie, Tuberculosis, and others.

(a) Durante l'anno 1946, non si verificarono in Italia, casi di morte per: peste (N. 3) dell'Elenco nosologico, colera (N. 4), infezione da Brucella abortus Bang (N. 5b), polmonite non specificata (N. 109), incidenti d'automobile per collisioni con vetture tranviarie (N. 170b), mancanza di cure (neonati) (N. 195c), decessi di militari e civili, altre malattie batteriche (eccettuata la dissenteria) (N. 26), febbri ricorrenti (N. 31), febbre gialla (N. 38a), malattie veneree, eccetto la sifilide e la gonococcia (N. 44a), da gas tossici, in seguito ad operazioni di guerra (N. 196a e 197a), decessi di militari per altre cause e non specificate, in seguito ad operazioni di guerra (N. 196c).



















Segue: Tav. 1. - Morti per causa - Regioni Anno 1947

Table with columns: Cause di morte (a), Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria. Rows include categories like I - Malattie infettive e parassitarie, Quozienti per 100.000 abitanti, Malattie batteriche, Febbre tifoidea, etc.

Table with columns: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ITALIA, Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.). Rows correspond to the categories in the first table, showing regional and national mortality figures.

(a) Durante l'anno 1947, non si verificarono in Italia, casi di morte per: peste (N. 3) dell'Elenco nosologico, colera (N. 4), pustola maligna e carbonchio senza altra specificazione (N. 7c), morva e farcino (N. 26a), tularemia (N. 26b), dissenteria da altri protozoi (N. 27c), febbri ricorrenti (N. 31), vaioloide (N. 34b), Vaiolo non specificato (N. 34c), febbre gialla (N. 38a), altre rickettsiosi, escluso il tifo esantematico da pidocchi (N. 39b e 39c), polmonite non specificata (N. 109), decessi di militari e civili, seguito ad operazioni di guerra (N. 196 e 197).















































































Segue : Tav. 3 — Morti per  
Segue : Anno

Table with columns for cause of death (a) and age groups (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59) split by sex (M, F). Rows include categories like Avvelenamenti cronici, Malattie del sistema nervoso, Malattie dell'apparato circolatorio, and Malattie del cuore.

causa, età e sesso  
1943

Table with columns for age groups (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94) split by sex (M, F) and cause of death. Rows include categories like Malattie del sistema nervoso, Malattie dell'apparato circolatorio, and Malattie del cuore.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2.



























Segue: Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso

Table with columns for CAUSE DI MORTE (a), T O T A L E, Meno di 1 mese, Da 1 mese a meno di 1 anno, 1 anno, and detailed sub-categories like XIV - Vizi di conformazione congeniti and XV - Malattie particolari della prima infanzia.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 22. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

causa, età e sesso

Table showing distribution of deaths by age group (2-34 anni) and sex (M, F) for various causes of death, corresponding to the categories in the left table.

1944

155  
156  
a  
b

157  
a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j

158  
159  
160  
a  
b  
c

161  
a  
b  
c  
d  
e

162  
a  
b  
c

163-164  
163  
a  
b  
164  
a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
165-168  
165  
166  
167  
168



segue: Tav. 3. — Morti per  
Segue: A n n o

Table with columns for age groups (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59) and sex (M, F) for various causes of death including infectious diseases, tuberculosis, and syphilis.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 22.

causa, età e sesso  
1 9 4 4

Table with columns for age groups (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90+) and sex (M, F) for various causes of death, including sub-categories for tuberculosis and syphilis.

1 - 26  
1 -  
2 -  
5 -  
a  
c  
6 -  
7 -  
a  
b  
c  
8 -  
9 -  
10 -  
11 -  
12 -  
13 - 22  
13 -  
a  
b  
c  
14 -  
a  
b  
15 -  
a  
b  
16 -  
17 -  
a  
b  
c  
18 -  
19 -  
20 -  
21 -  
a  
b  
22 -  
a  
b  
c  
23 -  
24 -  
a  
b  
c  
d  
25 -  
27 -  
a  
b  
c  
d





















Segue : Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso 1945

Table with columns: Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.), CAUSE DI MORTE (a), TOTALE (M, F, MF), Meno di 1 mese (MF, F), Da 1 mese a meno di 1 anno (MF, F), 1 anno (MF, F). Rows include various diseases like Malaria, Influenza, Vaiolo, etc.

causa, età e sesso 1945

Table with columns: 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5-9 anni, 10-14 anni, 15-19 anni, 20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni, Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.). Rows correspond to the same diseases as in the first table.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 42 — (b) Leishmaniosi. — (c) Altre spirochetosi o spirochetosi non specificate. — (d) Di cui 1 per febbre da pappataci, 1 per altre ossiuriosi, 2 per teniasi, 13 per altri elminti o elminti non specificati. — (g) 2 per bilarzioli, 3 per botriocefalosi, 37 per ascariidiosi, 1 per ossiuriosi, 3 per teniasi, 157 per altri micosi o blastomicetosi, 23 per altre forme di micosi e micosi non specificate. — (i) 6 per actinomicosi, 6 per aspergilliosi e Piede di Madura, 2 per tigna favosa, 1 per malattie veneree o malattie veneree non specificate. — (n) 1 per Quarta malattia, 5 per altre malattie infettive o parassitarie non indicate. — (o) 3 per febbre ghiandolare

malattie dovute o attribuite ad altri virus filtrabili o a virus filtrabili non specificati. — (e) Per febbre da pappataci. — (f) 1 bilarzioli, 3 botriocefalosi, 51 per ascariidiosi, 1 per elminti o elminti non specificati. — (h) 10 per actinomicosi, 1 per aspergilliosi e Piede di Madura, 1 per tricozifzie, 1 per sporotricosi, 52 per oidomicosi o endomicetosi, 2 per blastomicetosi, 46 per oidomicosi e endomicetosi, 11 per altre forme di micosi e micosi non specificate. — (l) Bubbone climatico. — (m) 2 per bubbone climatico, 2 per altre malattie veneree o malattie veneree non specificate. — (n) 1 per Quarta malattia, 17 per altre malattie infettive o parassitarie non indicate.







Segue: Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso Segue: Anno

Table with columns: Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.), CAUSE DI MORTE (a), TOTALE (M, F, MF), Meno di 1 mese (MF, F), Da 1 mese a meno di 1 anno (MF, F), 1 anno (MF, F).

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 42.

causa, età e sesso 1945

Table with columns: 2 anni (MF, F), 3 anni (MF, F), 4 anni (MF, F), 5-9 anni (MF, F), 10-14 anni (MF, F), 15-19 anni (MF, F), 20-24 anni (MF, F), 25-29 anni (MF, F), 30-34 anni (MF, F), Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.).



Segue: Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso  
Segue: Anno 1945

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	TOTALE								Menù di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno		2 anni		3 anni		4 anni		5-9 anni		10-14 anni		15-19 anni		20-24 anni		25-29 anni		30-34 anni		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)		
		M	F	MF	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F				
	<b>XI — Malattie della gravidanza, parto e puerperio</b>		1.556	1.556																																
140	Infezioni in seguito ad aborto		168	168																															140	
	a) aborto spontaneo, provocato per ragioni terapeutiche o di origine non specificata		140	140																															a	
	b) aborto provocato per altre ragioni, escluse le terapeutiche		28	28																															b	
141	Aborto non specificato come settico (senza indicazione di infezione)		50	50																															141	
	a) aborto spontaneo, provocato per ragioni terapeutiche o di origine non specificata		46	46																															a	
	b) aborto provocato per altre ragioni, escluse le terapeutiche		4	4																															b	
142	Gestazione ectopica		96	96																															142	
	a) con indicazione d'infezione		15	15																															a	
	b) con indicazione di emorragia, ma non d'infezione		56	56																															b	
	c) altri casi		25	25																															c	
143	Emorragie della gravidanza		71	71																															143	
	a) emorragia da placenta previa		55	55																															a	
	b) emorragia per separazione prematura della placenta, altre emorragie accidentali prima del parto (aborto escluso)		10	10																															b	
	c) altre emorragie nel corso della gravidanza e non specificate		6	6																																c
144	Tossiemie della gravidanza		227	227																																144
	a) eclampsia gravidica		71	71																																a
	b) albuminuria e nefrite della gravidanza		94	94																																b
	c) atrofia gialla acuta del fegato (gravidica)		31	31																																c
	d) altre		31	31																																d
145	Altre malattie e accidenti della gravidanza		14	14																																145
146	Emorragie nel corso del parto e dello stato puerperale		298	298																																146
	a) emorragie da placenta previa nel corso del parto		47	47																																a
	b) emorragie per distacco prematuro della placenta nel corso del parto		25	25																																b
	c) altre emorragie durante il parto		14	14																																c
	d) emorragie dopo il parto		212	212																																d
147	Infezione durante il parto e lo stato puerperale		343	343																																147
	a) infezioni puerperali generali o locali (tetano puerperale incluso) con indicazione di pielite		2	2																																a
	b) senza indicazione di pielite		284	284																																b
	c) tromboflebite puerperale		17	17																																c
	d) embolia e morte improvvisa puerperale		40	40																																d
148	Tossiemia puerperale		98	98																																148
	a) eclampsia puerperale		67	67																																a
	b) albuminuria e nefrite puerperali		24	24																																b
	c) atrofia gialla acuta del fegato (puerperale)		4	4																																c
	d) altre tossiemie puerperali		3	3																																d
149	Altri accidenti del parto		170	170																																149
	a) lacerazione, rottura, o altri traumatismi degli organi pelvici durante il parto, senza indicazione di emorragia		135	135																																a
	b) altri accidenti		35	35																																b
150	Altre malattie del parto e dello stato puerperale e non specificate		21	21																																150
	b) psicosi puerperali		1	1																																b
	c) altre malattie e non specificate		20	20																																c
	<b>XII — Malattie della pelle e del tessuto cellulare</b>	1.086	919	2.005	94	41	341	172	110	58	32	15	15	10	14	7	41	14	46	20	62	27	54	31	48	27	50	24								
151	Foruncolo	161	106	267	5	1	23	9	8	4	2		2			7		7	3	12	7	12	8	11	7	12	6	151								
152	Flemmone, ascesso caldo, cellulite	723	596	1.319	59	30	184	85	60	35	23	12	11	6	10	4	30	12	36	17	45	18	38	20	31	16	34	14	152							
153	Altre malattie della pelle, dei suoi annessi e del tessuto cellulare	202	217	419	30	10	134	78	42	19	7	3	2	2	4	3	4	2	3		5	2	4	3	6	4	4	4	153							
	<b>XIII — Malattie delle ossa e degli organi della locomozione</b>	469	324	793	5	3	31	16	22	11	19	9	17	6	18	6	110	47	106	36	55	11	33	11	18	2	20	13								
154	Osteomielite e periostite	339	207	546	3	1	22	12	14	9	16	8	16	6	17	6	103	44	101	34	46	8	22	6	10		16	10	154							
	a) osteomielite e periostite acuta	89	64	153	1		11	8	3	2	4	2	5	2	7	2	37	16	46	20	14	2	3	6	10		6	4	a							
	b) osteomielite e periostite cronica	11	10	21			1										3	1	2		2		2	1	2		2	1	b							
	c) osteomielite e periostite non specificata	239	133	372	2	1	10	4	11	7	12	6	11	4	10	4	63	27	53	14	32	6	17	4	8		8	5	c							

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 42.













Segue : Tav. 3. — Morti per  
Segue : A n n o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)										Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni		
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
79	Avvelenamenti cronici da altre sostanze minerali od organiche										79
	b) avvelenamenti da stupefacenti e sonniferi										b
	c) altri avvelenamenti non professionali										c
	d) avvelenamenti non specificati										d
	<b>VI — Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi</b>										
80	797	363	1.023	479	1.443	741	2.318	1.234	3.718	1.945	80
	Encefalite (non epidemica)										
	a) ascesso intracranico										a
	b) altre forme di encefalite										b
81	89	47	75	29	69	28	67	31	54	18	81
	Meningite non meningococcica										
	a) meningite semplice										a
	b) meningite cerebro-spinale acuta non meningococcica										b
82	45	18	50	21	53	22	54	25	80	38	82
	Malattie del midollo spinale										
83	280	134	529	239	937	490	1.776	931	3.160	1.674	83
	Lesioni intracraniche d'origine vascolare										
	a) emorragia cerebrale										a
	b) embolia e trombosi cerebrale										b
	c) rammollimento del cervello										c
	d) emiplegia ed altre paralisi da cause non specificate										d
	e) altre lesioni intracraniche										e
84	155	65	148	87	186	113	201	135	214	122	84
	Malattie e deficienze mentali										
	a) deficienza mentale										a
	b) schizofrenia (demenza precoce)										b
	c) psicosi maniaco-depressiva										c
	d) altre										d
85	102	43	111	49	73	36	83	37	66	35	85
	Epilessia										
86	Convulsioni dei bambini di età inferiore ai 5 anni										86
87	63	34	44	20	54	29	66	39	81	34	87
	Altre malattie del sistema nervoso										
	a) corea										a
	b) nevrite (non reumatica)										b
	c) paralisi agitante										c
	d) sclerosi a placche										d
	e) altre										e
88	Malattie degli organi della vista										88
89	30	8	25	12	24	6	23	8	29	9	89
	Malattie dell'orecchio e dei seni mastoidei										
	a) otite e altre malattie dell'orecchio senza indicazione d'affezione mastoidea										a
	b) malattie dei seni mastoidei										b
	<b>VII — Malattie dell'apparato circolatorio</b>										
90 - 95	1.483	831	1.948	1.020	2.621	1.340	3.410	1.731	5.117	2.729	90 - 95
	Malattie del cuore										
90	11	6	9	1	11	8	4	3	9	4	90
	Pericardite										
	a) pericardite cronica, specificata come reumatica										a
	b) altre										b
91	43	34	32	19	31	13	27	15	18	8	91
	Endocardite acuta non reumatica										
	a) endocardite batterica acuta										a
	b) endocardite batterica sub-acuta										b
	c) altre forme di endocardite acuta o sub-acuta (escluse le forme arteriosclerotiche)										c
92	642	388	724	444	840	508	917	554	1.233	761	92
	Afferzioni croniche delle valvole cardiache e dell'endocardio										
	a) malattie dell'orificio aortico, senza lesione della mitrale										a
	b) altre affezioni valvolari precisate, comprese quelle da reumatismo articolare acuto										b
	c) lesioni valvolari non specificate o endocardite non specificata										c
93	358	230	394	257	416	263	398	250	537	335	93
	Malattie del miocardio										
	a) miocardite acuta										a
	b) miocardite cronica, specificata come reumatica										b
	c) degenerazione e infarto cardiaco; sclerosi del miocardio o miocardite cronica, non specificata come reumatica										c
	d) miocardite non specificata come acuta o cronica										d
94	56	6	144	22	260	34	353	70	459	111	94
	Malattie delle arterie coronarie ed angina di petto										
	a) malattie delle arterie coronarie										a
	b) angina di petto, senza indicazione di malattia delle arterie coronarie										b

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 42.

causa, età e sesso  
1945

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)																				Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	
	60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90 - 94		Età ignota							
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F						
79	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
	b) avvelenamenti da stupefacenti e sonniferi																				b	
	c) altri avvelenamenti non professionali																				c	
	d) avvelenamenti non specificati																				d	
	<b>VI — Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi</b>																					
	5.582	2.889	8.556	4.262	11.051	5.459	11.517	5.653	7.368	3.731	2.647	1.401	507	289	52	34	80					
	Encefalite (non epidemica)																					
	a) ascesso intracranico																				a	
	b) altre forme di encefalite																				b	
81	44	23	43	16	20	7	17	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	
	Meningite non meningococcica																					
	a) meningite semplice																				a	
	b) meningite cerebro-spinale acuta non meningococcica																				b	
82	107	52	77	35	88	37	57	24	32	17	11	6	2	2	1	—	—	—	—	—	82	
	Malattie del midollo spinale																					
83	4.996	2.579	8.082	4.028	10.702	5.290	11.270	5.542	7.249	3.665	2.615	1.382	498	281	40	24	83					
	Lesioni intracraniche d'origine vascolare																					
	a) emorragia cerebrale																				a	
	b) embolia e trombosi cerebrale																				b	
	c) rammollimento del cervello																				c	
	d) emiplegia ed altre paralisi da cause non specificate																				d	
	e) altre lesioni intracraniche																				e	
84	189	113	96	53	57	32	31	15	13	10	4	3	2	2	3	3	84					
	Malattie e deficienze mentali																					
	a) deficienza mentale																				a	
	b) schizofrenia (demenza precoce)																				b	
	c) psicosi maniaco-depressiva																				c	
	d) altre																				d	
85	62	34	49	20	36	20	19	10	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	
	Epilessia																					
86	Convulsioni dei bambini di età inferiore ai 5 anni																				86	
87	116	59	162	83	113	55	95	41	48	27	14	10	2	2	4	4	87					
	Altre malattie del sistema nervoso																					
	a) corea																				a	
	b) nevrite (non reumatica)																				b	
	c) paralisi agitante																				c	
	d) sclerosi a placche																				d	
	e) altre																				e	
88	Malattie degli organi della vista																				88	
89	36	12	16	10	14	7	11	5	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	
	Malattie dell'orecchio e dei seni mastoidei																					
	a) otite e altre malattie dell'orecchio senza indicazione d'affezione mastoidea																				a	
	b) malattie dei seni mastoidei																				b	
	<b>VII — Malattie dell'apparato circolatorio</b>																					
90 - 95	7.691	4.280	11.996	6.845	15.474	8.840	16.170	9.416	11.511	6.814	4.683	2.864	1.064	702	103	69	90 - 95					
	Malattie del cuore																					
90	7	4	6	2	9	6	8	3	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	
	Pericardite																					
	a) pericardite cronica, specificata come reumatica																				a	
	b) altre																				b	
91	34	17	26	14	22	13	11	6	12	5	1	—	—	—	3	2	91					
	Endocardite acuta non reumatica																					
	a) endocardite batterica acuta																				a	
	b) endocardite batterica sub-acuta																				b	
	c) altre forme di endocardite acuta o sub-acuta (escluse le forme arteriosclerotiche)																				c	
92	1.711	1.079	2.617	1.630	2.992	1.809	2.891	1.718	1.695	1.047	577	359	110	65	15	9	92					
	Afferzioni croniche delle valvole cardiache e dell'endocardio																					
	a) malattie dell'orificio aortico, senza lesione della mitrale																				a	
	b) altre affezioni valvolari precisate, comprese quelle da reumatismo articolare acuto																				b	
	c) lesioni valvolari non specificate o endocardite non specificata																				c	
93	3.571	1.970	5.910	3.329	8.267	4.681	9.412	5.471	7.120	4.164	3.009	1.824	720	480	50	35	93					
	Malattie del miocardio																					
	a) miocardite acuta																				a	
	b) miocardite cronica, specificata come reumatica																				b	
	c) degenerazione e infarto cardiaco; sclerosi del miocardio o miocardite cronica, non specificata come reumatica																				c	
	d) miocardite non specificata come acuta o cronica																				d	
94	557	165	609	203	626	249	454	201	226	107	86	46	16	12	1	—	94					
	Malattie delle arterie coronarie ed angina di petto																					
	a) malattie delle arterie coronarie																				a	
	b) angina di petto, senza indicazione di malattia delle arterie coronarie																				b	









Segue : Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso  
Segue : Anno

Table with columns for age groups (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59) and sex (M, F). Rows list causes of death from 169 to 200, including accidents, deaths of military and civilians, and undetermined causes.

causa, età e sesso  
1945

Table with columns for age groups (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94) and sex (M, F). Rows list causes of death from 169 to 200, including accidents, deaths of military and civilians, and undetermined causes.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 42.



Segue: Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso

Segue: Anno 1946

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE), age groups (2-34 years), and sex (M, F, MF). Rows include various diseases like malaria, influenza, and cancer.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 62. — (b) Di cui 99 per leishmaniosi, 2 per altre malattie dovute a protozoi parassiti o a protozoi non indicati, 2 per spirochetosi o spirochetosi non specificate. — (f) Febbre da pappataci. — (g) 38 per ascariidiosi, 5 per ossiuriosi, 1 per teniasi, 109 per altri elminti o elminti non specificati, 7 per altre forme di micosi o micosi non specificate. (l) 1 per actinomicosi, 45 per oidiomicosi o endomicetosi, 2 per altre forme di micosi e micosi non specificate. — (m) 1 per Pfeiffer, 1 per quarta malattia, 1 per rinoscleroma, 6 per altre malattie infettive o parassitarie o non indicate.

(c) Leishmaniosi. — (d) 1 per spirochetosi bronco-polmonare, 5 per spirochetosi o spirochetosi non specificate. — (e) 2 per spirochetosi bronco-polmonare, 9 per altre febbre ghiandolare di Pfeiffer, 1 per quarta malattia, 4 per rinoscleroma, 8 per altre malattie infettive o parassitarie o non indicate. — (n) 1 per febbre ghiandolare di Pfeiffer, 1 per quarta malattia, 4 per rinoscleroma, 8 per altre malattie infettive o parassitarie o non indicate. — (i) 6 per actinomicosi, 65 per oidiomicosi o endomicetosi.











Segue: Tav. 3. - Morti per
Segue: Anno

causa, età e sesso
1946

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE), total counts, and age groups (Meno di 1 mese, Da 1 mese a meno di 1 anno, 1 anno). Rows include categories like XI - Malattie della gravidanza, parto e puerperio, and XII - Malattie della pelle e del tessuto cellulare.

Table with columns for age groups (2 anni, 3 anni, 4 anni, 5-9 anni, 10-14 anni, 15-19 anni, 20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni) and sex (M, F). Includes a column for 'Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)' at the end of each row.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 62.





Segue : Tav. 3. - Morti per  
Segue : Anno

Table with multiple columns: CAUSE DI MORTE (a), age groups (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-), and sex (MF, F). Rows include categories like I - Malattie infettive e parassitarie, with sub-entries for various diseases such as Meningite cerebro-spinale epidemica, Tuberculosis, and Lebbra.

causa, età e sesso  
1946

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 62.









Segue: Tav. 3. — Morti per  
Segue: Anno

Table with columns for age groups (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59), sex (MF, F), and cause of death. Includes categories like 'Altre malattie del cuore', 'VIII - Malattie dell'apparato respiratorio', and 'IX - Malattie dell'apparato digerente'.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 62.

causa, età e sesso  
1946.

Table with columns for age groups (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-ω), sex (MF, F), and cause of death. Includes categories like 'Altre malattie del cuore', 'VIII - Malattie dell'apparato respiratorio', and 'IX - Malattie dell'apparato digerente'.















Segue: Tav. 3. - Morti per  
Segue: Anno

Table with columns: Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.), CAUSE DI MORTE (a), and sub-columns for duration (Meno di 1 mese, Da 1 mese a meno di 1 anno, 1 anno) and sex (M, F, MF).

causa, età e sesso  
1947

Table with columns for age groups (2 anni, 3 anni, 4 anni, 5-9 anni, 10-14 anni, 15-19 anni, 20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni) and sex (MF, F), plus a final column for Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.).

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 82. (b) Di cui 37 per tossiemie o tossinfezioni diverse, 164 per altre malattie generali o malattie non indicate, 1 per diarrea della Cocincina della Sprue, 8 per diabete insipido, 15 per favismo.

(Sprue), 14 per diabete insipido, 41 per favismo. - (c) 32 per tossiemie o tossinfezioni diverse, 119 per altre malattie generali o malattie non indicate, 1 per diarrea











Segue : Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso 1947

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE), total deaths, and deaths by duration (Meno di 1 mese, Da 1 mese a meno di 1 anno, 1 anno). Rows include Morti accidentali, Accidents by mode (road, water, air, agriculture), poisoning, and non-determined causes.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 82.

segue: Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso 1947

Table showing the distribution of deaths by age group (2 anni, 3 anni, 4 anni, 5-9 anni, 10-14 anni, 15-19 anni, 20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni) and sex (M, F). Rows correspond to the same categories as the first table.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 82.











Segue: Tav. 3. — Morti per Segue: Anno

Table with columns for age groups (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59) and sex (MF, F), listing causes of death and their respective counts.

causa, età e sesso 1947

Table with columns for age groups (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94) and sex (MF, F), listing causes of death and their respective counts.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 82.

Segue : Tav. 3. — Morti per causa, età e sesso  
Segue : Anno

Table with columns for age groups (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59) and sex (MF, F) for various causes of death (118-129 and X - Malattie dell'apparato urinario...).

causa, età e sesso  
1947

Table with columns for age groups (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-ω) and sex (MF, F) for various causes of death (118-139).

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 82.





Segue: Tav. 3. — Morti per  
Segue: A n n o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
169 - 195	Morti accidentali . . . . .	1.002	141	919	113	889	139	846	161	935	189
169	Accidenti dovuti a ferrovie e tranvie . . . . .	57	5	30	7	41	7	35	9	35	4
170	Accidenti d'automobile . . . . .	189	24	167	10	162	20	139	24	149	28
	a) collisioni con treni . . . . .	—	—	2	—	1	—	—	—	3	1
	b) collisioni con vetture tranviarie . . . . .	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
	c) altri accidenti d'automobile . . . . .	188	23	165	10	160	20	138	23	146	27
171	Altri accidenti di trasporto su vie e strade, non compresi gli accidenti d'automobile . . . . .	57	6	64	9	58	7	80	17	75	11
	a) accidenti dovuti a tranvie su vie o strade . . . . .	6	2	12	3	17	3	15	3	24	1
	b) tutti gli altri accidenti di trasporto su vie o strade . . . . .	51	4	52	6	41	4	65	14	51	10
172	Accidenti da trasporti per acqua . . . . .	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—
173	Accidenti da trasporti aerei . . . . .	9	1	1	—	1	—	—	—	—	—
174	Accidenti nelle miniere e cave . . . . .	16	1	16	—	15	—	10	—	5	—
175	Accidenti agricoli e forestali . . . . .	21	3	33	1	32	3	21	—	32	2
	a) accidenti dovuti a macchine o veicoli agricoli (all'infuori degli accidenti stradali) . . . . .	2	—	10	—	7	—	—	—	7	2
	b) accidenti dovuti ad animali in occasione di lavori agricoli . . . . .	3	—	3	—	6	—	6	—	2	—
	c) altri . . . . .	16	3	20	1	19	3	15	—	23	—
176	Accidenti causati da macchine . . . . .	8	—	7	—	5	—	3	—	3	—
177	Avvelenamenti da alimenti . . . . .	1	1	7	4	10	4	1	1	6	1
178	Absorbimento accidentale di gas tossici . . . . .	22	10	17	2	27	8	29	11	17	5
179	Altri avvelenamenti accidentali acuti, esclusi quelli da gas . . . . .	9	4	9	3	6	1	11	5	10	4
180	In seguito ad incendi . . . . .	6	3	8	3	5	2	5	3	6	2
181	Ustione accidentale (diversa da quella per incendio) . . . . .	27	8	26	10	22	9	16	7	20	8
182	Soffocazione meccanica accidentale . . . . .	2	—	5	1	4	2	6	2	6	—
183	Annegamento accidentale . . . . .	50	13	48	4	57	7	45	7	49	16
184	Traumatismo accidentale causato da armi da fuoco . . . . .	28	3	18	1	10	4	8	—	8	2
185	Traumatismo accidentale da strumenti da punta o taglio . . . . .	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—
186	Traumatismo accidentale per caduta, schiacciamento, frana, ecc. . . . .	163	21	170	17	172	32	175	31	206	42
187	Cataclisma . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Violenze di animali . . . . .	7	2	2	—	1	—	4	2	7	1
189	Fame o sete . . . . .	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—
190	Freddo eccessivo . . . . .	5	—	7	1	17	3	13	2	28	5
191	Calore eccessivo . . . . .	8	1	20	3	18	—	29	2	33	4
192	Fulmine . . . . .	15	4	20	9	10	2	8	1	14	6
193	Altri accidenti dovuti a corrente elettrica . . . . .	38	3	26	3	16	2	7	1	11	1
194	Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3
195	Altri accidenti . . . . .	260	25	216	24	199	26	195	35	209	44
	a) vaccino generalizzato e altri accidenti da vaccinazione antiva iolosa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri accidenti da intervento medico o chirurgico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) mancanze di cure (neonati) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) altri e non specificati . . . . .	260	25	216	24	199	26	195	35	209	44
198	Esecuzione giudiziaria . . . . .	3	—	2	1	2	—	—	—	—	—
<b>XVIII — Cause di morte non determinate . . . . .</b>		<b>234</b>	<b>98</b>	<b>355</b>	<b>123</b>	<b>437</b>	<b>170</b>	<b>535</b>	<b>202</b>	<b>700</b>	<b>301</b>
199	Morte improvvisa . . . . .	100	34	143	39	204	69	229	77	289	106
200	Cause non specificate o mal definite . . . . .	134	64	212	84	233	101	306	125	411	195
	a) cause mal definite . . . . .	88	41	155	64	174	76	237	95	320	152
	b) « trovato morto », causa sconosciuta . . . . .	1	1	—	—	1	—	1	—	6	3
	c) altri decessi da cause sconosciute o non specificate . . . . .	45	22	57	20	58	25	68	29	85	40
<b>COMPLESSO . . . . .</b>		<b>12.505</b>	<b>5.827</b>	<b>13.879</b>	<b>5.872</b>	<b>16.528</b>	<b>7.043</b>	<b>19.372</b>	<b>8.471</b>	<b>24.700</b>	<b>11.387</b>

causa, età e sesso  
1947

		60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90 - 94		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
169 - 195		869	194	805	182	742	243	590	235	352	146	147	78	36	26	104	20	169 - 195
169		20	8	22	3	11	5	16	4	6	3	2	—	—	—	1	—	169
170		133	23	92	18	94	24	57	18	31	7	10	4	2	1	14	1	170
	a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	c)	133	23	92	18	94	24	57	18	31	7	10	4	2	1	14	1	c
171		67	14	54	12	61	18	45	18	19	7	8	1	1	—	3	—	171
	a)	15	3	14	4	21	7	14	5	6	3	2	—	—	—	2	—	a
	b)	52	11	40	8	40	11	31	13	13	4	6	1	1	—	1	—	b
172		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172
173		2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
174		4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175		30	3	26	—	9	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	175
	a)	3	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	a
	b)	27	3	20	—	7	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	c)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
176		2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	176
177		2	1	3	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	2	177
178		22	10	20	7	26	12	12	3	10	6	1	—	—	—	—	—	178
179		6	2	4	1	7	2	5	1	4	2	—	—	—	—	—	—	179
180		1	—	2	1	2	1	5	2	3	1	—	—	—	—	1	1	180
181		28	13	17	9	33	16	38	24	32	22	7	3	3	3	5	2	181
182		5	—	4	2	8	3	1	—	—	—	1	1	—	—	3	—	182
183		44	11	49	7	37	10	28	9	13	3	8	1	1	—	18	1	183
184		6	3	6	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	1	184
185		—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	185
186		210	58	260	60	223	81	227	97	130	60	62	37	9	8	18	3	186
187		—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
188		7	3	5	—	3	—	2	—	2	2	—	—	—	—	1	—	188
189		—	—	3	2	1	—	1	—	2	2	1	1	—	—	1	1	189
190		30	5	25	3	24	4	12	5	11	3	5	2	—	—	4	1	190
191		38	3	22	5	24	5	5	2	5	1	1	—	—	—	1	—	191
192		7	—	3	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192
193		6	—	5	1	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	193
194		—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194
195		198	35	181	45	173	57	121	48	80	26	41	28	17	12	26	7	195
	a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
	d)	197	35	180	45	173	57	121	48	80	26	41	28	17	12	26	7	d
198		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198
<b>XVIII — Cause di morte non determinate . . . . .</b>		<b>1.072</b>	<b>502</b>	<b>1.115</b>	<b>512</b>	<b>1.298</b>	<b>579</b>	<b>1.194</b>	<b>573</b>	<b>915</b>								

Segue: Tav. 3. — Morti per Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)									
	TOTALE			Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno		
	M	F	MF	MF	F	MF	F	MF	F	
<b>I — Malattie infettive e parassitarie.</b>	<b>26.133</b>	<b>21.659</b>	<b>47.792</b>	<b>646</b>	<b>276</b>	<b>3.299</b>	<b>1.583</b>	<b>2.002</b>	<b>926</b>	
1-26 <b>Malattie batteriche</b>	<b>20.396</b>	<b>16.901</b>	<b>37.297</b>	<b>240</b>	<b>97</b>	<b>1.794</b>	<b>917</b>	<b>1.371</b>	<b>631</b>	
1 Febbre tifoidea	1.321	1.659	2.980	—	—	18	6	29	19	
2 Infezioni paratifiche	81	99	180	—	—	1	1	5	2	
5 Febbre ondulante	161	94	255	—	—	1	—	2	—	
a) infezione da Brucella melitense (melitococcia)	148	90	238	—	—	—	—	—	—	
b) infezione da Brucella abortus Bang	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
c) senza altra indicazione	11	4	15	—	—	—	—	1	—	
6 Meningite cerebro-spinale epidemica (meningococcia)	119	91	210	3	2	74	34	29	9	
7 Pustola maligna e carbonchio (Bacillus anthracis)	32	8	40	—	—	—	—	—	—	
a) pustola maligna	27	7	34	—	—	—	—	—	—	
b) forme setticemiche e localizzazioni viscerali	5	1	6	—	—	—	—	—	—	
8 Scarlattina	25	36	61	—	—	5	2	12	7	
9 Pertosse	362	519	881	32	14	586	336	179	112	
10 Difterite	586	446	1.032	13	4	195	91	352	138	
11 Risipola	120	132	252	30	16	19	9	4	2	
12 Tetano	493	366	859	118	42	6	2	7	2	
13-22 <b>Tuberculosisi.</b>	<b>15.963</b>	<b>12.175</b>	<b>28.138</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>490</b>	<b>241</b>	<b>592</b>	<b>256</b>	
13 Tuberculosisi dell'apparato respiratorio (compresi i gangli tracheo-bronchiali)	12.982	8.886	21.868	—	—	136	60	174	78	
a) con indicazione di malattia professionale del polmone	27	2	29	—	—	—	—	—	—	
b) senza indicazione di malattia professionale del polmone	12.945	8.874	21.819	—	—	136	60	174	78	
c) tuberculosisi non specificate	10	10	20	—	—	—	—	—	—	
14 Tuberculosisi delle meningi e del sistema nervoso centrale	1.553	1.642	3.195	4	1	296	154	349	157	
a) meningi	1.543	1.633	3.176	4	1	296	154	348	156	
b) altre localizzazioni	10	9	19	—	—	—	—	1	1	
15 Tuberculosisi degli intestini e del peritoneo (compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali)	350	538	888	1	—	12	5	22	8	
a) intestino	92	113	205	—	—	3	1	8	4	
b) altre localizzazioni	258	425	683	1	—	9	4	14	4	
16 Tuberculosisi della colonna vertebrale	241	210	451	—	—	—	—	7	3	
17 Tuberculosisi delle ossa e delle articolazioni, esclusa la colonna vertebrale	261	271	532	—	—	5	1	2	1	
a) ossa (esclusa la colonna vertebrale)	155	177	332	—	—	1	—	1	1	
b) articolazioni	76	64	140	—	—	4	1	1	—	
c) mista o non specificata	30	30	60	—	—	—	—	—	—	
18 Tuberculosisi della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo	15	21	36	—	—	—	—	—	—	
19 Tuberculosisi del sistema linfatico	41	33	74	—	—	3	2	4	—	
20 Tuberculosisi dell'apparato genito-urinario	170	131	301	—	—	—	—	—	—	
21 Tuberculosisi: altre localizzazioni	8	6	14	—	—	—	—	—	—	
a) malattia d'Addison indicata come di natura tubercolare	2	3	5	—	—	—	—	—	—	
b) altre	6	3	9	—	—	—	—	—	—	
22 Tuberculosisi disseminate	342	437	779	—	—	38	19	34	9	
a) acuta (miliare)	260	320	580	—	—	35	18	30	8	
b) cronica	2	3	5	—	—	—	—	—	—	
c) non specificata	80	114	194	—	—	3	1	4	1	
23 Lebbra	9	8	17	—	—	—	—	—	—	
24 Infezione purulenta e setticemia (non dipendenti dalla gravidanza, parto e puerperio)	1.116	1.265	2.381	39	18	399	195	160	84	
a) setticemia	959	1.108	2.067	31	14	347	168	143	75	
b) piemia o pioemia	99	105	204	6	3	37	21	11	6	
c) gangrena gassosa	18	13	31	—	—	1	—	—	—	
d) colibacillosi generalizzata	40	39	79	2	1	14	6	6	3	
25 Infezione gonococcica (tutte le forme e localizzazioni)	7	3	10	—	—	—	—	—	—	
26 Altre malattie batteriche (eccettuata la dissenteria)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
b) tularemia	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
27 Dissenteria	65	40	105	—	—	12	5	9	4	
a) bacillare	9	13	22	—	—	5	4	5	—	
b) amebica	29	11	40	—	—	1	—	1	—	
d) non specificata o dovuta ad altre cause	27	16	43	—	—	6	1	3	4	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso 1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	DISTRIBUZIONE PER ETÀ E SESSO																				Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
	2 anni		3 anni		4 anni		5-9 anni		10-14 anni		15-19 anni		20-24 anni		25-29 anni		30-34 anni				
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F			
<b>I — Malattie infettive e parassitarie.</b>	<b>986</b>	<b>474</b>	<b>569</b>	<b>287</b>	<b>475</b>	<b>238</b>	<b>1.592</b>	<b>815</b>	<b>1.318</b>	<b>711</b>	<b>2.792</b>	<b>1.582</b>	<b>4.328</b>	<b>2.174</b>	<b>4.062</b>	<b>1.924</b>	<b>2.986</b>	<b>1.347</b>			
1-26 <b>Malattie batteriche</b>	<b>755</b>	<b>357</b>	<b>440</b>	<b>226</b>	<b>366</b>	<b>189</b>	<b>1.324</b>	<b>696</b>	<b>1.181</b>	<b>647</b>	<b>2.648</b>	<b>1.531</b>	<b>4.123</b>	<b>2.073</b>	<b>3.884</b>	<b>1.824</b>	<b>2.789</b>	<b>1.264</b>	<b>1-26</b>		
1 Febbre tifoidea	59	23	39	28	51	27	275	156	312	184	561	293	438	224	257	179	161	108	1		
2 Infezioni paratifiche	6	3	3	2	3	2	21	11	17	5	20	8	19	9	13	9	8	5	2		
5 Febbre ondulante	—	—	—	—	—	—	2	1	7	2	10	8	15	4	16	8	12	1	5		
a) infezione da Brucella melitense (melitococcia)	—	—	—	—	—	—	2	1	7	2	9	7	15	4	16	8	11	1	a		
b) infezione da Brucella abortus Bang	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b		
c) senza altra indicazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	c		
6 Meningite cerebro-spinale epidemica (meningococcia)	9	5	8	2	9	6	22	10	14	5	11	5	6	4	4	1	2	1	6		
7 Pustola maligna e carbonchio (Bacillus anthracis)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	1	—	5	—	2	—	7		
a) pustola maligna	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	—	4	—	1	—	a		
b) forme setticemiche e localizzazioni viscerali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	b		
8 Scarlattina	1	1	4	1	2	—	10	6	4	2	6	3	4	4	3	1	3	3	8		
9 Pertosse	45	32	17	13	6	3	9	5	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	9		
10 Difterite	183	73	100	37	53	29	76	43	12	6	12	6	6	4	5	4	4	2	10		
11 Risipola	2	2	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3	2	11		
12 Tetano	10	5	13	4	12	4	69	27	70	13	62	23	47	19	23	19	30	24	12		
13-22 <b>Tuberculosisi.</b>	<b>370</b>	<b>179</b>	<b>218</b>	<b>119</b>	<b>203</b>	<b>104</b>	<b>743</b>	<b>395</b>	<b>659</b>	<b>389</b>	<b>1.875</b>	<b>1.137</b>	<b>3.482</b>	<b>1.743</b>	<b>3.462</b>	<b>1.550</b>	<b>2.487</b>	<b>1.068</b>	<b>13-22</b>		
13 Tuberculosisi dell'apparato respiratorio (compresi i gangli tracheo-bronchiali)	93	43	35	18	48	23	154	96	227	164	1.268	813	2.883	1.434	3.007	1.294	2.188	905	13		
a) con indicazione di malattia professionale del polmone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a		
b) senza indicazione di malattia professionale del polmone	93	43	35	18	48	23	154	96	227	164	1.268	813	2.881	1.433	3.005	1.293	2.183	903	b		
c) tuberculosisi non specificate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	5	2	c		
14 Tuberculosisi delle meningi e del sistema nervoso centrale	234	112	149	78	123	64	455	230	306	148	372	192	306	165	168	105	100	55	14		
a) meningi	234	112	149	78	123	64	453	229	305	148	372	192	306	165	168	105	99	54	a		
b) altre localizzazioni	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	b		
15 Tuberculosisi degli intestini e del peritoneo (compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali)	14	5	14	10	11	3	46	25	38	26	80	49	94	54	103	68	65	45	15		
a) intestino	2	—	—	—	—	—	3	1	3	2	17	11	23	13	25	13	11	6	a		
b) altre localizzazioni	12	5	14	10	11	3	43	24	35	24	63	38	71	41	78	55	54	39	b		
16 Tuberculosisi della colonna vertebrale	2	—	2	1	5	3	16	6	18	8	12	6	38	11	44	15	36	11	16		
17 Tuberculosisi delle ossa e delle articolazioni, esclusa la colonna vertebrale	4	2	2	1	4	2	17	9	17	6	26	10	35	8	39	12	23	6	17		
a) ossa (esclusa la colonna vertebrale)	1	1	1	1	1	—	9	5	9	4	14	7	15	5	23	8	12	4	a		
b) articolazioni	2	1	1	—	3	2	6	2	7	2	10	3	14	2	14	3	8	2	b		
c) mista o non specificata	1	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	—	6	1	2	—	1	—	c		
18 Tuberculosisi della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo	2	—	—																		

Segue: Tav. 3. — Morti per  
Segue: A n n o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	TOTALE			Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno	
		M	F	MF	MF	F	MF	F	MF	F
28 - 29	Malattie dovute a protozoi . . . . .	188	117	305	—	—	26	16	57	22
28	Malaria (paludismo) . . . . .	121	70	191	—	—	11	6	14	6
	a) terzana benigna . . . . .	—	2	2	—	—	—	2	—	—
	c) terzana maligna (tropicale) e febbre biliosa-emoglobinurica . . . . .	7	4	11	—	—	1	—	1	—
	d) altre forme o non specificate . . . . .	114	64	178	—	—	8	4	13	6
29	Altre malattie dovute a protozoi parassiti (eccettuato le spirochete) (b)	67	47	114	—	—	15	10	43	16
30 - 32	Malattie dovute a spirochete . . . . .	1.785	857	2.642	232	99	429	178	55	23
30	Sifilide . . . . .	1.758	847	2.605	232	99	427	176	51	21
	a) atassia locomotrice (tabe dorsale) . . . . .	130	57	187	—	—	—	—	—	—
	b) paralisi generale progressiva . . . . .	349	123	472	—	—	—	—	—	—
	c) aneurisma dell'aorta . . . . .	292	124	416	—	—	—	—	—	—
	d) altre forme di sifilide . . . . .	987	543	1.530	232	99	427	176	51	21
32	Altre malattie dovute a spirochete . . . . .	27	10	37	—	—	2	2	4	2
	a) spirochetosi ittero-emorragica . . . . .	22	4	26	—	—	—	—	—	—
	b) altre . . . . . (d)	5	6	11	—	—	2	2	3	2
33 - 38	Malattie dovute o attribuite a virus filtrabili . . . . .	3.044	3.198	6.242	124	53	979	440	456	222
33	Influenza (grippe) . . . . .	2.510	2.709	5.219	119	51	777	346	229	106
	a) con complicazioni respiratorie dichiarate . . . . .	1.802	1.907	3.709	72	33	579	256	171	82
	b) senza complicazioni respiratorie dichiarate . . . . .	708	802	1.510	47	18	198	90	58	24
34	Vaiolo . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—
35	Morbillo . . . . .	197	187	384	2	1	112	53	150	73
36	Poliomielite anteriore acuta e polioencefalite acuta . . . . .	141	138	279	3	1	70	34	72	40
37	Encefalite infettiva acuta (letargica o epidemica) . . . . .	120	123	243	—	—	1	—	1	—
	a) encefalite letargica (o epidemica) acuta . . . . .	3	4	7	—	—	—	—	—	—
	b) postumi d'encefalite letargica . . . . .	99	85	184	—	—	—	—	—	—
	c) encefalite letargica (o epidemica) senz'altra specificazione . . . . .	18	34	52	—	—	1	—	1	—
38	Altre malattie dovute o attribuite a virus filtrabili . . . . .	75	41	116	—	—	19	7	4	3
	b) rabbia . . . . .	59	24	83	—	—	—	—	—	—
	c) Herpes zoster (Zona) . . . . .	1	4	5	—	—	—	—	—	—
	d) rosolia . . . . .	2	—	2	—	—	2	—	—	—
	e) varicella . . . . .	13	13	26	—	—	17	7	4	3
39	Malattie dovute o attribuite a rickettsie . . . . .	2	7	9	—	—	—	—	—	—
39	Tifo petecchiale e altre malattie legate al tifo (rickettsiosi) . . . . .	2	7	9	—	—	—	—	—	—
	a) tifo esantematico (da pidocchi) . . . . .	1	2	3	—	—	—	—	—	—
	b) malattie legate al tifo, trasmesse da altri vettori . . . . .	1	2	3	—	—	—	—	—	—
	c) altre rickettsiosi e non specificate . . . . .	—	3	3	—	—	—	—	—	—
40 - 42	Malattie dovute ad elminti . . . . .	182	193	375	—	—	20	14	45	20
40	Anchilostomiasi . . . . .	4	8	12	—	—	1	1	—	—
41	Malattia idatica . . . . .	65	51	116	—	—	—	—	—	—
	a) fegato . . . . .	34	26	60	—	—	—	—	—	—
	b) altre localizzazioni o non specificate . . . . .	31	25	56	—	—	—	—	—	—
42	Altre malattie dovute ad elminti (f)	113	134	247	—	—	19	13	45	20
43	Malattie dovute a funghi (Micosi) (h)	69	57	126	50	27	37	12	6	3
44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	402	289	691	—	—	2	1	3	1
	a) malattie veneree, eccetto la sifilide e la gonococchia . . . . .	2	6 (i)	8	—	—	1	1	—	—
	b) linfogranulomatosi maligna (malattia di Hodgkin) . . . . .	390	276	666	—	—	1	—	1	—
	c) parotite epidemica (orecchioni) . . . . .	5	—	5	—	—	—	—	—	—
	d) altre malattie infettive o parassitarie . . . . .	5	7	12	—	—	—	—	—	—
	<b>II — Cancro ed altri tumori . . . . .</b>	<b>23.246</b>	<b>24.754</b>	<b>48.000</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>25</b>
45 - 55	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	22.302	23.330	45.632	9	2	29	13	35	18
45	Cancro ed altri tumori maligni della cavità boccale e della faringe . . . . .	1.204	244	1.448	—	—	1	—	—	—
	a) labbra . . . . .	193	35	228	—	—	—	—	—	—
	b) lingua . . . . .	317	37	354	—	—	—	—	—	—
	c) altre localizzazioni o non specificate . . . . .	694	172	866	—	—	1	—	—	—

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102. — (b) Leishmaniosi. — (c) Di cui 46 per leishmaniosi, 1 per malattie del sonno da tripanosoma gambiense. — (d) 3 per spirochetosi non specificate. — (e) 1 per anguilliosi, 33 per ascariidiosi, 2 per ossiurosi, 77 per altri elminti o elminti non specificati. — (f) 1 per bilarziosi, 4 per botrioce, per tricocefie, 3 per sporotricosi, 52 per oidiomicosi o endomicetosi, 6 per altre forme di micosi e micosi non specificate. — (g) 2 per actinomicosi, 4 per aspergillosi e Piede di Madure. — (h) 2 per actinomicosi, 4 per aspergillosi e Piede di Madure. — (i) Altre malattie veneree non specificate.

causa, età e sesso  
1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	2 anni		3 anni		4 anni		5-9 anni		10-14 anni		15-19 anni		20-24 anni		25-29 anni		30-34 anni		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F		
28 - 29	20	10	16	7	10	2	19	4	6	2	3	1	14	7	7	1	12	5	28 - 29	
28	7	4	5	1	2	1	5	—	3	—	3	1	12	7	6	1	12	5	28	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	
	7	4	5	1	1	1	5	—	3	—	2	1	10	5	6	1	10	4	d	
29	13	6	11	6	8	1	14	4	3	2	—	—	2	—	1	—	—	—	29	
30 - 32	12	3	6	3	5	2	7	2	8	4	6	1	36	14	40	20	56	20	30 - 32	
30	12	3	5	3	4	2	7	2	6	4	5	1	35	14	35	19	54	20	30	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	
	12	3	5	3	4	2	6	1	5	4	5	1	25	11	24	14	33	12	d	
32	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	5	1	2	—	32	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	2	—	b	
33 - 38	147	76	78	37	59	29	148	69	90	43	91	32	84	47	60	41	67	32	33 - 38	
33	71	37	39	25	24	14	79	34	48	28	74	23	70	42	44	33	57	27	33	
	48	25	23	16	15	9	38	15	22	11	35	12	33	22	24	20	34	17	a	
	23	12	16	9	9	5	41	19	26	17	39	11	37	20	20	13	23	10	b	
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
35	46	25	20	6	14	7	27	15	6	3	4	3	1	—	2	1	—	—	35	
36	29	13	14	6	16	7	27	16	16	8	9	5	6	1	5	3	2	—	36	
37	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	3	4	3	—	c
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	—	b
38	—	—	3	—	4	1	14	4	20	4	4	1	3	2	4	—	2	—	38	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	—	—	3	—	4	1	12	3	19	4	4	1	3	2	4	—	2	—	—	c
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e
39	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
39	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
	—	—	—	—	—															

Segue : Tav. 3. — Morti per  
causa, età e sesso  
Segue : Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dect.)	CAUSE DI MORTE (a)	TOTALE			Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno	
		M	F	MF	MF	F	MF	F	MF	F
46	Cancro ed altri tumori maligni del tubo digerente e del peritoneo	14.094	12.236	26.330	7	2	15	5	9	8
	a) esofago	860	264	1.124						
	b) stomaco e duodeno	7.960	5.892	13.852						
	c) intestini, non compreso il duodeno e il retto	1.090	1.394	2.484			1	—	1	—
	d) retto	757	618	1.375			1	—	1	1
	e) fegato e vie biliari	2.471	2.788	5.259	1	1	5	3	1	1
	f) pancreas	443	344	787			1	1	—	—
	g) peritoneo	113	191	304	6	1	5	1	3	2
	h) altri organi digerenti o non specificati	400	745	1.145			2	—	4	4
47	Cancro ed altri tumori maligni dell'apparato respiratorio	2.293	701	2.994	—	—	1	1	—	—
	a) laringe e trachea	660	78	738	—	—	1	1	—	—
	b) bronchi, polmoni e pleura	1.630	622	2.252	—	—	—	—	—	—
	c) organi non specificati dell'apparato respiratorio	3	1	4	—	—	—	—	—	—
48	Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	—	3.632	3.632	—	—	—	—	—	—
	a) collo dell'utero	—	256	256	—	—	—	—	—	—
	b) altre localizzazioni o non specificate	—	3.376	3.376	—	—	—	—	—	—
49	Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	—	649	649	—	—	—	—	1	1
50	Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	31	3.138	3.169	—	—	—	—	—	—
51	Cancro ed altri tumori maligni degli organi genitali dell'uomo	1.207	—	1.207	—	—	—	—	1	—
	a) scroto	5	—	5	—	—	—	—	—	—
	b) prostata	990	—	990	—	—	—	—	1	—
	c) altre localizzazioni o non specificate	212	—	212	—	—	—	—	—	—
52	Cancro ed altri tumori maligni degli organi urinari dell'uomo e della donna	865	450	1.315	—	—	1	—	10	4
53	Cancro ed altri tumori maligni della pelle (eccettuato lo scroto)	531	402	933	—	—	—	—	—	—
54	Cancro ed altri tumori maligni del cervello e delle altre parti del sistema nervoso	176	123	299	—	—	1	1	2	1
	a) glioma (non specificato come benigno)	36	29	65	—	—	1	1	1	1
	b) sarcoma	24	16	40	—	—	—	—	1	—
	c) altri neoplasmi maligni e non specificati	116	78	194	—	—	—	—	—	—
55	Cancro ed altri tumori maligni di altri organi o di organi non specificati	1.901	1.755	3.656	2	—	10	6	12	4
	a) capsule surrenali	38	49	87	—	—	1	—	1	1
	b) ossa	419	362	781	—	—	2	2	1	—
	c) tiroide	79	148	227	—	—	1	—	—	—
	d) altri organi e non specificati	1.365	1.196	2.561	2	—	6	4	10	3
56	Tumori non maligni	83	587	670	3	3	7	3	5	3
	a) ovaia	—	126	126	—	—	—	—	—	—
	b) utero	—	373	373	1	1	—	—	—	—
	c) altri organi genitali della donna	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	d) cervello e altre parti del sistema nervoso	9	7	16	—	—	—	—	1	—
	e) altri organi e non specificati	74	80	154	2	2	7	3	4	3
57	Tumori il cui carattere maligno o non maligno non è specificato	861	837	1.698	—	—	7	3	5	4
	a) ovaia	—	19	19	—	—	—	—	—	—
	b) utero	—	54	54	—	—	—	—	—	—
	c) altri organi genitali della donna	—	7	7	—	—	—	—	—	—
	d) cervello e altre parti del sistema nervoso	651	509	1.160	—	—	2	—	2	2
	e) altri organi e non specificati	210	248	458	—	—	5	3	3	2
<b>III — Malattie reumatiche, malattie della nutrizione, delle ghiandole endocrine, altre malattie generali e avitaminosi</b>		<b>2.945</b>	<b>4.013</b>	<b>6.958</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>350</b>	<b>148</b>	<b>138</b>	<b>73</b>
58	Reumatismo articolare acuto febbrile (malattia di Bouillaud)	756	881	1.637	1	—	10	5	3	1
	a) pericardite reumatica acuta	4	6	10	—	—	1	1	—	—
	b) endocardite reumatica acuta	554	621	1.175	—	—	5	2	1	1
	c) miocardite reumatica acuta	54	79	133	—	—	—	—	—	—
	d) altre forme, compreso il reumatismo articolare acuto e la pleurite reumatica	144	175	319	1	—	4	2	2	—
59	Reumatismo cronico ed altre malattie reumatiche	187	389	576	—	—	—	—	—	—
	a) artrite reumatoide	182	380	562	—	—	—	—	—	—
	b) altre forme di reumatismo articolare cronico	—	3	3	—	—	—	—	—	—
	c) altre forme di reumatismo cronico	5	6	11	—	—	—	—	—	—

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso  
1948

	2 anni		3 anni		4 anni		5-9 anni		10-14 anni		15-19 anni		20-24 anni		25-29 anni		30-34 anni		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dect.)
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
46	6	4	12	9	15	6	19	7	15	10	25	12	37	19	96	49	159	72	46
a)	2	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	a
b)	—	—	3	2	3	1	—	—	2	2	3	5	8	5	39	21	70	33	b
c)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	1	1	3	13	8	23	10	c
d)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	d
e)	2	2	2	2	4	—	6	3	3	3	2	2	2	1	5	3	18	6	e
f)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f
g)	1	—	2	1	1	2	—	—	—	—	2	2	2	1	3	1	4	3	g
h)	1	1	5	4	3	2	11	3	4	2	4	1	8	5	12	5	15	7	h
47	1	1	2	—	1	—	6	2	10	3	12	5	14	6	27	11	33	10	47
a)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	a
b)	—	—	—	—	—	—	6	2	10	3	11	4	—	—	6	24	9	30	b
c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	c
48	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	10	10	35	35	74	74	48
a)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	5	5	7	7	a
b)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	8	8	30	30	67	67	b
49	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	9	9	15	15	49
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	8	8	54	53	50
51	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	14	—	13	—	18	—	51
a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
c)	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	13	—	13	—	16	—	c
52	6	2	4	—	1	—	8	6	2	2	—	—	3	—	5	1	9	2	52
53	—	—	1	—	2	—	1	1	5	3	5	2	4	3	3	2	5	1	53
54	3	1	3	1	3	2	6	—	7	2	11	3	7	5	8	2	16	9	54
a)	3	1	3	1	3	2	1	—	4	2	2	—	1	1	2	—	1	1	a
b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	b
c)	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	8	2	6	4	5	2	13	8	c
55	16	11	8	2	11	4	38	14	42	21	66	32	57	22	57	26	73	44	55
a)	1	1	2	—	—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	2	1	3	1	a
b)	5	4	2	1	2	1	15	6	23	11	30	13	16	6	15	9	15	9	b
c)	10	6	4	1	9	3	21	7	19	10	32	17	38	15	38	14	52	33	c
d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
56	—	—	1	—	2	2	3	1	1	—	7	5	4	3	16	12	35	33	56
a)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	3	3	7	7	12	12	a
b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	17	17	b
c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
e)	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	4	2	1	—	4	1	5	3	e
57	9	3	10	2	14	7	47	19	43	17	51	22	60	36	49	28	75	42	57
a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	a
b)	—																		





Segue: Tav. 3. — Morti per  
causa, età e sesso

Segue: Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	TOTALE		Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno		2 anni	3 anni	4 anni	5-9 anni	10-14 anni	15-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)												
		M	F	MF	MF	F	MF	F	MF											F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F			
95	Altre malattie del cuore	7.735	9.893	17.628	17	9	40	11	20	12	14	10	10	6	8	7	48	24	76	44	95	42	111	59	145	90	175	96	95		
	a) malattie funzionali del cuore, senza specificazione di lesione organica	79	112	191	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	4	2	1	1	a	
	b) malattie del cuore specificate come reumatiche, senz'altra indicazione	35	36	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	1	3	1	3	1	1	—	5	3	2	1	b
	c) altre malattie del cuore e non specificate	7.621	9.745	17.366	17	9	39	11	20	12	12	8	10	6	8	7	45	22	73	43	91	41	105	55	138	86	172	95	95		
96	Aneurisma	26	12	38	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	96
97	Arteriosclerosi	3.629	3.652	7.281	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
98	Gangrena	261	201	462	2	—	5	1	4	2	3	3	3	2	2	1	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	98
99	Altre malattie delle arterie	625	486	1.111	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	3	1	4	2	10	6	99		
100	Malattie delle vene (varici, emorroidi, flebiti, ecc.)	144	207	351	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	5	4	6	3	12	5	100		
	a) varici	31	43	74	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
	b) altre malattie delle vene	113	164	277	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	4	4	3	11	5	100		
101	Malattie del sistema linfatico	26	24	50	—	—	12	4	4	3	2	1	—	—	—	—	2	2	2	1	2	1	1	—	—	—	—	1	1	101	
102	Ipertensione arteriosa idiopatica	247	260	507	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	102	
103	Altre malattie dell'apparato circolatorio	43	24	67	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2	2	1	4	—	2	—	6	4	5	3	103		
<b>VIII — Malattie dell'apparato respiratorio (non indicate come tubercolari)</b>		<b>33.566</b>	<b>30.488</b>	<b>64.054</b>	<b>3.294</b>	<b>1.411</b>	<b>12.685</b>	<b>5.786</b>	<b>4.086</b>	<b>2.040</b>	<b>1.216</b>	<b>615</b>	<b>479</b>	<b>250</b>	<b>291</b>	<b>150</b>	<b>702</b>	<b>336</b>	<b>485</b>	<b>243</b>	<b>581</b>	<b>284</b>	<b>575</b>	<b>268</b>	<b>534</b>	<b>295</b>	<b>544</b>	<b>282</b>			
104	Malattie delle fosse nasali e annessi	17	10	27	2	1	5	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	104	
	a) malattie delle fosse nasali	3	4	7	2	1	3	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
	b) altre, compresa la sinusite	14	6	20	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	b	
105	Malattie della laringe	144	106	250	21	9	72	36	35	17	21	10	11	5	3	3	11	2	3	1	6	3	2	—	2	1	6	2	105		
106	Bronchite	3.522	3.676	7.198	446	200	1.023	479	318	186	67	29	24	14	13	4	31	15	17	8	31	16	32	14	40	20	37	14	106		
	a) acuta	861	841	1.702	409	185	478	222	103	60	16	4	7	4	3	1	12	7	5	3	8	3	3	1	5	3	2	—	a		
	b) cronica	1.446	1.508	2.954	—	—	15	7	12	5	7	3	—	—	2	1	4	1	3	6	5	3	9	4	16	8	17	5	b		
	c) non specificata	1.215	1.327	2.542	37	15	530	250	203	121	44	22	17	10	8	2	15	7	9	5	17	8	20	9	19	9	18	9	c		
107-109	<i>Broncopolmoniti e polmoniti</i>	24.859	23.747	48.606	2.806	1.195	11.450	5.214	3.637	1.797	1.089	560	426	223	259	139	616	297	416	210	459	234	408	190	363	205	350	201	107-109		
107	Broncopolmonite	20.293	19.773	40.066	2.572	1.103	10.174	4.620	3.184	1.578	949	487	345	180	226	128	480	232	308	157	336	170	289	139	257	151	244	145	107		
108	Polmonite lobare (pneumococcica)	4.566	3.974	8.540	234	92	1.276	594	453	219	140	73	81	43	33	11	136	65	108	53	123	64	119	51	106	54	106	56	108		
110	Pleurite non specificata come tubercolare	1.011	650	1.661	1	—	47	16	58	23	20	6	8	4	3	—	27	15	21	12	47	19	72	36	57	30	61	24	110		
	a) empiema	356	172	528	—	—	31	11	36	16	15	5	6	2	2	—	12	8	5	4	13	5	23	8	18	9	25	10	a		
	b) altre forme di pleurite e pleurite senza altra indicazione	655	478	1.133	1	—	16	5	22	7	5	1	2	2	1	—	15	7	16	8	34	14	49	28	39	21	36	14	b		
111	Congestione cronica o non specificata, edema, embolia, infarto emorragico e trombosidi del polmone	734	621	1.355	17	6	60	32	10	3	6	3	5	2	6	3	8	5	8	6	10	6	15	9	20	13	26	16	111		
	a) infarto emorragico del polmone (embolia polmonare)	81	64	145	2	1	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	—	6	3	5	3	a		
	b) edema acuto del polmone	348	305	653	5	1	21	11	3	—	4	3	1	—	4	2	2	1	6	5	5	3	9	6	8	6	16	11	b		
	c) congestione cronica o non specificata del polmone	305	252	557	10	4	36	20	7	3	2	—	2	—	2	1	6	4	1	—	3	2	4	3	6	4	5	2	c		
112	Asma	1.780	1.274	3.054	1	—	16	5	17	11	4	3	2	1	2	—	6	1	1	—	3	1	6	3	11	7	18	9	112		
113	Enfisema polmonare	168	82	250	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	
114	Altre malattie dell'apparato respiratorio	1.331	322	1.653	—	—	12	3	9	2	9	4	2	—	5	1	3	1	18	6	23	5	38	15	38	18	45	16	114		
	a) silicosi e altre pneumoconiosi professionali	143	5	148	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a		
	b) altre malattie professionali dell'apparato respiratorio	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b		
	c) gangrena del polmone	75	18	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c		
	d) ascesso del polmone	1.021	250	1.271	—	—	6	3	8	1	6	3	1	—	—	—	—	—	1	1	16	5	19	4	33	12	32	16	d		
	e) altre malattie dell'apparato respiratorio non specificate come professionali	91	48	139	—	—	4	—	1	1	3	1	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	3	1	5	2	3	—	e		
<b>IX — Malattie dell'apparato digerente</b>		<b>25.088</b>	<b>20.187</b>	<b>45.275</b>	<b>1.750</b>	<b>767</b>	<b>15.777</b>	<b>7.302</b>	<b>4.728</b>	<b>2.343</b>	<b>739</b>	<b>373</b>	<b>235</b>	<b>125</b>	<b>155</b>	<b>83</b>	<b>552</b>	<b>261</b>	<b>422</b>	<b>185</b>	<b>603</b>	<b>255</b>	<b>648</b>	<b>268</b>	<b>603</b>	<b>254</b>	<b>643</b>	<b>262</b>			
115	Malattie della cavità boccale, dei suoi annessi, della faringe e delle amigdale, comprese le vegetazioni adenoidi	268	274	542	28	15	93	55	54	34	28	13	20	13	10	5	32	15	21	14	26	12	25	11	14	7	17	8	115		
	a) affezioni dei denti e delle gengive	56	63	119	19	11	40	22	14	11	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	1	1	2	1	—	—	a		
	b) angina settica, streptococcica, ecc.	71	54	125	1	—	17	9	15	6	6	3	8	6	2	1	9	5	7	5	7	3	6	2	5	2	2	1	b		
	c) altre affezioni delle amigdale e della faringe	125	137	262	3	1	34	23	22	15	17	10	11	7	6	3	18	8	13	9	16	7	15	6	7	4	14	7	c		
	d) altre localizzazioni e non specificate	16	20	36	5	3	2	1	3	2	3	—	1	—	1	—	3	1	1	—</											

Segue : Tav. 3. — Morti per  
Segue : Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	TOTALE								Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno		
		TOTALE			Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno		Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno	
		M	F	MF	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F		
118	Altre malattie dello stomaco	244	176	420	1	1	5	1	3	1	—	—	—	—	—	
119	Diarrea ed enterite (al disotto di 2 anni)	11.408	10.092	21.500	1.621	711	15.356	7.132	4.523	2.249	—	—	—	—	—	
120	Diarrea, enterite ed ulcerazione intestinale (2 anni ed oltre)	1.499	1.834	3.333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	a) diarrea ed enterite (senza indicazione di ulcerazione)	1.358	1.736	3.094	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b) ulcerazione intestinale (eccettuate quelle del duodeno)	141	98	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
121	Appendicite	1.136	821	1.957	—	—	5	—	8	2	—	—	—	—	—	
122	Ernia, occlusione intestinale	2.254	1.682	3.936	79	27	201	61	49	11	—	—	—	—	—	
	a) ernia	1.040	531	1.571	13	1	55	4	23	1	—	—	—	—	—	
	b) occlusione intestinale	1.214	1.151	2.365	66	26	146	57	26	10	—	—	—	—	—	
123	Altre malattie dell'intestino	386	344	730	3	3	12	4	5	5	—	—	—	—	—	
	a) diverticolite	7	2	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b) altre malattie dell'intestino	379	342	721	3	3	11	4	5	5	—	—	—	—	—	
124	Cirrosi del fegato	2.806	1.359	4.165	—	—	4	—	9	5	—	—	—	—	—	
	a) con indicazione d'alcoolismo	105	19	124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b) senza indicazione d'alcoolismo	2.701	1.340	4.041	—	—	4	—	9	5	—	—	—	—	—	
125	Altre malattie del fegato	971	933	1.904	3	2	33	15	48	26	—	—	—	—	—	
	a) atrofia gialla acuta, non in relazione con la gravidanza o con lo stato puerperale	193	192	385	1	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	
	b) altre malattie del fegato	778	741	1.519	2	2	29	13	44	24	—	—	—	—	—	
126	Calcoli biliari	135	482	617	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
127	Altre malattie della vescichetta e delle vie biliari	354	660	1.014	—	—	3	2	5	2	—	—	—	—	—	
	a) colelitite, senza indicazione di calcoli biliari	257	554	811	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
	b) altre	97	106	203	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	
128	Malattie del pancreas	51	34	85	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
129	Peritonite senza causa indicata	918	919	1.837	12	6	63	30	24	8	—	—	—	—	—	
<b>X — Malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale (escluse le veneree, gravidiche o puerperali)</b>		<b>9.970</b>	<b>7.869</b>	<b>17.839</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>328</b>	<b>144</b>	<b>287</b>	<b>155</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
130 - 132	Nefriti	6.338	6.940	13.278	37	13	288	129	250	135	—	—	—	—	—	
130	Nefrite acuta	959	1.028	1.987	36	12	272	120	224	123	—	—	—	—	—	
131	Nefrite cronica	3.999	4.571	8.570	—	—	8	5	16	8	—	—	—	—	—	
	a) consecutiva ad una nefrite acuta	23	25	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b) di natura arteriosclerotica	2.940	3.396	6.336	—	—	6	4	5	3	—	—	—	—	—	
	c) senza altra indicazione	1.036	1.150	2.186	—	—	2	1	11	5	—	—	—	—	—	
132	Nefrite non specificata	1.380	1.341	2.721	1	1	8	4	10	4	—	—	—	—	—	
133	Altre malattie dei reni, dei bacinetti e degli ureteri (escluse le malattie gravidiche)	600	454	1.054	2	1	17	5	20	9	—	—	—	—	—	
	a) pielite, pielonefrite, pielocistite	323	203	529	1	—	10	2	4	4	—	—	—	—	—	
	b) altre	274	251	525	1	1	7	3	16	5	—	—	—	—	—	
134	Calcoli delle vie urinarie	313	131	444	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	
	a) calcoli dei reni e delle vie urinarie superiori	186	122	308	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
	b) calcoli della vescica	121	9	130	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
	c) calcoli senza altra indicazione	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
135	Malattie della vescica (esclusi i tumori)	365	69	434	1	—	7	1	3	2	—	—	—	—	—	
	a) cistite	190	48	238	1	—	7	1	2	1	—	—	—	—	—	
	b) altre	175	21	196	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
136	Malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc.	163	21	184	2	2	9	3	6	4	—	—	—	—	—	
	a) restringimento uretrale	53	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b) altre	110	21	131	2	2	9	3	6	4	—	—	—	—	—	
137	Malattie della prostata	2.171	—	2.171	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	a) ipertrofia della prostata	1.861	—	1.861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b) altre	310	—	310	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
138	Malattie degli organi genitali maschili, non indicate come veneree	20	—	20	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
139	Malattie degli organi genitali femminili, non indicate come veneree, gravidiche o puerperali	—	254	254	3	3	6	6	4	4	—	—	—	—	—	
	a) ovaia, tromba e parametro	—	103	103	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	
	b) utero	—	125	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	c) mammella	—	13	13	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	
	d) altre	—	13	13	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso  
1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	DISTRIBUZIONE PER ETÀ E SESSO																								Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
	2 anni		3 anni		4 anni		5-9 anni		10-14 anni		15-19 anni		20-24 anni		25-29 anni		30-34 anni								
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F							
118	10	4	6	3	3	2	11	6	7	2	2	—	10	4	10	4	8	2	118						
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119						
120	610	316	122	62	70	41	143	76	57	29	44	23	44	26	41	21	42	19	120						
	607	314	121	61	69	40	132	75	49	26	37	20	38	25	32	17	28	13	a						
	3	2	1	1	1	1	11	1	8	3	7	3	6	1	9	4	14	6	b						
121	6	1	12	7	19	9	143	66	157	64	238	85	175	64	127	49	112	55	121						
122	27	8	6	1	9	3	37	13	32	15	37	10	40	12	48	18	43	19	122						
	10	1	1	1	2	2	5	1	2	—	2	—	6	—	10	2	10	2	a						
	17	7	5	1	7	3	32	12	30	15	35	10	34	12	38	16	33	17	b						
123	7	3	15	7	6	3	31	13	21	10	24	9	27	16	20	12	17	12	123						
	7	3	15	7	6	3	31	13	21	10	24	9	27	16	20	12	17	12	a						
	7	3	15	7	6	3	30	13	21	10	24	9	27	16	19	11	16	12	b						
124	4	3	3	2	1	—	8	3	7	2	17	11	12	4	12	5	33	15	124						
	4	3	3	2	1	—	8	3	7	2	17	11	12	4	12	5	33	15	a						
	4	3	3	2	1	—	8	3	7	2	17	11	12	4	12	5	33	15	b						
125	19	13	25	18	13	7	51	28	24	8	42	21	69	32	68	35	53	25	125						
	19	13	25	18	13	7	51	28	24	8	42	21	69	32	68	35	53	25	a						
	19	13	25	18	13	7	51	28	24	8	42	21	69	32	68	35	53	25	b						
	19	13	25	18	13	7	51	28	24	8	42	21	69	32	68	35	53	25	a						
	19	13	25	18	13	7	51	28	24	8	42	21	69	32	68	35	53	25	b						
126	5	2	2	2	2	2	7	3	4	1	19	15	25	16	25	17	33	20	126						
127	5	2	2	2	2	2	7	3	4	1	19	15	25	16	25	17	33	20	127						
	5	2	2	2	2	2	7	3	4	1	19	15	25	16	25	17	33	20	a						
	5	2	2	2	2	2	7	3	4	1	19	15	25	16	25	17	33	20	b						
128	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	3	—	1	1	2	—	128						
129	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	129						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	a						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	b						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	a						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	b						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	a						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	b						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	a						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	b						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89	38	127	61	124	63	95	59	101	55	a						
	23	10	21	9	21	11	86	37	89																

Segue : Tav. 3. — Morti per  
Segue : A n n o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)										causa, età e sesso 1948																Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)					
	TOTALE			Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno		2 anni		3 anni		4 anni		5-9 anni		10-14 anni		15-19 anni		20-24 anni		25-29 anni		30-34 anni						
	M	F	MF	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF		F				
<b>XI — Malattie della gravidanza, parto e puerperio . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>1.539</b>	<b>1.539</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				
140 Infezione in seguito ad aborto . . . . .	—	86	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	46	46	252	252	343	343	313	313	140				
a) aborto spontaneo, provocato per ragioni terapeutiche o di origine non specificata . . . . .	—	72	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	14	14	20	20	13	13	a				
b) aborto provocato per altre ragioni, escluse le terapeutiche . . . . .	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	12	12	19	19	12	12	b				
141 Aborto non specificato come settico (senza indicazione di infezione)	—	44	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	7	9	9	11	11	141				
a) aborto spontaneo, provocato per ragioni terapeutiche o di origine non specificata . . . . .	—	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	8	8	8	8	a				
b) aborto provocato per altre ragioni, escluse le terapeutiche . . . . .	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	3	3	b				
142 Gestazione ectopica . . . . .	—	88	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	24	24	19	19	142				
a) con indicazione d'infezione . . . . .	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	a					
b) con indicazione di emorragia, ma non d'infezione . . . . .	—	56	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	13	13	12	12	b				
c) altri casi . . . . .	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	8	8	4	4	c				
143 Emorragie della gravidanza . . . . .	—	36	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	9	9	8	8	143				
a) emorragia da placenta previa . . . . .	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	7	7	6	6	a				
b) emorragia per separazione prematura della placenta, altre emorragie accidentali prima del parto (aborto escluso) . . . . .	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	b				
c) altre emorragie nel corso della gravidanza e non specificate . . . . .	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	c				
144 Tossiemie della gravidanza . . . . .	—	238	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	47	47	54	54	46	46	144		
a) eclampsia gravidica . . . . .	—	110	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	31	31	27	27	19	19	a		
b) albuminuria e nefrite della gravidanza . . . . .	—	89	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	12	12	18	18	21	21	b		
c) atrofia gialla acuta del fegato (gravidica) . . . . .	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	3	3	1	1	c		
d) altre . . . . .	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	6	6	5	5	d		
145 Altre malattie e accidenti della gravidanza . . . . .	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	6	4	4	145				
146 Emorragie nel corso del parto e dello stato puerperale . . . . .	—	377	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	53	53	77	77	77	77	146		
a) emorragie da placenta previa nel corso del parto . . . . .	—	91	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	15	15	22	22	a		
b) emorragie per distacco prematuro della placenta nel corso del parto . . . . .	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	3	3	b			
c) altre emorragie durante il parto . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c			
d) emorragie dopo il parto . . . . .	—	275	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	48	48	61	61	52	52	d		
147 Infezione durante il parto e lo stato puerperale . . . . .	—	272	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	53	53	71	71	52	52	147		
a) infezioni puerperali generali o locali (tetano puerperale incluso) con indicazione di pielite . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a			
b) senza indicazione di pielite . . . . .	—	177	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	39	39	46	46	37	37	b		
c) tromboflebite puerperale . . . . .	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	2	2	c			
d) embolia e morte improvvisa puerperale . . . . .	—	80	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	21	21	13	13	d				
148 Tossiemia puerperale . . . . .	—	143	143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	33	33	35	35	25	25	148		
a) eclampsia puerperale . . . . .	—	115	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	31	31	27	27	19	19	a		
b) albuminuria e nefrite puerperali . . . . .	—	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	7	7	5	5	b		
c) atrofia gialla acuta del fegato (puerperale) . . . . .	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c			
d) altre tossiemie puerperali . . . . .	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d			
149 Altri accidenti del parto . . . . .	—	210	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	22	22	34	34	52	52	149
a) lacerazione, rottura o altri traumatismi degli organi pelvici durante il parto, senza indicazione di emorragia . . . . .	—	192	192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a		
b) altri accidenti . . . . .	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b		
150 Altre malattie del parto e dello stato puerperale e non specificate	—	23	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	4	6	6	150			
a) mastite durante il periodo puerperale e l'allattamento . . . . .	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a		
b) psicosi puerperali . . . . .	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b		
c) altre malattie e non specificate . . . . .	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	5	5	c			
<b>XII — Malattie della pelle e del tessuto cellulare . . . . .</b>	<b>506</b>	<b>451</b>	<b>957</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>192</b>	<b>89</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>9</b>					
151 Foruncolo . . . . .	56	45	101	—	—	10	3	6	3	1	1	—	—	4	2	3	3	—	—	4	1	3	1	3	—	2	1	151				
152 Fiemme, ascesso caldo, cellulite . . . . .	316	285	601	51	29	105	53	40	21	8	4	8	5	4	2	7	3	8	4	10	6	14	7	12	7	6	3	152				
153 Altre malattie della pelle, dei suoi annessi e del tessuto cellulare . . . . .	134	121	255	9	3	77	33	14	7	4	—	3	1	1	1	3	—	—	—	4	3	4	4	6	5	8	5	153				
<b>XIII. — Malattie delle ossa e degli organi della locomozione . . . . .</b>	<b>238</b>	<b>184</b>	<b>422</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>18</b>															



Segue : Tav. 3. — Morti per  
Segue : A. n. n. o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	TOTALE								Meno di 1 mese		Da 1 mese a meno di 1 anno		1 anno	
		M		F		MF		MF		F		MF		F	
169 - 195	<i>Morti accidentali . . . . .</i>	10.417	3.110	13.527	15	8	121	56	541	227					
169	<i>Accidenti dovuti a ferrovie e tranvie . . . . .</i>	324	80	404	1	1	1	—	7	2					
170	<i>Accidenti d'automobile . . . . .</i>	2.213	438	2.651	—	—	2	1	8	6					
	<i>a) collisioni con treni . . . . .</i>	2	—	2	—	—	—	—	—	—					
	<i>b) collisioni con vetture tranviarie . . . . .</i>	4	—	4	—	—	—	—	—	—					
	<i>c) altri accidenti d'automobile . . . . .</i>	2.207	438	2.645	—	—	2	1	8	6					
171	<i>Altri accidenti di trasporto su vie e strade, non compresi gli accidenti d'automobile . . . . .</i>	781	157	938	—	—	—	—	11	7					
	<i>a) accidenti dovuti a tranvie su vie o strade . . . . .</i>	163	32	195	—	—	—	—	1	—					
	<i>b) tutti gli altri accidenti di trasporto su vie o strade . . . . .</i>	618	125	743	—	—	—	—	10	7					
172	<i>Accidenti da trasporti per acqua . . . . .</i>	16	—	16	—	—	—	—	—	—					
173	<i>Accidenti da trasporti aerei . . . . .</i>	43	4	47	—	—	—	—	1	—					
174	<i>Accidenti nelle miniere e cave . . . . .</i>	99	—	99	—	—	—	—	—	—					
175	<i>Accidenti agricoli e forestali . . . . .</i>	217	7	224	—	—	1	—	—	—					
	<i>a) accidenti dovuti a macchine o veicoli agricoli (all'infuori degli accidenti stradali) . . . . .</i>	59	3	62	—	—	—	—	—	—					
	<i>b) accidenti dovuti ad animali in occasione di lavori agricoli . . . . .</i>	24	—	24	—	—	—	—	—	—					
	<i>c) altri . . . . .</i>	134	4	138	—	—	1	—	—	—					
176	<i>Accidenti causati da macchine . . . . .</i>	59	5	64	—	—	—	—	1	1					
177	<i>Avvelenamenti da alimenti . . . . .</i>	38	41	79	—	—	—	—	3	2					
178	<i>Assorbimento accidentale di gas tossici . . . . .</i>	116	94	210	1	1	3	2	2	1					
179	<i>Altri avvelenamenti accidentali acuti, esclusi quelli da gas . . . . .</i>	95	51	146	2	1	2	—	9	4					
180	<i>In seguito ad incendi . . . . .</i>	28	14	42	—	—	2	1	2	1					
181	<i>Ustione accidentale (diversa da quella per incendio) . . . . .</i>	554	506	1.060	—	—	49	26	221	87					
182	<i>Soffocazione meccanica accidentale . . . . .</i>	82	41	123	5	3	25	13	17	8					
183	<i>Annegamento accidentale . . . . .</i>	1.043	324	1.367	1	1	7	3	188	80					
184	<i>Traumatismo accidentale causato da armi da fuoco . . . . .</i>	247	42	289	—	—	—	—	4	3					
185	<i>Traumatismo accidentale da strumenti da punta o taglio . . . . .</i>	19	6	25	—	—	—	—	—	—					
186	<i>Traumatismo accidentale per caduta, schiacciamento, frana, ecc. . . . .</i>	2.398	939	3.337	1	—	18	6	50	19					
187	<i>Cataclisma . . . . .</i>	10	13	23	—	—	—	—	—	—					
188	<i>Violenze di animali . . . . .</i>	81	15	96	—	—	1	—	1	—					
189	<i>Fame o sete . . . . .</i>	8	6	14	3	1	3	2	3	2					
190	<i>Freddo eccessivo . . . . .</i>	70	14	84	—	—	—	—	—	—					
191	<i>Calore eccessivo . . . . .</i>	29	6	35	—	—	—	—	2	—					
192	<i>Fulmine . . . . .</i>	111	36	147	—	—	—	—	1	—					
193	<i>Altri accidenti dovuti a corrente elettrica . . . . .</i>	212	19	231	—	—	1	—	—	—					
194	<i>Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .</i>	5	4	9	—	—	—	—	—	—					
195	<i>Altri accidenti . . . . .</i>	1.519	248	1.767	1	—	6	2	10	4					
	<i>b) altri accidenti da intervento medico o chirurgico . . . . .</i>	14	8	22	—	—	2	1	3	2					
	<i>d) altri e non specificati . . . . .</i>	1.505	240	1.745	1	—	4	1	7	2					
	<b>XVIII — Cause di morte non determinate . . . . .</b>	<b>3.933</b>	<b>3.123</b>	<b>7.056</b>	<b>132</b>	<b>55</b>	<b>243</b>	<b>108</b>	<b>299</b>	<b>161</b>					
199	<i>Morte improvvisa . . . . .</i>	2.546	1.710	4.256	41	20	112	43	26	9					
200	<i>Cause non specificate o mal definite . . . . .</i>	1.387	1.413	2.800	91	35	131	65	273	152					
	<i>a) cause mal definite . . . . .</i>	1.007	948	1.955	39	15	75	35	248	136					
	<i>b) « trovato morto », causa sconosciuta . . . . .</i>	4	5	9	1	—	—	—	—	—					
	<i>c) altri decessi da cause sconosciute o non specificate . . . . .</i>	376	460	836	51	20	56	30	25	16					
	<b>COMPLESSO . . . . .</b>	<b>247.883</b>	<b>238.509</b>	<b>486.392</b>	<b>32.604</b>	<b>14.182</b>	<b>39.979</b>	<b>18.558</b>	<b>13.458</b>	<b>6.600</b>					

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso  
1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	2 anni		3 anni		4 anni		5-9 anni		10-14 anni		15-19 anni		20-24 anni		25-29 anni		30-34 anni		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	
	MF		F		MF		F		MF		F		MF		F		MF			
169 - 195	432	174	247	107	197	76	810	244	756	149	872	124	924	113	776	85	589	65	169 - 195	
169	2	2	5	1	6	2	10	4	21	6	23	6	45	6	29	3	13	3	169	
170	34	12	24	11	25	6	159	46	167	46	198	31	236	26	207	20	173	11	170	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
171	16	4	10	4	11	4	44	12	50	8	61	3	65	4	40	6	32	1	171	
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	11	4	10	4	11	4	33	8	40	7	53	2	57	3	32	1	28	1	b	
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	172	
173	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	2	14	1	9	—	173	
174	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	8	—	12	—	10	—	174	
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	22	—	20	—	9	—	175	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	8	—	1	—	a	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	2	—	—	—	b	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	16	—	10	—	7	—	c	
176	3	2	2	—	1	1	14	8	10	6	3	2	7	1	5	—	5	—	176	
177	1	—	1	1	—	—	3	2	6	2	9	3	6	1	11	2	10	4	177	
178	10	5	6	2	8	3	13	3	4	—	1	1	8	6	5	3	3	1	178	
179	2	1	—	—	1	—	5	3	3	1	1	—	—	—	3	2	1	—	179	
180	221	99	121	60	74	41	89	52	19	11	21	5	15	4	16	4	7	3	180	
181	11	2	7	2	3	—	7	3	9	1	1	—	4	1	2	1	3	1	181	
182	80	25	26	8	18	5	98	20	98	13	158	28	115	17	56	10	40	8	182	
183	1	—	3	2	5	1	18	9	23	4	43	3	55	—	38	3	9	3	183	
184	2	2	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	184	
185	28	12	18	6	23	6	123	45	103	29	120	13	134	27	111	11	121	18	185	
186	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	4	4	2	2	—	—	186	
187	2	1	1	—	—	—	5	—	11	1	5	1	3	—	4	—	1	—	187	
188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188	
189	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	189	
190	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	2	—	2	—	4	1	—	—	190	
191	—	—	—	—	—	—	9	2	18	6	14	3	17	4	12	1	5	2	191	
192	3	1	3	3	2	—	9	1	16	3	24	2	25	1	38	3	20	1	192	
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	193	
194	14	4	17	6	19	7	197	33	190	11	153	17	137	8	138	9	111	7	194	
195	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	195	
	13	4	17	6	18	7	197	33	189	11	152	16	135	7	136	7	110	7	b	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
	72	36	23	13	22	10	44	17	39	14	81	31	102	47	97	38	88	42		
199	10	5	7	3	8	4	21	7	19	7	42	13	56	21	55	23	49	21	199	
200	62	31	16	10	14	6	23	10	20	7	39	18	46	26	42	15	39	21	200	
	51	26	13	7	11	4	15	6	9	4	29	12	29	17	31	10	30	17	a	
	11	5	3	3	3	2	8	4	10	2	10	6	17	9	11	5	9	4	b	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
	<b>4.306</b>	<b>2.073</b>	<b>2.116</b>	<b>1.039</b>	<b>1.578</b>	<b>773</b>	<b>5.326</b>	<b>2.467</b>												

Segue: Tav. 3. — Morti per Anno

causa, età e sesso 1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
	<b>I — Malattie infettive e parassitarie.</b>	<b>3.245</b>	<b>1.420</b>	<b>3.075</b>	<b>1.148</b>	<b>2.886</b>	<b>920</b>	<b>2.701</b>	<b>941</b>	<b>2.338</b>	<b>860</b>
1-26	<b>Malattie batteriche</b>	<b>2.952</b>	<b>1.305</b>	<b>2.725</b>	<b>1.010</b>	<b>2.431</b>	<b>780</b>	<b>2.166</b>	<b>762</b>	<b>1.781</b>	<b>624</b>
1	Febbre tifoidea	203	116	168	83	110	50	83	54	69	40
2	Infezioni paratifiche	7	4	6	2	12	9	5	5	6	3
5	Febbre ondulante	16	5	21	4	22	7	27	10	24	11
	a) infezione da Brucella melitense (melitococcia)	16	5	19	4	21	7	23	9	23	11
	b) infezione da Brucella abortus Bang	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	c) senza altra indicazione	—	—	2	—	1	—	3	1	1	—
6	Meningite cerebro-spinale epidemica (meningococcia)	5	2	4	2	4	—	2	2	1	—
7	Pustola maligna e carbuncolo (Bacillus anthracis)	3	1	3	2	5	1	4	2	3	—
	a) pustola maligna	3	1	2	1	4	1	4	2	3	—
	b) forme setticemiche e localizzazioni viscerali	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
8	Scarlattina	1	1	2	2	1	1	—	—	1	1
9	Pertosse	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
10	Difterite	1	—	3	1	1	—	4	2	4	3
11	Risipola	6	5	10	5	10	3	9	7	16	5
12	Tetano	49	38	48	30	52	18	56	24	34	15
13-22	<b>Tubercolosi</b>	<b>2.568</b>	<b>1.078</b>	<b>2.378</b>	<b>836</b>	<b>2.125</b>	<b>649</b>	<b>1.877</b>	<b>599</b>	<b>1.525</b>	<b>490</b>
13	Tubercolosi dell'apparato respiratorio (compresi i gangli tracheo-bronchiali)	2.200	878	2.078	682	1.897	534	1.651	475	1.338	389
	a) con indicazione di malattia professionale del polmone	5	—	4	—	3	—	6	—	5	—
	b) senza indicazione di malattia professionale del polmone	2.193	877	2.070	680	1.894	534	1.642	475	1.333	389
	c) tubercolosi non specificata	2	1	4	2	—	—	3	—	—	—
14	Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale	107	61	75	41	49	26	36	17	25	14
	a) meningi	105	59	75	41	46	26	31	16	25	14
	b) altre localizzazioni	2	2	—	—	3	—	5	1	—	—
15	Tubercolosi degli intestini e del peritoneo (compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali)	82	46	64	35	53	31	56	39	42	28
	a) intestino	24	11	14	6	17	8	14	8	16	11
	b) altre localizzazioni	58	35	50	29	36	23	42	31	26	17
16	Tubercolosi della colonna vertebrale	45	18	40	21	30	14	29	17	35	20
17	Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni, esclusa la colonna vertebrale	33	21	35	17	23	12	34	16	29	12
	a) ossa (esclusa la colonna vertebrale)	26	16	27	11	13	9	24	11	21	7
	b) articolazioni	7	5	7	5	6	1	7	4	5	2
	c) mista o non specificata	—	—	1	1	4	2	3	1	3	3
18	Tubercolosi della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo	2	1	2	2	2	2	2	2	1	—
19	Tubercolosi del sistema linfatico	1	1	1	1	6	2	7	4	6	5
20	Tubercolosi dell'apparato genito-urinario	46	22	32	14	30	9	27	13	23	7
21	Tubercolosi: altre localizzazioni	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1
	a) malattia d'Addison indicata come di natura tubercolare	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	b) altre	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
22	Tubercolosi disseminate	52	30	51	23	35	19	33	16	25	14
	a) acuta (miliare)	35	20	32	12	25	10	20	11	15	7
	b) cronica	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	c) non specificata	17	10	19	11	9	8	13	5	10	7
23	Lebbra	2	2	2	—	2	1	1	—	1	1
24	Infezione purulenta e setticemia (non dipendenti dalla gravidanza, parto e puerperio)	88	52	80	43	86	40	98	57	97	55
	a) setticemia	80	49	72	39	74	34	86	50	82	47
	b) piemia o piovemia	4	1	8	4	8	2	9	5	10	5
	c) gangrena gassosa	2	—	—	—	3	3	—	—	2	1
	d) colibacillosi generalizzata	2	2	—	—	1	1	3	2	3	2
25	Infezione gonococcica (tutte le forme e localizzazioni)	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Altre malattie batteriche (eccettuata la dissenteria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) tularemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Dissenteria	7	—	4	2	7	1	4	2	5	2
	a) bacillare	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
	b) amebica	4	—	3	2	5	—	2	2	4	—
	d) non specificata o dovuta ad altre cause	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso 1948		60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90 - ∞		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
		2.176	865	1.842	834	1.741	852	1.346	714	866	467	398	225	120	74	3	2	
1-26	<b>Malattie batteriche</b>	1.534	602	1.168	524	864	405	492	280	198	112	57	35	14	10	—	—	1-26
	a) Febbre tifoidea	58	26	37	18	28	17	16	6	6	1	2	1	—	—	—	—	1
	b) Infezioni paratifiche	9	7	8	4	8	5	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2
	c) Febbre ondulante	24	8	21	8	22	10	11	6	2	1	—	—	—	—	—	—	5
	d) infezione da Brucella melitense (melitococcia)	23	8	18	7	21	9	10	6	2	1	—	—	—	—	—	—	a
	e) infezione da Brucella abortus Bang	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	f) senza altra indicazione	1	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
	g) Meningite cerebro-spinale epidemica (meningococcia)	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	h) Pustola maligna e carbuncolo (Bacillus anthracis)	1	—	3	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7
	i) pustola maligna	1	—	3	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	a
	j) forme setticemiche e localizzazioni viscerali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	k) Scarlattina	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8
	l) Pertosse	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	9
	m) Difterite	3	1	—	—	1	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10
	n) Risipola	15	10	27	16	36	17	25	13	23	12	8	5	3	1	—	—	11
	o) Tetano	51	18	46	16	29	8	18	11	7	3	2	1	—	—	—	—	12
13-22	<b>Tubercolosi</b>	1.246	470	886	389	582	273	264	149	81	48	18	10	2	2	—	—	13-22
13	Tubercolosi dell'apparato respiratorio (compresi i gangli tracheo-bronchiali)	1.061	371	729	303	454	200	183	91	50	29	13	5	1	1	—	—	13
	a) con indicazione di malattia professionale del polmone	2	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) senza indicazione di malattia professionale del polmone	1.058	369	728	302	452	199	181	90	50	29	13	5	1	1	—	—	b
	c) tubercolosi non specificata	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	c
14	Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale	16	8	13	7	8	3	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	14
	a) meningi	15	7	11	6	8	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	a
	b) altre localizzazioni	1	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b
15	Tubercolosi degli intestini e del peritoneo (compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali)	33	24	37	22	11	8	7	4	3	3	—	—	—	—	—	—	15
	a) intestino	9	6	11	7	2	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	a
	b) altre localizzazioni	24	18	26	15	9	6	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	b
16	Tubercolosi della colonna vertebrale	41	21	17	12	18	13	10	6	6	4	—	—	—	—	—	—	16
17	Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni, esclusa la colonna vertebrale	46	26	44	29	58	37	39	32	15	9	1	1	1	1	—	—	17
	a) ossa (esclusa la colonna vertebrale)	35	20	29	20	37	21	22	18	9	6	1	1	1	1	—	—	a
	b) articolazioni	4	3	12	6	14	12	11	8	2	1	—	—	—	—	—	—	b
	c) mista o non specificata	7	3	3	3	7	4	6	6	4	2	—	—	—	—	—	—	c
18	Tubercolosi della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo	2	1	8	2	6	2	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	18
19	Tubercolosi del sistema linfatico	4	1	4	2	1	1	5	1	3	1	—	—	—	—	—	—	19
20	Tubercolosi dell'apparato genito-urinario	17	5	10	3	9	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	20
21	Tubercolosi: altre localizzazioni	2	1	1	1	2												

Segue: Tav. 3. — Morti per  
Segue: A. n. n. o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
28-29	Malattie dovute a protozoi	13	5	16	5	11	3	11	2	12	6
28	Malaria (paludismo)	12	5	16	5	11	3	11	2	12	6
	a) terzana benigna	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	c) terzana maligna (tropicale) e febbre bilioso-emoglobinurica	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	d) altre forme o non specificate	12	5	16	5	10	3	10	2	12	6
29	Altre malattie dovute a protozoi parassiti (eccettuate le spirochete)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30-32	Malattie dovute a spirochete	112	29	131	36	253	59	278	66	283	86
30	Sifilide	108	29	129	35	250	58	276	66	282	86
	a) atassia locomotrice (tabe dorsale)	2	—	9	3	20	5	27	6	32	12
	b) paralisi generale progressiva	39	9	61	15	89	22	87	22	77	23
	c) aneurisma dell'aorta	9	—	9	2	38	5	54	13	56	11
	d) altre forme di sifilide	58	20	50	15	103	26	108	25	117	40
32	Altre malattie dovute a spirochete	4	—	2	1	3	1	2	—	1	—
	a) spirochetosi ittero-emorragica	4	—	2	1	1	1	2	—	1	—
	b) altre	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
33-38	Malattie dovute o attribuite a virus filtrabili	94	53	112	59	117	51	159	70	194	113
33	Influenza (grippe)	60	33	81	44	85	33	130	57	165	95
	a) con complicazioni respiratorie dichiarate	36	14	51	27	59	20	83	32	110	63
	b) senza complicazioni respiratorie dichiarate	24	19	30	17	26	13	47	25	55	32
34	Vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Poliomielite anteriore acuta e polioencefalite acuta	5	3	1	—	2	1	—	—	1	—
37	Encefalite infettiva acuta (letargica o epidemica)	24	14	25	11	26	14	26	13	25	17
	a) encefalite letargica (o epidemica) acuta	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—
	b) postumi d'encefalite letargica	20	13	19	6	21	10	18	6	20	12
	c) encefalite letargica (o epidemica) senz'altra specificazione	4	1	6	5	2	2	7	6	5	5
38	Altre malattie dovute o attribuite a virus filtrabili	5	3	5	4	4	3	3	—	3	1
	b) rabbia	4	2	5	4	4	3	3	—	3	1
	c) Herpes zoster (Zona)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) rosolia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e) varicella	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Malattie dovute o attribuite a rickettsie	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—
39	Tifo petecchiale e altre malattie legate al tifo (rickettsiosi)	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—
	a) tifo esantematico (da pidocchi)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
	b) malattie legate al tifo, trasmesse da altri vettori	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	c) altre rickettsiosi e non specificate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40-42	Malattie dovute ad elminti	15	8	9	7	15	4	16	10	13	7
40	Anchilostomiasi	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—
41	Malattia idatica	10	3	9	7	14	3	14	8	12	7
	a) fegato	7	2	6	4	8	1	5	3	6	3
	b) altre localizzazioni o non specificate	3	1	3	3	6	2	9	5	6	4
42	Altre malattie dovute ad elminti	4	4	—	—	—	—	1	1	1	—
43	Malattie dovute a funghi (Micosi)	—	—	3	2	2	1	4	1	1	1
44	Altre malattie infettive e parassitarie	52	20	72	25	49	20	63	28	49	21
	a) malattie veneree, eccetto la sifilide e la gonococcia	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—
	b) linfogranulomatosi maligna (malattia di Hodgkin)	49	18	67	21	49	20	62	27	49	21
	c) parotite epidemica (orecchioni)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) altre malattie infettive o parassitarie non specificate	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—
<b>II — Cancro ed altri tumori</b>		<b>1.328</b>	<b>824</b>	<b>2.076</b>	<b>1.193</b>	<b>3.245</b>	<b>1.804</b>	<b>4.303</b>	<b>2.378</b>	<b>5.555</b>	<b>2.915</b>
45-55	Cancro ed altri tumori maligni	1.132	698	1.873	1.059	2.940	1.598	4.026	2.204	5.337	2.784
45	Cancro ed altri tumori maligni della cavità boccale e della faringe	22	8	34	8	59	8	104	26	140	17
	a) labbra	2	—	5	1	5	1	7	—	13	1
	b) lingua	8	3	6	1	8	1	27	6	42	2
	c) altre localizzazioni o non specificate	12	5	23	6	46	6	70	20	85	14

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso  
1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90-94		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
28-29	Malattie dovute a protozoi	12	7	11	2	14	5	12	4	2	—	1	1	—	—	—	—	28-29
28	Malaria (paludismo)	11	6	10	2	13	4	12	4	2	—	1	1	—	—	—	—	28
	a) terzana benigna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	c) terzana maligna (tropicale) e febbre bilioso-emoglobinurica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
	d) altre forme o non specificate	11	6	10	2	13	4	11	4	2	—	1	1	—	—	—	—	d
29	Altre malattie dovute a protozoi parassiti (eccettuate le spirochete)	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30-32	Malattie dovute a spirochete	238	63	202	59	134	45	84	29	29	12	5	3	1	1	—	—	30-32
30	Sifilide	235	62	200	58	133	44	84	29	29	12	5	3	1	1	—	—	30
	a) atassia locomotrice (tabe dorsale)	28	12	25	4	21	4	13	6	2	1	1	1	—	—	—	—	a
	b) paralisi generale progressiva	44	13	28	5	10	2	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	c) aneurisma dell'aorta	57	12	60	24	63	29	38	16	18	6	4	2	1	1	—	—	c
	d) altre forme di sifilide	106	25	87	25	39	9	24	6	9	5	—	—	—	—	—	—	d
32	Altre malattie dovute a spirochete	3	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
	a) spirochetosi ittero-emorragica	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) altre	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
33-38	Malattie dovute o attribuite a virus filtrabili	309	162	410	229	682	375	721	383	624	335	331	183	103	62	3	2	33-38
33	Influenza (grippe)	269	144	381	214	654	366	708	379	621	333	329	181	103	62	2	2	33
	a) con complicazioni respiratorie dichiarate	185	98	291	163	493	268	538	281	462	248	233	132	72	41	2	2	a
	b) senza complicazioni respiratorie dichiarate	84	46	90	51	161	98	170	98	159	85	96	49	31	21	—	—	b
34	Vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
	b) vaioloide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
35	Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
36	Poliomielite anteriore acuta e polioencefalite acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
37	Encefalite infettiva acuta (letargica o epidemica)	30	14	24	13	26	9	11	4	3	2	—	—	—	—	—	—	37
	a) encefalite letargica (o epidemica) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) postumi d'encefalite letargica	26	12	13	5	22	9	11	4	3	2	—	—	—	—	—	—	b
	c) encefalite letargica (o epidemica) senz'altra specificazione	4	2	9	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
38	Altre malattie dovute o attribuite a virus filtrabili	10	4	3	2	2	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	38
	b) rabbia	8	2	2	1	1	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	b
	c) Herpes zoster (Zona)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
	d) rosolia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
	e) varicella	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e
39	Malattie dovute o attribuite a rickettsie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
39	Tifo petecchiale e altre malattie legate al tifo (rickettsiosi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
	a) tifo esantematico (da pidocchi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) malattie legate al tifo, trasmesse da altri vettori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	c) altre rickettsiosi e non specificate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
40-42	Malattie dovute ad elminti	12	5	9	4	6	2	5	2	2								

Segue : Tav. 3. — Morti per  
causa, età e sesso  
1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)		35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
46 Cancro ed altri tumori maligni del tubo digerente e del peritoneo	420	203	762	309	1.291	558	1.915	877	2.973	1.332		
a) esofago	15	6	20	6	41	13	78	12	152	34		
b) stomaco e duodeno	190	74	401	135	655	234	974	385	1.580	619		
c) intestini, non compreso il duodeno e il retto	40	22	79	42	123	67	141	80	224	134		
d) retto	30	19	49	21	61	36	107	48	157	83		
e) fegato e vie biliari	89	53	136	61	274	126	410	234	618	318		
f) pancreas	14	4	24	8	51	25	84	34	102	45		
g) peritoneo	12	6	12	6	28	18	28	18	22	19		
h) altri organi digerenti o non specificati	30	19	41	30	58	39	93	66	118	80		
47 Cancro ed altri tumori maligni dell'apparato respiratorio	98	25	213	45	364	53	473	87	449	102		
a) laringe e trachea	14	1	35	3	74	3	116	6	109	11		
b) bronchi, polmoni e pleura	84	24	178	42	290	50	357	81	340	91		
c) organi non specificati dell'apparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
48 Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	184	184	291	291	397	397	523	523	545	545		
a) collo dell'utero	19	19	31	31	29	29	45	45	28	28		
b) altre localizzazioni o non specificate	165	165	260	260	368	368	478	478	517	517		
49 Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	33	33	46	46	75	75	71	71	87	87		
50 Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	163	163	239	238	325	322	405	403	430	428		
51 Cancro ed altri tumori maligni degli organi genitali dell'uomo	32	—	24	—	29	—	34	—	72	—		
a) scroto	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		
b) prostata	2	—	7	—	14	—	21	—	58	—		
c) altre localizzazioni o non specificate	30	—	17	—	15	—	11	—	14	—		
52 Cancro ed altri tumori maligni degli organi urinari dell'uomo e della donna	12	4	39	10	67	25	104	37	157	45		
53 Cancro ed altri tumori maligni della pelle (eccettuato lo scroto)	14	6	21	8	31	13	43	12	53	18		
54 Cancro ed altri tumori maligni del cervello e delle altre parti del sistema nervoso	24	9	26	11	36	15	38	14	42	15		
a) glioma (non specificato come benigno)	6	3	9	3	5	1	7	4	11	4		
b) sarcoma	3	—	3	—	11	3	6	4	2	1		
c) altri neoplasmi maligni e non specificati	15	6	14	6	20	11	25	6	29	10		
55 Cancro ed altri tumori maligni di altri organi o di organi non specificati	130	63	178	93	266	132	316	154	389	195		
a) capsule surrenali	6	4	3	2	2	1	12	6	8	4		
b) ossa	27	10	38	15	72	31	68	37	95	40		
c) tiroide	5	4	5	4	12	9	31	16	27	20		
d) altri organi e non specificati	92	45	132	72	180	91	205	95	259	131		
56 Tumori non maligni	75	74	94	90	123	118	75	71	43	36		
a) ovaia	13	13	12	12	13	13	9	9	13	13		
b) utero	52	52	75	75	99	99	57	57	16	16		
c) altri organi genitali della donna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
d) cervello e altre parti del sistema nervoso	2	1	2	1	1	1	2	—	1	1		
e) altri organi e non specificati	8	8	5	2	10	5	7	5	12	5		
57 Tumori il cui carattere maligno o non maligno non è specificato	121	52	109	44	182	88	202	103	175	95		
a) ovaia	—	—	1	1	1	1	2	2	3	3		
b) utero	3	3	1	1	5	5	11	11	5	5		
c) altri organi genitali della donna	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—		
d) cervello e altre parti del sistema nervoso	109	44	94	35	149	66	152	63	129	64		
e) altri organi e non specificati	9	5	13	7	26	15	37	27	38	23		
<b>III — Malattie reumatiche, malattie della nutrizione, delle ghiandole endocrine, altre malattie generali e avitaminosi</b>	<b>205</b>	<b>105</b>	<b>215</b>	<b>118</b>	<b>265</b>	<b>149</b>	<b>334</b>	<b>217</b>	<b>487</b>	<b>324</b>		
58 Reumatismo articolare acuto febbrile (malattia di Bouillaud)	87	41	82	47	81	43	72	41	74	42		
a) pericardite reumatica acuta	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—		
b) endocardite reumatica acuta	65	27	57	30	55	29	47	26	45	28		
c) miocardite reumatica acuta	2	1	8	5	6	4	8	5	8	3		
d) altre forme, compreso il reumatismo articolare acuto e la pleurite reumatica	20	13	17	12	20	10	15	9	21	11		
59 Reumatismo cronico ed altre malattie reumatiche	2	2	18	10	7	6	26	16	18	11		
a) artrite reumatoide	2	2	18	10	6	5	26	16	17	10		
b) altre forme di reumatismo articolare cronico	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
c) altre forme di reumatismo cronico	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—		

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso  
1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90 - 94		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
46 Cancro ed altri tumori maligni del tubo digerente e del peritoneo	4.007	1.856	4.668	2.080	4.671	2.132	3.326	1.656	1.431	759	396	231	55	40	—	—	46
a) esofago	195	37	200	39	202	49	151	44	48	14	16	7	2	1	—	—	a
b) stomaco e duodeno	2.099	884	2.468	1.009	2.591	1.142	1.797	850	762	369	182	107	22	16	—	—	b
c) intestini, non compreso il duodeno e il retto	335	200	442	235	461	231	352	208	169	107	51	35	9	6	—	—	c
d) retto	218	104	242	100	227	92	162	67	58	24	28	5	5	4	—	—	d
e) fegato e vie biliari	841	451	949	490	860	435	639	355	269	165	92	60	12	9	—	—	e
f) pancreas	107	45	144	67	118	46	77	37	47	23	6	2	—	—	—	—	f
g) peritoneo	52	37	55	34	30	20	13	6	11	8	1	1	—	—	—	—	g
h) altri organi digerenti o non specificati	160	98	168	106	182	117	135	89	67	49	20	14	4	4	—	—	h
47 Cancro ed altri tumori maligni dell'apparato respiratorio	430	103	341	95	282	84	162	40	57	18	17	10	1	—	—	—	47
a) laringe e trachea	130	10	94	14	83	15	52	5	19	4	3	2	—	—	—	—	a
b) bronchi, polmoni e pleura	297	93	247	81	199	69	110	35	38	14	14	8	—	—	—	—	b
c) organi non specificati dell'apparato respiratorio	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
48 Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	494	494	441	441	336	336	175	175	92	92	28	28	1	1	2	2	48
a) collo dell'utero	26	26	28	28	19	19	9	9	5	5	2	2	—	—	—	—	a
b) altre localizzazioni o non specificate	468	468	413	413	317	317	166	166	87	87	26	26	1	1	2	2	b
49 Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	101	101	69	69	65	65	49	49	21	21	2	2	—	—	—	—	49
50 Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	412	410	360	356	320	314	236	231	136	133	67	66	10	9	—	—	50
51 Cancro ed altri tumori maligni degli organi genitali dell'uomo	135	—	198	—	261	—	206	—	127	—	35	—	2	—	—	—	51
a) scroto	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
b) prostata	130	—	181	—	243	—	187	—	108	—	34	—	2	—	—	—	b
c) altre localizzazioni o non specificate	5	—	16	—	18	—	18	—	19	—	1	—	—	—	—	—	c
52 Cancro ed altri tumori maligni degli organi urinari dell'uomo e della donna	180	58	195	70	225	73	173	60	76	35	34	13	4	3	—	—	52
53 Cancro ed altri tumori maligni della pelle (eccettuato lo scroto)	80	38	118	34	145	52	169	82	145	72	73	44	15	11	—	—	53
54 Cancro ed altri tumori maligni del cervello e delle altre parti del sistema nervoso	27	12	17	7	12	6	4	2	3	2	3	3	—	—	—	—	54
a) glioma (non specificato come benigno)	3	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	a
b) sarcoma	6	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
c) altri neoplasmi maligni e non specificati	18	7	14	5	11	6	4	2	2	1	2	2	—	—	—	—	c
55 Cancro ed altri tumori maligni di altri organi o di organi non specificati	430	196	471	209	451	221	345	162	204	91	67	43	16	10	1	—	55
a) capsule surrenali	14	9	8	5	13	7	4	3	2	2	1	—	—	—	—	—	a
b) ossa	92	45	97	44	80	43	57	22	25	13	3	—	—	—	—	—	b
c) tiroide	36	25	33	20	25	15	27	19	14	10	1	—	—	—	—	—	c
d) altri organi e non specificati	288	117	333	140	333	156	257	118	163	66							

Segue: Tav. 3. — Morti per  
causa, età e sesso  
Segue: Anno

Table with columns for age groups (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59), sex (MF, F), and cause of death categories (a) from Gotta to Avitaminosi, and section IV (Malattie del sangue) and V (Avvelenamenti cronici).

causa, età e sesso  
1948

Table with columns for age groups (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-), sex (MF, F), and cause of death categories from Gotta to Avitaminosi, and section IV (Malattie del sangue) and V (Avvelenamenti cronici).

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

Segue: Tav. 3. — Morti per  
causa, età e sesso  
Segue: Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
79	Avvelenamenti cronici da altre sostanze minerali od organiche . . . . .	—	—	4	—	—	—	2	—	4	1
	a) avvelenamenti professionali . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
	b) avvelenamenti da stupefacenti e sonniferi . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1
	c) altri avvelenamenti non professionali . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	d) avvelenamenti non specificati . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	<b>VI — Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi . . . . .</b>	<b>618</b>	<b>291</b>	<b>801</b>	<b>380</b>	<b>1.331</b>	<b>657</b>	<b>2.197</b>	<b>1.148</b>	<b>3.582</b>	<b>1.876</b>
80	Encefalite (non epidemica) . . . . .	34	16	39	17	38	14	35	21	34	12
	a) ascesso intracranico . . . . .	10	2	11	3	10	3	9	3	7	2
	b) altre forme di encefalite . . . . .	24	14	28	14	28	11	26	18	27	10
81	Meningite non meningococcica . . . . .	60	29	59	22	64	24	53	20	51	16
	a) meningite semplice . . . . .	55	27	52	22	57	23	51	19	46	13
	b) meningite cerebro-spinale acuta non meningococcica . . . . .	5	2	7	—	7	1	2	1	5	3
82	Malattie del midollo spinale . . . . .	38	22	40	24	46	18	77	33	54	23
83	Lesioni intracraniche d'origine vascolare . . . . .	270	122	473	219	999	503	1.826	958	3.208	1.701
	a) emorragia cerebrale . . . . .	179	79	337	146	763	370	1.380	714	2.354	1.272
	b) embolia e trombosi cerebrale . . . . .	68	35	104	56	176	107	312	171	615	315
	c) rammollimento del cervello . . . . .	—	—	3	2	5	1	21	10	35	19
	d) emiplegia ed altre paralisi da cause non specificate . . . . .	21	8	25	12	49	22	113	63	198	93
	e) altre lesioni intracraniche . . . . .	2	—	4	3	6	3	—	—	6	2
84	Malattie e deficienze mentali . . . . .	69	39	56	29	72	43	87	58	100	65
	a) deficienza mentale . . . . .	13	8	6	3	16	12	14	12	7	4
	b) schizofrenia (demenza precoce) . . . . .	20	8	11	3	6	3	14	7	18	9
	c) psicosi maniaco-depressiva . . . . .	5	3	3	3	6	2	12	8	8	4
	d) altre . . . . .	31	20	36	20	44	26	47	31	67	48
85	Epilessia . . . . .	85	37	73	36	50	23	54	26	48	20
86	Convulsioni dei bambini di età inferiore ai 5 anni . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	40	21	39	23	48	23	51	24	64	28
	a) corea . . . . .	1	1	2	—	3	—	1	1	2	1
	b) nevrite (non reumatica) . . . . .	3	2	3	2	10	4	8	2	8	4
	c) paralisi agitante . . . . .	4	—	9	5	8	3	13	6	24	10
	d) sclerosi a placche . . . . .	24	12	17	13	19	12	21	10	24	10
	e) altre . . . . .	8	6	8	3	8	4	8	5	6	3
88	Malattie degli organi della vista . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
89	Malattie dell'orecchio e dei seni mastoidei . . . . .	22	5	22	10	14	9	14	8	22	10
	a) otite e altre malattie dell'orecchio senza indicazione d'affezione mastoidea . . . . .	16	2	19	10	10	6	12	7	16	7
	b) malattie dei seni mastoidei . . . . .	6	3	3	—	4	3	2	1	6	3
	<b>VII — Malattie dell'apparato circolatorio . . . . .</b>	<b>1.442</b>	<b>801</b>	<b>1.921</b>	<b>1.012</b>	<b>2.565</b>	<b>1.200</b>	<b>3.663</b>	<b>1.766</b>	<b>5.266</b>	<b>2.617</b>
90 - 95	Malattie del cuore . . . . .	1.400	774	1.845	984	2.427	1.135	3.500	1.688	4.982	2.507
90	Pericardite . . . . .	8	2	11	7	10	4	9	4	7	3
	a) pericardite cronica, specificata come reumatica . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
	b) altre . . . . .	8	2	11	7	8	4	9	4	6	3
91	Endocardite acuta non reumatica . . . . .	61	27	29	15	26	13	25	13	29	17
	a) endocardite batterica acuta . . . . .	26	13	13	6	6	5	8	7	9	5
	b) endocardite batterica sub-acuta . . . . .	24	7	13	7	12	5	12	3	15	8
	c) altre forme di endocardite acuta o sub-acuta (escluse le forme arteriosclerotiche) . . . . .	11	7	3	2	8	3	5	3	5	4
92	Affezioni croniche delle valvole cardiache e dell'endocardio . . . . .	674	406	746	452	789	449	931	551	1.163	691
	a) malattie dell'orificio aortico, senza lesione della mitrale . . . . .	34	5	37	12	56	19	86	33	104	38
	b) altre affezioni valvolari precisate, comprese quelle da reumatismo articolare acuto . . . . .	422	264	421	271	422	243	433	265	542	340
	c) lesioni valvolari non specificate o endocardite non specificata . . . . .	218	137	288	169	311	187	412	253	517	313
93	Malattie del miocardio . . . . .	342	187	533	278	847	377	1.429	669	2.300	1.159
	a) miocardite acuta . . . . .	10	7	25	15	20	10	40	21	55	32
	b) miocardite cronica specificata come reumatica . . . . .	9	5	6	5	13	7	11	9	14	9
	c) degenerazione e infarto cardiaco; sclerosi del miocardio o miocardite cronica, non specificata come reumatica . . . . .	102	53	163	75	308	122	522	219	900	444
	d) miocardite non specificata come acuta o cronica . . . . .	221	122	339	183	506	238	856	420	1.331	674
94	Malattie delle arterie coronarie ed angina di petto . . . . .	55	5	141	28	265	44	377	75	481	122
	a) malattie delle arterie coronarie . . . . .	6	1	12	2	23	8	26	10	53	14
	b) angina di petto, senza indicazione di malattia delle arterie coronarie . . . . .	49	4	129	26	242	36	351	65	428	108

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso  
1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90 - ∞		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
79	3	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	79
a	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
b	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b
c	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
	<b>5.721</b>	<b>2.976</b>	<b>8.507</b>	<b>4.461</b>	<b>11.720</b>	<b>5.826</b>	<b>11.673</b>	<b>5.873</b>	<b>7.707</b>	<b>3.919</b>	<b>2.898</b>	<b>1.507</b>	<b>519</b>	<b>306</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
80	38	28	27	12	13	6	10	8	3	—	—	—	1	1	—	—	80
a	5	2	6	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	a
b	33	26	21	10	13	6	9	7	2	—	—	—	1	1	—	—	b
81	51	24	38	12	32	10	15	8	10	4	4	2	—	—	—	—	81
a	50	23	36	12	30	9	13	6	10	4	4	2	—	—	—	—	a
b	1	1	2	—	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	b
82	69	33	79	32	74	35	50	21	28	10	9	1	1	—	—	—	82
83	5.299	2.751	8.115	4.287	11.355	5.664	11.429	5.755	7.607	3.871	2.860	1.488	513	303	4	4	83
a	3.806	1.950	5.681	2.961	7.847	3.862	7.628	3.802	4.966	2.523	1.826	926	311	172	—	—	a
b	1.049	597	1.681	931	2.414	1.269	2.580	1.336	1.818	952	1.026	409	153	96	—	—	b
c	71	30	181	96	231	97	266	126	226	95	82	38	19	13	—	—	c
d	367	173	569	298	856	433	948	488	597	301	216	114	29	21	—	—	d
e	6	1	3	1	7	3	7	3	—	—	2	1	1	1	—	—	e
84	111	63	64	36	44	27	36	22	3	3	6	4	—	—	—	—	84
a	12	7	2	1	2	2	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	a
b	14	7	13	4	7	6	7	4	—	—	2	2	—	—	—	—	b
c	17	6	14	9	6	3	6	5	—	—	1	—	—	—	—	—	c
d	68	43	35	22	29	16	20	11	3	3	2	1	—	—	—	—	d
85	45	25	27	16	39	16	15	6	6	4	4	3	—	—	—	—	85
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
87	86	41	134	56	143	59	107	49	41	23	12	8	4	2	—	—	87
a	2	1	—	—	2	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	a
b	9	4	8	5	6	4	8	4	2	1	1	1	—	—	—	—	b
c	43	23	88	37	104	38	78	36	26	14	5	3	2	1	—	—	c
d	22	8	25	8	22	11	17	6	8	4	5	4	—	—	—	—	d
e	10	5	13	6	9	5	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	e
88	1	1	4	2	3	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	88
89	21	10	19	8	17	9	10	3	6	2	2	1	—	—	—	—	89
a	14	7	16	7	10												

Segue: Tav. 3. — Morti per

Segue: A n n o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
95	Altre malattie del cuore . . . . .	260	147	385	204	490	248	729	376	1.002	515
	a) malattie funzionali del cuore, senza specificazione di lesione organica . . . . .	3	1	4	3	11	2	10	7	13	10
	b) malattie del cuore specificate come reumatiche, senz'altra indicazione . . . . .	2	1	3	2	9	4	7	3	7	3
	c) altre malattie del cuore e non specificate . . . . .	255	145	378	199	470	242	716	368	982	502
96	Aneurisma . . . . .	4	1	2	—	—	—	3	—	1	—
97	Arteriosclerosi . . . . .	3	2	4	3	21	9	44	21	101	37
98	Gangrena . . . . .	4	4	6	1	12	8	8	3	11	6
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	13	4	32	9	46	15	53	20	76	29
100	Malattie delle vene (varici, emorroidi, flebiti, ecc.) . . . . .	11	9	19	13	30	17	24	19	40	21
	a) varici . . . . .	—	—	2	1	7	2	3	3	9	5
	b) altre malattie delle vene . . . . .	11	9	17	12	23	15	21	16	31	16
101	Malattie del sistema linfatico . . . . .	—	—	1	—	1	—	2	1	2	1
102	Iperensione arteriosa idiopatica . . . . .	5	5	7	2	22	14	26	13	47	15
103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	2	2	5	—	6	2	3	1	6	1
	<b>VIII — Malattie dell'apparato respiratorio (non indicate come tubercolari)</b> . . . . .	<b>791</b>	<b>341</b>	<b>1.047</b>	<b>373</b>	<b>1.460</b>	<b>477</b>	<b>1.731</b>	<b>605</b>	<b>2.315</b>	<b>954</b>
104	Malattie delle fosse nasali e annessi . . . . .	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—
	a) malattie delle fosse nasali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre, compresa la sinusite . . . . .	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—
105	Malattie della laringe . . . . .	6	—	4	1	2	—	4	1	6	4
106	Bronchite . . . . .	38	13	49	12	99	32	129	40	214	93
	a) acuta . . . . .	19	5	3	2	16	8	11	5	23	8
	b) cronica . . . . .	9	5	30	6	55	9	97	26	144	67
	c) non specificata . . . . .	10	3	16	4	28	15	21	9	47	18
107-109	<b>Broncopolmoniti e polmoniti</b> . . . . .	<b>526</b>	<b>255</b>	<b>636</b>	<b>264</b>	<b>830</b>	<b>317</b>	<b>1.016</b>	<b>417</b>	<b>1.406</b>	<b>656</b>
107	Broncopolmonite . . . . .	331	167	436	175	619	241	735	309	1.052	496
108	Polmonite lobare (pneumococcica) . . . . .	195	88	200	89	211	76	281	108	354	160
110	Pleurite non specificata come tubercolare . . . . .	55	22	81	33	100	44	102	45	107	35
	a) empiema . . . . .	25	9	25	7	40	12	29	9	33	5
	b) altre forme di pleurite e pleurite senza altra indicazione . . . . .	30	13	56	26	60	32	73	36	74	30
111	Congestione cronica o non specificata, edema, embolia, infarto emorragico e trombosii del polmone . . . . .	24	10	31	18	58	15	65	19	84	29
	a) infarto emorragico del polmone (embolia polmonare) . . . . .	3	3	9	7	10	4	8	1	8	3
	b) edema acuto del polmone . . . . .	13	4	17	9	32	9	44	16	52	19
	c) congestione cronica o non specificata del polmone . . . . .	8	3	5	2	16	2	13	2	24	7
112	Asma . . . . .	44	21	78	25	144	45	191	46	289	106
113	Enfisema polmonare . . . . .	3	—	8	3	18	3	15	3	20	5
114	Altre malattie dell'apparato respiratorio . . . . .	93	19	160	17	206	21	209	34	189	26
	a) silicosi e altre pneumoconiosi professionali . . . . .	10	—	12	1	26	—	20	1	16	—
	b) altre malattie professionali dell'apparato respiratorio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) gangrena del polmone . . . . .	4	—	8	3	6	1	14	—	18	4
	d) ascesso del polmone . . . . .	75	17	134	12	162	16	158	27	145	19
	e) altre malattie dell'apparato respiratorio non specificate come professionali . . . . .	4	1	6	1	11	3	17	6	10	3
	<b>IX — Malattie dell'apparato digerente</b> . . . . .	<b>1.061</b>	<b>383</b>	<b>1.288</b>	<b>408</b>	<b>1.511</b>	<b>520</b>	<b>1.686</b>	<b>673</b>	<b>1.972</b>	<b>772</b>
115	Malattie della cavità boccale, dei suoi annessi, della faringe e delle mandibole, comprese le vegetazioni adenoidi . . . . .	20	10	12	4	18	5	17	7	18	5
	a) affezioni dei denti e delle gengive . . . . .	3	2	2	—	4	1	3	—	3	1
	b) angina settica, streptococcica, ecc. . . . .	6	1	3	2	2	—	7	2	1	—
	c) altre affezioni delle mandibole e della faringe . . . . .	11	7	6	1	11	4	6	4	13	4
	d) altre localizzazioni e non specificate . . . . .	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—
116	Malattie dell'esofago . . . . .	—	—	1	1	2	2	4	3	4	2
117	Ulcera dello stomaco o del duodeno . . . . .	301	22	374	21	407	43	378	66	322	64
	a) stomaco . . . . .	168	16	224	13	247	30	236	46	208	48
	b) duodeno . . . . .	133	6	150	8	160	13	142	20	114	16

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso

1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	causa, età e sesso	60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90-94 anni		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
95	Altre malattie del cuore . . . . .	1.645	890	2.354	1.350	3.267	1.860	3.237	1.842	2.293	1.344	993	575	212	130	2	2	95
	a) malattie funzionali del cuore, senza specificazione di lesione organica . . . . .	20	12	23	13	28	15	31	20	24	15	9	6	3	1	—	—	a
	b) malattie del cuore specificate come reumatiche, senz'altra indicazione . . . . .	7	4	7	5	6	4	6	1	1	—	1	1	2	2	—	—	b
	c) altre malattie del cuore e non specificate . . . . .	1.618	874	2.324	1.332	3.233	1.841	3.200	1.821	2.268	1.329	983	568	207	127	2	2	c
96	Aneurisma . . . . .	4	2	5	—	9	5	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	96
97	Arteriosclerosi . . . . .	274	132	558	277	1.174	546	1.766	864	1.795	887	1.160	629	379	244	1	—	97
98	Gangrena . . . . .	25	14	46	18	64	33	99	38	98	39	51	18	10	7	—	—	98
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	131	59	145	65	193	84	193	95	135	60	63	29	7	4	—	—	99
100	Malattie delle vene (varici, emorroidi, flebiti, ecc.) . . . . .	44	20	47	34	47	25	35	21	14	8	8	4	2	1	—	—	100
	a) varici . . . . .	11	6	10	9	7	4	13	8	5	4	1	1	—	—	—	—	a
	b) altre malattie delle vene . . . . .	33	14	37	25	40	21	22	13	9	4	7	3	2	1	—	—	b
101	Malattie del sistema linfatico . . . . .	3	2	2	1	3	1	5	1	4	3	1	1	—	—	—	—	101
102	Iperensione arteriosa idiopatica . . . . .	58	27	87	39	112	64	75	35	48	32	12	10	4	2	—	—	102
103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	—	—	5	2	3	—	3	1	4	1	1	—	1	1	—	—	103
	<b>VIII — Malattie dell'apparato respiratorio (non indicate come tubercolari)</b> . . . . .	<b>3.477</b>	<b>1.505</b>	<b>4.705</b>	<b>2.208</b>	<b>6.627</b>	<b>3.306</b>	<b>7.126</b>	<b>3.713</b>	<b>5.658</b>	<b>2.985</b>	<b>2.817</b>	<b>1.549</b>	<b>823</b>	<b>510</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
104	Malattie delle fosse nasali e annessi . . . . .	4	4	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	104
	a) malattie delle fosse nasali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) altre, compresa la sinusite . . . . .	4	4	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b
105	Malattie della laringe . . . . .	10	4	10	4	7	2	4	1	2	—	2	—	—	—	—	—	105
106	Bronchite . . . . .	356	176	550	273	883	489	1.040	586	987	515	576	316	197	132	1	—	106
	a) acuta . . . . .	30	14	67	38	87	49	144	83	156	81	73	35	32	20	—	—	a
	b) cronica . . . . .	235	115	362	184	558	311	566	323	472	233	248	137	75	53	—	—	b
	c) non specificata . . . . .	91	47	121	51	238	129	330	180	359	201	255	144	90	59	—	—	c
107-109	<b>Broncopolmoniti e polmoniti</b> . . . . .	<b>2.226</b>	<b>1.042</b>	<b>3.124</b>	<b>1.539</b>	<b>4.631</b>	<b>2.346</b>	<b>5.209</b>	<b>2.724</b>	<b>4.126</b>	<b>2.229</b>	<b>2.015</b>	<b>1.139</b>	<b>580</b>	<b>353</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>107-109</b>
107	Broncopolmonite . . . . .	1.686	791	2.426	1.227	3.653	1.898	4.201	2.245	3.415	1.884	1.669	960	479	290	—	—	107
108	Polmonite lobare (pneumococcica) . . . . .	540	251	698	312	978	448	1.008	479	711	345	346	179	101	63	2	1	108
110	Pleurite non specificata come tubercolare . . . . .	167	55	190	74	186	62	144	54	85	31	19	7	3	3	—	—	110
	a) empiema . . . . .	51	15	49	13	45	12	30	8	10	3	5	1	—	—	—	—	a
	b) altre forme di pleurite e pleurite senza altra indicazione . . . . .	116	40	141	61	141	50	114	46	75	28	14	6	3	3	—	—	b
111	Congestione cronica o non specificata, edema, embolia, infarto emorragico e trombosii del polmone . . . . .	104	41	171	74	196	105	169	86	146	68	91	39	24	13	1	—	111
	a) infarto emorragico del polmone (embolia polmonare) . . . . .	14	5	26	10	19	11	16	5	6	3	3	1	1	1	—	—	a
	b) edema acuto del polmone . . . . .	61	26	100	41	96	51	81	43	46	25	25	13	1	—	—	—	b
	c) congestione cronica																	

Segue: Tav. 3. — Morti per  
Segue: Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
118	Altre malattie dello stomaco	8	3	20	3	19	5	30	11	36	16
119	Diarrea ed enterite (al disotto di 2 anni)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Diarrea, enterite ed ulcerazione intestinale (2 anni ed oltre)	65	34	72	32	78	34	91	57	125	59
	a) diarrea ed enterite (senza indicazione di ulcerazione)	49	27	55	28	59	28	74	50	112	55
	b) ulcerazione intestinale (eccettuate quelle del duodeno)	16	7	17	4	19	6	17	7	13	4
121	Appendicite	140	59	135	48	111	50	111	45	102	49
122	Ernia, occlusione intestinale	93	33	121	51	157	66	193	93	227	91
	a) ernia	28	6	43	17	53	15	76	35	114	40
	b) occlusione intestinale	65	27	78	34	104	51	117	58	113	51
123	Altre malattie dell'intestino	26	12	29	12	30	11	30	14	34	16
	a) diverticolite	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
	b) altre malattie dell'intestino	26	12	29	12	30	11	30	14	31	15
124	Cirrosi del fegato	99	32	193	66	332	112	437	139	621	176
	a) con indicazione d'alcolismo	7	—	7	—	12	2	13	4	34	6
	b) senza indicazione d'alcolismo	92	32	186	66	320	110	424	135	587	170
125	Altre malattie del fegato	100	51	103	50	110	45	147	74	160	82
	a) atrofia gialla acuta, non in relazione con la gravidanza o con lo stato puerperale	27	17	21	15	19	9	33	16	31	18
	b) altre malattie del fegato	73	34	82	35	91	36	114	58	129	64
126	Calcoli biliari	46	38	38	29	60	46	66	56	85	68
127	Altre malattie della vescichetta e delle vie biliari	46	26	54	29	58	34	79	54	128	92
	a) colecistite, senza indicazione di calcoli biliari	35	24	45	26	43	26	69	48	108	81
	b) altre	11	2	9	3	15	8	10	6	20	11
128	Malattie del pancreas	6	1	12	4	12	6	11	7	8	2
129	Peritonite senza causa indicata	111	62	124	58	117	61	92	47	102	50
	<b>X — Malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale (escluse le veneree, gravidiche o puerperali)</b>	<b>494</b>	<b>273</b>	<b>549</b>	<b>298</b>	<b>670</b>	<b>346</b>	<b>814</b>	<b>418</b>	<b>1.103</b>	<b>545</b>
130-132	<b>Nefriti</b>	<b>378</b>	<b>205</b>	<b>443</b>	<b>239</b>	<b>545</b>	<b>273</b>	<b>674</b>	<b>361</b>	<b>893</b>	<b>463</b>
130	Nefrite acuta	58	33	59	27	62	26	73	37	88	52
131	Nefrite cronica	205	104	254	140	328	166	433	237	595	314
	a) consecutiva ad una nefrite acuta	4	—	2	1	8	5	3	2	4	3
	b) di natura arteriosclerotica	98	57	137	77	184	96	285	153	390	201
	c) senza altra indicazione	103	47	115	62	136	65	145	82	201	110
132	Nefrite non specificata	115	68	130	72	155	81	168	87	210	97
133	Altre malattie dei reni, dei bacinetti e degli ureteri (escluse le malattie gravidiche)	51	25	47	19	60	28	62	31	92	56
	a) pielite, pielonefrite, pielocistite	16	9	19	7	27	14	35	16	41	23
	b) altre	35	16	28	12	33	14	27	15	51	33
134	Calcoli delle vie urinarie	17	4	20	7	22	12	33	10	38	10
	a) calcoli dei reni e delle vie urinarie superiori	15	4	19	7	17	10	30	9	30	9
	b) calcoli della vescica	2	—	—	—	5	2	3	1	8	1
	c) calcoli senz'altra indicazione	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
135	Malattie della vescica (esclusi i tumori)	2	—	2	1	7	2	8	3	16	4
	a) cistite	1	—	1	1	1	1	2	1	10	3
	b) altre	1	—	1	—	6	1	6	2	6	1
136	Malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc.	6	—	2	—	3	—	9	1	10	1
	a) restringimento uretrale	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—
	b) altre	4	—	1	—	3	—	8	1	8	1
137	Malattie della prostata	1	—	2	—	2	—	13	—	40	—
	a) ipertrofia della prostata	1	—	—	—	1	—	11	—	32	—
	b) altre	—	—	2	—	1	—	2	—	8	—
138	Malattie degli organi genitali maschili, non indicate come veneree	—	—	1	—	—	—	3	—	3	—
139	Malattie degli organi genitali femminili, non indicate come veneree, gravidiche o puerperali	39	39	32	32	31	31	12	12	11	11
	a) ovaia, tromba e parametro	20	20	13	13	15	15	2	2	—	—
	b) utero	19	19	15	15	13	13	8	8	9	9
	c) mammella	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2
	d) altre	—	—	3	3	3	3	2	2	—	—

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102

causa, età e sesso  
1948

60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90 - 94		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
35	15	43	19	43	19	49	20	35	20	19	12	7	3	—	—	118
181	101	257	147	364	213	422	250	295	175	171	97	37	21	2	1	119
162	91	243	139	340	202	400	240	280	168	169	96	36	20	2	1	120
19	10	14	8	24	11	22	10	15	7	2	1	1	1	—	—	a
113	58	89	40	77	38	37	14	28	11	9	6	3	1	—	—	b
354	177	451	186	565	267	581	263	385	168	166	73	35	16	—	—	121
148	70	215	70	258	103	242	87	177	55	68	18	10	3	—	—	122
206	107	236	116	307	164	339	176	208	113	98	55	25	13	—	—	a
62	24	79	37	80	36	81	36	53	23	33	24	5	2	—	—	b
62	24	79	37	79	36	79	36	53	23	33	24	5	2	—	—	a
726	221	666	219	486	156	331	123	126	48	35	17	2	—	1	—	b
20	4	14	3	6	—	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	124
706	217	652	216	480	156	324	123	123	48	34	17	2	—	—	—	a
181	83	203	98	192	93	157	71	69	40	29	13	5	3	—	—	b
39	15	22	12	22	9	22	9	4	3	4	2	—	—	—	—	125
142	68	180	86	170	84	135	62	65	37	25	11	5	3	—	—	a
77	59	77	62	62	46	40	28	25	17	8	6	1	1	—	—	b
114	78	124	88	97	63	97	63	67	40	18	9	2	2	—	—	126
102	67	103	74	82	54	76	56	51	33	9	6	2	2	—	—	127
12	11	21	14	15	9	21	7	16	7	9	3	—	—	—	—	a
9	5	8	1	5	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b
122	65	122	61	127	55	83	47	39	17	9	6	3	3	—	—	128
1.501	702	2.084	893	2.651	1.076	2.661	1.008	1.815	645	787	286	184	84	3	2	129
1.149	609	1.498	790	1.879	1.012	1.815	945	1.191	599	517	276	132	75	3	2	130-132
75	41	68	41	83	53	61	33	31	15	14	9	4	1	1	1	130
796	413	1.118	591	1.447	799	1.420	769	974	512	424	227	106	63	1	1	131
3	1	5	3	5	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	a
552	287	822	432	1.131	621	1.189	639	856	459	392	217	97	57	—	—	b
241	125	291	156	311	178	228	129	116	51	32	10	9	6	1	1	c
278	155	312	158	349	160	334	143	186	72	79	40	22	11	—	—	132
101	54	139	64	102	32	114	38	77	17	19	6	12	6	—	—	133
47	21	84	33	61	18	74	20	51	8	11	2	9	4	—	—	a
54	33	55	31	41	14	40	18	26	9	8	4	3	2	—	—	b
62	18	70	24	72	20	45	8	23	7	11	1	—	—	—	—	134
47	18	40	21	45	20	20	7	14	7	6	—	—	—	—	—	a
14	—	29	3	26	3	24	1	9	—	4	—	—	—	—	—	b
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	c
28	6	48	6	69	6	95	12	79	15	42	3	13	3	—	—	135
10	1	24	6	39	5	57	9	47	11	21	3	9	2	—	—	a
18	5	24	6	30	1	38	3	32	4	21	3	9	4	—	—	b
16	2	26	1	27	1	28	2	21	—							

segue : Tav. 3. — Morti per  
Segue : A n n o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
		<b>XI — Malattie della gravidanza, parto e puerperio</b>									
		367	367	196	196	19	19	1	1	1	1
140	Infezioni in seguito ad aborto.	25	25	11	11						
	a) aborto spontaneo, provocato per ragioni terapeutiche o di origine non specificata	18	18	9	9						
	b) aborto provocato per altre ragioni, escluse le terapeutiche	7	7	2	2						
141	Aborto non specificato come settico (senza indicazione di infezione)	10	10	6	6						
	a) aborto spontaneo, provocato per ragioni terapeutiche o di origine non specificata	9	9	5	5						
	b) aborto provocato per altre ragioni, escluse le terapeutiche	1	1	1	1						
142	Gestazione-ectopica	23	23	9	9	2	2				
	a) con indicazione d'infezione	4	4	1	1						
	b) con indicazione di emorragia, ma non d'infezione	17	17	5	5	1	1				
	c) altri casi	2	2	3	3						
143	Emorragie della gravidanza.	9	9	4	4						
	a) emorragia da placenta previa	9	9	3	3						
	b) emorragia per separazione prematura della placenta, altre emorragie accidentali prima del parto (aborto escluso)			1	1						
	c) altre emorragie nel corso della gravidanza e non specificate										
144	Tossiemie della gravidanza.	48	48	25	25	2	2			1	1
	a) eclampsia gravidica	14	14	13	13					1	1
	b) albuminuria e nefrite della gravidanza	19	19	11	11	2	2				
	c) atrofia gialla acuta del fegato (gravidica)	2	2								
	d) altre	13	13	1	1						
145	Altre malattie e accidenti della gravidanza	5	5	3	3	1	1				
146	Emorragie nel corso del parto e dello stato puerperale	99	99	60	60	6	6				
	a) emorragie da placenta previa nel corso del parto	27	27	20	20	3	3				
	b) emorragie per distacco prematuro della placenta nel corso del parto	3	3	1	1						
	c) altre emorragie durante il parto	1	1								
	d) emorragie dopo il parto	68	68	39	39	3	3				
147	Infezione durante il parto e lo stato puerperale	46	46	38	38	1	1	1	1		
	a) infezioni puerperali generali o locali (tetano puerperale incluso) con indicazione di pielite										
	b) senza indicazione di pielite	29	29	16	16						
	c) tromboflebite puerperale	2	2	4	4						
	d) embolia e morte improvvisa puerperale	15	15	18	18	1	1	1	1		
148	Tossimia puerperale	26	26	13	13	2	2				
	a) eclampsia puerperale	18	18	10	10	2	2				
	b) albuminuria e nefrite puerperali	7	7	3	3						
	c) atrofia gialla acuta del fegato (puerperale)										
	d) altre tossiemie puerperali	1	1								
149	Altri accidenti del parto.	69	69	25	25	4	4				
	a) lacerazione, rottura, o altri traumatismi degli organi pelvici durante il parto, senza indicazione di emorragia	65	65	25	25	3	3				
	b) altri accidenti.	4	4			1	1				
150	Altre malattie del parto e dello stato puerperale e non specificate	7	7	2	2	1	1				
	a) mastite durante il periodo puerperale e l'allattamento	1	1								
	b) psicosi puerperali	1	1								
	c) altre malattie e non specificate	5	5	2	2	1	1				
	<b>XII — Malattie della pelle e del tessuto cellulare</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>20</b>
151	Foruncolo	2		4	1	3		7	4	4	3
152	Flemmone, ascesso caldo, cellulite	15	9	18	4	19	10	25	13	28	13
153	Altre malattie della pelle, dei suoi annessi e del tessuto cellulare	8	5	11	8	11	5	11	4	8	4
	<b>XIII — Malattie delle ossa e degli organi della locomozione.</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>11</b>
154	Osteomielite e periostite	5	1	7		18	6	11	7	14	7
	a) osteomielite e periostite acuta			1		1	1	1	1	2	1
	b) osteomielite e periostite cronica					4	1	1	1	3	3
	c) osteomielite e periostite non specificata	5	1	5		13	4	9	6	9	5

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso  
1948

	60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90 - 99		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
																	140
																	a
																	b
																	141
																	a
																	b
																	142
																	a
																	b
																	c
																	143
																	a
																	b
																	c
																	144
																	a
																	b
																	c
																	d
																	145
																	146
																	a
																	b
																	c
																	d
																	147
																	a
																	b
																	c
																	d
																	148
																	a
																	b
																	c
																	d
																	149
																	a
																	b
																	150
																	a
																	b
																	c
																	151
																	152
																	153
																	154
																	a
																	b
																	c



Segue : Tav. 3. — Morti per

Segue : A n n o

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	35-39 anni		40-44 anni		45-49 anni		50-54 anni		55-59 anni	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
169 - 195	Morti accidentali . . . . .	801	106	841	108	758	117	762	152	700	119
169	Accidenti dovuti a ferrovie e tranvie . . . . .	29	5	31	5	27	2	37	5	31	7
170	Accidenti d'automobile . . . . .	238	27	211	28	182	26	160	22	136	22
	a) collisioni con treni . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) collisioni con vetture tranviarie . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	c) altri accidenti d'automobile . . . . .	238	27	211	28	181	26	160	22	135	22
171	Altri accidenti di trasporto su vie e strade, non compresi gli accidenti d'automobile . . . . .	56	7	57	1	60	15	74	12	68	11
	a) accidenti dovuti a tranvie su vie o strade . . . . .	13	2	11	—	8	—	12	—	18	2
	b) tutti gli altri accidenti di trasporto-su vie o strade . . . . .	43	5	46	1	52	15	62	12	50	9
172	Accidenti da trasporti per acqua . . . . .	1	—	3	—	4	—	—	—	1	—
173	Accidenti da trasporti aerei . . . . .	5	—	3	—	2	—	2	—	—	—
174	Accidenti nelle miniere e cave . . . . .	13	—	12	—	10	—	13	—	8	—
175	Accidenti agricoli e forestali . . . . .	22	1	35	1	19	—	23	2	20	1
	a) accidenti dovuti a macchine o veicoli agricoli (all'infuori degli accidenti stradali) . . . . .	11	1	8	1	8	—	9	1	3	—
	b) accidenti dovuti ad animali in occasione di lavori agricoli . . . . .	—	—	7	—	2	—	1	—	1	—
	c) altri . . . . .	11	—	20	—	9	—	13	1	16	1
176	Accidenti causati da macchine . . . . .	9	—	4	—	3	—	3	—	5	—
177	Avvelenamenti da alimenti . . . . .	4	3	4	—	6	1	6	5	4	2
178	Assorbimento accidentale di gas tossici . . . . .	22	8	17	10	17	7	17	8	14	8
179	Altri avvelenamenti accidentali acuti, esclusi quelli da gas . . . . .	6	2	8	2	13	3	7	3	5	—
180	In seguito ad incendi . . . . .	1	—	4	1	3	—	2	—	1	—
181	Ustione accidentale (diversa da quella per incendio) . . . . .	12	3	19	5	9	4	20	11	13	9
182	Soffocazione meccanica accidentale . . . . .	1	—	2	—	3	—	4	1	1	—
183	Annegamento accidentale . . . . .	41	12	59	12	51	8	65	14	47	5
184	Traumatismo accidentale causato da armi da fuoco . . . . .	25	3	20	1	18	5	9	3	4	—
185	Traumatismo accidentale da strumenti da punta o taglio . . . . .	2	1	3	—	3	1	1	—	—	—
186	Traumatismo accidentale per caduta, schiacciamento, frana, ecc. . . . .	155	18	189	25	188	25	181	40	229	35
187	Cataclisma . . . . .	2	1	1	—	2	1	1	1	1	—
188	Violenze di animali . . . . .	1	—	5	1	1	1	5	1	8	1
189	Fame o sete . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
190	Freddo eccessivo . . . . .	4	—	3	—	8	2	6	—	10	—
191	Calore eccessivo . . . . .	2	—	3	—	4	1	2	—	2	—
192	Fulmine . . . . .	16	3	16	5	4	3	5	3	4	1
193	Altri accidenti dovuti a corrente elettrica . . . . .	21	—	23	1	18	1	13	1	10	—
194	Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	3	1
195	Altri accidenti . . . . .	111	11	108	10	103	11	105	20	74	16
	b) altri accidenti da intervento medico o chirurgico . . . . .	1	1	3	—	—	—	1	—	—	—
	d) altri e non specificati . . . . .	110	10	105	10	103	11	104	20	74	16
	<b>XVIII — Cause di morte non determinate. . . . .</b>	<b>170</b>	<b>65</b>	<b>223</b>	<b>81</b>	<b>322</b>	<b>101</b>	<b>384</b>	<b>132</b>	<b>494</b>	<b>191</b>
199	Morte improvvisa . . . . .	98	26	152	46	210	55	252	77	322	110
200	Cause non specificate o mal definite . . . . .	72	39	71	35	112	46	132	55	172	81
	a) cause mal definite . . . . .	59	31	57	28	97	39	105	39	147	66
	b) « trovato morto », causa sconosciuta . . . . .	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—
	c) altri decessi da cause sconosciute o non specificate . . . . .	12	7	14	7	14	7	27	16	24	14
	<b>COMPLESSO . . . . .</b>	<b>11.081</b>	<b>5.157</b>	<b>12.896</b>	<b>5.510</b>	<b>15.678</b>	<b>6.501</b>	<b>19.215</b>	<b>8.680</b>	<b>24.454</b>	<b>11.400</b>

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 102.

causa, età e sesso

1948

	60-64 anni		65-69 anni		70-74 anni		75-79 anni		80-84 anni		85-89 anni		90 - 0		Età ignota		Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	
	776	163	707	168	699	229	593	227	372	176	170	83	55	34	13	—	169 - 195
	17	3	21	4	21	6	12	2	10	1	2	2	2	2	1	—	169
	141	18	123	16	105	30	83	21	22	9	11	3	4	—	—	—	170
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	a
	141	18	122	16	105	30	83	21	22	9	11	3	3	—	—	—	b
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
	76	14	75	11	56	9	46	16	21	6	6	1	3	1	—	—	171
	16	4	18	4	19	4	14	6	5	1	5	1	1	—	—	—	a
	60	10	57	7	37	5	32	10	16	5	1	—	2	1	—	—	b
	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172
	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
	29	2	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	20	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
	3	—	2	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	176
	2	1	1	1	5	3	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	177
	14	5	15	7	17	7	14	8	8	5	2	2	—	—	—	—	178
	11	3	5	2	11	3	3	2	4	2	2	—	—	—	—	—	179
	1	—	4	2	2	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	180
	18	9	15	11	26	16	26	15	31	19	15	10	2	2	1	—	181
	3	1	7	2	3	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	182
	58	14	52	13	51	12	35	10	15	5	4	1	—	—	4	—	183
	7	—	5	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	185
	268	71	280	72	317	122	279	127	240	124	120	60	41	28	—	—	186
	3	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
	13	2	8	2	10	2	7	1	4	1	—	—	—	—	—	—	188
	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189
	9	3	9	3	13	1	10	1	—	—	1	1	—	—	2	—	190
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	191
	10	1	12	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192
	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193
	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	194
	79	13	60	18	50	14	64	20	10	3	5	3	3	1	2	—	195
	1	—	1	—	1	—	—	—	10	3	—	—	—	—	—	—	b
	78	13	59	18	49	14	64	20	10	3	5	3	3	1	2	—	d
	<b>761</b>	<b>329</b>	<b>735</b>	<b>325</b>	<b>817</b>	<b>368</b>	<b>808</b>	<b>373</b>	<b>363</b>	<b>167</b>	<b>197</b>	<b>117</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>491</b>	<b>274</b>	
	503	196	526	227	607	266	640	274	308	146	152	92	40	19	—	—	199
	258	133	209	98	210	102	168	99	55	21	45	25	9	9	491	274	200
	231	122	159	70	158	79	119	70	45	20	35	15	—	—	163	80	a
	3	1	1	1	52	23	49	29	10	1	10	10	9	9	328	194	b
	24	10	49	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
	<b>33.085</b>	<b>15.978</b>	<b>42.820</b>	<b>21.515</b>	<b>55.839</b>	<b>28.380</b>	<b>57.510</b>	<b>30.121</b>	<b>45.792</b>								

Tav. 4 — Femmine morte per tumori degli organi genitali e delle mammelle per età e stato civile (a)

Numeri dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE STATO CIVILE	Meno di 15 anni	Anno																	TOTALE
			15-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	65-69 anni	70-74 anni	75-79 anni	80-84 anni	85-89 anni	90 anni e più		
<b>Anno 1943</b>																				
48	Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	—	5	11	27	71	155	266	397	474	502	417	335	262	173	74	14	2	3.185	
	di cui nubili	—	4	4	9	13	23	33	51	51	51	32	42	35	19	5	1	—	373	
49	Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	6	4	5	5	9	17	25	53	59	55	66	58	58	35	15	6	1	477	
	di cui nubili	4	3	4	2	3	5	5	10	10	10	8	12	7	6	1	1	—	91	
50	Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	1	1	3	10	51	101	195	282	313	334	332	313	237	168	109	51	9	2.510	
	di cui nubili	1	1	3	4	8	25	42	62	63	70	62	57	44	33	16	13	1	505	
56 abc	Tumori non maligni degli organi genitali della donna	—	2	6	13	28	53	76	81	52	36	33	21	24	18	9	3	—	455	
	di cui nubili	—	2	3	6	8	15	16	12	13	7	7	4	3	—	—	1	—	97	
57 abc	Tumori degli organi genitali della donna, il cui carattere maligno o non maligno non è specificato	—	1	1	6	6	5	11	12	18	15	16	13	11	8	3	3	—	129	
	di cui nubili	—	1	1	2	3	—	4	—	2	2	1	2	1	—	—	—	—	19	
	COMPLESSO	7	13	26	61	165	331	573	825	916	942	864	740	592	402	210	77	12	6.756	
	di cui nubili	5	11	15	23	35	68	100	135	139	140	110	117	90	58	22	16	1	1.085	
<b>Anno 1944</b>																				
48	Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	3	3	6	22	82	165	263	390	433	458	359	363	249	154	59	20	4	3.033	
	di cui nubili	1	2	3	5	14	22	39	45	52	48	37	34	32	12	9	2	—	357	
49	Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	4	6	6	6	7	16	31	46	56	64	69	62	39	21	14	4	1	452	
	di cui nubili	4	6	4	5	—	5	7	11	10	15	10	11	2	5	3	1	—	99	
50	Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	—	—	2	10	46	115	197	274	328	335	305	307	270	183	106	32	8	2.518	
	di cui nubili	—	—	1	2	9	25	41	61	72	78	59	63	52	26	18	6	1	514	
56 abc	Tumori non maligni degli organi genitali della donna	1	2	8	8	28	40	75	82	47	26	22	25	26	17	10	3	2	422	
	di cui nubili	—	2	4	1	6	11	17	16	15	8	6	4	7	4	2	—	—	103	
57 abc	Tumori degli organi genitali della donna, il cui carattere maligno o non maligno non è specificato	2	—	2	6	2	17	24	31	27	31	28	27	27	18	15	2	—	259	
	di cui nubili	2	—	2	5	1	4	4	5	5	3	5	7	2	4	—	—	—	49	
	COMPLESSO	10	11	24	52	165	353	590	823	891	914	783	784	611	393	204	61	15	6.684	
	di cui nubili	7	10	14	18	30	67	108	138	154	152	117	119	95	51	32	9	1	1.122	
<b>Anno 1945</b>																				
48	Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	2	1	13	18	96	207	279	365	556	511	467	390	255	171	72	19	2	3.424	
	di cui nubili	2	1	7	6	18	40	38	56	72	62	50	45	25	11	4	1	—	438	
49	Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	2	8	5	8	11	13	45	60	63	74	67	72	51	40	15	8	2	544	
	di cui nubili	2	7	3	6	4	—	13	17	12	9	9	8	2	7	—	—	1	100	
50	Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	1	—	1	8	55	138	202	294	311	347	357	348	246	198	139	31	10	2.686	
	di cui nubili	1	—	1	4	6	29	46	49	67	66	74	63	39	46	28	7	2	528	
56 abc	Tumori non maligni degli organi genitali della donna	—	6	6	12	34	53	107	132	61	22	29	28	19	17	5	2	1	534	
	di cui nubili	—	5	1	4	10	12	18	27	12	5	5	10	6	2	—	2	—	119	
57 abc	Tumori degli organi genitali della donna, il cui carattere maligno o non maligno non è specificato	1	—	2	1	9	7	11	19	18	13	17	21	10	8	6	2	—	145	
	di cui nubili	—	—	2	—	1	3	3	3	3	2	2	2	—	1	2	—	—	26	
	COMPLESSO	6	15	27	47	205	418	644	870	1.009	967	937	859	581	434	237	62	15	7.333	
	di cui nubili	5	13	14	20	39	84	118	152	166	144	140	128	74	66	33	12	3	1.211	

(a) Esclusa l'età ignota.

Segue: Tav. 4 — Femmine morte per tumori degli organi genitali e delle mammelle per età e stato civile. (a)

Numeri dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE STATO CIVILE	Meno di 15 anni	Anno																	TOTALE
			15-19 anni	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	65-69 anni	70-74 anni	75-79 anni	80-84 anni	85-89 anni	90 anni e più		
<b>Anno 1946</b>																				
48	Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	1	10	4	22	85	176	265	436	547	554	467	416	292	184	89	17	3	3.568	
	di cui nubili	—	9	—	7	23	22	25	53	64	61	50	38	24	17	4	1	1	399	
49	Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	6	1	9	6	19	18	37	48	75	82	70	70	58	40	21	4	2	566	
	di cui nubili	4	1	7	—	4	5	11	12	15	15	9	12	5	3	2	1	—	106	
50	Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	—	—	—	10	56	128	231	337	370	344	366	309	302	205	131	46	8	2.843	
	di cui nubili	—	—	—	3	11	22	59	75	89	77	76	55	51	36	16	11	1	582	
56 abc	Tumori non maligni degli organi genitali della donna	—	1	5	10	38	58	98	110	69	22	32	23	28	15	9	3	—	521	
	di cui nubili	—	1	2	6	6	13	13	25	10	5	8	5	4	4	1	1	—	104	
57 abc	Tumori degli organi genitali della donna, il cui carattere maligno o non maligno non è specificato	2	1	1	1	7	4	4	11	8	4	8	14	9	3	5	1	—	83	
	di cui nubili	1	1	—	1	2	1	—	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	12	
	COMPLESSO	9	13	19	49	205	384	635	942	1.069	1.006	943	832	689	447	255	71	13	7.581	
	di cui nubili	5	12	9	17	46	63	108	166	179	158	143	110	85	61	25	14	2	1.203	
<b>Anno 1947</b>																				
48	Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	5	1	10	19	77	188	347	437	487	474	548	445	288	218	83	27	7	3.661	
	di cui nubili	5	1	6	7	15	32	39	53	55	67	58	52	31	19	10	—	—	450	
49	Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	4	7	13	7	17	19	45	74	78	81	86	78	62	44	21	6	—	642	
	di cui nubili	4	7	10	3	8	2	14	17	14	19	12	10	9	7	1	2	—	139	
50	Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	2	—	3	17	52	160	236	324	375	386	378	344	331	236	147	65	17	3.073	
	di cui nubili	2	—	2	4	16	44	50	72	80	87	80	60	61	48	23	9	2	640	
56 abc	Tumori non maligni degli organi genitali della donna	1	2	13	11	29	78	89	97	60	38	23	29	18	13	9	8	1	519	
	di cui nubili	1	2	6	5	9	9	16	18	15	9	4	9	2	—	1	2	—	108	
57 abc	Tumori degli organi genitali della donna, il cui carattere maligno o non maligno non è specificato	1	—	1	2	1	5	9	7	5	12	8	7	6	3	5	—	—	72	
	di cui nubili	1	—	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	11	
	COMPLESSO	13	10	40	56	176	450	726	939	1.005	991	1.043	903	705	514	265	106	25	7.967	
	di cui nubili	13	10	24	20	49	88	121	161	164	183	155	131	104	74	36	13	2	1.348	
<b>Anno 1948</b>																				
48	Cancro ed altri tumori maligni dell'utero	2	2	10	35	74	184	291	397	523	545	494	441	336	175	92	28	1	3.630	
	di cui nubili	2	2	6	8	7	23	35	48	58	70	53	43	31	21	4	2	—	413	
49	Cancro ed altri tumori maligni degli altri organi genitali della donna	3	1	2	9	15	33	46	75	71	87	101	69	65	49	21	2	—	649	
	di cui nubili	3	1	—	5	4	10	9	15	23	20	16	9	10	—	5	—	—	130	
50	Cancro ed altri tumori maligni delle mammelle	—	1	3	8	53	163	238	322	403	428	410	356	314	231	133	66	9	3.138	
	di cui nubili	—	1	2	7	30	54	65	87	94	72	50	62	50	26	10	—	—	612	

PARTE III — DISTRIBUZIONE PER MESE DI MORTE

Tav. 5 — Morti in complesso distinti per mese, per alcune cause e gruppi di cause

Table with columns for 'Numeri dell'Elenco nosologico', 'CAUSE DI MORTE', and months from 'Gennaio' to 'Dicembre', plus 'ANNO'. It contains three sub-tables for the years 1943, 1944, and 1945, listing various causes of death and their corresponding monthly and annual counts.

(a) Compresi i gangli tracheo-bronchiali. — (b) Due anni ed oltre.

Segue: Tav. 5 — Morti in complesso distinti per mese, per alcune cause e gruppi di cause

Table with columns for 'Numeri dell'Elenco nosologico', 'CAUSE DI MORTE', and months from 'Gennaio' to 'Dicembre', plus 'ANNO'. It contains three sub-tables for the years 1946, 1947, and 1948, continuing the list of causes of death and their monthly and annual counts.

(a) Compresi i gangli tracheo-bronchiali. — (b) Due anni ed oltre.

PARTE IV — MORTI NEL PRIMO ANNO DI VITA

Tav. 6 - Morti nel primo anno di vita, in complesso e per alcuni gruppi di cause, per mese — Regioni

Anno 1943

REGIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO	Quozienti per 10.000 nati vivi
<b>COMPLESSO</b>														
Piemonte	312	293	322	286	237	287	431	437	374	296	263	268	3.806	889,1
Valle d'Aosta	17	18	21	16	12	14	21	19	11	16	8	6	1.060,4	1.060,4
Lombardia	966	897	775	657	619	941	1.571	1.615	1.151	842	683	637	11.354	1.129,2
Trentino-Alto Adige	132	114	117	123	98	87	110	174	171	131	101	89	1.447	942,6
Veneto	723	554	487	379	371	421	513	518	391	391	499	433	5.680	688,5
Friuli-Venezia Giulia	160	143	96	79	72	75	135	133	111	106	87	99	1.296	728,6
Liguria	111	86	113	75	77	87	134	121	91	104	113	108	1.220	774,5
Emilia-Romagna	453	325	392	325	282	245	312	337	306	324	278	306	3.885	680,8
Toscana	399	306	252	230	210	268	336	310	218	227	262	270	3.288	678,4
Umbria	114	103	137	96	65	56	109	103	71	76	104	94	1.128	747,6
Marche	216	207	203	147	117	116	156	202	152	177	146	154	1.993	770,3
Lazio	604	459	427	315	414	617	615	500	409	402	405	383	5.550	931,7
Abruzzi e Molise	413	411	380	290	219	376	634	475	340	308	313	266	4.425	1.351,1
Campania	1.152	1.156	1.052	888	1.413	1.649	2.027	1.677	1.344	1.512	1.158	1.008	16.036	1.594,1
Puglia	1.192	971	898	758	1.199	1.513	1.402	1.073	804	903	818	812	12.343	1.579,5
Basilicata	193	213	220	156	170	275	409	291	188	191	165	126	2.597	1.864,1
Calabria	513	477	529	471	427	710	1.064	918	570	518	551	426	7.174	1.476,4
Sicilia	1.058	924	903	848	1.087	1.383	1.915	1.680	1.467	1.306	1.059	888	14.518	1.533,2
Sardegna	287	248	187	175	147	318	359	402	426	303	397	226	3.575	1.157,0
ITALIA	9.015	7.905	7.511	6.314	7.236	9.438	12.253	10.985	8.595	8.233	7.410	6.599	101.494	1.150,6
<b>Malattie dell'apparato respiratorio (a)</b>														
Piemonte	101	111	134	95	51	50	41	47	47	45	56	60	838	195,8
Valle d'Aosta	7	10	8	7	4	3	1	4	2	8	3	1	58	342,6
Lombardia	399	398	304	226	147	168	195	142	166	129	150	146	2.570	255,6
Trentino-Alto Adige	36	46	42	37	12	16	11	10	18	12	7	14	261	170,0
Veneto	258	221	162	107	85	91	65	59	47	56	99	84	1.334	161,7
Friuli-Venezia Giulia	61	64	42	22	18	14	17	13	5	15	24	24	310	174,3
Liguria	40	38	29	19	22	24	22	14	14	18	13	13	292	185,4
Emilia-Romagna	116	119	141	85	58	43	49	46	28	39	57	52	833	146,0
Toscana	148	106	66	54	54	33	42	36	26	28	42	48	683	140,9
Umbria	28	27	44	20	16	11	10	2	9	18	11	11	202	133,9
Marche	59	80	58	50	26	25	21	15	18	18	12	12	408	157,7
Lazio	233	166	124	70	79	89	76	69	59	42	65	63	1.135	190,5
Abruzzi e Molise	119	126	127	78	49	62	46	48	47	32	48	30	812	247,9
Campania	409	531	473	307	289	269	339	336	371	351	256	239	4.170	414,5
Puglia	471	427	378	281	309	322	293	213	162	169	176	184	3.385	433,2
Basilicata	86	114	108	73	43	60	48	34	30	39	36	41	712	511,1
Calabria	180	182	229	174	154	196	167	102	104	117	100	100	1.859	382,6
Sicilia	369	386	372	256	239	235	252	243	256	202	185	160	3.155	333,2
Sardegna	103	97	60	60	31	58	42	57	52	52	61	37	710	229,8
ITALIA	3.223	3.249	2.911	2.031	1.683	1.721	1.773	1.577	1.449	1.364	1.427	1.319	23.727	269,0
<b>Malattie dell'apparato digerente (b)</b>														
Piemonte	28	31	36	28	48	109	248	235	168	97	34	33	1.095	255,8
Valle d'Aosta	1	2	1	2	2	5	11	10	6	5	1	1	47	278,4
Lombardia	82	65	54	70	128	403	911	1.013	598	335	173	109	3.941	392,0
Trentino-Alto Adige	9	10	16	15	14	15	57	113	90	60	35	19	453	295,1
Veneto	39	27	29	51	51	211	221	126	100	72	44	44	1.063	128,8
Friuli-Venezia Giulia	19	13	9	8	10	13	72	78	54	40	25	13	353	198,5
Liguria	8	5	8	4	15	30	66	56	28	29	25	16	291	184,7
Emilia-Romagna	26	15	21	23	32	31	63	111	100	89	33	28	572	100,2
Toscana	22	19	12	19	34	98	145	131	70	63	29	34	676	139,5
Umbria	6	7	4	3	6	14	42	49	38	17	15	15	218	144,5
Marche	19	9	10	8	16	26	61	98	63	57	30	14	411	158,9
Lazio	40	38	35	35	126	279	272	202	136	137	106	75	1.481	248,6
Abruzzi e Molise	43	37	23	26	47	177	411	267	144	133	97	56	1.461	446,1
Campania	142	87	92	164	644	929	1.134	851	520	651	416	255	5.885	585,0
Puglia	147	88	87	105	446	694	648	457	305	323	245	195	3.740	478,6
Basilicata	10	15	14	18	55	126	250	168	89	81	46	20	892	640,3
Calabria	67	43	37	47	79	280	515	430	261	175	138	94	2.166	445,8
Sicilia	126	105	104	182	388	676	1.033	919	696	619	405	284	5.537	584,7
Sardegna	29	27	18	25	37	137	193	205	219	208	155	54	1.307	423,0
ITALIA	863	643	610	811	2.178	4.156	6.343	5.614	3.711	3.219	2.082	1.359	31.589	358,1
<b>Malattie della prima infanzia e vizi di conformazione congeniti (c)</b>														
Piemonte	143	109	107	116	92	98	105	112	130	122	135	136	1.405	328,2
Valle d'Aosta	4	5	9	5	6	6	6	1	3	2	3	4	52	308,1
Lombardia	359	303	280	253	238	319	313	266	274	281	278	278	3.420	340,1
Trentino-Alto Adige	64	38	48	52	51	34	38	51	48	39	45	45	553	360,2
Veneto	307	228	212	177	170	148	176	172	155	171	250	230	2.396	290,4
Friuli-Venezia Giulia	53	36	31	32	36	31	36	34	35	34	38	49	445	250,2
Liguria	48	31	44	30	30	26	30	32	35	46	53	58	463	293,9
Emilia-Romagna	237	151	155	160	139	123	147	135	128	162	148	181	1.866	327,0
Toscana	189	143	141	115	79	101	113	92	88	112	159	148	1.480	305,3
Umbria	65	57	73	55	26	26	40	28	27	42	51	54	544	360,6
Marche	103	88	98	68	50	51	43	61	48	66	70	97	843	325,8
Lazio	239	174	171	145	136	144	140	139	112	136	154	181	1.871	314,1
Abruzzi e Molise	173	170	148	139	77	68	110	98	89	77	100	110	1.359	414,9
Campania	363	322	255	224	263	241	245	205	166	237	244	270	3.035	301,7
Puglia	403	324	293	254	291	318	296	181	197	237	217	275	3.286	420,5
Basilicata	70	60	64	43	50	54	74	52	38	50	55	45	655	470,1
Calabria	182	170	190	151	108	174	192	162	119	128	156	146	1.878	386,5
Sicilia	425	318	320	287	329	337	408	341	371	345	351	334	4.166	440,0
Sardegna	117	89	77	68	54	82	88	91	100	100	129	90	1.085	351,1
ITALIA	3.544	2.816	2.716	2.373	2.224	2.329	2.602	2.287	2.158	2.389	2.633	2.731	30.802	349,2

(a) Dal 104 al 114 dell'Elenco nosologico. — (b) Dal 115 al 129 dell'Elenco nosologico. — (c) Dal 157 al 161 dell'Elenco nosologico.

Segue: Tav. 6 — Morti nel primo anno di vita, in complesso e per alcuni gruppi di cause, per mese — Regioni

Anno 1944

REGIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO	Quozienti per 10.000 nati vivi
---------	---------	----------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------	----------	----------	------	--------------------------------

Segue: Tav. 6 — Morti nel primo anno di vita, in complesso e per alcuni gruppi di cause, per mese — Regioni

Anno 1945

REGIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO	Quozienti per 10.000 nati vivi
<b>COMPLESSO</b>														
Piemonte	317	315	265	214	227	238	318	244	187	200	193	230	2.948	816,3
Valle d'Aosta	18	22	20	14	14	9	16	13	7	10	12	9	164	1.243,4
Lombardia	997	943	754	535	665	953	1.405	939	584	587	549	660	9.571	1.052,1
Trentino-Alto Adige	136	128	127	88	94	77	179	146	99	84	83	97	1.338	1.113,2
Veneto	619	596	573	380	414	460	463	328	346	356	385	478	5.398	805,3
Friuli-Venezia Giulia	119	152	147	85	70	65	90	74	74	79	65	85	1.105	760,8
Liguria	145	119	143	77	85	92	107	74	54	73	89	116	1.174	840,3
Emilia-Romagna	541	446	414	324	434	402	379	253	247	271	305	361	4.377	938,2
Toscana	441	372	365	246	226	195	246	211	208	231	235	308	3.284	752,7
Umbria	117	114	119	92	59	62	70	56	61	66	77	97	990	796,1
Marche	218	234	200	143	121	109	154	156	139	115	121	149	1.859	801,0
Lazio	568	443	366	284	272	376	496	409	324	343	317	363	4.561	896,6
Abruzzi e Molise	338	345	328	212	174	252	385	318	202	194	230	271	3.249	1.077,9
Campania	1.008	927	856	624	700	1.036	1.161	991	768	789	783	974	10.617	1.179,8
Puglia	1.298	1.049	834	607	830	1.124	1.230	958	706	760	761	783	10.940	1.320,1
Basilicata	205	199	198	136	119	192	252	184	152	159	153	146	2.095	1.580,8
Calabria	539	449	367	296	298	439	655	627	454	406	365	429	5.324	1.162,9
Sicilia	981	853	712	588	710	1.185	1.324	938	967	1.022	875	1.022	11.615	1.192,2
Sardegna	315	277	198	155	150	285	357	351	336	326	374	325	3.449	1.085,8
ITALIA	8.920	7.983	6.986	5.100	5.662	7.551	9.423	7.656	5.886	6.016	6.119	6.756	84.058	1.030,5

Malattie dell'apparato respiratorio (a)

Piemonte	112	124	97	60	46	45	36	33	23	39	37	58	710	196,6
Valle d'Aosta	4	9	10	6	1	1	6	2	2	3	3	2	49	371,5
Lombardia	383	419	285	162	140	111	117	91	94	111	129	189	2.231	245,2
Trentino-Alto Adige	46	46	42	25	22	11	11	10	8	18	19	16	274	228,0
Veneto	160	224	246	126	89	51	42	35	48	67	76	90	1.254	187,1
Friuli-Venezia Giulia	36	60	70	21	24	3	9	7	8	13	8	17	276	190,0
Liguria	47	37	44	18	24	13	8	11	5	13	15	29	264	189,0
Emilia-Romagna	126	137	136	83	96	36	56	37	53	50	62	68	940	201,5
Toscana	119	115	138	63	54	21	34	28	18	33	33	56	712	163,2
Umbria	28	38	45	25	12	9	12	4	10	8	9	12	212	170,5
Marche	52	76	83	35	35	10	19	16	16	10	22	19	393	169,3
Lazio	180	167	96	61	41	41	42	40	37	53	44	71	873	171,6
Abruzzi e Molise	87	96	94	48	33	25	44	28	25	32	33	56	601	218,2
Campania	318	332	265	177	157	146	143	152	143	145	194	327	2.499	239,6
Puglia	528	401	269	209	244	224	236	186	119	159	173	204	2.952	356,2
Basilicata	88	83	70	37	34	24	31	29	24	32	35	33	520	392,4
Calabria	197	171	132	86	62	88	84	86	78	78	112	112	1.248	272,6
Sicilia	359	323	274	180	160	193	240	236	182	195	197	229	2.768	284,1
Sardegna	105	113	76	59	46	49	63	49	53	60	58	91	822	258,8
ITALIA	2.975	2.971	2.472	1.481	1.320	1.101	1.233	1.080	941	1.120	1.225	1.679	19.598	240,3

Malattie dell'apparato digerente (b)

Piemonte	42	27	34	37	47	81	160	93	67	44	29	17	678	187,7
Valle d'Aosta	2	4	4	3	3	3	7	5	1	1	—	3	33	250,2
Lombardia	73	53	72	65	183	514	881	483	243	149	90	55	2.861	314,5
Trentino-Alto Adige	10	10	11	10	15	26	113	85	45	20	15	17	377	313,7
Veneto	36	48	30	36	69	192	234	122	87	46	46	43	989	147,6
Friuli-Venezia Giulia	11	10	13	6	9	19	45	31	25	13	9	3	194	133,6
Liguria	19	13	20	13	18	45	70	25	13	13	17	14	280	200,4
Emilia-Romagna	49	33	39	32	117	190	159	82	47	42	27	25	842	180,5
Toscana	33	27	25	35	20	48	62	40	53	40	33	19	435	99,7
Umbria	7	6	7	5	16	23	16	8	11	9	8	13	123	98,9
Marche	24	15	9	19	16	30	58	68	42	21	13	13	328	141,3
Lazio	55	48	29	28	49	150	230	154	106	79	65	54	1.047	205,8
Abruzzi e Molise	38	43	35	30	32	104	190	146	80	59	52	41	850	308,7
Campania	115	79	100	81	203	508	590	472	278	217	161	130	2.934	281,3
Puglia	150	115	111	106	244	551	614	425	268	244	231	168	3.227	389,4
Basilicata	19	17	22	17	34	103	147	98	70	53	41	25	646	487,4
Calabria	62	43	53	49	80	190	357	321	192	140	100	94	1.681	367,2
Sicilia	118	100	75	109	227	609	768	656	405	365	370	231	4.033	414,0
Sardegna	45	32	22	20	35	132	169	162	143	117	143	68	1.088	342,5
ITALIA	908	723	707	704	1.406	3.511	4.877	3.484	2.173	1.674	1.451	1.028	22.646	277,6

Malattie della prima infanzia e vizi di conformazione congeniti (c)

Piemonte	123	134	87	84	103	77	88	82	88	88	119	119	1.168	323,4
Valle d'Aosta	10	7	10	3	8	4	7	6	4	5	6	4	69	523,1
Lombardia	409	370	285	227	261	236	279	253	185	227	241	325	3.298	362,5
Trentino-Alto Adige	54	48	40	37	34	25	28	25	30	31	39	52	443	368,6
Veneto	340	261	226	150	169	159	124	115	144	176	208	264	2.336	348,5
Friuli-Venezia Giulia	48	55	37	36	31	31	22	23	23	37	36	54	433	298,1
Liguria	62	50	70	33	33	18	21	24	15	34	49	54	463	331,4
Emilia-Romagna	273	201	183	140	154	124	111	106	109	119	172	217	1.909	409,2
Toscana	233	189	154	118	116	100	117	109	110	135	143	187	1.711	392,2
Umbria	55	56	51	46	33	34	25	23	26	37	50	66	502	403,7
Marche	112	104	88	68	44	48	43	47	60	57	71	100	842	362,8
Lazio	219	139	151	134	126	118	139	134	123	159	183	178	1.784	350,7
Abruzzi e Molise	133	123	128	82	75	75	62	89	56	73	97	124	1.117	405,6
Campania	382	342	303	225	184	193	246	213	186	257	282	335	3.148	301,8
Puglia	407	382	327	192	240	222	247	208	229	267	251	295	3.267	394,2
Basilicata	73	68	82	55	38	40	51	37	39	59	53	66	661	498,8
Calabria	197	171	127	103	111	105	135	141	111	122	130	162	1.615	352,8
Sicilia	403	322	295	223	245	279	335	309	258	301	341	316	3.627	372,3
Sardegna	117	90	63	57	37	75	83	82	97	107	129	111	1.048	329,9
ITALIA	3.650	3.112	2.707	2.013	2.042	1.963	2.158	2.032	1.887	2.291	2.552	3.034	29.441	360,9

(a) Dal 104 al 114 dell'Elenco nosologico. — (b) Dal 115 al 129 dell'Elenco nosologico. — (c) Dal 157, al 161 dell'Elenco nosologico.

Segue: Tav. 6 — Morti nel primo anno di vita, in complesso e per alcuni gruppi di cause, per mese — Regioni

Anno 1946

REGIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO	Quozienti per 10.
---------	---------	----------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---------	----------	----------	------	-------------------

Segue: Tav. 6 — Morti nel primo anno di vita, in complesso e per alcuni gruppi di cause, per mese — Regioni  
Anno 1947

REGIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO	Quozienti per 10.000 nati vivi
<b>COMPLESSO</b>														
Piemonte . . . . .	303	340	399	308	235	229	272	266	212	211	223	189	3.187	687,1
Valle d'Aosta . . . . .	7	18	14	11	9	7	9	11	12	5	6	11	120	757,1
Lombardia . . . . .	1.097	1.203	1.269	729	601	824	1.479	1.134	709	688	629	692	11.054	968,7
Trentino-Alto Adige . . . . .	134	137	151	105	77	71	73	84	91	90	79	79	1.171	785,0
Veneto . . . . .	848	817	704	382	352	419	474	436	341	378	357	469	5.977	711,8
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	211	157	132	68	62	62	84	80	78	106	73	84	1.197	664,0
Liguria . . . . .	142	136	140	113	83	80	124	111	88	89	59	84	1.249	611,3
Emilia-Romagna . . . . .	587	613	705	381	303	276	304	336	245	296	228	320	4.594	731,5
Toscana . . . . .	441	446	396	257	176	190	222	246	222	206	201	292	3.295	614,7
Umbria . . . . .	145	193	193	95	46	43	66	71	58	83	67	86	1.146	756,5
Marche . . . . .	231	255	291	142	101	92	139	164	140	130	106	152	1.943	728,0
Lazio . . . . .	640	587	458	317	283	322	406	452	382	414	368	431	5.060	714,5
Abruzzi e Molise . . . . .	433	495	480	294	270	399	546	345	246	250	281	322	4.361	1.091,0
Campania . . . . .	1.073	1.009	929	693	761	1.279	1.280	970	758	772	726	843	11.093	928,1
Puglia . . . . .	1.265	1.120	708	610	967	1.234	918	641	501	569	605	697	9.835	1.060,0
Basilicata . . . . .	201	268	222	140	158	254	255	152	106	150	121	152	2.179	1.228,8
Calabria . . . . .	656	550	418	376	342	566	663	500	366	442	415	560	5.854	927,5
Sicilia . . . . .	999	1.037	800	573	644	849	843	734	673	868	811	897	9.728	834,0
Sardegna . . . . .	223	208	220	188	142	101	136	142	152	224	223	202	2.161	650,1
ITALIA . . . . .	9.636	9.589	8.629	5.782	5.612	7.297	8.293	6.875	5.380	5.971	5.578	6.562	85.204	842,4

## Malattie dell'apparato respiratorio (a)

Piemonte . . . . .	85	125	175	106	40	19	33	25	28	32	45	40	753	162,3
Valle d'Aosta . . . . .	4	9	13	7	6	2	3	3	2	1	2	—	296,5	
Lombardia . . . . .	383	536	561	195	114	117	120	94	85	128	119	173	2.625	230,0
Trentino-Alto Adige . . . . .	50	52	60	20	14	5	10	4	9	7	4	13	248	166,3
Veneto . . . . .	358	398	296	108	48	49	43	51	27	38	54	103	1.573	187,3
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	93	69	31	15	11	11	4	7	7	9	16	20	293	162,5
Liguria . . . . .	45	54	59	29	12	11	10	12	11	14	5	14	276	135,1
Emilia-Romagna . . . . .	168	227	302	90	46	46	30	53	17	32	35	46	1.092	173,9
Toscana . . . . .	117	177	147	61	30	22	30	15	16	23	16	38	692	129,1
Umbria . . . . .	34	74	79	39	9	5	6	9	6	11	9	11	292	192,8
Marche . . . . .	46	70	124	38	21	12	16	23	12	14	7	19	402	150,6
Lazio . . . . .	255	222	171	79	53	49	43	54	42	44	48	73	1.133	160,0
Abruzzi e Molise . . . . .	115	200	191	62	44	38	30	24	21	37	50	51	863	215,9
Campania . . . . .	372	433	386	216	164	183	159	156	136	165	172	207	2.749	230,0
Puglia . . . . .	477	517	284	174	208	161	133	98	111	133	187	187	2.691	290,0
Basilicata . . . . .	72	146	99	41	37	33	30	23	24	23	30	35	593	334,4
Calabria . . . . .	211	216	147	110	81	80	84	81	64	89	118	141	1.422	225,3
Sicilia . . . . .	400	562	345	182	150	158	158	124	114	150	140	230	2.713	232,6
Sardegna . . . . .	65	83	99	60	36	28	30	33	20	26	26	46	552	166,1
ITALIA . . . . .	3.350	4.170	3.569	1.632	1.124	1.076	997	924	739	954	1.027	1.447	21.009	207,7

## Malattie dell'apparato digerente (b)

Piemonte . . . . .	34	20	33	39	40	66	103	105	64	48	27	20	599	129,1
Valle d'Aosta . . . . .	1	1	—	—	—	2	7	3	3	—	—	1	19	119,9
Lombardia . . . . .	83	79	102	93	133	349	873	607	266	160	113	92	2.950	258,5
Trentino-Alto Adige . . . . .	10	14	14	12	11	17	19	38	32	22	10	10	209	140,1
Veneto . . . . .	45	26	41	29	54	135	184	163	80	64	49	39	909	108,3
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	13	14	14	4	7	6	35	27	22	31	10	7	190	105,4
Liguria . . . . .	12	12	11	17	17	17	41	37	27	26	12	5	234	114,5
Emilia-Romagna . . . . .	46	48	39	33	41	47	73	112	93	76	33	27	668	106,4
Toscana . . . . .	17	14	19	16	12	25	58	92	74	55	28	27	437	81,5
Umbria . . . . .	8	12	6	4	3	5	24	24	15	21	13	9	144	95,1
Marche . . . . .	17	14	16	7	7	15	37	66	48	47	15	20	309	115,8
Lazio . . . . .	45	39	33	42	35	96	190	177	145	166	100	72	1.140	161,0
Abruzzi e Molise . . . . .	35	36	44	48	75	228	343	182	94	71	82	67	1.305	326,5
Campania . . . . .	113	89	104	107	273	735	685	436	276	238	159	134	3.349	280,2
Puglia . . . . .	149	106	86	142	440	694	455	236	170	192	180	148	2.998	323,1
Basilicata . . . . .	20	13	25	21	61	151	144	65	39	68	35	33	675	380,6
Calabria . . . . .	75	56	61	49	91	259	332	221	104	123	84	97	1.552	245,9
Sicilia . . . . .	92	73	83	96	172	351	358	254	197	291	250	209	2.426	208,0
Sardegna . . . . .	21	18	25	15	24	26	31	38	49	98	89	42	476	143,2
ITALIA . . . . .	836	684	756	774	1.496	3.224	3.992	2.883	1.798	1.797	1.290	1.059	20.589	203,6

## Malattie della prima infanzia e vizi di conformazione congeniti (c)

Piemonte . . . . .	140	143	130	119	128	115	106	110	105	126	112	103	1.431	308,5
Valle d'Aosta . . . . .	2	6	—	4	2	2	1	5	6	4	4	10	46	290,2
Lombardia . . . . .	490	434	411	309	282	278	365	346	277	310	309	339	4.150	363,7
Trentino-Alto Adige . . . . .	55	59	57	53	48	38	35	36	43	47	51	49	571	382,8
Veneto . . . . .	333	302	267	188	184	183	185	168	179	221	192	261	2.663	317,2
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	54	56	59	35	29	31	36	36	40	45	35	45	501	277,9
Liguria . . . . .	70	55	48	53	39	47	55	51	36	38	53	53	583	285,3
Emilia-Romagna . . . . .	283	249	257	203	163	132	161	135	105	156	138	205	2.187	348,2
Toscana . . . . .	258	203	176	147	107	117	105	120	112	108	139	190	1.782	332,4
Umbria . . . . .	91	82	76	43	25	31	33	24	30	41	39	55	570	376,3
Marche . . . . .	130	136	111	75	57	53	66	54	67	55	59	89	952	356,7
Lazio . . . . .	252	224	169	127	135	126	111	133	136	158	171	217	1.967	277,8
Abruzzi e Molise . . . . .	206	179	157	127	122	102	116	95	93	102	110	151	1.560	390,3
Campania . . . . .	391	275	266	235	187	204	239	211	206	232	250	356	3.052	255,4
Puglia . . . . .	483	361	231	206	212	218	201	185	161	197	211	276	2.942	317,1
Basilicata . . . . .	79	76	64	56	42	54	55	47	29	46	44	58	650	366,5
Calabria . . . . .	287	188	138	140	104	129	158	115	121	162	160	262	1.964	311,2
Sicilia . . . . .	398	309	273	212	241	255	241	276	273	307	348	359	3.492	299,4
Sardegna . . . . .	97	85	62	79	58	27	58	47	66	75	89	92	835	251,2
ITALIA . . . . .	4.099	3.422	2.952	2.411	2.165	2.142	2.335	2.194	2.077	2.409	2.513	3.179	31.898	315,4

(a) Dal 104 al 114 dell'Elenco nosologico. — (b) Dal 115 al 129 dell'Elenco nosologico. — (c) Dal 157 al 161 dell'Elenco nosologico.

Tav. 7 — Morti e mortalità nel primo Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	CAUSE DI MORTE: (a)	Meno di 1 mese		1 mese		2 mesi		3 mesi		4 mesi		5 mesi	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
1, 2	Febbre tifoide e paratifoide	2	1	2	1	—	—	3	1	1	—	2	2
8	Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Pertosse	37	20	93	48	85	50	86	50	79	34	64	30
10	Difterite	26	10	18	4	14	5	13	6	10	4	23	13
13	Tubercolosi dell'apparato respiratorio	4	2	4	2	8	4	10	10	10	3	16	3
14 - 22	Tutte le altre forme di tubercolosi	11	5	16	7	18	7	32	11	46	23	54	33
14	di cui per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale	9	4	12	6	11	4	22	6	39	21	48	29
28	Malaria (paludismo)	3	2	7	4	13	5	9	6	7	1	4	2
30	Sifilide	171	84	69	31	78	37	55	23	45	16	22	10
33	Influenza	124	59	115	43	86	35	89	40	75	37	73	36
35	Morbillo	2	—	3	1	1	—	3	1	11	6	13	6
39	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44	Altre malattie infettive e parassitarie	350	152	145	72	120	68	122	54	99	48	108	54
45 - 55	Cancro e altri tumori maligni	3	2	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—
56, 57	Tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato	4	4	3	2	1	1	1	1	1	—	4	3
61	Diabete zuccherino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58, 62 - 76, 78, 79	Avitaminosi, altre malattie generali e avvelenamenti cronici	124	57	71	34	62	31	84	39	63	32	69	23
81, 82	Meningite semplice e malattie del midollo spinale	36	18	32	8	46	15	70	21	70	27	80	30
83	Lesioni intra-craniche d'origine vascolare	1	1	6	5	7	1	5	3	2	2	2	—
80, 84 - 89	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	1.215	529	417	162	341	157	325	126	328	162	234	108
86	di cui per convulsioni	1.188	518	381	146	292	138	296	114	289	141	209	99
90 - 95	Malattie del cuore	40	12	37	14	31	11	23	11	25	6	14	3
96 - 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio	14	7	7	4	7	2	2	1	4	1	2	1
106	Bronchite	847	364	527	236	360	173	285	116	268	125	241	123
107 - 109	Polmoniti	2.952	1.231	2.350	989	1.911	849	1.796	802	1.626	738	1.538	675
104, 105, 110 - 114	Altre malattie dell'apparato respiratorio	73	27	38	18	19	9	30	17	20	9	26	8
119	Diarrea ed enteriti	2.268	1.008	2.656	1.202	3.144	1.401	3.330	1.541	3.155	1.438	2.927	1.329
121	Appendicite	2	1	2	1	4	2	—	—	2	2	1	—
124 - 127	Malattie del fegato e delle vie biliari	21	7	10	3	17	9	17	5	8	1	8	6
115 - 118, 122, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente	170	65	96	32	66	21	59	19	68	23	43	15
130 - 132	Nefriti	79	35	74	34	83	39	91	42	71	33	70	25
133 - 139	Altre malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale	10	7	14	7	7	5	8	5	8	5	7	3
151 - 156	Malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione	98	45	76	43	101	50	73	38	47	21	45	24
157	Vizi di conformazione congeniti	1.781	808	206	96	131	58	86	46	77	40	58	25
158	Debolezza congenita	8.713	3.960	1.470	712	925	454	722	337	505	248	285	146
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	9.633	4.265	399	174	131	63	73	38	28	15	18	6
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti)	882	339	4	—	3	—	—	—	—	—	1	1
161	Altre malattie particolari della prima infanzia	3.130	1.281	176	76	69	32	37	13	25	16	20	6
165	Infanticidio (b)	26	14	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
170	Accidenti d'automobile (tutti i veicoli a motore)	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—
169, 171 - 198	Morti violente o accidentali, escluso l'infanticidio	83	40	62	35	53	24	65	35	69	33	44	23
199, 200	Cause non specificate o mal definite	800	364	168	67	165	79	175	57	133	60	124	54
	COMPLESSO	33.735	14.826	9.374	4.168	8.109	3.699	7.782	3.517	6.988	3.210	6.242	2.826

a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci per le quali, nell'anno 1943, si verificarono casi di morte.  
 (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

anno di vita, per causa, età e sesso 1943

6 mesi	7 mesi	8 mesi	9 mesi	10 mesi	11 mesi	Totale			Quozienti per 10.000 nati vivi			Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)
						M	F	MF	M	F	MF	
2	1	1	1	1	1	7	11	18	0,2	0,3	0,2	1 2
—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	8
75	38	63	38	61	40	370	460	830	8,2	10,7	9,4	9
30	8	32	11	45	15	257	169	426	5,7	3,9	4,8	10
11	2	14	7	17	4	79	55	134	1,7	1,3	1,5	13
52	17	49	18	50	26	250	220	470	5,5	5,1	5,3	14 - 22
41	12	42	16	39	21	201	180	381	4,4	4,2	4,3	14
7	3	11	5	11	7	59	55	114	1,3	1,3	1,3	28
12	7	17	10	12	2	278	237	515	6,1	5,5	5,8	30
66	24	52	20	47	16	492	374	866	10,9	8,7	9,8	33
21	12	30	12	29	15	104	100	204	2,3	2,3	2,3	35
1	1	2	1	—	—	3	2	5	0,1	—	0,1	39
86	40	70	32	82	37	722	656	1.378	15,9	15,3	15,6	4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44
2	2	2	1	1	1	5	10	15	0,1	0,2	0,2	45 - 55
1	1	—	—	—	—	4	13	17	0,1	0,3	0,2	56, 57
—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	61
69	28	68	33	66	30	479	389	868	10,6	9,1	9,8	58, 62 - 76, 78, 79
87	46	76	39	53	21	414	296	710	9,1	6,9	8,0	81, 82
—	—	3	1	—	—	17	15	32	0,4	0,3	0,4	83
241	103	207	90	187	87	2.210	1.738	3.948	48,7	40,5	44,8	80, 84 - 89
228	98	187	84	174	83	2.045	1.606	3.651	45,1	37,5	41,4	86
27	11	18	9	21	3	187	96	283	4,1	2,2	3,2	90 - 95
5	3	5	2	4	3	34	33	67	0,7	0,8	0,8	96 - 103
202	87	178	94	189	100	1.898	1.671	3.569	41,9	39,0	40,5	106
1.440	667	1.349	643	1.312	628	10.890	8.895	19.785	240,2	207,5	224,3	107 - 109, 104, 105, 110 - 114
30	9	16	6	29	6	221	152	373	4,9	3,5	4,2	119
2.616	1.235	2.406	1.130	2.220	1.085	16.333	14.374	30.707	360,2	335,3	348,1	115 - 118, 122, 123, 128 129
1	1	1	—	1	—	10	8	18	0,2	0,2	0,2	121
10	4	11	9	7	4	71	57	128	1,2	1,3	1,5	124 - 127
45	16	40	19	38	12	472	264	736	10,4	6,2	8,3	130 - 132
72	35	57	30	63	37	439	422	861	9,7	9,8	9,8	133 - 139
5	3	6	4	11	7	38	64	102	0,8	1,5	1,2	151 - 156
31	18	42	17	44	20	323	315	638	7,1	7,3	7,2	157
51	26	44	19	36	15	1.382	1.162	2.544	30,5	27,1	28,8	158
221	118	181	81	141	75	7.198	6.317	13.515	158,8	147,3	153,2	159
13	3	11	5	3	1	5.749	4.578	10.327	126,8	106,8	117,1	160
—	—	2	2	1	1	550	344	894	12,1	8,0	10,1	161
22	13	10	4	10	3	2.068	1.454	3.522	45,6	33,9	39,9	165
—	—	1	1	—	—	12	17	29	0,3	0,4	0,3	169
1	—	—	—	—	—	2	4	6	—	—	—	170
55	30	52	25	54	21	361	342	703	8,0	8,0	8,0	171 - 198
103	58	91	49	93	51	1.149	981	2.130	25,3	22,9	24,1	199, 200
5.713	2.670	5.218	2.468	4.940	2.374	55.140	46.354	101.494	1.216,2	1.081,2	1.150,6	

Segue: Tav. 7 — Morti e mortalità nel primo Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	CAUSE DI MORTE (a)	Meno di 1 mese		1 mese		2 mesi		3 mesi		4 mesi		5 mesi	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
		1,2	Febbre tifoide e paratifoide . . . . .	4	2	1	—	1	—	1	—	—	—
8	Scarlattina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Pertosse . . . . .	39	24	68	47	64	30	72	42	59	27	55	42
10	Difterite . . . . .	56	25	30	12	20	7	14	9	22	10	25	10
13	Tubercolosi dell'apparato respiratorio . . . . .	2	2	4	1	9	4	8	3	4	2	9	6
14 - 22	Tutte le altre forme di tubercolosi . . . . .	4	3	12	6	15	6	34	14	47	23	37	14
14	di cui per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale . . . . .	3	2	11	5	8	2	26	11	41	20	29	11
28	Malaria (paludismo) . . . . .	2	1	3	2	3	2	6	3	2	1	5	3
30	Sifilide . . . . .	213	82	101	53	100	51	48	19	39	20	20	11
33	Influenza . . . . .	96	52	78	36	59	27	57	25	68	35	65	30
34	Vaiuolo . . . . .	7	2	5	1	5	—	6	4	4	3	1	1
35	Morbillo . . . . .	1	—	—	—	—	—	4	1	7	3	8	1
39	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	262	98	173	86	153	66	151	75	117	53	83	36
45 - 55	Cancro e altri tumori maligni . . . . .	5	2	2	—	—	—	4	1	4	3	2	1
56, 57	Tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato . . . . .	7	1	—	—	2	2	1	1	—	—	1	1
61	Diabete zuccherino . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
58, 62 - 76, 78, 79	Avitaminosi, altre malattie generali e avvelenamenti cronici . . . . .	102	42	72	37	78	40	63	29	77	30	74	36
81, 82	Meningite semplice e malattie del midollo spinale . . . . .	25	11	53	19	54	25	71	33	70	40	66	30
83	Lesioni intra-craniche d'origine vascolare . . . . .	4	3	3	2	1	—	—	—	3	1	4	1
80, 84 - 89	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi . . . . .	1.079	437	339	142	319	160	242	99	227	103	183	80
86	di cui per convulsioni . . . . .	1.061	428	322	136	291	152	224	92	200	92	166	73
90 - 95	Malattie del cuore . . . . .	40	21	21	12	19	7	13	8	10	4	13	4
96 - 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	10	6	7	4	4	—	4	2	—	—	1	—
106	Bronchite . . . . .	600	233	355	166	230	111	197	101	166	80	160	77
107 - 109	Poiloniti . . . . .	2.539	1.083	1.683	718	1.457	645	1.323	585	1.155	537	1.130	505
104, 105, 110 - 114	Altre malattie dell'apparato respiratorio . . . . .	49	17	30	12	31	19	17	6	15	5	18	4
119	Diarrea ed enteriti . . . . .	1.980	900	2.104	933	2.178	1.001	2.500	1.172	2.291	1.041	2.176	991
121	Appendicite . . . . .	2	—	—	—	2	—	2	1	2	1	—	—
124 - 127	Malattie del fegato e delle vie biliari . . . . .	7	1	3	2	2	—	3	—	4	2	—	—
115 - 118, 122, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente . . . . .	120	49	43	15	36	9	44	15	42	12	36	15
130 - 132	Nefriti . . . . .	38	15	54	26	52	18	58	25	37	22	41	19
133 - 139	Altre malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale . . . . .	6	4	10	7	5	2	6	3	8	2	5	5
151 - 156	Malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione . . . . .	54	32	56	28	92	44	74	42	41	21	40	22
157	Vizi di conformazione congeniti . . . . .	1.935	901	224	98	157	67	112	62	87	38	75	32
158	Debolezza congenita . . . . .	7.534	3.471	1.261	607	863	419	302	150	168	78	133	52
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti) . . . . .	9.429	4.286	374	181	131	69	64	36	33	18	16	6
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti) . . . . .	927	366	9	3	5	2	4	2	2	1	1	1
161	Altre malattie particolari della prima infanzia . . . . .	3.382	1.439	218	88	106	44	50	24	42	20	31	13
165	Infanticidio (b) . . . . .	20	10	1	—	3	1	—	—	1	1	—	—
170	Accidenti d'automobile (tutti i veicoli a motore) . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
169, 171 - 198	Morti violente o accidentali, escluso l'infanticidio . . . . .	154	58	57	29	49	26	58	21	58	28	42	21
199, 200	Cause non specificate o mal definite . . . . .	873	371	207	100	214	95	163	82	147	64	145	74
	COMPLESSO . . . . .	31.608	14.050	7.661	3.473	6.519	2.999	5.778	2.695	5.059	2.329	4.703	2.165

(a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci per le quali, nell'anno 1944, si verificarono casi di morte. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

anno di vita, per causa, età e sesso 1944

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	CAUSE DI MORTE (a)																						Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)
	6 mesi		7 mesi		8 mesi		9 mesi		10 mesi		11 mesi		Totale			Quozienti per 10.000 nati vivi							
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF	M	F	MF					
1,2	1	1	2	2	1	1	3	1	3	1	2	—	12	9	21	0,3	0,2	0,3	1,2				
8	1	1	—	—	1	1	2	1	2	2	—	—	1	5	6	—	0,1	0,1	8				
9	53	27	61	32	48	29	53	28	47	23	38	18	288	369	657	6,9	9,3	8,1	9				
10	33	17	48	21	63	32	67	33	87	41	94	41	301	258	559	7,2	6,5	6,9	10				
13	13	4	14	7	12	5	13	5	17	7	15	6	68	52	120	1,6	1,3	1,5	13				
14 - 22	43	19	48	24	57	24	49	22	34	15	35	19	223	189	412	5,3	4,8	5,1	14 - 22				
14	37	18	45	22	51	20	44	19	30	13	30	17	195	160	355	4,7	4,0	4,4	14				
28	10	8	8	4	5	2	7	4	9	1	9	5	33	36	69	0,8	0,9	0,8	28				
30	23	11	23	15	15	9	11	4	9	4	9	2	330	281	611	7,9	7,1	7,5	30				
33	54	28	59	26	50	22	40	12	40	17	37	17	376	327	703	9,0	8,3	8,6	33				
34	4	3	7	2	4	2	1	1	1	—	—	—	26	19	45	0,6	0,5	0,6	34				
35	10	6	16	5	17	6	16	7	17	8	21	8	72	45	117	1,7	1,1	1,4	35				
39	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	39				
4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44	87	44	81	42	81	49	81	37	57	34	59	30	735	650	1.385	17,5	16,4	17,0	4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44				
45 - 55	2	—	1	—	1	—	2	—	3	1	2	2	18	10	28	0,4	0,3	0,3	45 - 55				
56, 57	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	1	11	6	17	0,3	0,2	0,2	56, 57				
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	61				
58, 62 - 76, 78, 79	71	32	75	42	77	28	66	27	67	38	64	28	477	409	886	11,4	10,3	10,9	58, 62 - 76, 78, 79				
81, 82	80	35	63	32	72	30	58	32	55	21	52	28	383	336	719	9,1	8,5	8,8	81, 82				
83	1	1	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	10	10	20	0,2	0,3	0,2	83				
80, 84 - 89	149	62	129	66	134	57	106	52	116	61	87	45	1.746	1.364	3.110	41,6	34,5	38,2	80, 84 - 89				
86	136	56	113	57	118	49	95	47	99	53	71	38	1.623	1.273	2.896	38,7	32,2	35,5	86				
90 - 95	7	2	14	5	10	4	14	7	9	5	5	4	92	83	175	2,2	2,1	2,1	90 - 95				
96 - 103	2	1	2	1	3	1	2	2	4	2	2	1	21	20	41	0,5	0,5	0,5	96 - 103				
106	131	58	147	67	128	60	118	60	94	43	112	65	1.317	1.121	2.438	31,4	28,3	29,9	106				
107 - 109	1.095	492	1.032	480	1.026	488	877	424	835	373	763	367	8.218	6.697	14.915	196,0	169,3	183,1	107 - 109				
104, 105, 110 - 114	20	7	24	10	20	11	18	9	26	12	26	12	170	124	294	4,1	3,1	3,6	104, 105, 110 - 114				
119	1.879	928	1.846	860	1.735	826	1.641	799	1.664	807	1.370	687	12.419	10.945	23.364	296,2	276,7	286,8	119				
121	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	9	4	13	0,2	0,1	0,2	121				
124 - 127	3	1	2	—	—	—	2	2	2	—	1	—	21	8	29	0,5	0,2	0,4	124 - 127				
115 - 118, 122, 123, 128, 129	38	18	38	19	32	11	29	16	27	11	31	10	316	200	516	7,5	5,1	6,3	115 - 118, 122, 123, 128, 129				
130 - 132	45																						

Segue: Tav. 7 — Morti e mortalità nel primo Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	CAUSE DI MORTE (a)	Meno di 1 mese		1 mese		2 mesi		3 mesi		4 mesi		5 mesi	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
		1,2	Febbre tifoide e paratifoide	3	2	1	—	1	—	—	—	3	1
8	Scarlattina	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9	Pertosse	46	27	152	81	110	60	100	55	79	43	83	41
10	Difterite	64	35	30	11	13	2	21	12	17	3	27	10
13	Tubercolosi dell'apparato respiratorio	2	1	5	2	4	4	3	2	6	3	11	6
14 - 22	Tutte le altre forme di tubercolosi	13	5	14	5	18	8	38	18	33	17	36	19
14	di cui per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale.	10	5	9	4	12	6	26	12	23	9	33	18
28	Malaria (paludismo)	2	1	9	4	9	5	15	7	6	3	11	8
30	Sifilide	225	102	127	57	114	59	87	39	47	25	39	18
33	Influenza	119	61	96	45	69	34	48	15	43	19	42	14
34	Vaiuolo	23	8	20	10	11	5	8	2	5	4	3	2
35	Morbillo	2	—	3	2	3	—	3	1	2	—	10	6
39	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44	Altre malattie infettive e parassitarie	356	132	129	58	83	32	96	49	66	39	56	29
45 - 55	Cancro e altri tumori maligni	1	—	1	1	3	1	1	—	3	—	2	2
56, 57	Tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato	8	5	2	2	1	1	—	—	2	—	1	1
61	Diabete zuccherino	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58, 62 - 76, 78, 79, 81, 82,	Avitaminosi, altre malattie generali e avvelenamenti cronici	118	54	79	38	63	25	61	27	54	17	73	36
83	Meningite semplice e malattie del midollo spinale	37	17	47	16	56	27	70	28	63	33	46	12
80, 84 89	Lesioni intra-craniche d'origine vascolare	14	7	2	—	3	3	3	2	3	2	1	1
86	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	1.070	435	360	164	260	128	233	113	185	84	147	80
90 - 95	di cui per convulsioni	1.043	421	330	150	237	113	204	99	163	74	128	68
96 - 103	Malattie del cuore	50	21	37	18	35	16	31	21	28	10	17	9
104, 105, 110 - 114	Altre malattie dell'apparato circolatorio	12	4	5	3	6	4	3	1	3	2	4	3
106	Bronchite	728	329	378	181	267	123	191	102	144	59	145	76
107 - 109	Polmoniti	3.392	1.458	2.281	976	1.737	767	1.403	623	1.230	553	1.080	481
119	Altre malattie dell'apparato respiratorio	85	35	25	8	31	11	18	6	21	11	33	15
121	Diarrea ed enteriti	2.186	952	2.108	939	2.100	985	2.263	1.088	1.960	956	1.830	877
124 - 127	Appendicite	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—
115 - 118, 122, 123, 128, 129	Malattie del fegato e delle vie biliari	9	2	11	6	11	7	7	2	4	1	3	3
130 - 132	Altre malattie dell'apparato digerente	155	56	45	18	48	17	42	19	34	10	36	11
133 - 139	Nefriti	86	35	57	27	49	27	46	22	44	25	33	21
151 - 156	Altre malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale	10	3	8	4	8	4	5	3	9	6	11	8
157	Malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione	99	44	53	27	68	35	55	27	42	28	20	10
158	Vizi di conformazione congeniti	1.929	872	1.199	594	1.44	66	102	43	71	36	56	26
159	Debolezza congenita	8.450	3.849	1.230	590	786	386	358	171	219	102	114	55
160	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	10.180	4.672	397	191	133	77	59	29	28	13	12	7
161	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti)	743	296	12	5	2	2	1	1	3	2	2	1
165	Altre malattie particolari della prima infanzia	3.100	1.251	169	78	89	40	63	28	36	20	24	14
170	Infanticidio (b)	25	15	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—
169, 171 - 198	Accidenti d'automobile (tutti i veicoli a motore)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
199, 200	Morti violente o accidentali, escluso l'infanticidio	52	20	26	15	37	20	26	11	22	12	26	12
	Cause non specificate o mal definite	414	184	106	47	75	37	68	32	53	27	48	20
	COMPLESSO	33.810	14.992	8.225	3.723	6.452	3.019	5.529	2.599	4.572	2.167	4.084	1.934

(a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci per le quali, nell'anno 1945, si verificarono casi di morte. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

anno di vita, per causa, età e sesso.  
1945

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	6 mesi		7 mesi		8 mesi		9 mesi		10 mesi		11 mesi		Totale			Quozienti per 10.000 nati vivi			Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF	M	F	MF	
	1,2	—	—	3	2	1	1	—	—	1	1	2	—	9	7	16	0,2	0,2	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	3	—	—	—	8
9	73	38	84	53	75	44	65	33	65	37	68	38	450	550	1.000	10,7	13,9	12,3	9
10	31	11	43	21	60	24	56	26	78	46	76	35	290	236	516	6,7	6,0	6,3	10
13	11	5	10	5	15	6	11	7	12	7	21	12	51	60	111	1,2	1,5	1,4	13
14 - 22	38	16	35	15	48	15	56	29	48	27	46	25	224	199	423	5,3	5,0	5,2	14 - 22
14	29	12	31	13	45	14	49	24	42	23	38	19	188	159	347	4,5	4,0	4,3	14
28	3	1	13	7	6	2	10	4	5	—	9	2	54	44	98	1,3	1,1	1,2	28
30	34	13	21	6	14	7	15	9	14	9	10	7	396	351	747	9,4	8,9	9,2	30
33	48	28	41	16	50	27	24	14	42	28	36	25	332	326	658	7,9	8,2	8,1	33
34	7	4	6	5	4	1	4	1	2	2	—	—	49	44	93	1,2	1,1	1,1	34
35	10	7	11	6	15	6	15	5	25	15	14	6	59	54	113	1,4	1,4	1,4	35
39	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	39
4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44	53	19	62	20	66	29	59	21	50	29	52	18	653	475	1.128	15,6	12,0	13,8	4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44
45 - 55	2	1	2	1	6	3	3	—	1	1	—	—	15	10	25	0,4	0,3	0,3	45 - 55
56, 57	1	—	—	—	2	—	4	2	—	—	1	—	11	11	22	0,3	0,3	0,3	56, 57
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	61
58, 62 - 76, 78, 79, 81, 82,	79	31	76	35	62	36	80	36	75	39	56	25	477	399	876	11,4	10,1	10,7	58, 62 - 76, 78, 79
83	63	29	85	35	70	33	54	29	53	27	43	19	382	305	687	9,1	7,7	8,4	83
80, 84 89	3	2	1	1	5	3	3	1	2	2	2	—	18	24	42	0,4	0,6	0,5	80, 84 - 89
86	135	54	125	55	120	66	108	48	102	49	82	35	1.616	1.311	2.927	38,5	33,1	35,9	86
90 - 95	119	49	111	50	107	58	96	45	87	41	67	28	1.496	1.196	2.692	35,7	30,2	33,0	90 - 95
96 - 103	14	5	21	8	15	7	20	14	10	3	13	5	154	137	291	3,7	3,5	3,6	96 - 103
104, 105, 110 - 114	4	4	2	2	5	—	4	3	2	—	5	3	26	29	55	0,6	0,7	0,7	104, 105, 110 - 114
119	114	54	114	51	113	63	100	47	112	63	71	38	1.291	1.186	2.477	30,8	29,9	30,4	119
121	1.040	489	988	458	943	456	962	464	883	463	831	414	9.168	7.602	16.770	218,6	191,9	205,6	121
124 - 127	21	13	22	11	18	3	24	12	19	10	34	18	198	153	351	4,7	3,9	4,3	124 - 127
115 - 118, 122, 123, 128, 129	1.753	866	1.607	797	1.630	774	1.637	824	1.553	755	1.399	683	11.530	10.496	22.026	274,9	264,9	270,0	115 - 118, 122, 123, 128, 129
130 - 132	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	1	1	5	4	9	0,1	0,1	0,1	130 - 132
133 - 139	—	—	5	2	11	7	8	3	6	3	4	3	40	39	79	1,0	1,0	1,0	133 - 139
151 - 156	38	9	19	10	36	14	28	18	23	11	28	15	324	208	532	7,7	5,2	6,5	151 - 156
157	36	17	31	10	43	26	45	18	53	25	45	21	294	274	568	7,0	6,9	7,0	157
158	3	—	9	4	7	3	4	2	10	7									

Segue: Tav. 7. — Morti e mortalità nel primo Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	CAUSE DI MORTE (a)	Meno di 1 mese		1 mese		2 mesi		3 mesi		4 mesi		5 mesi	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
1,2	Febbre tifoide e paratifoide	2	1	—	—	1	1	4	3	1	1	1	—
8	Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Pertosse	82	44	264	132	224	107	153	82	130	70	115	59
10	Difterite	65	27	37	17	20	10	11	5	13	8	27	14
13	Tubercolosi dell'apparato respiratorio	6	5	4	2	6	2	7	2	8	4	15	7
14 - 22	Tutte le altre forme di tubercolosi	9	5	30	10	18	5	30	12	33	13	46	23
14	di cui per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale	9	5	24	7	14	4	22	9	27	11	35	18
28	Malaria (paludismo)	2	1	6	4	9	5	11	5	5	3	3	1
30	Sifilide	256	126	112	54	126	53	77	34	63	34	26	12
33	Influenza	110	48	92	37	106	45	72	30	54	28	69	25
34	Vaiolo	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1
35	Morbillo	12	7	14	9	10	3	18	5	13	7	24	11
39	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44	Altre malattie infettive e parassitarie	484	196	205	97	148	74	129	55	97	53	95	39
45 - 55	Cancro e altri tumori maligni	7	2	5	3	2	—	3	2	2	1	4	1
56, 57	Tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato	4	3	1	1	5	3	4	1	2	1	1	1
61	Diabete zuccherino	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
58, 62 - 76, 78, 79	Avitaminosi, altre malattie generali e avvelenamenti cronici	137	54	85	36	66	25	76	25	56	25	75	31
81, 82	Meningite semplice e malattie del midollo spinale	48	22	65	25	86	39	82	30	85	42	66	34
83	Lesioni intra-craniche d'origine vascolare	2	1	7	3	9	4	4	1	4	1	3	1
80, 84 - 89	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	1.196	506	383	165	288	133	223	101	201	86	181	74
86	di cui per convulsioni	1.170	494	348	151	259	123	197	89	161	70	158	65
90 - 95	Malattie del cuore	74	37	51	25	18	6	31	15	21	11	17	8
96 - 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio	16	9	5	2	6	4	3	3	2	1	2	—
106	Bronchite	703	325	372	184	239	114	177	81	150	79	132	66
107 - 109	Polmoniti	3.600	1.536	2.513	1.071	1.954	864	1.582	688	1.323	608	1.166	582
104, 105, 110 - 114	Altre malattie dell'apparato respiratorio	80	33	38	19	28	12	22	6	9	2	19	9
119	Diarrea ed enteriti	2.240	1.003	2.138	966	2.180	997	2.106	996	1.974	910	1.762	851
121	Appendicite	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—
124 - 127	Malattie del fegato e delle vie biliari	12	3	7	3	8	1	6	2	4	1	4	1
115 - 118, 122, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente	169	60	52	13	57	21	43	10	52	21	34	19
130 - 132	Nefriti	59	29	53	21	41	14	38	17	40	23	32	15
133 - 139	Altre malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale	13	8	11	4	6	5	4	—	2	—	2	1
151 - 156	Malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione	91	40	44	16	66	33	51	15	39	17	18	9
157	Vizi di conformazione congeniti	2.340	1.053	297	135	200	98	141	62	91	43	80	35
158	Debolezza congenita	8.464	3.827	1.225	566	669	325	493	236	304	154	147	66
159	Nascita prematura (non compresi i natí morti)	12.792	5.677	422	205	144	76	52	25	38	21	22	13
160	Conseguenze del parto (non compresi i natí morti)	1.381	532	16	8	3	1	5	3	—	—	1	1
161	Altre malattie particolari della prima infanzia	3.156	1.322	156	64	49	24	36	14	28	13	17	9
165	Infanticidio (b)	19	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
170	Accidenti d'automobile (tutti i veicoli a motore)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189, 171 - 198	Morti violente o accidentali, escluso l'infanticidio	36	18	20	12	9	4	12	2	10	7	11	6
199, 200	Cause non specificate o mal definite	769	346	134	68	103	47	87	39	78	40	57	21
	COMPLESSO	38.441	16.921	8.870	3.979	6.904	3.155	5.793	2.607	4.933	2.328	4.278	2.046

(a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci per le quali, nell'anno 1946, si verificarono casi di morte. — (b), Cfr. la nota (b) a pag. 18.

anno di vita, per causa, età e sesso. 1946

		6 mesi		7 mesi		8 mesi		9 mesi		10 mesi		11 mesi		Totale			Quozienti per 10.000 nati vivi			Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF	M	F	MF		
		3	1	4	2	2	2	2	1	2	2	3	2	9	16	25	0,2	0,3	0,2	1,2	
		2	1	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	3	4	7	0,1	0,1	0,1	8	
		101	54	122	70	92	55	84	40	100	58	94	53	737	824	1.561	13,8	16,4	15,1	9	
		31	17	39	15	45	25	44	18	66	33	70	25	254	214	468	4,8	4,3	4,5	10	
		17	13	19	5	15	8	21	7	17	6	19	11	82	72	154	1,5	1,4	1,5	13	
		60	36	46	19	43	25	43	18	52	24	43	18	245	208	453	4,6	4,1	4,4	14 - 22	
		54	31	40	17	37	21	32	13	43	19	39	16	205	171	376	3,8	3,4	3,6	14	
		2	1	10	4	5	2	5	3	4	3	6	1	35	33	68	0,7	0,7	0,7	28	
		22	12	21	11	18	11	21	10	13	4	10	5	399	366	765	7,5	7,3	7,4	30	
		59	28	41	19	30	11	34	11	33	15	34	18	419	315	734	7,9	6,3	7,1	33	
		—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	0,1	0,1	0,1	34	
		34	13	53	22	64	28	72	42	72	37	66	32	236	216	452	4,4	4,3	4,4	35	
		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	39	
		62	28	76	42	52	22	70	32	48	26	54	24	832	688	1.520	15,6	13,7	14,7	4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44	
		2	—	2	1	3	1	1	1	1	—	2	1	21	13	34	0,4	0,3	0,3	45 - 55	
		2	2	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	8	14	22	0,1	0,3	0,2	56, 57	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	61	
		45	25	51	26	49	21	35	15	64	33	67	33	457	349	806	8,6	6,9	7,8	58, 62 - 76, 78, 79	
		77	35	71	33	63	22	76	35	48	22	40	15	453	354	807	8,5	7,0	7,8	81, 82	
		1	1	3	2	2	1	3	—	—	—	—	—	23	15	38	0,4	0,3	0,4	83	
		130	63	134	68	123	56	114	44	103	53	93	43	1.777	1.392	3.169	33,3	27,7	30,6	80, 84 - 89	
		108	55	112	55	100	44	95	36	86	44	84	41	1.611	1.267	2.878	30,2	25,2	27,8	86	
		16	5	9	5	11	4	10	3	16	10	14	6	153	135	288	2,9	2,7	2,8	90 - 95	
		2	1	2	1	2	1	3	1	1	1	3	2	21	26	47	0,4	0,5	0,5	96 - 103	
		109	63	87	44	82	41	109	59	91	50	74	35	1.184	1.141	2.325	22,2	22,7	22,4	106	
		1.086	523	1.102	501	990	470	987	471	909	453	970	474	9.941	8.241	18.182	186,3	164,0	175,5	107 - 109	
		37	17	18	7	22	8	22	7	23	13	26	10	201	143	344	3,8	2,8	3,3	104, 105, 110 - 114	
		1.651	783	1.454	734	1.423	724	1.309	653	1.236	624	1.214	642	10.804	9.883	20.687	202,5	196,7	199,7	119	
		1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	4	5	9	0,1	0,1	0,1	121	
		7	3	6	4	5	4	2	—	4	—	—	—	2	43	24	67	0,8	0,5	0,6	124 - 127
		36	15	40	15	25	10	18	11	27	12	15	9	352	216	568	6,6	4,3	5,5	115 - 118, 122, 123, 128, 129	
		28	7	36	26	40	19	33	16	41	20	52	26	260	233	493	4,9	4,6	4,8	130 - 132	
		5	—	9	4	3	2	3	3	1	—	4	2	34	29	63	0,6				

Segue: Tav. 7. — Morti e mortalità nel primo Anno

Table with columns for cause of death (a), time intervals (Meno di 1 mese to 5 mesi), and counts for Males (M) and Females (F). Rows include various medical conditions like Febris typhoide, Scarlattina, Pertosse, etc.

anno di vita, per causa, età e sesso 1947

Table showing mortality rates per 10,000 live births by month (6-11 mesi) and total, with columns for Males (M), Females (F), and Mortality Rate (MF). Rows correspond to the same medical conditions as in the first table.

(a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci per le quali, nell'anno 1947, si verificarono casi di morte. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

Segue: Tav. 7. — Morti e mortalità nel primo Anno

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	CAUSE DI MORTE (a)	Meno di 1 mese		1 mese		2 mesi		3 mesi		4 mesi		5 mesi	
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
		1,2	Febbre tifoide e paratifoide	—	—	—	—	1	—	2	2	1	—
8	Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1
9	Pertosse	32	14	91	52	90	55	67	35	67	38	50	23
10	Difterite	13	4	8	3	7	3	9	5	8	6	10	1
13	Tubercolosi dell'apparato respiratorio	—	—	2	2	4	1	19	6	8	3	7	1
14 - 22	Tutte le altre forme di tubercolosi	5	1	5	1	18	6	19	11	37	20	35	16
14	di cui per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale	4	1	5	1	10	5	14	9	30	17	28	14
28	Malaria (paludismo)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2
30	Sifilide	232	99	94	35	86	36	68	32	49	18	24	10
33	Influenza	119	51	111	40	99	42	91	39	89	36	63	28
35	Morbillo	2	1	—	—	1	1	2	1	5	2	9	3
4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44, 45 - 55, 56, 57, 61, 58, 62 - 76, 78, 79, 81, 82, 83, 80, 84 - 89, 86, 90 - 95, 96 - 103, 106, 107 - 109, 104, 105, 110 - 114, 119, 121, 124 - 127, 115 - 118, 122, 123, 128, 129, 130 - 132, 133 - 139, 151 - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 170, 169, 171 - 198, 199, 200	Altre malattie infettive e parassitarie	243	106	91	46	78	30	73	31	69	28	55	29
45 - 55	Cancro e altri tumori maligni	9	2	3	—	—	—	3	2	4	2	3	—
56, 57	Tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato	3	3	1	1	1	—	—	—	3	1	4	2
61	Diabete zuccherino	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
58, 62 - 76, 78, 79	Avitaminosi, altre malattie generali e avvelenamenti cronici	105	47	66	26	80	24	74	38	61	25	52	26
81, 82	Meningite semplice e malattie del midollo spinale	35	14	45	11	51	19	54	20	65	30	59	26
83	Lesioni intra-craniche d'origine vascolare	2	1	3	—	3	—	3	1	3	1	2	2
80	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	868	331	271	139	188	89	195	85	155	69	127	56
86	di cui per convulsioni	845	324	256	133	164	82	172	78	133	58	111	47
90 - 95	Malattie del cuore	32	13	23	7	23	11	18	10	18	7	18	7
96 - 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio	2	—	1	—	4	1	3	2	2	1	2	—
106	Bronchite	446	200	214	91	152	76	123	63	97	43	76	37
107 - 109	Polmoniti	2.806	1.195	1.724	713	1.437	632	1.293	588	1.222	510	1.075	472
104, 105, 110 - 114	Altre malattie dell'apparato respiratorio	42	16	33	16	26	12	21	12	28	16	14	4
119	Diarrea ed enteriti	1.621	711	1.773	783	1.762	780	1.820	835	1.706	808	1.628	733
121	Appendicite	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
124 - 127, 115 - 118, 122, 123, 128, 129	Malattie del fegato e delle vie biliari	3	2	4	2	4	1	4	2	3	—	3	1
122, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente	126	54	63	27	48	19	44	14	36	14	46	21
130 - 132	Nefriti	37	13	25	10	42	20	26	10	21	9	26	11
133 - 139	Altre malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale	8	6	9	5	8	2	5	1	2	1	2	1
151 - 156	Malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione	69	36	39	18	36	15	24	11	24	7	17	7
157	Vizi di conformazione congeniti	2.493	1.111	319	170	192	78	138	71	122	58	83	38
158	Debolezza congenita	7.078	3.237	979	460	542	258	385	190	240	120	108	56
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	10.720	4.760	237	110	88	44	36	18	20	11	10	4
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti)	1.332	493	15	12	3	—	4	2	1	—	—	—
161	Altre malattie particolari della prima infanzia	3.938	1.580	123	61	69	30	46	18	25	11	16	5
165	Infanticidio (b)	36	18	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
170	Accidenti d'automobile (tutti i veicoli a motore)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Morti violente o accidentali, escluso l'infanticidio	15	8	15	6	13	6	7	3	5	4	7	4
171 - 198, 199, 200	Cause non specificate o mal definite	132	55	43	17	33	12	32	11	30	12	21	10
	COMPLESSO	32.604	14.182	6.433	2.866	5.192	2.303	4.709	2.169	4.228	1.912	3.658	1.637

(a) In questo Elenco sono indicate solo quelle voci per le quali, nell'anno 1948, si verificarono casi di morte. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

Anno di vita, per causa, età e sesso 1948

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)	6 mesi		7 mesi		8 mesi		9 mesi		10 mesi		11 mesi		Totale			Quozienti per 10.000 nati vivi			Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. abbr.)
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF	M	F	MF	
	1,2	2	1	3	1	1	1	2	—	4	2	3	—	12	7	19	0,2	0,1	
8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	2	5	0,1	—	—	8
9	37	22	40	21	47	34	35	18	33	19	29	19	268	350	618	5,2	7,2	6,1	9
10	8	3	16	10	29	15	39	16	30	17	31	12	113	95	208	2,2	1,9	2,1	10
13	22	12	14	7	11	3	6	2	26	14	17	9	76	60	136	1,5	1,2	1,4	13
14 - 22	41	26	35	15	39	23	44	21	42	17	39	25	177	182	359	3,4	3,7	3,6	14 - 22
14	37	24	27	10	35	21	41	19	34	12	35	22	145	155	300	2,8	3,2	3,0	14
28	2	1	1	1	—	—	1	1	—	—	3	1	5	6	11	0,1	0,1	0,1	28
30	26	10	24	13	21	8	15	5	8	5	12	4	384	275	659	7,4	5,6	6,6	30
33	71	30	66	33	45	19	48	25	57	36	37	18	499	397	896	9,7	8,1	8,9	33
35	13	6	7	3	17	9	19	9	23	9	16	10	60	54	114	1,2	1,1	1,1	35
4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44, 45 - 55, 56, 57, 61, 58, 62 - 76, 78, 79, 81, 82, 83, 80, 84 - 89, 86, 90 - 95, 96 - 103, 106, 107 - 109, 104, 105, 110 - 114, 119, 121, 124 - 127, 115 - 118, 122, 123, 128, 129, 130 - 132, 133 - 139, 151 - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 170, 169, 171 - 198, 199, 200	56	31	46	19	54	34	55	24	49	27	51	26	489	431	920	9,5	8,8	9,1	4 - 7, 11, 12, 23 - 27, 29, 31, 32, 36 - 38, 40 - 44, 45 - 55, 56, 57, 61, 58, 62 - 76, 78, 79, 81, 82, 83, 80, 84 - 89, 86, 90 - 95, 96 - 103, 106, 107 - 109, 104, 105, 110 - 114, 119, 121, 124 - 127, 115 - 118, 122, 123, 128, 129, 130 - 132, 133 - 139, 151 - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 170, 169, 171 - 198, 199, 200
45 - 55	1	1	2	1	1	—	4	2	3	3	5	2	23	15	38	0,4	0,3	0,4	40 - 44
56, 57	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8	9	17	0,2	0,2	0,2	45 - 55
61	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	56, 57
58, 62 - 76, 78, 79	41	19	74	24	55	32	51	33	49	22	47	21	418	337	755	8,1	6,9	7,5	58, 62 - 76, 78, 79
81, 82	62	28	50	23	54	21	50	25	37	20	29	14	340	251	591	6,6	5,1	5,9	81, 82
83	3	3	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	12	11	23	0,2	0,2	0,2	83
80	92	46	83	43	98	44	92	38	55	33	70	38	1.283	1.011	2.294	24,8	20,7	22,8	80
84 - 89	90	37	73	36	83	39	76	30	43	26	54	28	1.172	918	2.090	22,7	18,8	20,8	84 - 89
86	6	1	13	5	11	8	5	2	9	5	8	5	103	81	184	2,0	1,7	1,8	86
90 - 95	—	—	3	—	2	2	1	—	2	2	—	—	14	8	22	0,3	0,2	0,2	90 - 95
96 - 103	74	39	69	32	58	24	58	22	53	28	49	24	790	679	1.469	15,3	13,9	14,6	96 - 103
106	967	454	889	430	825	422	727	361	653	322	638	310	7.847	6.409	14.256	151,8	131,0	141,7	106
107 - 109	14	5	20	8	18	6	8	4	14	3	16	7	145	109	254	2,8	2,2	2,5	107 - 109
104, 105, 110 - 114, 119, 121, 124 - 127, 115 - 118, 122, 123, 128, 129, 130 - 132, 133 - 139, 151 - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 170, 169, 171 - 198, 199, 200	413	654	1.235	580	1.116	508	1.118	552	901	457	884	442	9.134	7.843	16.977	176,8	160,4	168,8	110 - 114, 119, 121, 124 - 127, 115 - 118, 122, 123, 128, 129, 130 - 132, 133 - 139, 151 - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 170, 169, 171 - 198, 199, 200
121	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	0,1	—	—	121
124 - 127, 115 - 118, 122, 123, 128, 129	4	3	5	3	2	1	4	2	4	2	3	—	24	19	43	0,5	0,4	0,4	124 - 127, 115 - 118, 122, 123, 128, 129
122, 123, 128, 129	38																		

Tav. 8 — Morti nella prima settimana di vita, per causa, età e sesso  
Anno 1943

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE		
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF
		10	Difterite	2														2
11	Risipola	1				1		1	1			1	1	1		3	2	5
12	Tetano					3				2		5	2	4	2	10	4	14
24	Setticemia non dipendente dalla gravidanza, parto e puerperio			1		2				1	1	2	2	1	1	3	4	7
30	Altre forme di sifilide	32	18	14	9	9	3	10	3	12	7	4	3	3	1	40	44	84
33	Influenza (grippe)	1		1	1	4	1	2	1	3	2			3		9	5	14
	a) con complicazioni respiratorie dichiarate			1	1	2		2	1	3	2			2		6	4	10
	b) senza complicazioni respiratorie dichiarate	1				2	1							1		3	1	4
36	Poliomielite anteriore acuta e polioencefalite acuta	1														1		1
43	Micosi	1												1	1	1	1	2
64	Malattie del timo	5	3	8	3	9	4	7	2	2		1		3	1	22	13	35
71	Altre forme di avitaminosi					1	1										1	1
72	Stati emorragici			2	2	2						1	1			2	3	5
	a) porpora primitiva			1	1	2										2	1	3
	b) emofilia			1	1							1	1				2	2
82	Malattie del midollo spinale	2	2											1		1	2	3
86	Convulsioni	40	25	64	25	93	32	63	23	44	17	59	24	55	19	253	165	418
103	Altre malattie dell'apparato circolatorio									1						1		1
104	Malattie delle fosse nasali													1	1		1	1
105	Malattie della laringe	2				2		1		1		3	1	3	1	10	2	12
106	Bronchite	7	3	6	3	16	7	18	6	11	4	18	8	30	11	64	42	106
	a) acuta	2	1	2	1	9	3	6	1	9	4	11	5	16	7	33	22	55
	c) non specificata	5	2	4	2	7	4	12	5	2		7	3	14	4	31	20	51
107	Broncopneumonia	19	7	27	16	44	19	34	9	33	10	40	23	89	29	179	113	292
110	Altre forme di pleurite e pleurite senza altra indicazione			1	1												1	1
111	Congestione cronica o non specificata, edema, embolia, infarto emorragico e trombosi del polmone	1		2	1	2	1	1		1	1			1	1	4	4	8
	b) edema acuto del polmone	1														1		1
	c) congestione cronica o non specificata del polmone			2	1	2	1	1		1	1			1	1	3	4	7
115	Malattie della cavità boccale, dei suoi annessi, della faringe e delle amigdale, comprese le vegetazioni adenoidi							1		1				1	1	2	1	3
	a) affezioni dei denti e delle gengive									1				1	1	1	1	2
	d) angina settica, streptococcica, ecc.							1							1		1	1
116	Malattie dell'esofago	1	1													1	1	2
118	Altre malattie dello stomaco							1	1	1						1	1	2
119	Diarrea ed enterite	22	11	14	7	26	10	37	18	23	4	34	18	54	19	123	87	210
122	Ernia, occlusione intestinale	1	1	1		5	3	1		11	4	3	2	4	2	14	12	26
	a) ernia	1	1			1		1		3	1			1	1	4	3	7
	b) occlusione intestinale			1		4	3			8	3	3	2	3	1	10	9	19
123	Altre malattie dell'intestino	1														1		1
129	Peritonite senza causa indicata											1				2		2

(a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1943, si verificarono casi di morte.

segue : Tav. 8. — Morti nella prima settimana di vita, per cause, età e sesso  
segue : Anno 1943

Numeri dell'Elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (b)	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE		
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF		
		152	Flemmone, ascesso caldo, cellulite	2	1							1				1	1	2
153	Altre malattie della pelle, dei suoi annessi e del tessuto cellulare			1	1					1	1						2	2
157	Vizi di conformazione congeniti	415	192	169	75	180	74	120	57	81	44	69	41	70	29	592	512	1.104
	a) idrocefalia congenita	36	11	11	6	10	5	6	3			1	1			38	26	64
	b) spina bifida e meningocele	43	23	19	7	12	7	23	12	19	10	19	14	16	7	71	80	151
	c) malformazioni congenite del cuore	169	77	102	46	99	36	51	24	35	19	21	11	30	14	280	227	507
	d) mostrosità	88	50	10	5	8	4	4	3			2	2	1	1	48	65	113
	e) stenosi congenita del piloro	1	1			4	1	3	3	3	2	2	1	3	1	7	9	16
	f) fessura del palato, becchio di lepre	5		6	2	9	4	5		8	7	4	3	2		23	16	39
	g) imperforazione dell'ano	5	1	2		6	2	6		6	1	2	1	3		25	5	30
	h) altre malformazioni congenite specificate	50	22	14	8	26	10	19	9	9	5	16	7	12	6	79	67	146
	i) altre malformazioni congenite non specificate	18	7	5	1	6	5	3	3	1		2	1	3		21	17	38
158	Debolezza congenita	1.430	609	736	320	748	341	521	233	431	208	360	171	316	155	2.505	2.037	4.542
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	3.348	1.399	1.166	536	981	453	636	286	356	155	323	150	271	114	3.988	3.093	7.081
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti)	577	227	93	32	64	23	30	10	20	7	9	5	17	5	501	309	810
	a) emorragia intra-cranica o spinale	57	19	34	13	23	8	13	5	9	5	7	4	7	2	94	56	150
	b) altre lesioni intra-craniche o spinali	1	1	1		2				1				2		6	1	7
	c) altre lesioni dovute al parto	519	207	58	19	39	15	17	5	10	2	2	1	8	3	401	252	653
161	Altre malattie particolari della prima infanzia	1.276	510	301	133	221	97	185	64	131	49	108	47	74	36	1.360	936	2.296
	a) asfissia durante o dopo la nascita	1.190	471	246	105	142	65	85	23	36	16	35	13	26	13	1.054	706	1.760
	b) intossicazione da tossemia materna	21	7	6	3	7	4	1						1		22	14	36
	c) infezioni	12	5	1		4	1	7	3	10	5	9	3	5	1	30	18	48
	d) melena dei neonati	8	4	10	4	11	3	11	7	7	6	3	3	2	2	23	29	52
	e) altre malattie specificate	45	23	38	21	57	24	81	31	78	22	61	28	40	20	231	169	400
165	Infanticidi (b)	16	9	1		3	2	1								10	11	21
179	Altri avvelenamenti accidentali acuti, esclusi quelli da gas							1	1							2	2	4
181	Ustione accidentale (diversa da quella per incendio)			1												1		1
182	Soffocazione meccanica accidentale	1	1			1	1									2	2	4
189	Fame o sete							1								1		1
190	Freddo eccessivo			1												1		1
195	Altri accidenti e non specificati	2	1							1	1			1		2	2	4
197	Decessi per operazioni di guerra	1	1	2	2	1		1	1	1	1	2				3	5	8
	b) da ferite			1	1											1	1	2
	c) altre cause e non specificate	1	1	1	1	1		1	1	1	1	2				3	4	7
199	Morte improvvisa	8	7	3		4	1	4	2	1				2	1	11	11	22
200	Cause non specificate o mal definite	122	48	64	34	92	37	69	34	59	23	56	21	23	13	275	210	485
	a) cause mal definite	35	12	12	5	12	4	13	5	13	3	5		11	7	65	36	101
	b) « trovato morto », causa sconosciuta	41	19	26	12	53	19	44	21	36	15	37	17	3	3	134	106	240
	c) altri decessi da cause sconosciute o non specificate	46	17	26	17	27	14	12	8	10	5	14	4	9	3	76	68	144
	COMPLESSO	7.337	3.076	2.679	1.201	2.515	1.110	1.746	752	1.236	539	1.100	521	1.030	444	10.000	7.643	17.643

(a) Cfr. la nota (a) a pag. precedente. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

Segue: Tav. 8. — Morti nella prima settimana di vita, per causa, età e sesso  
Anno 1944

Numeri dell'elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)																	
	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE			
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF	
10			2	1							1	1	1		2	2	4	
11			1		1	1			1		1		1	1	3	2	5	
12		1			1	1	2		2	1	9	4	6	3	12	9	21	
24		1	1	4		1		2	1	2	1	3	2		8	5	13	
		1	1	3		1		2	1	2	1	3	2		7	5	12	
				1											1		1	
30 d		35	18	13	4	18	7	3	1	7	3	7	4	4	3	47	40	87
33		1		3	2	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	3	10	13
				2	2	1	1	3	2	1	1	1	1		1	7	8	
		1		1		1	1			1	1			1	1	2	3	5
36						1									1		1	
56 e												1			1		1	
57 e			1												1		1	
64		5	1	2	1	9	3	6	3	1		3	3	18	11	29		
71												1		1		1		
72 a						1								1		1		
82		1	1									1	1		2	2		
83 b						1	1					1	1		2	2		
86		41	16	57	25	76	33	59	20	50	15	51	25	63	29	234	163	397
87 c										1					1		1	
89 b								1							1		1	
98												1	1		1		1	
103		1												1		1		
105		1		1		3	1	2				1		7	1	8		
106				5	3	10	3	10	2	12	5	17	8	31	7	57	28	85
				5	3	10	3	9	1	12	5	17	8	25	6	52	26	78
								1	1					6	1	5	2	7
107		18	9	35	15	49	19	46	22	49	24	58	23	64	28	179	140	319
111		4	1	1		2	1	2	2			1		1	1	6	5	11
		2	1			1		2	2			1				3	3	6
		2		1		1	1						1	1	3	2	5	
115																		
		1	1					1				1	1	1		2	2	4
		1	1									1	1			2	2	4
								1							1		1	
														1		1		1
														1		1		1
119		13	7	13	4	20	4	33	11	27	13	31	14	54	26	112	79	191
122		2		3		6	1	3	1	5		2	1	4		22	3	25
		1		2		1						1	1			6	1	7
		1		1		5	1	3	1	3		1		4		16	2	18
123 b				1											1		1	
129						1		1							2		2	
151												1	1			1	1	

(a) In questo Elenco, sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1944, si verificarono casi di morte.

segue: Tav. 8. — Morti nella prima settimana di vita, per cause, età e sesso  
segue: Anno 1944

Numeri dell'elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)																	
	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE			
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF	
152														1		1	2	
153																1	1	2
154 b																1	1	2
157		412	184	198	93	188	74	138	78	92	42	72	30	70	40	629	541	1.170
		48	21	6	1	4	2	3		2	2	1	1	1	1	37	28	65
		27	15	10	7	18	12	18	10	12	7	13	6	12	8	45	65	110
		192	76	129	58	98	40	69	40	39	14	32	14	33	15	335	257	592
		63	39	12	9	7	4	4	3			1	1		31	56	87	
				1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	8	5	9	18
		3	2	9	3	6	1	5	4	5	2	2	2	3	3	16	17	33
				1		10	1	3	2	5		5	2	3	2	20	7	27
		56	21	26	13	33	9	26	12	20	10	13	4	6	2	109	71	180
		23	10	4	2	10	4	9	6	5	5	3		4	4	27	31	58
158		1.026	428	694	313	644	263	532	270	409	200	357	171	322	148	2.191	1.793	3.984
159		3.151	1.292	1.129	514	1.028	469	615	312	415	188	326	165	304	140	3.888	3.080	6.968
160		601	248	92	38	65	22	42	14	27	10	14	4	13	2	516	338	854
		54	16	28	11	26	9	20	3	5	3	9	2	8	2	104	46	150
		7	5	2	1	2	1	1		1				1		7	7	14
		540	227	62	26	37	12	21	11	21	7	5	2	4		405	285	690
161		1.067	447	316	129	246	100	204	82	167	72	154	62	157	68	1.351	960	2.311
		988	415	244	100	160	67	109	42	82	44	80	39	70	36	990	743	1.733
		35	15	17	7	10	5	10	5	4	2	2		3	1	46	35	81
		2	1	6	1	8	3	6	2	9	5	7	4	11	3	30	19	49
		12	8	8	2	9	2	10	4	5	2	6		6	2	36	20	56
		30	8	41	19	59	23	69	29	67	19	59	19	67	26	249	143	392
165		13	6	2	1					3	3					8	10	18
169		1	1													1	1	2
181				1												2		2
182										3	1					1	3	4
186																		
										1	1							
189		5	3	2		4	3	7	4	10	2	3	1	4	2	20	15	35
190						1	1											
195 d		1		1												2		2
197		1	1	4	1			1	1	1		3	1			6	4	10
		1	1	1								1				2	1	3
				3	1			1	1	1		2	1			4	3	7
199		4		3	1	3		1		2		3	1	2	1	15	3	18
200		152	64	84	36	66	22	57	28	36	14	39	14	27	11	272	189	461
		19	9	8	1	7	1	10	3	1	1	5	2	4	3	34	20	54
																1	1	2
		133	55	76	35	59	21	47	25	35	13	34	12	22	7	238	168	406
		6.559	2.729	2.669	1.182	2.448	1.032	1.774	855	1.324	596	1.163	537	1.137	516	9.627	7.447	17.074

(a) Cfr. la nota (a) a pag. precedente. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

Segue: Tav. 8. — Morti nella prima settimana di vita, per cause, età e sesso  
Anno 1945

Numeri dell'elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)																	
	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE			
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF	
10	1									1	1			1	1	2		
11							1	1	1				1	2	1	3		
12	3	2	1		4	2	2	1	2		7	2	20	4	28	11	39	
24			1	1	2					2	1	1	4	2	6	4		
a) setticemia			1	1	1					1	1			1	1	1		
c) gangrena gassosa														1		1		
d) colibacillosi generalizzata																		
30 d	41	19	10	5	8	4	13	4	12	2	5	3	9	3	58	40	98	
33			1				4	4	1		3	3	9	5	10	8	18	
a) con complicazioni respiratorie dichiarate			1				4	4	1		3	3	9	5	10	8	18	
b) senza complicazioni respiratorie dichiarate													2	2	1	2	3	
36							1						1	1	1	1	2	
43																		
56 e											1							
57 c											1	1						
64	9	6	8	4	5	4	5	1	6	3	5	3	3	1	19	22	41	
72 a																		
82	2																	
83	1	1	1		2	1	2	1										
b) embolia e trombosi cerebrali	1	1																
d) emiplegia ed altre paralisi da cause non specificate			1		1	1	1											
e) altre lesioni intracraniche					1	1												
86	26	12	73	23	81	33	62	30	47	14	51	23	62	26	241	161	402	
89 a																		
99	1																	
104 a			1	1														
105	1				3	2			2	1	1		2	1	5	4	9	
106	3	1	18	9	18	5	29	14	20	7	24	11	25	13	77	60	137	
a) acuta	1		14	5	17	5	25	13	17	6	24	11	25	13	70	53	123	
c) non specificata	2	1	4	4	1		4	1	3	1					7	7	14	
107	29	15	45	19	89	37	101	54	67	29	88	44	110	40	291	238	529	
111	4	1	3	3	3	1			1	1	1	1	1		6	7	13	
a) infarto emorragico del polmone (embolia polmonare)	1														1		1	
b) edema acuto del polmone	1								1	1	1	1			1	2	3	
c) congestione cronica o non specificata del polmone	2	1	3	3	3	1						1			4	5	9	
114																		
d) ascesso del polmone																		
e) altre malattie dell'apparato respiratorio non specificate come professionali																		
115 c																		
119	9	7	21	6	27	13	30	9	48	19	48	18	43	18	136	90	226	
122	1		4	3	3	1	6	1	5	1	8	3	3	1	20	10	30	
a) ernia	1		4	3	3	1	6	1	5	1	8	3	3	1	19	10	29	
b) occlusione intestinale																		

(a) In questo elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1945, si verificarono casi di morte.

Segue: Tav. 8 — Morti nella prima settimana di vita, per causa, età e sesso  
Segue: Anno 1945

Numeri dell'elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)																			
	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE					
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF			
123 b	2	1												1	1			1	2	3
129																				
151																				
152																				
153																				
154 a	1																			
156 b																				
157	381	174	191	89	186	76	151	74	98	48	87	34	58	27	630	522	1.152			
a) idrocefalia congenita	44	25	9	5	10	6	5	1	3	2	3	1	3	1	36	41	77			
b) spina bifida e meningocèle	24	14	10	3	19	8	22	13	15	7	9	4	10	6	54	55	109			
c) malformazioni congenite del cuore	166	66	107	52	92	33	66	27	49	26	42	16	26	10	318	230	548			
d) mostruosità	64	34	13	9	8	3	5	4							40	50	90			
e) stenosi congenita del piloro	1		2		2	1	1	1	1		2		4	3	8	5	13			
f) fessura del palato, becco di lepre	8	4	10	5	7	7	11	6			6	3	4	4	17	29	46			
g) imperforazione dell'ano	3	1	3	1	5		9	3	8	4	4		3		26	9	35			
h) malattia cistica dei reni			1	1	1	1														
i) altre malformazioni congenite specificate	54	20	26	9	34	12	23	14	15	5	19	8	8	3	108	71	179			
j) malformazioni congenite non specificate	17	10	10	4	8	5	9	5	7	4	2	2			23	30	53			
158	1.234	521	696	342	769	352	584	265	438	213	400	178	346	155	2.441	2.026	4.467			
159	3.274	1.424	1.274	565	1.040	499	660	318	472	243	374	184	330	161	4.030	3.394	7.424			
160	430	179	104	39	64	32	29	10	19	9	15	3	12	7	394	279	673			
a) emorragia intra-cranica o spinale	39	11	33	12	31	15	12	2	12	6	11	2	8	5	93	53	146			
b) altre lesioni intra-craniche o spinali	2		1												4		4			
c) altre lesioni dovute al parto	389	168	70	27	33	17	17	8	6	3	4	1	4	2	297	226	523			
161	1.083	445	315	130	249	97	182	62	123	52	122	59	123	42	1.310	887	2.197			
a) asfissia durante o dopo la nascita	1.000	401	249	105	159	67	90	27	53	20	47	21	41	16	982	657	1.639			
b) intossicazione da tossiemia materna	26	15	13	6	8	1			1	1	2	1	1		27	24	51			
c) infezioni	6	4	6	3	9	2	14	3	7	4	6	4	10	2	36	22	58			
d) melena dei neonati	17	9	9	3	11	4	10	6	5	1	5	1	8	5	36	29	65			
e) altre malattie specificate	34	16	38	13	62	23	68	26	57	26	62	32	63	19	229	155	384			
165	17	11	3	2											7	13	20			
177															1		1			
181	1	1																		
182	2	1													1	1	2			
183															1		1			
186	1	1													2	2	3	3		
189	1		1	1	2	1			1	1					2	3	5			
191					1										1		1			
195 d															1		1			
197 c															1		1			
199	7	3	2	2	2	1	1								2	1	1	7	8	15
200	61	23	23	9	40	15	25	16	18	6	23	14	12	6	113	89	202			
a) cause mal definite	17	10	10	4	6	2	7	5	2		8	5	4	2	26	28	54			
b) « trovato morto », causa sconosciuta															2	2		2	2	
c) altri decessi da cause sconosciute o non specificate	44	13	13	5	34	13	16	9	16	6	15	9	8	4	87	59	146			
COMPLESSO	6.626	2.848	2.800	1.253	2.602	1.178	1.897	866	1.387	651	1.273	588	1.182	516	9.867	7.900	17.767			

(a) Cfr. la nota (a) a pag. precedente. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.



Segue: Tav. 8. — Morti nella prima settimana di vita, per causa età e sesso  
Anno 1947

Numeri dell'elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)																
	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE		
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF
6									1						1		1
10	2											1	1	2	1	3	
11	1		1	1	1	1			2		1	1	2	5	3	8	
12	1	1			2				2		6	1	14	4	19	6	25
24																	
	3	1	4	2					1		2	1		6	4	10	
a) setticemia	2	1	3	1					1		2	1		5	3	8	
b) piemia o pioemia	1		1	1										1	1	2	
30d	65	27	17	8	17	7	12	7	8	1	14	7	7	4	79	61	140
33	1	1	10	4	1	1	3	2	4		3		5	3	16	11	27
a) con complicazioni respiratorie dichiarate			6	2	1	1	3	2	3		3		3	2	12	7	19
b) senza complicazioni respiratorie dichiarate	1	1	4	2					1				2	1	4	4	8
36	1													1		1	
43	1	1													1	1	
56e										1				1		1	
64	9		9	6	8	1	7	2	4	1	3	2	2	1	29	13	42
72	2	1							1					2	1	3	
a) porpora primitiva	2	1												1	1	2	
b) emofilia									1					1		1	
82	2	1												1	1	2	
83d										1				1		1	
86	45	23	73	25	97	50	60	20	40	22	53	22	49	20	235	182	417
89a																	
			1	1	1	1					1	1			3	3	
99													1		1		1
103	2													2		2	
104a									1	1					2	2	
105	1	1			1	1	1				2		3		6	2	8
106	2	1	9	4	18	6	11	4	18	5	25	11	21	11	62	42	104
a) acuta	1	1	7	2	18	6	9	4	19	5	25	11	21	11	59	40	99
c) non specificata	1		2	2			2							3	2	5	
107	37	19	101	50	106	37	91	37	110	47	106	48	108	53	368	291	659
111																	
	1		2		4	3			1	1	1		2	1	6	5	11
b) edema acuto del polmone	1		1		3	2			1	1			1		4	3	7
c) congestione cronica o non specificata del polmone			1		1	1					1	1	1	1	2	2	4
115																	
	1												1	1	1	1	2
b) angina settica, streptococcica, ecc.													1	1		1	1
c) altre affezioni delle amigdale e della faringe	1													1		1	
119	31	13	42	18	43	19	54	23	43	13	60	23	39	18	185	127	312
122	4	1	4	2	4	3	4	3	2	1	6	2	4	3	13	15	28
a) ernia	3	1	1		1		1	1			1	1		4	3	7	
b) occlusione intestinale	1		3	2	3	3	3	2	2	1	5	1	4	3	9	12	21
129	1	1	1	1	3	2	1								2	4	6

(a) In questo elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1947, si verificarono casi di morte.

Segue: Tav. 8. — Morti nella prima settimana di vita, per causa, età e sesso  
segue: Anno 1947

Numeri dell'elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)																		
	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE				
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF		
139a													1	1			1	1	
152	1	1	1		1										2	2	2	3	5
153																			
					1										2	1		1	3
157	606	297	304	132	249	104	184	73	120	51	104	40	71	31	910	728	1.638		
a) idrocefalia congenita	44	26	11	4	5	2	2		3	1	1		2		35	33	68		
b) spina bifida e meningocele	63	32	29	16	31	19	29	15	23	13	18	8	11	9	92	112	204		
c) malformazioni congenite del cuore	273	118	182	76	138	56	90	38	49	23	42	18	31	10	466	339	805		
d) mostruosità	112	60	25	12	3	1	3	2	3	1	2	2			70	78	148		
e) stenosi congenita del piloro					2				3	1	5	2	3	2	8	5	13		
f) fessura del palato, becco di lepre	16	7	18	8	14	7	11	6	4	1	7	3	4	3	39	35	74		
g) imperforazione dell'ano	5	1	4	2	8	2	12	1	5	1	8	1	3		37	8	45		
h) altre malformazioni congenite specificate	64	34	27	11	35	14	34	10	28	9	18	5	14	5	132	88	220		
i) malformazioni congenite non specificate	29	19	8	3	13	3	3	1	2	1	3	1	3	2	31	30	61		
158	1.290	583	726	334	741	340	542	251	399	197	333	161	262	120	2.307	1.986	4.293		
159	4.253	1.760	1.516	687	1.132	511	798	378	529	256	407	191	329	141	5.040	3.924	8.964		
160	769	305	159	58	90	33	76	26	20	7	25	8	19	5	716	442	1.158		
a) emorragia intra-cranica o spinale	89	38	61	19	45	19	39	14	16	6	16	6	15	5	174	107	281		
b) altre lesioni intra-craniche o spinali			1	1	2		2						1		5	1	6		
c) altre lesioni dovute al parto	680	267	97	38	43	14	35	12	4	1	9	2	3		537	334	871		
161	1.462	598	405	166	334	138	227	82	189	80	130	49	115	46	1.703	1.159	2.862		
a) asfissia durante o dopo la nascita	1.365	544	343	139	205	94	105	40	80	35	42	14	30	13	1.291	879	2.170		
b) intossicazione da tossiemia materna	46	25	15	9	18	5	2		5	2	6	4			47	45	92		
c) infezioni	9	8	9	3	11	4	12	7	16	8	10	3	9	3	40	36	76		
d) melena dei neonati	15	9	10	3	32	13	12	6	17	7	8	3	6	3	56	44	100		
e) altre malattie specificate	27	12	28	12	68	22	96	29	71	28	64	25	70	27	269	155	424		
165	14	9	3	1	1	1							1	1			7	12	19
170c	1														1		1		1
179																			
															1		1		1
182			1		1										2		2		2
183															1		1		1
189	1	1	1		1		2		1					5	1	6		6	
190					1	1	1							1	1	2		2	
195c											1	1				1		1	1
199	7	1	3		4	1	3		1	1	3	1	1	1	17	5	22		
200	71	29	38	16	34	19	31	11	8	4	13	7	13	8	114	94	208		
a) cause mal definite	21	10	13	4	12	8	20	9	4	1	5	3	8	4	44	39	83		
b) « trovato morto », causa sconosciuta	1	1													1		1		1
c) altri decessi da cause sconosciute o mal specificate	49	18	25	12	22	11	11	2	4	3	8	4	5	4	70	54	124		
COMPLESSO	8.688	3.676	3.431	1.516	2.897	1.280	2.110	921	1.505	688	1.304	579	1.072	474	11.873	9.134	21.007		

(a) Cfr. la nota (a) a pag. precedente. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

Segue: Tav. 8. — Morti nella prima settimana di vita, per causa, età e sesso  
Anno 1948

Numeri dell'elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE		
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF
		6	Meningite cerebro-spinale epidemica (meningococcica)										1					1
10	Difterite							1								1		1
11	Risipola													1		1		1
12	Tetano	2	1	2						3	1	11	4	16	6	22	12	34
24a	Setticemia (non dipendente dalla gravidanza, parto e puerperio)			1				1	1							1	1	2
30d	Altre forme di sifilide	55	27	23	11	17	7	12	4	4	2	3	1	12	3	71	55	126
33	Influenza (grippe)	3	2	2	1	5	2	3	1					6	4	9	10	19
	a) con complicazioni respiratorie dichiarate	1	1	1	1	5	2	2						4	2	7	6	13
	b) senza complicazioni respiratorie dichiarate	2	1	1				1	1					2	2	2	4	6
36	Poliomielite anteriore acuta e polioencefalite acuta											1				1		1
43	Micosi			1	1							1				1	1	2
56e	Tumori non maligni di altri organi e non specificati											1	1			1	1	2
64	Malattie del timo	10	5	14	8	7	1	4		4	1	1		2	2	25	17	42
71	Altre forme di avitaminosi					1										1		1
72	Stati emorragici	1	1			1										1	1	2
	a) porpora primitiva					1										1		1
	c) altre e non specificate	1	1													1	1	2
82	Malattie del midollo spinale			1	1					1						1	1	2
83	Lesioni intracraniche d'origine vascolare	1										1	1			1	1	2
	b) embolia e trombosi cerebrale	1														1		1
	c) rammollimento del cervello											1	1			1	1	2
86	Convulsioni	58	17	60	22	73	20	52	16	41	16	39	16	38	21	233	128	361
104a	Malattie delle fosse nasali							1	1							1	1	2
105	Malattie della laringe	1		1	1	2	1			2		1	1	2		6	3	9
106	Bronchite	3	3	6	3	11	6	13	3	15	10	14	5	11	4	39	34	73
	a) acuta	2	2	4	2	9	5	11	3	14	10	13	5	9	3	32	30	62
	c) non specificata	1	1	2	1	2	1	2		1		1		2	1	7	4	11
107	Broncopneumonia	37	20	40	16	66	25	87	37	77	33	77	38	77	34	258	203	461
111	Congestione cronica o non specificata, edema, embolia, infarto emorragico e trombosi del polmone					2	1	1	1	2	1	1		1		4	3	7
	a) infarto emorragico del polmone (embolia polmonare)									1	1			1		1	1	2
	b) edema acuto del polmone											1				1		1
	c) congestione cronica o non specificata del polmone					2	1	1	1	1					2	2	4	
119	Diarrea ed enterite	14	9	26	7	24	14	33	8	34	14	30	14	40	17	118	83	201
122	Ernia, occlusione intestinale	2		4	1	3	2	9		4	1	10	5	3	3	23	12	35
	a) ernia	2		1		1	1	1		2		1			7	1	8	
	b) occlusione intestinale			3	1	2	1	8		2	1	9	5	3	3	16	11	27
128	Malattie del pancreas			1	1	1										1	1	2
129	Peritonite senza causa indicata					2						1				3		3

(a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1948, si verificarono casi di morte.

Segue: Tav. 8. — Morti nella prima settimana di vita, per causa, età e sesso  
segue: Anno 1948

Numeri dell'elenco nosologico (Nom. dett.)	CAUSE DI MORTE (a)	Meno di 1 giorno		1 giorno		2 giorni		3 giorni		4 giorni		5 giorni		6 giorni		TOTALE		
		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	M	F	MF
		157	Vizi di conformazione congeniti	610	276	305	140	247	101	176	70	124	59	93	39	91	39	922
	a) idrocefalia congenita	45	20	20	12	11	5	9	5	2	2			1		44	44	88
	b) spina bifida e meningocele	60	35	25	14	31	13	30	17	22	12	16	8	20	13	92	112	204
	c) malformazioni congenite del cuore	300	115	166	75	134	57	84	32	57	27	39	19	43	18	480	343	823
	d) mostrosità	92	56	27	11	12	6	3	1	4	1	2		2		67	75	142
	e) stenosi congenita del piloro	1	1	1	1	1		2		3	1	6	3	2		10	6	16
	f) fessura del palato, becco di lepre	19	8	9	6	14	4	6	3	4	3	4	2	2	1	31	27	58
	g) imperforazione dell'ano	3	1	4		12	4	7		12	4	8	1	4	2	38	12	50
	h) malattia cistica dei reni	1														1		1
	i) altre malformazioni congenite specificate	71	33	42	14	26	10	30	10	16	8	16	6	15	4	131	85	216
	j) malformazioni congenite non specificate	18	7	11	7	6	2	5	2	4	1	2		2	1	28	20	48
158	Debolezza congenita	1.263	541	705	305	656	299	465	207	335	155	296	148	225	121	2.169	1.776	3.945
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	3.987	1.692	1.532	685	1.123	513	663	310	405	182	351	159	298	142	4.696	3.663	8.359
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti)	798	303	186	64	115	42	61	19	35	10	14	5	24	10	780	453	1.233
	a) emorragia intra-cranica o spinale	107	32	61	16	61	24	29	10	22	6	9	4	16	6	207	98	305
	b) altre lesioni intra-craniche o spinali	7	3	4		2								1	1	10	4	14
	c) altre lesioni dovute al parto	684	268	121	48	52	18	32	9	13	4	5	1	7	3	563	351	914
161	Altre malattie particolari della prima infanzia	1.637	677	455	163	341	137	260	106	169	60	126	56	125	49	1.865	1.248	3.113
	a) asfissia durante o dopo la nascita	1.538	627	373	132	230	97	138	61	70	26	35	19	45	18	1.449	980	2.429
	b) intossicazione da tossemia materna	49	23	18	10	6	1	8	2	5	1	3	3	1	50	40	90	
	c) infezioni	5	3	9	4	13	4	9	2	12	1	12	6	10	3	47	23	70
	d) melena dei neonati	19	8	18	10	17	6	22	11	15	9	10	4	9	5	57	53	110
	e) altre malattie specificate	26	16	37	7	75	29	83	30	67	23	66	24	60	23	262	152	414
165	Infanticidi (b)	22	12	2		2	1	1	1			3	1	1		16	15	31
169	Accidenti dovuti a ferrovie e tranvie	1	1													1	1	2
178	Absorbimento accidentale di gas tossici													1	1			2
182	Soffocazione meccanica accidentale	1	1			1	1					1				1	2	3
186	Traumatismo accidentale per caduta, schiacciamento, frana, ecc.													1		1		1
189	Fame o sete	1				1										2		2
199	Morte improvvisa	1	1	3	2	6	3	2	1	2	2	1		3		9	9	18
200	Cause non specificate o mal definite	16	8	8	2	10	1	9	3	5	3	1	1	5	2	34	20	54
	a) cause mal definite	7	4	2		4		5	1	3	1	1	1	2		17	7	24
	c) altri decessi da cause sconosciute o non specificate	9	4	6	2	6	1	4	2	2	2			3	2	17	13	30
	COMPLESSO	8.524	3.597	3.378	1.414	2.717	1.177	1.854	789	1.263	550	1.078	495	983	458	11.317	8.480	19.797

(a) Cfr. la nota (a) a pag. precedente. — (b) Cfr. la nota (b) a pag. 18.

## Publicazioni periodiche dell'Istituto Centrale di Statistica

TITOLO DEL PERIODICO	Prezzo di un fascicolo	Prezzi di abbonamento per l'anno 1952	
		Italia	Estero
Bollettino mensile di statistica	600	6.130	10.000
Statistica del commercio con l'estero (mensile)	€00	8.170	12.000
<b>Notiziario Istat:</b>			
Serie A - Statistiche agrarie e forestali (quindicinale)	50	612	1.200
Serie B - Statistiche industriali, commerciali e finanziarie (mensile)	50	612	1.200
Serie C - Statistiche dei prezzi e del lavoro (quindicinale)	50	612	1.200
Serie D - Statistiche demografiche e sanitarie (mensile)	50	612	1.200
Serie E - Statistiche sociali (trimestrale)	50	153	300
<b>Abbonamenti cumulativi</b>			
A tutte le Serie del «Notiziario Istat»	—	2.042	4.000
A tutti i periodici (Bollettino mensile di statistica, Statistica del commercio con l'estero, Notiziario Istat)	—	14.290	22.000
A tutte le pubblicazioni periodiche ed a quelle non periodiche stampate nel corso del 1952	—	24.000	40.000

### Avvertenze

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio, anche se fatti nel corso dell'anno. In tale caso all'abbonato saranno addebitati i fascicoli arretrati.

I prezzi di abbonamento per l'Italia sono comprensivi della relativa I. G. E. e del diritto fisso.

Gli abbonati alla «Statistica del commercio con l'estero» ricevono altresì gratuitamente i numeri bis della Serie B del «Notiziario Istat» nei quali, entro il 23 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, sono pubblicati i dati relativi alle quantità delle principali merci importate ed esportate.

## Recenti pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica

Annuario statistico italiano 1951	L. 1.500
Compendio statistico italiano 1951	» 500
Atlante dei Comuni d'Italia	» 1.500
<b>Annali di statistica (Serie VIII):</b>	
Vol. III - Studi sul reddito nazionale	» 1.500
Vol. IV - Studi di statistica forestale	» 1.000
Primi risultati generali dei censimenti. Dati provvisori (IX Censimento generale della popolazione e rilevazione delle abitazioni. III Censimento generale dell'industria e del Commercio)	» 500
Istruzioni per il confronto tra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi della popolazione (IX Censimento generale della popolazione)	» 200
Una indagine sulle forze del lavoro (nelle provincie della Sicilia e nelle provincie di Milano, Pisa e Napoli al 7 settembre 1951)	» 300
Classificazioni delle attività economiche	» 400
Classificazioni delle malattie e cause di morte (Ediz. 1951)	» 500
Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile negli anni 1943-1948	» 1.200
Statistica forestale 1949-50	» 500
Misure locali per le superfici agrarie	» 500
Annuario statistico dell'istruzione italiana 1948-49	» 800
<b>Commercio con l'estero — anni 1939, 1946-1949:</b>	
Vol. I - Statistica delle merci importate per paesi di provenienza	» 1.500
Vol. II - Statistica delle merci esportate per paesi di destinazione	» 1.500
Vol. III - Movimento commerciale coi singoli paesi. Tavole riassuntive	» 1.500
<b>Le elezioni politiche del 1948:</b>	
Elezioni della Camera dei Deputati:	
Vol. I - Note illustrative e documentazione statistica - Notizie sulle elezioni politiche in alcuni paesi esteri	» 800
Vol. II - Elettori, votanti, voti di lista validi, voti non validi in ciascun Comune della Repubblica	» 400
Elezioni del Senato della Repubblica — Note illustrative e documentazione statistica	» 800