

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

---

# STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1904



DIREZIONE GENERALE  
BIBLIOTECA  
DELLA STATISTICA

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1907



# I N D I C E

## INTRODUZIONE.

### CAPO I. — Avvertenze preliminari.

§ 1. — Metodo e fonti. . . . .	<i>Pag.</i>	III
§ 2. — Ordine delle tavole analitiche . . . . .	"	IV
§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i vari quozienti di mortalità . . . . .	"	V

### CAPO II. — Mortalità nel Regno e nelle singole provincie.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1904 e confronti cogli anni precedenti. . . . .	<i>Pag.</i>	VIII
§ 2. — Cause più frequenti o più caratteristiche delle morti avvenute nel Regno in ciascun anno del periodo 1887-1904 . . . . .	"	XI
§ 3. — Morti avvenute nell'anno 1904 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia . . . . .	"	XXV
§ 4. — Distribuzione geografica di alcune malattie, specialmente infettive, negli anni 1902, 1903 e 1904 . . . . .	"	XXIX
§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità . . . . .	"	XXXVI
§ 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso . . . . .	"	ivi
§ 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età . . . . .	"	XXXVII
§ 8. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini . . . . .	"	XLIV
§ 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile . . . . .	"	XLVI

### CAPO III. — Mortalità nei comuni urbani più importanti.


§ 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni durante il periodo 1881-1904 . . . . .	<i>Pag.</i>	XLIX
§ 2. — Mortalità nelle città principali durante il periodo d'anni corso dal 1896 al 1903 e nell'anno 1904 . . . . .	"	LII

CAPO IV. — Notizie particolari sulle morti violente.

§ 1. — Morti per causa violenta durante il periodo 1887-1904, ripartiti per sesso . . .	Pag.	LVIII
§ 2. — Morti accidentalmente negli anni 1902-1904, classificati per compartimenti, sesso, età, specie dell'infortunio, e natura del veleno nei casi di avvelenamento . . . . .	„	LIX
§ 3. — Morti per omicidio negli anni 1902-1904, classificati secondo il sesso e il mezzo d'uccisione . . . . .	„	LXIII
§ 4. — Morti per suicidio negli anni 1902-1904, classificati per compartimenti, sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione . . .	„	ivi
APPENDICE. — Elenco nosologico adottato per la statistica delle cause di morte . . .	„	LXX

TAVOLE.

TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, classificati per cause di morte . . . . .	Pag.	2
„ II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1904, classificati per sesso e principali cause di morte. . . . .	„	32
„ III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e principali cause di morte. . . . .	„	34
„ IV. — Maschi morti in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per professioni e principali cause di morte . . . . .	„	42
„ V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia o di circondario e in altri 83 Comuni, classificati secondo le principali cause di morte . . . . .	„	44
„ VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno in età di non oltre 5 anni compiuti, classificati per sesso e principali cause di morte . . . . .	„	64
„ VII. — Morti violente accidentali classificate per età, per sesso e secondo le cause che le produssero . . . . .	„	65
„ VIII. — Morti violente accidentali classificate secondo le cause che le produssero, per sesso e per mesi . . . . .	„	66
„ IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale in età di oltre 15 anni compiuti, classificati secondo la causa della morte e la condizione o professione . . . . .	„	68
„ X. — Suicidi classificati per compartimenti, per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione . . . . .	„	70
„ XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età . . . . .	„	71
„ XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione . . . . .	„	72
„ XIII. — Suicidi in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per sesso e secondo la condizione o professione . . . . .	„	73



---

# STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1904.

## INTRODUZIONE.

### CAPO I.

#### AVVERTENZE PRELIMINARI.

##### § 1. — Metodo e fonti.

La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, i quali comprendono un quarto circa della popolazione totale. Col principio del 1887 essa fu estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questa statistica si fa raccogliendo, sopra una scheda nominativa per ciascun defunto, la dichiarazione della malattia che causò la morte, formulata e firmata dal medico curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che ha dato il permesso di seppellimento; per i bambini morti poco dopo il parto le dichiarazioni si fanno dalle levatrici.

Le dichiarazioni originali si spediscono ogni mese dai sindaci dei singoli Comuni, pel tramite della Prefettura, all'Ufficio centrale di statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna di esse con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita. Non mancano adunque le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza tecnica, sia in coloro che dichiarano le cause di morte, sia in quelli che ne fanno la classificazione per la statistica sanitaria, poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono dai documenti originali, non da copie.

I medici hanno sempre concorso volenterosamente a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza; poche, relativamente, sono state le lacune per mancate denunce, come vedremo in appresso; e queste non furono cagionate quasi mai da rifiuto dei medici a rilasciare il certificato, ma perchè in parecchi Comuni di montagna, molto appartati, accade non di rado che soccombano persone, e più specialmente fanciulli, senza aver ricevuto assistenza sanitaria, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di determinare la malattia che fu causa della

morte, in modo che si possa poi classificare sotto una delle voci dell'elenco nosologico adottato (a).

Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria, è stato fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia che ne fu la causa, cosicchè la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti sono distribuite sotto 170 voci, secondo un elenco preparato da apposita Commissione medica nel 1881, e leggermente ritoccato una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Queste modificazioni consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppate in una rubrica sola. Si è creduto opportuno di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, ed anche in omaggio ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica nelle riunioni tenute a Vienna ed a Cristiania.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti in 170 voci per ciascuno dei Comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Convieni conciliare le ragioni della spesa con quelle della scienza che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo coll'offrire la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni di ciascuna provincia e per il complesso del Regno; limitandoci a dare per ciascun Comune capoluogo di provincia e di circondario, per parecchi Comuni capiluoghi di distretto e per alcuni altri Comuni più popolosi, le cifre dei morti per talune malattie meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica. (b).

In appendice alla presente Introduzione (pagina LXX) è riportato l'elenco delle malattie secondo il quale sono fatte le classificazioni.

## § 2. — Ordine delle tavole analitiche.

La presente statistica si svolge in XIII tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta, come si è detto, di 170 voci.

La seconda dà la classificazione dei morti nel complesso del Regno in ciascun trimestre dell'anno 1904, colla divisione per sesso e per cause di morte.

---

(a) Simili lacune si osservano nelle statistiche sanitarie dell'Inghilterra, della Scozia, dell'Irlanda e del Belgio. Negli altri Stati che pubblicano la statistica delle cause di morte, l'elenco nosologico comprende uno scarso numero di voci, e le morti *per causa ignota o male determinata*, sono spesso sommate insieme a quelle avvenute *per altre malattie*, cioè per malattie non specificate tassativamente nella classificazione.

(b) Nelle statistiche per gli anni dal 1894 al 1901 i Comuni non capiluoghi per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti erano quelli che al 1° gennaio 1882 contavano più di 15,000 abitanti. A cominciare dall'anno 1902 furono date a parte le notizie, oltrechè pei Comuni capiluoghi di provincia, di circondario e per taluni capiluoghi di distretto, anche pei Comuni che al 10 febbraio 1901 avevano più di 20,000 abitanti e per altri 5, che quantunque nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano oltre 15,000, e ciò allo scopo di mantenere, nei limiti del possibile, l'uniformità, e quindi la possibilità dei confronti, fra le statistiche degli anni 1902-1904 e quelle degli anni precedenti.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia della causa di morte, nel complesso del Regno.

La quarta dà la classificazione dei maschi morti in età di oltre 15 anni compiuti per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, nei 137 capiluoghi di circondario, nei 17 principali capiluoghi di distretto e in 66 altri Comuni.

La sesta classifica i bambini illegittimi e gli esposti morti in età non superiore a 5 anni compiuti secondo la causa della morte.

Le rimanenti tavole danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

In questa Introduzione sono riassunti ed illustrati i dati più importanti esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1904 vi sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendo fino al 1887 e, quando era possibile, fino al 1881.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre effettive, quanto in rapporti proporzionali alla popolazione calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente.

### § 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i vari quozienti di mortalità.

La popolazione presente secondo l'ultimo censimento riferentesi alla mezzanotte dal 9 al 10 febbraio 1901 risultò

di 32,475,253 abitanti per l'insieme dei Comuni del Regno;

„ 5,610,530 per i 69 Comuni capiluoghi di provincia;

„ 2,379,608 per i 137 Comuni capiluoghi di circondario;

„ 1,921,354 per l'insieme dei 17 principali capiluoghi di distretto e dei 61 Comuni non capiluoghi che alla data predetta avevano più di 20,000 abitanti (a).

Confrontando la popolazione presente al 10 febbraio 1901 con quella presente al 1° gennaio 1882, si è determinata la popolazione alla mezzanotte dal 30 giugno al 1° luglio di ciascuno degli anni corsi fra i due censimenti, supponendo che l'aumento annuo della popolazione sia avvenuto, dal 1882 al 1901, in ragione aritmetica; giacchè mancano elementi completi per un calcolo più preciso.

Per calcolare poi la popolazione al 1° luglio degli anni dal 1901 al 1904 si è partiti dall'ipotesi che dopo il 10 febbraio 1901 la popolazione sia cresciuta nel medesimo rapporto aritmetico col quale crebbe fra i due censimenti succitati. Ma per determinare con questo metodo la popolazione delle singole provincie, si è fatto il calcolo separatamente per ciascun circondario o distretto, attesochè nell'intervallo fra i censimenti del 1882 e del 1901 non tutti i circondari o distretti aumentarono di popolazione. Per i circondari o

---

(a) Nel formare questo gruppo non si è tenuto conto dei 5 Comuni che al 10 febbraio 1901 non avevano raggiunto i 20,000 abitanti.

distretti nei quali il censimento del 1901 aveva trovato un numero di abitanti inferiore a quello censito nel 1882, si è fatta l'ipotesi che la popolazione fosse in essi rimasta stazionaria dopo il 10 febbraio 1901, non avendosi un mezzo sicuro per verificare se avesse continuato in quei circondari il movimento regressivo. Il totale della popolazione del Regno, calcolato in questa maniera, risulta perciò superiore a quello che si otterrebbe ove si prendesse per base l'aumento medio generale, poichè a formare siffatto aumento entrano anche quei circondari nei quali la popolazione è diminuita, mentre nel calcolo su enunciato si è supposto che in essi le cifre di popolazione siano rimaste invariate dopo il 10 febbraio 1901. Con lo stesso metodo si è calcolata la popolazione di ciascun Comune capoluogo di provincia, del complesso dei 137 capiluoghi di circondario, dei 17 principali capiluoghi di distretto e dei 61 Comuni non capiluoghi (a).

Calcolata in tal modo la popolazione al 1° luglio 1904, che è l'anno al quale si riferisce la presente statistica, è risultata

- di 33,346,514 abitanti per tutti i Comuni del Regno;
- „ 5,866,647 per i 69 capiluoghi di provincia;
- „ 2,456,553 per i 137 capiluoghi di circondario;
- „ 1,993,405 per i suddetti 17 capiluoghi di distretto e per 61 Comuni non capiluoghi.

Nei volumi concernenti gli anni dal 1887 al 1899 la popolazione del Regno era stata determinata supponendo che dal 1° gennaio 1882 in poi essa fosse venuta crescendo nella stessa ragione annuale in cui era cresciuta fra il secondo ed il terzo censimento generale, e perciò le cifre della popolazione ed i quozienti di mortalità calcolati nel presente volume, per gli anni dal 1887 al 1899, differiscono alquanto da quelli esposti nei volumi su indicati.

Nel prospetto n. 1 è indicata la popolazione di ciascuna provincia e di ciascun Comune capoluogo di provincia al 1° luglio 1904, calcolata col metodo suaccennato, e nel prospetto n. 2, è indicata la popolazione del Regno e quella dei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario, presi insieme, al 1° luglio di ciascuno degli anni dal 1887 al 1904.

---

(a) In considerazione delle numerose cause d'errore che possono influire sui dati raccolti per mezzo della registrazione anagrafica, si è preferito, anche per le grandi città, di riferire i quozienti di mortalità alle cifre della popolazione calcolata col procedimento suddetto, anzichè alle cifre risultanti dai registri comunali di popolazione. Con questo metodo si ha anche il vantaggio di avere dati omogenei con quelli pubblicati nelle statistiche degli anni antecedenti.

Non si è creduto necessario di dare qui il confronto fra la popolazione di ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia calcolata al 1° luglio 1904 secondo i dati risultanti dai registri comunali d'anagrafe e quella calcolata secondo il metodo suesposto, perchè a mostrare le differenze tra le due cifre di popolazione calcolata secondo i due metodi suaccennati, si ritiene sufficiente l'analogo confronto contenuto nel volume " Statistica delle cause di morte per l'anno 1902 „.



**Popolazione presente in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, calcolata al 1° luglio 1904 (a).**

PROSPETTO N. 1.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE CALCOLATA supponendo invariato l'aumento medio aritmetico osservato fra i due ultimi censimenti			PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE CALCOLATA supponendo invariato l'aumento medio aritmetico osservato fra i due ultimi censimenti		
	delle provincie e dei comparti- menti	dei Comuni capiluoghi di provincia (b)			delle provincie e dei comparti- menti	dei Comuni capiluoghi di provincia (b)	
		totale	con dimora abituale nel Comune			totale	con dimora abituale nel Comune
Alessandria . . . . .	828 026	73 086	67 833	Ancona . . . . .	309 150	58 755	54 477
Cuneo . . . . .	641 007	27 495	23 413	Ascoli Piceno . . . . .	252 648	30 125	29 219
Novara . . . . .	756 207	48 194	42 770	Macerata . . . . .	263 211	23 292	21 787
Torino . . . . .	1 144 533	354 877	330 078	Pesaro e Urbino . . . . .	260 228	25 997	24 033
PIEMONTE . . . . .	3 369 773	503 652	464 094	MARCHE . . . . .	1 085 237	138 169	129 516
Genova . . . . .	972 659	247 491	220 793	Perugia - UMBRIA . . . . .	686 880	63 505	61 124
Porto Maurizio . . . . .	145 141	7 202	6 524	Roma - LAZIO . . . . .	1 265 812	507 106	451 175
LIGURIA . . . . .	1 117 800	254 693	227 317	Aquila degli Abruzzi	405 312	21 750	19 718
Bergamo . . . . .	473 940	49 489	45 770	Campobasso . . . . .	367 554	15 064	13 974
Brescia . . . . .	551 956	72 673	65 608	Chieti . . . . .	376 058	27 340	25 886
Como . . . . .	593 225	40 832	37 469	Teramo . . . . .	318 702	25 474	24 443
Cremona . . . . .	332 789	38 895	35 695	ABRUZZI E MOLISE . . . . .	1 467 626	89 628	84 021
Mantova . . . . .	315 030	29 411	26 878	Avellino . . . . .	404 272	23 919	22 585
Milano . . . . .	1 517 189	539 280	509 145	Benevento . . . . .	259 951	25 253	24 323
Pavia . . . . .	502 056	35 657	32 096	Caserta . . . . .	799 869	33 121	30 842
Sondrio . . . . .	126 494	8 415	7 544	Napoli . . . . .	1 182 539	577 520	547 587
LOMBARDIA . . . . .	4 412 679	814 652	760 205	Salerno . . . . .	568 778	45 504	43 084
Belluno . . . . .	196 629	19 404	18 370	CAMPANIA . . . . .	3 215 409	705 317	668 421
Padova . . . . .	452 208	84 323	77 569	Bari delle Puglie . . . . .	859 694	81 308	78 458
Rovigo . . . . .	223 602	11 174	10 319	Foggia . . . . .	440 714	56 158	55 287
Treviso . . . . .	419 378	34 512	31 468	Lecce . . . . .	741 200	34 194	32 045
Udine . . . . .	611 611	39 185	36 312	PUGLIE . . . . .	2 041 608	171 660	165 790
Venezia . . . . .	410 120	155 238	143 752	Potenza - BASILICATA	490 705	16 186	15 411
Verona . . . . .	427 828	75 331	66 171	Catanzaro . . . . .	484 446	32 464	30 781
Vicenza . . . . .	458 347	45 854	43 035	Cosenza . . . . .	470 120	22 351	20 778
VENETO . . . . .	3 199 723	465 021	426 996	Reggio di Calabria . . . . .	440 128	45 441	43 567
Bologna . . . . .	539 930	158 285	145 840	CALABRIE . . . . .	1 394 694	100 256	95 126
Ferrara . . . . .	280 327	84 646	81 879	Caltanissetta . . . . .	341 421	46 527	45 274
Forlì . . . . .	286 713	44 233	42 540	Catania . . . . .	736 913	162 164	155 649
Modena . . . . .	323 131	66 184	62 015	Girgenti . . . . .	384 801	25 803	24 688
Parma . . . . .	299 398	50 139	45 528	Messina . . . . .	561 141	154 661	146 518
Piacenza . . . . .	248 644	36 257	31 681	Palermo . . . . .	808 643	324 189	312 170
Ravenna . . . . .	238 759	64 681	62 116	Siracusa . . . . .	446 583	34 089	32 902
Reggio nell'Emilia . . . . .	280 362	60 095	57 047	Trapani . . . . .	387 426	65 297	63 933
EMILIA . . . . .	2 497 264	564 520	528 646	SICILIA . . . . .	3 666 928	812 730	781 134
Arezzo . . . . .	278 318	45 393	44 007	Cagliari . . . . .	496 366	57 479	52 570
Firenze . . . . .	970 263	213 472	194 739	Sassari . . . . .	317 997	38 637	36 064
Grosseto . . . . .	151 550	10 117	9 129	SARDEGNA . . . . .	814 363	96 116	89 643
Livorno . . . . .	124 287	98 443	92 122	Regno . . . . .	33 346 514	5 866 647	5 473 343
Lucca . . . . .	326 498	76 322	72 802				
Massa e Carrara . . . . .	201 349	27 903	27 239				
Pisa . . . . .	328 302	62 801	59 225				
Siena . . . . .	239 446	28 985	25 461				
TOSCANA . . . . .	2 620 013	563 436	524 724				

(a) Per il metodo seguito nel calcolare la popolazione delle singole provincie e dei 69 Comuni capiluoghi, veggansi le spiegazioni date a pagina v.

(b) Nel calcolare la popolazione dei 69 Comuni capiluoghi di provincia si è tenuto conto delle variazioni di territorio avvenute dal 10 febbraio 1901 al 1° luglio 1904. Le cifre della popolazione con dimora abituale nei comuni capiluoghi furono calcolate sottraendo dalla popolazione totale quella che vi ha dimora occasionale. Per fare questa sottrazione si è supposto che la popolazione avventizia, compresa la guarnigione militare che non viene inserita nei registri comunali di anagrafe, fosse numericamente uguale a quella censita il 10 febbraio 1901, non avendosi elementi sufficientemente attendibili per determinare le eventuali variazioni in più od in meno.

## CAPO II.

### MORTALITÀ NEL REGNO E NELLE SINGOLE PROVINCE.

#### § 1. — **Morti nel Regno durante il 1904 e confronti cogli anni precedenti.**

Durante l'anno 1904 morirono nel Regno 698,604 individui, esclusi i nati-morti, cioè i bambini partoriti morti, ma non quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto, quantunque fossero morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile. Vi sono compresi, ad esempio, 811 bambini morti per asfissia o apoplezia nel parto, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

Confrontando le cifre dei morti con quelle della popolazione presente o di fatto calcolata al 1° luglio dello stesso anno 1904 (a), si trova un quoziente di 20.95 morti ogni 1000 abitanti.

Nei 206 capiluoghi di provincia e di circondario morirono 179,680 individui, ciò che dà un quoziente di mortalità di 21.59 ogni 1000 abitanti.

Nel prospetto seguente, ove i dati del 1904 sono posti a raffronto con quelli dei diciassette anni precedenti, si rileva che la mortalità è venuta scemando dal 1887 in poi.

---

(a) Il metodo col quale è stata calcolata la popolazione alla data predetta è esposto nel paragrafo 3 del capo I di questa introduzione (pag. v e seg.).

**Numero dei morti nel Regno e nei Comuni Capiluoghi di provincia e di circondario  
durante gli anni 1887-1904.**

PROSPETTO N. 2.

A N N I	REGNO			CAPILUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO (206 comuni)		
	Popolazione calcolata al 1° luglio	Morti		Popolazione calcolata al 1° luglio	Morti	
		cifre effettive	per ogni 1000 abitanti		cifre effettive	per ogni 1000 abitanti
1887 . . . . .	29 614 430	828 992	27.99	6 953 127	200 101	28.78
1888 . . . . .	29 825 022	820 431	27.51	7 029 464	198 980	28.31
1889 . . . . .	30 035 038	768 068	25.57	7 105 592	186 985	26.32
1890 . . . . .	30 245 054	795 911	26.32	7 181 720	196 372	27.34
1891 . . . . .	30 455 070	795 327	26.11	7 257 848	197 933	27.27
1892 . . . . .	30 665 662	802 779	26.18	7 334 185	196 486	26.79
1893 . . . . .	30 875 678	776 713	25.16	7 410 313	194 304	26.22
1894 . . . . .	31 085 694	776 372	24.98	7 486 441	187 568	25.05
1895 . . . . .	31 295 710	783 813	25.05	7 562 569	191 947	25.38
1896 . . . . .	31 506 302	758 129	24.06	7 638 906	185 521	24.29
1897 . . . . .	31 716 318	695 602	21.93	7 715 034	171 053	22.17
1898 . . . . .	31 926 334	732 265	22.94	7 791 162	182 153	23.38
1899 . . . . .	32 136 350	703 393	21.89	7 867 290	177 871	22.61
1900 . . . . .	32 346 366	768 917	23.77	7 943 418	190 884	24.03
1901 . . . . .	32 574 563	715 036	21.95	8 028 587	181 349	22.59
1902 . . . . .	32 831 644	727 181	22.15	8 122 530	183 484	22.59
1903 . . . . .	33 088 725	736 311	22.25	8 221 786	185 605	22.57
1904 . . . . .	33 346 514	698 604	20.95	8 323 200	179 680	21.59

La mortalità nei Comuni capiluoghi apparisce, in tutti gli anni del periodo 1887-1904, alquanto più alta che nel complesso di tutti i Comuni, e a ciò contribuisce essenzialmente il fatto che i maggiori centri di popolazione sono sede di ospedali o di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei Comuni rurali finitimi.

Le cause delle morti avvenute nel 1904 furono specificate dai medici curanti o,

in mancanza di essi, dai medici necroscopi, per 690,850 casi, e restarono ignote per 7,754, cioè in 11 casi su 1000; dipendenti la massima parte da che il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, o dal fatto che la causa di morte non era stata designata in termini abbastanza chiari e precisi, da poterla classificare in una delle voci dell'elenco.

Confrontando le morti delle quali restò ignota la causa col totale delle morti avvenute nell'anno 1904 in ciascun compartimento, si forma il prospetto seguente, da cui si rileva che il numero delle morti delle quali non si poté specificare la causa, è venuto scemando dal 1887 in poi.

**Numero delle morti delle quali non si poté determinare la causa negli anni 1887-1904.**

PROSPETTO N. 3.

COMPARTI- MENTI	TOTALE dei morti nell'anno 1904	MORTI PER CAUSA IGNOTA O NON DETERMINATA												
		Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 morti										Trienni	
			Anni											
			1904	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1893-95	1890-92
Piemonte . . . . .	63 198	1 196	19	21	22	25	28	28	29	30	29	47	76	72
Liguria . . . . .	20 747	121	6	5	4	4	6	8	10	9	12	13	18	15
Lombardia . . . . .	97 185	212	2	2	2	2	1	2	3	2	4	6	7	8
Veneto . . . . .	61 517	372	6	6	6	5	6	6	8	9	10	11	15	11
Emilia . . . . .	48 931	288	6	7	7	5	6	6	7	8	10	8	11	10
Toscana . . . . .	49 985	192	4	3	3	2	3	2	3	4	4	5	10	12
Marche . . . . .	22 556	203	9	10	9	11	11	10	12	13	16	13	18	17
Umbria . . . . .	13 454	40	3	2	3	2	3	4	5	6	6	9	13	12
Lazio . . . . .	24 366	223	9	9	11	14	7	9	8	9	10	14	11	13
Abruzzi e Molise . . . . .	31 887	628	20	20	17	21	21	24	26	22	32	34	39	37
Campania . . . . .	69 935	618	9	12	10	9	7	5	6	7	8	11	11	15
Puglie . . . . .	54 481	315	6	7	9	9	6	5	6	7	8	7	10	8
Basilicata . . . . .	13 239	407	31	29	20	26	16	19	20	33	25	23	43	32
Calabrie . . . . .	29 100	1 012	35	37	43	46	39	32	39	47	53	61	70	55
Sicilia . . . . .	80 223	803	10	10	8	10	12	12	18	21	20	27	31	23
Sardegna . . . . .	17 800	1 124	63	97	96	109	123	114	121	112	131	142	137	103
REGNO . . . . .	698 604	7 754	11	12	12	13	14	13	15	16	18	22	28	25

I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non potè essere determinata la causa del decesso, sono più frequenti che altrove in Sardegna e nelle regioni montuose o di popolazione molto rada del Piemonte, degli Abruzzi, della Basilicata e delle Calabrie, dove parecchi piccoli centri di popolazione sono tuttora privi di sanitario, o distano notevolmente dal luogo dove questo risiede.

**§ 2. — Cause più frequenti o più caratteristiche delle morti avvenute nel Regno in ciascun anno del periodo 1887-1904.**

Nel prospetto seguente sono indicate, in cifre effettive ed in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1904, per le malattie più frequenti o più caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie della popolazione (a).

**Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1904, classificate secondo le cause più frequenti o più caratteristiche.**

PROSPETTO N. 4.

CAUSE DI MORTE	TRIENNI		ANNI											
	1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904
<b>A) Cifre effettive.</b>														
Vaiuolo . . . . .	47775	11380	2638	2606	2998	2033	1003	420	214	316	3396	2413	6049	3093
Morbillo . . . . .	58529	46346	12953	9001	11322	11499	6156	5429	7433	8827	5562	9961	7283	5332
Scarlattina . . . . .	30125	22528	6596	4511	3814	3234	3907	4492	4487	1483	1185	1338	1991	1611
Febbre tifoide . . . . .	64740	54944	15065	13639	15590	16397	15557	17412	14963	15060	11748	11358	11671	12239
Tifo petecchiale . . . . .	4466	234	56	47	9	80	25	8	1	2	17	3	2	9
Meningite epidemica . . . . .	590	54	2014	1262	176	409	216	31	74	21	5	9	3	80
Difterite e crup . . . . .	73804	48440	17783	15585	11466	9286	8881	7808	6893	5790	5444	4514	4064	4519
Ipertosse . . . . .	31048	29667	6847	8261	8678	6660	7938	7420	7886	6565	6916	7202	6521	5958
Influenza . . . . .	1642	32108	2710	14668	3773	6576	3750	8765	4264	17306	4079	3821	7132	3794
Febbri e cachessia da malaria . . . . .	53214	49407	15301	15296	16464	14023	11947	11378	b) 8605 2206	b) 12815 3050	b) 10552 3006	b) 7319 2589	b) 6414 2103	b) 6357 2106
Risipola infettiva . . . . .	14330	11420	4104	3683	3463	3197	2779	2939	2983	2633	2568	2609	3149	2885
Tetano . . . . .	2576	2004	677	802	960	800	767	757	728	702	639	615	535	646
Sifilide . . . . .	5884	6542	2379	2364	2313	2307	2205	2247	2354	2117	1965	2009	1919	1849
Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1999	1821	598	635	621	453	460	433	461	330	341	403	396	355
Rabbia . . . . .	327	255	83	93	53	71	102	66	80	63	55	56	58	45
Tubercolosi disseminata . . . . .	27532	26519	8446	8685	9868	7767	7690	7787	4729	2339	2300	2636	3662	3666
Tubercolosi polmonare . . . . .	95770	93893	29934	31484	31756	33302	30980	30548	35078	39394	36212	33086	38262	35486
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito . . . . .	16718	17310	6283	5501	4497	4861	4453	4535	5898	5920	5751	5515	5471	5465
Tabes mesenterica . . . . .	37774	33252	10944	10142	10144	10351	9263	9124	8780	9155	8117	7858	7251	7291
Scrofola disseminata . . . . .	8991	7544	2066	2119	1844	1908	1795	1571	1425	1384	1248	1116	1122	1039
Lupo . . . . .	224	299	84	49	126	106	100	85	118	128	102	96	115	106

(a) In questi confronti sono specificate 78 cause di morte; le morti determinate dalle altre malattie indicate nell'elenco generale e non contemplate in questo prospetto furono qui comprese in una sola rubrica intitolata « Morti per altre cause ».  
 (b) Per gli anni 1899-1904 la voce « febbrì e cachessia da malaria » comprende due numeri: nel primo si sono dati i morti per sola febbre di malaria; nel secondo quelli per cachessia malarica.

**Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1904, classificate secondo le cause più frequenti o più caratteristiche.**

*Segue* PROSPETTO N. 4.

CAUSE DI MORTE	TRIENNI		ANNI										
	1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903

*Segue* A) Cifre effettive.

Sinovite e artrite fungosa, tuberc. delle ossa . . . . .	(a) 2299	(a) 2524	(a) 778	(a) 633	1298	1486	1519	1664	1728	1649	1675	1725	1775	1773
Morbo di Pott. . . . .	1207	947	452	470	393	425	391	412	382	318	357	361	380	421
Rachitide . . . . .	8610	9844	2764	2501	2806	3159	3153	2803	3231	3539	3275	3231	3305	2944
Polmonite cronica . . . . .	15981	12554	2835	2737	1784	1508	1293	918	1495	1379	835	667	631	647
Asma, enfisema e congestione polmonare . . . . .	20041	16394	3978	4310	3418	3602	2928	3323	3928	4107	3490	3306	3664	3309
Atrofia congenita . . . . .	158180	162087	55525	56557	54677	50457	46690	46869	45948	49400	50454	50684	47057	46345
Anemia, leucemia . . . . .	29561	24989	7473	6697	9162	9737	9475	9547	9376	9795	9364	9783	10138	8911
Marasmo senile . . . . .	86127	97232	38029	34384	39036	37656	36557	41595	41870	47760	46367	46398	46779	43942
Porpora emorragica, emofilia . . . . .	1603	1523	552	433	487	503	411	439	476	508	433	459	480	476
Scorbuto . . . . .	1445	1315	301	283	439	360	236	299	260	265	205	226	214	160
Pellagra . . . . .	10284	12286	3250	3028	3271	3076	2807	3987	3836	3788	3054	2376	2647	2363
Gotta . . . . .	670	364	109	133	153	153	164	144	146	133	129	127	124	126
Diabete . . . . .	1595	2109	704	700	771	833	882	894	1026	1082	1071	1154	1139	1242
Tumori maligni . . . . .	38179	39080	13234	13841	15089	15482	15967	16330	16680	16873	17141	17684	17774	18860
Apoplessia cerebrale . . . . .	97383	93315	30619	31107	31926	30639	29082	29790	31440	32166	32711	32563	38775	32991
Paralisi, rammollimento, tumori cerebrali e spinali (b) . . . . .	2505	2325	801	758	1807	3923	4570	4428	4915	4687	4493	4402	4623	4944
Meningite acuta cerebrale e spinale . . . . .	43621	42931	16412	14770	18519	16602	15235	15443	13892	14407	13676	13923	14655	14049
Encefalite . . . . .	7249	5080	1140	1234	1390	1408	1164	1085	1066	1208	1077	1014	1079	1029
Mielite e tabe dorsale . . . . .	12050	14632	4447	4557	5024	3681	3156	3049	3038	3024	2773	2805	2899	2819
Epilessia . . . . .	6359	6547	2069	1905	2026	1884	1780	1734	1554	1816	1928	1911	1832	1878
Corea . . . . .	329	292	100	83	97	93	75	76	104	76	92	89	105	92
Eclampsia infantile . . . . .	71022	66066	20883	19839	20161	19716	18511	17782	16817	17754	16483	17004	15847	15423
Malattie delle fosse nasali, della trachea e laringe . . . . .	7654	11589	3885	2906	1772	1855	1794	1730	1928	1889	1901	1876	1853	1908
Bronchite acuta e cronica . . . . .	198658	238550	73719	77419	76774	72646	62362	64733	c) 51537 7047	c) 58029 8275	c) 53652 8555	c) 56910 7587	c) 53721 8687	c) 49112 8289
Malattie della pleura . . . . .	14392	12938	3935	3598	3656	3421	2988	3097	2979	3044	2935	2965	3034	2996
Polmonite acuta . . . . .	209790	225378	76616	78269	80250	78508	67417	73412	d) 43846 28309	d) 41996 34105	d) 43453 31082	d) 40481 33592	d) 47400 35742	d) 37509 32181
Malattie delle arterie, gangrena senile . . . . .	12391	16300	6305	5740	6366	5920	5990	6998	7183	7575	7519	7681	7945	8456
Malattie delle vene . . . . .	692	649	235	240	196	251	208	241	193	201	178	137	162	143
Malattie del cuore e pericardio . . . . .	124274	125468	41744	42581	50911	49419	47612	52456	52771	55815	56185	55901	58759	56292
Gastrite . . . . .	19084	19069	7458	6686	6589	7146	7482	7841	7421	8123	7340	8384	7778	7813
Enterite, diarrea, colera indigeno, tifo, proctite e ulcera intestinale . . . . .	279400	307820	103437	101281	114214	108002	99622	112105	94970	115138	98551	111518	108678	104578

(a) Queste cifre si riferiscono alla sola sinovite fungosa e non comprendono i morti per tubercolosi delle ossa che, negli anni anteriori al 1895, si sommarono con quelli per malattie delle ossa in genere.  
 (b) Compresi i morti per demenza paralitica e successioni della pazzia.  
 (c) Per gli anni 1899-1904 la voce: « Bronchite acuta e cronica » comprende due numeri: nel primo si sono classificati i morti per bronchite acuta, nel secondo quelli per bronchite cronica.  
 (d) I morti per polmonite negli anni 1899-1904 sono stati classificati in due gruppi; nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte per pneumonite crupale e nel secondo quelle di bronco polmonite acuta.

**Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1904, classificate secondo le cause più frequenti o più caratteristiche.**

Segue PROSPETTO N. 4.

CAUSE DI MORTE	TRIENNI		A N N I												
	1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	
<i>Segue A) Cifre effettive.</i>															
Dissenteria . . . . .	17097	2304	203	33	148	717	230	154	131	52	66	52	34	14	
Parassiti intestinali . . . . .	14159	7579	2370	1895	1050	1127	1533	1238	1253	1206	1467	1415	1283	1203	
Occlusione intestinale, volvolo . . . . .	5985	5602	2016	1912	2196	1998	2091	2214	2295	2343	2259	2195	2287	2227	
Ernie intestinali . . . . .	4766	4456	1441	1408	1564	1392	1319	1426	1302	1369	1436	1269	1295	1300	
Epatite e cirrosi . . . . .	17670	16692	5423	5298	5567	5504	5202	5264	5184	5344	5092	5336	5063	4994	
Atrofia gialla acuta del fegato . . . . .	377	359	122	119	113	120	112	97	109	90	80	112	112	106	
Itterizia . . . . .	3026	3555	1360	1387	1148	1377	1440	1355	1298	1294	1396	1447	1398	1482	
Peritonite . . . . .	13690	13638	5055	4907	5208	5246	4755	5066	4813	4981	4753	5039	5239	4893	
Malattie dei reni . . . . .	23527	26742	10006	10194	11206	11461	11409	12370	12806	12390	12259	13066	13421	13136	
Malattie della vescica . . . . .	7712	8099	2700	2757	3237	2509	2446	2388	2567	2529	2452	2487	2484	2351	
Malattie dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio . . . . .	3148	4725	2055	1479	1099	1011	986	713	598	613	565	523	421	375	
Febbre puerperale . . . . .	7061	4845	1774	1604	1514	1292	1199	1214	1302	1033	994	1037	1112	1082	
Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	12869	7391	2216	2444	1893	2335	2143	2016	2270	2001	1773	1770	1659	1899	
Asfissia ed apoplezia nel parto . . . . .	9660	6481	2202	2188	1568	1213	1101	1000	1031	1007	848	864	679	811	
Sclerema . . . . .	9022	8654	2897	2829	2885	2877	2714	2283	2202	2269	2587	2440	2303	2207	
Mughetto, nomma, glossite . . . . .	11718	10362	3537	3646	2738	2840	2477	2492	2287	2374	2126	2269	1971	1870	
Pomfigo, eczema, ectima, psoriasi . . . . .	3317	3038	1109	974	785	797	853	805	793	782	678	713	616	599	
Flemmone, ascesso, cancrena della pelle . . . . .	9151	9909	3462	3089	2418	2647	2584	2379	2528	2286	2215	2166	2333	2332	
Setticemia, ptoemia . . . . .	6414	3185	1136	1166	1379	1116	1146	1292	1263	1526	1605	1653	1807	1921	
Malattie delle ossa, osteomalacia . . . . .	4772	4249	1066	1076	968	1105	1132	1031	1059	1035	1053	1186	1134	1197	
Reumatismo articolare, acuto . . . . .	2651	2693	984	822	915	932	827	896	978	927	857	912	983	953	
Reumatismo cronico . . . . .	2850	3406	948	1007	943	939	837	582	764	840	775	770	822	852	
Alcoolismo cronico . . . . .	1283	1573	646	625	473	557	504	541	555	523	414	400	401	509	
Morti violente accidentali . . . . .	32814	30240	10008	9891	8894	9628	10304	10066	10229	10184	10771	10493	10322	11044	
Omicidii e conflitto con la forza pubblica . . . . .	4642	4282	1648	1429	1487	1456	1540	1706	1417	1306	1262	1332	1305	1312	
Suicidii . . . . .	4502	5072	1737	1732	1874	2000	1895	2059	2019	2040	2014	2010	1922	2156	
Morti per altre cause . . . . .	63538	61356	23753	23216	11150	11558	9984	9563	9887	10787	10140	9797	9918	10073	
TOTALE dei morti per causa determinata . . . . .	2358054	2328181	758224	758640	768817	744625	684258	721289	693992	758398	705579	718183	727178	690850	
Cause ignote o non specificate . . . . .	59437	65836	18489	17732	14996	13504	11344	10976	9401	10519	9457	8998	9133	7754	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2417491</b>	<b>2394017</b>	<b>776713</b>	<b>776372</b>	<b>783813</b>	<b>758129</b>	<b>695602</b>	<b>732265</b>	<b>703393</b>	<b>768917</b>	<b>715036</b>	<b>727181</b>	<b>736311</b>	<b>698604</b>	

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1904, classificate secondo le cause più frequenti o più caratteristiche.

Segue PROSPETTO N. 4.

CAUSE DI MORTE	TRIENNI		ANNI										
	1887-89 (media annuale)	1890-92 (media annuale)	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903

B) Cifre proporzionali a 1,000,000 di abitanti.

Vaiuolo . . . . .	584	125	85	84	96	65	32	19	7	10	104	73	133	93
Morbillo . . . . .	655	507	490	290	362	365	194	170	231	273	171	303	220	160
Scarlattina . . . . .	397	247	214	145	122	103	123	141	140	46	36	41	60	48
Febbre tifoide . . . . .	836	601	488	439	498	520	491	545	466	466	361	346	353	367
Tifo petecchiale . . . . .	50	3	2	2	..	3	1	..	..	..	1	..	..	..
Meningite epidem. . . . .	7	1	65	41	6	13	7	1	2	1	..	..	..	2
Difterite e crup . . . . .	825	580	576	501	366	295	280	245	214	179	167	137	123	136
Ipertosse . . . . .	347	325	222	266	277	211	250	232	245	203	212	219	197	179
Influenza . . . . .	18	351	88	472	121	209	118	275	133	535	125	116	216	114
Febbri e cachexia da malaria . . . . .	595	541	496	492	526	445	377	356	(a) 268 69	(a) 396 94	(a) 324 92	(a) 223 79	(a) 194 64	(a) 191 63
Risipola infettiva . . . . .	160	125	133	118	111	101	88	92	93	81	79	79	95	87
Tetano . . . . .	29	22	22	26	31	25	24	24	23	22	20	19	16	19
Sifilide . . . . .	66	72	77	76	74	73	70	70	73	65	60	61	58	55
Pustola maligna, carbonchio . . . . .	22	20	19	20	20	14	15	14	14	10	10	12	12	11
Rabbia . . . . .	4	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1
Tubercolosi disseminata . . . . .	307	290	274	279	315	247	242	244	147	72	71	80	111	110
Tubercolosi polmonare . . . . .	1070	1028	970	1013	1015	1057	977	957	1092	1218	1112	1008	1005	1064
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito . . . . .	187	189	203	177	144	154	140	142	184	183	177	168	165	164
Tabe mesenterica . . . . .	422	364	354	328	324	329	292	286	273	283	249	239	219	219
Scrofolo dissemin. . . . .	100	83	67	68	59	61	57	49	44	43	38	34	34	31
Lupo . . . . .	2	3	3	2	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa . . . . .	(b) 26	(b) 28	(b) 25	(b) 20	41	47	48	52	54	51	51	53	54	53
Morbo di Pott. . . . .	14	10	15	15	13	13	12	13	12	10	11	11	11	13
Rachitide . . . . .	96	102	90	80	90	100	99	88	101	109	101	98	100	88
Polmonite cronica . . . . .	179	137	92	88	57	48	41	29	47	43	26	20	19	19
Asma, enfisema e congestione polmonare . . . . .	224	179	129	139	109	114	92	104	122	127	107	101	111	99
Atrofia congenita . . . . .	1768	1774	1798	1819	1747	1601	1472	1468	1430	1527	1549	1544	1422	1390
Anemia, leucemia . . . . .	331	274	242	215	293	309	299	299	292	303	287	298	306	267
Marasmo senile . . . . .	962	1064	1070	1106	1247	1195	1153	1303	1303	1477	1423	1413	1414	1318

(a) Veggasi la nota (b) alla pagina xi.

(b) Veggasi la nota (a) alla pagina xii.



**Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1904, classificate secondo le cause più frequenti o più caratteristiche.**

Segue PROSPETTO N. 4.

CAUSE DI MORTE	TRIENNI		ANNI										
	1887-89 (media annuale)	1890-92 (media annuale)	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903

*Segue B) Cifre proporzionali a 1,000,000 di abitanti.*

Porpora emorragica	18	17	18	14	16	16	13	14	15	16	13	14	15	14
Scorbuto . . . . .	16	14	10	9	14	11	7	9	8	8	6	7	6	5
Pellagra . . . . .	115	134	105	97	105	98	89	125	119	117	94	72	80	71
Gotta . . . . .	8	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
Diabete . . . . .	18	23	23	23	25	26	28	28	32	33	33	35	34	37
Tumori maligni . .	427	428	429	445	482	491	508	511	519	522	526	537	537	566
Apoplessia cerebr.	1089	1021	992	1001	1020	972	917	933	978	994	1004	992	1021	989
Paralisi, rammolli- mento, tumori ce- rebrali e spina- li (a) . . . . .	28	25	26	24	58	125	145	154	153	145	138	134	140	148
Meningite acuta ce- rebrale e spinale.	488	470	532	475	592	527	480	484	432	445	420	424	443	421
Encefalite . . . . .	81	56	37	40	44	45	37	34	33	37	33	31	33	31
Mielite e tabe dor- sale . . . . .	135	160	144	147	161	117	100	96	95	93	85	85	88	85
Epilessia . . . . .	71	72	67	61	65	60	56	54	48	56	59	58	55	56
Corea . . . . .	4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3
Eclampsia infantile	794	723	676	638	644	626	584	557	523	549	506	518	479	463
Malattie delle fos- se nasali, della trachea e laringe	85	127	126	93	57	59	57	54	60	58	58	57	56	57
Bronchite acuta e cronica . . . . .	2220	2611	2388	2491	2453	2306	1966	2028	b) 1604 219	b) 1794 256	b) 1647 263	b) 1733 231	b) 1624 263	b) 1473 249
Malattie della pleura . . . . .	161	142	127	116	117	109	94	97	98	94	90	90	92	90
Polmonite acuta . .	2233	2467	2481	2518	2564	2492	2126	2299	c) 1364 881	c) 1298 1054	c) 1334 954	c) 1233 1023	c) 1433 1080	c) 1125 965
Malattie delle arte- rie, cangrena se- nile . . . . .	138	178	204	185	203	188	189	219	294	234	231	234	240	254
Malattie delle vene	8	7	8	8	6	8	7	8	6	6	5	5	5	4
Malattie del cuore e pericardio . . .	1389	1373	1352	1370	1627	1569	1501	1643	1 642	1726	1725	1703	1776	1688
Gastrite . . . . .	214	209	242	215	211	227	236	246	231	251	225	255	285	234
Enterite, diarrea, colera indigeno, tifite, ulcera in- testinale . . . . .	3123	3369	3350	3258	3650	3428	3141	3511	2955	3560	3025	3397	3284	3136
Disenteria . . . . .	191	25	7	1	5	23	7	5	4	2	2	2	1	..
Parassiti intestinali	158	83	77	61	34	36	48	39	39	37	45	43	39	36
Occlusione intesti- nale,volvolo . . .	67	61	65	62	70	63	66	69	71	72	69	67	69	67

(a) Veggasi la nota (b) alla pag. XII.  
(b) Id. (c) Id.  
(c) Id. (d) Id.

**Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1904, classificate secondo le cause più frequenti o più caratteristiche.**

*Segue* PROSPETTO N. 4.

CAUSE DI MORTE	TRIENNI		ANNI											
	1887-89 (media annuale)	1890-92 (media annuale)	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904
Ernie intestinali. . .	53	49	47	45	50	44	42	45	41	42	44	39	39	39
Epatite e cirrosi . .	197	183	176	170	178	175	164	165	161	165	156	163	153	150
Atrofia gialla acuta del fegato. . . . .	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3
Itterizia. . . . .	34	39	44	45	37	44	45	42	40	40	43	44	42	44
Peritonite. . . . .	153	149	164	158	166	167	150	159	150	154	146	153	158	147
Malattie dei reni . .	263	298	324	328	358	364	360	387	398	383	376	398	406	394
Malattie della ve- scica. . . . .	86	89	87	89	103	80	77	75	80	78	75	76	75	71
Malattie dell'utero e della vagina al- l'infuori del puer- perio. . . . .	35	52	67	48	35	32	31	22	19	19	17	16	13	11
Febbre puerperale.	79	53	57	52	48	41	38	38	41	32	31	32	34	32
Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio. . . .	144	81	72	79	60	74	68	63	71	62	54	54	50	57
Asfissia ed apople- sia nel parto . . .	108	71	71	70	50	39	35	31	32	31	26	26	21	24
Sclerema. . . . .	101	95	94	91	92	91	86	72	69	70	79	74	70	66
Mughetto, noma, glossite. . . . .	131	113	115	98	87	90	78	78	71	73	65	69	60	56
Pemfigo, eczema, ectima, psoriasi .	37	33	36	31	25	25	27	25	25	24	21	22	19	18
Flemmone, ascesso, cangrena della pelle. . . . .	102	108	112	99	77	84	81	75	79	71	68	66	71	70
Setticemia, pioemia	72	35	37	38	44	35	36	40	39	47	49	50	55	58
Malattie delle ossa, osteomalacia . . .	53	47	35	35	31	35	36	32	33	32	32	36	34	36
Reumatismo artico- lare acuto. . . . .	30	29	32	26	29	30	26	28	30	29	26	28	30	29
Reumatismo cro- nico. . . . .	32	37	31	32	30	30	26	21	24	26	24	23	25	26
Alcoolismo cronico	14	17	21	20	15	18	16	17	17	16	13	12	12	15
Morti violente acci- dentali. . . . .	367	381	324	318	284	306	325	315	318	315	331	320	312	331
Omicidi e in con- fitto con la forza pubblica. . . . .	52	47	53	46	48	46	49	53	44	40	39	41	39	39
Suicidi. . . . .	50	56	56	56	60	63	60	64	63	63	62	61	58	65
Morti per altre cause. . . . .	711	671	763	746	354	365	310	301	306	335	316	302	296	301
TOTALE dei morti per causa deter- minata. . . . .	26360	25482	24557	24403	24566	23634	21574	22592	21595	23446	21661	21875	21977	20717
Cause ignote o non specificate. . . . .	664	721	599	570	479	429	358	344	298	325	290	274	276	233
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>27024</b>	<b>26203</b>	<b>25156</b>	<b>24975</b>	<b>25045</b>	<b>24063</b>	<b>21932</b>	<b>22936</b>	<b>21888</b>	<b>23771</b>	<b>21951</b>	<b>22149</b>	<b>22263</b>	<b>20950</b>

*Segue B)* Cifre proporzionali a 1,000,000 di abitanti.

Dal prospetto n. 4 si rileva che, in generale, le malattie infettive si vennero facendo meno gravi dal 1887 al 1904. La mortalità per *vaiuolo* ha avuto i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 il vaiuolo ha assunto di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 73 nel 1902, 183 nel 1903 e 93 nel 1904.

La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887 a 160 nel 1904; quella per *scarlattina* da 494 nel 1887 a 48 nel 1904; quella per *febbre tifoide* da 939 nel 1887 a 367 nel 1904. Il *tifo petecchiale*, che nel 1887 causò 64 morti ogni milione di abitanti, e 70 nel 1888, è quasi scomparso dalle tavole necrologiche per gli anni susseguenti; la mortalità per *difterite* e *crup* è diminuita negli stessi anni da 952 nel 1887 a 136 nel 1904 ogni milione di abitanti; quella per *ipertosse* da 376 nel 1887 a 179 nel 1904 e quella per *febbre puerperale* da 85 nel 1887 a 32 nel 1904.

Anche la mortalità per *febbri e cachessia da malaria* presenta un forte miglioramento dal 1887 al 1904 (710 morti ogni milione di abitanti nel primo anno e 254 nel secondo) e la diminuzione maggiore si è osservata nell'ultimo triennio (1902-1904), il quale ha dato un quoziente di 271 morti di malaria ogni milione di abitanti, mentre nel triennio precedente (1899-1901) il quoziente fu di 414.

Il *colera asiatico*, che nel 1887 aveva causato 8150 casi di morte, in cifre effettive, non ne causò alcuno negli anni corsi dal 1888 al 1892; mentre tornò a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3040 decessi. Vi furono ancora 20 morti di colera nel gennaio del 1894 e negli anni seguenti non si verificarono casi di morte per detta malattia.

È invece aumentata la mortalità per *influenza*. Questa causa che, nei tre anni 1887-1889, aveva determinato soltanto 18 morti ogni milione di abitanti, nel 1890 aggravò la mortalità di 11,771 casi (389 per un milione di abitanti); fu gravissima nel 1892 (20,039 morti, cioè 653 ogni milione di abitanti) e nel 1894 (14,668 morti, cioè 472 ogni milione di abitanti). Fra il 1895 e il 1899 la mortalità per *influenza* scemò notevolmente, ma nel 1900 si ebbe una nuova recrudescenza, con 17,306 morti, vale a dire 535 ogni milione di abitanti, che è il quoziente più alto, dopo quello dell'anno 1892; nell'anno 1901 essa discese al quoziente di 125 morti per ogni milione di abitanti, nel 1902 a quello di 116; tornò ad aggravarsi nel 1903, dando un quoziente di 216 morti ogni milione di abitanti, per discendere nuovamente a quello di 114 nell'anno 1904.

La mortalità per *sifilide* è aumentata di anno in anno dal 1887 al 1893, ma negli anni susseguenti si è notata una leggiera diminuzione.

I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, scemarono fino a 53 nel 1895; la *rabbia* fu causa nel 1902 di 56 morti, nel 1903 di 58 e nel 1904 di 45. La serie delle cifre annuali, quantunque irregolare nel suo andamento, accenna ad una diminuzione nel numero dei morti per *rabbia* nel corso dei diciotto anni di osservazione. Tale fatto può dipendere dall'efficacia dei mezzi terapeutici ora adoperati per la cura di questa malattia (sistema Pasteur); o da una più accurata vigilanza esercitata dalle amministrazioni municipali sui cani vaganti; oppure

dalla circostanza che la rabbia, del pari che altre malattie infettive, può presentare da un anno all'altro forti oscillazioni nel suo grado di frequenza (1).

(1) La legge di sanità fa obbligo ai medici di denunziare alle autorità locali i casi di rabbia trasmessa all'uomo, e dai Bollettini sanitari pubblicati mensilmente dal Ministero dell'interno, si può rilevare il numero di queste denunzie. Esse furono 147 nel 1895, 163 nel 1896, 192 nel 1897, 170 nel 1898, 149 nel 1899, 166 nel 1900, 343 nel 1901, 113 nel 1902, 89 nel 1903 e 61 nel 1904.

Se si confronta il numero dei morti col numero dei casi, si trova che nel 1895, su 100 casi 36 furono mortali, nel 1896 44, nel 1897 53, nel 1898 39, nel 1899 54, nel 1900 38, nel 1901 16, nel 1902 50, nel 1903 65 e nel 1904 74.

Per gli anni antecedenti al 1887 non si conosce il numero dei morti per rabbia in tutti i Comuni del Regno; la statistica delle cause di morte era allora limitata ai 284 Comuni capiluoghi di provincia, circondario o distretto, che complessivamente comprendono circa un quarto della popolazione del Regno. In quei Comuni avvennero 29 casi di morte per rabbia nel 1881, 22 nel 1882, 28 nel 1883, 27 nel 1884, 36 nel 1885 e 29 nel 1886; in media 29 ogni anno.

Nel 1904 fra i 45 casi di morte per rabbia, 18 furono dichiarati in quel gruppo di 284 Comuni, e più precisamente 13 nei 69 capiluoghi di provincia e 5 nei capiluoghi di circondario.

È però da osservare che, fra i 13 individui morti nei 69 capiluoghi di provincia, soltanto 3 contrassero la malattia nello stesso Comune in cui avvenne la morte; gli altri 10 vi furono inviati già infermi da altri Comuni per essere ricoverati nelle cliniche o in altri istituti speciali di cura. Nel 1903 furono dichiarati nei 69 Comuni capiluoghi 20 casi di morte per rabbia, dei quali 6 appartenevano alla popolazione residente, nel 1902 17 dei quali 7 facevano parte della popolazione residente, nel 1901 20 di cui 5 residenti, nel 1900 14 dei quali 3 residenti, nel 1899 33 dei quali 12 residenti e nel 1898 23 dei quali 3 residenti. I morti di rabbia negli anni antecedenti al 1898 non furono classificati secondo la residenza; non si sa quindi, per gli anni 1881-86, quanti dei casi registrati nei Comuni capiluoghi spettassero alla popolazione avventizia curata negli ospedali.

I casi di rabbia sono, relativamente alla popolazione, molto più frequenti nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare che non in quelle dell'Italia settentrionale e centrale. In queste ultime le condizioni sono notevolmente migliorate nell'ultimo decennio, in confronto degli anni precedenti, per quanto si può arguire dalle due serie di cifre non perfettamente omogenee fra loro (sole città e città con Comuni rurali) date nel seguente prospetto.

Compartimenti	Cifre effettive dei morti per rabbia			Cifre proporzionali ad un milione di abitanti		
	1881-86	1887-1903	1904	1881-86	1887-1903	1904
	Capiluoghi (284 Comuni)	Intera regione		Capiluoghi (284 Comuni)	Intera regione	
Piemonte . . . . .	8	93	1	2.2	1.7	0.3
Liguria . . . . .	2	23	..	1.2	1.3	..
Lombardia . . . . .	26	118	3	5.4	1.7	0.7
Veneto . . . . .	21	61	3	3.9	1.2	0.9
Emilia . . . . .	19	79	6	4.2	2.0	2.4
Toscana . . . . .	13	44	..	3.6	1.0	..
Marche . . . . .	8	32	1	8.3	1.8	0.9
Umbria . . . . .	7	23	..	8.0	2.1	..
Lazio . . . . .	4	68	3	1.9	3.6	2.4
Abruzzi e Molise . . . . .	3	66	5	3.1	2.8	3.4
Campania . . . . .	22	206	8	4.7	3.9	2.5
Puglie . . . . .	2	104	1	1.2	3.3	0.5
Basilicata . . . . .	2	36	3	6.2	4.2	6.1
Calabria . . . . .	1	74	1	0.9	3.2	0.7
Sicilia . . . . .	21	242	9	3.7	4.2	2.5
Sardegna . . . . .	12	93	1	15.4	7.1	1.2
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>171</b>	<b>1362</b>	<b>45</b>	<b>4.0</b>	<b>2.5</b>	<b>1.3</b>

Classificando i morti per rabbia secondo le stagioni, si nota che il maggior numero di essi si ebbe nell'estate.

Mesi . . . . .	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Morti nel 1904 . . . . .	3	5	2	3	1	7	4	7	4	2	4	3
nei sei anni 1898-903 . . . . .	34	21	26	30	34	26	46	44	35	34	22	26

Secondo il sesso, i morti per rabbia nel 1904 si dividevano in 31 maschi e 14 femmine, e prendendo le

Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio e pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 355 nel 1904 in cifre effettive).

La mortalità per *malattie tubercolari* accenna, durante il periodo di osservazione, ad una diminuzione abbastanza sensibile. Infatti, ogni milione di abitanti, si ebbero nel 1887 2101, nel 1888 2126 e nel 1889 2119 morti per tubercolosi, considerata nelle sue varie manifestazioni; invece nel 1902 la proporzione è stata solamente di 1585 morti, nel 1903 di 1591 e nel 1904 di 1644. Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della tubercolosi, si hanno, per gli anni dal 1887 al 1904, le cifre seguenti:

cifre dell'intero periodo 1887-1904, si hanno 1045 maschi (74 %) e 362 femmine (26 %). Queste ultime, sia per la forma del vestiario, sia perchè stanno più riparate in casa, sono menq esposte ai morsi di cani drofobi.

Riguardo alle professioni, sono colpiti di preferenza gli agricoltori e, in generale gli individui che esercitano professioni all'aperto. Infatti fra i morti maschi nel 1904 si contarono 12 contadini, 1 carrettiere, 1 vnaio, ed i rimanenti, in numero di 17, erano fanciulli sotto i 15 anni. Fra le femmine vi erano 5 contadine, 1 casalinga e 8 fanciulle sotto 15 anni.

Finalmente rispetto all'età, ponendo a raffronto i dati del periodo 1887-91 con quelli degli anni dal 1898 al 1904, si forma il seguente quadro:

Età	Morti per rabbia															
	Cifre effettive								Proporzioni ad un milione di viventi coetanei							
	1887-91	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1887-91	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904
Non oltre i 5 anni . . . . .	41	4	5	5	3	4	2	2	2.0	1.0	1.2	1.2	0.7	1.0	0.5	0.5
Da oltre 5 a 9 anni compiuti .	77	13	10	14	9	12	3	15	4.3	3.6	2.8	3.9	2.5	3.4	0.8	4.2
» 10 a 14 » . . . . .	68	13	9	7	9	1	10	8	4.0	3.8	2.7	2.1	2.7	0.3	3.0	2.4
» 15 a 19 » . . . . .	36	10	6	5	4	8	4	1	2.4	3.3	2.0	1.7	1.3	2.7	1.4	0.3
» 20 a 29 » . . . . .	51	3	13	7	4	3	7	2	2.1	0.6	2.7	1.4	0.8	0.6	1.4	0.4
» 30 a 39 » . . . . .	60	5	10	5	8	7	6	5	3.0	1.3	2.5	1.3	2.0	1.8	1.5	1.3
» 40 a 49 » . . . . .	46	6	7	5	2	9	8	3	2.7	1.7	2.0	1.4	0.6	2.6	2.3	0.9
» 50 a 59 » . . . . .	53	3	4	7	5	4	8	6	3.7	1.0	1.4	2.4	1.7	1.4	2.8	2.1
» 60 a 79 » . . . . .	63	8	13	7	11	7	9	3	4.2	2.7	4.4	2.4	3.7	2.4	3.0	1.0
Da 80 anni in su . . . . .	4	1	2	1	..	1	1	..	3.9	4.9	9.9	4.9	..	4.9	4.9	..
Età ignota . . . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
TOTALE . . . . .	499	66	80	63	55	56	58	45	3.1	2.0	2.4	2.0	1.7	1.7	1.8	1.3

Confrontando il numero dei morti in ciascun gruppo di età col totale dei coetanei viventi secondo il censimento del 10 febbraio 1901, si rileva che i gruppi più esposti a contrarre la rabbia sono quelli dei fanciulli fra 5 e 15 anni e quelli dei vecchi da 60 anni in su. I bambini, sotto i 5 anni, per essere meglio sorvegliati, e gli adulti fra 15 e 60 anni, perchè più in grado di difendersi, sono relativamente risparmiati.

**Morti per malattie tubercolari sopra un milione di abitanti, negli anni dal 1887 al 1904.**

PROSPETTO N. 5.

MALATTIE TUBERCOLARI	TRIENNI		ANNI											
	1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904
Tubercolosi disseminata	307	290	274	279	315	247	242	244	147	72	71	80	111	110
Tisi polmonare . . . . .	1070	1028	970	1013	1015	1057	977	957	1092	1218	1112	1008	1005	1064
Scrofola disseminata e lupo . . . . .	103	86	70	70	63	64	60	52	48	47	41	37	37	34
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito . . . . .	187	189	203	177	144	154	140	142	184	183	177	168	165	164
Tabe mesenterica e tubercolosi intestinale . . . . .	422	364	354	326	324	329	292	286	273	283	249	239	219	219
Artrite fungosa, sinovite fungosa e tubercolosi delle ossa . . . . .	(a) 26	(a) 28	(a) 25	(a) 20	41	47	48	52	54	51	51	53	54	53
TOTALE . . . . .	2115	1985	1896	1885	1902	1898	1759	1733	1798	1854	1701	1585	1591	1644

La diminuzione è stata più notevole nelle morti per *scrofola*, *tabe mesenterica* e *meningite tubercolare* che non in quelle per *tubercolosi polmonare* o *disseminata in più organi*, prese complessivamente.

Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello sopra indicato, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, sono stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 20 nel 1902 ed a 19 tanto nel 1903 quanto nel 1904; che i morti per *bronchite*, i quali nel triennio 1887-89 erano stati 2220 per ogni milione di abitanti, nel triennio 1902-1904 scesero a 1858; e che il numero dei morti per *meningite acuta* si è mantenuto quasi invariato fra il 1887 ed il 1904, si può legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata nel numero dei morti per malattie tubercolari non dipende dall'aver i medici negli ultimi anni di osservazione celata più spesso la diagnosi di tali malattie, sostituendovi dichiarazioni di morte per polmonite cronica o per bronchite o per meningite semplice.

Oltre ai casi di morte per tubercolosi delle ossa, sommati colle altre forme tubercolari, si contano circa 400 morti all'anno pel morbo di Pott.

Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta scemando dal 1887 in poi.

(a) Non compresi i morti per tubercolosi delle ossa che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

Mortalità delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto  
negli anni dal 1887 al 1904.

PROSPETTO N. 6.

	ANNI	NUMERO dei parti (nati vivi e nati morti)	NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza parto e puerperio	NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	OGNI 1000 parti morirono	
					gestanti	neonati
	1904. . . . .	1 120 856	2 981	811	2.7	0.7
	1903. . . . .	1 075 851	2 771	679	2.6	0.6
	1902. . . . .	1 127 901	2 807	864	2.5	0.8
	1901. . . . .	1 090 907	2 767	848	2.5	0.8
	1900. . . . .	1 100 055	3 034	1 007	2.8	0.9
	1899. . . . .	1 121 084	3 572	1 031	3.2	0.9
	1898. . . . .	1 102 373	3 230	1 000	2.9	0.9
REGNO . . . . .	1897. . . . .	1 135 505	3 342	1 101	2.9	1.0
	1896. . . . .	1 128 782	3 627	1 213	3.2	1.1
	1895. . . . .	1 125 131	3 407	1 568	3.0	1.4
	1894. . . . .	1 135 460	4 048	2 188	3.6	1.9
	1893. . . . .	1 158 552	3 990	2 202	3.4	1.9
	1890-92 . . .	3 416 431	12 236	6 481	3.6	1.9
	1887-89 . . .	3 508 892	19 930	9 660	5.7	2.8

La mortalità per *pellagra* variò, durante il periodo di osservazione, in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire (da 115 morti ogni milione di abitanti nella media del triennio 1887-89 a 74 nel triennio 1902-1904).

I morti per *diabete* furono, in cifre effettive, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1154 nel 1902, a 1139 nel 1903 ed a 1242 nel 1904. Si nota invece una diminuzione nel numero dei morti per *gota*, da 231 nel 1887 a 126 nel 1904, in cifre effettive; e per *scorbuto*, da 532 a 160 negli stessi anni.

Le cifre dei bambini morti entro il primo mese dopo la nascita per *atrofia congenita*, si sono mantenute quasi invariate in ciascun anno del periodo 1887-95; ma diminuirono notevolmente negli anni susseguenti per la scemata mortalità infantile e per una maggiore accuratezza delle diagnosi fatte dai medici curanti. Al contrario, col prolungarsi della vita media dell'uomo, viene crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*.

La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti nel 1887 a 566 nel 1904).

Se si dividono i morti per *tumori maligni*, secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

Morti causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi,  
negli anni dal 1887 al 1904.

PROSPETTO N. 7.

SEDE DEI TUMORI MALIGNI	MEDIA ANNUALE				NUMERO DEI MORTI NEGLI ANNI						
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	1903	1904	
Tumori maligni	disseminati in più organi o di sede indeterminata	2 787	2 993	3 489	3 553	3 624	3 761	3 770	3 542	3 905	3 974
	dell'utero, vagina, ovaia.	2 403	2 375	2 322	2 469	2 578	2 564	2 501	2 590	2 502	2 572
	delle mammelle . . . . .	1 013	862	874	908	916	950	863	927	855	973
	della vescica, uretra, pro- stata, pene, testicoli. . .	308	285	259	306	283	301	327	346	325	394
	della bocca, labbra, lin- gua, palato, fauci, tiroi- de, laringe, trachea . . .	437	415	555	858	1 145	1 059	1 095	1 143	1 067	1 233
	dello stomaco, esofago . .	3 341	3 739	4 021	4 510	4 613	4 613	4 865	4 928	5 179	5 356
	del fegato, milza, pan- creas, intestino, peri- toneo . . . . .	2 122	2 235	2 380	2 998	3 240	3 312	3 401	3 559	3 445	3 877
	delle ossa, articolazioni .	254	79	81	202	139	237	257	544	409	359
	dei centri nervosi ed or- gani dei sensi . . . . .	61	44	73	123	142	76	62	55	87	122
	TOTALE . . . . .	12 726	13 027	14 054	15 927	16 680	16 873	17 141	17 634	17 774	18 860

Una leggera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1904 nel numero dei morti di *apoplessia cerebrale*, di *epilessia*, di *epatite* e di *reumatismo articolare cronico*; il fatto opposto si è verificato per i *vizi di cuore*, per le malattie delle *arterie* e per malattie *dei reni*.

Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*, da 805 per un milione d'abitanti nel 1887 a 463 nel 1904. È noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di meningite e di disturbi dell'apparato digerente; e perciò la diminuzione avvertita dipende in parte dall'aver i medici assegnato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1904 nella mortalità per malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio; infatti i morti per *bronchite acuta e cronica* diedero un quoziente di 2416 ogni milione di abitanti nella media degli anni 1887-92, si mantennero intorno a questo numero fino all'anno 1895 e diminuirono notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1902-1904 scesero a 1858.

A partire dall'anno 1899 i morti di *bronchite* sono stati divisi in due gruppi secondo che si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di bronchite capillare infantile) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari, è stata, nella media del sessennio 1899-1904, dichiarata causa di morte di



247 individui per ogni milione di abitanti, ossia di circa un ottavo del totale dei morti per *bronchite*.

La *polmonite crupale* e la *bronco-polmonite acuta* aggravarono la mortalità di 2350 casi in media ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2514 ogni milione di abitanti); negli anni seguenti il quoziente di mortalità per questa causa scemò sensibilmente, per risalire poi nel 1903 a 2513 morti ogni milione di abitanti, e scendere a 2090 nel 1904, che è il quoziente più basso fra tutti quelli osservati in questo periodo d'anni. Anche per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per polmonite cruposa da quelli morti per bronco-polmonite acuta. Nella media del sessennio 1899-1904, i primi risultarono nella proporzione di 1298 ed i secondi di 993 per un milione di abitanti.

I morti per *malattie della pleura* discesero da 159 ogni milione di abitanti nel 1887 a 90 nell'anno 1904.

La mortalità per *diarrea, enterite, colera indigeno, colite, proctite ed ulcera intestinale* presenta, nel periodo di tempo da noi considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3147 morti ogni milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3650 (il più alto nel periodo), nel 1897 scese a 3141, per risalire subito nell'anno appresso a 3511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2955, determinando così in detto anno il quoziente più basso. Nel 1900 la mortalità per le suddette cause tornò ad aggravarsi fortemente, dando un altro massimo quoziente di 3560 ogni milione di abitanti; nel 1901 essa ridiscese al quoziente di 3025, nel 1902 risali a 3397, nel 1903 diede un quoziente di 3284 e nel 1904 di 3136.

I morti per *elmintiasi* sono stati 5104 nel 1887 in cifre effettive, e queste cifre sono diminuite gradatamente negli anni susseguenti fino a 1203 nel 1904. La diminuzione soltanto in parte è un fatto reale e dipende dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; ma per altra parte essa deve essere stata causata da una maggiore accuratezza dei medici nel fare le diagnosi delle malattie. Un tempo parecchi casi di malattie dell'apparato digerente nei bambini erano dai medici attribuiti alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata un'importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatasi nel canale digerente. Probabilmente dipende dallo stesso motivo la diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per *dissenteria*, da 6279 nel 1887, in cifre effettive, a 14 nel 1904. Pei primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per diarrea, mentre negli ultimi vi furono iscritti i soli casi di dissenteria cruenta.

La maggiore precisione di diagnosi da parte dei medici, mentre ha fatto diminuire la cifra dei morti per eclampsia infantile, per elmintiasi e per dissenteria, ha contribuito a tener alto dal 1887 in poi il numero dei morti per diarrea e gastroenterite.

L'*alcoolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre effettive. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo salì improvvisamente

a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare nel 1895 a 473. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, nel 1901 fu soltanto di 414, nel 1902 di 400, nel 1903 di 401 e nel 1904 salì a 509, numero che dà un quoziente di 15 morti per ogni milione di abitanti. Inoltre nel 1904 avvennero 38 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi e 2 suicidi per frenosi alcoolica.

Delle morti violente, siano esse dovute ad infortunio accidentale, a omicidio od a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo IV della presente Introduzione.

Fermandoci a considerare particolarmente l'andamento della mortalità nell'anno 1904, durante il quale si ebbero 20,950 morti per ogni milione di abitanti, e classificando le morti stesse secondo le cause che le produssero nell'ordine decrescente della loro frequenza, troviamo che ve ne furono:

- 3136 per diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.;
- 2090 „ polmonite acuta (1125 per polmonite crupale e 965 per bronco polmonite acuta);
- 1722 „ bronchite acuta e cronica (1473 per bronchite acuta e 249 per bronchite cronica);
- 1688 „ malattie del cuore e del pericardio;
- 1644 „ malattie tubercolari complessivamente (1174 per tubercolosi disseminata e polmonare e 470 per le altre forme tubercolari);
- 1390 „ immaturità e atrofia congenita;
- 1318 „ marasmo senile;
- 989 „ apoplezia e congestione cerebrale;
- 566 „ tumori maligni;
- 463 „ eclampsia infantile;
- 421 „ meningite semplice cerebrale e spinale;
- 394 „ malattie dei reni;
- 367 „ febbre tifoide;
- 331 „ cause violente accidentali;
- 267 „ anemia e leucemia;
- 254 „ febbri e cachessia da malaria (191 per febbri da malaria e 63 per cachessia palustre);
- 254 „ malattie delle arterie;
- 234 „ gastrite;
- 179 „ ipertosse;
- 160 „ morbillo;
- 150 „ epatite e cirrosi;
- 148 „ paralisi, rammollimento cerebrale, tumori cerebrali e spinali;
- 147 „ peritonite;
- 136 „ difterite e crup;
- 114 „ influenza;
- 99 „ asma, enfisema e congestione polmonare;
- 93 „ vaiuolo e vaiuoloide;
- 90 „ pleurite;
- 88 „ rachitide;
- 87 „ risipola infettiva;
- 85 „ mielite e tabe dorsale;

71	per	malattie della vescica;
71	"	pellagra;
70	"	flemmone, ascesso, cangrena della pelle;
67	"	occlusione intestinale, volvolo;
66	"	sclerema;
65	"	suicidi;
58	"	setticemia e pioemia;
57	"	malattie delle fosse nasali, della trachea e laringe;
56	"	epilessia;
56	"	mughetto, noma, glossite;
55	"	siflide;
48	"	scarlattina;
44	"	itterizia;
39	"	omicidi;
39	"	ernie intestinali ed addominali;
37	"	diabete;
36	"	parassiti intestinali;
36	"	malattie delle ossa;
31	"	encefalite;
29	"	reumatismo articolare acuto;
26	"	reumatismo cronico;
24	"	asfissia ed apoplezia nel parto;
19	"	polmonite cronica;
19	"	tetano;
18	"	pemfigo, eczema, ectima, psoriasi;
15	"	alcoolismo cronico;
14	"	porpora emorragica;
13	"	morbo di Pott;
11	"	pustola maligna;
5	"	scorbuto;
4	"	gota;
4	"	malattie delle vene;
3	"	corea;
3	"	atrofia gialla acuta del fegato;
2	"	meningite epidemica;
1	"	rabbia.

Se si guarda poi alle cause di morte proprie del sesso femminile, risulta che per ogni milione di donne viventi ne morirono 183 per malattie di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale) e 23 per malattie dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio.

### § 3. — Morti avvenute nell'anno 1904 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia.

Il prospetto seguente fa conoscere le morti avvenute nell'anno 1904 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, tanto in cifre effettive, quanto in cifre proporzionali a 1000 abitanti. Le cifre di popolazione, alle quali sono ragguagliate quelle dei morti, sono indicate nel prospetto I a pagina vii.

Numero dei morti e quozienti di mortalità per l'anno 1904 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia.

PROSPETTO N. 8.

PROVINCIE	PROVINCIA		COMUNE CAPOLUOGO				
	cifre effettive dei morti	cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti	Cifre effettive degli appartenenti alla popolazione			Cifre proporzionali	
			stabile		occasionale	Morti per 1000 individui della popolazione	
			morti nel Comune di contro indicato	morti in altri Comuni	morti nel Comune di contro indicato	stabile (Col. 4 + 5)	totale (Col. 4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Alessandria . . . . .	14 349	17.3	1 289	47	52	19.7	18.3
Cuneo . . . . .	13 052	20.4	673	20	37	29.6	25.8
Novara . . . . .	13 945	18.4	792	53	372	19.8	24.2
Torino . . . . .	21 852	19.1	6 193	281	450	19.6	18.7
Genova . . . . .	17 823	18.3	4 622	463	516	23.0	20.8
Porto Maurizio . . . . .	2 924	20.1	120	5	6	19.2	17.5
Bergamo . . . . .	12 664	26.7	1 186	155	382	29.3	31.7
Brescia . . . . .	12 492	22.6	1 608	130	358	26.5	27.1
Como . . . . .	13 303	22.4	648	117	319	20.4	23.7
Cremona . . . . .	7 272	21.9	880	80	430	26.9	33.7
Mantova . . . . .	6 099	19.4	783	40	184	30.6	32.9
Milano . . . . .	33 426	22.0	8 792	1 952	1 491	21.1	19.1
Pavia . . . . .	9 208	18.3	691	77	234	23.9	27.3
Sondrio . . . . .	2 721	21.5	122	11	20	17.6	16.9
Belluno . . . . .	4 119	20.9	395	32	62	23.2	23.6
Padova . . . . .	8 834	19.5	1 624	104	228	22.3	22.0
Rovigo . . . . .	4 837	21.6	188	8	69	19.0	23.0
Treviso . . . . .	7 665	18.3	665	68	189	23.3	24.7
Udine . . . . .	11 296	18.5	764	53	219	22.5	25.1
Venezia . . . . .	8 356	20.4	2 997	216	437	22.4	22.1
Verona . . . . .	7 735	18.1	1 384	65	224	21.9	21.3
Vicenza . . . . .	8 675	18.9	1 015	50	206	24.7	26.6
Bologna . . . . .	9 541	17.7	2 778	130	337	19.9	19.7
Ferrara . . . . .	5 750	20.5	1 604	45	100	20.1	20.1
Forlì . . . . .	5 979	20.9	778	31	15	19.0	17.9
Modena . . . . .	6 840	21.2	1 481	94	114	25.4	24.1
Parma . . . . .	5 946	19.8	1 135	131	357	27.8	29.8
Piacenza . . . . .	4 709	18.9	713	57	362	24.3	29.7
Ravenna . . . . .	4 048	17.0	1 115	30	24	18.4	17.6
Reggio nell'Emilia . . . . .	6 118	21.8	1 295	55	206	23.7	25.0
Arezzo . . . . .	5 932	21.3	857	17	235	19.9	24.1
Firenze . . . . .	18 342	18.9	3 827	304	881	21.2	22.1
Grosseto . . . . .	2 580	17.0	136	18	61	16.9	19.5
Livorno . . . . .	2 483	20.0	1 921	89	82	21.8	20.3
Lucca . . . . .	6 015	18.4	1 298	106	388	19.3	22.1
Massa e Carrara . . . . .	4 155	20.6	570	1	31	21.0	21.5
Pisa . . . . .	5 705	17.4	1 055	58	263	18.8	21.0
Siena . . . . .	4 773	19.9	602	35	369	25.0	33.5

Numero dei morti e quozienti di mortalità per l'anno 1904 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia.

Segue PROSPETTO N. 8.

PROVINCIE	PROVINCIA		COMUNE CAPOLUOGO				
	cifre effettive dei morti	cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti	Cifre effettive degli appartenenti alla popolazione			Cifre proporzionali	
			stabile		occasionale	Morti per 1000 individui della popolazione	
			Morti nel Comune di contro indicatedo	Morti in altri Comuni	Morti nel Comune di contro indicatedo	stabile (Col. 4 + 5)	totale (Col. 4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ancona . . . . .	6 545	21.2	1 011	109	89	20.6	18.7
Ascoli Piceno . . . . .	4 881	19.3	497	24	25	17.8	17.3
Macerata . . . . .	5 330	20.2	391	2	66	18.0	19.6
Pesaro e Urbino . . . . .	5 800	22.3	487	17	58	21.0	21.0
Perugia . . . . .	13 454	19.6	1 170	44	157	19.9	20.9
Roma . . . . .	24 366	19.2	8 645	488	1 311	20.2	19.6
Aquila degli Abruzzi . . . . .	9 028	22.3	469	7	14	24.1	22.2
Campobasso . . . . .	9 191	25.0	298	5	22	21.7	21.2
Chieti . . . . .	7 625	20.3	531	10	12	20.9	19.9
Teramo . . . . .	6 043	19.0	652	..	1	26.7	25.6
Avellino . . . . .	8 640	21.4	510	18	20	23.4	22.2
Benevento . . . . .	5 365	20.6	545	6	32	22.7	22.8
Caserta . . . . .	15 731	19.7	640	16	35	21.3	20.4
Napoli . . . . .	28 225	23.9	13 674	266	817	25.5	25.1
Salerno . . . . .	11 974	21.1	982	39	12	23.7	21.8
Bari delle Puglie . . . . .	21 667	25.2	1 949	62	41	25.6	24.5
Foggia . . . . .	12 910	29.3	1 436	16	104	26.3	27.4
Lecce . . . . .	19 904	26.9	557	8	47	17.6	17.7
Potenza . . . . .	13 239	27.0	336	18	10	23.0	21.4
Catanzaro . . . . .	10 878	22.5	960	31	16	32.2	30.1
Cosenza . . . . .	9 512	20.2	525	36	39	27.0	25.2
Reggio di Calabria . . . . .	8 710	19.8	983	39	24	23.5	22.2
Caltanissetta . . . . .	8 854	25.9	773	27	14	17.7	16.9 <sup>4</sup>
Catania . . . . .	17 994	24.4	3 078	149	570	20.7	22.5
Girgenti . . . . .	9 397	24.4	641	31	11	27.2	25.3
Messina . . . . .	10 941	19.5	3 272	12	118	22.4	21.9
Palermo . . . . .	15 931	19.7	5 915	152	411	19.4	19.5
Siracusa . . . . .	10 733	24.0	724	29	17	22.9	21.7
Trapani . . . . .	6 373	16.4	764	148	61	14.3	12.6
Cagliari . . . . .	11 021	22.2	1 035	29	86	19.9	19.5
Sassari . . . . .	6 779	21.3	842	60	29	25.0	22.5
<b>Regno . . . . .</b>	<b>698 604</b>	<b>20.9</b>	<b>112 888</b>	<b>7 126</b>	<b>14 629</b>	<b>21.9</b>	<b>21.7</b>

I quozienti massimi di mortalità, nell'anno 1904, si ebbero nelle provincie di Foggia (29.3 ogni 1000 abitanti), di Potenza (27.0), di Lecce (26.9), di Bergamo (26.7), di Caltanissetta (25.9), di Bari (25.2), di Campobasso (25.0), di Catania (24.4), di Girgenti (24.4), di Siracusa (24.0) e di Napoli (23.9). I quozienti minimi furono dati dalle provincie di Trapani con 16.4 ogni 1000 abitanti, di Ravenna (17.0), di Grosseto (17.0), di Alessandria (17.3), di Pisa (17.4), di Bologna (17.7), di Verona (18.1), di Genova, Pavia e Treviso (18.3), di Novara e Lucca (18.4), di Udine (18.5), di Vicenza, Piacenza e Firenze (18.9). Da tali quozienti si deduce che, nell'anno 1904, la mortalità nell'Italia meridionale è stata più alta di quella verificatasi nell'Italia settentrionale e centrale, e questo fatto si è osservato anche nelle statistiche degli anni anteriori al 1904.

Per ciò che riguarda le morti avvenute nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, esse furono divise in tre categorie, cioè:

1° Morti avvenute nel Comune di individui che avevano la loro dimora abituale nel medesimo;

2° Morti avvenute nel Comune di individui che vi dimoravano solo occasionalmente;

3° Morti d'individui iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune, avvenute mentre essi si trovavano accidentalmente fuori del territorio del Comune medesimo, e delle quali si prese nota nel registro degli atti di stato civile per trascrizione, secondo l'articolo 106 del regio decreto del 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

È noto che nelle città più popolate, le quali sono sede di importanti istituti di ricovero e di cura, trovano assistenza e possono soccombere molti individui aventi la loro dimora in Comuni finitimi, dove essi contrassero la malattia che li trasse a morte; perciò, ove si calcolassero per questi Comuni i quozienti di mortalità in rapporto al numero totale delle morti ivi avvenute, essi verrebbero ad essere indebitamente aggravati. Ma, per altra parte, molti cittadini di questi grandi centri, generalmente sede di attivi commerci, se ne allontanano spesso per ragione di affari, cosicchè possono soccombere fuori della loro dimora abituale; inoltre parecchi bambini nati nei Comuni capiluoghi sono collocati a balatico mercenario sia dalle famiglie, sia dalle Amministrazioni dei brefotrofi, in luoghi finitimi e non pochi vi muoiono.

Per avere quindi un'idea più esatta della frequenza della mortalità nei Comuni capiluoghi, conviene fare astrazione dalle morti ivi avvenute occasionalmente, e tener conto invece delle morti avvenute occasionalmente fuori del territorio del Comune.

Le cifre indicate nella colonna 7 del prospetto 8 rappresentano appunto i quozienti di mortalità riguardanti la popolazione stabile, mentre quelle della colonna 8 rappresentano la mortalità complessiva.

Nell'insieme dei 69 Comuni capiluoghi la differenza fra i due quozienti è minima, giacchè il primo arriva a 21.9 ed il secondo a 21.7 per 1000 abitanti.

Nell'anno 1904 morirono occasionalmente nei Comuni suddetti 14,629 individui, per contro altri 7126 in essi residenti, morirono fuori del Comune. Quantunque il numero di questi non sia che la metà di quello dei primi, siccome il quoziente di mortalità della popolazione stabile è calcolato soltanto sulla popolazione stessa (che è

inferiore di 393,304 abitanti alla popolazione totale), così detto quoziente è riuscito leggermente più alto di quello complessivo.

Considerando peraltro separatamente i singoli Comuni, si trova che per parecchi di essi, la differenza fra i due quozienti è notevole. Per esempio, nel comune di Siena il quoziente di mortalità della popolazione stabile in confronto a quello della popolazione totale si riduce a 25.0 da 33.5; quello di Cremona a 26.9 da 33.7; quello di Piacenza a 24.3 da 29.7; quello di Novara a 19.8 da 24.2; quello di Pavia a 23.9 da 27.3; quello di Parma a 27.8 da 29.8; quello di Rovigo a 19.0 da 23.0; quello di Pisa a 18.8 da 21.0.

I quozienti più alti di mortalità nella popolazione stabile si ebbero nel 1904 nei comuni di Catanzaro (32.2), Mantova (30.6), Cuneo (29.6), Bergamo (29.3), Parma (27.8), Girgenti (27.2), Cosenza (27.0), Cremona (26.9), Teramo (26.7), Brescia (26.5) e Foggia (26.3). Ebbero i quozienti più bassi i comuni di Trapani (14.3), Grosseto (16.9), Sondrio e Lecce (17.6), Caltanissetta (17.7), Ascoli Piceno (17.8) e Macerata (18.0).

Infine, nel confrontare i quozienti di mortalità per provincie, si deve anche tener presente che essi risentono l'influenza di un fatto demografico d'indole opposta a quello che studiamo, cioè delle nascite; perchè dove sono alti i quozienti di natività, sono d'ordinario anche alti quelli di mortalità, per il grande numero di bambini che soccombono nei primi anni di vita.

Più innanzi, nei prospetti XI, XII, XIII e XIV, si trovano particolareggiate notizie sulla mortalità dei bambini finò a un anno e fino a 5 anni, le quali danno la misura in cui questo fenomeno si manifesta nel nostro paese. Ma per determinare l'influenza suaccennata occorrerebbe porre le cifre della mortalità infantile in relazione colle nascite, per ciascuna provincia, poichè soltanto ravvicinando questi due quozienti dei morti di qualsiasi età e dei morti di età non superiore a un anno si potrebbe valutare l'azione della natività più o meno alta sulle cifre della prima serie; però non è qui il luogo di farlo (a).

#### § 4. — Distribuzione geografica di alcune malattie, specialmente infettive, negli anni 1902, 1903 e 1904.

Per la singolare importanza delle malattie infettive, come indice delle condizioni igieniche generali e locali, stimiamo utile di mettere in evidenza dove siano state più frequenti e dove meno quelle forme morbose che nel nostro paese hanno una maggior diffusione. A ciò è inteso il prospetto seguente, in cui è indicato, in cifre effettive ed in cifre proporzionali a 100,000 abitanti, il numero dei morti per *vaiuolo*, per *morbillo*, per *scarlattina*, per *difterite* e *crup*, per *febbre tifoide*, per *ipertosse*, per *febbri da malaria*, per *sifilide*, per *pustola maligna* e *carbonchio*, per *febbre puerperale*, per *pellagra*, per *tuberculosis disseminata* e *sue manifestazioni locali* e per *polmonite acuta*, nei singoli compartimenti del Regno, durante gli anni 1902, 1903 e 1904.

(a) Chi voglia compiere questo studio comparativo ne troverà gli elementi che qui mancano nella pubblicazione annuale di questa stessa Direzione che intitolasi " *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile* ".

Morti per alcune malattie infettive e per

pellagra negli anni 1902, 1903 e 1904.

COMPARTIMENTI	Totale dei morti per qualsiasi causa			Valuolo			Morbilli		
	1904	1903	1902	1904	1903	1902	1904	1903	1902
Piemonte . . . . .	63 198	68 567	65 852	6	27	40	226	476	655
Liguria . . . . .	20 747	20 624	21 121	17	23	107	98	77	416
Lombardia . . . . .	97 185	101 259	98 611	8	22	102	1 101	1 280	1 238
Veneto . . . . .	61 517	61 897	61 498	6	12	14	374	160	798
Emilia . . . . .	48 931	55 369	53 456	4	3	7	101	318	498
Toscana . . . . .	49 985	54 338	53 836	5	10	25	231	486	810
Marche . . . . .	22 556	24 008	23 261	3	3	2	49	45	369
Umbria . . . . .	13 454	14 800	13 073	2	..	2	35	45	112
Lazio . . . . .	24 366	26 000	24 614	6	2	21	471	275	704
Abruzzi e Molise . . . . .	31 887	35 263	33 989	1	31	11	491	450	429
Campania . . . . .	69 935	71 144	74 992	18	48	796	615	599	1 291
Puglie . . . . .	54 481	58 634	56 120	2 058	5 109	1 061	510	706	809
Basilicata . . . . .	13 239	13 461	14 164	298	97	12	147	238	733
Calabrie . . . . .	29 100	31 798	32 202	80	141	5	295	777	595
Sicilia . . . . .	80 223	82 095	83 477	581	516	205	411	1 320	386
Sardegna . . . . .	17 800	17 054	16 915	..	5	3	177	31	118
REGNO . . . . .	698 604	736 311	727 181	3 093	6 049	2 413	5 332	7 283	9 961

A) Cifre

effettive.

Scarlattina			Difterite e erup.			Febbri da malaria						Febbre tifoide		
1904	1903	1902	1904	1903	1902	1904		1903		1902		1904	1903	1902
						Febbri da malaria	Cachessia palustre	Febbri da malaria	Cachessia palustre	Febbri da malaria	Cachessia palustre			
75	40	23	357	348	378	49	13	57	13	63	11	860	710	573
25	33	85	145	151	182	5	2	4	2	11	1	219	182	164
59	68	20	1 046	1 000	1 202	58	31	77	32	142	30	1 924	1 787	1 856
72	48	69	622	496	517	88	25	99	24	134	30	1 021	939	962
44	49	36	316	284	321	50	22	85	34	116	27	672	751	584
16	28	43	592	478	451	38	10	58	23	112	35	1 064	1 144	944
23	10	58	50	66	78	11	1	11	2	10	3	493	496	328
7	10	5	68	79	91	9	..	10	2	11	..	274	259	218
17	26	16	136	94	131	199	62	202	82	231	93	455	416	399
101	102	15	173	144	133	415	133	507	141	412	117	629	551	569
126	354	271	327	252	294	409	133	311	104	394	128	921	818	928
396	595	221	102	150	227	1 435	477	1 428	478	1 505	566	928	1 064	1 092
35	48	38	35	19	35	566	211	404	160	444	250	146	167	150
507	503	325	105	135	170	438	218	596	242	704	352	464	470	557
108	77	110	418	346	268	1 419	537	1 705	573	2 014	730	2 001	1 816	1 939
..	..	3	27	22	36	1 168	231	860	191	1 016	216	168	101	95
1 611	1 991	1 338	4 519	4 064	4 514	6 357	2 106	6 414	2 103	7 319	2 589	12 239	11 671	11 358

B) Cifre proporzionali

a 100,000 abitanti.

Piemonte . . . . .	1 875	2 044	1 972	..	1	1	7	14	19
Liguria . . . . .	1 856	1 865	1 931	2	2	10	9	7	38
Lombardia . . . . .	2 202	2 315	2 274	..	1	2	25	29	29
Veneto . . . . .	1 923	1 946	1 945	..	..	..	12	5	25
Emilia . . . . .	1 959	2 231	2 167	..	..	..	4	13	20
Toscana . . . . .	1 908	2 091	2 088	..	..	1	9	19	31
Marche . . . . .	2 078	2 227	2 172	..	..	..	5	4	34
Umbria . . . . .	1 959	2 173	1 936	..	..	..	5	7	17
Lazio . . . . .	1 925	2 088	2 009	..	..	2	37	22	57
Abruzzi e Molise . . . . .	2 173	2 415	2 340	..	2	1	33	31	30
Campania . . . . .	2 175	2 224	2 356	1	2	25	19	19	41
Puglie . . . . .	2 669	2 906	2 816	101	253	53	25	35	41
Basilicata . . . . .	2 698	2 743	2 886	61	20	2	30	49	149
Calabrie . . . . .	2 086	2 292	2 333	6	10	..	21	56	43
Sicilia . . . . .	2 188	2 264	2 328	16	14	6	11	36	11
Sardegna . . . . .	2 186	2 111	2 112	..	1	..	22	4	15
REGNO . . . . .	2 095	2 225	2 215	9	18	7	16	22	30

2	2	1	11	10	11	1	..	2	..	2	..	26	21	17
2	3	8	13	14	17	..	..	..	..	1	..	20	16	15
1	2	..	24	23	28	1	1	2	1	3	1	44	41	43
2	2	2	19	16	16	3	1	3	1	4	1	32	30	30
2	2	1	13	11	13	2	1	3	1	5	1	27	30	24
1	1	2	23	18	17	1	..	2	1	4	1	41	44	37
2	1	5	5	6	7	1	..	1	..	1	..	45	46	31
1	1	1	10	12	13	1	..	1	..	2	..	40	38	32
1	2	1	11	8	11	16	5	16	7	19	8	36	33	33
7	7	1	12	10	9	28	9	35	10	28	8	43	38	39
4	11	9	10	8	9	13	4	10	3	12	4	29	26	29
19	29	11	5	7	11	70	23	71	24	76	28	45	53	55
7	10	8	7	4	7	115	43	82	33	90	51	30	34	31
36	36	24	8	10	12	31	16	43	17	51	26	33	34	40
3	2	3	11	10	7	39	15	47	16	56	20	55	50	54
..	..	..	3	3	4	143	28	106	24	127	27	21	13	12
5	6	4	14	12	14	19	6	19	6	22	8	37	35	35



Morti per alcune malattie infettive e per

Segue PROSPETTO N. 9.

COMPARTIMENTI	Ipertosse			Sifilide			Pustola maligna, carbonchio		
	1904	1903	1902	1904	1903	1902	1904	1903	1902
Piemonte . . . . .	411	946	778	64	60	99	12	10	13
Liguria . . . . .	95	79	139	56	50	57	11	8	6
Lombardia . . . . .	910	928	1 217	139	239	183	11	8	9
Veneto . . . . .	999	893	843	81	92	78	10	3	5
Emilia . . . . .	746	667	815	73	78	78	8	7	9
Toscana . . . . .	629	681	868	70	77	77	17	18	16
Marche . . . . .	341	122	172	34	36	47	4	4	2
Umbria . . . . .	233	48	90	33	30	22	11	22	22
Lazio . . . . .	173	298	173	172	162	202	14	18	29
Abruzzi e Molise . . . . .	196	386	421	100	93	107	14	25	20
Campania . . . . .	115	182	476	317	355	355	42	46	46
Puglie . . . . .	171	353	217	142	135	150	32	51	43
Basilicata . . . . .	33	133	51	24	23	38	33	43	35
Calabria . . . . .	133	142	178	232	178	174	49	51	61
Sicilia . . . . .	539	341	555	285	276	303	49	48	55
Sardegna . . . . .	234	322	209	27	35	39	38	34	32
REGNO . . . . .	5 958	6 521	7 202	1 849	1 919	2 009	355	396	403

A) Cifre

Piemonte . . . . .	12	28	23	2	2	3	..	..	..
Liguria . . . . .	8	7	13	5	5	5	1	1	1
Lombardia . . . . .	21	21	28	3	5	4	..	..	..
Veneto . . . . .	31	28	27	3	3	2	..	..	..
Emilia . . . . .	30	27	33	3	3	3	..	..	..
Toscana . . . . .	24	26	34	3	3	3	1	1	1
Marche . . . . .	31	11	16	3	3	4	..	..	..
Umbria . . . . .	34	7	13	5	4	3	2	3	3
Lazio . . . . .	14	24	14	14	13	16	1	1	2
Abruzzi e Molise . . . . .	13	26	29	7	6	7	1	2	1
Campania . . . . .	4	6	15	10	11	11	1	1	1
Puglie . . . . .	8	17	11	7	7	8	2	3	2
Basilicata . . . . .	7	27	10	5	5	8	7	9	7
Calabria . . . . .	10	10	13	17	13	13	4	4	4
Sicilia . . . . .	15	9	15	8	8	8	1	1	2
Sardegna . . . . .	29	40	26	3	4	5	5	4	4
REGNO . . . . .	18	20	22	6	6	6	1	1	1

B) Cifre proporzionali

pellagra negli anni 1902, 1903 e 1904.

Febbre puerperale			Pellagra			Tubercolosi disseminate e sue manifestazioni locali			Polmonite acuta					
1904	1903	1902	1904	1903	1902	1904	1903	1902	1904		1903		1902	
									Polmo- nite crupale	Bronco polmonite acuta	Polmo- nite crupale	Bronco polmonite acuta	Polmo- nite crupale	Bronco polmonite acuta
107	104	85	61	77	81	5 825	5 944	5 392	4 010	3 517	4 877	3 909	3 780	3 521
31	32	29	..	5	6	2 411	2 384	2 340	1 286	1 843	1 410	1 680	1 224	1 866
156	178	149	701	677	671	9 298	9 214	8 808	5 363	4 446	6 725	5 054	5 339	4 359
83	71	76	848	959	811	5 929	5 672	5 526	2 709	2 601	2 990	2 777	2 582	2 546
99	86	90	290	389	371	4 667	4 344	4 244	2 205	2 304	3 218	2 930	2 634	2 605
80	77	75	95	120	116	5 071	4 696	4 773	2 501	2 461	3 417	2 807	2 930	2 807
31	31	30	184	201	144	1 461	1 396	1 345	726	784	997	890	879	854
21	40	22	138	176	148	941	912	850	626	566	839	664	566	552
40	54	46	21	27	19	2 303	2 256	2 231	1 359	1 284	1 745	1 360	1 396	1 282
63	70	60	16	12	6	1 920	1 968	1 940	1 564	1 369	2 153	1 568	1 643	1 438
84	108	102	..	2	1	4 289	3 749	4 168	3 936	4 203	4 907	4 594	4 561	4 876
67	70	60	1	..	1	3 221	3 114	3 417	3 119	2 098	3 911	2 126	3 825	2 235
18	16	14	..	..	1	520	446	454	711	473	923	621	790	561
72	58	55	..	1	..	1 335	1 310	1 424	1 584	1 188	2 313	1 481	2 135	1 233
99	89	110	2	1	..	4 204	3 988	3 894	4 407	2 503	5 219	2 692	4 655	2 337
31	28	34	6	..	..	1 431	1 265	1 226	1 403	541	1 756	589	1 542	520
1 082	1 112	1 037	2 363	2 647	2 376	54 826	52 658	52 032	37 509	32 181	47 400	35 742	40 481	33 592

effettive.

a 100,000 abitanti.

3	3	3	2	2	2	173	177	162	119	104	145	117	113	105
3	3	3	..	..	1	216	216	214	115	165	128	152	112	171
4	4	3	16	15	15	211	211	203	122	101	154	116	123	101
3	2	2	27	30	26	185	178	175	85	81	94	87	82	81
4	3	4	12	16	15	187	175	172	88	92	130	118	107	106
3	3	3	4	5	5	194	181	185	95	94	131	108	114	109
3	3	3	17	19	13	135	130	126	67	72	92	83	82	80
3	6	3	20	26	22	137	134	126	91	82	123	97	84	82
3	4	4	2	2	2	182	181	182	107	101	140	109	114	105
4	5	4	2	1	..	131	135	134	107	93	147	107	113	99
3	3	3	..	..	..	133	117	131	122	131	153	144	143	153
3	3	3	..	..	..	158	154	171	153	103	194	105	192	112
4	3	3	..	..	..	106	91	93	145	96	188	127	161	114
5	4	4	..	..	..	96	94	103	114	85	167	107	155	89
3	2	3	..	..	..	115	110	109	120	68	144	74	130	65
4	3	4	1	..	..	176	157	153	172	66	217	73	193	65
3	3	3	7	8	7	164	159	158	112	97	143	108	123	102

Osservando la frequenza delle morti causate dalle varie malattie infettive, durante l'anno 1904, si trova che il *vaiuolo* inferì principalmente nelle Puglie, dove esso fu causa di 2058 decessi, pari a 101 ogni 100,000 abitanti, nella Basilicata con 298 morti, e cioè 61 su 100,000 abitanti. Negli altri compartimenti l'epidemia vaiuolosa fu meno grave; nella Sicilia si ebbero 16 morti di vaiuolo per 100,000 abitanti, nelle Calabrie 6, nella Liguria 2 e nella Campania 1. Rari furono i casi di vaiuolo nei compartimenti del Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi. La Sardegna fu l'unico compartimento immune dal vaiuolo durante l'anno 1904.

Il *morbilli* dominò particolarmente nel Lazio (37 morti ogni 100,000 abitanti), negli Abruzzi (33), nella Basilicata (30), nella Lombardia e nelle Puglie (25); le proporzioni più basse si ebbero nell'Emilia (4), nelle Marche e nell'Umbria (5), nel Piemonte (7), nella Liguria e nella Toscana (9).

La *scarlattina* colpì principalmente la popolazione delle Calabrie (36 morti ogni 100,000 abitanti), delle Puglie (19), degli Abruzzi e della Basilicata (7). I quozienti minimi di mortalità per questa causa si ebbero nella Lombardia, nella Toscana, nell'Umbria e nel Lazio (1 morto ogni 100,000 abitanti), nel Piemonte, nella Liguria, nel Veneto, nell'Emilia e nelle Marche (2). Nella Sardegna non si verificò alcun caso di morte per scarlattina durante l'anno 1904.

La *difterite* fu grave in Lombardia (24), in Toscana (23) e nel Veneto (19); causò poche morti nella Sardegna (3), nelle Puglie e nelle Marche (5), nella Basilicata (7) e nelle Calabrie (8). Coi morti per difterite sono compresi anche quelli per *laringite crupale*.

La *febbre tifoide* fece maggiori vittime nella Sicilia (55), nelle Marche e nelle Puglie (45), nella Lombardia (44), negli Abruzzi (43), nella Toscana (41) e nell'Umbria (40). Le proporzioni più basse si ebbero nella Liguria (20), nella Sardegna (21), nel Piemonte (26) e nell'Emilia (27).

Le morti per *ipertosse* furono numerose nell'Umbria (34), nel Veneto e nelle Marche (31), nell'Emilia (30) e nella Sardegna (29); e meno frequenti nella Campania (4), nella Basilicata (7), nelle Puglie e nella Liguria (8) e nelle Calabrie (10).

Le *febbri da malaria* e la *cachessia palustre*, che nelle provincie continentali situate a nord del parallelo di Roma causarono pochissime morti, nella Sardegna ne causarono 171 ogni 100,000 abitanti, nella Basilicata 158, nelle Puglie 93, nella Sicilia 54, nelle Calabrie 47, negli Abruzzi 37, nel Lazio 21 e nella Campania 17.

La *sifilide* cagionò un numero relativamente più grande di morti, principalmente nell'infanzia, nelle Calabrie (17), nel Lazio (14) (a) e nella Campania (10); ed un minor numero nel Piemonte (2), nella Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Marche e Sardegna (3).

---

(a) Conviene rammentare, quando si parla del Lazio, che si indica il territorio della sola provincia di Roma, nella quale la città capitale comprende circa la metà della popolazione totale, onde questo compartimento male si può confrontare con quelli che hanno una superficie più estesa, ed in cui prevale, per numero, la popolazione rurale.

Le morti per *pustola maligna* furono più frequenti nell'Italia meridionale (Basilicata 7, Sardegna 5 e Calabrie 4); e rarissime nelle provincie dell'Italia settentrionale.

Le morti per *febbre puerperale* si presentano presso a poco colla stessa frequenza nei diversi compartimenti; nel Regno avvennero nella proporzione di 3 ogni 100,000 abitanti.

Le *affezioni tubercolari* (sotto la quale rubrica sono comprese le morti per *tubercolosi disseminata* in più organi, per *tisi polmonare*, per *meningite tubercolare* e *idrocefalo acquisito*, per *scrofola disseminata* e per *lupo*, per *tube mesenterica* e *tubercolosi intestinale*, per *sinovite* e *artrite fungosa*, e per *tubercolosi delle ossa*) diedero quozienti più alti di mortalità nella Liguria (216 morti ogni 100,000 abitanti), nella Lombardia (211), nella Toscana (194), nell'Emilia (187), nel Veneto (185) e nel Lazio (182); e più bassi nelle Calabrie (96), nella Basilicata (106) e nella Sicilia (115).

Le morti per *polmonite crupale* e per *bronco polmonite acuta* dominarono più che altrove nella Liguria (280 morti ogni 100,000 abitanti), nelle Puglie (256), nella Campania (253), nella Basilicata (241) e nella Sardegna (238), e meno nelle Marche (139), nel Veneto (166) e nell'Umbria (173).

Fin qui ci siamo occupati delle infezioni più frequenti. Ma stimiamo utile aggiungere per lo stesso anno 1904 qualche cenno sulla distribuzione territoriale di due altre malattie, le quali hanno un'importanza singolare per lo studio della geografia medica italiana e sono la *pellagra* e l'*alcoolismo* cronico ed acuto.

La *pellagra* è malattia quasi limitata all'Italia settentrionale e centrale. Infatti le morti per questa causa avvennero nella proporzione di 27 ogni 100,000 abitanti nel Veneto, di 20 nell'Umbria, di 17 nelle Marche, di 16 nella Lombardia, di 12 nell'Emilia, di 4 nella Toscana e di 2 nel Piemonte, Lazio ed Abruzzi; mentre in tutte le altre regioni se ne contarono pochissimi casi (6 in cifre effettive in Sardegna, 2 in Sicilia ed 1 nelle Puglie) o nessuno (in Liguria, Campania, Basilicata e Calabrie).

I morti per *alcoolismo* cronico furono 509 ed i morti per infortuni causati dall'ubbrichezza 38; i quozienti di mortalità più alti, nell'anno 1904, si notarono nella Sardegna, nelle Marche, nel Veneto, nella Liguria, nella Lombardia e nel Piemonte; i più bassi nelle Puglie, nella Sicilia, nella Campania, nella Basilicata, nelle Calabrie e nella Toscana.

Nel prospetto seguente sono posti a raffronto i dati dell'anno 1904 con quelli di ciascuno degli anni dal 1897 al 1903 e dei due quinquenni 1887-91 e 1892-96.

**Media annuale dei morti per alcoolismo cronico e per infortunio causato da ubbriachezza  
in rapporto ad 1 milione di abitanti.**

PROSPETTO N. 10.

ANNI	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana	Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna	REGNO
1887-91. . . . .	19.4	35.4	25.5	25.4	12.7	10.1	30.2	13.5	16.1	7.6	5.4	9.0	6.3	10.4	9.6	27.6	16.2
1892-96. . . . .	27.7	42.4	34.2	29.4	17.5	13.5	31.8	12.9	13.1	8.4	6.6	8.6	11.1	9.6	9.3	27.1	19.5
1897. . . . .	26.6	34.5	32.9	25.0	17.5	9.3	25.1	10.8	14.0	7.8	4.5	4.8	10.1	5.2	7.0	15.6	16.8
1898. . . . .	28.0	30.4	30.9	29.4	11.6	16.4	23.9	12.2	23.3	3.5	5.8	5.2	8.1	9.6	7.3	14.2	17.5
1899. . . . .	26.7	21.7	30.0	33.8	18.2	12.7	31.4	16.7	18.8	11.2	4.5	7.3	6.1	5.9	5.5	28.1	18.1
1900. . . . .	25.7	36.4	30.0	32.3	11.9	9.1	21.8	9.0	13.5	5.6	5.1	5.6	..	7.3	6.6	31.7	16.8
1901. . . . .	17.8	25.0	20.9	32.5	7.3	6.6	13.2	12.0	16.6	6.2	6.9	5.1	12.2	5.8	3.7	16.4	13.4
1902. . . . .	19.8	21.0	15.9	30.1	11.8	6.6	30.8	16.3	10.6	6.9	4.7	4.5	..	2.2	5.0	13.7	12.9
1903. . . . .	21.5	12.7	21.9	28.6	6.8	6.9	33.4	14.7	7.2	4.1	5.0	3.5	6.1	4.3	2.8	11.1	12.7
1904. . . . .	21.1	34.0	24.7	34.1	10.0	8.8	35.0	18.9	15.8	12.3	5.9	3.4	6.1	7.9	3.8	35.6	16.4

**§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.**

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerando la mortalità nel suo complesso, si rileva che la massima si è, nel 1904, verificata nel 1° trimestre, la minima nel 2°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per debolezza congenita, marasmo senile, vaiuolo, risipola, influenza, morbillo, siflide, eclampsia infantile, malattie del cuore, malattie dei reni, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale e bronco polmonite acuta, pleurite, apoplezia cerebrale, reumatismo articolare acuto e malattie delle arterie. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per ipertosse, pellagra, meningite semplice e per suicidi. In estate (3° trimestre) le morti per affezioni tubercolari, anemia, gastrite, gastroenterite, peritonite, febbre tifoide, febbri da malaria e cachessia palustre, tumori maligni e per cause violente accidentali. In autunno (4° trimestre) dominarono la scarlattina, la difterite e crup, l'epatite e le morti violenti per omicidio.

**§ 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso.**

Nel prospetto n. 11, le morti causate dalle malattie più frequenti, sono state classificate secondo il sesso e l'età dei defunti. Nello stesso prospetto sono indicate le cifre proporzionali dei morti per le malattie suddette a 1000 morti del rispettivo gruppo di età,

avvenute per qualunque causa, e le cifre proporzionali ad un milione di viventi del rispettivo gruppo d'età, secondo i dati del censimento al 10 febbraio 1901.

Morirono nel 1904, in tutto il Regno, 353,815 maschi e 344,789 femmine; nella ragione cioè di 103 maschi ogni 100 femmine: nel 1903, 1902 e 1901 si era osservata la stessa proporzione.

Quantunque muoiano ogni anno più maschi che femmine, pure parecchie malattie sono maggiormente esiziali per queste ultime, pure escludendo le malattie che sono proprie soltanto della donna.

Infatti nel 1904 morirono più femmine che maschi per febbre tifoide, per ipertosse, per malattie tubercolari, per anemia e clorosi, per tabe senile, per tumori maligni, per vizi di cuore, per peritonite ed idrope-ascite, per ustioni.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti di bambini nell'atto del parto e quelle per vizi congeniti; le morti per febbri da malaria, per pellagra, per apoplezia, per encefalite e mielite, per polmonite acuta, per ateromasia arteriosa, per epatite, per malattie degli organi urinari, per sclerema, per alcoolismo e le morti violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio.

Risultanze analoghe presentano le statistiche degli anni 1887 e seguenti.

### § 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età.

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, cioè dalla nascita a non oltre 1 mese, da 1 mese a non oltre 1 anno, e poi d'anno in anno fino al 5° anno e per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della scala; nell'ultimo gruppo furono collocati gli individui di età ignota. Ma nelle notizie riassuntive che formano oggetto di questa introduzione, la classificazione dei morti per età è fatta in otto gruppi, e cioè dalla nascita a non oltre 1 anno, da oltre 1 anno a 5 compiuti, da oltre 5 a 10 compiuti, da oltre 10 a 20 compiuti, da oltre 20 a 40 compiuti, da oltre 40 a 60 compiuti, da oltre 60 a 80 compiuti e da 80 anni compiuti in su.

Nel prospetto n. 11 sono anche indicate le proporzioni dei morti classificati per malattie predominanti e per gruppi d'età ad un milione di viventi coetanei, secondo il censimento del 10 febbraio 1901 (a).

Si rileva dal suddetto prospetto che nel gruppo dei bambini d'ambo i sessi, che non avevano oltrepassato il primo anno di età, le cause più frequenti di morte, nel 1904, sono state la gastroenterite, la debolezza congenita, la bronchite acuta, l'eclampsia infantile, la polmonite crupale e catarrale.

---

(a) I viventi in età dalla nascita ad 1 anno sono, per numero, inferiori ad un milione; lo stesso dicasi per i viventi in età da 80 anni in su; e quindi le cifre proporzionali calcolate per questi due gruppi ad un milione di viventi risultano più grandi delle cifre effettive dei morti in essi gruppi. Si sarebbe potuto evitare tale inconveniente confrontando i morti a 100,000 viventi, ma così facendo si sarebbe dovuto, in parecchi casi, far uso di sole cifre decimali inferiori all'unità.

Nel gruppo da oltre 1 a 5 anni compiuti, per ogni milione di viventi, ne morirono 34,809. Tra le cause delle morti tengono il primo posto quelle per enterite e diarrea (10,854 per un milione di viventi), vengono in seguito le malattie dell'apparato respiratorio (8291), le affezioni tubercolari (1898), la meningite semplice (1443), l'eclampsia infantile (1254), il morbillo (1189), l'anemia e leucemia (1005), l'ipertosse (916) e la differite e laringite crupale (915).

Nel gruppo da oltre 5 a 10 anni compiuti, per ogni milione di viventi, ne morirono 5905. In esso predominano le morti per malattie dell'apparato respiratorio, per affezioni tubercolari, per enterite e diarrea e per meningite semplice.

Tra i viventi da oltre 10 a 20 anni compiuti prevalgono le morti per malattie tubercolari (1352 per un milione di viventi) e quelle per malattie dell'apparato respiratorio (526); vengono in seguito la febbre tifoide (460), la meningite semplice (247), le malattie del cuore (243), l'enterite e la diarrea (217) e le morti violente per cause accidentali (185). È da osservare inoltre che in questo gruppo le malattie tubercolari danno nelle femmine un quoziente di mortalità quasi doppio di quello dei maschi.

Nel gruppo da oltre 20 a 40 anni compiuti tengono il primo posto le morti per affezioni tubercolari (2552 sopra un milione di viventi), vengono appresso le malattie dell'apparato respiratorio con 1089 morti, le malattie del cuore con 448, la febbre tifoide con 436, l'enterite e la diarrea con 241, le malattie dei reni con 200 e le morti violente per cause accidentali con 196.

Nel gruppo da oltre 40 a 60 anni compiuti sono numerose specialmente le morti per malattie dell'apparato respiratorio (2547 morti per ogni milione di viventi); seguono le malattie del cuore (1597), le affezioni tubercolari (1412), i tumori maligni (1101), l'apoplessia e congestione cerebrale (806), l'enterite e diarrea (560), le malattie dei reni (383), l'epatite (313) e le morti violente per cause accidentali (298).

Nel gruppo da oltre 60 a 80 anni compiuti prevalgono le morti per malattie del cuore, (11,032 sopra un milione di viventi). Il secondo posto è tenuto dalle malattie dell'apparato respiratorio le quali furono dichiarate causa di 10,896 morti; vengono quindi il marasma senile con 7355 e l'apoplessia cerebrale con 7327. Scendono alla proporzione di 3301 le morti per enterite e diarrea e di 3233 quelle per tumori maligni. Le morti per affezioni tubercolari, le quali nei gruppi precedenti occupavano quasi sempre il primo posto, in questo, invece, sono rappresentate da un quoziente basso, e cioè da 935 morti ogni milione di viventi.

Finalmente più di  $\frac{1}{10}$  dei viventi nel gruppo da 80 anni compiuti in su morì per marasma senile; seguono le malattie dell'apparato respiratorio, le malattie del cuore, l'apoplessia cerebrale, l'enterite, le malattie delle arterie ed i tumori maligni.

In conclusione, dall'esame delle proporzioni dei morti al totale dei viventi fra gli stessi limiti d'età, risulta che l'anemia, la gastrite, l'enterite e diarrea, la peritonite, il vaiuolo, la risipola, l'ipertosse, la malaria, la siflide, il tetano, la bronchite acuta, le diverse affezioni tubercolari (esclusa la tubercolosi polmonare) e la meningite furono, nell'anno 1904, più frequenti nel gruppo comprendente i bambini di non oltre un anno che

negli altri gruppi d'età; mentre il morbillo, la febbre tifoide, la scarlattina e la difterite dominarono nel gruppo da oltre 1 a 5 anni compiuti. La tubercolosi disseminata e polmonare colpì di preferenza il gruppo da oltre 20 a 40 anni compiuti, nel quale furono più frequenti anche le morti per omicidio. Il reumatismo articolare acuto cagionò il massimo di mortalità nel gruppo da oltre 40 a 60 anni compiuti. L'epatite, il diabete e l'alcoolismo cronico inferirono specialmente in quello da oltre 60 a 80 anni compiuti. Le nefriti, l'influenza, la bronchite cronica, la polmonite crupale, la bronco-polmonite acuta, la pleurite, le malattie del cuore e delle arterie, l'apoplezia e congestione cerebrale, l'encefalite, la pellagra, i tumori maligni, i suicidi e gl'infortuni riuscirono più spesso letali nelle età estreme (da 80 anni compiuti in su) in confronto cogli altri gruppi d'età.

Come è ovvio, non abbiamo qui fatto cenno speciale delle malattie che sono proprie di qualche determinato gruppo d'età, come le malattie fetali e le malattie di gravidanza, parto e puerperio.





Morti nel Regno nell'anno 1904 classificati per età e cause di morte.

B) Cifre proporzionali a 1000 morti dei rispettivi gruppi di età.

(Segue PROSPETTO N. II.)

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI MORTI IN ETÀ									TOTALE GENERALE (Ambo i sessi)
		di non oltre l'anno (Ambo i sessi)	da oltre l'anno a 5 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 5 a 10 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 10 a 20 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 20 a 40 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 40 a 60 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 60 a 80 anni compiuti (Ambo i sessi)	da 80 anni compiuti in su (Ambo i sessi)		
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	11.6	1.3	1.6	0.4	..	..	..	..	..	3.2
6	Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare. . . . .	266.8	..	..	..	..	..	..	..	..	67.1
39	Anemia . . . . .	11.5	28.7	14.1	17.2	17.9	20.4	..	..	..	12.5
40	Leucemia . . . . .	0.1	0.7	0.3	0.9	0.8	0.9	..	..	..	0.4
44	Marasmo senile. . . . .	..	..	..	..	..	..	180.1	447.7	..	68.6
97	Gastrite. . . . .	25.1	14.1	8.4	4.6	3.2	5.0	5.0	..	3.5	11.3
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	277.8	316.7	120.0	50.1	33.1	45.8	58.4	49.0	151.4	
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	0.8	1.1	3.7	3.3	9.6	26.6	11.1	1.9	7.2	
112	Malattie dei reni . . . . .	4.1	21.8	42.3	26.7	27.5	31.3	22.1	10.2	19.0	
110	Peritonite. . . . .	2.0	3.8	17.3	23.5	20.1	12.5	4.7	1.4	7.1	
7	Valuolo. . . . .	5.0	9.8	19.9	10.0	4.7	1.6	0.2	..	4.5	
8	Morbillo . . . . .	5.4	34.7	23.0	3.3	0.6	0.1	..	..	7.7	
9	Scarlattina . . . . .	0.6	8.1	21.9	5.0	0.6	0.1	..	..	2.3	
10	Risipola infettiva. . . . .	7.1	1.1	1.4	2.3	4.0	5.1	3.8	2.8	4.2	
11	Febbre tifoide . . . . .	2.4	14.4	60.3	106.1	59.9	17.7	4.5	1.2	17.7	
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . . . .	0.1	0.1	0.9	0.7	0.2	0.1	..	..	0.1	
16	Ipertosse . . . . .	16.4	26.7	8.0	0.4	0.1	..	..	..	8.6	
14	Difterite . . . . .	1.2	16.8	35.6	5.8	0.5	0.2	..	..	4.3	
15	Laringite crupale. . . . .	0.9	9.9	12.2	1.0	..	0.1	..	..	2.2	
18	Febbri da malaria . . . . .	5.7	16.5	33.9	21.7	10.7	10.0	4.3	1.6	9.2	
19	Cachessia palustre . . . . .	1.2	5.8	7.0	4.7	3.8	5.0	2.0	0.4	3.0	
17	Influenza . . . . .	5.0	5.2	4.3	5.8	4.9	5.6	6.3	5.8	5.5	
22	Sifilide . . . . .	6.3	1.2	0.2	1.1	3.2	3.6	0.6	0.1	2.7	
71	Tetano . . . . .	0.7	0.2	4.5	4.1	1.7	1.4	0.5	..	0.9	
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	0.1	0.3	1.0	1.1	1.0	1.6	0.4	0.2	0.5	
27	Rabbia . . . . .	..	..	0.7	0.3	0.1	0.1	..	..	0.1	
124	Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	2.0	14.3	1.3	..	..	1.6	
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	..	..	2.2	23.2	4.3	..	..	2.7	
77	Bronchite acuta. . . . .	130.0	130.8	55.0	32.5	27.7	25.8	29.9	28.7	71.1	
78	Bronchite cronica. . . . .	..	1.7	2.6	4.1	5.4	12.7	30.2	31.3	12.0	
81	Polmonite crupale . . . . .	19.5	34.7	35.4	48.2	77.0	115.1	75.2	34.7	54.3	
82	Bronco polmonite acuta. . . . .	37.3	71.5	45.9	28.6	29.9	45.4	52.8	37.3	46.6	
79	Malattie della pleura . . . . .	0.8	3.2	5.7	7.8	9.4	9.1	4.6	1.7	4.3	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare. . . . .	2.1	10.4	43.3	232.2	312.6	101.2	12.7	1.1	56.7	
30, 32 a 36	Altre forme tubercolari . . . . .	14.6	45.0	86.6	79.2	37.8	14.1	3.9	0.9	22.7	
90	Malattie del cuore . . . . .	1.7	4.9	27.6	56.0	61.5	130.5	195.1	120.3	80.6	
87	Malattie delle arterie . . . . .	0.9	0.6	1.1	1.7	6.3	15.9	29.0	33.7	12.2	
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	1.0	1.3	4.7	6.7	12.5	65.9	129.6	95.9	47.8	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	18.8	42.1	96.4	57.0	20.2	10.5	2.7	0.8	20.3	
63	Encefalite . . . . .	0.8	1.3	3.1	2.0	2.3	2.6	1.5	0.8	1.5	
72	Eclampsia infantile. . . . .	82.8	86.6	23.0	1.9	..	..	..	..	22.3	
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.1	0.4	2.8	6.7	3.3	4.4	0.5	0.1	1.4	
45	Pellagra . . . . .	..	..	0.7	0.7	2.6	8.7	8.2	2.1	3.4	
47	Diabete. . . . .	..	0.1	0.5	1.6	2.4	5.5	3.4	0.6	1.8	
138	Alcoolismo cronico . . . . .	..	..	..	..	1.4	3.1	1.0	0.2	0.7	
48 a 58	Tumori maligni. . . . .	0.2	0.7	3.0	4.6	17.2	89.9	57.2	17.8	27.3	
140 a 156	per cause accidentali . . . . .	1.9	21.8	43.1	42.6	26.9	24.4	12.6	9.0	16.0	
157 a 165	Morti violente per suicidio. . . . .	..	..	..	5.9	13.5	9.0	2.3	0.6	3.1	
166 e 169	per omicidio ed in conflitto con la forza pubblica . . . . .	..	0.1	1.3	5.5	10.3	4.2	0.6	0.1	1.9	
	Altre malattie . . . . .	49.6	53.8	75.7	70.2	74.1	102.6	93.0	56.5	71.4	

## Morti nel Regno nell'anno 1904 classificati per età e cause di morte.

## C) Cifre proporzionali a 1,000,000 di viventi coetanei.

Segue PROSPETTO N. 11.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI MORTI IN ETÀ										TOTALE GENERALE (Ambo i sessi)
		di non oltre 1 anno (Ambo i sessi)	da oltre 1 anno a 5 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 5 a 10 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 10 a 20 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 20 a 40 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 40 a 60 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 60 a 80 anni compiuti (Ambo i sessi)	da 80 anni compiuti in su (Ambo i sessi)			
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . .	2 136	44	9	2	..	..	..	..	..	..	66
6	Immaturità, debolezza congenita, atelec- tasia polmonare . . . . .	49 134	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 390
39	Anemia . . . . .	2 126	983	82	75	130	250	..	..	..	..	259
40	Leucemia . . . . .	24	22	2	4	6	11	2	..	..	..	8
44	Marasmo senile . . . . .	..	..	..	..	..	..	7 355	109 251	1 318	..	1 318
97	Gastrite . . . . .	4 628	483	49	20	23	61	284	..	847	..	234
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ul- cera intestinale, ecc. . . . .	51 166	10 854	699	217	241	560	3 301	11 962	3 136	..	3 136
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	151	37	22	14	70	313	628	458	150	..	150
112	Malattie dei reni . . . . .	758	749	246	116	200	383	1 250	2 497	394	..	394
110	Peritonite . . . . .	368	130	101	102	146	153	263	335	147	..	147
7	Vaiuolo . . . . .	926	335	116	43	34	19	13	..	93	..	93
8	Morbillo . . . . .	995	1 189	134	44	4	1	2	..	160	..	160
9	Scarlattina . . . . .	103	276	128	22	4	1	1	..	48	..	48
10	Risipola infettiva . . . . .	1 307	37	8	10	29	63	215	694	87	..	87
11	Febbre tifoide . . . . .	450	492	351	460	436	217	252	281	367	..	367
13	Meningite cerebro spinale epidemica .	12	5	5	3	1	1	1	..	2	..	2
16	Ipertosse . . . . .	3 025	916	47	2	1	..	2	10	179	..	179
14	Difterite . . . . .	229	576	207	25	3	2	1	5	90	..	90
15	Laringite crupale . . . . .	164	389	71	4	..	1	1	..	46	..	46
18	Febbri da malaria . . . . .	1 041	567	197	94	78	122	245	399	191	..	191
19	Cachessia palustre . . . . .	218	200	41	20	28	61	114	89	63	..	63
17	Influenza . . . . .	922	179	25	25	36	69	356	1 423	114	..	114
22	Sifilide . . . . .	1 158	41	1	5	23	44	34	15	55	..	55
71	Tetano . . . . .	127	9	26	18	12	17	26	5	19	..	19
24	Pustola maligna, carbonchio . . . .	17	9	6	5	7	19	22	59	11	..	11
27	Rabbia . . . . .	..	1	4	1	1	1	1	..	1	..	1
124	Febbre puerperale . . . . .	..	..	..	9	104	15	..	..	32	..	32
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	..	..	9	169	52	..	..	57	..	57
77	Bronchite acuta . . . . .	23 941	4 481	320	141	202	316	1 693	7 013	1 473	..	1 473
78	Bronchite cronica . . . . .	..	58	15	18	40	155	1 708	7 633	249	..	249
81	Polmonite crupale . . . . .	3 599	1 190	206	209	561	1 409	4 250	8 461	1 125	..	1 125
82	Bronco-polmonite acuta . . . . .	6 861	2 452	267	124	218	556	2 986	9 111	965	..	965
79	Malattie della pleura . . . . .	147	110	33	34	68	111	259	434	90	..	90
29 e 31	Tubercolosi disséminata e polmonare .	378	356	252	1 008	2 276	1 239	717	276	1 174	..	1 174
30, 32 a 36	Altre forme tubercolari . . . . .	2 691	1 542	504	344	276	173	218	212	470	..	470
90	Malattie del cuore . . . . .	315	169	161	243	448	1 597	11 032	29 347	1 670	..	1 670
87	Malattie delle arterie . . . . .	159	20	6	7	46	195	1 640	8 215	254	..	254
64	Apoplessia e congestione cerebrale . .	179	45	27	29	91	806	7 327	23 393	989	..	989
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	3 469	1 443	561	247	147	128	152	202	421	..	421
63	Encefalite . . . . .	140	43	18	9	16	32	86	192	31	..	31
72	Eclampsia infantile . . . . .	11 570	1 254	134	8	..	..	..	..	463	..	463
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	24	15	16	29	24	54	27	20	29	..	29
45	Pellagra . . . . .	4	1	4	3	19	106	462	507	71	..	71
47	Diabete . . . . .	2	3	3	7	18	67	190	138	37	..	37
138	Alcoolismo cronico . . . . .	..	..	..	..	10	38	56	39	15	..	15
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	31	24	18	20	125	1 101	3 233	4 354	566	..	566
140 a 156	per cause accidentali . . . . .	351	747	251	185	196	298	713	2 206	331	..	331
157 a 165	Morti per suicidio . . . . .	..	..	..	26	99	110	129	138	65	..	65
166 e 169	violente / per omicidio ed in conflitto con la forza pubblica . . . . .	5	4	7	24	75	51	36	25	39	..	39
Altre malattie . . . . .	9 118	1 840	441	305	541	1 262	5 250	13 780	1 473	..	..	1 473
170	Cause ignote . . . . .	1 169	540	84	48	72	148	746	1 784	233	..	233
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>		185 328	34 809	5 905	4 387	7 354	12 388	57 279	245 800	20 950	..	20 950

§ 8. — **Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini.**

I bambini morti prima di aver compiuti cinque anni di età sono stati divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima; in questa seconda categoria sono compresi anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI a pagina 64).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1904 a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 57 ed entro il primo anno d'età 157, e che per 1000 nati illegittimi ed esposti ne morirono nel primo mese 102 ed entro il primo anno di età 230.

**Mortalità nei bambini di età non superiore ad un anno, senza distinzione di sesso.**

PROSPETTO N. 12.

	NATI VIVI nel 1904	MORTI NEL 1904		MORTI PER 1000 NATI					
		Meno di 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	Meno di 1 mese			Da 1 mese ad 1 anno		
				1904	1903	1902	1904	1903	1902
Legittimi . . . . .	1 025 278	58 345	102 650	57	59	62	100	109	107
Illegittimi ed esposti. . . . .	60 153	6 144	7 671	102	101	104	128	137	127

**Mortalità nei bambini di età non superiore a 5 anni, distinti per sesso.**

PROSPETTO N. 13.

		BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1904				PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti sotto 5 anni		
		Non oltre 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 5 anni compiuti	Totale dei bambini morti sotto i 5 anni	1904	1903	1902
Legittimi . . . . .	Maschi. .	32 584	54 347	53 018	139 949	52	52	52
	Femmine	25 761	48 303	52 899	126 963	48	48	48
Illegittimi ed esposti	Maschi. .	3 239	3 785	2 197	9 221	50	51	50
	Femmine	2 905	3 886	2 345	9 136	50	49	50

Tra gli illegittimi, le bambine morte nei primi cinque anni d'età, per rapporto ai maschi, sono, relativamente, in numero maggiore che non fra i legittimi.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi negli anni 1902, 1903 e 1904.

Cause più frequenti delle morti dei bambini di età non superiore ad un anno.

PROSPETTO N. 14.

CAUSE DI MORTE (a)	PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età					
	Legittimi			Illegittimi ed esposti		
	1904	1903	1902	1904	1903	1902
Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	1.9	1.8	1.9	1.6	1.7	2.0
Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare	41.1	43.6	45.0	70.2	70.9	70.0
Anemia, leucemia. . . . .	1.8	2.4	1.8	2.5	3.0	2.2
Gastrite . . . . .	3.8	3.8	3.9	8.0	7.7	7.9
Diarrea, colera indigeno, enterite . . . . .	43.5	46.1	44.6	60.7	65.2	58.0
Epatite . . . . .	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2
Malattie dei reni . . . . .	0.6	0.7	0.7	1.2	1.2	0.9
Peritonite . . . . .	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
Vaiuolo . . . . .	0.8	1.9	0.6	0.8	1.1	0.3
Morbillo . . . . .	0.9	1.4	1.7	0.7	0.9	1.3
Scarlattina. . . . .	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Risipola infettiva. . . . .	1.1	1.2	1.1	1.2	1.4	1.0
Febbre tifoide . . . . .	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4
Ipertosse. . . . .	2.6	3.0	3.2	2.6	3.0	2.9
Difterite e crup . . . . .	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2
Febbri da malaria e cachessia palustre. . . . .	1.1	1.2	1.4	0.8	1.1	1.2
Influenza. . . . .	0.8	1.0	0.8	0.6	0.9	1.0
Siflide. . . . .	0.4	0.5	0.5	11.2	10.8	10.0
Tetano. . . . .	0.1	..	0.1	0.1	..	0.1
Bronchite acuta . . . . .	20.8	21.8	22.9	20.4	21.6	23.4
Polmonite crupale . . . . .	3.1	3.4	3.1	3.0	2.8	2.9
Bronco polmonite acuta. . . . .	5.9	5.8	5.9	6.5	6.7	7.0
Malattie della pleura . . . . .	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali. . . . .	2.6	2.9	3.1	3.1	3.6	3.1
Malattie del cuore . . . . .	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
Malattie delle arterie . . . . .	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Apoplessia e congestione cerebrale. . . . .	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
Meningite semplice cerebrale e spinale. . . . .	3.1	3.3	3.1	2.1	2.1	1.8
Encefalite . . . . .	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	..
Eclampsia infantile. . . . .	10.0	10.5	10.9	10.4	11.9	12.4
Morti violente accidentali. . . . .	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
TOTALE DEI MORTI PER QUALSIASI CAUSA . . . . .	157.0	167.9	168.3	229.7	238.1	230.6

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che negli anni 1902-1904 non furono causa di morte nei bambini di non oltre un anno d'età o ne causarono un numero minimo.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è superiore di 1/3 e più a quella dei legittimi, e ciò perchè i primi nascono per lo più con una costituzione fisica debole e sono spesso affetti da lue congenita; ma, forse in misura maggiore, vi contribuiscono il difetto di cure e l'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per matrimonio dei genitori, ed i bambini morti dopo essere stati legittimati sono classificati fra i legittimi, mentre nella statistica dei nati erano stati iscritti fra gli illegittimi.

### § 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile.

Nella tavola IV, a pagina 42, sono classificati i maschi morti nel 1904 in età di oltre 15 anni compiuti, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da quella tavola si può rilevare in quali professioni gli individui maschi atti al lavoro siano di preferenza colpiti da determinate malattie.

Convieni per altro stare in guardia contro alcune cause di errore in cui si può incorrere nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni. Alcune professioni, come quelle di medico, avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedendo una carriera preparatoria assai lunga, possono essere esercitate soltanto da individui che abbiano almeno 23 o 24 anni di età; e per queste professioni non vi possono essere morti di età più giovane, mentre si hanno molti morti fra 15 e 20 anni nelle professioni di agricoltore o di marinaio o di tipografo. D'altra parte, non pochi individui, coll'avanzare dell'età, cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro forze, devono procurarsi una occupazione meno faticosa. Si troveranno perciò pochi morti in età avanzata fra i commessi di negozio, non perchè siano morti quasi tutti in età giovane, ma perchè parecchi col tempo sono diventati padroni e all'atto di morte sono registrati fra i negozianti; così pure parecchi facchini e marinai vecchi sono ridotti alla condizione di bracciante e quasi tutti gli impiegati, i maestri, gli ufficiali dell'esercito e le guardie sono passati, nell'età avanzata, nella categoria dei pensionati.

Nei confronti istituiti nelle pagine seguenti, ci siamo limitati ad indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, in età di 15 anni e più e che esercitavano la medesima professione. Accanto alle proporzioni dell'anno 1904 abbiamo indicate, a titolo di confronto, anche quelle degli anni 1903 e 1902.

#### Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia.

##### Morti di febbri da malaria e cachessia palustre.

	1904	1903	1902		1904	1903	1902
Pastori, mandriani. . . . .	3.3	3.7	4.2	Guardie dogan., carcerarie, ecc.	1.2	1.6	3.3
Agricoltori . . . . .	1.7	1.6	2.0	Di qualsiasi professione. . . . .	1.1	1.1	1.3

Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia.

Morti di febbre tifoide.

	1904	1903	1902		1904	1903	1902
Militari . . . . .	15.9	12.6	15.4	Mugnai e fornai . . . . .	2.6	2.1	1.9
Studenti . . . . .	8.7	7.5	7.6	Muratori e imbianchini . . . . .	2.6	1.7	2.1
Guardie doganali, carcer., ecc.	3.4	1.9	1.6	Falegnami ed ebanisti . . . . .	2.5	2.1	2.0
Fabbrì, maniscalchi, meccanici	3.0	2.5	2.3	Filatori e tessitori . . . . .	2.5	2.1	2.2
Maestri e professori . . . . .	2.8	1.4	2.2	Operai in genere . . . . .	2.4	2.3	1.9
Commessi di studio e di negozio	2.7	3.0	1.8	Di qualsiasi professione . . . . .	2.0	1.7	1.7

Morti di pellagra.

	1904	1903	1902		1904	1903	1902
Agricoltori . . . . .	1.2	1.2	1.2	Di qualsiasi professione. . . . .	0.7	0.7	0.7
Braccianti e cantonieri . . . . .	1.0	0.9	1.0				

Morti di apoplezia cerebrale.

	1904	1903	1902		1904	1903	1902
Sacerdoti e monaci . . . . .	14.9	13.9	15.6	Negozianti e commercianti . . . . .	10.8	10.0	10.7
Medici e veterinari. . . . .	12.8	12.2	9.9	Filatori e tessitori . . . . .	10.8	9.3	10.6
Proprietari e benestanti . . . . .	12.6	12.1	12.3	Marinari e pescatori . . . . .	10.5	9.0	9.6
Impiegati pubblici e privati . . . . .	11.9	12.1	12.9	Macellai e pizzicagnoli . . . . .	10.5	8.3	9.5
Avvocati e notai . . . . .	11.5	12.8	12.2	Di qualsiasi professione . . . . .	9.2	8.9	9.1
Servi, uscieri, infermieri . . . . .	11.5	9.3	10.5				

Morti di tubercolosi disseminata e tisi polmonare.

	1904	1903	1902		1904	1903	1902
Studenti . . . . .	38.6	40.1	41.0	Operai in genere . . . . .	15.5	15.1	13.8
Tipografi e litografi . . . . .	36.1	30.5	28.9	Mugnai e fornai . . . . .	14.3	11.8	11.6
Barbieri . . . . .	26.5	20.0	21.9	Macellai e pizzicagnoli . . . . .	13.6	9.9	13.0
Commessi di studio e di negozio	19.2	23.1	26.8	Guardie doganali, carcer., ecc.	13.5	12.3	10.4
Fabbrì, maniscalchi, meccanici	19.1	16.5	16.5	Caffettieri, trattori, vinai. . . . .	12.4	13.3	12.6
Camerieri di caffè e d'albergo . . . . .	18.6	21.0	17.1	Muratori e imbianchini . . . . .	12.1	11.1	10.8
Sarti . . . . .	17.4	15.5	14.4	Filatori e tessitori . . . . .	12.1	10.2	10.7
Calzolai . . . . .	17.3	16.4	17.0	Facchini . . . . .	11.5	11.6	13.2
Falegnami ed ebanisti . . . . .	16.6	14.3	14.0	Di qualsiasi professione . . . . .	8.8	7.7	7.9
Minatori e cavaatori . . . . .	15.6	13.4	14.5				

**Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia..**

**Morti di polmonite crupale e di bronco polmonite acuta.**

	<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>		<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>
Pastori . . . . .	19.7	23.4	23.8	Facchini . . . . .	14.3	16.8	14.9
Agricoltori . . . . .	16.2	19.5	17.1	Di qualsiasi professione . . .	13.5	16.4	14.5

**Morti di malattie di cuore.**

	<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>		<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>
Sacerdoti e monaci . . . . .	14.5	14.3	12.5	Negozianti e commercianti . .	12.7	13.0	12.5
Impiegati pubblici e privati . .	13.6	13.3	13.2	Agricoltori . . . . .	12.6	12.0	12.2
Proprietari e benestanti . . .	13.3	13.3	13.6	Filatori e tessitori . . . . .	12.6	12.7	14.9
Servi, uscieri, infermieri . . .	13.0	12.7	13.4	Di qualsiasi professione . . .	12.0	11.8	11.9

**Morti di enterite e diarrea.**

	<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>		<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>
Agricoltori . . . . .	5.3	5.0	5.8	Sarti . . . . .	5.0	4.0	4.7
Pastori . . . . .	5.1	4.7	5.7	Di qualsiasi professione . . .	4.7	4.6	5.1
Braccianti e cantonieri . . . .	5.0	4.8	5.3				

**Morti di malattie renali.**

	<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>		<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>
Avvocati e notai . . . . .	5.3	6.6	6.3	Sacerdoti e monaci . . . . .	3.4	3.7	4.3
Maestri e professori . . . . .	4.7	4.6	3.1	Proprietari e benestanti . . .	3.2	3.2	3.2
Medici e veterinari . . . . .	4.4	5.1	4.4	Fruttivendoli e pescivendoli . .	3.2	2.5	2.2
Caffettieri, trattori, vinai . . .	3.7	3.1	2.3	Servi, uscieri, infermieri . . .	2.9	3.1	3.3
Impiegati pubblici e privati . .	3.7	3.6	3.6	Militari . . . . .	2.8	2.3	3.0
Tipografi e litografi . . . . .	3.5	2.0	4.5	Operai in genere . . . . .	2.7	2.8	2.8
Negozianti e commercianti . . .	3.4	3.7	3.6	Di qualsiasi professione . . .	2.2	2.2	2.3

**Morti di cirrosi del fegato.**

	<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>		<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>
Caffettieri, trattori, vinai . . .	4.0	4.8	4.6	Servi, uscieri, infermieri . . .	2.4	2.0	2.8
Avvocati e notai . . . . .	3.3	3.3	2.6	Impiegati pubblici e privati . .	2.3	2.6	2.5
Negozianti e commercianti . . .	3.3	3.2	2.9	Commessi di studio e di negozio	2.1	2.9	4.2
Medici e veterinari . . . . .	3.0	2.2	3.3	Proprietari e benestanti . . .	2.1	2.2	2.2
Macellai e pizzicagnoli . . . .	2.9	3.9	3.8	Marinari e pescatori . . . . .	2.0	2.1	2.0
Maestri e professori . . . . .	2.7	2.6	2.9	Fruttivendoli e pescivendoli . .	2.0	2.0	2.7
Guardie doganali, carcer., ecc.	2.6	3.8	2.0	Di qualsiasi professione . . .	1.7	1.6	1.7

**Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia.**

**Morti per infortunio accidentale.**

	<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>		<u>1904</u>	<u>1903</u>	<u>1902</u>
Minatori e cavaatori . . . . .	10.8	6.2	8.5	Guardie doganali, carcer., ecc.	3.8	2.3	4.2
Cocchieri e carrettieri . . . . .	6.6	5.5	6.5	Marinari e pescatori . . . . .	3.6	3.8	3.1
Muratori e imbianchini . . . . .	5.8	4.4	5.1	Braccianti e cantonieri . . . . .	3.5	3.3	3.2
Militari . . . . .	5.4	5.0	6.6	Fruttivendoli e pescivendoli . . . . .	3.4	2.0	2.3
Facchini . . . . .	5.0	3.0	4.3	Studenti . . . . .	3.3	2.3	2.3
Pastori . . . . .	4.6	3.9	2.3	Di qualsiasi professione . . . . .	2.7	2.3	2.5
Operai in genere . . . . .	3.9	4.2	3.6				

**CAPO III.**

**MORTALITÀ NEI COMUNI URBANI PIÙ IMPORTANTI.**

**§ 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni durante il periodo 1881-1904.**

Giova mettere a raffronto le cifre della mortalità avvenuta nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario con quelle di tutti gli altri Comuni. I Comuni del primo gruppo sono, per la massima parte, grossi centri di popolazione urbana, mentre in quelli del secondo gruppo predominano i piccoli centri e gli abitanti che vivono sparsi per le campagne. Dal confronto fra le due serie di cifre si potrà rilevare quale influenza eserciti la distribuzione territoriale della popolazione sulle condizioni sanitarie degli abitanti.

Nel prospetto n° 15 diamo le cifre concernenti gli anni 1881-1886 per ciò che riguarda i 284 capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, e gli anni 1887-1904 per tutti i Comuni del Regno. Per gli anni 1902-1904 abbiamo anche indicato separatamente le cifre che si riferiscono ai 78 Comuni di media importanza, ai quali si è già ripetutamente accennato (a).

Le cifre di popolazione che hanno servito per il calcolo dei quozienti di mortalità, negli anni 1887-1904, si sono ottenute coi criteri esposti nel paragrafo 3° del Capo I (pag. v) e rappresentano la popolazione totale dei rispettivi Comuni, sia stabile, sia occasionale; così pure nelle cifre dei decessi sono compresi tutti i morti nel territorio del Comune, senza distinzione di dimora.

(a) Ricordiamo che questo numero è costituito da 17 principali capiluoghi di distretto e da 61 Comuni non capiluoghi che avevano, al 10 febbraio 1901, più di 20,000 abitanti.



Morti nei Comuni capiluoghi di provincia, di circondario o distretto, ed in altri 78 Comuni più

PROSPETTO N. 15.

	VAIUOLO	MORBILO	SCARLAT-TINA	FEBBRE tifoidea, migliare e tifo esantematico	DIFTERITE e crup	IPERTOSSE	FEBBRI da malaria e cachessia palustre
A) Cifre							
Morti nei 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, anni <b>1881-86</b>	12 151	27 529	12 360	42 867	39 777	11 251	20 951
anni <b>1887-93</b>	15 375	23 679	10 251	33 141	(a) 24 848	(b) 3 247	18 176
" <b>1894-97</b>	1 890	7 702	2 292	13 919	11 202	4 194	9 026
" <b>1898-901</b>	1 686	5 538	1 628	14 678	5 869	4 502	8 396
Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario.	anno <b>1902</b>	560	2 410	169	3 236	1 192	1 538
" <b>1903</b>	752	1 109	495	3 312	1 120	962	1 343
" <b>1904</b>	676	1 032	229	3 444	1 179	851	1 242
anno <b>1902</b>	299	654	161	695	204	269	622
Morti in 78 Comuni non capiluoghi, ma assai popolosi (1).	" <b>1903</b>	2 384	468	59	747	231	504
" <b>1904</b>	490	331	115	826	168	334	475
anni <b>1887-93</b>	46 418	94 149	48 998	116 364	(a) 93 781	(b) 20 177	99 746
" <b>1894-97</b>	6 750	30 276	13 174	47 311	34 016	27 343	48 704
" <b>1898-901</b>	2 660	21 713	10 019	44 524	20 066	24 285	43 216
Morti negli altri Comuni del Regno (e).	anno <b>1902</b>	1 853	7 551	1 169	8 125	3 322	6 056
" <b>1903</b>	5 297	6 174	1 496	8 361	2 944	5 559	7 174
" <b>1904</b>	2 417	4 300	1 382	8 804	3 340	5 107	7 221
B) Cifre proporzionali							
Morti nei 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, anni <b>1881-86</b>	2.8	6.4	2.9	9.9	9.2	2.6	4.9
anni <b>1887-93</b>	3.1	4.7	2.0	6.6	(a) 4.9	(b) 1.5	3.6
" <b>1894-97</b>	0.6	2.5	0.8	4.6	3.7	1.4	3.0
" <b>1898-901</b>	0.5	1.8	0.5	4.6	1.9	1.4	2.7
Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario.	anno <b>1902</b>	0.7	3.0	0.2	4.0	1.5	1.9
" <b>1903</b>	0.9	1.3	0.6	4.0	1.2	1.2	1.6
" <b>1904</b>	0.8	1.2	0.3	4.1	1.4	1.0	1.5
anno <b>1902</b>	1.5	3.4	0.8	3.6	1.0	1.4	3.2
Morti in 78 Comuni non capiluoghi, ma assai popolosi (1).	" <b>1903</b>	12.1	2.4	0.3	3.8	1.2	2.6
" <b>1904</b>	2.5	1.7	0.6	4.1	0.8	1.7	2.4
anni <b>1887-93</b>	2.9	5.8	3.0	7.2	(a) 5.8	(b) 2.9	6.2
" <b>1894-97</b>	0.7	3.2	1.4	5.0	3.6	2.9	5.1
" <b>1898-901</b>	0.3	2.2	1.0	4.6	2.1	2.5	4.4
Morti negli altri Comuni del Regno (e).	anno <b>1902</b>	0.7	3.1	0.5	3.3	1.3	3.4
" <b>1903</b>	2.1	2.5	0.6	3.4	1.2	2.2	2.9
" <b>1904</b>	1.0	1.8	0.6	3.5	1.3	2.0	2.9

popolosi (1), confrontati coi morti negli altri Comuni del Regno, durante gli anni dal 1881 al 1904.

SIFILIDE	TUBERCOLOSI disseminata e sue manifestazioni locali	PELLAGRA	POLMONITE cruposa	DIARREA, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale	FEBBRE puerperale	ALCOOLISMO cronico	MORTI per cause accidentali	SUICIDI	TOTALE dei morti per qualsiasi causa
effettive.									
6 632	141 543	13 480	85 819	123 648	2 878	1 790	15 468	4 477	1 243 177
8 312	140 479	6 712	131 572	(b) 64 041	(b) 1 034	(b) 742	(b) 7 007	(b) 2 418	1 371 161
5 177	77 120	3 036	80 529	85 522	1 173	783	(c) 6 982	(c) 2 637	736 089
5 100	75 694	4 210	80 092	88 364	997	807	9 875	3 736	732 257
1 186	17 728	583	(a) 10 070	23 186	264	142	2 660	920	183 484
1 216	17 894	723	(a) 11 451	22 584	260	140	2 675	865	185 605
1 163	18 732	617	(a) 10 301	22 637	257	215	2 785	1 022	179 680
98	3 206	150	(a) 9 384	8 956	50	21	552	78	46 275
94	3 038	150	(a) 2 090	8 415	44	17	540	81	46 916
94	3 364	138	(a) 2 612	8 125	43	15	572	95	44 540
6 493	288 705	19 108	370 212	(b) 248 776	(b) 3 903	(b) 992	(b) 23 457	(b) 2 739	4 217 060
4 012	155 232	9 146	223 915	337 324	4 436	1 376	(c) 22 841	(c) 2 990	2 277 827
3 583	152 750	10 455	216 111	332 460	3 546	1 226	31 375	4 396	2 187 354
823	34 304	1 793	(a) 30 411	88 332	773	258	7 833	1 090	543 697
708	34 764	1 924	(a) 23 813	86 094	852	261	7 647	1 057	550 706
686	36 094	1 746	(a) 25 441	81 941	825	294	8 259	1 134	518 924
a 10,000 abitanti.									
1.5	32.8	3.1	19.9	28.7	0.7	0.4	3.6	1.0	288.1
1.7	27.9	1.3	26.2	(b) 29.1	(b) 0.5	(b) 0.3	(b) 3.2	(b) 1.1	272.7
1.7	25.4	1.0	26.5	28.1	0.4	0.3	(c) 3.1	(c) 1.2	242.1
1.6	23.9	1.3	25.3	27.9	0.3	0.3	3.1	1.2	231.5
1.5	21.8	0.7	(a) 12.4	28.5	0.3	0.2	3.3	1.1	225.9
1.5	21.8	0.9	(a) 13.9	27.5	0.3	0.2	3.3	1.1	225.7
1.4	22.5	0.7	(a) 12.5	27.2	0.3	0.3	3.3	1.2	215.9
0.5	16.4	0.8	(a) 11.3	45.9	0.3	0.1	2.8	0.4	237.2
0.5	15.4	0.8	(a) 10.9	42.7	0.2	0.1	2.7	0.4	237.9
0.5	16.9	0.7	(a) 12.5	40.8	0.2	0.1	2.9	0.5	223.4
0.4	17.9	1.2	(a) 10.7	35.5	(b) 0.6	(b) 0.1	(b) 3.4	(b) 0.4	261.2
0.4	16.3	1.0	(a) 13.2	35.4	0.5	0.1	(c) 3.2	(c) 0.4	239.3
0.4	15.7	1.1	(a) 10.1	34.1	0.4	0.1	3.2	0.5	224.7
0.3	13.9	0.7	(a) 10.8	35.7	0.3	0.1	3.2	0.4	220.0
0.3	14.0	0.8	(a) 9.7	34.6	0.3	0.1	3.1	0.4	221.5
0.3	14.4	0.7	(a) 11.2	32.7	0.3	0.1	3.3	0.5	207.4

(1) Veggasi la nota alla pag. XLIX.  
 (a) Non compresi i morti per laringite crupale. — (b) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1891-92-93. — (c) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1894, 1896 e 1897. — (d) Il primo numero riguarda i morti per polmonite crupale; il secondo quelli per bronco-polmonite acuta. — (e) Nel complesso dei morti negli altri Comuni del Regno sono compresi anche quelli dei 78 Comuni popolosi, ma non capiluoghi di provincia, né di circondario.

riferiscono soltanto agli anni 1894, 1896 e 1897. — (d) Il primo numero riguarda i morti per polmonite crupale; il secondo quelli per non capiluoghi di provincia, né di circondario.

Tanto il *morbillo*, quanto la *scarlattina*, la *difterite e crup* e l'*ipertosse*, causarono, nei periodi di tempo considerati, un numero di morti maggiore, relativamente alla popolazione, nei piccoli Comuni che non nei centri principali. Il *vaiuolo* nel periodo 1887-1900 diede nelle città un quoziente di mortalità quasi eguale a quello verificatosi nei piccoli Comuni, nel 1901 causò nelle prime un numero di morti assai più grande di quello dei Comuni rurali, nel 1902 tornò a dare lo stesso quoziente nei due gruppi di Comuni e nel 1903 e 1904 diede nei Comuni minori un quoziente di mortalità più grande di quello osservatosi nelle grandi città. Quanto alla *febbre tifoide* si osservano piccolissime differenze fra i centri principali ed i piccoli Comuni. L'*infezione malarica*, nei Comuni rurali ebbe, si può dire, un grado di perniciosità doppio di quello che spiegò nei maggiori centri, sebbene questi siano di preferenza sede di ospedali e di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei piccoli Comuni finitimi.

La *polmonite acuta* fu alquanto più esiziale nei centri principali che nei piccoli Comuni; la *sifilide* diede nelle città un quoziente di mortalità quattro volte più grande di quello osservato in media nei Comuni minori e le morti per *alcoolismo* furono nelle prime tre volte più frequenti che nell'insieme dei secondi. Anche la *tisi* e le altre *malattie tubercolari* diedero nelle prime quozienti di mortalità più alti di quelli osservati nei secondi; la *diarrea* e l'*enterite* fecero invece un numero relativamente maggiore di vittime nei piccoli Comuni in confronto delle città. Le *morti accidentali* avvengono quasi con pari frequenza nelle popolazioni dei due gruppi di Comuni: quelle per *suicidio* invece sono quasi tre volte più numerose, rispetto alla popolazione, nei capiluoghi.

Nei 78 Comuni non capiluoghi che abbiamo considerati a parte la mortalità per vaiuolo, morbillo, scarlattina, febbri da malaria e diarrea è stata, negli anni 1902-1904, più forte che nei Comuni capiluoghi, e ciò perchè i primi appartengono quasi tutti ai compartimenti delle Puglie, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia, nei quali le morti per malattie infettive sono relativamente più frequenti che altrove.

Preso nel suo insieme la mortalità nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario è stata nel 1904 di 216 ogni 10,000 abitanti, mentre negli altri 8071 Comuni non ha oltrepassato i 207. In questo secondo gruppo sono compresi anche i 78 Comuni suaccennati nei quali la mortalità ha raggiunto la proporzione di 223 per 10,000 abitanti.

## § 2. — Mortalità nelle città principali durante il periodo d'anni corso dal 1896 al 1903 e nell'anno 1904.

Nel prospetto n. 8 a pagina xxvi si è calcolato il quoziente di mortalità generale in ciascun Comune capoluogo di provincia (colonna 8). Qui prendiamo in esame più particolarmente la mortalità avvenuta durante il periodo di tempo corso dal 1896 al 1903 e nell'anno 1904 nei 29 Comuni che contano più di 60,000 abitanti. Tali notizie sono date nei tre prospetti seguenti dove i morti nei suddetti 29 Comuni sono classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o più caratteristiche e ragguagliati a 10,000 abitanti.

Da essi rilevasi che il *vaiuolo*, nell'anno 1904, colpì in modo gravissimo la città di Taranto, dove si contarono 38.7 morti ogni 10,000 abitanti. Anche in Palermo e Catania si ebbero a lamentare molte vittime per tale morbo, mentre nelle altre città più popolate rari furono i morti di vaiuolo, anzi, la maggior parte di esse ne fu immune.

Il *morbilli* assunse una certa gravità in Bari, Roma e Taranto.

La *scarlattina* causò parecchie morti a Messina, Taranto, Bari, Alessandria e Torino, mentre nelle altre città fu mite, anzi, in parecchie di esse non si ebbe alcuna morte per tale causa.

L'infezione *tifoide* cagionò il maggior numero di morti, relativamente alla popolazione, in Catania, Pistoia, Verona, Trapani, Brescia, Bari e Pisa, e il minore in Alessandria, Perugia, Palermo, Marsala, Napoli e Modena.

La *difterite* (compreso il *crup*) dominò in Catania, Pistoia e Firenze.

I morti per *ipertosse* toccarono il massimo in Padova, Ferrara, Modena, Reggio nell'Emilia, Marsala e Lucca.

Le *febbri* e la *cachessia da malaria* fecero maggiori vittime che altrove in Taranto (12.6 morti ogni 10,000 abitanti), Marsala (9.7) e Trapani (4.3). Seguono, a distanza, Catania (1.7), Roma (1.1) e Bari (0.9). Nelle rimanenti città la mortalità per malaria fu lievissima, anzi, in Firenze, Livorno, Lucca, Alessandria, Brescia, Perugia e Spezia essa fu nulla nel 1904 (a).

(a) Per ciò che riguarda la frequenza delle *febbri da malaria* in Roma, conviene tener conto del gran numero di lavoranti avventizi della campagna o addetti ai lavori di sterro nel suburbio, che colti dalla febbre, vengono a cercar ricovero e soccombono negli ospedali della città. Dalla tabella seguente risulta che negli anni 1881-96 circa un terzo delle morti avvenute in Roma per febbri malariche fu dato dalla popolazione avventizia e che negli anni 1897-1904 questa ne ha dato la metà od anche di più.

**Morti per febbri da malaria e per cachessia palustre nel Comune di Roma in ciascun anno del periodo 1881-1904.**

MORTI per febbri malariche	ANNI DI OSSERVAZIONE																							
	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904
Nella popolaz. stabile. . . . .	387	325	335	267	283	225	250	234	238	226	188	92	114	86	105	76	37	75	47	48	30	26	20	28
Nella popolaz. avventizia. . . . .	263	180	153	122	122	130	124	133	104	74	66	47	75	54	84	61	36	95	40	75	46	27	26	27
TOTALE . . . . .	650	505	488	389	405	355	374	367	342	300	254	139	189	140	189	137	73	170	87	123	76	53	46	55

Come si vede le condizioni di Roma rispetto all'endemia malarica, sono molto migliorate dal 1881 al 1904. Difatti il numero effettivo dei morti è scemato, nel detto periodo di tempo, da 650 a 55, mentre negli stessi anni la popolazione è cresciuta da 300,467 a 507,106, cosicchè il quoziente di mortalità per tali malattie è sceso nei ventiquattro anni considerati da 21.6, per ogni 10,000 abitanti, a 1.1.

Classificando i morti di febbre da malaria, nei cinque anni 1900-1904, secondo il luogo in cui erano domiciliati si hanno le cifre seguenti:

ANNI	POPOLAZIONE		NUMERO DEI MORTI PER FEBBRI DA MALARIA PROVENIENTI		PROPORZIONE DEI MORTI PER 10,000 ABITANTI	
	della città	dell'agro romano	dalla città	dall'agro romano	della città	dell'agro romano
1900 . . . . .	424,000	36,500	67	56	1.58	15.34
1901 . . . . .	433,816	38,482	32	44	0.74	11.43
1902 . . . . .	443,663	39,243	22	31	0.50	7.80
1903 . . . . .	455,776	40,425	27	19	0.59	4.70
1904 . . . . .	466,823	41,971	34	21	0.73	5.00

La *siflide* diede i maggiori quozienti di mortalità in Messina, Verona, Napoli, Reggio Emilia e Roma.

Le morti per *febbre puerperale* avvennero, presso a poco, colla stessa frequenza nelle città più popolose.

La mortalità per *atrofia congenita* presentò i più alti quozienti in Perugia, Modena, Padova, Ferrara e Messina, ed i più bassi in Napoli, Trapani, Torino e Spezia.

La *polmonite crupale* e la *bronco-polmonite acuta* diedero in Genova, Modena, Napoli, Firenze, Venezia e Lucca un quoziente di mortalità quasi doppio di quello riscontrato in Trapani, Ferrara, Catania, Spezia, Pistoia e Ravenna.

La *bronchite acuta e cronica* determinò una mortalità considerevole nelle città di Bari, Napoli, Reggio Emilia, Catania, Taranto, Palermo e Perugia, mentre in quelle di Spezia, Torino, Bologna, Genova, Padova, Milano e Roma riuscì meno letale.

La mortalità per malattie *tubercolari*, prese complessivamente, presentò i quozienti massimi in Firenze, Pisa, Brescia, Genova, Padova, Lucca, Bologna e Verona, ed i minimi in Trapani, Marsala, Taranto, Catania, Bari, Modena e Ravenna.

Le malattie del *cuore* cagionarono una mortalità relativamente alta in Verona, Reggio nell'Emilia, Napoli, Brescia, Livorno, Pistoia e Torino al paragone di quella verificatasi in Trapani, Marsala, Taranto, Spezia, Palermo e Bari.

L'*apoplessia* e la *congestione cerebrale* fecero il maggior numero di vittime in Brescia, Perugia, Firenze, Modena, Pisa, Verona e Venezia, e il minore in Taranto, Bari, Spezia, Messina, Catania, Alessandria, Trapani e Palermo.

L'*enterite*, la *diarrea* e le altre malattie infiammatorie del canale intestinale colpirono più gravemente le città di Bari, Catania, Taranto, Reggio nell'Emilia, Modena, Brescia, Palermo e Napoli; mentre Verona, Bologna, Perugia, Spezia, Firenze, Roma, Pisa e Torino ne soffrirono molto meno, tantochè la percentuale in alcuni di questi ultimi Comuni, per esempio in Verona, non raggiunse il quarto di quella verificatasi in Bari.

L'*alcoolismo cronico* causò parecchie morti in Verona, Brescia, Venezia, Padova, Lucca e Perugia; all'opposto in Catania, Messina, Ferrara, Bari, Modena, Ravenna, Trapani, Reggio nell'Emilia, Spezia, Pistoia e Marsala non vi fu alcun caso di morte per abuso di bevande alcooliche.

Le morti violente per *cause accidentali* avvennero con maggior frequenza in Brescia, Reggio nell'Emilia, Pisa, Lucca e Genova; i *suicidi* in Bologna, Torino, Roma, Milano, Genova, Livorno e Padova; e gli *omicidi* in Napoli, Catania, Marsala, Palermo, Roma, Firenze e Trapani. Nelle città di Perugia e Reggio nell'Emilia non si ebbe alcun omicidio durante l'anno 1904.

Morti durante il 1904 nei 29 Comuni che contano più di 60,000 abitanti,  
classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

PROSPETTO N. 16.

A) Cifre effettive.

COMUNI	Vainolo	Morbilli	Scarlattina	Febbre tifoide	Difterite e laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachexia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrofia congenita	Bronchite acuta	Bronchite cronica	Polmonite crupale	Bronco polmonite acuta	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Apoplessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale	Alcolismo cronico	Morti violente		
																				per cause accidentali	per suicidio	per omicidio
<i>Capoluoghi di provincia.</i>																						
Napoli . . . . .	2	61	5	102	108	10	18	181	10	347	1 025	337	566	1 111	1 258	1 362	544	1 619	4	217	46	87
Milano . . . . .	..	42	4	209	135	32	11	71	27	539	417	49	670	508	1 476	784	632	866	10	165	102	14
Roma . . . . .	1	167	8	203	72	29	55	128	20	581	298	138	574	623	1 268	760	519	776	9	151	101	37
Torino . . . . .	..	12	19	157	20	31	2	18	8	311	116	86	430	408	989	729	499	564	10	106	73	16
Palermo . . . . .	111	21	2	44	8	12	17	27	6	328	533	86	461	143	622	437	282	935	1	55	14	26
Genova . . . . .	9	30	3	69	39	10	3	34	5	248	139	33	332	477	757	478	227	420	11	101	47	9
Firenze . . . . .	..	28	..	87	69	25	..	21	5	213	169	54	316	243	696	393	329	301	1	48	30	13
Catania . . . . .	27	1	4	201	98	7	28	33	..	167	308	32	153	97	248	240	138	741	..	39	19	24
Bologna . . . . .	..	5	..	57	18	8	1	9	3	197	61	34	146	159	452	305	168	204	1	59	45	5
Venezia . . . . .	..	27	1	35	21	16	2	13	3	187	142	28	191	208	423	294	218	304	14	50	28	4
Messina . . . . .	1	10	48	56	25	..	9	89	4	308	205	22	166	113	308	234	129	386	..	40	7	4
Livorno . . . . .	1	2	1	35	7	9	..	3	2	118	118	23	93	95	236	216	89	220	3	30	19	2
Ferrara . . . . .	1	10	1	30	8	33	4	12	6	172	90	19	60	68	184	124	108	168	..	24	9	1
Padova . . . . .	..	11	1	33	7	39	1	8	1	184	49	12	49	123	258	134	113	154	6	26	16	2
Bari delle Puglie . . . . .	7	28	7	44	5	4	7	6	5	81	227	47	77	113	124	110	55	428	..	24	2	3
Lucca . . . . .	..	..	..	36	8	21	..	5	4	79	106	36	78	117	222	148	79	127	5	31	5	4
Verona . . . . .	..	7	2	72	4	3	1	25	2	94	63	19	82	68	213	188	111	90	10	25	9	1
Alessandria . . . . .	..	..	5	3	11	1	..	14	..	77	61	24	62	87	188	104	62	151	2	14	10	1
Brescia . . . . .	..	3	3	45	10	2	..	6	1	80	58	24	102	73	226	170	150	225	7	41	9	1
Modena . . . . .	..	..	..	12	14	24	1	4	1	144	92	24	57	136	112	93	100	229	..	19	12	2
Trapani . . . . .	..	1	..	43	4	2	28	8	1	23	65	10	63	29	67	40	57	135	..	16	1	4
Ravenna . . . . .	..	1	..	18	2	10	1	1	3	96	53	15	83	28	110	121	86	118	..	15	9	3
Perugia . . . . .	..	2	..	7	11	1	..	3	3	153	116	5	93	40	115	115	102	86	3	23	7	..
Pisa . . . . .	..	..	1	34	3	12	1	1	1	67	55	20	56	83	196	119	93	97	1	26	11	2
Reggio Emilia . . . . .	..	..	..	16	4	20	1	16	1	96	114	18	50	100	132	143	74	211	..	28	7	..
<i>Capiluoghi di circondario.</i>																						
Spezia . . . . .	..	1	..	26	14	7	..	4	1	76	18	6	56	77	193	86	57	109	..	16	4	1
Taranto . . . . .	268	17	10	22	5	5	87	8	2	73	128	16	80	48	105	70	27	306	1	23	6	3
Pistoia . . . . .	..	6	..	63	30	13	1	1	1	95	61	14	55	56	161	139	65	154	..	15	10	2
<i>Comuni non capiluoghi</i>																						
Marsala . . . . .	..	..	1	9	3	19	60	2	3	75	97	4	44	92	76	58	61	113	..	11	1	6

B) Cifre proporzionali a 10,000 abitanti della popolazione totale del Comune.

Segue PROSPETTO 16.

COMUNI	Popolazione al 1° luglio 1904 (a)	Vaiuolo	Morbilli	Scarlattina	Febbre tifoide	Difterite e larintgite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrfia congenita	Bronchite acuta	Bronchite cronica	Polmonite crupale	Bronco polmonite acuta	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Apoplessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale	Alcolifismo cronico	Morti violente		
																					per cause acci-dentali	per suicidio	per omicidio
<i>Capitluoghi di provincia</i>																							
Napoli . . . . .	577 520	..	1.1	0.1	1.8	1.9	0.2	0.3	3.1	0.9	6.0	17.7	5.8	9.8	19.2	21.8	23.6	9.4	28.0	0.1	3.8	0.8	1.5
Milano . . . . .	539 280	..	0.8	0.1	3.9	2.5	0.6	0.2	1.3	0.5	10.0	7.7	0.9	12.4	9.4	27.4	14.5	11.7	16.1	0.2	3.1	1.9	0.3
Roma . . . . .	507 106	..	3.3	0.2	4.0	1.4	0.6	1.1	2.5	0.4	11.5	5.9	2.7	11.3	12.3	25.0	15.0	10.2	15.3	0.2	3.0	2.0	0.7
Torino . . . . .	354 877	..	0.3	0.5	4.4	0.6	0.9	0.1	0.5	0.9	8.8	3.3	2.4	12.1	11.5	27.9	20.5	12.4	15.9	0.3	3.0	2.1	0.5
Palermo . . . . .	324 189	3.4	0.6	0.1	1.4	0.2	0.4	0.5	0.8	0.2	10.1	16.4	2.7	14.2	4.4	19.2	13.5	8.7	28.8	..	1.7	0.4	0.8
Genova . . . . .	247 491	0.4	1.2	0.1	2.8	1.6	0.4	0.1	1.4	0.2	10.0	5.6	1.3	13.4	19.3	30.6	19.3	9.2	17.0	0.4	4.1	1.9	0.4
Firenze . . . . .	213 472	..	1.3	..	4.1	3.2	1.2	..	1.0	0.2	10.0	7.9	2.5	14.8	11.4	32.6	18.4	15.4	14.1	..	2.2	1.4	0.6
Catania . . . . .	162 164	1.7	0.1	0.2	12.4	6.0	0.4	1.7	2.0	..	10.3	19.0	2.0	9.4	6.0	15.3	14.8	8.5	45.7	..	2.4	1.2	1.5
Bologna . . . . .	158 285	..	0.3	..	3.6	1.1	0.5	0.1	0.6	0.2	12.4	3.9	2.1	9.2	10.0	28.6	19.3	10.6	12.9	0.1	3.7	2.2	0.3
Venezia . . . . .	155 238	..	1.7	0.1	2.3	1.4	1.0	0.1	0.8	0.2	12.0	9.1	1.8	12.3	13.4	27.2	19.0	14.0	19.6	0.9	3.2	1.3	0.3
Messina . . . . .	154 661	0.1	0.6	3.1	3.6	1.6	..	0.6	5.8	0.3	19.9	13.3	1.4	10.7	7.3	19.9	15.1	8.3	25.0	..	2.6	0.5	0.3
Livorno . . . . .	98 443	0.1	0.2	0.1	3.6	0.7	0.9	..	0.3	0.2	12.0	12.0	2.3	9.4	9.7	24.0	21.9	9.0	22.3	0.3	3.0	1.9	0.2
Ferrara . . . . .	84 646	0.1	1.2	0.1	3.5	0.9	3.9	0.5	1.4	0.7	20.3	10.6	2.2	7.1	8.0	21.7	14.6	12.8	19.8	..	2.8	1.1	0.1
Padova . . . . .	84 323	..	1.3	0.1	3.9	0.8	4.6	0.1	0.9	0.1	21.8	5.8	1.4	5.8	14.6	30.6	15.9	13.4	18.3	0.7	3.1	1.9	0.2
Bari delle Puglie . . . . .	81 308	0.9	3.4	0.9	5.4	0.6	0.5	0.9	0.7	0.6	10.0	27.9	5.8	9.5	13.9	15.3	13.5	6.8	52.6	..	3.0	0.2	0.4
Lucca . . . . .	76 322	..	..	..	4.7	1.0	2.8	..	0.7	0.5	10.4	13.9	4.7	10.2	15.3	29.1	19.4	10.4	16.6	0.7	4.1	0.7	0.5
Verona . . . . .	75 331	..	0.9	0.3	9.6	0.5	0.4	0.1	3.3	0.3	12.5	8.4	2.5	10.9	9.0	28.3	25.0	14.7	11.9	1.3	3.3	1.2	0.1
Alessandria . . . . .	73 086	..	..	0.7	0.4	1.5	0.1	..	1.9	..	10.5	8.3	3.3	8.5	11.9	25.7	14.2	8.5	20.7	0.3	1.9	1.4	0.1
Brescia . . . . .	72 673	..	0.4	0.4	6.2	1.4	0.3	..	0.8	0.1	11.0	8.0	3.3	14.0	10.0	31.1	23.4	20.6	31.0	1.0	5.6	1.2	0.1
Modena . . . . .	66 184	..	..	..	1.8	2.1	3.6	0.2	0.6	0.2	21.8	13.9	3.6	8.6	20.5	16.9	14.1	15.1	34.6	..	2.9	1.3	0.3
Trapani . . . . .	65 297	..	0.2	..	6.6	0.6	0.3	4.3	1.2	0.2	3.5	10.0	1.5	9.6	4.4	10.3	6.1	8.7	20.7	..	2.5	0.2	0.6
Ravenna . . . . .	64 681	..	0.2	..	2.8	0.3	1.5	0.2	0.2	0.5	14.8	8.2	2.3	12.8	4.3	17.0	18.7	13.3	18.2	..	2.3	1.4	0.5
Perugia . . . . .	63 505	..	0.3	..	1.1	1.7	0.2	..	0.5	0.5	24.1	18.3	0.8	14.6	6.3	18.1	18.1	16.1	13.5	0.5	3.6	1.1	..
Pisa . . . . .	62 801	..	..	0.2	5.4	0.5	1.9	0.2	0.2	0.2	10.7	8.8	3.2	8.9	13.2	31.2	18.9	14.8	15.4	0.2	4.1	1.8	0.3
Reggio Emilia . . . . .	60 095	..	..	..	2.7	0.7	3.3	0.2	2.7	0.2	16.0	19.0	3.0	8.3	16.6	22.0	23.8	12.3	35.1	..	4.7	1.2	..
<i>Capitluoghi di circondario.</i>																							
Spezia . . . . .	78 811	..	0.1	..	3.3	1.8	0.9	..	0.5	0.1	9.6	2.3	0.8	7.1	9.8	24.5	10.9	7.2	13.8	..	2.0	0.5	0.1
Taranto . . . . .	69 230	38.7	2.5	1.4	3.2	0.7	0.7	12.6	1.2	0.3	10.5	18.5	2.3	11.6	6.9	15.2	10.1	3.9	44.2	0.1	3.3	0.9	0.4
Pistoia . . . . .	64 985	..	0.9	..	9.7	4.6	2.0	0.2	0.2	0.2	14.6	9.4	2.2	8.5	8.6	24.8	21.4	10.0	23.7	..	2.3	1.5	0.3
<i>Comuni non capitluoghi.</i>																							
Marsala . . . . .	61 957	..	..	0.2	1.5	0.5	3.1	9.7	0.3	0.5	12.1	15.7	0.6	7.1	14.8	12.3	9.4	9.8	18.2	..	1.8	0.2	1.0

(a) Per il calcolo della popolazione si veggano le spiegazioni date a pagina v.

Morti durante il periodo d'anni corso dal 1896 al 1903 nei 29 Comuni che contano più di 60,000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

PROSPETTO N. 17.

(Cifre proporzionali a 10,000 abitanti della popolazione totale del Comune).

COMUNI	Vaiuolo	Morbilli	Scarlatina	Febbre tifoide	Difterite e laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrofia congenita (a)	Bronchite acuta e cronica	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Apoplessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale	Alcolismo cronico	Morti violente		
																		per cause accidentali	per suicidio	per omicidio
<i>Capoluoghi di provincia</i>																				
Napoli . . . . .	2.6	0.6	0.1	2.1	1.1	0.3	0.5	3.3	0.2	5.0	23.3	34.0	24.5	23.8	11.3	27.7	..	3.3	0.9	1.4
Milano . . . . .	0.1	2.0	0.4	4.5	3.5	0.8	0.3	2.5	0.4	10.5	11.4	23.8	29.1	16.7	12.6	15.4	0.3	2.7	2.0	0.2
Roma . . . . .	..	3.2	0.1	3.8	1.2	0.7	2.1	2.7	0.4	7.3	10.4	25.4	27.4	13.9	10.7	18.3	0.2	3.0	1.9	0.9
Torino . . . . .	0.1	2.5	0.1	2.2	1.3	1.6	0.1	0.8	0.3	11.3	8.6	27.9	25.3	20.9	12.4	16.1	0.2	3.0	2.3	0.4
Palermo . . . . .	0.4	1.7	0.4	4.4	2.1	1.6	1.0	1.0	0.2	11.0	20.8	18.9	19.4	12.3	7.9	32.4	0.1	1.9	0.5	0.7
Genova . . . . .	0.5	1.9	0.4	2.4	1.7	0.7	0.2	1.5	0.3	11.4	10.4	35.1	30.7	19.2	8.5	16.4	0.5	3.1	1.8	0.4
Firenze . . . . .	0.2	0.7	0.3	4.4	1.8	0.8	0.1	1.4	0.3	11.6	13.6	27.7	29.5	24.3	14.7	13.2	0.1	2.2	1.7	0.4
Catania . . . . .	0.2	0.8	1.3	5.0	2.8	1.1	2.6	1.7	0.3	9.6	24.2	19.7	14.3	11.9	9.6	46.4	..	2.4	1.0	1.1
Bologna . . . . .	..	1.1	0.1	4.4	1.5	1.6	0.1	1.7	0.2	19.6	9.6	26.6	29.9	19.1	11.9	21.1	0.2	3.0	2.8	0.3
Venezia . . . . .	..	3.7	0.1	4.1	3.5	1.4	0.2	0.9	0.2	14.8	17.2	23.5	32.0	19.9	14.1	22.0	0.8	3.3	1.7	0.2
Messina . . . . .	0.5	1.1	0.3	4.4	0.7	0.9	0.6	5.4	0.4	18.2	22.8	19.7	21.4	14.7	6.9	29.7	..	2.3	0.3	0.3
Livorno . . . . .	..	1.8	0.2	8.2	1.8	0.8	0.1	0.9	0.2	11.3	15.6	24.2	29.1	24.8	9.6	18.0	0.3	2.9	1.7	0.4
Ferrara . . . . .	..	1.0	0.4	3.5	1.3	3.0	2.3	1.9	0.3	23.0	16.9	16.1	23.3	15.2	14.3	25.0	0.1	2.7	1.0	0.2
Padova . . . . .	0.1	1.4	0.1	4.0	0.9	3.1	0.3	2.0	0.2	20.8	12.2	20.4	34.5	16.6	11.7	20.6	0.6	2.8	1.5	0.2
Bari delle Puglie . . . . .	5.6	1.5	4.8	13.3	2.1	0.8	2.5	0.9	0.5	10.6	22.7	16.1	19.5	13.0	6.3	45.2	..	2.6	0.6	0.4
Lucca . . . . .	..	0.9	..	6.1	1.4	1.7	0.1	0.8	0.2	15.4	18.0	29.8	30.8	20.0	12.5	16.1	0.2	3.4	0.6	0.4
Verona . . . . .	0.4	0.8	0.3	5.3	1.5	0.6	0.1	2.7	0.8	13.0	12.9	24.1	26.3	26.1	15.1	16.0	0.7	2.9	1.3	0.1
Alessandria . . . . .	..	1.3	0.3	1.8	1.2	0.6	0.1	0.8	0.3	12.2	19.1	24.0	29.1	19.0	10.6	21.6	0.8	2.7	1.1	0.2
Brescia . . . . .	0.1	2.2	0.2	5.2	3.4	1.4	0.2	1.4	0.3	16.6	15.6	29.0	31.7	24.0	20.2	30.2	0.7	4.3	1.1	0.3
Modena . . . . .	..	1.6	..	3.7	1.9	1.5	0.1	0.8	0.3	22.1	23.3	32.7	21.9	15.7	14.7	28.5	0.2	3.1	1.0	0.2
Trapani . . . . .	..	2.7	0.3	7.0	2.0	0.5	12.9	1.1	0.5	5.1	12.5	18.7	11.9	7.7	9.4	21.7	..	1.9	0.5	1.0
Ravenna . . . . .	..	0.5	..	2.9	1.7	2.3	2.1	0.3	0.4	19.6	9.5	25.7	19.1	14.4	10.9	24.4	0.1	2.9	1.1	0.4
Perugia . . . . .	..	1.0	0.1	2.7	2.4	3.0	0.1	1.2	0.3	19.3	23.5	24.4	17.5	19.0	15.4	22.3	0.5	3.2	1.0	0.2
Pisa . . . . .	..	2.6	0.1	9.8	2.0	1.0	0.4	1.3	0.5	12.5	15.5	23.9	33.5	18.2	13.4	16.6	0.2	3.5	1.8	0.4
Reggio Emilia . . . . .	..	1.8	0.3	2.7	4.2	3.1	0.1	1.9	0.2	19.7	24.4	23.5	25.5	26.6	13.0	35.9	0.2	3.1	1.2	0.1
<i>Capoluoghi di circondario.</i>																				
Spezia . . . . .	0.1	4.8	0.1	2.0	2.0	1.5	0.2	0.5	0.4	13.4	14.3	23.7	25.6	10.4	6.2	16.1	0.2	3.2	1.1	0.3
Taranto . . . . .	2.4	2.9	3.8	6.4	1.2	1.0	11.0	1.4	0.2	13.2	25.1	23.1	21.1	9.1	6.0	52.3	0.1	2.7	0.5	0.5
Pistoia . . . . .	0.2	1.1	0.7	8.2	2.0	2.0	0.3	0.6	0.5	19.0	15.2	24.2	24.4	21.1	10.9	27.5	..	2.8	0.9	0.2
<i>Comuni non capoluoghi.</i>																				
Marsala . . . . .	0.2	2.0	0.2	6.9	1.7	0.9	13.2	0.4	0.4	15.2	20.4	18.0	15.5	7.0	9.5	21.9	0.1	2.8	0.5	1.3

(a) Le proporzioni dei morti per atrofia congenita si riferiscono al sessennio 1898-1903, giacchè prima del 1898 i morti di tale malattia non erano indicati in una rubrica a sè nella tavola relativa ai grandi Comuni.

CAPO IV.

NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

§ 1. — Morti per causa violenta durante il periodo 1887-1904, ripartiti per sesso.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti a causa di infortunio accidentale, di omicidio e di suicidio, divisi per sesso, negli anni dal 1887 al 1904.

Classificazione delle morti violente negli anni 1887-1904.

PROSPETTO N. 18.

ANNI	NUMERO DEI MORTI								
	Per causa accidentale			Per omicidio (a)			Per suicidio		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
1887. . . . .	11 180	7 518	3 662	1 547	1 358	189	1 449	1 182	267
1888. . . . .	11 356	7 664	3 692	1 637	1 433	204	1 590	1 280	310
1889. . . . .	10 278	6 868	3 410	1 458	1 273	185	1 463	1 144	319
1890. . . . .	9 784	6 557	3 227	1 317	1 128	189	1 652	1 356	296
1891. . . . .	10 310	6 869	3 441	1 407	1 205	202	1 697	1 381	316
1892. . . . .	10 146	6 831	3 315	1 558	1 358	200	1 723	1 392	331
1893. . . . .	10 008	6 586	3 422	1 648	1 424	224	1 737	1 432	305
1894. . . . .	9 891	6 484	3 407	1 429	1 238	191	1 732	1 381	351
1895. . . . .	8 894	5 833	3 061	1 487	1 276	211	1 874	1 507	367
1896. . . . .	9 628	6 283	3 345	1 456	1 256	200	2 000	1 594	406
1897. . . . .	10 304	6 741	3 563	1 537	1 324	213	1 895	1 505	390
1898. . . . .	10 066	6 700	3 366	1 591	1 356	235	2 059	1 629	430
1899. . . . .	10 229	6 743	3 486	1 407	1 201	206	2 019	1 594	425
1900. . . . .	10 184	6 780	3 404	1 305	1 102	203	2 040	1 615	425
1901. . . . .	10 771	7 008	3 763	1 260	1 069	191	2 014	1 597	417
1902. . . . .	10 493	6 867	3 626	1 332	1 133	199	2 010	1 580	430
1903. . . . .	10 322	6 804	3 518	1 296	1 097	199	1 922	1 537	385
1904. . . . .	11 044	7 480	3 564	1 308	1 131	177	2 156	1 705	451

Nelle cifre suesposte non si sono compresi fra i morti per omicidio gli uccisi in conflitti colla forza pubblica, dei quali si ha notizia separata soltanto dal 1897. Essi furono 3 (maschi) nel 1897, 115 (maschi 101 e femmine 14) nel 1898, (b) 10 (maschi) nel 1899, 1 (maschio) nel 1900, 2 (maschi) nel 1901, nessuno nel 1902, 9 (maschi) nel 1903 e 4 (maschi) nel 1904.

Sopra 184,888 morti per causa violenta accidentale negli anni dal 1887 al 1904, 122,616 erano maschi e 62,272 femmine, cioè, ogni 100, se ne contarono 66 dei primi e 34 delle seconde.

(a) In questa rubrica sono compresi anche i morti per ferite in duello, i quali furono in numero di 2 nel 1887, 4 nel 1888, 4 nel 1889, 2 nel 1890, 2 nel 1891, 14 nel 1892, 1 nel 1893, 1 nel 1894, 7 nel 1895, 1 nel 1896 e 3 nel 1898. Negli anni 1899-1904 non si ebbero dichiarazioni di morte per ferite riportate in duello.

Fra i morti per omicidio sono contati, nel 1904, 4 militari, 4 carabinieri, 3 guardie di città, 5 guardie di finanza e 3 guardiani campestri, che probabilmente trovarono la morte nel compimento del loro dovere.

(b) Questo numero così elevato in confronto di quello degli altri anni dipende dalla repressione dei moti avvenuti nel 1898 in alcune provincie del Regno e più particolarmente a Milano.



**§ 2. — Morti accidentalmente negli anni 1902-1904 classificati per compartimenti, sesso, età, specie dell'infortunio, e natura del veleno nei casi di avvelenamento.**

*Distribuzione geografica.* — Le morti accidentali, negli anni 1902, 1903 e 1904, si ripartivano geograficamente come apparisce dal prospetto sottostante.

**Morti accidentali negli anni 1902-1904 divise per compartimenti.**

PROSPETTO N. 19.

COMPARTIMENTI	ANNO 1904		ANNO 1903		ANNO 1902	
	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti
Piemonte . . . . .	1 244	36.92	1 118	33.33	1 197	35.85
Liguria . . . . .	422	37.75	362	32.73	402	36.75
Lombardia . . . . .	1 566	35.49	1 376	31.46	1 365	31.48
Veneto . . . . .	1 048	32.75	961	30.22	914	28.91
Emilia . . . . .	805	32.24	770	31.03	769	31.18
Toscana . . . . .	756	28.85	756	29.09	740	28.70
Marche . . . . .	397	36.58	372	34.51	371	34.65
Umbria . . . . .	249	36.25	264	38.76	244	36.13
Lazio . . . . .	445	35.16	452	36.29	387	31.59
Abruzzi e Molise . . . . .	456	31.07	488	33.43	492	33.88
Campania . . . . .	1 189	36.98	1 084	33.88	1 120	35.19
Puglie . . . . .	590	28.90	547	27.11	572	28.70
Basilicata . . . . .	205	41.78	178	36.27	213	43.41
Calabrie . . . . .	466	33.41	459	33.08	452	32.75
Sicilia . . . . .	944	25.74	903	24.90	1 035	28.86
Sardegna . . . . .	262	32.17	232	28.72	220	27.47
REGNO . . . . .	11 044	33.12	10 322	31.19	10 493	31.96

Nell'anno 1904 le morti accidentali sono state relativamente più frequenti nella Basilicata, nella Liguria, nella Campania, nel Piemonte, nelle Marche e nell'Umbria; e meno frequenti nella Sicilia, nella Toscana e nelle Puglie.

*Età e sesso.* — Nel 1904 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 31 erano in età non superiore ai 15 anni, 47 fra 15 e 60 anni e 22 di oltre 60 anni. Nelle femmine, gl'infortuni furono relativamente più numerosi nell'infanzia e nell'adolescenza (51 per cento in età non superiore ai 15 anni) e nell'età avanzata (26 per cento di oltre 60 anni), mentre le età fra 15 e 60 anni non diedero che un quoziente di 23 per cento. Raggiungliando i morti per causa violenta accidentale al numero dei viventi della stessa età, si trova che essi furono più frequenti tra i vecchi da 70 anni in su (1449 nei maschi e 1052 nelle femmine per un milione di coetanei, nell'anno 1904) e poi tra i fanciulli da oltre 1 a non oltre 5 anni (789 nei maschi, 703 nelle femmine); gli individui fra 5 e 40 anni furono maggiormente risparmiati, non ostante che siano comprese fra le morti accidentali quelle avvenute per infortunio sul lavoro.

Nel prospetto seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1902-1904.

**Morti accidentali, negli anni 1902-1904, classificate per gruppi d'età e secondo il sesso dei colpiti.**

**A) Cifre effettive.**

PROSPETTO N. 20.

ETÀ DEI DEFUNTI	ANNO 1904			ANNO 1903			ANNO 1902		
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.
Non oltre 1 anno . . . . .	331	171	160	291	146	145	308	158	150
Da oltre 1 a 4 anni compiuti . . .	2,370	1,277	1,093	2,309	1,239	1,070	2,305	1,211	1,094
" 5 a 14 " . . . . .	1,478	908	570	1,392	813	579	1,391	808	583
" 15 a 29 " . . . . .	1,569	1,287	282	1,389	1,126	263	1,431	1,129	302
" 30 a 39 " . . . . .	763	621	142	731	593	138	766	621	145
" 40 a 49 " . . . . .	896	726	170	819	675	144	828	660	168
" 50 a 59 " . . . . .	1,003	801	202	938	694	244	974	731	243
" 60 a 69 " . . . . .	1,105	799	306	990	685	305	1,059	743	316
Da 70 anni in su . . . . .	1,448	834	614	1,439	816	623	1,389	779	610
Età ignota . . . . .	81	56	25	24	17	7	42	27	15
TOTALE . . . . .	11,044	7,480	3,564	10,322	6,804	3,518	10,493	6,867	3,626

**B) Cifre proporzionali.**

ETÀ DEI DEFUNTI	A 100 morti accidentali						Ad un milione di viventi coetanei (a)					
	1904		1903		1902		1904		1903		1902	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Non oltre 1 anno . . . . .	2	4	2	4	2	4	355	346	303	314	328	325
Da oltre 1 a 4 anni compiuti . . .	17	31	18	31	18	30	789	703	766	688	748	704
" 5 a 14 " . . . . .	12	16	12	16	12	16	257	166	230	169	229	170
" 15 a 29 " . . . . .	17	8	17	7	16	8	332	71	291	66	291	76
" 30 a 39 " . . . . .	9	4	9	4	9	4	319	70	304	68	319	72
" 40 a 49 " . . . . .	10	5	10	4	10	5	426	97	396	82	387	96
" 50 a 59 " . . . . .	11	6	10	7	11	7	561	137	486	166	512	165
" 60 a 69 " . . . . .	11	9	10	9	11	9	816	301	699	300	758	311
Da 70 anni in su . . . . .	11	17	12	18	11	17	1449	1052	1418	1067	1354	1045
TOTALE . . . . .	100	100	100	100	100	100	463	219	422	216	425	222

*Cause.* — Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute negli anni 1902, 1903 e 1904, sono indicate le cadute, gli annegamenti, e, nelle femmine, le ustioni, secondo che risulta dal prospetto seguente:

(a) Secondo i risultati del Censimento 10 febbraio 1901.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI											
	Cifre effettive						Cifre proporzionali a 100 per qualsiasi causa					
	Anno 1904		Anno 1903		Anno 1902		Anno 1904		Anno 1903		Anno 1902	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Ubbriachezza . . . . .	(a) 36	(a) 2	(b) 17	(b) 2	(c) 20	(c) 2	0.48	0.06	0.25	0.06	0.29	0.06
Anneggamento . . . . .	1 373	511	1 266	509	1 307	586	18.36	14.34	17.72	14.47	19.03	16.16
Freddo . . . . .	65	17	56	13	73	30	0.87	0.48	0.82	0.37	1.06	0.83
Insolazione . . . . .	56	20	46	21	91	39	0.75	0.56	0.68	0.60	1.33	1.08
Fulmineazione . . . . .	218	93	91	21	87	25	2.91	2.61	1.34	0.60	1.27	6.69
Caduta . . . . .	2 204	798	1 884	733	1 892	763	29.47	22.39	27.69	20.84	27.55	21.04
Lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine . . . . .	214	34	203	20	202	23	2.86	0.95	2.98	0.57	2.94	0.63
Ferite d'arma da taglio . . . . .	35	2	11	4	13	3	0.47	0.06	0.16	0.11	0.19	0.08
Lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	12	..	5	1	6	1	0.16	..	0.07	0.03	0.09	0.03
Schiacciamento . . . . .	542	73	392	63	396	68	7.25	2.05	5.76	1.79	5.77	1.87
Violenze d'animali . . . . .	38	4	18	1	35	10	0.51	0.11	0.26	0.03	0.51	0.28
Ustione . . . . .	1 076	1 481	1 124	1 502	1 016	1 482	14.39	41.55	16.52	42.69	14.80	40.87
Soffocamento . . . . .	168	90	135	73	144	77	2.25	2.53	1.98	2.08	2.10	2.12
Asfissia . . . . .	155	65	136	55	126	62	2.07	1.82	2.00	1.56	1.83	1.71
Avvelenamenti acuti . . . . .	136	85	108	87	129	76	1.82	2.38	1.59	2.47	1.88	2.10
Morsi di vipera o di altri animali velenosi . . . . .	8	8	6	6	10	7	0.11	0.22	0.09	0.17	0.15	0.19
Diverse o ignote . . . . .	1 144	281	1 366	407	1 320	372	15.27	7.89	20.09	11.56	19.21	10.26
TOTALE . . . . .	7 480	3 564	6 804	3 518	6 867	3 626	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Dei 38 casi di morte per ubbriachezza, nell'anno 1904, 24 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 14 per infortuni causati dall'ubbriachezza, e cioè, 10 per caduta, 2 per annegamento, 1 per soffocamento ed 1 per assideramento.

(b) Dei 19 casi di morte per ubbriachezza, nell'anno 1903, 16 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 3 per infortuni causati dall'ubbriachezza, e cioè, uno per caduta, uno per annegamento ed uno per asfissia.

(c) Nell'anno 1902 l'ubbriachezza fu causa di 22 morti, delle quali 20 per avvelenamento acuto da alcool e 2 per infortunio (una per caduta ed una per annegamento).

Per le morti dovute ad avvelenamento acuto, sia accidentale, sia procurato, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze venefiche introdotte nell'organismo. Tra gli avvelenamenti acuti accidentali sono compresi, nel prospetto seguente, quelli causati da morsicatura di vipera o di altro animale velenoso. Qui appresso sono riferiti i risultati ottenuti negli anni 1902, 1903 e 1904.

**Morti per avvelenamento acuto negli anni 1902, 1903 e 1904, classificati per sesso e secondo la specie del veleno.**

PROSPETTO N. 22.

NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto						Suicidi per avvelenamento					
	1904		1903		1902		1904		1903		1902	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Acido solforico . . . . .	9	3	11	4	12	5	14	3	12	1	5	7
Id. nitrico . . . . .	2	1	1	..	..	..	2	..	1	..	1	1
Id. muriatico . . . . .	2	..	1	..	..	1	1	4	..	1	1	..
Id. arsenioso e liquore del Fowler . . . . .	..	1	..	..	5	..	4	2	2	..	3	1
Id. ossalico . . . . .	2	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..
Id. fenico . . . . .	3	2	1	1	3	2	3	2	2	2	2	..
Id. acetico . . . . .	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
Id. prussico, emulsione di mandorle ed essenze amare . . . . .	1	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..
Altri acidi ed acidi non specificati . . . . .	6	3	1	..	1	1	5	..	..	..	3	..
Fosforo . . . . .	..	..	..	..	..	..	3	4	5	8	4	8
Jodio . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ammoniaca . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..
Cianuro di potassio . . . . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..
Bicromato di potassio . . . . .	3	..	..	..	3	2	..	..	..	..	..	1
Solfato ed acetato di rame . . . . .	5	2	8	2	5	4	3	2	1	4	4	5
Sali di piombo . . . . .	1	..	3	..	1	3	..	1	..	1	..	..
Sublimato corrosivo . . . . .	9	10	12	18	12	16	33	29	27	21	20	13
Lisciva . . . . .	2	1	1	3	..	..	1	1	1	2	1	1
Altri sali . . . . .	1	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
Idrato di cloralio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Cloroformio . . . . .	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..
Benzina e petrolio . . . . .	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..
Creolina . . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Cicuta . . . . .	1	..	3	1	3	..	..	..	..	..	1	..
Tintura di noce vomica . . . . .	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Laudano, oppio e morfina . . . . .	5	..	4	2	2	1	5	..	3	1	6	..
Stricnina . . . . .	..	..	2	..	6	1	5	1	2	2	5	1
Altri alcaloidi . . . . .	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
Funghi . . . . .	48	32	16	23	22	13	..	..	..	..	..	..
Carne infetta . . . . .	1	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..
Veleni non specificati . . . . .	33	21	43	30	50	21	32	24	19	17	32	17
Morsi di vipera o di altro animale velenoso	8	8	6	6	10	7	..	..	..	..	..	..
TOTALE . . . . .	144	93	114	93	139	83	112	76	77	61	90	55

Giova ricordare che nella classe delle malattie ordinarie sono compresi, nel 1904, 60 morti (maschi 46 e femmine 14) per avvelenamento cronico causato, nella massima parte dei casi, da coliche saturnine. Nel 1903 le morti per avvelenamento cronico furono dichiarate in numero di 48 (maschi 38, femmine 10) e nel 1902 di 50 (maschi 43, femmine 7).

**§ 3. — Morti per omicidio negli anni 1902-1904 classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.**

Nel 1904 i morti per omicidio (compresi quelli per infanticidio ed esclusi i morti in conflitto colla Forza), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 1308.

Esaminando in relazione al sesso dei colpiti i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno le cifre seguenti:

PERSONE UCCISE MEDIANTE	ANNO 1904			ANNO 1903			ANNO 1902		
	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale
arma da fuoco . . . . .	303	47	350	247	43	290	285	48	333
arma da taglio . . . . .	377	56	433	377	53	430	441	57	498
arma contundente . . . . .	81	23	104	103	20	123	98	27	125
strangolamento . . . . .	6	11	17	7	8	15	8	11	19
avvelenamento . . . . .	2	3	5	1	2	3	7	2	9
annegamento . . . . .	2	5	7	10	5	15	7	4	11
soffocazione . . . . .	2	1	3	5	5	10	9	2	11
combustione . . . . .	...	...	...	...	...	...	...	1	1
precipitazione . . . . .	3	...	3	4	1	5	1	1	2
mezzo non specificato . . . . .	355	31	386	343	62	405	277	46	323
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1131</b>	<b>177</b>	<b>1308</b>	<b>1097</b>	<b>199</b>	<b>1296</b>	<b>1133</b>	<b>199</b>	<b>1332</b>

**§ 4. — Morti per suicidio negli anni 1902-1904, classificati per compartimenti, sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione.**

Abbiamo date a pagina LVIII le cifre dei suicidi divisi per sesso, in ciascun anno dal 1887 al 1904. Da esse apparisce che il numero dei suicidi è venuto crescendo fino al

(a) La statistica degli omicidii, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari. Ad esempio, la media annuale degli omicidii nel quinquennio 1896-1900 fu, secondo la statistica penale, di 2301 e, secondo la statistica sanitaria, di 1485 compresi i morti in conflitto colla forza pubblica. Ma questa discordanza è naturale ed inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratti di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano fortuiti, oppure causati da mano omicida. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, previe laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidii d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini più lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o colposa.

1898, dopo il quale anno si nota una leggera diminuzione fino al 1903. Nel 1904 le morti per suicidio crebbero nuovamente, essendo state 2156 corrispondenti a 6.47 ogni 100,000 abitanti.

*Distribuzione geografica.* — I suicidii avvenuti negli anni 1902, 1903 e 1904 si ripartiscono fra i vari compartimenti come è indicato qui appresso.

**Suicidii negli anni 1902-1904, divisi per compartimenti.**

PROSPETTO N. 23.

COMPARTIMENTI	NUMERO DEI SUICIDII					
	Anno 1904		Anno 1903		Anno 1902	
	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti
Piemonte . . . . .	297	8.81	325	9.69	330	9.88
Liguria . . . . .	116	10.38	108	9.77	94	8.59
Lombardia . . . . .	337	7.64	296	6.77	261	6.02
Veneto . . . . .	224	7.00	179	5.63	208	6.58
Emilia . . . . .	239	9.57	213	8.58	243	9.85
Toscana . . . . .	210	8.02	176	6.77	187	7.25
Marche . . . . .	79	7.28	64	5.94	74	6.92
Umbria . . . . .	41	5.97	47	6.90	47	6.96
Lazio . . . . .	132	10.43	124	9.96	110	8.98
Abruzzi e Molise . . . . .	51	3.47	42	2.88	59	4.06
Campania . . . . .	119	3.70	95	2.97	129	4.05
Puglie . . . . .	62	3.04	59	2.92	83	4.16
Basilicata . . . . .	19	3.87	17	3.46	15	3.06
Calabria . . . . .	25	1.79	22	1.59	24	1.74
Sicilia . . . . .	163	4.45	120	3.31	116	3.23
Sardegna . . . . .	42	5.16	35	4.33	30	3.75
<b>REGNO . . .</b>	<b>2 156</b>	<b>6.47</b>	<b>1 922</b>	<b>5.81</b>	<b>2 010</b>	<b>6.12</b>

*Sesso e stato civile.* — Fra i 2156 individui morti per suicidio nel 1904, 1705 erano maschi e 451 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 79 maschi e 21 femmine. Secondo lo stato civile, essi si distribuivano negli anni 1902, 1903 e 1904 così:

**Suicidi negli anni 1902-1904, classificati per sesso e stato civile.**

**A) Cifre effettive.**

PROSPETTO N. 24.

STATO CIVILE	ANNO 1904			ANNO 1903			ANNO 1902		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi o nubili. . . . .	963	793	170	834	665	169	881	715	166
Coniugati . . . . .	888	683	205	810	654	156	832	641	191
Vedovi . . . . .	250	180	70	223	168	55	242	176	66
Ignoto . . . . .	55	49	6	55	50	5	55	48	7
TOTALE . . . . .	2 156	1 705	451	1 922	1 537	385	2 010	1 580	430

**B) Cifre proporzionali a 100.**

STATO CIVILE	A 100 DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE						A 100 DEL TOTALE		
	Anno 1904		Anno 1903		Anno 1902		Anno	Anno	Anno
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	1904	1903	1902
Celibi o nubili. . . . .	82	18	80	20	81	19	45	43	44
Coniugati . . . . .	77	23	81	19	77	23	41	42	41
Vedovi . . . . .	72	28	75	25	73	27	12	12	12
Ignoto . . . . .	89	11	91	9	87	13	2	3	3
TOTALE . . . . .	79	21	80	20	79	21	100	100	100

*Età.* — Nel prospetto che segue i suicidi dell'uno e dell'altro sesso, negli anni 1902, 1903 e 1904, sono divisi per età. Confrontando il numero dei suicidi con quello dei viventi coetanei, si trova che le proporzioni crescono coll'avanzare dell'età.

**Suicidi negli anni 1902-1904, classificati per gruppi d'età.**

**A) Cifre effettive.**

PROSPETTO N. 25.

ANNI D'ETÀ	ANNO 1904			ANNO 1903			ANNO 1902		
	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.
Sotto 15 anni . . . . .	12	11	1	10	7	3	10	10	..
15-19 " . . . . .	150	110	40	128	84	44	167	116	51
20-39 " . . . . .	877	668	209	706	545	161	760	585	175
40-59 " . . . . .	700	572	128	683	561	122	687	551	136
60-79 " . . . . .	380	318	62	358	311	47	359	293	66
80 e più . . . . .	28	20	8	25	18	7	14	14	..
Età ignota . . . . .	9	6	3	12	11	1	13	11	2
TOTALE . . . . .	2 156	1 705	451	1 922	1 537	385	2 010	1 580	430

**B) Cifre proporzionali.**

ANNI D'ETÀ	A 100 morti per suicidio						A un milione di viventi coetanei (a)					
	1904		1903		1902		1904		1903		1902	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Sotto 15 anni . . . . .	1	..	..	1	1	..	6	1	4	2	6	..
15-19 " . . . . .	6	9	6	11	7	12	75	27	57	30	79	34
20-39 " . . . . .	39	47	36	42	37	41	153	46	125	35	134	38
40-59 " . . . . .	34	28	37	32	35	32	183	40	179	38	176	42
60-79 " . . . . .	19	14	20	12	19	15	218	41	214	31	201	44
80 e più " . . . . .	1	2	1	2	1	..	202	77	182	67	142	..
TOTALE . . . . .	100	100	100	100	100	100	139	36	126	31	129	34

(a) Secondo i risultati del Censimento al 10 febbraio 1901.



*Mezzi o modi di suicidio.* — Rispetto ai mezzi o modi adoperati nel consumarli, la nostra statistica distingue i suicidii in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1902, 1903 e 1904.

**Suicidii negli anni 1902-1904, classificati secondo i mezzi o modi adoperati.**

**A) Cifre effettive.**

PROSPETTO N. 26.

MEZZI O MODI del suicidio	ANNO 1904			ANNO 1903			ANNO 1902		
	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.
Per annegamento . . . . .	433	281	152	387	258	129	397	258	139
Con armi da fuoco . . . . .	522	501	21	460	448	12	493	460	33
Con armi da taglio . . . . .	68	59	9	66	57	9	71	60	11
Per impiccamento . . . . .	388	320	68	386	316	70	407	337	70
Per precipitazione . . . . .	213	147	66	171	122	49	170	125	45
Per schiacciamento . . . . .	61	56	5	52	46	6	55	45	10
Per avvelenamento . . . . .	188	112	76	138	77	61	145	90	55
Per asfissia . . . . .	98	69	29	95	68	27	90	58	32
Per altri mezzi o per mezzo ignoto . . . . .	185	160	25	167	145	22	182	147	35
TOTALE . . . . .	(a) 2 156	1 705	451	(b) 1 922	1 537	385	(c) 2 010	1 580	430

**B) Cifre proporzionali a 100 del totale.**

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	ANNO 1904		ANNO 1903		ANNO 1902	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Per annegamento . . . . .	16.48	33.70	16.79	33.51	16.33	32.32
Con armi da fuoco . . . . .	29.38	4.66	29.15	3.12	29.11	7.67
Con armi da taglio . . . . .	3.46	2.00	3.71	2.34	3.80	2.56
Per impiccamento . . . . .	18.77	15.08	20.56	18.18	21.33	16.28
Per precipitazione . . . . .	8.62	14.63	7.94	12.73	7.91	10.47
Per schiacciamento . . . . .	3.28	1.11	2.99	1.56	2.85	2.33
Per avvelenamento . . . . .	6.57	16.85	5.01	15.84	5.69	12.79
Per asfissia . . . . .	4.05	6.43	4.42	7.01	3.67	7.44
Per altri mezzi o per mezzo ignoto.	9.39	5.54	9.43	5.71	9.31	8.14
TOTALE . . . . .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Fra i suicidii dell'anno 1904 ve ne sono compresi 39 (maschi 21 e femmine 18) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 1 maschio ed 1 femmina per frenosi alcoolica, 5 maschi e 5 femmine per frenosi pellagrosa e 2 maschi e 5 femmine per neurastenia.

(b) Fra i suicidii dell'anno 1903 ve ne sono compresi 30 (maschi 20 e femmine 10) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi per frenosi alcoolica e 4 maschi e 7 femmine per frenosi pellagrosa.

(c) Sono compresi 29 suicidi (maschi 20 e femmine 9) compiuti in stato di delirio per psicopatia.

*Mesi in cui avvennero i suicidii.* — In relazione alle stagioni ed ai mesi nei quali accaddero, i suicidii distribuivansi, in cifre effettive ed in cifre proporzionali a 12,000, secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza si nota nei mesi da aprile a luglio, la minore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

**Suicidii negli anni 1902-1904, divisi per mesi e per stagioni.**

PROSPETTO N. 27.

MESI E STAGIONI	CIFRE EFFETTIVE			PROPORZIONI SU 12,000 (a)		
	1904	1903	1902	1904	1903	1902
Marzo . . . . .	170	178	152	933	1 089	889
Aprile . . . . .	209	219	176	1 182	1 387	1 065
Maggio . . . . .	261	165	218	1 431	1 013	1 276
<i>Primavera</i> . . . . .	640	562	546	3 546	3 489	3 230
Giugno . . . . .	227	166	233	1 284	1 051	1 409
Luglio . . . . .	216	212	226	1 182	1 298	1 325
Agosto . . . . .	167	196	190	916	1 203	1 113
<i>Estate</i> . . . . .	610	574	649	3 382	3 552	3 847
Settembre . . . . .	156	149	140	882	943	847
Ottobre . . . . .	139	129	133	763	792	780
Novembre . . . . .	148	125	110	837	792	665
<i>Autunno</i> . . . . .	443	403	383	2 482	2 527	2 292
Dicembre . . . . .	141	120	127	769	735	744
Gennaio . . . . .	163	136	144	894	836	841
Febbraio . . . . .	159	127	161	927	861	1 046
<i>Inverno</i> . . . . .	463	383	432	2 590	2 432	2 631
ANNO . . . . .	<b>2 156</b>	<b>1 922</b>	<b>2 010</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

(a) Furono fatti i calcoli necessari per ridurre i singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero di giorni, cioè a trenta.

**Professioni.** — La professione, e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidii. Nella tavola XIII, a pagina 73, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1904. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi uccisisi d'età superiore a 15 anni compiuti, classificati secondo la professione esercitata, tanto in cifre effettive quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 1901.

**Maschi suicidi in età superiore ai 15 anni negli anni 1897-1903 e nell'anno 1904  
classificati per professioni.**

PROSPETTO N. 28.

PROFESSIONI	MASCHI di oltre 15 anni secondo il censimento del 10 febbraio 1901	SUICIDI		
		Cifre effettive		Proporzioni a 100,000 della stessa professione — Periodo 1897-1904
		1904	1897-1903	
Agricoltori, silvicoltori, pastori, braccianti . . . . .	5 706 152	452	3 185	8
Marinai, pescatori, barcaioli . . . . .	109 872	13	66	9
Facchini, acquaiuoli, lavandai . . . . .	72 631	21	119	24
Filatori e tessitori . . . . .	66 575	10	73	16
Muratori e imbianchini . . . . .	325 259	61	230	11
Barbieri . . . . .	48 513	17	106	32
Tipografi, litografi, legatori di libri . . . . .	30 985	14	63	31
Caffettieri, liquoristi, osti, trattori, vinai . . . . .	58 275	25	190	46
Guardie campestri, di città, doganali, carcerarie, glaziarie, forestali . . . . .	72 213	23	234	44
Ufficiali e truppa di terra e di mare e pensionati militari . . . . .	210 000	77	535	36
Professori e maestri . . . . .	39 557	16	66	26
Capitalisti e benestanti . . . . .	234 456	86	767	45
Medici, dentisti, veterinari . . . . .	25 401	9	74	41
Sacerdoti e monaci . . . . .	77 139	7	30	6
Di qualsiasi professione . . . . .	10 482 781	1 694	11 006	15

## APPENDICE.

### ELENCO NOSOLOGICO ADOTTATO PER LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE.

1. Asfissia e apoplezia nel parto.
2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità.
3. Cianosi, vizi congeniti di cuore.
4. Atresia (delle narici, dell' esofago, dell'ano, ecc.).
5. Labbro leporino complicato (gola lupina).
6. Atrofia congenita, atelectasia polmonare.
7. Vaiuolo e vaiuoloide.
8. Morbillo (rosolia).
9. Scarlattina.
10. Risipola.
11. Febbre tifoide, pneumo-tifo, meningo-tifo, paratifo, febbre miliare.
12. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
13. Meningite cerebro-spinale epidemica.
14. Differite.
15. Laringite crupale.
16. Ipertosse (tosse convulsiva).
17. Grippe o influenza.
18. Febbri da malaria.
19. Cachessia palustre.
20. Dissenteria cruenta ed epidemica.
21. Colèra asiatico.
22. Sifilide.
23. Setticiemia, pioemia, cangrena nosocomiale.
24. Pustola maligna, carbonchio.
25. Moccio (farcino, cimurro).
26. Lebbra (elefantiasi dei greci).
27. Rabbia (idrofobia).
28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate.
29. Tubercolosi disseminata.
30. Meningite tubercolare basilare, idrocefalo acquisito.
31. Tubercolosi polmonare, polmonite caseosa.
32. Tabe mesenterica.
33. Scrofolo disseminata.
34. Lupo.
35. Artrite fungosa, sinovite fungosa.
36. Tubercolosi delle ossa.
37. Male vertebrale di Pott.
38. Rachitide.
39. Anemia, clorosi.
40. Leucemia, anemia pernicioza progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin.
41. Porpora emorragica, morbo di Werloff.
42. Emofilia, morbo di Barlow.
43. Scorbuto.
44. Marasmo senile.
45. Pellagra.
46. Gotta.
47. Diabete zuccherino ed insipido.
48. } disseminati in più organi.
49. } dell'utero, vagina, ovaia.
50. } delle mammelle.
51. } della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli.
52. } della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.
53. } dello stomaco, esofago.
54. } del fegato.
55. } della milza, del pancreas, intestino, peritoneo.
56. } delle ossa, delle articolazioni.
57. } dei centri nervosi e degli organi dei sensi.
58. } d'altri organi.
59. Meningite semplice cerebrale e spinale.
60. Mielite, tabe dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séquard, di Morvan.
61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante.
62. Paralisi infantile.
63. Encefalite.
64. Apoplezia e congestione cerebrale.
65. Tumori cerebrali e spinali (1).
66. Rammollimento cerebrale.
67. Paralisi progressiva, demenza paralitica.
68. Epilessia, morbo di Jackson.
69. Convulsioni, isterismo.
70. Corea.
71. Tetano traumatico e reumatico.
72. Eclampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi.
73. Successioni della pazzia, mania, neurastenia (2).
74. Malattie degli organi della vista (1).
75. Id. degli orecchi, otite, morbo del Ménière (1).

(1) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(2) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, nei quali non fu specificata la causa diretta della morte.

76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (1).
77. Bronchite acuta.
78. Id. cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, pitorace, pneumotorace, accessi del mediastino, ecc.) (1).
80. Congestione polmonare ed apoplezia polmonare.
81. Polmonite crupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, gangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixedema) (1).
85. Morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.
87. Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, aterosmasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite).
88. Id. delle vene (flebite, varici, trombosi, emorroidi).
89. Id. dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).
90. Id. del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, rottura, ecc.).
91. Id. del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, cancro acquatico, morbo di Riga, glossite, ulcerazione al frenulo (1).
95. Orecchioni
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (accessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (1).
97. Id. dello stomaco, gastrite, atresia, morbo di Ludwig (1).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atrofia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Itterizia, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (1).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tifiite, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, dentizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali e addominali (1).
107. Ernie intestinali e addominali.
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Peritonite, appendicite.
111. Idrope-ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (1).
113. Id. della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (1).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (1).
116. Id. delle capsule soprarrenali.
117. Id. dei testicoli (tumori, ecc.) (1).
118. Id. dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (1).
119. Id. dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematoccele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (1).
120. Id. delle mammelle (ascesso, tumori) (1).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metroperitonite puerperale.
126. Sincope nel parto.
127. Flemmone, ascesso (1).
128. Gangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta lattea, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema, edema dei neonati, litopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (1).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psoite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcoolismo cronico.
139. Avvelenamenti cronici, accidentali e professionali.

(1) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

140. in istato di ubbriachezza.  
141. per annegamento.  
142. per freddo.  
143. per insolazione.  
144. per fulminazione e scossa elettrica.  
145. per caduta.  
146. per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine.  
147. per ferite da taglio.  
148. per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.  
149. per schiacciamento da caduta d'alberi o d'altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere; sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari.  
150. per violenze d'animali.  
151. per ustione.  
152. per soffocamento.  
153. per asfissia.  
154. per avvelenamenti acuti.  
155. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.  
156. per cause non determinate.

Morte accidentale

157. per annegamento.  
158. con armi da fuoco.  
159. con armi da taglio.  
160. per impiccamento.  
161. per precipitazione.  
162. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.  
163. per avvelenamento.  
164. per asfissia.  
165. per altri mezzi e per mezzi non determinati.  
166. Omicidio.  
167. Condanna all'estremo supplizio.  
168. Duello.  
169. Conflitto colla forza pubblica.  
170. Morti per causa ignota o non dichiarata.

Suicidio

## TAVOLE.

TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun compart

Anno 1904.

Table with columns for CAUSE DI MORTE and provinces: PIEMONTE (ALESSANDRIA, CUNEO, NOVARA, TORINO), LIGURIA (GENOVA, PORTO MAURIZIO), LOMBARDIA (BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, MANTOVA, MILANO, PAVIA, SONDRIO).

(a) Nell'anno 1904 non si verificarono nel Regno casi di morte per «colera asiatico» (n. 21 dell'Elenco nosologico).

mento e nel Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1904.

Table with columns for provinces: VENETO (BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, UDINE, VENEZIA, VERONA, VICENZA) and EMILIA (BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ, MODENA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, REGGIO EMILIA).















Segue TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1904.

Anno 1904.

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces of Piedmont (PIEMONTE), Liguria (LIGURIA), and Lombardy (LOMBARDIA). Rows list various medical conditions like eye diseases, lung diseases, heart diseases, etc.

Table with columns for provinces of Veneto (VENETO) and Emilia (EMILIA). Rows continue the list of medical conditions from the previous table, showing mortality counts for each province.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari. (b) Esclusa la sincope da parto.



segue TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun comparti

Anno 1904.

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA E CARRARA, PISA, SIENA, ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO E URBIKO, PERUGIA, ROMA). Rows list various medical conditions like Malattie degli occhi, Bronchite acuta, Polmonite crupale, etc.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari. (b) Esclusa la sincope da parto.

mento e nel Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1904.

Table with columns for regions (ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE, BASILICATA, CALABRIE) and provinces (AQUILA DEGLI ABRUZZI, CAMPOBASSO, CHIETI, TERAMO, AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO, BARI DELLE PUGLIE, FOGGIA, LECCE, POTENZA, CATANZARO, Cosenza, REGGIO DI CALABRIA). Rows list various medical conditions, continuing from the previous table.







Segue TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun comparti

Anno 1904.

No. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TOSCANA							MARCHE				UMBRIA	LAZIO	
		AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA
107	Ernie intestinali e addominali. . . . .	6	32	3	7	9	5	7	14	7	5	6	9	19	45
108	Malattie da echinococco. . . . .	1	..	3	..	..	..	4	4	1	..	..	3	2	6
109	Ascariidi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali. . . . .	12	14	3	..	6	2	3	4	12	10	10	11	39	32
110	Peritonite. . . . .	44	146	31	15	51	27	34	36	48	24	37	48	111	192
111	Idrope-ascite. . . . .	..	12	3	..	3	1	3	3	1	4	3	4	6	12
112	Malattie dei reni (a). . . . .	104	349	47	54	146	63	83	85	132	113	114	88	252	646
113	Id. della vescica (a). . . . .	14	74	3	15	26	8	30	12	26	13	10	11	63	74
114	Calcoli renali e vescicali. . . . .	2	2	..	..	..	1	3	1	3	1	1	..	..	6
115	Malattie dell'uretra e prostata (a). . . . .	2	24	3	..	3	4	6	7	3	4	3	..	13	37
116	Id. delle capsule surrenali. . . . .	..	3	..	..	2	1	5	..	1	1	2	2	2	2
117	Id. dei testicoli (a). . . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
118	Id. dell'ovaia (a). . . . .	1	2	1	2	..	..	2	1	4	..	..	2	1	18
119	Id. dell'utero e vagina (a). . . . .	3	11	1	..	2	4	1	..	..	..	2	1	5	7
120	Id. delle mammelle (a). . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
121	Metrorragia dopo il parto. . . . .	4	15	4	..	2	11	5	5	2	12	7	8	14	22
122	Distocia. . . . .	1	6	1	1	2	2	1	1	..	3	..	..	3	6
123	Eclampsia puerperale. . . . .	6	8	1	..	4	4	1	5	3	1	1	2	7	20
124	Febbre puerperale. . . . .	11	17	2	4	9	18	4	15	10	6	6	9	21	40
125	Pelvi e metropertinite puerperale. . . . .	1	6	..	..	..	2	1	2	1	1	1	2	4	9
126	Stincope da parto e altre malattie puerperali. . . . .	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	..	10
127	Flemmone, ascesso (a). . . . .	17	50	6	10	11	10	10	18	23	19	11	18	49	77
128	Gangrena della pelle. . . . .	5	38	..	..	4	1	3	2	6	5	3	2	9	17
129	Elefantiasi degli arabi. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
130	Favo, foruncoli. . . . .	2	4	1	..	..	1	..	1	1	1	..	..	2	18
131	Pemfigo, eczema, ectima. . . . .	4	8	2	3	6	2	6	6	5	5	2	3	22	36
132	Sclerema. . . . .	3	30	2	7	8	3	7	7	15	7	20	18	36	71
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a). . . . .	10	27	3	5	21	16	12	9	9	3	5	10	22	39
134	Reumatismo articolare acuto. . . . .	12	30	2	3	6	9	14	7	4	7	10	8	21	28
135	Id. cronico. . . . .	3	13	2	2	9	5	4	3	6	11	4	2	9	50
136	Psotte. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
137	Atrofia muscolare progressiva. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
138	Alcolismo cronico. . . . .	3	4	..	3	6	..	2	4	6	7	11	13	12	20
139	Avvelenamenti cronici accidentali e professionali. . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

mento e nel Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1904

AQUILA DEGLI ABRUZZI	ABRUZZI E MOLISE				CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CALABRIE		
	CAMPORASSO	CHIETI	TERAMO		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LIFORCE	POTENZA	CATANZARO	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA
20	13	13	5	15	7	26	92	17	53	28	37	19	20	21	17	
4	..	1	..	..	..	3	4	..	5	1	1	..	..	..	..	
13	18	6	5	32	12	20	3	9	36	14	58	10	17	16	11	
61	51	36	36	45	23	78	160	74	123	35	85	57	66	43	48	
19	23	11	9	13	12	20	29	16	29	17	24	13	28	17	18	
217	193	145	112	172	112	360	803	186	494	227	345	202	252	186	206	
22	24	15	21	23	15	66	121	50	50	19	37	28	37	26	25	
..	1	3	1	..	..	2	6	..	1	..	1	3	2	..	6	
6	2	1	4	3	1	3	35	4	6	4	3	5	1	2	4	
3	3	..	..	1	..	2	5	..	4	1	2	1	2	1	1	
..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	
1	..	2	1	3	..	3	10	10	4	2	..	..	6	..	4	
3	5	2	4	5	4	10	17	11	10	9	10	13	14	7	11	
..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	1	..	..	..	..	
19	16	13	10	15	7	20	36	15	17	14	25	13	17	19	10	
3	3	5	1	2	1	5	6	3	2	6	3	7	6	3	5	
3	5	6	..	1	5	7	13	1	4	8	3	2	5	5	4	
14	26	14	9	16	6	25	18	19	17	24	26	18	27	18	27	
3	1	5	3	2	4	13	18	4	2	7	7	6	4	3	13	
..	2	2	4	1	2	5	9	5	4	..	8	6	3	3	5	
18	21	29	12	21	21	52	91	39	50	27	52	32	20	34	32	
2	3	1	2	7	4	12	53	10	5	15	2	9	..	5	6	
..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	
..	..	..	1	..	1	2	12	2	5	5	1	7	..	2	1	
5	7	6	13	8	7	7	27	11	15	7	10	19	7	10	2	
7	26	13	6	8	2	10	114	41	172	32	80	51	53	12	43	
7	8	11	9	5	7	20	49	11	26	11	16	8	10	11	22	
23	12	13	7	21	10	26	21	25	24	17	19	16	23	18	7	
17	33	14	6	14	7	17	23	28	10	16	24	31	17	26	15	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	..	
..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	1	..	..	1	
6	4	7	..	3	..	4	8	2	2	2	3	2	3	4	2	
..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	..	..	1	1	

7 — St. cause di morte.

Segue TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun comparti

Anno 1904.

N.º dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	SICILIA							SARDEGNA		PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA
		CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI			
107	Ernie intestinali e addominali. . . . .	21	38	22	34	28	24	10	41	16	173	51	111
108	Malattie da echinococco. . . . .	1	3	5	..	6	2	2	2	3	4	..	1
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali. . . . .	18	45	5	9	5	85	2	25	21	52	14	176
110	Peritonite. . . . .	48	90	63	69	117	49	54	59	43	466	157	835
111	Idrope-ascite. . . . .	17	58	24	25	23	40	9	32	19	72	13	72
112	Malattie dei reni (a). . . . .	153	390	167	244	326	185	150	173	109	1 196	325	1 615
113	Id. della vescica (a). . . . .	13	61	28	45	58	30	28	18	14	225	70	295
114	Calcoli renali e vescicali. . . . .	2	11	6	9	4	5	3	4	11	12	6	13
115	Malattie dell'uretra e prostata (a). . . . .	1	12	7	7	7	5	4	11	7	63	36	72
116	Id. delle capsule surrenali. . . . .	2	2	2	3	3	..	..	3	1	13	3	21
117	Id. dei testicoli (a). . . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2
118	Id. dell'ovaia (a). . . . .	1	3	3	1	4	4	2	5	1	19	9	28
119	Id. dell'utero e vagina (a). . . . .	5	11	13	12	4	8	3	11	4	35	11	42
120	Id. delle mammelle (a). . . . .	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
121	Metrorragia dopo il parto. . . . .	8	21	12	8	20	10	6	26	22	84	17	89
122	Distocia. . . . .	1	1	2	2	1	1	1	10	2	14	2	15
123	Eclampsia puerperale. . . . .	3	2	1	1	4	4	..	7	3	45	8	73
124	Febbre puerperale. . . . .	11	10	7	19	26	30	6	16	15	107	31	156
125	Pelvi e metropertoneite puerperale. . . . .	1	7	3	5	2	3	2	7	6	37	9	80
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali. . . . .	1	6	3	3	3	2	6	9	5	14	5	37
127	Flemmone, ascesso (a). . . . .	21	44	27	38	65	17	17	32	17	99	62	268
128	Gangrena della pelle. . . . .	10	11	5	11	22	15	5	9	4	36	7	103
129	Elefantiasi degli arabi. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3
130	Favo, foruncoli. . . . .	3	2	2	2	..	2	..	7	9	7	1	20
131	Pemfigo, eczema, ectima. . . . .	8	4	9	3	8	4	6	7	8	59	34	87
132	Sclerema. . . . .	4	6	1	5	2	15	5	3	1	97	15	539
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a). . . . .	10	18	16	8	21	11	10	16	13	100	68	280
134	Reumatismo articolare acuto. . . . .	10	23	13	9	13	25	2	26	12	104	25	107
135	Id. cronico. . . . .	6	31	12	10	13	6	2	18	24	101	21	78
136	Psorite. . . . .	..	..	..	..	1	1	..	..	..	3	..	1
137	Atrofia muscolare progressiva. . . . .	..	..	..	1	..	1	..	1	..	5	..	2
138	Alcolismo cronico. . . . .	2	1	2	1	1	4	1	21	8	67	37	102
139	Avvelenamenti cronici accidentali e professionali. . . . .	1	3	..	..	..	..	..	1	3	12	10	15

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

mento e nel Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1904.

COMPARTIMENTI															REGNO		
VENETO	EMILIA	TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti		
79	75	88	27	19	45	51	157	118	19	58	177	57	881	469	1 300		
6	7	12	4	2	6	5	7	7	..	..	19	5	50	35	85		
142	171	44	48	39	32	42	76	108	10	44	164	46	603	600	1 203		
505	473	384	157	111	192	184	380	243	57	157	490	102	2 193	2 700	4 893		
32	31	25	12	6	12	62	90	70	13	63	196	51	351	469	820		
859	736	931	447	252	646	667	1 653	1 066	202	644	1 615	282	6 503	6 633	13 136		
210	150	182	60	63	74	82	275	106	28	88	263	32	1 952	251	2 203		
6	10	9	5	..	6	5	8	2	3	8	40	15	125	23	148		
49	59	49	10	13	37	13	46	13	5	7	43	18	528	8	536		
5	11	11	6	2	2	6	8	7	1	4	12	4	59	57	116		
..	..	1	..	..	..	..	3	..	..	..	..	2	8	..	8		
14	9	9	6	1	18	4	26	6	..	10	18	6	..	183	183		
22	22	22	3	5	7	14	47	29	13	32	56	15	..	375	375		
..	2	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	..	..	8	8		
76	73	46	29	14	22	58	93	56	13	46	85	48	..	849	849		
6	8	15	3	3	6	12	17	11	7	14	9	12	..	154	154		
36	38	29	7	7	20	14	27	15	2	14	15	10	..	360	360		
93	99	80	31	21	40	63	84	67	18	79	99	31	..	1 082	1 082		
33	20	12	5	4	9	12	41	16	6	20	23	13	..	340	340		
14	12	2	5	..	10	8	22	12	6	11	24	14	..	196	196		
118	112	132	71	49	77	80	224	129	32	86	229	49	1 065	752	1 817		
28	18	53	16	9	17	8	86	22	9	11	79	13	279	236	515		
..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	5	3	8		
11	7	9	2	2	18	1	17	11	7	3	11	16	95	48	143		
45	46	37	15	22	36	31	60	32	19	19	42	15	312	287	599		
241	369	67	60	36	71	52	175	284	51	108	38	4	1 223	984	2 207		
100	104	103	27	22	39	35	92	53	8	43	94	39	596	601	1 197		
76	65	83	29	21	28	55	103	60	16	48	95	38	451	502	953		
59	50	41	23	9	50	70	89	50	31	58	80	42	311	541	852		
..	1	..	..	..	2	..	..	1	1	3	2	..	4	10	14		
..	1	..	..	..	1	..	2	1	1	1	2	1	9	8	17		
99	20	22	37	12	20	17	17	7	2	9	12	29	452	57	509		
2	4	1	..	..	2	..	3	1	..	2	4	4	46	14	60		



Segue TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1904.

Anno 1904.

No. dell'elenco nosologico (α)	CAUSE DI MORTE	TOSCANA							MARCHE				UMBRIA	LAZIO	
		AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO	LUCCA	MASA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA
140	in stato d'ubriachezza . . . . .							1		1				1	
141	per annegamento. . . . .	18	28	6	3	18	9	19	11	33	21	19	16	37	43
142	per freddo . . . . .		1		1						3			1	1
143	per insolazione. . . . .		2		3	2		2		1	3	3		1	2
144	per fulminazione. . . . .	4	9	1		3	1	2	4		1	1	4	11	17
145	per caduta . . . . .	26	78	15	17	37	30	23	19	25	28	20	26	57	137
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine . . . . .	5	8	2	1	3	3	6	2	2	2	2	1	4	11
147	per ferite da taglio . . . . .		1			1		2		2				4	3
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali. . . . .													1	2
149	per schiacciamento. . . . .	5	11	2		10	8	8		4	1	3	4	8	52
150	per violenze d'animali. . . . .					1			1		1				3
151	per ustione. . . . .	15	34	11	4	22	16	20	23	17	16	25	26	73	123
152	per soffocamento. . . . .	4	5			3	1	1	2		3	4	2	6	5
153	per asfissia. . . . .		2	2	1	5	1		1	1		1	1	6	4
154	per avvelenamenti acuti. . . . .	1	4	1	2	1	4	4	3	2	1	1		3	10
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi. . . . .			2											1
156	per cause non determinate. . . . .	21	20	8	4	14	9	7	5	19	13	14	25	36	31
157	per annegamento. . . . .	1	6	1	4	1	1	2	8	6	1	3	3	10	21
158	con armi da fuoco. . . . .	5	23	9	3	2	1	10	4	12	2	2	3	9	39
159	id. da taglio. . . . .		3	1		1		1		3	2	1	1		3
160	per impiccamento. . . . .	3	25	4	6	4	3		14	5	2	4	7	5	13
161	per precipitazione. . . . .	1	12	1	4	1	2	2	1	1	3	1	1	4	32
162	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .											1	1		
163	per avvelenamento. . . . .	1	10	2				6		2	1			3	17
164	per asfissia. . . . .		2	1	2	1	1	2		1			1	2	4
165	per altri mezzi o per mezzi non determinati. . . . .	1	3	1	3	1	2	1		1	3	5		8	3
166	Omicidi, infanticidi. . . . .	9	31	1	3	10	8	2	2	9	5	4	8	19	71
169	In conflitto con la forza pubblica. . . . .														
	Totale dei morti per causa determinata	5 916	18 252	2 562	2 464	6 005	4 140	5 698	4 756	6 533	4 810	5 263	5 747	13 414	24 143
170	Morti per causa ignota . . . . .	16	90	18	19	10	15	7	17	12	71	67	53	40	223
	TOTALE GENERALE . . . . .	5 932	18 342	2 580	2 483	6 015	4 155	5 705	4 773	6 545	4 881	5 330	5 800	13 454	24 366

No. dell'elenco nosologico (α)	ABRUZZI E MOLISE				CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CALABRIE		
	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAFOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	CATANZARO	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA
1									1							
8	11	15	10	15	9	34	23	20	29	12	23	13	9	15	12	141
1	3	2				2	1	1		2	1	4	1	5	1	142
	2		2	1	1	1		2		2	2	1		2		143
11	13	4		7	3	9	1	7	9	7	8	24	12	2	2	144
32	29	23	16	27	19	75	167	66	53	33	35	69	35	39	36	145
1	2	2	1	2	1	2	8	5	8	7	7	4	8	3	3	146
1	1	1	1	1					1				3	1		147
																148
4	2	4	1	6	5	8	26	9	12	9	5	5	10	1	7	149
2	1				1	1	1		1	2	1	1	1	1		150
33	48	52	27	69	34	115	109	72	59	51	52	60	62	62	53	151
3	3	3	2	1	1	3	5	5	2	4	2			1		152
3	3			4	9	5	7	4	1	10	6	1		4	3	153
2				2	1	1	7	4		5	6		8	1	2	154
		1				1						1	2	1		155
30	16	14	9	25	9	37	50	40	50	18	50	21	26	17	13	156
2	3	7	1	5	3	6	2	1	12	4	9	5				157
2	3	1	1	4	2	11	15	3	8	1	5	6	4	3	2	158
				1		2	1				1	1				159
4	2	6	3	2	4		3		2	1		6	2		1	160
		1		1	1	2	13		1		2		1			161
1										1	1					162
		2	1				18		2	2	4		1		2	163
1											1					164
4	3	2	1		1	4	10	4	3	1	1		6	1	2	165
18	22	14	13	12	15	41	121	34	39	32	18	30	47	36	34	166
																169
	8 964	9 005	7 430	5 860	8 586	5 287	15 679	27 934	11 831	21 611	12 797	19 758	12 832	10 489	9 133	8 466
	64	186	195	183	54	78	52	291	143	56	113	146	407	389	379	244
	9 028	9 191	7 625	6 043	8 640	5 365	15 731	28 225	11 974	21 667	12 910	19 904	13 239	10 878	9 512	8 710

(a) Nell'anno 1904 non si verificarono nel Regno casi di morte per « condanna all'estremo supplizio » (167 dell'Elenco nosologico) e per « ferite riportate in duello » (168).

Segue TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, in ciascun comparti

Anno 1904.

N. dell'elenco nosologico (α)	CAUSE DI MORTE	SICILIA						SARDEGNA		PIEMONTE			LIGURIA	LOMBARDIA
		CALTANISSETTA	CATANIA	GIRONETTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	PIEMONTE	LIGURIA		
140	In stato d'ubbrachezza . . . . .	..	..	..	1	..	1	..	..	..	4	1	..	
141	per annegamento. . . . .	7	24	8	19	21	20	14	38	16	219	57	386	
142	per freddo . . . . .	..	..	..	..	..	2	..	8	2	17	3	9	
143	per insolazione. . . . .	6	..	2	..	1	..	..	4	..	6	5	7	
144	per fulminazione. . . . .	13	9	4	5	7	8	2	3	13	9	5	22	
145	per caduta . . . . .	16	37	12	50	41	15	28	29	19	422	154	454	
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine . . . . .	5	10	6	5	12	..	3	1	2	16	9	23	
147	per ferite da taglio. . . . .	..	..	..	..	4	..	1	..	1	1	1	1	
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	4	
149	per schiacciamento. . . . .	11	18	6	2	9	4	3	9	2	144	26	86	
150	per violenze d'animali. . . . .	1	3	..	..	3	..	..	1	..	1	..	6	
151	per ustione. . . . .	25	50	28	42	48	24	15	44	21	222	76	265	
152	per soffocamento. . . . .	..	4	2	6	5	1	..	2	3	28	4	61	
153	per asfissia. . . . .	7	7	4	4	3	2	4	8	1	14	13	31	
154	per avvelenamenti acuti. . . . .	6	12	4	14	6	1	1	4	3	21	8	25	
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi. . . . .	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	
156	per cause non determinate. . . . .	32	21	15	18	27	24	11	20	8	117	60	176	
157	per annegamento. . . . .	1	14	..	2	..	3	1	9	4	50	12	69	
158	con armi da fuoco. . . . .	6	16	14	7	12	4	2	1	3	71	32	73	
159	id. da taglio. . . . .	1	..	1	..	..	..	..	1	1	10	1	12	
160	per impiccamento. . . . .	4	7	2	8	7	..	1	7	4	60	11	55	
161	per precipitazione. . . . .	..	4	..	1	2	..	1	6	..	32	16	33	
162	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc. . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	5	20	
163	per avvelenamento. . . . .	4	7	3	3	4	4	2	2	2	16	9	36	
164	per asfissia. . . . .	..	..	1	..	..	1	1	..	..	15	24	18	
165	per altri mezzi o per mezzi non determinati. . . . .	1	1	1	2	6	..	1	2	..	30	6	23	
166	Omicidi, infanticidi. . . . .	44	63	45	15	67	16	42	21	19	98	32	69	
169	In conflitto con la forza pubblica. . . . .	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	
	Totale dei morti per causa determinata	8 845	17 737	9 372	10 803	15 814	10 494	6 355	10 335	6 341	62 002	20 626	96 975	
170	Morti per causa ignota. . . . .	9	257	25	138	117	239	18	686	438	1 196	121	212	
	TOTALE GENERALE . . . . .	8 854	17 994	9 397	10 941	15 931	10 733	6 373	11 021	6 779	63 198	20 747	97 185	

(a) Nell'anno 1901 non si verificarono nel Regno casi di morte per « condanna all'estremo supplicio » (167 dell'Elenco nosologico) e per « ferite riportate in duello » (168).

mento e nel Regno, classificati secondo 169 cause di morte.

Anno 1904.

N. dell'elenco nosologico (α)	COMPARTIMENTI															REGNO		N. dell'elenco nosologico (α)
	VENETO	EMILIA	TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE del morti		
140	10	5	1	1	1	..	1	2	..	1	2	..	36	2	38	140		
141	329	187	112	89	37	43	44	101	64	13	36	113	54	1 373	511	1 884	141	
142	6	4	2	3	1	1	6	4	3	4	7	2	10	65	17	82	142	
143	7	3	9	7	1	2	4	5	4	1	2	9	4	56	20	76	143	
144	13	21	24	6	11	17	28	27	24	24	16	48	16	218	93	311	144	
145	237	196	245	99	57	137	100	354	126	69	110	194	48	2 204	798	3 002	145	
146	23	17	30	7	4	11	6	18	22	4	14	41	3	214	34	248	146	
147	2	3	4	2	4	3	4	1	1	..	4	5	1	35	2	37	147	
148	2	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	12	..	12	148	
149	36	34	44	12	8	52	11	54	26	5	18	48	11	542	73	615	149	
150	4	3	2	2	..	3	3	3	4	1	2	7	1	38	4	42	150	
151	166	148	145	84	73	123	160	399	162	60	177	332	65	1 076	1 481	2 557	151	
152	40	31	16	9	6	5	11	15	8	..	1	18	5	168	90	258	152	
153	11	26	12	3	6	4	6	20	17	1	7	31	9	155	65	220	153	
154	31	9	20	4	3	10	2	15	11	..	11	44	7	136	85	221	154	
155	1	1	2	..	..	1	1	1	..	1	3	2	..	8	8	16	155	
156	130	117	88	69	36	31	69	161	118	21	56	148	28	1 144	281	1 425	156	
157	72	68	24	13	10	21	13	17	25	5	..	21	13	281	152	433	157	
158	38	48	57	19	9	39	7	35	14	6	9	61	4	501	21	522	158	
159	14	5	6	7	..	3	..	4	1	1	..	2	2	59	9	68	159	
160	42	49	59	18	5	13	15	9	3	6	3	29	11	320	68	388	160	
161	13	18	24	6	4	32	1	16	3	..	1	8	6	147	66	213	161	
162	7	10	..	2	..	..	1	..	2	1	..	..	..	56	5	61	162	
163	14	7	19	3	3	17	3	19	8	..	3	27	4	112	76	188	163	
164	7	14	9	2	2	4	1	..	1	..	..	3	..	69	29	98	164	
165	17	20	12	9	8	3	10	19	5	..	9	12	2	160	95	185	165	
166	27	42	66	26	19	71	67	223	89	30	117	292	40	1 131	177	1 308	166	
169	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	169	
	61 145	48 643	49 793	22 353	13 414	24 143	31 259	69 317	54 166	12 832	28 088	79 420	16 676	350 002	340 848	690 850		
170	372	288	192	208	40	223	628	618	315	407	1 012	803	1 124	3 813	3 941	7 754	170	
	61 517	48 931	49 985	22 556	13 454	24 366	31 887	69 935	54 481	13 239	29 100	80 223	17 800	353 815	344 789	698 604		

(a) Nell'anno 1901 non si verificarono nel Regno casi di morte per « condanna all'estremo supplicio » (167 dell'Elenco nosologico) e per « ferite riportate in duello » (168).

**TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1904, classificati per sesso e per principali cause di morte.**

*Avvertenza.* — Le 170 voci dell'elenco nosologico che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I sono state qui riassunte in 54, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta o riunendo sotto l'unica e generica voce di « altre malattie » quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

Anno 1904.

Anno 1904.

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . .	291	248	260	243	322	242	344	249	1 217	982	2 196
6	Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare . . . . .	8 049	7 187	5 313	4 499	4 985	4 344	6 375	5 593	24 722	21 623	46 345
39	Anemia . . . . .	1 076	1 251	876	1 074	1 113	1 364	845	1 054	3 910	4 743	8 653
40	Leucemia . . . . .	10	14	40	35	43	34	43	39	136	122	258
44	Marasmo senile . . . . .	5 906	7 209	4 103	5 176	4 243	5 381	5 408	6 516	19 660	24 282	43 942
97	Gastrite . . . . .	888	885	918	866	1 282	1 208	918	853	4 006	3 807	7 813
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	6 582	6 367	11 568	11 223	24 662	24 990	9 679	9 507	52 491	52 087	104 578
20	Dissenteria . . . . .	1	..	..	2	5	2	2	2	8	6	14
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	801	373	776	370	892	443	903	436	3 372	1 622	4 994
112	Malattie dei reni . . . . .	1 833	1 913	1 460	1 445	1 424	1 434	1 786	1 841	6 503	6 633	13 136
110	Peritonite . . . . .	476	674	523	643	658	765	536	618	2 193	2 700	4 893
7	Varicella . . . . .	506	495	372	369	403	301	301	346	1 582	1 511	3 093
8	Morbillo . . . . .	811	791	777	743	625	618	500	467	2 713	2 619	5 332
9	Scarlattina . . . . .	203	179	201	187	214	199	237	191	855	756	1 611
10	Risipola infettiva . . . . .	471	413	298	277	300	257	454	415	1 523	1 362	2 885
11	Febbre tifoide . . . . .	933	1 009	939	973	2 332	2 670	1 621	1 712	5 875	6 364	12 239
12	Tifo esantematico . . . . .	..	..	..	2	2	3	2	..	4	5	9
13	Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	27	33	8	10	..	2	..	..	35	45	80
16	Ipertosse . . . . .	767	886	790	1 061	759	927	322	446	2 638	3 320	5 958
14	Difterite . . . . .	454	436	293	281	298	303	467	456	1 517	1 476	2 993
15	Laringite crupale . . . . .	283	220	153	104	121	99	310	236	867	659	1 526
18	Febbri da malaria . . . . .	384	287	447	307	1 959	1 670	706	597	3 496	2 861	6 357
19	Cachessia palustre . . . . .	307	182	199	126	364	391	360	277	1 130	976	2 106
17	Influenza . . . . .	1 142	1 076	529	398	72	66	254	257	1 997	1 797	3 794
22	Sifilide . . . . .	259	219	248	200	251	214	247	211	1 005	844	1 849
71	Tetano traumatico e reumatico	66	24	115	58	158	87	94	44	433	213	646
24	Pustola maligna, carbonchio . . .	45	17	41	16	87	52	65	32	238	117	355

*Segue* TAV. II. — **Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1904, classificati per sesso e per principali cause di morte.**

Anno 1904.

Anno 1904.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno			
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale	
		27	Rabbia . . . . .	8	2	7	4	9	6	7	2	31	14
124	Febbre puerperale . . . . .	..	332	..	225	..	236	..	289	..	1 082	1 082	
121, 122 123, 125 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . . . .	..	466	..	410	..	460	..	563	..	1 899	1 899	
77	Bronchite acuta . . . . .	10 397	9 589	6 132	5 832	3 860	3 513	5 210	5 139	25 099	24 013	49 112	
78	Id. cronica . . . . .	1 294	1 623	829	934	596	755	1 001	1 257	3 720	4 569	8 289	
81	Polmonite crupale . . . . .	8 106	5 737	5 625	4 089	2 891	2 288	4 960	3 813	21 582	15 927	37 509	
82	Bronco-polmonite acuta . . . . .	6 693	6 098	4 077	3 849	2 134	2 122	3 695	3 513	16 599	15 582	32 181	
79	Malattie della pleura . . . . .	499	348	470	344	419	235	390	291	1 778	1 218	2 996	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	4 517	5 076	4 696	5 415	4 528	5 552	4 293	5 075	18 034	21 118	39 152	
30 32 a 36	Altre forme tubercolari . . . . .	1 709	1 841	2 033	2 210	2 169	2 428	1 547	1 737	7 458	8 216	15 674	
90	Malattie del cuore . . . . .	6 634	9 578	5 370	7 157	5 094	6 414	6 567	8 872	23 665	32 021	55 686	
87	Malattie delle arterie . . . . .	1 356	1 038	1 099	821	1 077	754	1 317	994	4 849	3 607	8 456	
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	5 157	4 546	3 927	3 403	3 752	3 242	4 904	4 060	17 740	15 251	32 991	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	1 941	1 775	2 115	1 829	1 881	1 856	1 405	1 297	7 292	6 757	14 049	
63	Encefalite . . . . .	150	108	139	89	158	135	148	102	595	434	1 029	
72	Eclampsia infantile . . . . .	2 499	2 065	2 133	1 704	1 892	1 641	1 843	1 646	8 367	7 056	15 423	
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	134	141	107	130	89	100	121	131	451	502	953	
45	Pellagra . . . . .	319	228	353	289	357	279	300	238	1 329	1 034	2 363	
47	Diabete . . . . .	226	114	181	109	205	105	166	136	778	464	1 242	
138	Alcolismo cronico . . . . .	120	11	102	12	104	14	126	20	452	57	509	
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	1 952	2 495	2 067	2 619	2 220	2 736	2 032	2 739	8 271	10 589	18 860	
140 a 156	Morti violente	per cause accidentali . . . . .	1 488	914	1 937	805	2 375	854	1 680	991	7 480	3 564	11 044
157 a 165		per suicidio . . . . .	395	97	569	128	410	129	331	97	1 705	451	2 156
166		per omicidio . . . . .	249	29	245	51	323	43	314	54	1 131	177	1 308
169		in conflitto con la forza pubblica . . . . .	..	..	..	..	4	..	..	..	4	..	4
—	Altre malattie . . . . .	7 393	6 032	6 139	4 865	6 715	5 245	7 219	5 572	27 466	21 714	49 180	
170	Cause ignote . . . . .	1 063	1 034	765	710	1 035	1 104	950	1 033	3 813	3 941	7 754	
<b>TOTALE GENERALE</b> . . . . .		<b>96 825</b>	<b>93 655</b>	<b>82 364</b>	<b>78 721</b>	<b>91 321</b>	<b>80 307</b>	<b>83 305</b>	<b>82 106</b>	<b>353 815</b>	<b>344 789</b>	<b>698 604</b>	



TAV. III. — Morti nel Regno classificati (Vedasi l'avvertenza)

Anno 1904.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		non oltre 1 mese		oltre 1 a non oltre 12 mesi (a)		oltre 1 anno a 2 compiuti (b)		oltre 2 anni a 3 compiuti		oltre 3 anni a 4 compiuti		oltre 4 anni a 5 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	922	710	193	190	46	40	19	12	9	9	1	8
6	Immaturità, debolezza congenita, atelecacia polmonare	20 154	16 460	4 568	5 163	..	..	..	..	..	..	..	..
39	Anemia	..	..	1 056	949	1 072	1 163	268	326	81	112	38	60
40	Leucemia	..	..	9	14	21	16	10	8	2	5	4	5
44	Marasmo senile	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
97	Gastrite	982	803	1 380	1 216	482	469	160	217	61	61	43	60
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	3 588	2 972	21 740	19 962	11 609	12 050	3 263	3 009	1 210	1 250	664	789
20	Dissenteria	..	..	8	1	2	..	..	1	1	..	..	..
99	Epatite, cirrosi epatica	38	19	46	39	21	31	11	22	13	6	8	5
112	Malattie dei reni	88	57	313	257	418	472	381	320	247	219	201	166
110	Peritonite	60	40	127	120	94	68	46	57	57	30	34	29
7	Vaiuolo	46	34	405	388	239	210	135	123	79	100	86	92
8	Morbillo	12	15	485	427	973	886	507	475	271	295	167	199
9	Scarlattina	3	5	51	38	116	111	124	85	105	105	120	110
10	Risipola infettiva	339	261	305	328	26	41	11	17	8	7	3	4
11	Febbre tifoide	17	11	216	180	258	221	209	180	201	160	156	177
12	Tifo esantematico	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
13	Meningite cerebro-spinale epidemica	6	..	1	4	1	1	1	..	2	8	2	..
16	Ipertosse	65	74	1 291	1 423	715	1 013	308	386	135	203	50	96
14	Difterite	5	5	107	99	301	234	239	220	216	223	189	206
15	Laringite crupale	8	4	85	58	231	147	147	135	144	107	95	71
18	Febbri da malaria	39	27	465	451	402	364	242	251	160	134	124	117
19	Caechessia palustre	..	..	110	96	160	155	91	80	36	51	25	35
17	Influenza	119	74	400	277	179	137	68	72	29	35	19	29
22	Sifilide	211	205	339	337	49	42	15	10	7	4	2	1
71	Tetano traumatico e reumatico	73	38	3	6	2	2	4	3	6	..	6	4

(a) Si comprendono in questo gruppo quei bambini che erano entrati nel secondo mese di vita, ma non avevano superato il primo anno di età.  
 (b) In questo gruppo sono compresi i morti che contavano da 1 anno e 1 giorno ad 1 anno e 365 giorni di età. Con lo stesso metodo sono

per età, sesso e principali cause di morte. (Vedasi la Tavola II).

Anno 1904.

MORTI IN ETÀ DI		oltre 5 anni a 10 compiuti		oltre 10 anni a 15 compiuti		oltre 15 anni a 20 compiuti		oltre 20 anni a 25 compiuti		oltre 25 anni a 30 compiuti		oltre 30 anni a 35 compiuti		oltre 35 anni a 40 compiuti		oltre 40 anni a 45 compiuti		Numero dell'elenco nosologico
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
20	13	7	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
134	158	80	132	98	163	81	189	77	199	89	194	103	229	154	215	39	40	
4	3	7	1	8	8	4	4	5	7	8	9	8	10	12	8	..	44	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	97
75	100	31	50	15	31	26	29	16	39	17	35	34	20	33	37	..	104	
1 157	1 335	366	435	263	316	237	310	193	309	209	328	229	330	251	355	..	20	
..	1	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	99
48	29	26	23	24	19	48	38	33	40	109	58	160	86	270	107	..	112	
484	394	192	213	154	178	150	233	146	277	166	291	172	345	215	327	..	110	
193	166	142	160	157	188	148	220	121	237	100	206	85	184	99	188	..	7	
200	213	67	83	56	69	48	51	50	48	29	32	25	23	26	13	..	8	
235	242	30	34	11	17	5	8	2	10	3	5	3	1	1	1	..	9	
250	205	46	54	25	13	7	16	1	4	1	5	1	1	..	..	..	10	
13	17	15	17	13	18	26	35	28	41	35	32	27	38	44	34	..	11	
590	663	486	726	769	942	790	783	484	546	326	404	258	287	217	217	..	12	
..	1	1	..	1	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	13
6	12	6	5	4	3	..	2	1	3	..	..	..	..	4	1	..	16	
58	108	6	5	..	1	1	2	2	2	1	..	..	..	1	4	..	14	
368	371	56	76	13	15	4	6	2	6	4	4	1	4	..	..	..	15	
186	118	8	13	3	4	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	18	
375	328	198	140	158	102	128	106	85	63	85	63	88	73	112	71	..	19	
68	77	44	33	34	18	31	18	33	30	26	30	42	37	47	48	..	17	
42	48	31	44	44	42	41	56	22	39	43	34	48	34	39	46	..	22	
4	1	8	..	10	11	18	17	41	26	29	24	37	15	42	36	..	71	
72	22	47	22	29	15	17	10	22	9	13	11	17	8	18	..	..	71	

età, vale a dire che erano morti entro i 365 giorni dalla nascita. formati gli altri gruppi.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		oltre 45 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 55 compiuti		oltre 55 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 65 compiuti		oltre 65 anni a 70 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
39	Anemia	151	176	198	197	224	274	..	..	..	..
40	Leucemia	9	8	10	9	11	5	3	1	..	1
44	Marasmo senile	..	..	..	..	..	..	722	1 029	1 211	1 650
97	Gastrite	32	40	58	45	74	71	105	102	111	88
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	356	335	512	513	598	644	997	1 020	1 056	1 194
20	Dissenteria	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..
99	Epatite, cirrosi epatica	324	127	414	151	414	184	463	210	385	161
112	Malattie dei reni	261	283	365	317	346	321	503	452	483	500
110	Peritonite	98	141	105	123	108	110	118	118	108	104
7	Valuolo	24	8	25	12	11	3	14	5	8	3
8	Morbillo	1	..	1	1	1	..	1	..	..	..
9	Scarlattina	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..
10	Risipola infettiva	53	44	55	42	89	40	91	74	84	67
11	Febbre tifoide	169	168	145	173	147	142	151	128	99	87
12	Tifo esantematico	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1
13	Meningite cerebro-spinale epidemica	2	..	..	2	1	..	..	..	1	..
16	Ipertosse	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..
14	Difterite	2	2	4	1	2	2	1	1	1	1
15	Laringite crupale	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..
18	Febbri da malaria	131	63	125	92	111	72	137	108	119	71
19	Cachessia palustre	47	23	74	40	68	41	86	67	43	36
17	Influenza	56	45	60	55	85	51	114	105	123	117
22	Sifilide	42	27	44	35	39	15	32	16	16	10
71	Tetano traumatico e reumatico	16	10	20	10	18	7	16	10	17	8

Numero dell'Elenco nosologico	MORTI IN ETÀ DI												Totale generale			Numero dell'Elenco nosologico	
	oltre 70 anni a 75 compiuti		oltre 75 anni a 80 compiuti		oltre 80 anni a 85 compiuti		oltre 85 anni a 90 compiuti		oltre 90 anni compiuti		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine					
1 a 5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1 217	982	2 199	1 a 5
6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24 722	21 623	46 345	6
39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	3 910	4 743	8 653	39
40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	136	122	258	40
44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	21	30	19 660	24 282	43 942	44
97	2 907	4 088	4 572	5 528	6 202	7 345	2 906	3 149	1 119	1 463	21	30	19 660	24 282	43 942	97	
104	117	126	108	82	62	64	16	20	5	5	3	7	4 006	3 807	7 813	104	
20	1 493	1 474	1 264	1 243	852	879	250	303	69	76	65	56	52 491	52 087	104 578	20	
99	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	6	14	99
112	274	136	134	89	48	29	4	11	1	..	6	2	3 372	1 622	4 994	112	
110	551	465	418	317	227	172	54	40	7	7	11	10	6 503	6 633	13 136	110	
7	91	119	63	55	28	29	4	5	1	1	6	2	2 193	2 700	4 893	7	
8	5	1	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1 582	1 511	3 093	8	
9	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	2 713	2 619	5 332	9	
10	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	855	756	1 611	10	
11	85	80	95	58	58	50	14	12	4	3	2	2	1 523	1 362	2 885	11	
12	109	81	39	50	22	19	5	9	..	2	12	8	5 875	6 364	12 239	12	
13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	9	13
16	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	35	45	80	16
14	1	1	1	1	..	1	1	..	1	..	1	2	2 638	3 320	5 958	14	
15	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1 517	1 476	2 993	15	
18	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	867	659	1 526	18	
19	109	79	52	49	33	27	10	9	..	2	3	..	3 496	2 861	6 357	19	
17	35	39	20	9	6	8	1	2	..	1	3	2	1 130	976	2 106	17	
22	152	168	138	135	94	106	36	31	9	13	6	4	1 997	1 797	3 794	22	
71	10	10	5	2	2	..	1	..	..	..	2	..	1 005	844	1 849	71	
	11	7	4	4	1	..	..	..	..	..	1	..	433	213	646		



Anno 1904.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		oltre 45 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 55 compiuti		oltre 55 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 65 compiuti		oltre 65 anni a 70 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
24	Pustola maligna, carbonchio. . . . .	25	5	21	6	21	9	14	6	14	4
27	Rabbia . . . . .	2	..	2	1	2	1	2	..	..	1
124	Febbre puerperale. . . . .	..	15	..	..	..	..	..	..	..	..
121, 122 123, 125 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio. . . . .	..	47	..	..	..	..	..	..	..	..
77	Bronchite acuta . . . . .	185	205	294	251	345	325	520	549	546	610
78	Bronchite cronica . . . . .	80	97	142	143	176	226	343	416	506	595
81	Polmonite crupale . . . . .	1 333	628	1 639	877	1 619	1 017	2 038	1 491	1 872	1 479
82	Bronco-polmonite acuta. . . . .	409	254	581	436	663	597	951	893	1 077	1 098
79	Malattie della pleura . . . . .	98	59	135	68	124	66	157	100	121	74
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare. . . . .	1 128	963	970	753	749	569	627	445	343	262
30, 32 a 36	Altre forme tubercolari. . . . .	125	155	127	149	102	119	113	108	67	114
90	Malattie del cuore. . . . .	856	1 130	1 211	1 609	1 628	2 168	2 688	3 884	3 452	4 744
87	Malattie delle arterie . . . . .	150	79	229	127	297	193	436	302	636	411
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	481	371	795	711	1 193	1 039	2 076	1 861	2 733	2 466
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	124	86	111	91	106	76	90	85	80	49
63	Encefalite. . . . .	37	17	38	21	27	18	29	34	51	24
72	Eclampsia infantile . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	28	40	57	60	35	64	15	26	7	9
45	Pellagra. . . . .	61	71	93	81	162	94	201	144	260	174
47	Diabete. . . . .	53	26	72	42	99	70	133	73	99	54
138	Alcolismo cronico . . . . .	65	3	51	6	50	6	53	7	42	4
48 a 58	Tumori maligni. . . . .	511	935	847	1 261	1 040	1 373	1 415	1 651	1 293	1 362
140 a 156	Morti violente } per cause accidentali. . . . .	372	85	425	102	376	100	420	148	379	158
157 a 165	Morti violente } per suicidio . . . . .	139	29	158	23	145	42	126	17	90	27
166	Morti violente } per omicidio . . . . .	75	8	68	11	48	9	33	10	22	7
169	Morti violente } in conflitto con la forza pubblica . . . . .	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..
170	Altre malattie. . . . .	942	728	1 262	891	1 553	1 060	2 056	1 568	2 359	1 600
170	Cause ignote . . . . .	117	92	131	108	161	126	222	208	209	245
TOTALE GENERALE . . . . .		9 173	7 628	11 676	9 642	13 069	11 351	18 313	17 475	20 124	19 670

Anno 1904.

MORTI IN ETÀ DI													Totale generale			Numero dell'elenco nosologico
oltre 70 anni a 75 compiuti		oltre 75 anni a 80 compiuti		oltre 80 anni a 85 compiuti		oltre 85 anni a 90 compiuti		oltre 90 anni compiuti		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale		
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine					
6	7	10	4	8	3	1	..	..	..	1	..	238	117	355	24	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	31	14	45	27	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1 082	1 082	124
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1 899	1 899	121, 122 123, 125 126
658	760	642	710	489	507	174	165	43	46	21	29	25 099	24 018	49 112	77	
696	960	716	808	485	597	170	187	49	62	1	4	3 720	4 569	8 289	78	
1 800	1 542	1 285	1 090	673	638	170	161	37	44	37	20	21 582	15 927	37 509	81	
1 285	1 342	1 107	1 058	673	654	225	198	36	64	35	17	16 599	15 582	32 181	82	
111	80	74	48	37	31	10	5	1	2	5	1	1 778	1 218	2 996	79	
171	151	68	48	16	20	5	6	2	7	23	31	18 034	21 118	39 152	29 e 31	
76	71	42	52	8	22	4	3	1	5	9	17	7 458	8 216	15 674	30, 32 a 36	
4 173	5 784	3 345	4 488	2 042	2 562	531	607	86	131	29	43	23 665	32 021	55 686	90	
861	637	868	688	674	511	191	194	54	44	8	11	4 849	3 607	8 456	87	
3 628	3 094	3 151	2 613	1 978	1 559	527	475	102	109	39	42	17 740	15 251	32 991	64	
52	34	35	23	15	14	7	5	..	..	8	3	7 292	6 757	14 049	59	
45	25	32	13	19	15	2	2	..	1	..	1	595	434	1 029	63	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8 367	7 056	15 423	72	
4	5	6	9	..	2	..	1	1	..	1	1	451	502	953	134	
209	145	159	70	55	38	5	9	1	..	6	6	1 329	1 034	2 363	45	
86	43	49	25	16	7	5	..	..	..	3	..	778	464	1 242	47	
42	2	16	..	6	2	..	..	..	..	2	2	452	57	509	138	
1 173	1 238	668	722	322	368	75	86	13	20	4	19	8 271	10 589	18 860	48 a 58	
335	198	258	209	178	143	53	47	10	17	56	25	7 480	3 564	11 044	140 a 156	
63	12	39	6	17	7	3	1	..	..	6	3	1 705	451	2 156	157 a 165	
14	9	8	3	3	1	..	1	..	..	10	1	1 131	177	1 308	166	
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	4	169	
2 631	1 830	2 112	1 335	1 264	817	381	209	73	54	59	56	27 466	21 714	49 180	..	
322	337	351	309	79	157	31	58	14	24	102	122	3 813	3 941	7 754	170	
24 397	25 181	21 927	21 954	16 692	17 394	5 873	6 011	1 738	2 203	622	591	353 815	344 789	698 604	..	











Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE														BORGOFARO
	COCCARO	PORTOMAGGIORE	FORLÌ	CESENA	RIMINI	MODENA	MIRANDOLA	PAVALONE NEL FRI- GNAVO	CARPI	PARMA	BORGO SAN DON- NINO				
6	201	71	76	46	102	144	35	38	60	116	17	1			
39 e 40	15	3	5	5	10	4	3	5	6	14	1	3			
44	45	20	45	47	52	107	21	24	20	34	9	12			
97	6	39	3	8	14	16	5	7	6	14	3				
104	110	42	92	103	112	229	23	29	65	132	49	15			
20															
99	3	1	10	7	4	3	3			6	2				
112	11	2	17	17	13	20	2	4	6	39	2	2			
110	5	4	10	8	11	16	1		7	8	2	1			
7															
8	9				3		2			1		1			
9			2	2			2								
10	1	1	7	7		3	2		3	7	3	5			
11	14	5	19	14	12	12	2	2	16	15	1				
12															
13															
16	65		1	29	31	24	3		3	1					
14		2	4	5	1	6		4		15	3				
15	2	4	1	3	8	8			3	2	1				
18 e 19	8	2													
17	4		5		5	5			6	2	2	1			
22			2	1		4				5					
71			1	2						3	1				
24				1											
27															
124	8				1	1	2			2	2	1			
77	59	14	27	73	53	92	18	23	44	44	28	25			
78	3	1	18	14	8	24	3	2	1	30	8	1			
81	41	24	24	50	32	57	6	9	11	61	11	15			
82	25	16	43	27	32	136	10	10	19	74	5	7			
79	1	1	1	5	5	10	2		3	17	1				
29 e 31	37	27	92	52	58	97	26	10	57	168	23	8			
30, 32 e 36	19	8	20	29	29	15	11	2	28	56	8	2			
90	49	24	56	64	67	93	21	16	37	111	31	27			
87	19	5	16	18	16	52	4		3	33	1	1			
64	35	28	54	41	56	100	18	5	18	72	23	10			
59	13	7	11	6	7	34	2	5	10	15	10	2			
63		1	1	1	2		1		3	2	1				
72	37	2	4	35	14	20	1	1	5	13	1	2			
131	1	1	1			4				3					
45	5	3	1	5	4		1			3	7				
47		1	2	6	2	5				2					
138				1						2					
48 a 58	26	10	60	39	31	62	2	6	21	99	10	2			
140 a 156	18	5	11	19	8	19	6	5	12	27	12	6			
157 a 165	3	1	4	2	8	12	3		3	11	1				
166	1		1	1	2	2			1						
169															
	75	26	46	46	75	137	38	16	60	231	36	14			
170	1	2		1	1	1			1	2					
TOTALE GENERALE	936	403	793	840	889	1 595	279	224	538	1 492	315	164			

(4) Si veggia la nota a pag. 44.

Num. dell'elenco nosologico	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	RAVENNA	FAENZA	LUGO	REGGIO EMILIA	CASTELFRANCO	AREZZO	CORTONA	FIRENZE	PISTOIA	ROCCA SAN CA- SCIANO	SAN MINIATO	EMPOLI	PRATO	GROSSETO	LIVORNO	Num. dell'elenco nosologico
6	36	9	96	44	67	96	13	130	28	213	95	15	34	36	73	14	118	6
39 e 40	11	2	5	2	3	20		14	5	19	6				3	3	13	39 e 40
44	98	3	45	35	17	72	14	104	59	263	73	6	28	19	55	6	130	44
97	3	2	12	4	5	16		3	1	40	4			1	11		16	97
104	104	8	118	50	53	211	28	162	99	301	154	13	53	28	129	15	220	104
20															1			20
99	9	2	11	2	3	4	3	3	4	39	19	1	3		2	6	17	99
112	15	1	16	11	22	35	1	15	17	138	17	2	6	3	17	5	46	112
110	19		14	3	1	19	3	2	2	38	18	1	2	8	6	2	14	110
7															2		1	7
8															7		2	8
9									5	28	6		4	6				9
10	4	1	7	4		5	1	4	2	18	6			2	6	1	4	10
11	16		18	15	11	16	9	8	8	87	63	1	6	20	26	2	35	11
12																		12
13																		13
16	3		10			20	1	4	14	25	13	10	6		5		9	16
14	3		1	2	2	4		5		67	20		8	2	3	1	2	14
15								4	1	2	10	1		1			5	15
18 e 19																	7	18 e 19
17	5	1	4			1	6	1	5		3	1	3	2			3	17
22	1		1	1		1	1	16		5	1				1		3	22
71	5	2	1	1		1	1			2	2			4				71
24										3							1	24
27																		27
124	3							2										124
77	40	8	53	22	9	114	26	81	104	169	61	13	13	2	4		118	77
78	18	1	15	3	3	18	2	26	3	54	14	1	3	4	5		23	78
81	36	5	83	39	6	50	13	44	40	316	55	1	9	42	42	24	93	81
82	72	5	28	30	38	100	17	36	31	243	56	7	29	22	48	4	95	82
79	8		8	1	1	4	2	2		30	7		2		1	1	14	79
29 e 31	104	9	71	67	52	90	18	55	23	574	131	4	31	54	86	15	183	29 e 31
30, 32 e 36	37	3	39	15	19	42	5	17	17	123	30	2	6	15	11	7	53	30, 32 e 36
90	97	15	121	66	49	143	14	92	78	593	139	4	38	44	88	12	216	90
87	23	2	26	20	14	32	3	9	7	99	13	2	5	4	11	3	47	87
64	73	11	86	30	35	74	17	73	24	329	65	5	34	25	49	7	89	64
59	20	3	18	12	7	25	12	12	2	84	17		5	8	31	4	57	59
63	1		2	3	4	8		1	1	5	5	1		3	3		2	63
72	7	1	28	3	3	19	5	18	3	42	12	4	8	8	12	3	29	72
131	3		2	1				1	5	6	4	1		1			3	131
45	35							3	1	10	1							45
47	3		1	2	1	5		2	1	25	3			1				47
138	3							3		1								138
48 a 58	53	9	78	62	33	57	6	38	22	293	53	9	13	23	50	12	111	48 a 58
140 a 156	7	3	15	9	9	28	4	18	8	48	15		2	1	13	5	30	140 a 156
15																		

Segue TAV. V. - Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1904.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE' and various municipalities: PORTOFERRAIO, LUCCA, CAPANNORI, MASSA, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, PONTREMOLI, CARRARA, PISA, VOLTERRA, BAGNI SAN GIULIANO, CASCINA, SIENA. Rows list various causes of death like 'Anemia, leucemia', 'Tifo esantematico', etc., with corresponding counts.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1904.

Table with columns for various municipalities: MONTEPULCIANO, ANCONA, FABRIANO, IESI, SENIGALLIA, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA, CAMERINO, PESARO, URBINO, FANO, PERUGIA, FOLIGNO, ORVIETO, RIETI, SPOLETO. Rows list various causes of death with counts for each municipality.

(a) Si veggia la nota a pag. 44.

Segue **TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario**

Anno 1904.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TERNI	CITTA' DI CASTELLO	GUBBIO	ROMA	CIVITAVECCHIA	FRONZONE	VELLETRI	VITERBO	AQUILA DEGLI ABRUZZI	AVEZZANO	CITTADUCALE	SULMONA
6	Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare . . . . .	44	60	49	581	4	15	13	46	43	13	13	26
39 e 40	Anemia, leucemia . . . . .	4	6	4	122	2	..	8	2	5	2	..	2
44	Marasmo senile . . . . .	38	51	33	241	5	14	30	27	39	12	4	18
97	Gastrite . . . . .	2	..	5	60	1	2	3	12	3	8	..	..
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . . . .	57	89	80	776	27	36	67	76	73	32	12	93
20	Diisenteria . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
99	Epatite, cirrosi epatica . . . . .	8	4	..	95	4	4	3	5	4	2	..	..
112	Malattie dei reni . . . . .	14	1	9	297	9	4	20	10	13	7	1	9
110	Peritonite . . . . .	4	4	6	98	..	1	..	5	3	..	..	2
7	Vaiuolo . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2
8	Morbillo . . . . .	..	15	4	167	5	1	..	..	1	..	14	2
9	Scarlattina . . . . .	..	..	..	8	..	..	..	2	..	..	..	..
10	Risipola infettiva . . . . .	6	4	1	44	3	2	4	2	..	..	..	..
11	Febbre tifoide . . . . .	22	14	11	203	5	5	6	5	4	2	..	7
12	Tif esantematico . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Ipertosse . . . . .	8	26	..	29	..	..	1	2	4	..	..	2
14	Difterite . . . . .	..	1	..	65	2	..	4	1	..	..	..	..
15	Laringite crupale . . . . .	3	..	..	7	..	1	2	..	1	1	1	3
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	1	..	..	55	11	..	4	3	..	..	2	..
17	Influenza . . . . .	6	4	2	41	1	..	5	1	1	1	8	5
22	Sifilide . . . . .	1	..	..	128	3	..	1	8	13	..	..	2
71	Tetano . . . . .	..	..	1	6	1	..	1	1	1	..	..	2
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	1	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..
27	Rabbia . . . . .	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..
124	Febbre puerperale . . . . .	1	1	1	20	..	..	2	..	..	..	..	..
77	Bronchite acuta . . . . .	26	99	48	298	10	26	19	19	9	16	11	11
78	Bronchite cronica . . . . .	10	5	1	138	2	5	1	5	4	1	2	6
81	Polmonite crupale . . . . .	15	30	28	574	36	9	21	20	13	17	6	13
82	Bronco-polmonite acuta . . . . .	18	28	30	623	12	9	14	24	19	15	2	36
79	Malattie della pleura . . . . .	5	..	4	80	1	..	2	1	2	1	1	2
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	52	32	9	959	30	5	19	37	29	9	4	18
30, 32 e 36	Altre forme tubercolari . . . . .	17	9	7	309	10	4	19	19	30	9	3	8
90	Malattie del cuore . . . . .	39	51	44	760	22	21	28	39	46	8	4	38
87	Malattie delle arterie . . . . .	5	6	3	242	5	5	10	8	14	3	1	5
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . . . .	48	50	34	519	13	11	21	15	29	11	3	23
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	5	5	5	221	1	4	3	1	10	1	..	3
63	Encefalite . . . . .	..	1	..	13	..	..	..	..	..	..	..	3
72	Eclampsia infantile . . . . .	34	18	18	360	2	5	4	11	11	3	1	2
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	1	1	1	14	..	..	1	1	..	1	..	2
45	Pellagra . . . . .	..	13	7	3	1	..	..	..	..	..	..	2
47	Diabete . . . . .	2	..	..	58	..	..	2	1	..	..	..	..
138	Alcoolismo cronico . . . . .	4	..	..	9	1	..	..	..	..	..	..	1
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	19	18	17	456	16	1	6	21	11	2	1	12
140 a 154	Morti violente per cause accidentali . . . . .	12	11	8	151	12	5	7	6	3	4	3	9
157 a 165	per suicidio . . . . .	4	2	..	101	1	3	2	1	1	2	..	2
166	per omicidio . . . . .	1	..	3	37	1	..	2	3	2	1	..	3
169	in conflitto con la forza pubblica . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	Altre malattie . . . . .	39	48	40	950	20	6	22	44	42	11	5	35
170	Cause ignote . . . . .	9	..	..	31	1	13	..	1	..	..	..	..
<b>TOTALE GENERALE . . .</b>		<b>585</b>	<b>707</b>	<b>513</b>	<b>9 956</b>	<b>281</b>	<b>217</b>	<b>377</b>	<b>485</b>	<b>483</b>	<b>197</b>	<b>102</b>	<b>404</b>

(a) Si veggia la nota a pag. 44.

in altri **83 Comuni (a)** classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1904.

CAUSE DI MORTE	CAMPOBASSO	ISERNIA	LARINO	CHIETI	LANCIANO	VASTO	TERAMO	PENNE	AVELLINO	ARIANO DI PUGLIA	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	BENEVENTO	CERRETO SANNITA	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	CASERTA	GAETA	NOLA	Num. dell'elenco nosologico
	12	10	5	27	14	29	79	15	16	22	12	21	7	9	23	..	10	6
	3	6	1	5	7	9	8	2	5	9	3	4	1	8	3	1	4	39 e 40
	29	26	8	33	38	32	24	26	20	40	14	26	13	29	30	3	8	44
	1	6	..	4	3	6	24	4	3	5	3	2	..	1	5	1	1	97
	45	39	29	90	70	37	153	33	93	96	16	124	9	86	124	11	52	104
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20
	2	2	..	2	1	3	3	..	1	3	..	3	..	2	5	2	5	99
	5	7	3	9	6	2	10	2	13	15	5	10	1	7	11	..	18	112
	2	1	..	6	..	2	5	..	8	5	..	1	1	..	2	1	2	110
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
	..	28	3	..	4	..	1	1	14	..	..	..	..	17	5	..	1	8
	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	9
	1	..	..	2	1	4	3	..	3	1	1	2	..	1	1	3	1	10
	5	10	2	9	9	8	17	4	6	1	2	10	4	..	18	2	5	11
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
	..	1	..	..	1	2	4	..	6	1	..	..	..	..	1	2	2	16
	1	..	1	..	3	1	1	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	14
	1	..	1	..	1	..	1	..	3	..	4	1	..	..	3	..	..	15
	2	2	8	5	1	16	2	2	3	..	12	..	9	1	..	..	..	18 e 19
	2	2	..	1	..	1	2	1	6	4	10	1	5	3	..	1	1	17
	1	..	..	12	1	5	3	..	2	8	..	1	..	13	1	1	1	22
	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	71
	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	24
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	27
	2	..	1	..	..	..	..	1	2	..	..	1	..	..	1	..	..	124
	15	7	17	23	14	20	17	7	32	47	18	62	5	24	44	4	16	77
	1	3	..	14	7	2	11	2	6	12	1	9	1	6	5	1	1	78
	36	4	11	19	41	24	12	9	28	21	2	38	4	5	33	2	29	81
	10	22	6	13	19	11	26	8	49	16	5	36	4	17	56	3	18	82
	2	1	2	1	4	1	5	..	6	..	2	..	..	2	2	..	5	79
	12	7	6	33	20	22	28	6	9	6	3	18	2	4	30	5	16	29 e 31
	5	6	7	21	9	11	25	1	17	21	2	8	5	2	7	5	13	30, 32 e 36
	49	25	16	62	28	19	38	16	58	26	6	43	17	11	75	9	30	90
	2	3	1	10	4	4	8	2	4	1	11	1	1	6	..	3	3	87
	10	10	6	34	32	16	46	18	24	15	6	28	11	5	38	8	18	64
	21	5	2	10	1	4	11	4	9	13	..	6	2	..	14	1	6	59
	1	..	..	1	..	..	1	2	1	..	1	..	..	..	2	1	..	63
	9	3	3	23	44	3	9	5	9	6	1	9	2	6				

Segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1904.

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE) and 14 municipalities: PIEDIMONTE D'ALIFE, SORA, AVERSA, MADDALONI, S. MARIA CAPUA VETERE, SESSA AURUNCA, NAPOLI, CASORIA, CASTELLAMARE DI STABIA, POZZUOLI, AFRAGOLA, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. Rows include various medical conditions like Anemia, Marasmo senile, Gastrite, etc., and a final 'TOTALE GENERALE' row.

(a) Si veggia la nota a pag. 44.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1904.

Table with columns for 14 municipalities: TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, SALERNO, CAMPANA, SALA CONSILINA, VALLO DELLA LUCANIA, CAVA DEI TIRRENI, BARI DELLE PUGLIE, ALTAMURA, BARLETTA, ANDRIA, BISCEGLIE, BITONTO, CANOSA DI PUGLIA, CORATO, GIOIA DAL COLLE, GRAVINA IN PUGLIA (a), and Num. dell'Elenco necrologico. Rows include various medical conditions and a final 'TOTALE GENERALE' row.

(a) Si veggia la nota a pag. 44.

Segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1904.

Table with 14 columns: CAUSE DI MORTE and municipalities (MOLFETTA, MONOPOLI, RUVO DI PUGLIA, TERLIZZI, TRANI, FOGGIA, BOVINO, SAN SEVERO, CERIGNOLA, MONTE S. ANGELO, SAN MARCO IN LAMIS (a), LECCE). Rows list various medical conditions and their death counts.

(a) Si veggia la nota a pag. 44.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1904.

Table with 27 columns: municipalities (BRINDISI, GALLIPOLI, TARANTO, FRANCAVILLA FONTANA, MARTINA FRANCA, OSTUNI, POTENZA, LAGONEGRO, MATERA, MELFI, AVIGLIANO (a), CATANZARO, COTRONE, MONTELEONE DI CALABRIA, NICASTRO, COSENZA, CASTROVILLARI) and Num. dell'elenco nosologico. Rows list causes of death and their counts across these municipalities.

Segue Tav. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1904.

Table with 15 columns: Num. dell'elenco nosologico, CAUSE DI MORTE, PAOLA, ROSSANO, REGGIO DI CALABRIA, GERACE, PALMI, CALTANISSETTA, PIAZZA ARMERINA, TERRANOVA DI SICILIA, CASTROGIOVANNI, SAN CATALDO (a), CATANIA, ACIRALE, CALTAGIRONE. Rows list various causes of death and their counts for each locality.

(a) Si veggia la nota a pag. 44.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1904.

Table with 23 columns: Nicosia, Aderò, Bronte, Giarre, Leonforte (a), Paternò, Girgenti, Bivona, Sciacca, Canicatti, Favara, Licata, Messina, Castoreale, Mistretta, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Num. dell'elenco nosologico. Rows list counts for various causes of death across these 83 municipalities.

Segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1904.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE														
		PALERMO	CECALÙ	CORLEONE	TERMINI IMERSE	MONREALE	PARTINICO	SIRACUSA	MODICA	NOTO	COMISO	RAGUSA	VITTORIA	TRAPANI	
6	Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare	328	10	32	9	28	26	52	69	16	69	28	40	23	
39 e 40	Anemia, leucemia	138	2	6	3	6	9	10	19	9	13	4	9	4	
44	Marasmo senile	600	30	47	40	60	34	53	39	26	41	53	34	43	
97	Gastrite	62	1	1	2	4	1	2	25	2	7	15	37	3	
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	935	24	63	54	76	96	117	186	128	76	244	198	135	
20	Dissenteria														
99	Epatite, cirrosi epatica	67		4	2										
112	Malattie dei reni	164	1	1	6	6	28	9	3	4	3	20	22		
110	Peritonite	60	2	1				5	3	1	2				
7	Vaiuolo	111				1									
8	Morbillo	21	1		4	6		3	11		16	9	17	1	
9	Scarlattina	2				1			3						
10	Risipola infettiva	8	1		5	1		1	4	2		2	2		
11	Febbre tifoide	44	12	1	11	16	28	30	37	30		43	37	43	
12	Tifo esantematico														
13	Meningite cerebro-spinale epidemica							1							
16	Ipertosse	12				1	8	1	1		2	9	3	2	
14	Difterite	5			2							5		1	
15	Laringite crupale	3	1												
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	17	5	1	5	6	16	11	28	38	22	18	15	3	
17	Influenza	11						5	4	4	8	4	1		
22	Sifilide	27	1		2			5		2	4	1	5	8	
71	Tetano	4													
24	Pustola maligna, carbonchio	7													
27	Rabbia	1												2	
124	Febbre puerperale	6			1	1	1	3		1		2		1	
77	Bronchite acuta	533	18	43	25	96	51	54	32	17	68	19	43	65	
78	Bronchite cronica	86	1	4	9		2	11	19		6	5	5	10	
81	Polmonite crupale	461	11	13	23	11	25	33	55	40	22	35	71	63	
82	Bronco-polmonite acuta	143	1	8	12	15	18	23	15	5	7	10	36	29	
79	Malattie della pleura	41	1		3		4	1	3			2	4	7	
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	500	11	6	17	21	20	39	15	13	19	46	26	51	
30, 32 a 36	Altre forme tubercolari	122	2	4	4	5	2	19	13	3	8	6	5	16	
90	Malattie del cuore	437	19	20	25	38	25	53	39	13	25	44	22	40	
87	Malattie delle arterie	35	2		3	8	6	3	5	2	5	2	4	9	
64	Apoplessia e congestione cerebrale	282	15	14	22	23	20	47	26	23	14	19	37	57	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	280		6	2	6	9	18	13	6	6	5	15	33	
63	Encefalite	7						2	2	1					
72	Eclampsia infantile	50	6	6	2	3	5	8	20		5	9	29		
134	Reumatismo articolare acuto	4			1			2	2	1					
45	Pellagra													1	
47	Diabete	24	1	1				3	1	1				4	
138	Alcolismo cronico	1						3							
48 a 58	Tumori maligni	125	6	8	5	8	3	19	16	12	6	13	17	16	
140 a 156	Morti violente per cause accidentali	55	9	4	10	4	7	10	8	6	3	6	4	16	
157 a 165	Morti violente per suicidio	14						1	4	2				1	
166	Morti violente per omicidio	26	1	3	2	3	8	4	1	3	1			4	
169	Morti violente in conflitto con la forza pubblica														
	Altra malattie	405	14	16	21	25	13	48	92	22	35	151	68	63	
170	Cause ignote	62			1	1	1	4				149	2	1	
	TOTALE GENERALE	6 326	209	313	338	480	452	741	874	439	644	823	824	825	

(a) Si veggia la nota a pag. 44.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1904.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE															TOTALE dei 69 Comuni capiluoghi di provincia	TOTALE dei 137 Comuni capiluoghi di circondario	TOTALE dei 17 Comuni capiluoghi di distretto e dei 61 Comuni non capiluoghi (c)	Num. dell'elenco nosologico
		ALCAMO	MAZZARA DEL VALLO	CASTELVETRANO	MARSALA	MONTE SAN GIULIANO	CAGLIARI	IGLESIAS	LANUSEI	ORISTANO	SASSARI	ALGHERO	NUORO	OZIERI	TEMPIO PAUSANIA				
71		13	37	75	24	65	36	5	12	50	26	6	13	24	6 974	3 099	2 827	6	
7		1	5	4	3	30	17		2	8	11	2	5	6	1 374	546	523	39 e 40	
54		24	46	57	40	30	15	8	11	33	15	10	4	15	6 738	3 189	2 645	44	
7			3	10	9	24	11	2		6	3	2	3	2	1 134	613	634	97	
268		96	100	113	80	212	98	12	25	234	49	54	29	29	14 323	8 314	8 125	104	
3		2	2	8	4	16	2	1	2	13	3	3	3	2	1 212	415	271	99	
15		10	14	26	13	13	8		5	15	4		6	1	3 157	1 066	777	112	
5		3	7	6	2	4	2	1		8		1		1	1 188	328	272	110	
															174	502	490	7	
															666	366	331	8	
															130	99	115	9	
2															502	221	161	10	
38			4	9	9	26	4		1	3	3		2		2 321	1 120	826	11	
															3			12	
															3			13	
															496	355	334	16	
															622	199	96	14	
															234	124	72	15	
1															473	769	475	18 e 19	
15		25	7	60	8	13	73	7	27	12	9	6	4	3	473	769	475	18 e 19	
			2	9	4	1	1	2	1	2	1		3	1	428	213	254	17	
1															954	209	94	22	
															114	45	39	71	
															56	21	14	24	
															13	5	3	27	
1															177	80	43	124	
68		61	45	97	22	38	49		13	33	7	9	1	10	6 493	3 555	4 111	77	
7		6	5	4	4	21	9		3	8		3	4	4	1 648	605	520	78	
38		45	40	44	28	45	40		20	57	68	17	12	17	6 475	2 909	2 144	81	
13		13	16	22	12	34	26	3	2	58	3	14	6	8	6 871	2 223	1 933	82	
3		1		1	3	5			1	4	3	1	1	2	847	235	152	79	
8		17	20	57	11	102	20		9	83	13	5	7	16	11 066	3 209	2 164	29 e 31	
10		5	6	19	4	54	16	1	1	24	9	4	4	1	3 298	1 159	1 200	30, 32 a 36	
23		19	33	58	24	90	20	5	13	41	9	9	7	11	10 671	4 044	3 010	90	
2		7	6	8	2	8	4		2	12	2	1	6		2 522	567	479	87	
20		9	22	61	26	48	19		7	31	11	2	4	8	6 749	2 541	1 945	64	
11		12	18	20	15	21	10	3	1	32	13	1	3	4	3 052	1 081	874	59	
1										1					238	85	53	63	
1		4	3	4		12	10		1	1	8	1		4	2 485	1 024	1 158	72	
															146	84	47	134	
															501	116	138	45	
															423	108	54	47	
															174	41	15	138	
8		6	15	26	8	16	6	3	3	14	5	2	3	3	5 213	1 423	994	48 a 58	
6		6	5	11	10	18	22	1	4	10	2	3	3	1	1 920	865	572	140 a 156	
1			1	1		12	1		1	2		1			811	211	95	157 a 165	
10		2	4	6	6	3	1		1	1		1	2	1	324	112	130	166	
																	1	169	
26		23	21	53	22	85	33		10	51	28	8	15	21	11 327	3 822	3 047		
1															812	244	250	170	
745		422	426	960	397	1 121	620	69	198	271	310	132	172	294	127 517	52 163	44 540		

9\* — St. cause di morte.

TAV. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno in età di non oltre 5 anni compiuti classificati per sesso e principali cause di morte.

Anno 1904.

Anno 1904.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	NUMERO DEI MORTI DI											
		non oltre 1 mese		oltre 1 a non oltre 12 mesi compiuti		oltre 1 anno a 2 compiuti		oltre 2 anni a 3 compiuti		oltre 3 anni a 4 compiuti		oltre 4 anni a 5 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . . . .	35	37	10	12	1	1	4	..	..	..	1	..
6	Immaturità, debolezza congenita, atelectasia polmonare . . . . .	1 691	1 493	497	540	..	..	..	..	..	..	..	..
39 e 40	Anemia, leucemia . . . . .	..	..	79	72	64	65	15	8	2	6	2	2
97	Gastrite . . . . .	95	100	139	149	27	24	5	8	2	2	2	1
104	Enterite, diarrea, colera indigeno . . . . .	495	441	1 378	1 339	496	561	140	167	39	51	26	32
99	Epatite, cifresi epatica . . . . .	12	5	7	1	1	..	1	..	1	..	..	..
112	Malattie dei reni . . . . .	17	10	16	27	24	17	10	11	6	6	3	4
110	Peritonite . . . . .	7	2	9	5	6	3	4	2	2	2	1	..
7	Vaiuolo . . . . .	2	5	22	20	8	8	3	6	2	4	1	3
8	Morbillo . . . . .	..	1	24	16	37	43	18	18	9	7	9	11
9	Scarlattina . . . . .	1	1	1	1	2	5	3	..	2	1	1	3
10	Risipola infettiva . . . . .	11	20	21	18	..	..	..	..	1	..	..	..
11	Febbre tifoide . . . . .	1	2	6	8	12	14	5	6	4	1	3	9
13	Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	..	..	..	2	..	..	..	..	1	2	..	..
16	Ipertosse . . . . .	4	4	70	78	33	63	9	23	9	11	4	1
14	Difterite . . . . .	2	2	7	5	8	9	19	4	6	2	..	3
15	Laringite crupale . . . . .	..	..	1	5	4	4	3	4	1	..	1	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . . . .	1	2	19	28	18	16	15	15	6	7	3	9
17	Influenza . . . . .	8	1	14	15	2	5	4	6	2	1	..	3
22	Sifilide . . . . .	138	141	179	217	26	15	2	4	1	..	1	..
71	Tetano traumatico e reumatico . . . . .	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
24	Pustola maligna, carbonchio . . . . .	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1
77	Bronchite acuta . . . . .	154	123	458	495	197	190	61	94	23	28	5	14
78	Bronchite cronica . . . . .	..	..	..	..	3	1	1	1	..	..	..	..
81	Polmonite crupale . . . . .	26	14	74	64	34	29	15	15	3	5	9	4
82	Bronco-polmonite acuta . . . . .	46	40	161	146	89	89	47	40	12	12	10	10
79	Malattie della pleura . . . . .	..	..	3	6	2	2	..	1	..	..	..	..
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . . . .	1	1	6	11	10	10	3	1	1	1	3	4
30, 32 a 36	Altre forme tubercolari . . . . .	11	8	73	74	54	46	10	24	9	11	10	7
90	Malattie del cuore . . . . .	4	3	4	3	4	5	1	1	2	1	1	..
87	Malattie delle arterie . . . . .	..	5	2	1	1	2	..	..	1	..	..	1
64	Aplessia e congestione cerebrale . . . . .	2	1	3	..	1	1	..	1	..	..	..	..
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . . . .	10	5	60	50	26	40	15	19	13	8	7	4
63	Encefalite . . . . .	1	..	1	3	1	1	..	1	..	..	1	..
72	Eclampsia infantile . . . . .	126	119	192	191	51	44	24	16	7	9	8	7
134	Reumatismo articolare acuto . . . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..
48 a 58	Tumori maligni . . . . .	3	2	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..
140 a 156	Morti violente . . . . .	4	1	4	9	13	8	15	11	12	7	6	8
166	Altre malattie . . . . .	326	318	215	232	77	69	44	38	16	17	17	7
170	Cause ignote . . . . .	..	..	30	40	29	38	14	12	6	3	1	2
TOTALE . . . . .		3 239	2 905	3 785	3 886	1 362	1 430	499	558	200	206	136	151

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che non furono, nell'anno 1904, causa di morte nei bambini illegittimi ed esposti in età di non oltre 5 anni compiuti.



TAV. VII. — Morti violente accidentali classificate per età, per sesso e secondo le cause che le produssero.

Anno 1904.

Anno 1904.

CAUSE delle morti accidentali	Complesso			NUMERO DEI MORTI DI																			
				non oltre 1 anno		oltre 1 anno a 5 compiuti		oltre 5 anni a 15 compiuti		oltre 15 anni a 30 compiuti		oltre 30 anni a 40 compiuti		oltre 40 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 70 compiuti		oltre 70 anni		Età ignota	
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Per ubbriachezza . . . . .	38	36	2	..	..	..	1	2	..	5	..	4	1	5	..	9	..	7	..	4	..	..	..
Per annegamento . . . . .	1 884	1 873	511	7	7	325	257	279	73	300	47	96	27	82	27	87	26	106	29	86	16	5	2
Per freddo . . . . .	82	65	17	2	3	1	..	3	..	4	1	5	1	7	1	9	2	16	7	18	2	..	..
Per insolazione . . . . .	76	56	20	3	2	8	1	7	5	9	2	7	1	6	2	8	2	6	2	2	3	..	..
Per fulminazione . . . . .	311	218	93	1	..	1	1	20	16	69	33	30	10	36	11	35	11	20	6	6	4	..	1
Per caduta . . . . .	3 002	2 204	798	12	10	88	51	200	66	299	54	200	31	276	50	317	85	361	126	437	320	14	5
Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc. . . . .	248	214	34	1	..	8	1	34	11	100	11	32	4	17	3	15	2	6	2	1	..	..	..
Per ferite da taglio . . . . .	37	35	2	..	..	1	..	2	1	15	1	6	..	3	..	4	..	4	..	..	..	..	..
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali . . . . .	12	12	..	..	..	..	..	3	..	3	..	4	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..
Per schiacciamento . . . . .	615	542	73	1	2	19	12	50	9	168	10	72	7	85	6	70	8	40	10	27	9	10	..
Per violenze di animali . . . . .	42	38	4	1	..	..	1	5	..	10	2	..	..	7	..	8	..	5	1	2	..	..	..
Per ustione . . . . .	2 557	1 076	1 481	46	61	681	674	124	337	47	65	23	33	21	33	34	25	30	77	65	170	5	6
Per soffocamento . . . . .	258	168	90	61	51	45	25	14	7	14	1	1	1	8	1	12	2	4	1	9	..	..	1
Per asfissia . . . . .	220	155	65	14	12	11	16	12	5	44	8	15	2	24	3	13	4	11	3	9	9	2	3
Per avvelenamenti acuti . . . . .	221	136	85	4	2	30	16	19	10	16	24	16	12	14	5	16	10	15	3	6	3	..	..
Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi . . . . .	16	8	8	..	..	1	2	2	4	1	1	..	..	..	..	2	..	1	1	1	..	..	..
Per cause diverse o non determi- nate . . . . .	1 425	1 144	281	18	10	58	35	132	26	183	22	110	12	134	28	162	25	166	38	161	78	20	7
TOTALE . . . . .	11 044	7 480	3 564	171	160	1 277	1 093	908	570	1 287	282	621	142	726	170	801	202	799	306	834	614	56	25

TAV. VIII. — Morti violente accidentali classificate secondo

Anno 1904.

MESI	COMPLESSO			PER UBBRIACHEZZA		PER ANNEGAMENTO		PER FREDDO		PER INSOLAZIONE		PER FULMINAZIONE		PER CADUTA	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Gennaio . . . . .	854	489	365	4	..	56	18	17	3	..	..	1	..	117
Febbraio . . . . .	783	510	273	3	..	78	21	10	2	..	..	4	..	148	56
Marzo . . . . .	765	489	276	3	..	87	38	5	2	..	..	2	..	130	57
Aprile . . . . .	818	544	274	5	..	101	57	1	..	..	..	5	4	158	55
Maggio . . . . .	897	628	269	4	..	138	63	..	..	1	3	7	3	201	63
Giugno . . . . .	1 027	765	262	1	..	213	63	..	..	7	3	25	11	223	72
Luglio . . . . .	1 225	899	326	5	1	254	70	..	..	26	10	95	39	206	72
Agosto . . . . .	1 084	794	290	1	1	174	44	..	..	18	4	43	24	253	95
Settembre . . . . .	920	682	238	3	..	80	41	..	..	4	..	30	10	229	73
Ottobre . . . . .	881	609	272	1	..	62	51	2	1	..	..	4	..	222	66
Novembre . . . . .	858	516	342	2	..	68	19	10	3	..	..	1	..	150	76
Dicembre . . . . .	932	555	377	4	..	62	26	20	6	..	..	1	2	172	56
ANNO . . . . .	11 044	7 489	3 554	36	2	1 373	511	65	17	56	20	218	93	2 204	798

le cause che le produssero, per sesso e per mesi.

Anno 1904.

PER LESIONI causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.		PER FERITE DA TAGLIO		PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali		PER SCHIACCIAMENTO		PER VIOLENZE di animali		PER USTIONE		PER SOFFOCAMENTO		PER ASFISSIA		PER AVVELENAMENTI ACUTI		PER MORSI di VIPERA o di altri animali velenosi		PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMINATE	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
13	1	4	1	1	..	31	6	..	..	126	233	9	9	9	10	4	3	..	..	97	24
11	2	1	..	..	..	29	2	1	1	119	156	11	6	9	5	11	3	..	..	80	19
9	2	4	..	1	..	32	9	2	..	94	128	13	6	10	6	4	5	..	..	93	23
14	3	4	..	..	..	88	7	..	..	54	102	13	9	13	3	10	7	..	1	88	26
21	1	2	..	1	..	42	7	4	..	52	80	16	5	19	3	10	12	1	3	109	26
24	3	3	..	1	..	50	7	5	..	51	55	15	8	17	3	10	5	3	3	117	29
16	6	3	..	6	..	56	8	6	1	76	69	18	10	14	6	5	8	2	1	111	25
27	2	2	..	1	..	50	7	10	1	84	69	11	12	15	9	12	4	..	..	93	18
21	4	3	..	..	..	48	3	3	..	91	68	14	2	19	3	25	11	2	..	110	23
21	4	7	1	..	..	51	4	5	1	80	93	16	5	11	5	28	15	..	..	99	26
17	5	2	..	1	..	31	8	1	..	115	198	16	4	8	2	14	8	..	..	80	19
20	1	..	..	..	..	39	5	1	..	134	230	16	14	11	10	3	4	..	..	72	23
214	34	35	2	12	..	542	73	38	4	1 076	1 481	168	90	155	65	136	85	8	8	1 144	231

TAV. IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale in età di oltre 15 anni

Anno 1904.

PROFESSIONI	TOTALE delle morti violente accidentali	PER UBBRIACHEZZA	PER ANNEGAMENTO	PER FREDDO	PER INSOLAZIONE	PER FULMINAZIONE	PER CADUTA
Agricoltori, giardinieri, boscaioli . . . . .	1 961	14	245	19	15	134	788
Braccianti, cantonieri, selcatori, spazzini, becchini, lustrascarpe, lampionari . . . . .	477	5	61	8	3	12	157
Proprietari, benestanti . . . . .	175	1	21	2	..	6	74
Operai in genere, fuochisti, fornaciai, cartai, ecc. . . . .	218	..	31	2	..	7	61
Negozianti, industriali, droghieri, albergatori, spedizionieri, commercianti, ecc. . . . .	113	1	16	1	..	..	42
Impiegati pubblici e privati e pensionati civili . . . . .	70	..	9	..	2	1	28
Calzolai, sellai . . . . .	109	1	25	4	..	1	28
Falegnami, ebanisti, carrai, legnaiuoli, carpentieri, ecc. . . . .	107	..	23	..	..	..	42
Muratori, imbianchini . . . . .	281	4	21	2	5	3	141
Fabbrì, maniscalchi, calderai, meccanici, stagnini, armaiuoli, fonditori, coltellinai . . . . .	106	..	25	..	1	1	41
Cocchieri, carrettieri . . . . .	200	..	11	1	..	1	75
Servi, uscieri, portieri, infermieri . . . . .	42	..	5	..	2	..	24
Sacerdoti, monaci, laici, chierici . . . . .	21	..	4	1	..	1	8
Pastori, mandriani . . . . .	81	2	17	1	1	11	16
Sarti . . . . .	22	..	2	1	..	1	11
Mugnai, panettieri, pastai, fornai . . . . .	53	1	15	..	..	..	18
Marinari, barcaiuoli, pescatori . . . . .	68	..	46	..	..	1	15
Facchini, brentatori, lavandai, spaccalegna, stallieri . . . . .	85	5	9	3	..	..	29
Caffettieri, liquoristi, bettolieri, trattori, vinai . . . . .	33	..	8	..	..	..	12
Fruttivendoli, erbivendoli, pescivendoli, merciai ambulanti . . . . .	53	..	13	..	..	1	19
Militari e pensionati militari . . . . .	62	..	23	..	3	..	16
Filatori, tessitori, cardatori . . . . .	27	..	7	..	1	..	8
Macellai, pizzicagnoli, salsamentari . . . . .	25	..	10	1	..	..	6
Studenti . . . . .	33	..	18	..	1	..	3
Guardie carcerarie, doganali, daziarie, civiche, campestri, ecc. . . . .	26	4	11	..	..	..	7
Barbieri . . . . .	17	..	3	..	1	..	5
Minatori, cavaatori, solfatori, marmisti . . . . .	168	..	15	..	2	..	41
Avvocati, procuratori, notai, magistrati . . . . .	8	..	2	..	..	..	4
Commessi di studio e di negozio, garzoni . . . . .	12	..	3	1	..	2	2
Medici, veterinari, flebotomi . . . . .	7	..	..	..	..	..	1
Maestri e professori . . . . .	7	..	..	1	..	..	2
Camerieri di caffè, d'albergo, ecc. . . . .	15	..	4	..	1	..	5
Tipografi, litografi . . . . .	6	..	..	..	..	..	4
Altre professioni e professioni ignote . . . . .	486	..	59	11	..	13	171
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>5 124</b>	<b>34</b>	<b>762</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>196</b>	<b>1 904</b>

compiuti classificati secondo la causa della morte e la condizione o professione.

Anno 1904.

PER LESIONI causate da scoppio di esplosivi, d'armi da fuoco, di mine, ecc.	PER FERITE da taglio	PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali	PER SCHIACCIA-MENTO	PER VIOLENZE di animali	PER USTIONE	PER SOFFOCAMENTO	PER ASFISSIA	PER AVVELENAMENTI ACUTI	PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi	PER CAUSE DIVERSE O NON DETERMINATE
71	11	3	101	15	76	24	41	27	4	373
11	3	3	71	4	33	7	15	6	..	78
10	1	..	7	2	5	3	5	3	1	34
4	2	1	51	..	17	..	7	2	..	33
11	..	..	5	..	2	3	4	1	..	27
6	..	..	5	..	3	1	2	2	..	11
1	3	..	9	..	7	..	7	3	..	20
4	1	..	8	..	2	..	2	1	..	24
7	1	1	20	..	8	2	3	4	..	59
3	1	..	9	..	2	1	4	2	..	16
1	..	..	51	5	3	..	..	2	..	50
..	..	..	3	1	2	1	..	1	..	3
..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	3
3	1	..	6	2	2	1	2	..	..	16
2	1	..	1	..	..	..	1	..	..	2
1	1	1	4	..	2	..	..	..	..	10
..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	4
..	1	..	11	1	1	..	3	2	..	20
1	1	..	1	..	1	1	..	1	..	7
1	..	..	4	..	..	..	..	4	..	11
7	1	..	3	..	2	..	3	..	..	4
3	..	..	..	..	5	..	..	..	..	3
1	..	..	1	..	2	..	..	1	..	3
1	..	..	2	..	..	..	..	1	..	7
4	1	..	1	..	..	..	..	1	..	1
1	1	..	..	..	2	..	..	1	..	3
6	1	..	51	..	12	3	9	1	..	27
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2
1	..	..	1	..	1	..	..	1	..	2
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	46	2	33	1	10	8	..	76
<b>171</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>472</b>	<b>32</b>	<b>225</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>936</b>

TAV. X. — Suicidi classificati per compartimenti, per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione.

Anno 1904.

Anno 1904.

		REGNO		PIE-MONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE		BASILICATA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		
		Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Mesi	Gennaio . . . . .	163	129	34	24	8	11	..	20	5	14	5	12	2	15	3	3	3	1	1	6	1	4	..	5	4	2	..	..	..	2	..	10	2	..	..
	Febbraio . . . . .	159	133	26	23	2	6	1	35	2	13	5	11	2	13	4	7	..	2	1	5	1	3	1	9	1	2	2	1	1	..	..	10	2	3	1
	Marzo . . . . .	170	133	37	17	8	13	4	19	3	11	3	14	7	14	5	6	1	3	..	11	..	4	2	12	2	1	1	1	..	..	..	6	1	1	..
	Aprile . . . . .	209	170	39	17	6	7	2	35	7	22	3	15	7	16	2	7	3	4	1	12	2	4	1	13	1	4	..	..	..	3	..	10	4	1	..
	Maggio . . . . .	261	215	46	24	6	7	2	45	9	27	1	28	9	16	2	12	3	2	1	16	4	3	1	6	1	4	1	2	1	3	1	16	3	4	1
	Giugno . . . . .	227	184	43	32	4	10	2	25	6	20	2	24	6	16	1	4	1	4	1	11	4	3	1	7	2	8	3	1	..	1	..	13	7	5	3
	Luglio . . . . .	216	163	53	14	2	10	3	21	7	25	7	17	9	18	4	7	1	4	3	6	3	2	3	9	2	7	3	2	..	3	..	15	6	3	..
	Agosto . . . . .	167	131	36	15	4	4	3	11	7	12	1	13	7	16	4	5	1	1	3	10	..	3	2	11	1	3	..	4	..	2	1	15	2	6	..
	Settembre . . . . .	156	116	40	15	7	10	1	21	3	13	6	8	4	13	2	..	1	1	..	4	4	4	1	6	2	6	3	2	1	2	..	7	5	4	..
	Ottobre . . . . .	139	102	37	23	7	9	1	12	10	9	2	6	7	16	3	3	..	3	..	5	1	1	2	3	1	2	1	..	..	3	..	6	2	1	..
	Novembre . . . . .	148	117	31	15	5	4	1	19	4	13	..	16	4	6	5	3	1	3	..	10	3	3	..	10	2	4	2	..	1	2	..	4	3	5	..
	Dicembre . . . . .	141	112	29	14	5	5	..	19	2	9	1	9	2	11	5	6	1	2	..	8	5	1	2	7	2	3	..	2	..	2	..	12	2	2	2
Mezzi di uccisione	Per annegamento . . .	433	281	152	27	23	8	4	49	20	54	18	39	29	16	8	9	4	9	1	17	4	7	6	9	8	15	10	4	1	..	..	9	12	9	4
	Con armi da fuoco . . .	522	501	21	68	3	29	3	70	3	38	..	47	1	54	3	17	2	9	..	38	1	7	..	32	3	14	..	6	..	9	..	59	2	4	..
	Con armi da taglio . . .	68	59	9	9	1	1	..	10	2	11	3	4	1	5	1	7	..	..	..	3	..	..	..	4	..	1	..	..	1	..	..	2	..	2	..
	Per impiccamento . . .	388	320	68	46	14	10	1	49	6	40	2	36	13	51	8	13	5	2	3	12	1	10	5	9	..	3	..	4	2	3	..	21	8	11	..
	Per precipitazione . . .	213	147	66	25	7	14	2	20	13	11	2	10	8	15	9	4	2	4	..	20	12	..	1	12	4	2	1	..	..	1	..	5	3	4	2
	Per schiacciamento . . .	61	56	5	10	3	5	..	19	1	7	..	9	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..
	Per avvelenamento . . .	188	112	76	11	5	5	4	22	14	7	7	3	4	12	7	2	1	..	3	8	9	..	3	16	3	5	3	..	..	2	1	16	11	3	1
Per asfissia . . . . .	98	69	29	10	5	18	6	13	3	4	3	10	4	6	3	2	..	1	1	3	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	..	..	
Per altri mezzi o per mezzi non determinati	185	160	25	27	3	6	..	20	3	16	1	15	5	11	1	7	2	5	3	3	..	10	..	16	3	4	1	..	..	8	1	10	2	2	..	
TOTALE . . .	2 156	1 705	451	233	64	96	20	272	65	188	36	173	66	170	40	63	16	30	11	104	28	35	16	98	21	46	16	15	4	23	2	124	39	35	7	

TAV. XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.

Anno 1904.

Anno 1904.

E T À	COMPLESSO			PER ANNEGA- MENTO		CON ARMI DA FUOCO		CON ARMI DA TAGLIO		PER IMPICCA- MENTO		PER PRECIPITA- ZIONE		PER SCHIACCIA- MENTO		PER AVVELENA- MENTO		PER ASPISSIA		PER ALTRI MEZZI O PER MEZZI NON DETERMINATI	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Non oltre 15 anni compiuti. . . . .	12	11	1	1	1	2	..	1	..	3	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..
Oltre 15 anni a 20 compiuti. . . . .	150	110	40	13	12	49	5	3	..	8	3	9	3	6	..	13	11	4	..	5	6
» 20 » 25 » . . . . .	312	240	72	16	23	121	6	7	1	31	9	11	8	10	..	17	18	8	4	19	3
» 25 » 30 » . . . . .	218	166	52	15	15	72	3	8	..	19	7	6	5	7	1	10	14	7	5	22	2
» 30 » 40 » . . . . .	347	262	85	37	22	74	4	9	2	46	15	30	10	8	..	17	19	12	10	29	3
» 40 » 50 » . . . . .	332	269	63	48	20	63	..	15	2	51	13	24	11	6	1	25	5	16	6	21	5
» 50 » 60 » . . . . .	368	303	65	58	26	59	2	9	2	79	12	28	13	10	1	15	4	13	3	32	2
» 60 » 70 » . . . . .	260	216	44	60	21	37	..	4	2	51	6	24	8	5	1	8	4	5	..	22	2
» 70 » 80 » . . . . .	120	102	18	27	8	15	..	3	..	27	3	12	4	3	1	4	..	3	..	8	2
» 80 anni compiuti . . . . .	28	20	8	6	4	4	..	..	..	5	..	3	3	..	..	..	1	..	..	2	..
Età ignota . . . . .	9	6	3	..	..	5	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..
TOTALE . . . . .	2 156	1 705	451	281	152	501	21	59	9	320	68	147	66	56	5	112	76	69	29	160	25

TAV. XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione.

Anno 1904.

Anno 1904.

MEZZI DI UCCISIONE	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.
Per annegamento . . . . .	433	281	152	152	101	51	205	127	78	65	42	23	11	11	..
Con armi da fuoco . . . . .	522	501	21	317	305	12	162	156	6	29	27	2	14	13	1
Con armi da taglio . . . . .	68	59	9	28	25	3	31	27	4	7	5	2	2	2	..
Per impiccamento . . . . .	388	320	68	133	112	21	190	156	34	62	49	13	3	3	..
Per precipitazione . . . . .	213	147	66	79	55	24	95	71	24	35	19	16	4	2	2
Per schiacciamento . . . . .	61	56	5	33	33	..	21	17	4	4	3	1	3	3	..
Per avvelenamento . . . . .	188	112	76	97	57	40	70	42	28	16	8	8	5	5	..
Per asfissia . . . . .	98	69	29	36	27	9	45	29	16	11	9	2	6	4	2
Per altri mezzi o per mezzi non determinati . . . . .	185	160	25	88	78	10	69	58	11	21	18	3	7	6	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>2 156</b>	<b>1 705</b>	<b>451</b>	<b>963</b>	<b>793</b>	<b>170</b>	<b>888</b>	<b>683</b>	<b>205</b>	<b>250</b>	<b>180</b>	<b>70</b>	<b>55</b>	<b>49</b>	<b>6</b>

**TAV. XIII. — Suicidi in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per sesso e secondo la condizione o professione (a).**

Anno 1904.

Anno 1904.

PROFESSIONI	SUICIDI	PROFESSIONI	SUICIDI
-------------	---------	-------------	---------

**Maschi.**

Agricoltori, giardinieri, boscaioli . . . . .	358	Marinai, barcaiuoli, pescatori . . . . .	13
Braccianti e giornalieri . . . . .	82	Pastori, mandriani . . . . .	12
Proprietari e benestanti . . . . .	86	Facchini, brentatori lavandai . . . . .	21
Negozianti, industriali, albergatori, spedizionieri, agenti di cambio . . . . .	111	Caffettieri, liquoristi, bettolieri, trattori, vinai . . . . .	25
Calzolai, sellai . . . . .	58	Studenti . . . . .	38
Falegnami, ebanisti, carrai . . . . .	53	Macellai, pizzicagnoli, salsamentari . . . . .	14
Muratori, imbianchini . . . . .	61	Guardie carcerarie, doganali, daziarie, civiche e campestri . . . . .	23
Tipografi, litografi . . . . .	14	Fruttivendoli, erbivendoli, pescivendoli, merciai ambulanti . . . . .	17
Filatori e tessitori . . . . .	10	Barbieri . . . . .	17
Minatori, marmisti . . . . .	6	Avvocati, procuratori, notai, magistrati . . . . .	11
Operai senza specificazione d'industria . . . . .	52	Medici, veterinari . . . . .	9
Fabbrì, maniscalchi, calderai, meccanici, ecc. . . . .	62	Commessi di studio e di negozio . . . . .	42
Cocchieri, conduttori di tramways, carrettieri, ecc. . . . .	18	Maestri e professori . . . . .	16
Impiegati pubblici e privati e pensionati civili . . . . .	124	Camerieri di caffè, d'albergo . . . . .	13
Sacerdoti, monaci . . . . .	7	Militari e pensionati militari . . . . .	77
Sarti . . . . .	21	Altre professioni e professioni ignote . . . . .	168
Servi, uscieri, portieri, infermieri . . . . .	31		
Mugnai, panettieri, pastai . . . . .	27		
		<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>1 694</b>

**Femmine.**

Contadine, ortolane . . . . .	103	Maestre . . . . .	6
Pastore . . . . .	2	Stiratrici . . . . .	2
Braccianti . . . . .	5	Levatrici . . . . .	2
Filatrici e tessitrici . . . . .	11	Artiste di canto . . . . .	1
Sarte, modiste, cucitrici, bustaie . . . . .	24	Cameriere, domestiche . . . . .	15
Operaie in genere . . . . .	4	Lavandaie . . . . .	2
Merciaie, commercianti . . . . .	2	Portinaie . . . . .	2
Ostesse . . . . .	4	Donne di casa . . . . .	178
Cuoche . . . . .	1	Altre professioni e professioni non determinate . . . . .	53
Agiate . . . . .	31		
Pensionate . . . . .	1		
Monache . . . . .	1		
		<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>450</b>

(a) Non sono compresi in questo prospetto undici maschi ed una femmina suicidatisi in età inferiore ai 15 anni.

