

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1907




ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1909



I N D I C E

INTRODUZIONE.

CAPO I. — Avvertenze preliminari.

§ 1. — Metodo e fonti.	Pag.	III
§ 2. — Ordine delle tavole analitiche	"	V
§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità	"	V

CAPO II. — Mortalità nel Regno e nelle singole provincie.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1907 e confronti cogli anni precedenti.	"	X
§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1887-1907	"	XI
§ 3. — Morti avvenute nell'anno 1907 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia	"	XXXI
§ 4. — Distribuzione geografica di alcune malattie, specialmente infettive, negli anni 1905, 1906 e 1907	"	XXXIII
§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità	"	XLI
§ 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso	"	XLI
§ 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età	"	XLI
§ 8. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini	"	XLVII
§ 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile	"	XLIX

CAPO III. — Mortalità nei comuni urbani più importanti.

§ 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, durante il periodo 1881-1907	"	LIII
§ 2. — Mortalità nelle città principali durante gli anni 1906 e 1907	"	LVI

CAPO IV. — Notizie particolari sulle morti violente.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1907	"	LXII
§ 2. — Morti per infortunio accidentale negli anni 1905-1907 classificati per compartimenti, sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento	"	LXIII
§ 3. — Morti per omicidio negli anni 1905-1907 classificati secondo il sesso e il mezzo d'uccisione	"	LXVIII
§ 4. — Morti per suicidio negli anni 1905-1907 classificati per compartimenti, sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione	"	LXVIII
Elenco nosologico adottato per la statistica delle cause di morte	"	LXXV

TAVOLE.

TAV.	I. — Morti classificati secondo 168 cause di morte:	
	A. — Per provincie	Pag. 2
	B. — Per compartimenti e pel complesso del Regno	» 32
„	II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1907, classificati per sesso e per principali cause di morte	» 42
„	III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e principali cause di morte	» 44
„	IV. — Maschi morti in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per professioni e principali cause di morte	» 52
„	V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia o di circondario e in altri 83 Comuni, classificati secondo le principali cause di morte	» 56
„	VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno in età di non oltre 5 anni compiuti, classificati per sesso e principali cause di morte	» 76
„	VII. — Morti violente accidentali classificate per età, per sesso e secondo le cause che le produssero	» 77
„	VIII. — Morti violente accidentali classificate secondo le cause che le produssero, per sesso e per mesi	» 78
„	IX. — Maschi morti per causa violenta accidentale in età di oltre 15 anni compiuti, classificati secondo la causa della morte e la condizione o professione	» 80
„	X. — Suicidi classificati per compartimenti, per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione	» 82
„	XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età	» 83
„	XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione	» 84
„	XIII. — Suicidi in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per sesso e secondo la condizione o professione	» 85





STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1907.

INTRODUZIONE.

CAPO I.

AVVERTENZE PRELIMINARI.

§ 1. — Metodo e fonti.

La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto; col principio del 1887 essa fu estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questa statistica si fa raccogliendo, sopra una scheda nominativa per ciascun defunto, la dichiarazione della malattia che causò la morte, formulata e firmata dal medico curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che ha dato il permesso di seppellimento; per bambini morti poco dopo il parto si accettano anche le dichiarazioni fatte dalle levatrici.

Le dichiarazioni originali si spediscono ogni mese dai sindaci dei singoli Comuni, pel tramite della Prefettura, all'Ufficio centrale di statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna di esse con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita. Non mancano adunque le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza tecnica, sia in coloro che dichiarano le cause di morte, sia in quelli che ne fanno la classificazione per la statistica sanitaria, poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono dai documenti originali, non da copie.

I medici hanno sempre concorso volenterosamente a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza; poche, relativamente, sono state le lacune per mancate denunce, come vedremo in appresso; e queste non furono cagio-

nate quasi mai da rifiuto dei medici a rilasciare il certificato, ma perchè in parecchi Comuni molto appartati, specialmente di montagna, accade non di rado che soccombano persone, senza aver ricevuto assistenza sanitaria, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di determinare la malattia che fu causa della morte, in modo che si possa poi classificare sotto una delle voci dell'elenco nosologico adottato (a).

Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria, è stato fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia che ne fu la causa, cosicchè la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti, delle quali si è potuto accertare la causa, sono distribuite sotto 168 voci, secondo un elenco preparato da apposita Commissione medica nel 1881, e leggermente ritoccato una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Queste modificazioni consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppate in una rubrica sola. Si è creduto opportuno di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, ed anche in omaggio ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica nelle riunioni tenute a Vienna ed a Cristiania.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti in 168 voci per ciascuno dei Comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Convieni conciliare le ragioni della spesa con quelle della scienza che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo col'offrire la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni di ciascuna provincia e per il complesso del Regno; limitandoci a dare per ciascun Comune capoluogo di provincia o di circondario, per parecchi Comuni capiluoghi di distretto e per alcuni altri Comuni più popolosi, le cifre dei morti per talune malattie meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica. (b).

In fine della presente Introduzione (pagina LXXV) è riportato l'elenco delle malattie secondo il quale sono fatte le classificazioni.

(a) Simili lacune si osservano nelle statistiche sanitarie dell'Inghilterra, della Scozia, dell'Irlanda e del Belgio. Negli altri Stati che pubblicano la statistica delle cause di morte, l'elenco nosologico comprende uno scarso numero di voci, e le morti *per causa ignota o male determinata*, sono spesso sommate insieme a quelle avvenute *per altre malattie*, cioè per malattie non specificate tassativamente nella classificazione.

(b) Nelle statistiche per gli anni dal 1894 al 1901 i Comuni non capiluoghi, per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti erano quelli che al 1° gennaio 1882 contavano più di 15,000 abitanti. A cominciare dall'anno 1902 furono date a parte le notizie, oltrechè per i Comuni capiluoghi di provincia, di circondario e per taluni capiluoghi di distretto, anche per i Comuni che al 10 febbraio 1901 avevano più di 20,000 abitanti e per altri 5, che quantunque nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano oltre 15,000, e ciò allo scopo di mantenere, nei limiti del possibile, l'uniformità, e quindi la possibilità dei confronti, fra le statistiche degli anni 1902-1907 e quelle degli anni precedenti.

§ 2. — Ordine delle tavole analitiche.

La presente statistica si svolge in XIII tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta, come si è detto, di 168 voci.

La seconda dà la classificazione dei morti nel complesso del Regno in ciascun trimestre dell'anno 1907, colla divisione per sesso e per le cause di morte più importanti.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia delle cause di morte più importanti, nel complesso del Regno.

La quarta dà la classificazione dei maschi morti in età di oltre 15 anni compiuti per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, nei 137 capiluoghi di circondario, nei 17 principali capiluoghi di distretto e in 66 altri Comuni.

La sesta classifica i bambini illegittimi e gli esposti morti in età non superiore a 5 anni compiuti secondo la causa della morte.

Le rimanenti tavole danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

In questa Introduzione sono riassunti ed illustrati i dati esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1907 vi sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendo fino al 1887 e, quando era possibile, fino al 1881.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre effettive, quanto in rapporti proporzionali alla popolazione calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente.

§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità.

I quozienti di mortalità esposti in questo volume si sono ottenuti dal confronto del numero dei morti colla popolazione presumibilmente presente alla metà di ciascuno degli anni del periodo preso in esame, dedotta da quelle calcolate pel 1° gennaio e per il 31 dicembre dell'anno stesso, poichè, rappresentando essa con maggiore esattezza la popolazione media, permette di ottenere proporzioni più precise.

Fino al 1900 la popolazione media di ciascun anno è stata calcolata sottraendo dalle cifre della popolazione presente al 10 febbraio 1901 (32,475,253) quella rilevata col censimento del 1° gennaio 1882 (28,459,628), per dedurne l'aumento complessivo nell'intervallo e quindi l'aumento medio annuale, nella supposizione che questo aumento fosse avvenuto in proporzione aritmetica.

Per il calcolo della popolazione negli anni dal 1901 al 1904 si era, nei volumi riferentisi a quegli anni, seguito un procedimento analogo, partendo dalla ipotesi che avesse continuato a verificarsi un aumento medio annuale identico a quello riscontrato nell'intervallo fra i due ultimi censimenti. Si era soltanto fatta eccezione per circondari nei quali il censimento del 1901 aveva indicato una popolazione minore di quella censita nel 1882; per questi eransi mantenute invariate dal 1901 in poi le cifre di popolazione date dall'ultimo censimento, non potendosi determinare con sufficiente esattezza se ed in quanto avesse continuato nei medesimi il movimento regressivo. Secondo questo procedimento, la popolazione alla metà del 1907 sarebbe risultata, pel complesso del Regno, di 34,117,757 abitanti.

Se non che, il movimento d'emigrazione per l'estero si è fortemente accentuato a cominciare dal 1901, superando annualmente di gran lunga quello verificatosi negli anni intercedenti fra il terzo ed il quarto censimento; di guisa che l'aumento medio annuale della popolazione deve essere ora più basso di quello avvenuto fra il 1882 ed il 1901. Si è perciò creduto opportuno di modificare il calcolo dell'aumento della popolazione, a cominciare dall'anno 1905, seguendo un metodo più diretto.

Per disposizione del R. decreto 4 aprile 1873, n. 1363, serie II, ogni Comune tiene un registro della sua *popolazione stabile*, nel quale nota le variazioni che avvengono per fatto di nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni. La tenuta di questo registro fu resa più semplice e sempre meglio rispondente a' suoi scopi con altro R. decreto in data 21 settembre 1901, n. 445. A ciascun Comune si è chiesta notizia delle variazioni avvenute nel numero degli abitanti per effetto di immigrazioni e di emigrazioni in rapporto con altri Comuni del Regno e coll'estero, in ciascun anno, dal 10 febbraio 1901 al 31 dicembre 1907; per ciò che riguarda il movimento delle nascite e delle morti nello stesso settennio, si è preferito attenersi alle risultanze dei registri degli atti dello stato civile, che sono più sicure di quelle dei registri anagrafici.

Le due fonti di notizie sopra indicate hanno fornito per il detto periodo (10 febbraio 1901 al 31 dicembre 1907), i dati seguenti:

Nati	N.	7,368,892
Morti	„	4,906,892
Nuovi iscritti nel registro di popolazione perchè immigrati:		
Da altri Comuni del Regno	N.	3,819,970
Dall'estero	„	435,425
Cancellati dal registro di popolazione perchè emigrati:		
Per altri Comuni del Regno	N.	3,235,224
Per l'estero	„	1,461,369

Devono essere iscritti nel registro della popolazione stabile di ciascun Comune, come provenienti da altri Comuni del Regno, gli individui isolati e le famiglie che vengono a fissare nel Comune la propria dimora abituale, lasciando quella che avevano

altrove nel Regno; contemporaneamente essi dovrebbero essere cancellati dai registri dei Comuni di loro precedente dimora. Adunque, a un totale di 3,819,970 nuove iscrizioni, fatte fra il 10 febbraio 1901 ed il 1° gennaio 1908, avrebbero dovuto corrispondere altrettante cancellazioni, ma queste ultime si effettuarono solamente per 3,235,224 individui. La differenza di 584,746 fra le due cifre dipende dal modo imperfetto nel quale è tenuto il Registro, tantochè, per ogni 100 iscrizioni, si ebbero soltanto 85 cancellazioni.

Gli Uffici municipali possono più facilmente aver notizia delle persone le quali vengono a fissare la loro dimora nell'ambito del rispettivo territorio (poichè esse, per molteplici esigenze amministrative e fiscali o per richieste di pubblica assistenza, devono dare contezza di sè e delle loro famiglie alle Amministrazioni locali), che non essere informati di quelle che partono senza darne alcun avviso; donde consegue che le cifre della popolazione dei singoli Comuni, dedotte dai registri anagrafici, riescono d'ordinario più alte di quelle rilevate ad una stessa data per mezzo di un censimento generale.

Questo difetto nella cancellazione degli emigrati non vizia il calcolo dei movimenti di migrazione interna permanente che venga fatto per l'insieme del Regno, potendosi esso basare sul solo numero delle nuove iscrizioni, che è più esatto. Ma, volendo stabilire un bilancio, per provincie e compartimenti, degli aumenti e delle diminuzioni dipendenti da questi scambi reciproci, occorre integrare le cifre delle emigrazioni per farle coincidere nel loro complesso con quelle delle immigrazioni.

Per fare questa integrazione si è supposto che la deficienza riscontrata nelle cifre riguardanti l'intero Regno, siasi verificata in uguale proporzione nella tenuta dei registri anagrafici di tutti i Comuni d'ogni provincia. In altri termini, si sono aumentate le cifre dei cancellati per emigrazione in altri Comuni del Regno, risultanti dai registri anagrafici per ciascuna provincia, del 25. 8 per cento nel 1901 e 1902, del 27. 9 nel 1903, del 13. 9 nel 1904, del 12. 0 nel 1905, del 13. 3 nel 1906 e del 13. 8 nel 1907. La differenza fra il numero dei nuovi iscritti e quello dei cancellati dai registri negli ultimi quattro anni è stata minore che nei primi tre, il che dimostra come la tenuta dei registri di popolazione da parte delle Amministrazioni comunali sia migliorata.

Per ciò che riguarda i movimenti migratorii in rapporto coll'estero, nei registri anagrafici non si prende nota di tutti gli emigrati, nè di tutti i rimpatriati, ma si cancellano soltanto quelli per i quali l'Ufficio municipale ha fondati motivi di ritenere che intendano di espatriare a tempo indefinito, e si inscrivono come immigrati coloro che dopo essere stati cancellati in anni precedenti ritornarono in patria, come pure gli individui italiani e stranieri venuti per la prima volta dall'estero in Italia a fissarvi la propria dimora.

Con queste norme è stata calcolata la popolazione media dell'anno 1907 in ciascuna provincia (prospetto n. 1), risultante dalla semisomma di quelle calcolate pel 1° gennaio e pel 31 dicembre dello stesso anno.

Non si può assicurare che le cifre degli immigrati e degli emigrati in rapporto

coll'estero, desunte dai registri anagrafici, rappresentino esattamente questo movimento dislocativo; ciò non di meno il calcolo così istituito lo indica con un'approssimazione maggiore di quella che si poteva ottenere col metodo adottato prima del 1905. Secondo tale calcolo, alla metà dell'anno 1907 si trovavano nel Regno 33,776,087 abitanti, cioè 341,670 in meno di quelli che sarebbero risultati con l'altro procedimento; ed in otto provincie, e cioè in quelle di Mantova, Pavia, Macerata, Campobasso, Avellino, Salerno, Potenza e Palermo, la popolazione sarebbe diminuita in confronto di quella censita nel 1901, mentre col metodo precedente si supposeva invariata la popolazione di una sola provincia (Potenza) ed in continuo aumento quella di tutte le altre.

Con procedimento analogo si è calcolata la popolazione in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia al 1° luglio 1907 (che è l'anno al quale si riferisce la presente statistica), colla sola differenza che nel determinare l'aumento naturale per eccedenza delle cifre dei nati su quelle dei morti non si è tenuto conto di tutti gli atti di stato civile formati nel Comune, ma soltanto delle nascite e delle morti avvenute nella popolazione stabile, sia nel territorio del Comune, sia fuori di esso. Si è adottato questo procedimento, che è pure quello prescritto dal regolamento vigente per la tenuta del registro di popolazione, perchè nelle grandi Città, che sono sedi di importanti istituti ospitalieri e di grosse guarnigioni, avvengono numerosi casi di morte di persone che vi si trovavano solo occasionalmente. La popolazione nel complesso dei 69 capiluoghi di provincia, al 1° luglio 1907, è risultata di 6,030,781 abitanti.

Si è ommesso di fare un calcolo analogo per ciascuno dei 137 capiluoghi di circondario, dei 17 principali capiluoghi di distretto e dei 61 Comuni non capiluoghi che contavano più di 20,000 abitanti, perchè il modo imperfetto col quale sono registrate le migrazioni fra Comune e Comune, rendono questo calcolo tanto meno sicuro quanto più piccola è la circoscrizione territoriale alla quale lo si deve applicare. Per procedere ad uno studio speciale sulla mortalità di questi tre gruppi di Comuni, si attende che un nuovo censimento fornisca cifre esatte circa il numero dei loro abitanti.

Nel prospetto n. 1 è indicata la popolazione di ciascuna provincia e di ciascun Comune capoluogo di provincia alla metà dell'anno 1907 calcolata col metodo suaccennato, e nel prospetto n. 2 è segnata la popolazione del Regno e quella dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, presi insieme, alla metà di ciascuno degli anni dal 1887 al 1907.

Popolazione presente in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, calcolata alla metà dell'anno 1907 (a).

PROSPETTO N. 1.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE MEDIA dell'anno 1907		PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE MEDIA dell'anno 1907	
	delle provincie e dei comparti- menti	dei Comuni capiluoghi di provincia (b)		delle provincie e dei comparti- menti	dei Comuni capiluoghi di provincia (b)
Alessandria	841 744	71 513	Ancona	307 274	61 058
Cuneo	654 703	26 712	Ascoli Piceno	248 015	27 794
Novara	778 672	52 197	Macerata	257 354	23 446
Torino	1 157 790	363 940	Pesaro e Urbino	260 838	25 735
PIEMONTE	3 432 909	514 362	MARCHE	1 073 481	138 033
Genova	1 013 184	269 127	Perugia - UMBRIA	690 676	65 019
Porto Maurizio	152 388	8 451	Roma - LAZIO	1 289 200	528 764
LIGURIA	1 165 572	277 578	Aquila degli Abruzzi	402 812	19 900
Bergamo	506 265	52 884	Campobasso	365 906	13 850
Brescia	561 763	73 630	Chieti	375 942	25 486
Como	617 816	41 918	Teramo	316 044	23 585
Cremona	333 732	40 304	ABRUZZI E MOLISE	1 460 704	82 821
Mantova	309 715	28 772	Avellino	399 787	22 481
Milano	1 565 271	567 889	Benevento	258 335	23 820
Pavia	493 193	36 121	Caserta	790 548	32 517
Sondrio	132 435	8 469	Napoli	1 198 454	591 680
LOMBARDIA	4 520 190	849 987	Salerno	559 216	43 415
Belluno	211 889	20 993	CAMPANIA	3 206 340	713 913
Padova	479 693	89 117	Bari delle Puglie	859 042	82 935
Rovigo	230 658	10 312	Foggia	441 947	60 137
Treviso	456 156	35 842	Lecce	751 238	35 352
Udine	657 185	40 053	PUGLIE	2 052 227	178 424
Venezia	434 923	158 584	Potenza - BASILICATA	469 963	15 026
Verona	442 592	78 050	Catanzaro	487 824	33 035
Vicenza	477 269	47 774	Cosenza	480 095	21 243
VENETO	3 390 365	480 725	Reggio di Calabria	449 247	42 167
Bologna	538 160	161 267	CALABRIE	1 417 166	96 445
Ferrara	287 694	87 666	Caltanissetta	336 887	45 296
Forlì	290 862	42 451	Catania	731 960	161 556
Modena	329 939	66 001	Girgenti	378 636	25 092
Parma	297 133	50 988	Messina	548 189	160 469
Piacenza	247 908	43 601	Palermo	763 884	315 824
Ravenna	239 529	66 615	Siracusa	448 332	35 206
Reggio nell'Emilia	286 695	63 434	Trapani	369 446	66 484
EMILIA	2 517 920	582 023	SICILIA	3 577 334	809 927
Arezzo	279 759	48 020	Cagliari	513 428	54 964
Firenze	979 511	222 824	Sassari	332 649	39 693
Grosseto	152 975	11 992	SARDEGNA	846 077	94 657
Livorno	133 599	106 178	Regno	33 776 087	6 030 781
Lucca	335 735	80 235			
Massa e Carrara	212 351	30 414			
Pisa	334 361	63 154			
Siena	237 672	40 260			
TOSCANA	2 665 963	603 077			

(a) Per il metodo seguito nel calcolare la popolazione delle singole provincie e dei 69 Comuni capiluoghi, veggansi le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I (pag. V e seg.).

(b) Nel calcolare la popolazione dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, si è tenuto conto delle variazioni di territorio avvenute dal 10 febbraio 1901 al 1° luglio 1907.

CAPO II.

MORTALITÀ NEL REGNO E NELLE SINGOLE PROVINCE.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1907 e confronti cogli anni precedenti.

Durante l'anno 1907 morirono 700,333 individui, esclusi i bambini nati-morti, ma compresi quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto, quantunque fossero morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile: vi figurano, ad esempio, 759 bambini morti per asfissia o apoplessia nel parto, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

Confrontando le cifre dei morti con quelle della popolazione presente o di fatto calcolata alla metà dello stesso anno 1907 (a), si trova un quoziente di 20.73 morti ogni 1000 abitanti.

Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia morirono 134,631 individui, ciò che dà un quoziente di mortalità di 22.32 ogni 1000 abitanti.

Nel prospetto seguente, ove, i dati del 1907 sono raffrontati a quelli dei venti anni precedenti, si rileva che la mortalità è venuta scemando dal 1887 in poi.

Numero dei morti nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia durante gli anni 1887-1907.

PROSPETTO N. 2.

ANNI	REGNO			CAPILUOGHI DI PROVINCIA (69 Comuni)		
	Popolazione media	Morti		Popolazione media	Morti	
		cifre effettive	per ogni 1000 abitanti		cifre effettive	per ogni 1000 abitanti
1887	29 614 430	828 992	27.99	4 835 074	140 275	29.01
1888	29 825 022	820 431	27.51	4 892 157	139 566	28.53
1889	30 035 038	768 068	25.57	4 949 084	130 600	26.39
1890	30 245 054	795 911	26.32	5 006 011	138 504	27.67
1891	30 455 070	795 327	26.11	5 062 938	139 629	27.58
1892	30 665 662	802 779	26.18	5 120 021	138 259	27.00
1893	30 875 678	776 713	25.16	5 176 948	136 759	26.42
1894	31 085 694	776 372	24.98	5 233 875	131 030	25.03
1895	31 295 710	783 813	25.05	5 290 802	134 987	25.51
1896	31 506 302	758 129	24.06	5 347 885	129 789	24.27
1897	31 716 318	695 602	21.93	5 404 812	120 710	22.33
1898	31 926 334	732 265	22.94	5 461 739	128 167	23.47
1899	32 136 350	703 393	21.89	5 518 666	126 147	22.86
1900	32 346 366	768 917	23.77	5 575 594	134 547	24.13
1901	32 545 437	715 036	21.97	5 633 204	128 814	22.87
1902	32 744 745	727 181	22.21	5 691 898	129 683	22.78
1903	32 921 317	736 311	22.37	5 750 592	130 549	22.70
1904	33 139 697	698 604	21.08	5 809 447	127 517	21.95
1905	33 362 167	730 340	21.89	5 878 452	137 515	23.39
1906	33 541 094	696 875	20.78	5 942 913	131 728	22.17
1907	33 776 087	700 333	20.73	6 030 781	134 631	22.32

(a) Il metodo col quale è stata calcolata la popolazione alla data predetta è esposto nel paragrafo 3 del capo I di questa Introduzione (pag. v e seg.).

La mortalità nei 69 Comuni capiluoghi di provincia apparisce, in tutti gli anni del periodo 1887-1907, alquanto più alta che nel complesso di tutti i Comuni, e a ciò contribuisce essenzialmente il fatto che i maggiori centri di popolazione sono sede di ospedali o di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei Comuni rurali finitimi.

Le cause delle morti avvenute nel 1907 furono specificate dai medici curanti o necroscopi, per 696,278 casi, e restarono ignote per 4,055, cioè in 6 casi su 1000, dipendenti in gran parte da che il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, o dal fatto che la causa di morte non era stata designata con precisione sufficiente per poterla classificare in una delle voci dell'elenco.

Confrontando le morti delle quali restò ignota la causa col totale delle morti avvenute nell'anno 1907 in ciascun compartimento, si forma il prospetto seguente, da cui si rileva che il numero delle prime è venuto scemando dal 1887 in poi.

Numero delle morti delle quali non si poté determinare la causa negli anni 1887-1907.

PROSPETTO N. 3.

COMPARTI- MENTI	TOTALE dei morti nell'anno 1907	MORTI PER CAUSA IGNOTA O NON DICHIARATA													
		Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 morti												
			Anni										Trienni		
			1907	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1896-98	1893-95	1890-92
Piemonte	64 339	610	9	13	15	19	21	22	25	28	28	29	47	76	72
Liguria	22 644	90	4	3	5	6	5	4	4	6	8	10	13	18	15
Lombardia	100 962	195	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	6	7	8
Veneto	64 883	263	4	3	5	6	6	6	5	6	6	9	11	15	11
Emilia	51 783	191	4	4	4	6	7	7	5	6	6	8	8	11	10
Toscana	50 758	92	2	1	2	4	3	3	2	3	2	4	5	10	12
Marche	21 112	122	6	6	11	9	10	9	11	11	10	14	13	18	17
Umbria	12 942	16	1	1	3	3	2	3	2	3	4	6	9	13	12
Lazio	23 575	171	7	7	8	9	9	11	14	7	9	9	14	11	13
Abruzzi e Molise	28 462	205	7	10	16	20	20	17	21	21	24	27	34	39	37
Campania	70 630	276	4	4	8	9	12	10	9	7	5	7	11	11	15
Puglie	49 034	281	6	4	6	6	7	9	9	6	5	7	7	10	8
Basilicata	12 090	126	10	14	22	31	29	20	26	16	19	26	23	43	32
Calabria	29 734	457	15	16	22	35	37	43	46	39	32	46	61	70	55
Sicilia	80 354	285	4	6	8	10	10	8	10	12	12	20	27	31	23
Sardegna	17 031	675	40	46	59	63	97	96	109	123	114	121	142	137	103
REGNO	700 333	4 055	6	6	9	11	12	12	13	14	13	16	22	28	25

I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non poté determinarsi la causa del decesso, sono più frequenti che altrove in Sardegna e nelle regioni montuose del Piemonte, o con popolazione poco densa nella Basilicata e nelle Calabrie, dove parecchi piccoli centri sono tuttora privi di sanitario, o distano molto dal luogo dove questo risiede.

§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1887-1907.

Nel prospetto seguente sono indicate, in cifre effettive ed in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1907, classificate secondo le malattie che le causarono.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	TRIENNI					
		1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896
		A) Cifre					
1	Asfissia ed apoplezia nel parto . . .	9 660	6 481	2 202	2 188	1 568	1 213
2 a 5	Vizi congeniti	9 656	6 660	1 858	2 860	1 805	1 486
6	Atrofia congenita, immaturità	158 180	162 087	55 525	56 557	54 677	50 457
7	Vaiuolo	47 775	11 380	2 638	2 606	2 998	2 033
8	Morbillo	58 529	46 346	12 953	9 001	11 322	11 499
9	Scarlattina	30 125	22 528	6 596	4 511	3 814	3 234
10	Risipola	14 330	11 420	4 104	3 683	3 463	3 197
11	Febbre tifoidea	69 206	54 944	15 065	13 639	15 590	16 397
12	Tifo petecchiale		234	56	47	9	80
13	Meningite cerebro spinale epidemica .	590	84	2 014	1 262	176	409
14 e 15	Difterite e laringite crupale	73 804	48 440	17 783	15 585	11 466	9 286
16	Ipertosse	31 048	29 667	6 847	8 261	8 678	6 660
17	Influenza	1 642	32 108	2 710	14 668	3 773	6 576
18	Febbri da malaria	53 214	49 407	15 301	15 296	16 464	14 023
19	Cachessia da malaria						
20	Dissenteria	17 097	2 304	203	33	148	717
21	Colera asiatico	8 150	..	3 040	20
22	Sifilide	5 884	6 542	2 379	2 364	2 313	2 307
23	Setticemia, piemia	6 414	3 185	1 136	1 166	1 379	1 116
24	Pustola maligna, carbonchio	1 939	1 821	598	635	621	453
25	Moccio, cimurro	48	23	9	10	..	6
26	Lebbra	47	12	3	5	8	17
27	Rabbia	327	255	83	93	53	71
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	83	4 537	1 634	2 866	435	205
29	Tubercolosi disseminata	27 532	26 519	8 446	8 685	9 868	7 767
31	Tubercolosi polmonare, tisi	95 770	93 893	29 934	31 484	31 756	33 302
30	Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito	16 718	17 310	6 283	5 501	4 497	4 861
32	Tabes mesenterica	37 774	33 252	10 944	10 142	10 144	10 351
33	Scrofola disseminata	8 991	7 544	2 066	2 119	1 844	1 908
34	Lupo	224	299	84	49	126	106

(a) Per maggiori schiarimenti vedasi l'elenco più particolareggiato dato a pagina LXXV.
 (b) Compresi 6 morti per peste bubbonica.

dal 1887 al 1907, classificate secondo le cause.

NUMERO dell'elenco nosologico	ANNI											
	1887	1888	1889	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	
	effettive.											
1	1 101	1 000	1 031	1 007	848	864	679	811	976	711	759	1
2 a 5	1 572	1 537	1 435	1 353	1 298	1 324	1 354	1 388	1 716	1 777	1 909	2 a 5
6	46 690	46 869	45 948	49 400	50 454	50 684	47 057	46 345	45 293	41 441	42 049	6
7	1 003	420	214	316	3 396	2 413	6 049	3 093	482	169	451	7
8	6 156	5 429	7 433	8 827	5 562	9 961	7 283	5 332	6 738	9 726	8 184	8
9	3 907	4 492	4 487	1 483	1 185	1 338	1 991	1 611	1 689	2 724	2 940	9
10	2 779	2 939	2 983	2 633	2 568	2 609	3 149	2 885	2 479	2 334	2 581	10
11	15 557	17 412	14 963	15 060	11 748	11 358	11 671	12 239	10 896	9 424	8 614	11
12	25	8	1	2	17	3	2	9	38	35	39	12
13	216	31	74	21	5	9	3	80	288	91	92	13
14 e 15	8 881	7 808	6 893	5 790	5 444	4 514	4 064	4 519	4 255	4 253	5 634	14 e 15
16	7 938	7 420	7 886	6 565	6 916	7 202	6 521	5 958	5 767	6 165	6 142	16
17	3 750	8 765	4 264	17 306	4 079	3 821	7 132	3 794	6 870	4 309	8 043	17
18	11 947	11 378	8 605	12 815	10 552	7 319	6 414	6 357	5 696	3 782	3 251	18
19	230	154	131	52	66	52	34	14	197	15	6	20
20	21
21	2 205	2 247	2 354	2 117	1 965	2 009	1 919	1 849	1 986	1 814	1 757	22
22	1 146	1 292	1 263	1 526	1 605	1 653	1 807	1 921	1 550	1 684	1 946	23
23	460	433	461	330	341	403	396	355	306	305	314	24
24	2	7	4	2	..	3	2	3	2	2	1	25
25	21	27	14	11	6	5	11	12	12	10	10	26
26	102	66	80	63	55	56	58	45	47	60	56	27
27	90	31	26	10 (b)	34	7	11	26	234	1 068	139	28
28	7 690	7 787	4 729	2 339	2 300	2 636	3 662	3 666	5 979	6 840	6 172	29
29	30 980	30 548	35 078	39 394	36 212	33 086	33 262	35 486	34 370	34 059	35 796	31
30	4 453	4 535	5 898	5 920	5 751	5 515	5 471	5 465	5 683	5 679	5 864	30
31	9 263	9 124	8 780	9 155	8 117	7 858	7 251	7 291	7 277	6 187	5 865	32
32	1 795	1 571	1 425	1 384	1 248	1 116	1 122	1 039	1 122	1 052	989	33
33	100	85	118	128	102	96	115	106	101	101	125	34

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					
		1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896
Segue A) Cifre							
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott	(a) 3 506	(a) 3 471	(a) 1 230	(a) 1 103	1 691	1 911
38	Rachitide	8 610	9 344	2 764	2 501	2 806	3 159
39 e 40	Anemia e leucemia	29 561	24 989	7 473	6 697	9 162	9 737
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia	1 603	1 523	552	433	487	503
43	Scorbuto	1 445	1 315	301	283	439	360
44	Marasmo senile	86 127	97 232	33 029	34 384	39 036	37 656
45	Pellagra	10 284	12 286	3 250	3 028	3 271	3 076
46	Gotta	670	364	109	133	153	153
47	Diabete	1 595	2 109	704	700	771	833
48 a 58	Tumori maligni	38 179	39 080	13 234	13 841	15 089	15 482
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	43 621	42 931	16 412	14 774	18 519	16 602
60	Mielite, tabe dorsale						
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	12 050	14 632	4 447	4 557	5 024	3 681
64	Apoplezia e congestione cerebrale						
62	Paralisi infantile	97 527	93 315	30 619	31 107	31 926	30 639
66	Rammollimento cerebrale						
65	Tumori cerebrali e spinali (b)						
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	4 439	6 165	2 302	2 071	1 807	3 923
73	Successioni della pazzia						
63	Encefalite	7 249	5 080	1 140	1 234	1 390	1 408
68 e 69	Epilessia ed isterismo	6 359	6 547	2 069	1 905	2 026	1 884
70	Corea	329	292	100	83	97	93
71	Tetano e trisma	2 576	2 004	677	802	960	800
72	Eclampsia infantile	71 022	66 066	20 883	19 839	20 161	19 716
74	Malattie degli occhi (b)	144	276	102	81		
75	Malattie degli orecchi (b)	777	1 291	428	438	388	540
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea e della laringe (b)	7 654	11 589	3 885	2 906	1 772	1 855
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c)	198 658	238 550	73 719	77 419	76 774	72 646

(a) Queste cifre si riferiscono alla sola *sinovite fungosa* e non comprendono i morti per *tubercolosi delle ossa*, che, negli anni anteriori al 1895, si sommano con quelli per *malattie delle ossa in genere*.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Per gli anni 1899-1907 la voce: « *bronchite acuta e cronica* » comprende due numeri: nel primo si sono classificati i morti per *bronchite acuta*, nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

dal 1887 al 1907, classificate secondo le cause.

NUMERO dell'elenco nosologico	ANNI												
	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		
35, 36 e 37	1 910	2 076	2 110	1 967	2 032	2 086	2 155	2 194	2 480	2 402	2 514	35, 36 e 37	
38	3 153	2 803	3 231	3 539	3 275	3 231	3 305	2 944	3 370	2 817	2 739	38	
39 e 40	9 475	9 547	9 376	9 795	9 364	9 783	10 138	8 911	9 315	14 651	11 346	39 e 40	
41 e 42	411	439	476	508	433	459	480	476	591	547	517	41 e 42	
43	236	299	260	265	205	226	214	160	217	193	164	43	
44	36 557	41 595	41 870	47 760	46 367	46 398	46 779	43 942	47 583	45 953	48 601	44	
45	2 807	3 987	3 836	3 788	3 054	2 376	2 647	2 363	2 357	2 024	1 635	45	
46	164	144	146	133	129	127	124	126	132	185	186	46	
47	882	894	1 026	1 082	1 071	1 154	1 139	1 242	1 322	1 394	1 535	47	
48 a 58	15 967	16 330	16 680	16 873	17 141	17 634	17 774	18 860	19 348	20 653	20 668	48 a 58	
59	15 235	15 443	13 892	14 407	13 676	13 923	14 655	14 049	13 026	13 057	11 734	59	
60			2 820	2 874	2 646	2 698	2 734	2 616	2 773	2 427	2 529	60	
61	3 156	3 049		218	150	127	107	165	203	234	322	362	61
64			31 440	32 166	32 711	32 563	33 775	32 991	34 263	33 112	33 270	64	
62	29 082	29 790	199	280	243	268	200	228	293	322	330	62	
66			707	732	834	766	822	841	1 031	836	877	66	
65			390	415	429	437	473	423	532	515	525	65	
67	4 570	4 928	3 548	3 196	2 834	2 801	2 934	3 135	4 215	4 304	4 440	67	
73			71	64	153	130	194	317	1 024	183	178	73	
63	1 164	1 085	1 066	1 208	1 077	1 014	1 079	1 029	1 250	1 186	969	63	
68 e 69	1 780	1 734	1 554	1 816	1 928	1 911	1 832	1 878	1 894	1 700	1 767	68 e 69	
70	75	76	104	76	92	89	105	92	108	72	97	70	
71	767	757	728	702	639	615	535	646	699	750	548	71	
72	18 511	17 782	16 817	17 754	16 483	17 004	15 847	15 423	16 191	14 960	14 714	72	
74			128	55	25	43	30	47	45	30	34	74	
75	535	548	344	402	376	335	368	355	495	446	489	75	
76	1 794	1 730	1 928	1 889	1 901	1 876	1 853	1 908	1 903	1 298	860	76	
77 e 78	62 362	64 733	51 537	58 029	53 652	56 910	53 721	49 112	46 556	46 998	47 869	77 e 78	
			7 047	8 275	8 555	7 587	8 687	8 289	10 066	7 611	7 933		

1895, si sommano con quelli per *malattie delle ossa in genere*.
 acuta, nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					
		1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896
<i>Segue A) Cifre</i>							
79	Malattie della pleura (a)	14 392	12 938	3 935	3 598	3 656	3 421
80	Congestione ed apoplezia polmonare .	7 912	5 220	1 187	1 268	477	379
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (b)	209 790	225 378	76 616	78 269	80 250	78 508
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	15 981	12 554	2 835	2 737	1 784	1 508
84	Malattie della tiroide e del timo (a) .	349	444	171	161	155	173
85	Morbo di Basedow	12 129	11 174	2 791	3 042	2 941	3 223
86	Asma, enfisema	12 391	16 300	6 305	5 740	6 366	5 920
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti	692	649	235	240	196	251
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi .	1 559	1 125	380	220	143	197
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	135 481	144 769	49 214	50 594	53 550	52 374
90, 91 e 93	Malattie del cuore e pericardio, sincope	1 529	1 614	567	508	482	503
92	Angina pectoris	11 718	10 362	3 537	3 046	2 738	2 840
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	725	662	254	206	161	165
95	Orecchioni	6 549	3 925	1 121	1 447	815	953
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	19 084	19 069	7 458	6 686	6 589	7 146
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a) . .	1 972	1 700	582	636	520	560
98	Ulcera rotonda dello stomaco	17 944	17 205	5 587	5 460	5 567	5 504
99	Epatite, cirrosi epatica	377	359	122	119	113	120
100	Atrofia gialla acuta del fegato	322	335	152	151	93	117
101	Calcoli biliari	3 026	3 555	1 360	1 387	1 148	1 377
102	Ittero	1 148	682	172	236	122	213
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	279 614	308 056	103 497	101 344	114 214	108 002
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	5 985	5 602	2 016	1 912	2 196	1 998
105	Volvolo, occlusione intestinale	12 871	10 551	2 955	2 679	2 459	2 243
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (a); idrope ascite	4 766	4 456	1 441	1 408	1 564	1 392
107	Ernie intestinali e addominali	128	129	37	44	56	79
108	Malattie da echinococco	14 159	7 579	2 370	1 895	1 050	1 127
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali						

(a) Esclusi i tumori maligni.
 (b) I morti per polmonite negli anni 1899-1907 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte

1887 al 1907, classificate secondo le cause.

NUMERO dell'elenco nosologico	ANNI											
	1887	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	
<i>effettive.</i>												
	2 988	3 097	2 979	3 044	2 935	2 965	3 034	2 996	2 874	2 711	2 824	79
	263	376	839	714	664	736	773	716	788	760	728	80
	67 417	73 412	43 846	41 996	43 453	40 481	47 400	37 509	38 812	37 350	41 367	81 e 82
			28 309	34 105	31 082	33 592	35 742	32 181	34 268	36 286	39 178	
	1 293	918	1 495	1 379	835	667	631	647	628	702	763	83
	141	127	140	153	115	113	108	113	129	104	115	84
			22	35	58	68	61	60	69	75	112	85
	2 665	2 947	3 089	3 393	2 826	2 570	2 891	2 593	3 010	1 777	2 345	86
	5 990	6 998	7 183	7 575	7 519	7 681	7 945	8 456	9 765	8 850	10 085	87
	208	241	193	201	178	167	162	143	323	261	308	88
	75	47	61	26	44	23	34	26	143	151	313	89
	49 625	54 283	54 809	58 778	59 327	58 672	61 599	59 172	62 890	58 362	59 783	90, 91 e 93
	490	505	613	589	580	638	635	666	782	738	764	92
	2 477	2 492	2 287	2 374	2 126	2 269	1 971	1 870	1 938	1 781	1 517	94
	149	149	138	126	108	118	142	105	128	110	124	95
	912	857	1 127	1 097	1 019	976	1 014	903	974	809	842	96
	7 482	7 841	7 421	8 123	7 340	8 384	7 778	7 813	7 829	4 767	6 188	97
	549	574	490	556	516	520	490	553	497	534	552	98
	5 202	5 264	5 184	5 344	5 092	5 336	5 063	4 994	5 003	4 747	4 816	99
	112	97	109	90	80	112	112	106	113	99	97	100
	122	132	199	185	162	180	189	190	203	158	202	101
	1 440	1 355	1 298	1 294	1 396	1 447	1 398	1 482	1 504	1 676	1 538	102
	115	65	26	28	26	37	43	73	163	89	104	103
	99 622	112 105	94 970	115 138	98 551	111 518	108 678	104 578	115 367	108 853	97 189	104
	2 091	2 214	2 295	2 343	2 259	2 195	2 287	2 227	2 130	2 098	2 033	105
	2 040	2 015	1 903	1 989	1 701	1 663	1 520	1 495	1 386	856	904	106 e 111
	1 319	1 426	1 302	1 369	1 436	1 269	1 295	1 300	1 414	1 333	1 365	107
	63	73	68	81	77	74	72	85	71	80	94	108
	1 533	1 238	1 253	1 206	1 467	1 415	1 283	1 203	1 085	1 149	1 146	109

per pneumonite crupale e nel secondo quelle per bronco polmonite acuta.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					
		1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896
<i>Segue A) Cifre</i>							
110 e 110-a	Appendicite e peritonite	13 690	13 638	5 055	4 907	5 208	5 246
112	Malattie dei reni (b)	23 527	26 742	10 006	10 194	11 206	11 461
113 e 114	Malattie della vescica e calcoli renali e vescicali (b)	7 712	8 099	2 700	2 757	3 237	2 509
115	Malattie dell'uretra e prostata (b)	963	1 154	366	369	390	450
116	Malattie delle capsule surrenali	151	227	77	83	91	74
117	Malattie dei testicoli (b)	218	264	87	80	15	19
118	Malattie dell'ovaia (c)	687	737	251	256	130	186
119	Malattie dell'utero e vagina (c)	3 148	4 725	2 055	1 479	1 099	1 011
120	Malattie delle mammelle (c)	92	162	43	52	13	24
124	Febbre puerperale	7 061	4 845	1 774	1 604	1 514	1 292
21, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	12 869	7 391	2 216	2 444	1 893	2 335
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), cangrena della pelle	9 151	9 909	3 462	3 089	2 418	2 647
129	Elefantiasi degli arabi	95	77	32	30	16	13
130	Favo, foruncoli	733	361	96	71	126	215
131	Pemfigo, eczema, ectima	3 317	3 038	1 109	974	785	797
132	Sclerema	9 022	8 654	2 897	2 829	2 885	2 877
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b)	4 772	4 245	1 066	1 076	968	1 105
134	Reumatismo articolare acuto	2 651	2 693	984	822	915	932
135	Reumatismo cronico	2 850	3 406	948	1 007	943	939
136	Psoite	296	85	6	5	31	17
137	Atrofia muscolare progressiva	385	298	98	111	33	120
138	Alcoolismo cronico	1 283	1 573	646	625	473	557
139	Avvelenamento cronico accidentale o professionale	88	138	37	35	24	28
140 a 156	Morte violenta accidentale	32 814	30 240	10 008	9 891	8 894	9 628
157 e 158	Omicidio (compreso quello d'infante)	4 642	4 282	1 648	1 429	1 487	1 456
159	Condanna alla pena capitale	1	..	1
160 a 168	Suicidio	4 502	5 072	1 737	1 732	1 874	2 000
	Totale dei morti per causa determinata	2 358 054	2 328 181	758 224	758 640	768 817	744 625
	Morti per causa ignota o non dichiarata	59 437	65 836	18 489	17 732	14 996	13 504
	Totale generale	2 417 491	2 394 017	776 713	776 372	783 813	758 129

(a) I morti per peritonite nell'anno 1907 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte per
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.

dal 1887 al 1907, classificate secondo le cause.

NUMERO dell'elenco nosologico	ANNI											NUMERO dell'elenco nosologico
	1887	1888	1889	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	
<i>effettive.</i>												
110 e 110-a	4 755	5 066	4 813	4 981	4 753	5 039	5 239	4 893	4 839	4 050	(a) 645 3 157	110 e 110-a
112	11 409	12 370	12 806	12 390	12 259	13 066	13 421	13 136	13 094	13 486	13 298	112
113 e 114	2 446	2 388	2 567	2 529	2 452	2 487	2 484	2 351	2 365	2 122	2 225	113 e 114
115	452	421	447	488	378	370	464	536	604	572	656	115
116	83	91	102	119	111	112	122	116	129	129	120	116
117	13	15	17	11	8	4	9	8	20	7	6	117
118	181	182	208	176	152	164	140	183	178	36	62	118
119	986	713	598	613	565	523	421	375	431	578	562	119
120	14	15	13	23	13	15	12	8	25	8	4	120
124	1 199	1 214	1 302	1 033	994	1 037	1 112	1 082	977	1 021	1 147	124
21, 122, 123, 125, 126	2 143	2 016	2 270	2 001	1 773	1 770	1 659	1 899	2 221	1 770	1 927	121, 122, 123, 125, 126
127 e 128	2 584	2 379	2 528	2 286	2 215	2 166	2 333	2 332	2 454	2 503	2 724	127 e 128
129	22	11	13	11	3	..	5	8	14	8	15	129
130	156	167	180	152	125	154	169	143	178	171	168	130
131	853	805	793	782	678	713	616	599	629	525	526	131
132	2 714	2 283	2 202	2 262	2 587	2 440	2 303	2 207	2 567	2 171	2 231	132
133	1 132	1 031	1 059	1 035	1 053	1 186	1 134	1 197	1 168	884	999	133
134	827	896	978	927	857	912	983	953	990	988	1 171	134
135	837	682	764	840	775	770	822	852	1 102	907	1 097	135
136	21	17	15	12	18	6	16	14	14	14	24	136
137	113	95	86	51	14	24	9	17	63	105	90	137
138	504	541	555	523	414	400	401	509	837	702	663	138
139	40	28	30	33	31	50	48	60	54	55	57	139
140 a 156	10 304	10 066	10 229	10 184	10 771	10 493	10 322	11 044	13 146	10 820	11 442	140 a 156
157 e 158	1 540	1 706	1 417	1 306	1 262	1 332	1 305	1 312	1 444	1 317	1 283	157 e 158
159	159
160 a 168	1 895	2 059	2 019	2 040	2 014	2 010	1 922	2 156	2 379	2 319	2 445	160 a 168
	684 258	721 289	693 992	758 398	705 579	718 183	727 178	690 850	723 719	692 388	696 278	
	11 344	10 976	9 401	10 519	9 457	8 998	9 133	7 754	6 621	4 487	4 055	
	695 602	732 265	703 393	768 917	715 036	727 181	736 311	698 604	730 340	696 875	700 333	

appendicite e nel secondo quelle per peritonite.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				1893	1894	1895	1896
		1887-89 (media annuale)	1890-92 (media annuale)						
B) Cifre proporzionali									
1	Asfissia ed apoplezia nel parto . . .	108	71	71	70	50	39		
2 a 5	Vizi congeniti	108	73	60	92	58	47		
6	Atrofia congenita, immaturità	1 768	1 774	1 798	1 819	1 747	1 601		
7	Vaiuolo	534	125	85	84	96	65		
8	Morbillo	655	507	420	290	362	365		
9	Scarlattina	337	247	214	145	122	103		
10	Risipola	160	125	133	118	111	101		
11	Febbre tifoidea	886	601	488	439	498	520		
13	Meningite cerebro spinale epidemica .	7	1	65	41	6	13		
14 e 15	Difterite e laringite crupale	825	530	576	501	366	295		
16	Ipertosse	347	325	222	266	277	211		
17	Influenza	18	351	88	472	121	209		
18	Febbri da malaria	595	541	496	492	526	445		
19	Cachessia da malaria	191	25	7	1	5	23		
20	Dissenteria	91	..	98	1		
21	Colera asiatico	66	72	77	76	74	73		
22	Sifilide	72	35	37	38	44	35		
23	Setticemia, piemia	22	20	19	20	20	14		
24	Pustola maligna, carbonchio	1	50	53	92	14	7		
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	307	290	274	279	315	247		
29	Tubercolosi disseminata	1 070	1 028	970	1 013	1 015	1 057		
31	Tubercolosi polmonare, tisi	187	189	203	177	144	154		
30	Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito	422	364	354	326	324	329		
32	Tabes mesenterica	103	86	70	70	63	64		
33 e 34	Scrofola, disseminata e lupo	39	38	40	35	54	60		
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott	96	102	90	80	90	100		
38	Rachitide	331	274	242	215	293	309		
39 e 40	Anemia e leucemia	18	17	18	14	16	16		
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia	962	1 064	1 070	1 106	1 247	1 195		
44	Marasmo senile	115	134	105	97	105	98		
45	Pellagra								

(a) Non si sono fatte le proporzioni ad 1,000,000 di abitanti per quelle cause che hanno dato un numero di morti inferiore a 500, durante il periodo di osservazione dal 1887 al 1907.
(b) Veggasi la nota (a) a pag. XIV.

dal 1887 al 1907, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell'elenco nosologico	ANNI										NUMERO dell'elenco nosologico	
	1887	1888	1889	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906		1907
a 1,000,000 di abitanti.												
1	35	31	32	31	26	26	21	24	29	21	22	1
2 a 5	50	48	45	42	40	40	41	42	51	53	57	2 a 5
6	1 472	1 468	1 430	1 527	1 550	1 548	1 429	1 398	1 358	1 236	1 245	6
7	32	13	7	10	104	74	184	93	14	5	13	7
8	194	170	231	273	171	304	221	161	202	290	242	8
9	123	141	140	46	36	41	60	49	51	81	87	9
10	88	92	93	81	79	80	96	87	74	70	76	10
11	491	545	466	466	361	347	355	369	327	281	255	11
13	7	1	2	1	2	9	3	3	13
14 e 15	280	245	214	179	167	138	123	136	128	127	167	14 e 15
16	250	232	245	203	213	220	198	180	173	184	182	16
17	118	275	133	535	125	117	217	114	206	128	238	17
18	377	356	268	396	324	224	195	192	171	113	96	18
19	7	5	4	2	2	2	1	..	6	1	..	20
21	21
22	70	70	73	65	60	61	58	56	60	54	52	22
23	36	40	39	47	49	50	55	58	46	50	58	23
24	15	14	14	10	10	12	12	11	9	9	9	24
28	3	1	1	..	1	1	7	32	4	28
29	242	244	147	72	71	81	111	111	179	204	183	29
31	977	957	1 092	1 218	1 113	1 010	1 010	1 071	1 030	1 015	1 060	31
30	140	142	184	183	177	168	166	165	170	169	174	30
32	292	286	273	283	249	240	220	220	218	184	174	32
33 e 34	60	52	48	47	41	37	38	35	37	34	33	33 e 34
35, 36 e 37	60	65	66	61	62	64	66	67	75	71	74	35, 36 e 37
38	99	88	101	109	101	99	100	89	101	84	81	38
39 e 40	299	299	292	303	288	299	308	269	279	437	336	34 e 40
41 e 42	13	14	15	16	13	14	15	14	18	16	15	41 e 42
44	1 153	1 303	1 303	1 477	1 425	1 417	1 421	1 326	1 426	1 370	1 439	44
45	89	125	119	117	94	73	80	71	71	60	48	45

il periodo di osservazione dal 1887 al 1907.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					
		1887-89 (media annuale)	1890-92	1893	1894	1895	1896
<i>Segue B) Cifre proporzionali</i>							
47	Diabete	18	23	23	23	25	26
48 a 58	Tumori maligni	427	428	429	445	482	491
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	488	470	532	475	592	527
60	Mielite, tabe dorsale						
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	135	160	144	147	161	117
64	Apoplessia e congestione cerebrale						
62	Paralisi infantile	1 090	1 021	992	1 001	1 020	972
66	Rammollimento cerebrale						
65	Tumori cerebrali e spinali (b)						
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	50	67	75	67	58	125
73	Successioni della pazzia						
63	Encefalite	81	56	37	40	44	45
68 e 69	Epilessia ed isterismo	71	72	67	61	65	60
71	Tetano e trisma	29	22	22	26	31	25
72	Eclampsia infantile	794	723	676	638	644	626
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (b)	85	127	126	93	57	59
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c)	2 220	2 611	2 388	2 491	2 453	2 306
79	Malattie della pleura (b)	161	142	127	116	117	109
80	Congestione ed apoplessia polmonare	88	57	38	41	15	12
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (d)	2 233	2 467	2 481	2 518	2 564	2 492
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	179	137	92	88	57	48
86	Asma, enfisema	136	122	90	98	94	102
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti	138	178	204	185	203	188
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	17	12	12	7	5	6
90, 91 e 93	Malattie del cuore e pericardio, sincope	1 514	1 584	1 594	1 628	1 711	1 662
92	Angina pectoris	17	18	18	16	15	16
94	Malattie della bocca e della lingua (b)	131	113	115	98	87	90
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (b)	73	43	36	47	26	30

dal 1887 al 1907, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell'elenco nosologico	ANNI												
	1887	1888	1889	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		
<i>a 1,000,000 di abitanti.</i>													
	28	28	32	33	33	35	35	37	40	42	45	47	
	503	511	519	522	527	539	540	569	580	616	612	48 a 58	
	480	484	432	445	420	425	445	424	390	389	347	59	
			88	89	81	82	83	79	83	72	75	60	
	100	96		7	5	4	3	5	6	7	10	11	61
			978	994	1 005	994	1 026	996	1 027	987	985	64	
	917	933	6	9	7	8	6	7	9	10	10	62	
			22	23	26	23	25	25	31	25	26	66	
			12	13	13	13	14	13	16	15	16	65	
	144	154	110	99	88	86	89	95	126	128	131	67	
			2	2	5	4	6	10	31	5	5	73	
	37	34	33	37	33	31	33	31	37	35	29	63	
	56	54	48	56	59	58	56	57	57	51	52	68 e 69	
	24	24	23	22	20	19	16	19	21	22	16	71	
	584	557	523	549	506	519	481	465	485	446	436	72	
	57	54	60	58	58	57	56	58	57	39	25	76	
	1 966	2 028	1 604	1 794	1 649	1 738	1 632	1 482	1 395	1 401	1 417	77 e 78	
			219	256	263	232	264	250	302	227	235		
	94	97	93	94	90	91	92	90	86	81	84	79	
	8	12	26	22	20	22	23	22	24	23	22	80	
			1 364	1 298	1 335	1 236	1 440	1 132	1 163	1 114	1 225	81 e 82	
	2 126	2 299	881	1 054	955	1 026	1 086	971	1 027	1 082	1 160		
	41	29	47	43	26	20	19	20	19	21	23	83	
	84	92	96	105	87	78	88	78	90	53	69	86	
	189	219	224	234	231	235	241	255	293	264	299	87	
	2	1	2	1	1	1	1	1	4	4	9	89	
	1 565	1 700	1 706	1 817	1 823	1 792	1 871	1 786	1 885	1 740	1 770	90, 91 e 93	
	15	16	19	18	18	19	19	20	23	22	23	92	
	78	78	71	73	65	69	60	56	58	53	45	94	
	29	27	35	34	31	30	31	27	29	24	25	96	

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XX.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Veggasi la nota (c) a pagina XIV.
 (d) Id. (b) id. XVI.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal

Segue PROSPETTO N. 4.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI					1896
		1887-89 (media annuale)	1890-92 (media annuale)	1893	1894	1895	
<i>Segue B) Cifre proporzionali</i>							
97	Malattie dello stomaco, atresia (b).	214	209	242	215	211	227
98	Ulcera rotonda dello stomaco	22	19	19	20	17	18
99	Epatite, cirrosi epatica	201	188	181	176	178	175
102	Ittero	34	39	44	45	37	44
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	3 125	3 372	3 352	3 260	3 650	3 428
105	Volvolo, occlusione intestinale	67	61	65	62	70	63
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (b), idrope ascite	144	116	96	86	79	71
107	Ernie intestinali e addominali	53	49	47	45	50	44
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	158	83	77	61	34	36
110 e 110a	Appendicite e peritonite	153	149	164	158	166	167
112	Malattie dei reni (b)	263	293	324	328	358	364
113 e 114	Malattie della vescica e calcoli renali e vescicali (b)	86	89	87	89	103	80
115	Malattie dell'uretra e prostata (b)	11	13	12	12	12	14
119	Malattie dell'utero e vagina (d)	35	52	67	48	35	32
124	Febbre puerperale.	79	53	57	52	48	41
121, 122, 123, 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio.	144	81	72	79	60	74
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), cangrena della pelle.	102	108	112	99	77	84
131	Pemfigo, eczema, ectima.	37	33	36	31	25	25
132	Sclerema.	101	95	94	91	92	91
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b).	53	46	35	35	31	35
134	Reumatismo articolare acuto	30	29	32	26	29	30
135	Reumatismo cronico	32	37	31	32	30	30
138	Alcoolismo cronico	14	17	21	20	15	18
140 a 156	Morte violenta accidentale	367	331	324	318	284	306
157 e 158	Omicidio (compreso quello d'infante)	52	47	53	46	48	46
160 a 168	Suicidio	50	56	56	56	60	63
	Totale dei morti per causa determinata.	26 360	25 482	24 557	24 405	24 566	23 634
	Morti per causa ignota o non dichiarata	664	721	599	570	479	429
	Totale generale	27 024	26 203	25 156	24 975	25 045	24 063

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XX.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Veggasi la nota (a) a pagina XVIII.
 (d) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.

1887 al 1907, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell'elenco nosologico	ANNI										NUMERO dell'elenco nosologico	
	1887	1888	1889	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906		1907
<i>a 1,000,000 di abitanti.</i>												
97	236	246	231	251	226	256	236	236	235	142	183	97
98	17	18	15	17	16	16	15	17	15	16	16	98
99	164	165	161	165	156	163	154	151	150	141	143	99
102	45	42	40	40	43	44	42	45	45	50	46	102
104	3 141	3 511	2 955	3 560	3 028	3 406	3 301	3 156	3 458	3 245	2 877	104
105	66	69	71	72	69	67	64	67	64	63	60	105
106 e 111	64	63	60	62	52	51	46	45	42	26	27	106 e 111
107	42	45	41	42	44	39	39	39	42	40	40	107
109	48	39	39	37	45	43	39	36	33	34	34	109
110 e 110a	150	159	150	154	146	154	159	148	145	121 (e)	119	110 e 110a
										93	93	
112	360	387	398	383	377	399	408	396	392	403	394	112
113 e 114	77	75	80	78	75	76	75	71	71	63	66	113 e 114
115	14	13	14	15	12	11	14	16	18	17	19	115
119	31	22	19	19	17	16	13	11	13	17	17	119
124	38	38	41	32	31	32	34	33	29	30	34	124
121, 122, 123, 125 e 126	68	63	71	62	54	54	50	57	67	53	57	121, 122, 123, 125 e 126
127 e 128	81	75	79	71	68	66	71	70	74	75	81	127 e 128
131	27	25	25	24	21	22	19	18	19	16	16	131
132	86	72	69	70	79	75	70	67	77	65	66	132
133	36	32	33	32	32	36	34	36	35	26	30	133
134	26	28	30	29	26	28	30	29	30	29	35	134
135	26	21	24	26	24	24	25	26	33	27	32	135
138	16	17	17	16	13	12	12	15	25	21	20	138
140 a 156	325	315	318	315	331	320	314	333	394	323	339	140 a 156
157 e 158	49	53	44	40	39	41	40	40	43	39	38	157 e 158
160 a 168	60	64	63	63	62	61	58	65	71	69	72	160 a 168
	21 574	22 592	21 595	23 446	21 680	21 933	22 088	20 847	21 693	20 643	20 615	
	358	344	293	325	290	275	278	234	198	134	120	
	21 932	22 936	21 888	23 771	21 970	22 208	22 366	21 081	21 891	20 777	20 735	

Dal prospetto n. 4 si rileva che, in generale, le malattie infettive si vennero facendo meno gravi dal 1887 al 1907. La mortalità per *vaiuolo* ebbe i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 al 1904 il vaiuolo assunse di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 74 nel 1902, 184 nel 1903 e 93 nel 1904. Nel 1905 si ebbero 14 morti per vaiuolo ogni milione di abitanti, nel 1906 se n'ebbero 5 e nel 1907 13.

La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887 a 242 nel 1907; quella per *scarlattina* da 494 nel 1887 a 87 nel 1907; quella per *febbre tifoidea* da 939 nel 1887 a 255 nel 1907. Il *tifo petecchiale*, che aveva causato parecchie morti nei primi anni di questo periodo di osservazione, in seguito è quasi scomparso dalle tavole necrologiche; la mortalità per *difterite* e *laringite crupale* è diminuita da 952 nel 1887 a 167 nel 1907 ogni milione di abitanti; quella per *ipertosse* da 376 nel 1887 a 182 nel 1907 e quella per *febbre puerperale* da 85 nel 1887 a 34 nel 1907.

Anche la mortalità per *febbri e cachessia da malaria* presenta un forte miglioramento dal 1887 al 1907 (710 morti ogni milione di abitanti nel primo anno e 125 nell'ultimo) e la diminuzione maggiore si è osservata negli ultimi sei anni (1902-1907).

Il *colera asiatico*, che nel 1887 aveva causato 8150 casi di morte, in cifre effettive, non ne causò alcuno negli anni corsi dal 1888 al 1892; tornò a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3040 decessi. Vi furono ancora 20 morti di colera nel gennaio del 1894 e negli anni seguenti non si verificarono casi di morte per detta malattia.

È invece aumentata la mortalità per *influenza*. Questa causa che, nei tre anni 1887-1889, aveva determinato soltanto 18 morti ogni milione di abitanti, nel 1890 aggravò la mortalità di 11,771 casi (389 per un milione di abitanti); fu gravissima nel 1892 (20,039 morti, cioè 653 ogni milione di abitanti) e nel 1894 (14,668 morti, cioè 472 ogni milione di abitanti). Fra il 1895 e il 1899 la mortalità per *influenza* scemò notevolmente, ma nel 1900 si ebbe una nuova recrudescenza, con 17,306 morti, vale a dire 535 ogni milione di abitanti, che è il quoziente più alto, dopo quello dell'anno 1892; nell'anno 1901 essa discese al quoziente di 125 morti per ogni milione di abitanti, nel 1902 a quello di 117; tornò ad aggravarsi nel 1903, dando un quoziente di 217 morti ogni milione di abitanti, per discendere nuovamente a quello di 114 nell'anno 1904 e risalire a 206 nel 1905. Nel 1906 essa scese al quoziente di 128 morti ogni milione di abitanti, mentre tornò ad aggravarsi nel 1907 (238 morti ogni milione di abitanti).

La mortalità per *sifilide* è aumentata di anno in anno dal 1887 al 1893, ma negli anni sussquenti si è notata una leggiera diminuzione.

I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, ed erano scesi fino a 53 nel 1895, furono 47 nel 1905, 60 nel 1906 e 56 nel 1907. La serie delle cifre annuali, quantunque irregolare nel suo andamento, accenna ad una diminuzione nel numero dei morti per *rabbia* nel corso del periodo di osservazione dal 1887 al 1907. Tale fatto può dipendere dall'efficacia dei mezzi adoperati per

impedire che si sviluppi l'infezione (sistema Pasteur), o da una più accurata vigilanza esercitata dalle amministrazioni municipali sui cani vaganti, oppure dalla circostanza che la rabbia, del pari che altre malattie infettive, può presentare da un anno all'altro forti oscillazioni nel suo grado di frequenza (a).

Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio e pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 314 nel 1907 in cifre effettive).

La *lebbra* causò, in cifre effettive, 22 morti nel 1887 e 10 nel 1907.

La mortalità per *malattie tubercolari* accenna, durante il periodo di osservazione, ad una diminuzione abbastanza sensibile. Infatti, ogni milione di abitanti, nel triennio 1887-1889, si ebbero in media 2128 morti per tubercolosi, considerata nelle sue varie manifestazioni; invece nel 1906 la proporzione è stata solamente di 1677 morti e nel 1907 di 1698 (b). Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della tubercolosi, si hanno, per gli anni dal 1887 al 1907, le cifre seguenti:

Morti per malattie tubercolari per ogni milione di abitanti, negli anni dal 1887 al 1907.

PROSPETTO N. 5.

MALATTIE TUBERCOLARI	TRIENNI		ANNI														
	1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907
Tubercolosi disseminata	307	290	274	279	315	247	242	244	147	72	71	81	111	111	179	204	183
Tisi polmonare	1070	1028	970	1013	1015	1057	977	957	1092	1218	1113	1010	1010	1071	1030	1015	1060
Scrofola disseminata e lupo	103	86	70	70	63	64	60	52	48	47	41	37	38	35	37	34	33
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito .	187	189	203	177	144	154	140	142	184	182	177	168	166	165	170	169	174
Tabe mesenterica e tubercolosi intestinale .	422	364	354	326	324	329	292	286	273	283	249	240	220	220	218	184	174
Artriti e sinoviti fungose, tubercolosi delle ossa, morbo di Pott .	(c) 39	(c) 38	(c) 40	(c) 35	54	60	60	65	66	61	62	64	66	67	75	71	74
TOTALE	2128	1995	1911	1900	1915	1911	1771	1746	1810	1864	1713	1600	1611	1669	1709	1677	1698

La diminuzione è stata più notevole nelle morti per *scrofola, tabe mesenterica e meningite tubercolare* che non in quelle per *tubercolosi polmonare o disseminata in più organi*, prese complessivamente.

Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello indi-

(a) Nei 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, che complessivamente comprendono circa un quarto della popolazione del Regno, avvennero 29 casi di morte per rabbia nel 1881, 22 nel 1882, 28 nel 1883, 27 nel 1884, 36 nel 1885 e 29 nel 1886.

(b) Nel formare i valori medii si sono compresi fra i morti per malattie tubercolari, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

(c) Non compresi i morti per tubercolosi delle ossa che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

cato, nel prospetto precedente, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, sono stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 21 nel triennio 1905-1907; che le dichiarazioni di morte per *bronchite cronica* non sono aumentate dal 1899 in poi (dal quale anno si cominciò a tenerle distinte da quelle di *bronchite capillare acuta*); e che il numero dei morti per *meningite acuta* e per *diarrea* si è mantenuto quasi invariato fra il 1887 ed il 1907, si può legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata nel numero dei morti per malattie tubercolari non dipenda dall'aver i medici, negli ultimi anni di osservazione, celata più spesso la diagnosi di tali malattie, sostituendovi dichiarazioni di morte per polmonite cronica o per bronchite o per meningite semplice.

Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta scemando dal 1887 in poi.

**Mortalità delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto
negli anni dal 1887 al 1907.**

PROSPETTO N. 6.

	ANNI	NUMERO dei parti semplici e multipli (a)	NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza parto e puerperio	NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	OGNI 1000 parti morirono	
					gestanti	neonati
	1907.	1 097 223	3 074	759	2.8	0.7
	1906.	1 105 899	2 791	711	2.5	0.6
	1905.	1 120 631	3 198	976	2.9	0.9
	1904.	1 120 856	2 981	811	2.7	0.7
	1903.	1 075 851	2 771	679	2.8	0.6
	1902.	1 127 901	2 807	864	2.5	0.8
	1901.	1 090 907	2 767	848	2.5	0.8
	1900.	1 100 055	3 034	1 007	2.8	0.9
REGNO	1899.	1 121 084	3 572	1 031	3.2	0.9
	1898.	1 102 373	3 230	1 000	2.9	0.9
	1897.	1 135 505	3 342	1 101	2.9	1.0
	1896.	1 128 782	3 627	1 213	3.2	1.1
	1895.	1 125 131	3 407	1 568	3.0	1.4
	1894.	1 135 460	4 048	2 188	3.6	1.9
	1893.	1 158 552	3 990	2 202	3.4	1.9
	1890-92 . . .	3 416 431	12 236	6 481	3.6	1.9
	1887-89 . . .	3 508 892	19 930	9 660	5.7	2.8

(a) Il totale dei parti comprende anche quelli di nati-morti.

La mortalità per *pellagra* variò, durante il periodo di osservazione, in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire (da 115 morti ogni milione di abitanti nella media del triennio 1887-89 a 60 nel triennio 1905-1907).

I morti per *diabete* furono, in cifre effettive, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1394 nel 1906 ed a 1535 nel 1907. Si nota invece una diminuzione nel numero dei morti per *gota*, da 231 nel 1887 a 186 nel 1907, in cifre effettive; e per *scorbuto*, da 532 a 164 negli stessi anni.

Le cifre dei bambini morti poco dopo la nascita per *atrofia congenita*, si sono mantenute quasi invariate in ciascun anno del periodo 1887-95; ma diminuirono alquanto negli anni susseguenti per la scemata mortalità infantile e perchè parecchi bambini morti per anemia in età di oltre un mese furono nelle statistiche degli ultimi anni classificati fra i morti per anemia (n° 39 dell'elenco) e non più fra i morti per debolezza congenita, come si era fatto antecedentemente. Al contrario, col prolungarsi della vita media dell'uomo, è venuto crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*.

La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti nel 1887 a 612 nel 1907).

Se si dividono i morti per *tumori maligni*, secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

**Morti causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi,
negli anni dal 1887 al 1907.**

PROSPETTO N. 7.

SEDE DEI TUMORI MALIGNI	MEDIA ANNUALE				NUMERO DEI MORTI NEGLI ANNI									
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	
disseminati in più organi o di sede non specificata	2 787	2 993	3 489	3 553	3 624	3 761	3 770	3 542	3 905	3 974	3 948	4 609	4 400	
dell'utero, vagina, ovaia.	2 403	2 375	2 322	2 469	2 578	2 564	2 501	2 590	2 502	2 572	2 535	2 778	2 725	
delle mammelle	1 013	862	874	908	916	950	863	927	855	973	974	1 019	983	
della vescica, uretra, prostata, pene, testicoli, rene	308	285	259	306	283	301	327	346	325	394	408	453	405	
della bocca, labbra, lingua, palato, fauci, tiroide, laringe, trachea	437	415	555	858	1 145	1 059	1 095	1 143	1 067	1 233	1 049	865	947	
dello stomaco, esofago	3 341	3 739	4 021	4 510	4 613	4 613	4 865	4 928	5 179	5 356	5 909	6 108	6 444	
del fegato, milza, pancreas, intestino, peritoneo	2 122	2 235	2 380	2 998	3 240	3 312	3 401	3 559	3 445	3 877	3 974	4 416	4 198	
delle ossa ed articolazioni	254	79	31	202	139	237	257	544	409	359	429	283	311	
dei centri nervosi ed organi dei sensi	61	44	73	123	142	76	62	55	87	122	122	122	255	
TOTALE	12 726	13 027	14 054	15 927	16 680	16 873	17 141	17 634	17 774	18 860	19 348	20 653	20 668	

Una leggiera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1907 nel numero dei morti di *apoplessia cerebrale*, di *epilessia*, di *epatite* e di *reumatismo articolare cronico*; il fatto opposto si è verificato per le malattie delle *arterie*, per i *vizi di cuore* e per le malattie *dei reni*. A determinare questi ultimi aumenti ha contribuito anche il fatto che i medici ora, meno spesso che in passato, rilasciano certificati di cause di morte colle dichiarazioni generiche di asma, idrope ascite, tumori addominali.

Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*, da 805 per un milione d'abitanti nel 1887 a 436 nel 1907. È noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di meningite e di disturbi dell'apparato digerente; e perciò la diminuzione avvertita dipende in parte dall'avere i medici dato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1907 nella mortalità per malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio; infatti i morti per *bronchite acuta e cronica* diedero un quoziente di 2416 ogni milione di abitanti nella media degli anni 1887-92, si mantennero intorno a questo numero fino all'anno 1895 e diminuirono notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1905-1907 scesero a 1659.

A partire dall'anno 1899 i morti di *bronchite* sono stati divisi in due gruppi, secondochè si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di bronchite capillare infantile) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari in età senile, è stata, nella media del periodo 1899-1907, dichiarata causa di morte di 250 individui per ogni milione di abitanti, ossia di circa un ottavo del totale dei morti per *bronchite* e non è aumentata nel periodo d'osservazione.

La *polmonite crupale* e la *bronco-polmonite acuta* aggravarono la mortalità di 2350 casi in media ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2514 ogni milione di abitanti); negli anni seguenti il quoziente di mortalità per queste cause scemò sensibilmente, fino a 2103 nel 1904, a 2190 nel 1905 ed a 2196 nel 1906. Nel 1907 invece il quoziente salì a 2385. Anche per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per polmonite cruposa da quelli morti per bronco-polmonite acuta. Nella media del periodo 1899-1907, i primi risultarono nella proporzione di 1256 ed i secondi di 1027 per un milione di abitanti.

I morti per *malattie della pleura* discesero da 159 ogni milione di abitanti nel 1887 a 84 nell'anno 1907.

La mortalità per *diarrea*, *enterite*, *colera indigeno*, *colite*, *proctite* ed *ulcera intestinale* presenta, nel periodo di tempo da noi considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3147 morti ogni milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3650 (il più alto nel periodo), nel 1897 scese a 3141, per risalire subito nell'anno appresso a 3511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2955. Nel 1900 la mortalità per le suddette cause tornò ad aggravarsi fortemente, dando un altro massimo quoziente di 3560 ogni milione di abitanti; nel 1906 la proporzione fu di 3245 e nel 1907 soltanto di 2877, che è il quoziente più basso in tutto il periodo di osservazione.

I morti per *elmintiasi* sono stati 5104 nel 1887 in cifre effettive, e queste cifre sono diminuite gradatamente negli anni susseguenti fino a 1146 nel 1907. La diminuzione soltanto in parte è un fatto reale e dipende dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; ma per altra parte essa deve essere stata causata da una maggiore accuratezza dei medici nel fare le diagnosi delle malattie. Un tempo, parecchi casi di malattie dell'apparato digerente nei bambini erano dai medici attribuiti alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata un'importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatasi nel canale digerente. Probabilmente dipende dallo stesso motivo la diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per *dissenteria*, da 6279 nel 1887, in cifre effettive, a 6 nel 1907. Pei primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per diarrea, mentre negli ultimi vi furono iscritti i soli casi di dissenteria cruenta.

La maggiore precisione di diagnosi da parte dei medici, mentre ha fatto diminuire la cifra dei morti per eclampsia infantile, per elmintiasi e per dissenteria, ha contribuito a tener alto il numero dei morti per diarrea e gastroenterite.

L'*alcoolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre effettive. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo salì improvvisamente a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare nel 1895 a 473. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, scemò nei quattro anni susseguenti, ma poi risalì a 837 nel 1905, a 702 nel 1906 ed a 663 nel 1907 (a). Inoltre in quest'ultimo anno avvennero 105 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi.

Delle morti violente, siano esse dovute ad infortunio accidentale, ad omicidio od a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo IV della presente Introduzione.

§ 3 — **Morti avvenute nell'anno 1907 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia.**

Il prospetto seguente fa conoscere le morti avvenute nell'anno 1907 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, tanto in cifre effettive, quanto in cifre proporzionali a 1000 abitanti. Le cifre di popolazione, alle quali sono ragguagliate quelle dei morti, trovansi indicate nel prospetto I a pagina IX.

(a) Si ritiene da molti medici che ad elevare il quoziente di mortalità per alcoolismo abbia contribuito il movimento di emigrazione e d'immigrazione in rapporto coll'estero, fattosi molto più intenso in questi ultimi anni. Secondo il loro avviso, le nostre popolazioni rurali abituate ad una vita sobria in paese, messe in contatto colle masse operaie dell'Europa centrale e settentrionale e degli Stati Uniti d'America, dove l'abuso degli alcoolici è molto più frequente che da noi, vi hanno contratto abitudini viziose, che conservano anche dopo il rimpatrio.

Numero dei morti e quozienti di mortalità per l'anno 1907 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia.

PROSPETTO N. 8.

PROVINCIE	PROVINCIA		COMUNE capoluogo		PROVINCIE	PROVINCIA		COMUNE capoluogo	
	Cifre effettive dei morti	Cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti	Cifre effettive dei morti	Cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti		Cifre effettive dei morti	Cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti	Cifre effettive dei morti	Cifre proporzionali dei morti a 1000 abitanti
Alessandria	15 254	18.1	1 460	20.4	Ancona	6 113	19.9	1 147	18.8
Cuneo	13 161	20.1	706	26.4	Ascoli Piceno	4 479	18.1	509	18.3
Novara	13 663	17.5	1 195	22.9	Macerata	4 974	19.3	464	19.8
Torino	22 261	19.2	7 140	19.6	Pesaro e Urbino	5 546	21.3	570	22.1
Genova	19 515	19.3	5 894	21.9	Perugia	12 942	18.7	1 275	19.6
Porto Maurizio	3 129	20.5	159	18.8	Roma	23 575	18.3	9 964	18.8
Bergamo	13 223	26.1	1 669	31.6	Aquila degli Abruzzi	8 231	20.4	428	21.5
Brescia	13 204	23.5	2 308	31.3	Campobasso	7 892	21.6	282	20.4
Como	13 139	21.3	1 066	25.4	Chieti	7 063	18.8	570	22.4
Cremona	7 614	22.8	1 335	33.1	Teramo	5 276	16.7	566	24.0
Mantova	6 575	21.2	1 047	36.4	Avellino	8 214	20.5	501	22.3
Milano	34 719	22.2	11 318	19.9	Benevento	5 014	19.4	530	22.3
Pavia	9 437	19.1	1 097	30.4	Caserta	16 659	21.1	705	21.7
Sondrio	3 051	23.0	199	23.5	Napoli	28 453	23.7	14 469	24.5
Belluno	3 902	18.4	444	21.1	Salerno	12 290	22.0	1 024	23.6
Padova	9 038	18.8	2 041	22.9	Bari delle Puglie	20 581	24.0	2 114	25.5
Rovigo	5 098	22.1	298	28.9	Foggia	11 480	26.0	1 629	27.1
Treviso	8 333	18.3	889	24.8	Lecce	16 973	22.6	651	18.4
Udine	11 664	17.7	1 050	26.2	Potenza	12 090	25.7	308	20.5
Venezia	8 769	20.2	3 490	22.0	Catanzaro	10 716	22.0	893	27.0
Verona	8 396	19.0	1 876	24.0	Cosenza	9 260	19.3	503	23.7
Vicenza	9 683	20.3	1 220	25.5	Reggio di Calabria	9 758	21.7	1 390	33.0
Bologna	10 311	19.2	3 379	21.0	Caltanissetta	8 937	26.5	894	19.7
Ferrara	5 638	19.6	1 854	21.1	Catania	17 332	23.7	3 855	23.9
Forlì	5 916	20.3	797	18.8	Girgenti	9 451	25.0	567	22.6
Modena	7 357	22.3	1 910	28.9	Messina	11 180	20.4	3 474	21.6
Parma	6 331	21.3	1 570	30.8	Palermo	15 622	20.5	6 767	21.4
Piacenza	5 491	22.1	1 199	27.5	Siracusa	11 384	25.4	778	22.1
Ravenna	4 160	17.4	1 219	18.3	Trapani	6 448	17.5	968	14.6
Reggio nell'Emilia	6 579	22.9	1 692	26.7	Cagliari	10 945	21.3	1 165	21.2
Arezzo	5 715	20.4	1 076	22.4	Sassari	6 086	18.3	829	20.9
Firenze	18 888	19.3	5 037	22.6	Regno	700 333	20.7	134 631	22.3
Grosseto	2 575	16.8	235	19.6					
Livorno	2 531	18.9	2 028	19.1					
Lucca	6 165	18.4	1 824	22.7					
Massa e Carrara	4 310	20.3	603	19.8					
Pisa	5 816	17.4	1 330	21.1					
Siena	4 758	20.0	1 188	29.5					

I quozienti massimi di mortalità, nell'anno 1907, si ebbero nelle provincie di Caltanissetta (26.5 ogni 1000 abitanti), di Bergamo (26.1), di Foggia (26.0), di Potenza (25.7), di Siracusa (25.4), di Girgenti (25.0) e di Bari (24.0). I quozienti minimi furono dati dalle provincie di Teramo con 16.7 ogni 1000 abitanti, di Grosseto (16.8), di Ravenna e di Pisa (17.4), di Trapani e di Novara (17.5) e di Udine (17.7). Dal prospetto n. 8 si deduce che la mortalità nell'Italia meridionale fu, generalmente, più alta di quella verificatasi nell'Italia settentrionale e centrale: questo fatto erasi già osservato nelle statistiche degli anni anteriori al 1907.

Nel confrontare i quozienti di mortalità per provincie, si deve tener presente che essi risentono l'influenza di un fatto demografico d'indole opposta a quello che studiamo, cioè delle nascite; perchè dove sono alti i quozienti di natività, sono d'ordinario anche alti quelli di mortalità, per il grande numero di bambini che soccombono nei primi anni di vita.

Più innanzi, nei prospetti XI, XII, XIII e XIV, si trovano particolareggiate notizie sulla mortalità dei bambini fino a un anno e fino a 5 anni, le quali danno la misura in cui questo fenomeno si manifesta nel nostro paese. Ma per determinare l'influenza suaccennata occorrerebbe porre le cifre della mortalità infantile in relazione colle nascite, per ciascuna provincia, poichè soltanto ravvicinando questi due quozienti dei morti di qualsiasi età e dei morti di età non superiore a un anno si potrebbe valutare l'azione della natività più o meno alta sulle cifre della prima serie; però non è qui il luogo di farlo (a).

Paragonando fra loro i 69 Comuni capiluoghi di provincia, si rilevano pure differenze notevoli nei quozienti di mortalità. Dalle cifre massime di 36.4 morti ogni 1000 abitanti in Mantova, di 33.1 in Cremona, di 33.0 in Reggio Calabria, di 31.6 in Bergamo, di 31.3 in Brescia, di 30.8 in Parma, di 30.4 in Pavia, si scende alle cifre minime di 14.6 in Trapani, di 18.3 in Ravenna e Ascoli Piceno, di 18.4 in Lecce, di 18.8 in Porto Maurizio, Forlì, Ancona e Roma. Questi quozienti sono stati calcolati ragguagliando il numero totale delle morti avvenute in ciascun Comune, comprese quelle verificatesi nella popolazione avventizia o con dimora occasionale, a 1000 abitanti pure della popolazione totale, e perciò nelle città ove trovansi grandi istituti ospitalieri civili e militari ed altre case di ricovero che servono per l'assistenza anche di persone dimoranti in altri Comuni, tali quozienti sono aggravati dal contingente che apporta alla mortalità la popolazione estranea al Comune.

§ 4. — **Distribuzione geografica di alcune malattie, specialmente infettive, negli anni 1905, 1906 e 1907.**

Per la singolare importanza delle malattie infettive, come indice delle condizioni igieniche locali, stimiamo utile di mettere in evidenza dove siano state più frequenti e dove meno quelle che nel nostro paese hanno una maggior diffusione. A ciò

(a) Chi voglia compiere questo studio comparativo ne troverà gli elementi che qui mancano nella pubblicazione annuale di questa stessa Direzione che intitolasi " *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile* ".

è inteso il prospetto seguente, in cui è indicato, in cifre effettive ed in cifre proporzionali a 100,000 abitanti, il numero dei morti per *vaiuolo*, *morbilli*, *scarlattina*, *difterite* e *crup*, *ipertosse*, *sifilide*, *pustola maligna* e *carbonchio*, *febbre tifoide*, *febbri da malaria*, *febbre puerperale*, *tubercolosi disseminata* e *sue manifestazioni locali*, *polmonite acuta* ed inoltre quelli per *pellagra*, nei singoli compartimenti del Regno, durante gli anni 1905, 1906 e 1907.

Osservando particolarmente la frequenza delle morti causate dalle malattie sopra indicate, durante l'anno 1907, si trova che il *vaiuolo* colpì principalmente la popolazione delle Calabrie (15 morti ogni 100,000 abitanti) e quella della Basilicata (10), non causò alcuna morte nelle Marche e nella Sardegna, e fu mite negli altri compartimenti.

Il *morbilli* dominò particolarmente nella Basilicata (77 morti ogni 100,000 abitanti) e nelle Calabrie (64); le proporzioni più basse si ebbero nelle Marche e nell'Umbria (9), nella Toscana (11) e nel Piemonte (12).

La *scarlattina* colpì principalmente la popolazione della Basilicata (104 morti ogni 100,000 abitanti), delle Calabrie (30), della Sicilia (24) e della Sardegna (22); negli altri compartimenti fu causa di poche morti.

La *difterite* fu grave in Lombardia (26), nel Veneto (24) e nell'Emilia (22); causò poche morti nelle Marche, nell'Umbria, negli Abruzzi e nelle Calabrie (9). Coi morti per difterite sono compresi anche quelli per *laringite crupale*.

La *febbre tifoidea* fece maggiori vittime nella Lombardia (43) e nella Sicilia (37). Le proporzioni più basse si ebbero nella Sardegna (10), nella Liguria e nella Basilicata (13), nella Campania (16) e nel Piemonte (17).

Le morti per *ipertosse* furono numerose nell'Emilia (29), nel Veneto (24), nel Piemonte (23) e nella Lombardia (22); e meno frequenti nella Campania (9), nella Liguria (10), nelle Marche e nell'Umbria (11).

Le *febbri da malaria* e la *cachessia palustre*, che nelle provincie continentali situate a nord del parallelo di Roma causarono pochissime morti, nella Sardegna ne causarono 69 ogni 100,000 abitanti, nella Basilicata (49), nella Sicilia (43), nelle Puglie e nelle Calabrie (35), nel Lazio (11), negli Abruzzi e nella Campania (7).

La *sifilide* cagionò un numero relativamente più grande di morti, massime nell'infanzia, nelle Calabrie (11), nel Lazio (10) (a), nell'Umbria e nella Campania (9); ed un minor numero nel Piemonte, nella Toscana e nelle Marche (2).

Le morti per *pustola maligna* furono più frequenti nell'Italia meridionale (Basilicata 7 e Sardegna 4); e rarissime nelle provincie dell'Italia settentrionale.

Le morti per *febbre puerperale* si presentarono presso a poco colla stessa frequenza nei diversi compartimenti; nel Regno avvennero nella proporzione di 3 ogni 100,000 abitanti.

Le *affezioni tubercolari* (sotto la quale rubrica sono comprese le morti per *tubercos-*

(a) Conviene rammentare, quando si parla del Lazio, che si indica il territorio della sola provincia di Roma, nella quale la città capitale comprende circa la metà della popolazione totale, onde questo compartimento male si può confrontare con quelli che hanno una superficie più estesa, ed in cui prevale, per numero, la popolazione rurale.

losi disseminata in più organi, per *tisi polmonare*, per *meningite tubercolare e idrocefalo acquisito*, per *scrofolo disseminata* e per *lupo*, per *tabe mesenterica e tubercolosi intestinale*, per *sinovite e artrite fungosa*, per *tubercolosi delle ossa* e per *morbo di Pott*) diedero quozienti più alti di mortalità nella Liguria (227 morti ogni 100,000 abitanti), nella Lombardia (220), nella Toscana (209) e nella Sardegna (201); e più bassi nelle Calabrie (101), nella Basilicata (104), negli Abruzzi (121) e nella Sicilia (124).

Le morti per *polmonite crupale* e per *bronco polmonite acuta* dominarono più che altrove nella Liguria (351 morti ogni 100,000 abitanti), nella Campania (301), nella Lombardia (267), nel Piemonte (256) e nella Basilicata (241); e meno nelle Marche (146), nell'Umbria (174), negli Abruzzi (194) e nel Veneto (199).

Differenze notevoli secondo i compartimenti presentò pure la mortalità per *rabbia*; infatti, sopra 56 casi di morte dichiarati nel 1907 in tutto il Regno, se ne ebbero 14 nella Sicilia, 9 nella Campania, 8 nel Lazio, 5 nella Sardegna, 3 tanto nelle Puglie, quanto nelle Calabrie, 2 in Piemonte, Lombardia, Emilia, Umbria e negli Abruzzi, 1 nella Liguria, nel Veneto, nella Toscana e nelle Marche, e nessuno nella Basilicata.

Morti per alcune malattie infettive e per

PROSPETTO N. 9.

Table with columns: COMPARTIMENTI, Totale dei morti per qualsiasi causa, Valuolo, Morbillo, and years 1907, 1906, 1905. Rows include various Italian regions and 'REGNO'.

A) Cifre

Table showing absolute figures (A) for various regions and the Kingdom, with columns for years 1907, 1906, 1905 and categories like Valuolo and Morbillo.

B) Cifre proporzionali

Table showing proportional figures (B) for various regions and the Kingdom, with columns for years 1907, 1906, 1905 and categories like Valuolo and Morbillo.

pellagra negli anni 1905, 1906 e 1907.

Table with columns: Scarlattina, Difterite e erup, Ipertosse, Sifilide, Pustola maligna, carbuncolo, and years 1907, 1906, 1905. Rows include absolute figures (effective) and figures per 100,000 inhabitants.

effettive.

Table showing absolute figures for pellagra cases in various regions and the Kingdom, with columns for years 1907, 1906, 1905 and categories like Scarlattina and Ipertosse.

a 100,000 abitanti.

Table showing proportional figures for pellagra cases per 100,000 inhabitants in various regions and the Kingdom, with columns for years 1907, 1906, 1905 and categories like Scarlattina and Ipertosse.

Fin qui ci siamo occupati delle infezioni più frequenti. Ma stimiamo utile aggiungere qualche cenno sulla distribuzione territoriale di due altre malattie, le quali hanno un'importanza singolare per lo studio della geografia medica italiana e sono la *pellagra* e l'*alcoolismo* cronico ed acuto.

La *pellagra* è malattia quasi limitata all'Italia settentrionale e centrale. Infatti le morti per questa causa avvennero nel 1907 nella proporzione di 17 ogni 100,000 abitanti nel Veneto, di 15 nell'Umbria, di 11 nelle Marche e nella Lombardia, di 9 nell'Emilia, di 3 nella Toscana e di 1 nel Piemonte, nel Lazio e negli Abruzzi; mentre in tutte le altre regioni se ne contarono pochissimi casi (4, in cifre effettive, in Liguria, 1 nelle Puglie e 1 nelle Calabrie) e nessuno (in Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna). Cifre poco differenti si ebbero per i due anni 1905 e 1906.

I morti per *alcoolismo cronico* nel 1907 furono 663 ed i morti per infortuni causati dalla ubbriachezza 105; i quozienti di mortalità più alti, si notarono nel Veneto, nella Liguria, nelle Marche, nella Lombardia, nel Piemonte, nella Sardegna e nell'Umbria; i più bassi nella Campania, nella Sicilia, nelle Puglie, nella Basilicata, negli Abruzzi e nelle Calabrie.

Nel prospetto seguente sono posti a raffronto i dati dell'anno 1907 con quelli di ciascuno degli anni dal 1897 al 1906 e dei due quinquenni 1887-91 e 1892-96. Da esso si scorge che l'aumento nella mortalità per alcoolismo avvenuta nel triennio 1905-1907 in confronto degli anni precedenti si verificò specialmente nei compartimenti del Veneto, della Liguria, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e degli Abruzzi (a).

Media annuale dei morti per alcoolismo cronico e per infortunio causato da ubbriachezza in rapporto ad 1 milione di abitanti.

PROSPETTO N. 10.

ANNI	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana	Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna	FRANCO
1887-91	19.4	35.4	25.5	25.4	12.7	10.1	30.2	13.5	16.1	7.6	5.4	9.0	6.3	10.4	9.6	27.6	16.2
1892-96	27.7	42.4	34.2	29.4	17.5	13.5	31.8	12.9	13.1	8.4	6.6	8.6	11.1	9.6	9.3	27.1	19.5
1897	26.6	34.5	32.9	25.0	17.5	9.3	25.1	10.8	14.0	7.8	4.5	4.8	10.1	5.2	7.0	15.6	16.8
1898	28.0	30.4	30.9	29.4	11.6	16.4	23.9	12.2	23.3	3.5	5.8	5.2	8.1	9.6	7.3	14.2	17.5
1899	26.7	21.7	30.0	33.8	18.2	12.7	31.4	16.7	18.8	11.2	4.5	7.3	6.1	5.9	5.5	28.1	18.1
1900	25.7	36.4	30.0	32.3	11.9	9.1	21.8	9.0	13.5	5.6	5.1	5.6	..	7.3	6.6	31.7	16.8
1901	17.7	25.0	21.0	32.4	7.3	6.6	13.2	12.0	16.7	6.2	7.0	5.1	12.3	5.8	3.7	16.4	13.4
1902	19.7	21.1	16.0	30.0	11.8	6.6	30.9	16.4	10.7	6.9	4.8	4.6	..	2.2	5.1	13.7	12.9
1903	21.3	12.7	22.1	28.2	6.9	6.9	33.6	14.8	7.4	4.2	5.1	3.5	6.2	4.3	2.8	11.1	12.8
1904	20.9	34.0	24.8	33.3	10.1	8.8	35.4	19.2	16.2	12.5	6.0	3.5	6.3	7.9	3.9	35.4	16.5
1905	38.8	40.6	41.7	54.1	24.9	26.6	37.3	17.6	20.8	12.4	11.6	8.9	8.4	12.8	5.0	48.4	27.1
1906	27.5	48.7	40.9	44.2	14.0	15.5	50.4	19.0	31.5	10.3	10.6	9.4	6.4	3.5	5.6	31.1	23.4
1907	27.1	42.0	35.8	55.2	22.2	14.6	41.0	24.6	17.8	12.3	2.8	6.8	8.5	13.4	3.6	24.8	22.7

(a) Nella nota (a) a pag. xxxi si è cercato di dare una spiegazione di questo fatto, mettendolo in relazione col cresciuto movimento d'emigrazione in rapporto coll'estero.

§ 5. — **Influenza delle stagioni sulla mortalità.**

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerando la mortalità nel suo complesso, si rileva che la massima si è, nel 1907, verificata nel 1° trimestre, la minima nel 4°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per atrofia congenita, marasmo senile, anemia, risipola, influenza, ipertosse, difterite, eclampsia infantile, malattie del cuore, malattie dei reni, meningite acuta, diabete, reumatismo articolare acuto, siflide, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale e bronco polmonite acuta, apoplezia cerebrale, malattie delle arterie e alcoolismo cronico. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per morbillo, affezioni tubercolari, pellagra, pleurite e per suicidi. In estate (3° trimestre) le morti per gastrite, gastro enterite, peritonite, febbre tifoidea, febbri da malaria e cachessia palustre, tumori maligni e per cause violente accidentali. In autunno (4° trimestre) toccarono i loro massimi le morti per vaiuolo, scarlattina, epatite, rabbia e per omicidio.

§ 6. — **Cause di morte predominanti in ciascun sesso.**

Morirono nel 1907, in tutto il Regno, 354,109 maschi e 346,224 femmine; nella ragione cioè di 102 maschi ogni 100 femmine: negli anni 1906 e 1905 tale rapporto era stato di 103.

Quantunque muoiano ogni anno più maschi che femmine, nondimeno parecchie malattie sono maggiormente esiziali per queste ultime, pure non tenendo conto delle malattie che sono proprie soltanto della donna.

Infatti, nel 1907 morirono più femmine che maschi per febbre tifoidea, per ipertosse, per malattie tubercolari, per anemia e clorosi, per tabe senile, per tumori maligni, per vizi di cuore, per peritonite ed idrope-ascite e per ustioni.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti di bambini nell'atto del parto e quelle per vizi congeniti; le morti per febbri da malaria, per pellagra, per apoplezia, per encefalite e mielite, per polmonite acuta, per rabbia, per ateromasia arteriosa, per epatite, per malattie degli organi urinari, per sclerema, per alcoolismo e le morti violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio.

Risultanze analoghe presentano le statistiche degli anni 1887 e seguenti.

§ 7. — **Cause di morte predominanti nelle diverse età.**

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, cioè dalla nascita a non oltre 1 mese, da 1 mese a non oltre 1 anno, e poi d'anno in anno fino al 5° anno e per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della scala; nell'ultimo gruppo furono collocati gli individui di età ignota. Ma nelle notizie riassuntive che formano oggetto di questa introduzione, la classificazione dei morti per età è fatta in otto gruppi, e cioè dalla nascita a non oltre 1 anno, da oltre 1 anno a 5 compiuti, da oltre 5

a 10 compiuti, da oltre 10 a 20 compiuti, da oltre 20 a 40 compiuti, da oltre 40 a 60 compiuti, da oltre 60 a 80 compiuti e da 80 anni compiuti in su.

Esaminando le proporzioni dei morti nel 1907 classificati per malattie a 1000 morti per qualsiasi malattia separatamente per ciascun gruppo di età, si nota quanto segue:

Nel gruppo dei bambini d'ambo i sessi, che non avevano oltrepassato il primo anno di età, le cause più frequenti di morte sono state la diarrea infantile e la gastroenterite (273.3 ogni 1000 morti), l'immatùrità e debolezza congenita (255.4), la bronchite acuta (129.7), la polmonite acuta (64.4), l'eclampsia infantile (62.9), l'anemia (28.1) e la gastrite (20.0).

Nel gruppo da oltre 1 a 5 anni compiuti tennero il primo posto le morti per diarrea infantile e gastro enterite (294.1 ogni 1000 morti), vennero in seguito la bronchite acuta (131.7), la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale (127.9), il morbillo (55.5), le affezioni tubercolari (53.1), l'eclampsia infantile (36.7), la difterite e il crup (35.3), la meningite semplice cerebrale e spinale (34.9), l'ipertosse (28.0), le morti violente per cause accidentali (24.1) e l'anemia (23.6).

Nel gruppo da oltre 5 a 10 anni compiuti predominarono le morti per malattie tubercolari con 145.0 per ogni 1000 morti, la diarrea e l'enterite con 125.9, la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale con 97.1, la meningite semplice con 83.1, la difterite e il crup con 49.9, la bronchite acuta con 49.2, le morti violente per cause accidentali con 47.5, le malattie di reni con 44.3, la febbre tifoidea con 44.1, il morbillo con 41.4 e la scarlattina con 40.5.

Nel gruppo da oltre 10 a 20 anni compiuti diedero quozienti più alti le morti per malattie tubercolari (338.0 ogni 1000 morti) e quelle per polmonite crupale e bronco polmonite acuta (84.2). Vennero appresso la febbre tifoidea (83.2), la meningite semplice (57.8), la diarrea e la gastro enterite (56.2); le malattie del cuore (55.1) e le morti violente per cause accidentali (46.1).

Delle morti avvenute da oltre 20 a 40 anni compiuti, più di un terzo erano dovute alle affezioni tubercolari (379.2 su 1000 morti); seguono le morti per polmonite crupale e quelle per bronco polmonite acuta con 117.5. Le malattie del cuore erano rappresentate da 56.7 su 1000 morti, la febbre tifoidea da 44.4, l'enterite e la diarrea da 36.0, le morti violente per cause accidentali da 27.9 e le malattie dei reni da 26.9.

Nel gruppo da oltre 40 a 60 anni compiuti occuparono il primo posto la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta, che in complesso avevano cagionato 176.8 morti ogni 1000; a queste tenevano dietro le affezioni tubercolari con 123.1 per 1000 morti, le malattie del cuore con 122.1, i tumori maligni con 94.2, l'apoplessia e congestione cerebrale con 64.1, l'enterite e la diarrea con 43.9, la bronchite acuta e cronica con 34.3, le malattie dei reni con 32.8, le morti violente per cause accidentali con 25.0 e l'epatite con 24.9.

Nel gruppo da oltre 60 a 80 anni compiuti il maggior numero di vittime è stato dato dalle malattie del cuore (188.0 morti su 1000); seguivano la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta (145.9), il marasmo senile (127.3), l'apoplessia cerebrale (122.4),

la bronchite acuta e cronica (62.1), i tumori maligni (59.0), l'enterite e la gastroenterite (49.9), le malattie delle arterie (34.6) e quelle dei reni (21.7). Le morti per affezioni tubercolari, che, come abbiamo visto, tengono quasi sempre il primo posto nei diversi gruppi di età, e cioè da oltre 5 a 60 anni compiuti, in questo, invece, sono rappresentate da un quoziente basso, e cioè da 18.9 per ogni 1000 morti.

Finalmente nel gruppo da 80 anni compiuti in su, poco meno della metà delle morti derivarono da marasmo senile (456.8 su 1000 morti). Dopo questa, ma a grandissima distanza, le malattie che causarono una mortalità più rilevante furono quelle del cuore con 116.9 morti su 1000, l'apoplezia cerebrale con 89.7, la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta con 78.2, la bronchite acuta e cronica con 63.8, l'enterite e la diarrea con 40.9 e le malattie delle arterie con 37.6.

In altri termini, risulta che nel 1907 furono relativamente più frequenti le morti:

per gastrite, risipola, sifilide e anemia nel primo anno di età;

per morbillo, diarrea infantile e enterite, ipertosse, bronchite acuta e bronco polmonite acuta, nel gruppo d'età da oltre 1 a 5 anni compiuti;

per vaiuolo, scarlattina, difterite e crup, febbri e cachessia da malaria, meningite cerebrale e spinale, malattie dei reni e cause violente accidentali, da oltre 5 a 10 anni compiuti;

per peritonite, febbre tifoidea, reumatismo articolare acuto, encefalite e tetano, da oltre 10 a 20 anni compiuti, nel qual gruppo d'età si mantiene pure alta la mortalità per febbri da malaria ed assume forti proporzioni quella per affezioni tubercolari;

per malattie tubercolari, pleurite, suicidio e omicidio, da oltre 20 a 40 anni compiuti;

per epatite, polmonite crupale, diabete, pustola maligna, alcoolismo e tumori maligni, da oltre 40 a 60 anni compiuti;

per influenza, malattie del cuore, bronchite cronica, pellagra, apoplezia e congestione cerebrale, da oltre 60 a 80 anni compiuti;

per ateromasia delle arterie negli individui da 80 anni in su, fra i quali si mantiene elevata anche la mortalità per apoplezia e congestione cerebrale, per malattie del cuore e per bronchite cronica.

I gruppi di età più esposti a contrarre la rabbia sono quelli dei fanciulli fra 5 e 15 anni e quelli dei vecchi da 60 a 80 anni; i bambini sotto i 5 anni, per esser meglio sorvegliati, e gli adulti fra 15 e 60 anni, perchè più in grado di difendersi, sono relativamente risparmiati.

Prescindendo da ogni classificazione per età, considerando cioè la mortalità generale, le malattie che nel 1907 riuscirono più letali furono anzitutto la diarrea, l'enterite, il colera indigeno, ecc., cui è dovuto circa un settimo delle morti avvenute nel Regno in quell'anno e poi in ordine decrescente la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta, le affezioni tubercolari, le malattie del cuore, la bronchite acuta e cronica, il marasmo senile, l'immatunità e debolezza congenita, l'apoplezia e congestione cerebrale, le quali diedero un contingente di morti che va da un nono ad un ventunesimo del totale.

Morti nel Regno nell'anno 1907 classificati

A) Cifre

PROSPETTO N. II.

Table with columns: NUMERO dell'elenco nosologico, CAUSE DI MORTE, and NUMERO (subdivided by age groups: di non oltre 1 anno, da oltre 1 anno a 5 anni compiuti, da oltre 5 a 10 anni compiuti, da oltre 10 a 20 anni compiuti). Rows list various diseases like Malattie fetali e vizi congeniti, Anemia, Leucomia, etc.

per età, sesso e cause di morte.

effettive.

Table with columns: DEI MORTI IN ETÀ (subdivided by age groups: da oltre 20 a 40 anni compiuti, da oltre 40 a 60 anni compiuti, da oltre 60 a 80 anni compiuti, da 80 anni compiuti in su, ignota), TOTALE GENERALE, and NUMERO dell'elenco nosologico. Rows list various diseases and their counts across different age and sex categories.

Morti nel Regno nell'anno 1907 classificati per età e cause di morte.

B) Cifre proporzionali a 1000 morti dei rispettivi gruppi di età.

Segue PROSPETTO N. 11.

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI MORTI IN ETÀ								TOTALE GENERALE (Ambo i sessi)
		di non oltre 1 anno (Ambo i sessi)	da oltre 1 anno a 5 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 5 a 10 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 10 a 20 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 20 a 40 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 40 a 60 anni compiuti (Ambo i sessi)	da oltre 60 a 80 anni compiuti (Ambo i sessi)	da 80 anni compiuti in su (Ambo i sessi)	
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	14.9	1.5	2.2	0.7	3.8
6	Atrofia congenita	255.4	60.4
39	Anemia	28.1	23.6	9.8	10.4	12.0	18.3	14.1
40	Leucemia	0.9	3.1	3.2	5.0	5.3	4.0	1.1	0.1	2.2
44	Marasmo senile	127.3	456.8	69.8
97	Gastrite	20.0	11.3	7.4	4.1	2.8	4.9	4.2	2.1	8.9
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	273.3	294.1	125.9	56.2	36.0	43.9	49.9	40.9	139.6
99	Epatite, cirrosi epatica	0.5	1.0	2.8	2.9	8.1	24.9	10.5	1.8	6.9
112	Malattie dei reni	4.7	20.6	44.3	25.2	26.9	32.8	21.7	10.0	19.1
110	Appendicite	0.1	2.0	4.5	2.8	2.0	0.7	0.1	0.9
110a	Peritonite	1.1	2.4	12.8	15.4	15.3	7.5	2.6	0.6	4.5
7	Vaiuolo	0.6	1.4	2.5	1.3	1.1	0.4	..	0.1	0.6
8	Morbillo	7.7	55.5	41.4	5.6	0.8	0.2	11.8
9	Scarlattina	1.1	15.3	40.5	10.4	1.0	0.1	4.2
10	Risipola	6.4	1.3	1.0	2.3	3.2	4.7	3.5	2.0	3.7
11	Febbre tifoidea	1.7	9.5	44.1	83.2	44.4	12.1	2.6	0.7	12.4
12	Tifo petecchiale	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1
13	Menigitte cerebro spinale epidemica	0.2	1.3	1.0	0.1	0.1	0.1
16	Ipertosse	17.9	28.0	10.8	0.5	8.8
14	Difterite	1.4	17.7	30.9	5.5	0.6	0.1	4.2
15	Laringite crupale	2.4	17.6	19.0	2.3	0.3	0.1	3.9
18	Febbri da malaria	3.1	8.6	18.1	12.0	6.3	5.0	1.7	0.5	4.7
19	Cachessia palustre	0.5	2.4	3.4	2.0	2.1	2.6	1.0	0.2	1.4
17	Influenza	6.1	8.4	10.3	11.9	10.0	13.6	16.6	16.5	11.6
22	Sifilide	6.0	1.0	0.5	0.6	3.8	3.8	0.5	0.1	2.5
71	Tetano	0.1	0.3	3.6	4.3	1.8	1.5	0.5	..	0.8
24	Pustola maligna, carbonchio	0.3	0.9	1.0	0.9	1.1	0.4	0.1	0.4
27	Rabbia	0.1	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1
124	Febbre puerperale	1.2	15.8	1.5	1.6
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	2.3	24.7	3.9	2.8
77	Bronchite acuta	129.7	131.7	49.2	18.7	13.2	20.7	35.2	40.3	68.7
78	Bronchite cronica	2.0	3.2	4.5	4.4	13.6	26.9	23.5	11.4
81	Polmonite crupale	20.1	39.8	39.9	53.7	84.4	123.0	81.0	33.6	59.4
82	Bronco polmonite acuta	44.3	88.1	57.2	30.5	33.1	53.8	64.9	44.6	56.3
79	Malattie della pleura	0.9	3.4	6.1	8.5	9.7	7.6	3.9	1.2	4.1
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	3.0	13.0	48.3	249.6	335.2	107.5	15.3	2.0	60.3
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	13.1	40.1	96.7	88.4	44.0	15.6	3.6	0.8	22.1
90	Malattie del cuore	1.8	4.2	22.7	55.1	56.7	122.1	188.0	116.9	81.1
87	Malattie delle arterie	0.8	0.2	1.1	1.0	4.5	15.6	34.6	37.6	14.5
64	Apoplessia e congestione cerebrale	0.4	0.7	2.6	4.7	10.7	64.1	122.4	89.7	47.8
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	16.2	34.9	83.1	57.8	18.2	7.9	2.2	0.7	16.9
63	Encefalite	0.7	1.5	2.9	3.7	1.6	1.8	1.4	0.8	1.4
72	Eclampsia infantile	62.9	36.7	21.7	1.9	21.1
134	Reumatismo articolare acuto	0.2	0.4	4.6	9.5	4.4	3.4	1.1	0.4	1.7
45	Pellagra	0.2	0.4	1.6	5.1	5.7	1.1	2.3
47	Diabete	0.1	0.3	1.6	2.7	6.3	4.2	0.7	2.2
138	Alcolismo cronico	1.6	4.1	1.2	0.2	1.0
48 a 58	Tumori maligni	0.3	1.0	3.8	5.8	19.5	94.2	59.0	16.1	29.7
140 a 156	Morte per causa accidentale	2.1	24.1	47.5	46.1	27.9	25.0	12.1	7.6	16.4
157	violenta per omicidio	0.1	0.1	1.2	6.9	10.0	4.1	0.5	0.2	1.8
160 a 168	violenta per suicidio	8.2	14.8	9.8	2.6	0.7	3.5
	Altre malattie	49.5	52.7	68.6	70.6	75.3	105.4	89.4	48.7	70.4

§ 8. — **Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini.**

I bambini morti prima di aver compiuti cinque anni di età sono stati divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima; in questa seconda categoria sono compresi anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI a pagina 76).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1907 a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 57 ed entro il primo anno d'età 151, e che per 1000 nati illegittimi ed esposti ne morirono nel primo mese 107 ed entro il primo anno di età 233.

Mortalità nei bambini di età non superiore ad un anno, senza distinzione di sesso.

PROSPETTO N. 12.

	NATI VIVI nel 1907	MORTI NEL 1907		MORTI PER 1000 NATI VIVI					
		Non oltre 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	Non oltre 1 mese			Da 1 mese ad 1 anno		
				1907	1906	1905	1907	1906	1905
Legittimi	1 006 762	57 803	94 866	57	57	60	94	99	102
Illegittimi ed esposti.	55 571	5 972	6 982	107	108	106	126	132	127

Mortalità nei bambini di età non superiore a 5 anni, distinti per sesso.

PROSPETTO N. 13.

		BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1907				PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti sotto 5 anni		
		Non oltre 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 5 anni compiuti	Totale dei bambini morti sotto i 5 anni	1907	1906	1905
Legittimi	Maschi.	31 484	50 971	51 878	134 333	53	53	52
	Femmine	26 319	43 895	50 863	121 077	47	47	48
Illegittimi ed esposti	Maschi.	3 189	3 449	1 975	8 613	51	49	51
	Femmine	2 783	3 533	2 123	8 439	49	51	49

Tra gli illegittimi, le bambine morte nei primi cinque anni d'età, per rapporto ai maschi, sono, relativamente, in numero maggiore che non fra i legittimi.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi, negli anni 1905, 1906 e 1907.

Cause più frequenti delle morti dei bambini di età non superiore ad un anno.

PROSPETTO N. 14.

CAUSE DI MORTE (a)	PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età					
	Legittimi			Illegittimi ed esposti		
	1907	1906	1905	1907	1906	1905
Malattie fetali e vizi congeniti	2.3	2.1	2.3	2.4	3.1	2.4
Atrofia congenita	38.2	37.1	40.3	65.3	67.7	67.5
Anemia, leucemia.	4.3	6.3	2.9	8.2	12.7	4.8
Gastrite	2.9	1.8	4.1	7.2	5.4	7.8
Diarrea, colera indigeno, enterite	41.1	45.0	48.4	65.5	66.3	65.5
Epatite	0.1	0.1	0.1	..	0.1	0.4
Malattie dei reni	0.7	0.7	0.6	1.1	1.2	1.2
Peritonite	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
Vaiuolo	0.1	..	0.1	0.1	..	0.1
Morbillo	1.2	1.7	1.0	0.8	1.1	1.0
Scarlattina.	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Risipola	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.0
Febbre tifoidea	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Ipertosse.	2.8	2.7	2.5	2.4	2.5	1.9
Difterite e laringite crupale	0.6	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2
Febbri da malaria e cachessia palustre	0.6	0.6	1.0	0.6	0.5	0.9
Influenza.	0.9	0.7	0.9	1.1	0.9	1.0
Sifilide.	0.4	0.4	0.6	11.0	10.0	10.5
Tetano.	0.2	0.1	..	0.1	0.1
Bronchite acuta	20.2	20.2	19.4	19.0	20.6	18.9
Polmonite crupale	3.1	3.0	3.1	3.5	3.2	2.8
Bronco polmonite acuta.	6.8	6.8	6.0	7.7	7.2	6.9
Malattie della pleura	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali. . .	2.5	2.7	2.7	2.7	3.4	3.0
Malattie del cuore	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3
Malattie delle arterie	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Apoplessia e congestione cerebrale.	0.1	0.1	0.2	..	0.1	0.1
Meningite semplice cerebrale e spinale.	2.5	2.9	2.9	2.1	2.2	1.6
Encefalite	0.1	0.2	0.1	0.1	..	0.2
Eclampsia infantile	9.7	9.6	10.5	11.2	10.5	12.7
Morte violenta accidentale	0.3	0.3	0.3	0.8	0.7	0.6
TOTALE DEI MORTI PER QUALSIASI CAUSA . . .	151.6	156.4	162.3	233.1	239.9	232.8

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che negli anni 1905-1907 non furono causa di morte nei bambini di non oltre un anno d'età o ne causarono un numero minimo.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è superiore di $\frac{1}{3}$ e più a quella dei legittimi, e ciò perchè non pochi fra i primi nascono con una costituzione fisica debole o sono affetti da lue congenita; ma, forse in misura maggiore, vi contribuiscono il difetto di cure e l'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per matrimonio dei genitori, ed i bambini morti dopo essere stati legittimati sono classificati fra i legittimi, mentre nella statistica dei nati erano stati iscritti fra gli illegittimi.

§ 9. — **Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile.**

Nella tavola IV, a pagina 52, sono classificati i maschi morti nel 1907 in età di oltre 15 anni compiuti, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da quella tavola si può rilevare in quali professioni gli individui maschi adulti siano di preferenza colpiti da determinate malattie.

Convieni per altro stare in guardia contro alcune cause di errore in cui si può incorrere nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni. Alcune professioni, come quelle di medico, avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedendo una carriera preparatoria assai lunga, possono essere esercitate soltanto da individui che abbiano almeno 23 o 24 anni di età; e per queste professioni non vi possono essere morti di età più giovane, mentre si hanno molti morti fra 15 e 20 anni nelle professioni di agricoltore o di marinaio o di tipografo. D'altra parte, non pochi individui, coll'avanzare dell'età, cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro forze, devono procurarsi una occupazione meno faticosa. Si troveranno perciò pochi morti in età avanzata fra i commessi di negozio, non perchè siano morti quasi tutti in età giovane, ma perchè parecchi col tempo sono diventati padroni e all'atto di morte sono registrati fra i negozianti; così pure parecchi facchini e marinai vecchi sono ridotti alla condizione di bracciante e quasi tutti gli impiegati, i maestri, gli ufficiali dell'esercito e le guardie sono passati, nell'età avanzata, nella categoria dei pensionati.

Nei confronti istituiti nelle pagine seguenti, ci siamo limitati ad indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, durante l'anno 1907, in età di 15 anni e più e che esercitavano la medesima professione. Accanto alle proporzioni dell'anno 1907 abbiamo indicate, a titolo di confronto, anche quelle dell'anno 1906.

Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia negli anni 1906 e 1907.

Morti per febbri da malaria e cachessia palustre.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Pastori, mandriani	1.7	2.7	Ferrovieri e tramvieri	1.2	1.0
Militari	1.5	0.3	Di qualsiasi professione.	0.6	0.7
Minatori, marmisti	1.3	1.6			

Morti per febbre tifoidea.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Militari	10.6	14.9	Fornaciai	2.6	1.8
Studenti	5.6	7.3	Lattai e casari	2.3	2.1
Infermieri	3.5	9.6	Tipografi, litografi	2.3	3.5
Vetrai	3.3	1.6	Corpi armati (escluso l'esercito)	2.2	2.5
Macchinisti e fuochisti	3.2	1.5	Fabbri, meccanici, arrotini	2.1	2.5
Commessi e ragionieri	3.1	3.3	Filatori, tessitori, tintori	2.0	1.4
Ferrovieri e tramvieri	2.6	1.7	Di qualsiasi professione.	1.3	1.6

Morti per pellagra.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Mendicanti e ricoverati	1.9	0.8	Fornaciai	0.6	0.4
Agricoltori, boscaioli	0.8	1.0	Cartai	0.6	0.7
Braccianti, manovali	0.7	0.9	Di qualsiasi professione.	0.5	0.6

Morti per apoplessia cerebrale.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Droghieri e farmacisti	12.6	11.5	Sarti	10.7	10.7
Sacerdoti, monaci	12.1	14.2	Cappellai, guantai	10.4	11.1
Proprietari e benestanti.	11.9	12.5	Domestici, portieri	10.2	10.9
Mendicanti e ricoverati	11.6	11.0	Ingegneri, agrimensori	10.1	9.8
Impiegati e pensionati civili	11.6	12.2	Trattori, vinai	10.1	9.5
Maestri e professori	11.1	10.9	Medici, veterinari	10.0	10.9
Avvocati, uscieri giudiziari	11.0	11.6	Di qualsiasi professione.	8.9	9.2
Conciatori	11.0	10.2			

Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia negli anni 1906 e 1907.

Morti per tubercolosi disseminata e tisi polmonare.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Studenti	40.0	45.0	Calzolari, sellai	16.6	17.8
Camerieri d'esercizi pubblici	29.8	19.7	Ferrovieri e tranvieri	16.3	13.6
Tipografi, litografi	29.1	30.1	Macchinisti e fuochisti	15.6	15.1
Commessi e ragionieri	24.8	23.4	Fabbricanti ed operai non specificati	15.5	15.4
Infermieri	24.8	19.1	Falegnami, verniciatori	15.3	16.7
Tappezziere e materassai	22.5	18.6	Caffettieri, pasticciere	15.0	15.3
Barbieri	21.8	22.9	Cartai	14.5	8.2
Vetrai	20.5	21.3	Muratori, scalpellini, fumisti	13.7	13.3
Orefici, orologiai	20.5	20.0	Corpi armati (escluso l'esercito)	13.7	16.0
Fabbrici, meccanici, arrotini	19.1	18.5	Macellai, pizzicagnoli	13.6	14.4
Cappellai, guantai	18.3	17.6	Facchini, lavandai, spazzini	13.6	11.5
Cestai	17.7	18.2	Mugnai, pastai, fornai	13.1	14.3
Sarti	16.9	17.4	Di qualsiasi professione	8.9	8.9
Fattorini postali e telegrafici	16.8	19.8			

Morti per polmonite erupale e bronco polmonite acuta.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Pastori, mandriani	20.7	21.9	Agricoltori, boscaioli	17.1	16.1
Minatori, marmisti	18.6	16.3	Fattorini postali e telegrafici	16.3	15.1
Conciatori	18.0	13.9	Di qualsiasi professione	14.8	13.9
Facchini, lavandai, spazzini	17.2	17.2			

Morti per malattie del cuore.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Filatori, tessitori, tintori	13.8	12.4	Lattai e casari	12.3	13.2
Proprietari, benestanti	12.7	13.1	Impiegati e pensionati civili	12.3	12.9
Fruttivendoli, venditori ambulanti	12.7	12.0	Di qualsiasi professione	11.6	12.0
Agricoltori, boscaioli	12.6	12.9			

Morti per enterite e diarrea.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Mendicanti e ricoverati	6.9	7.4	Caffettieri, pasticciere	5.1	4.6
Cartai	6.9	6.1	Pastori, mandriani	5.0	5.5
Lattai e casari	6.5	2.1	Agricoltori, boscaioli	4.8	5.4
Cestai	5.3	6.2	Di qualsiasi professione	4.3	4.9

Su 100 maschi morti in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia negli anni 1906 e 1907.

Morti per malattie renali.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Avvocati, uscieri giudiziari	6.0	5.5	Impiegati e pensionati civili	3.7	3.8
Medici, veterinari	5.8	5.2	Fattorini postali e telegrafici	3.7	4.3
Maestri e professori	5.5	5.5	Camerieri d'esercizi pubblici	3.7	1.9
Ingegneri, agrimensori	5.3	7.3	Cappellai, guantai	3.6	4.5
Orefici, orologiai	4.4	6.1	Ferrovieri e tramvieri	3.6	4.9
Caffettieri, pasticciere	4.4	4.6	Macchinisti e fuochisti	3.5	3.5
Infermieri	4.4	3.2	Barbieri	3.5	2.6
Tipografi, litografi	4.2	3.3	Proprietari, benestanti	3.4	3.6
Droghieri e farmacisti	4.0	5.8	Di qualsiasi professione	2.3	2.5
Sacerdoti, monaci	4.0	3.1			

Morti per cirrosi del fegato.

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Trattori, vinali	5.9	5.9	Maestri e professori	2.7	2.0
Macellai, pizzicagnoli	4.2	4.1	Caffettieri, pasticciere	2.7	2.5
Ferrovieri e tramvieri	3.5	1.4	Orefici, orologiai	2.6	4.5
Negozianti, albergatori	3.4	3.7	Lattai e casari	2.6	3.6
Droghieri e farmacisti	3.2	2.9	Cappellai, guantai	2.5	2.0
Fattorini postali e telegrafici	3.1	0.4	Domestici, portieri	2.4	2.1
Corpi armati (escluso l'esercito)	2.8	2.5	Di qualsiasi professione	1.6	1.6

CAPO III.

MORTALITÀ NEI COMUNI URBANI PIÙ IMPORTANTI.

§ 1. — **Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, durante il periodo 1881-1907.**

Giova mettere a raffronto le cifre della mortalità avvenuta nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario con quelle di tutti gli altri Comuni. I Comuni del primo gruppo sono, per la massima parte, grossi centri di popolazione urbana, mentre in quelli del secondo gruppo predominano i piccoli centri e gli abitanti che vivono sparsi per le campagne. Dal confronto fra le due serie di cifre si potrà rilevare quale influenza eserciti la distribuzione territoriale della popolazione sulle condizioni sanitarie di essa.

Nel prospetto n° 15 diamo le cifre concernenti gli anni 1881-1886 per ciò che riguarda i 284 capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, e gli anni 1887-1907 per i 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario e per i rimanenti Comuni del Regno. Per gli anni 1902-1907 abbiamo anche indicato separatamente le cifre che si riferiscono ai 78 Comuni di media importanza, ai quali si è già ripetutamente accennato (a).

Ci siamo limitati a dare per questo confronto le sole cifre effettive, perchè il nuovo calcolo della popolazione, indicato a pagina V e seg., per i motivi ivi esposti, è stato fatto soltanto per i 69 Comuni capiluoghi di provincia.

(a) Ricordiamo che questo numero è costituito da 17 principali capiluoghi di distretto e da 61 Comuni non capiluoghi che avevano, al 10 febbraio 1901, più di 20,000 abitanti.

Morti nei Comuni capiluoghi di provincia, di circondario o distretto ed in altri 78 Comuni più

PROSPETTO N. 15.

	VAIUOLO	MORBILLO	SCARLAT- TINA	FEBBRE tifoidea e tifo petecchiale	DIFTERITE e laringite erupale	IPERTOSSE	FEBBRI da malaria e cachessia palustre
Cifre							
Morti nei 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto: anni 1881-86	12 151	27 529	12 360	42 867	39 777	11 251	20 951
anni 1887-93	15 375	23 679	10 251	33 141	(a) 24 848	(b) 3 247	18 176
" 1894-97	1 890	7 702	2 292	13 919	11 202	4 194	9 026
" 1898-901	1 686	5 538	1 628	14 678	5 869	4 502	8 396
anno 1902	560	2 410	169	3 236	1 192	1 146	1 538
Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario.							
" 1903	752	1 109	495	3 312	1 120	962	1 343
" 1904	676	1 032	229	3 444	1 179	851	1 242
" 1905	261	1 650	425	3 072	1 145	917	1 134
" 1906	47	1 799	586	2 559	1 191	980	800
" 1907	53	1 529	598	2 391	1 514	1 060	801
anno 1902	299	654	161	695	204	269	622
" 1903	2 384	468	59	747	231	278	504
" 1904	490	331	115	826	168	334	475
Morti in 78 Comuni non capiluoghi, ma assai popolosi (1).							
" 1905	18	230	57	668	189	200	398
" 1906	6	465	285	542	215	224	386
" 1907	26	393	90	527	248	312	349
anni 1887-93	46 418	94 149	48 998	116 364	(a) 93 781	(b) 20 177	99 746
" 1894-97	6 750	30 276	13 174	47 311	34 016	27 343	48 704
" 1898-901	2 660	21 713	10 019	44 524	20 066	24 285	43 216
anno 1902	1 853	7 551	1 169	8 125	3 322	6 056	8 370
Morti negli altri Comuni del Regno (e).							
" 1903	5 297	6 174	1 496	8 361	2 944	5 559	7 174
" 1904	2 417	4 300	1 382	8 804	3 340	5 107	7 221
" 1905	221	5 088	1 264	7 862	3 110	4 850	6 711
" 1906	122	7 927	2 138	6 900	3 062	5 185	4 071
" 1907	398	6 655	2 342	6 262	4 120	5 112	3 430

popolosi (1), confrontati coi morti negli altri Comuni del Regno, durante gli anni dal 1881 al 1907.

SIFILIDE	TUBERCOLOSI disseminata e sue manifestazioni locali	PELLAGRA	POLMONITE erupale e bronco polmonite acuta	DIARREA, enterite, colera indigeno, ulcera intesti- nale*	FEBBRE puerperale	ALCOOLISMO cronico	MORTI violente per cause accidentali	SUICIDI	TOTALE dei morti per qualsiasi causa
6 632	141 543	13 480	85 819	123 648	2 878	1 790	15 468	4 477	1 243 177
8 312	140 479	6 712	131 572	(b) 64 041	(b) 1 034	(b) 742	(b) 7 007	(b) 2 418	1 371 161
5 177	77 120	3 036	80 529	85 522	1 173	783	(c) 6 982	(c) 2 637	736 089
5 100	75 694	4 210	80 092	88 364	997	807	9 875	3 736	732 257
1 186	17 728	583	(d) 10 070 9 779	23 186	264	142	2 660	920	183 484
1 216	17 894	723	(d) 11 451 10 301	22 584	260	140	2 675	865	185 605
1 163	18 732	617	(d) 9 384 9 094	22 637	257	215	2 785	1 022	179 680
1 239	19 220	622	(d) 10 793 10 587	24 918	227	319	3 211	1 087	191 773
1 112	19 186	565	(d) 10 192 10 910	23 738	304	292	2 719	1 035	183 664
1 059	19 549	406	(d) 11 476 11 536	22 056	295	250	3 034	1 194	186 938
98	3 206	150	(d) 2 439 2 090	8 956	50	21	552	78	46 275
94	3 038	150	(d) 2 612 1 987	8 415	44	17	540	81	46 916
94	3 364	138	(d) 2 144 1 933	8 125	43	15	572	95	44 540
109	3 233	144	(d) 2 142 1 940	8 994	47	27	645	124	44 731
98	3 254	126	(d) 2 117 2 074	8 609	54	28	543	111	43 584
74	3 283	117	(d) 2 309 2 320	8 121	65	28	601	104	44 220
6 493	288 705	19 108	370 212	(b) 248 776	(b) 3 908	(b) 992	(b) 23 457	(b) 2 739	4 217 060
4 012	155 232	9 146	223 915	337 324	4 436	1 376	(c) 22 841	(c) 2 990	2 277 827
3 583	152 750	10 455	216 111	332 460	3 546	1 226	31 375	4 396	2 187 354
823	34 304	1 793	(d) 30 411 23 813	88 332	773	258	7 833	1 090	543 697
703	34 764	1 924	(d) 35 949 25 441	86 094	852	261	7 647	1 057	550 706
686	36 094	1 746	(d) 28 125 23 087	81 941	825	294	8 259	1 134	518 924
747	37 298	1 735	(d) 28 019 23 681	90 449	750	518	9 935	1 292	538 567
702	37 134	1 459	(d) 27 158 25 376	85 115	717	410	8 101	1 284	513 211
698	37 776	1 229	(d) 29 891 27 642	75 133	852	413	8 408	1 251	513 395

(1) Veggasi la nota (a) a pag. LIII.
(a) Non compresi i morti per laringite erupale. — (b) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1891-92-93 — (c) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1894, 1896 e 1897. — (d) Il primo numero riguarda i morti per polmonite erupale; il secondo quelli per bronco polmonite acuta. — (e) Nel complesso dei morti negli altri Comuni del Regno sono compresi anche quelli dei 78 Comuni popolosi, ma

riferiscono soltanto agli anni 1894, 1896 e 1897. — (d) Il primo numero riguarda i morti per polmonite erupale; il secondo quelli per non capiluoghi di provincia, né di circondario.

§ 2. — Mortalità nelle città principali durante gli anni 1906 e 1907.

Prendiamo ora in esame più particolarmente la mortalità avvenuta durante gli anni 1906 e 1907 nei 30 Comuni che contavano più di 60,000 abitanti. Nei due prospetti seguenti (n. 16 e 17), i morti nei suddetti 30 Comuni sono classificati secondo alcune cause più frequenti o più caratteristiche e messi a confronto col numero dei morti per le stesse cause nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia e nel complesso degli altri Comuni del Regno, sia in cifre effettive, sia in rapporto a 10,000 abitanti (a).

Dal prospetto n. 16 si rileva che 20 delle 30 Città più popolose furono, nell'anno 1907, immuni dal *vaiuolo* e che nelle altre dieci non si ebbero a lamentare che rare vittime per tale morbo.

Il *morbillo* assunse una certa gravità in Modena e Brescia.

La *scarlattina* causò parecchie morti a Bologna; mentre nelle altre Città fu mite, anzi, in Brescia, Modena, Trapani, Reggio nell'Emilia e Marsala non si ebbe alcuna morte per tale causa.

La *febbre tifoidea* cagionò il maggior numero di morti, relativamente alla popolazione, in Verona, Brescia, Pistoia, Catania, Milano, Trapani, Ravenna e Messina; ed il minore in Alessandria, Perugia, Napoli e Palermo.

La *difterite* e la *laringite crupale* dominarono in Bologna, Verona, Brescia, Padova e Reggio nell'Emilia.

I morti per *ipertosse* toccarono il massimo in Modena, Ferrara, Padova, Ravenna, Reggio nell'Emilia e Firenze. Nel comune di Trapani non si verificò alcuna morte per *ipertosse*, durante l'anno 1907.

Le *febbri* e la *cachessia da malaria* fecero maggiori vittime che altrove in Marsala (10.2 morti ogni 10,000 abitanti), Taranto (8.3) e Trapani (6.3). Seguono, a distanza, Catania (1.2) e Roma (0.8) (b). Nelle rimanenti Città la mortalità per malaria fu lievissima, anzi, in Livorno, Lucca, Verona, Alessandria, Brescia, Modena, Reggio nell'Emilia, Ancona e Pistoia essa fu nulla nel 1907.

La *sifilide* diede i maggiori quozienti di mortalità in Messina, Verona, Brescia, Napoli, Reggio Emilia, Alessandria e Roma. In Pistoia non si ebbe alcuna morte per *sifilide* nel 1907.

Le morti per *febbre puerperale* avvennero, presso a poco, colla stessa frequenza nelle Città più popolose.

La mortalità per *atrofia congenita* presentò i più alti quozienti in Modena, Reggio

(a) Ricordiamo che i quozienti di mortalità sono stati calcolati in base al numero delle morti avvenute in ciascun Comune, sia fra gli individui che vi dimoravano abitualmente, sia fra gli avventizi, i quali potevano aver contratto la malattia che ne causò la morte dopo il loro arrivo nel Comune o esservi recati già infermi per farsi curare in qualche istituto ospitaliero.

(b) Circa la frequenza delle *febbri da malaria* in Roma, occorre tener conto del gran numero di lavoratori avventizi nell'Agro e nel suburbio, che colti dalla febbre, vengono a cercar ricovero e soc-

Emilia, Ferrara, Ravenna, Padova, Perugia, Catania, Marsala e Messina; ed i più bassi in Trapani, Napoli, Alessandria, Ancona, Spezia, Torino, Milano e Taranto.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* diedero in Genova, Brescia, Modena, Napoli, Firenze, Verona e Lucca, un quoziente di mortalità assai più grande di quello riscontrato in Trapani, Ferrara, Bari, Perugia, Padova, Ravenna e Marsala.

La *bronchite acuta e cronica* determinò una mortalità considerevole nelle città di Catania, Bari, Reggio Emilia, Modena e Napoli; mentre in quelle di Spezia, Bologna, Roma, Milano, Torino, Pisa, Ravenna, Genova, Venezia, Pistoia e Padova riuscì meno letale.

La mortalità per le malattie *tubercolari*, prese complessivamente, presentò i quozienti massimi in Brescia, Pisa, Firenze, Lucca, Venezia, Padova, Milano, Ferrara, Genova ed Alessandria; ed i minimi in Trapani, Marsala, Perugia, Ravenna, Catania, Taranto Napoli e Palermo.

Le malattie del *cuore* cagionarono una mortalità relativamente alta in Verona, Reggio Emilia, Napoli, Brescia e Genova al paragone di quella verificatasi in Trapani, Marsala, Taranto, Spezia, Roma, Ancona, Ferrara, Palermo e Pisa.

L'*apoplessia* e la *congestione cerebrale* fecero il maggior numero di vittime in Brescia, Verona, Perugia, Ancona, Ferrara, Pisa, Reggio Emilia, Lucca e Firenze; e il

combono negli ospedali della Città. Dalla tabella seguente risulta che negli anni 1881-96 circa un terzo delle morti avvenute in Roma per febbri malariche fu dato dalla popolazione avventizia e che negli anni 1897-1907 questa ne ha dato la metà od anche di più.

Morti di febbri da malaria e di cachessia palustre nel Comune di Roma in ciascun anno del periodo 1881-1907.

MORTI di febbri malariche nella popolaz.	ANNI DI OSSERVAZIONE																											
	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	
Stabile . . .	387	325	335	267	283	225	250	234	238	226	188	92	114	86	135	76	37	75	47	48	30	26	20	28	30	20	18	
Avventizia . .	263	180	153	122	122	130	124	133	104	74	66	47	75	54	84	61	36	95	40	75	46	27	26	27	35	30	26	
TOTALE . . .	650	505	488	389	405	355	374	367	342	300	254	139	189	140	189	137	73	170	87	123	76	53	46	55	65	50	44	

Come si vede, le condizioni di Roma rispetto all'endemia malarica, sono molto migliorate dal 1881 al 1907. Difatti, il numero effettivo dei morti è scemato, nel detto periodo di tempo, da 650 a 44, mentre negli stessi anni la popolazione è cresciuta da 309,467 a 528,764, cosicchè il quoziente di mortalità per tali malattie è sceso, nei ventisette anni considerati, da 21.6, per ogni 10,000 abitanti, a 0.8.

Classificando i morti di febbri da malaria, negli otto anni 1900-1907, secondo il luogo in cui erano domiciliati, si hanno le cifre seguenti:

ANNI	POPOLAZIONE		NUMERO DEI MORTI DI FEBBRI DA MALARIA PROVENIENTI		PROPORZIONE DEI MORTI PER 10,000 ABITANTI	
	della città	dell'agro romano	dalla città	dall'agro romano	della città	dell'agro romano
1900	424,000	36,500	67	56	1.58	15.34
1901	433,816	38,482	32	44	0.74	11.43
1902	443,663	39,243	22	31	0.50	7.30
1903	455,776	40,425	27	19	0.59	4.70
1904	466,823	41,971	34	21	0.73	5.00
1905	482,584	43,286	31	34	0.64	7.85
1906	487,602	43,900	24	26	0.49	5.92
1907	507,824	46,020	20	24	0.39	5.21

minore in Taranto, Spezia, Catania, Trapani, Bari, Palermo, Pistoia, Genova, Livorno, Messina, Roma e Marsala.

L'*enterite*, la *diarrea* e le altre malattie infiammatorie del canale intestinale colpirono più gravemente le città di Bari, Taranto, Catania, Brescia, Reggio Emilia, Palermo, Modena, Trapani e Napoli; mentre Bologna, Spezia, Lucca, Firenze, Torino, Ancona e Roma ne soffrirono molto meno, tantochè la percentuale in alcuni di questi ultimi Comuni, per esempio in Bologna, fu meno di un quinto di quella verificatasi in Bari.

L'*alcolismo cronico* causò parecchie morti in Verona, Brescia, Ancona, Lucca, Perugia, Reggio Emilia e Padova; in confronto a Napoli, Palermo, Catania, Messina, Livorno, Ferrara e Pistoia, nelle quali città rari furono i casi di morte per alcolismo. Nelle città di Bari, Ravenna, Modena, Pisa, Spezia, Taranto e Marsala non si verificò alcun caso di morte per abuso di bevande alcoliche, durante l'anno 1907.

Le morti violenti per *cause accidentali* avvennero con maggior frequenza in Brescia, Alessandria, Lucca, Bologna, Napoli, Milano; i *suicidi* in Venezia, Bologna, Roma, Torino, Firenze e Milano; gli *omicidi* in Napoli, Palermo, Catania, Ravenna, Trapani, Roma, Bari, Firenze, Livorno e Pisa. Nelle città di Lucca e Verona non si ebbe alcun morto per omicidio durante l'anno 1907.

Se poi si confronta la mortalità avvenuta durante gli anni 1907 e 1906 nei Comuni più popolosi con quella dei Comuni minori si notano le seguenti differenze:

Tanto il *morbillo*, quanto la *scarlattina* e l'*ipertosse*, causarono un numero di morti minore, relativamente alla popolazione, nei primi che non nei secondi. Quanto al *vaiuolo*, alla *difterite* ed alla *febbre tifoide* si osservano lievi differenze fra i due gruppi di Comuni. L'*infezione malarica*, nei Comuni rurali ebbe, si può dire, un grado di perniciosità triplo di quello che spiegò nei maggiori centri, sebbene questi siano di preferenza sede di ospedali e di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei piccoli Comuni finitimi.

La *polmonite acuta* fu alquanto più esiziale nei centri principali che nei piccoli Comuni; la *sifilide* diede nelle grandi città un quoziente di mortalità cinque volte più grande di quello osservato in media nei Comuni minori e la proporzione delle morti per *alcolismo cronico* fu nelle prime doppia di quella calcolata per l'insieme dei secondi. Anche la *tisi* e le altre *malattie tubercolari* diedero nelle prime quozienti di mortalità molto più alti di quelli osservati nei secondi; la *diarrea* e l'*enterite* fecero invece un numero relativamente maggiore di vittime nei piccoli Comuni in confronto delle Città. Le *morti violente accidentali* avvennero quasi con pari frequenza; quelle per *suicidio*, invece, sono tre volte più numerose, rispetto alla popolazione, nei Comuni più popolosi.

Morti durante il 1907 nei 30 Comuni che contavano più di 60,000 abitanti, nel totale dei 69 Comuni capiluoghi di provincia e nei restanti Comuni, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

A) Cifre effettive.

PROSPETTO N. 16.

COMUNI	Vainolo	Morbilli	Scarlatina	Febbre tifoidea	Difterite e laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria o cachessia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrofia congenita	Bronchite acuta	Bronchite cronica	Polmonite crupale	Broncopolmonite acuta	Tubercolosi disseminate e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Apoplessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale	Alcolismo cronico	Morte violenta			Totale dei morti per qualsiasi causa
																				per causa accidentale	per suicidio	per omicidio	
Napoli	6	45	12	59	144	17	17	153	8	301	955	257	779	1 312	1 147	1 297	707	1 682	2	235	64	78	14 460
Milano	1	39	6	219	90	46	5	36	29	499	316	55	784	723	1 680	930	681	948	13	227	122	27	11 318
Roma	1	118	2	126	63	62	44	95	22	510	216	118	694	610	1 346	612	485	803	11	172	126	37	9 964
Torino	9	6	6	93	56	48	1	18	9	314	171	81	554	504	1 010	719	413	510	13	132	84	14	7 140
Palermo	1	5	14	42	13	16	15	24	11	353	462	85	580	203	617	444	253	988	1	102	32	32	6 767
Genova	..	96	3	51	16	9	1	39	8	264	180	23	396	801	762	537	223	450	14	99	48	9	5 894
Firenze	..	35	2	71	62	58	2	18	4	217	162	46	379	370	729	383	291	296	4	50	51	13	5 037
Catania	..	5	11	64	30	13	20	14	..	245	457	41	253	178	235	255	113	654	1	37	20	16	3 855
Bologna	..	19	27	46	93	23	2	13	..	179	69	33	180	168	423	315	207	177	4	66	46	2	3 379
Messina	..	3	15	58	29	8	1	128	4	240	171	25	197	135	350	271	114	367	1	29	13	7	3 474
Venezia	1	20	17	25	14	14	2	7	3	199	114	16	216	210	476	298	193	303	9	50	55	3	3 490
Livorno	1	2	8	21	13	19	..	1	4	136	105	25	145	153	248	208	88	167	1	24	17	6	2 028
Ferrara	1	16	3	25	33	35	3	11	8	151	63	16	69	99	265	140	100	188	6	26	14	3	2 041
Bari delle Puglie	..	3	3	13	16	46	3	8	5	173	98	18	69	79	249	123	130	164	1	28	8	3	1 854
Lucca	..	28	8	19	10	2	4	12	4	108	153	63	55	91	180	137	61	465	..	23	11	6	2 114
Verona	..	4	2	41	37	7	..	45	3	96	92	15	164	97	213	196	134	158	16	20	11	..	1 876
Brescia	..	43	3	37	31	6	..	23	5	93	67	18	193	133	280	156	141	298	12	57	13	3	2 308
Alessandria	..	10	3	12	9	9	..	14	..	42	73	14	93	103	201	127	76	158	4	34	7	2	1 460
Ravenna	..	1	5	25	5	18	2	3	1	130	45	4	62	67	96	102	85	172	..	19	11	6	1 219
Trapani	..	21	..	26	3	..	42	4	3	31	65	11	55	30	46	58	47	199	1	15	4	5	968
Modena	..	95	..	15	15	38	..	4	..	149	127	11	78	164	137	102	83	200	..	25	7	1	1 910
Perugia	..	1	..	6	13	5	..	3	2	110	106	8	62	56	92	112	107	111	5	20	5	2	1 275
Reggio nell'Emilia	..	12	..	10	21	17	..	14	4	134	134	6	71	105	152	154	88	220	5	18	10	1	1 692
Pisa	..	3	1	19	7	4	..	1	2	71	38	8	40	104	234	93	89	115	..	23	5	4	1 330
Ancona	..	3	7	13	17	7	..	3	3	32	60	10	46	89	129	74	96	92	9	22	6	3	1 147
Spezia	..	4	1	18	2	2	..	2	2	62	27	3	62	118	212	82	51	93	..	23	13	4	1 101
Pistoia	..	4	1	31	19	10	..	5	5	95	42	15	98	87	180	125	58	156	1	14	8	2	1 396
Taranto	..	1	6	11	3	4	..	57	4	61	92	11	68	73	117	66	34	297	..	18	3	2	1 334
Marsala	..	9	..	14	2	13	..	64	3	4	95	6	72	51	77	58	59	153	..	19	1	3	1 026
TOTALE dei 30 Comuni con più di 60,000 abitanti	30	691	171	1 215	885	566	290	717	169	5 178	4 788	1 080	6 617	7 074	12 128	8 330	5 347	10 696	141	1 663	819	262	104 690
TOTALE dei 69 Comuni capiluoghi di provincia	39	938	273	1 594	1 137	709	322	932	215	6 920	6 436	1 493	8 347	8 618	14 995	10 534	6 912	14 444	213	2 165	963	364	134 631
TOTALE degli altri Comuni del Regno	412	7 246	2 667	7 020	4 497	5 433	3 909	825	932	35 129	41 433	6 440	33 020	30 560	42 330	45 969	26 358	82 745	450	9 277	1 482	919	565 702

CAPO IV.

NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1907.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti a causa di infortunio accidentale, di omicidio e di suicidio, divisi per sesso, negli anni dal 1887 al 1907.

Classificazione delle morti violente negli anni 1887-1907.

PROSPETTO N. 18.

A N N I	N U M E R O D E I M O R T I								
	Per infortunio accidentale			Per omicidio (a)			Per suicidio		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
1887.	11 180	7 518	3 662	1 547	1 358	189	1 449	1 182	267
1888.	11 356	7 664	3 692	1 637	1 433	204	1 590	1 280	310
1889.	10 278	6 868	3 410	1 458	1 273	185	1 463	1 144	319
1890.	9 784	6 557	3 227	1 317	1 128	189	1 652	1 356	296
1891.	10 310	6 869	3 441	1 407	1 205	202	1 697	1 381	316
1892.	10 146	6 831	3 315	1 558	1 358	200	1 723	1 392	331
1893.	10 008	6 586	3 422	1 648	1 424	224	1 737	1 432	305
1894.	9 891	6 484	3 407	1 429	1 238	191	1 732	1 381	351
1895.	8 894	5 833	3 061	1 487	1 276	211	1 874	1 507	367
1896.	9 628	6 283	3 345	1 456	1 256	200	2 000	1 594	406
1897.	10 304	6 741	3 563	1 540	1 327	213	1 895	1 505	390
1898.	10 066	6 700	3 366	1 706	1 457	249	2 059	1 629	430
1899.	10 229	6 743	3 486	1 417	1 211	206	2 019	1 594	425
1900.	10 184	6 780	3 404	1 306	1 103	203	2 040	1 615	425
1901.	10 771	7 008	3 763	1 262	1 071	191	2 014	1 597	417
1902.	10 493	6 867	3 626	1 332	1 133	199	2 010	1 580	430
1903.	10 322	6 804	3 518	1 305	1 106	199	1 922	1 537	385
1904.	11 044	7 480	3 564	1 312	1 135	177	2 156	1 705	451
1905.	13 146	8 720	4 426	1 444	1 241	203	2 379	1 869	510
1906.	10 820	7 192	3 628	1 317	1 134	183	2 319	1 755	564
1907.	11 442	7 829	3 613	(b) 1 283	1 091	192	2 445	1 821	624

Sopra 220,296 morti per causa violenta accidentale negli anni dal 1887 al 1907, 146,357 erano maschi e 73,939 femmine, cioè, ogni 100, se ne contarono 66 dei primi e 34 delle seconde, e nel solo anno 1907, rispettivamente, 68 e 32 su 100.

(a) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e derivati da duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente, i quali ai termini dell'art. 49 del Codice penale possono essere non punibili.

(b) In questo numero sono compresi 7 omicidii (6 maschi e 1 femmina) dipendenti dall'esecuzione di ordini impartiti dall'Autorità competente e 13 di persone rivestite di pubblica autorità (1 carabiniere, 1 guardia di città, 1 guardia municipale, 1 guardia daziaria, 1 guardia di finanza, 1 guardia notturna e 7 guardiani campestri) delle quali s'ignera se e quante perirono nel compimento del proprio dovere. Nel 1907 non si ebbe alcuna dichiarazione di morte avvenuta in duello. Per gli anni anteriori veggansi i volumi che si riferiscono al 1906 e 1905.

§ 2. — **Morti per infortunio accidentale negli anni 1905-907 classificati per compartimenti, sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento.**

Distribuzione geografica. — Le morti accidentali, negli anni 1905, 1906 e 1907, si ripartivano geograficamente come apparisce dal prospetto sottostante.

Morti accidentali negli anni 1905-1907 divise per compartimenti.

PROSPETTO N. 19.

COMPARTIMENTI	ANNO 1907		ANNO 1906		ANNO 1905	
	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti
Piemonte	1 256	36.59	1 195	34.98	1 280	37.59
Liguria	413	35.43	445	38.72	474	41.80
Lombardia	1 707	37.76	1 561	34.87	1 571	35.41
Veneto	1 079	31.83	972	29.04	1 208	36.49
Emilia	792	31.45	738	29.47	1 043	41.86
Toscana	778	29.18	802	30.29	1 038	39.44
Marche	422	39.31	368	34.36	465	43.32
Umbria	259	37.50	246	35.88	335	49.18
Lazio	416	32.27	404	31.85	640	51.11
Abruzzi e Molise	550	37.65	515	35.49	583	40.28
Campania	1 196	37.30	1 311	41.03	1 208	37.89
Puglie	674	32.84	533	26.23	719	35.73
Basilicata	171	36.39	207	43.91	277	58.39
Calabrie	498	35.14	428	30.38	1 041	74.12
Sicilia	961	26.86	846	23.63	930	25.89
Sardegna	270	31.91	249	29.81	334	40.42
REGNO	11 442	33.88	10 820	32.26	13 146	39.40

Nell'anno 1907 le morti accidentali sono state relativamente più frequenti nelle Marche, nella Lombardia, negli Abruzzi, nell'Umbria e nella Campania; e meno frequenti nella Sicilia e nella Toscana.

Età e sesso. — Nel 1907 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 32 erano in età non superiore ai 15 anni, 46 fra 15 e 60 anni e 22 di oltre 60 anni. Nelle femmine, gli infortuni furono relativamente più numerosi nell'infanzia e nell'adolescenza (53 per cento in età non superiore ai 15 anni) e nell'età avanzata (25 per cento di oltre 60 anni), mentre le età fra 15 e 60 anni non diedero che un quoziente di 22 per cento.

Nel prospetto seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1905-1907.

Morti accidentali negli anni 1905-1907, classificate per gruppi d'età e secondo il sesso dei colpiti.

PROSPETTO N. 20.

ETÀ DEI DEFUNTI	CIFRE EFFETTIVE									CIFRE PROPORZIONALI a 100 morti accidentali					
	Anno 1907			Anno 1906			Anno 1905			1907		1906		1905	
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Non oltre 1 anno	344	187	157	335	180	155	372	204	168	2	4	2	4	2	4
Da oltre 1 a 4 anni compiuti . . .	2 548	1 389	1 159	2 474	1 333	1 141	2 515	1 339	1 176	18	32	19	32	15	27
" 5 a 14 " . . .	1 575	943	632	1 550	902	648	1 717	1 032	685	12	17	13	18	12	16
" 15 a 29 " . . .	1 534	1 289	245	1 490	1 203	287	1 849	1 387	462	17	7	17	8	16	10
" 30 a 39 " . . .	794	662	132	745	595	150	936	735	201	9	4	8	4	9	4
" 40 a 49 " . . .	910	738	172	861	696	165	1 246	977	269	9	5	10	5	11	6
" 50 a 59 " . . .	1 081	873	208	943	709	234	1 339	1 039	300	11	6	10	6	12	7
" 60 a 69 " . . .	1 197	867	330	1 046	751	295	1 414	998	416	11	9	10	8	12	9
Da 70 anni in su	1 403	832	571	1 325	786	539	1 711	975	736	11	16	11	15	11	17
Età ignota	56	49	7	51	37	14	47	34	13
TOTALE . . .	11 442	7 829	3 613	10 820	7 192	3 628	13 146	8 720	4 426	100	100	100	100	100	100

Cause. — Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute nei maschi durante l'anno 1907, sono indicate le cadute, le ustioni, gli schiacciamenti e gli annegamenti. Nelle femmine prevalgono le ustioni (48.08 su 100), e quindi le cadute, gli annegamenti e gli schiacciamenti.

Morti accidentali negli anni 1905-1907, classificate secondo le cause che le determinarono.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI											
	Cifre effettive						Cifre proporzionali a 100 per qualsiasi causa					
	Anno 1907		Anno 1906		Anno 1905		Anno 1907		Anno 1906		Anno 1905	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Ubbriachezza	(a) 97	(a) 8	(b) 76	(b) 8	(c) 65	(c) 3	1 24	0.22	1.06	0.22	0.75	0.07
Annegamento	1 217	433	1 165	459	1 409	523	15.54	11.98	16.20	12.65	16.16	11 82
Freddo	132	42	99	36	149	41	1.69	1.16	1.38	0.99	1.71	0.93
Insolazione	69	22	64	31	1 209	367	0.88	0 61	0.89	0.85	13.86	8.29
Fulmineazione	137	51	144	78	167	75	1.75	1.41	2.00	2.15	1.92	1.69
Scossa elettrica	57	4	43	1	28	3	0.73	0.11	0.60	0.03	0.32	0 07
Caduta	2 469	750	2 245	740	2 515	890	31.54	20.76	31.21	20.40	28.84	20.11
Lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	257	46	256	37	215	31	3.28	1 27	3.56	1.02	2.47	0.70
Ferita d'arma da taglio	20	5	29	6	24	4	0.26	0.14	0.40	0.17	0.28	0.09
Lesioni da macchine agrarie o industriali. . .	75	6	62	4	56	9	0.96	0.17	0.86	0.11	0.64	0.20
Schiacciamento	1 272	216	1 132	344	888	503	16.25	5.98	15.74	9.48	10.18	11.36
Violenza d'animali	161	19	141	22	111	13	2.06	0.53	1.96	0.61	1.27	0.29
Ustione	1 278	1 737	1 170	1 603	1 142	1 656	16.32	48.08	16.27	44.18	13.10	37.42
Soffocamento	115	82	120	72	147	92	1.47	2.27	1.67	1.98	1.69	2.08
Asfissia	178	70	151	75	165	79	2.27	1.94	2.10	2.07	1.89	1.78
Avvelenamento acuto	96	78	88	64	98	52	1 23	2.16	1.22	1.76	1.12	1.17
Morsi di vipera o di altri animali velenosi . .	5	8	11	6	3	5	0.06	0.22	0.15	0.17	0.03	0.11
Diverse o non determinate	194	36	196	42	329	80	2.47	0.99	2.73	1.16	3.77	1.82
TOTALE . . .	7 829	3 613	7 192	3 628	8 720	4 426	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Dei 105 casi di morte per ubbriachezza nell'anno 1907, 55 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 50 per infortunio causato dall'ubbriachezza, e cioè, 36 per caduta, 4 per annegamento e 10 per assideramento.

(b) Nell'anno 1906 l'ubbriachezza fu causa di 84 morti, delle quali 54 per avvelenamento acuto da alcool e 30 per infortunio causato dall'ubbriachezza (21 per caduta, 8 per assideramento ed una per schiacciamento).

(c) Dei 63 casi di morte per ubbriachezza nell'anno 1905, 39 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 29 per infortunio causato dall'ubbriachezza, e cioè, 17 per caduta, 2 per annegamento, una per soffocamento, 7 per assideramento, una per insolazione ed una per strangolamento accidentale.

— AXI —

Per le morti dovute ad avvelenamento acuto, sia accidentale, sia volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze velenose introdotte nell'organismo. Tra gli avvelenamenti acuti accidentali abbiamo compresi, nel prospetto seguente, quelli causati da morsicatura di vipera o di altro animale velenoso. Qui appresso sono riferiti i casi avvenuti negli anni 1905, 1906 e 1907.

Morti per avvelenamento acuto negli anni 1905, 1906 e 1907, classificati per sesso e secondo la specie del veleno.

PROSPETTO N. 22.

NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto						Suicidi per avvelenamento					
	1907		1906		1905		1907		1906		1905	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Acido solforico	8	7	10	4	9	1	6	10	10	7	7	8
Id. nitrico	1	1	1	..	2	1	1	..	1	..
Id. muriatico	1	..	1	12	2	2	1
Id. arsenioso, liquore del Fowler . . .	5	2	..	2	..	1	1	..	1	1	5	5
Id. ossalico	1
Id. fenico	3	1	2	..	5	1	4	4	2	4	3	7
Id. acetico	1	1	1	1
Id. prussico, emulsione di mandorle ed essenze amare	6	1	..	1	4	1
Altri acidi ed acidi non specificati . . .	1	1	2	1
Fosforo	3	1	1	3	7	2	12	10	7
Cianuro di potassio	4	..	4	..	2	..
Bicromato di potassio	1
Solfato ed acetato di rame	4	2	4	1	6	1	8	6	8	9	10	3
Sali di piombo	1	..	3	1	1	1	..	1
Sublimato corrosivo	12	12	6	10	8	8	71	124	52	73	46	45
Lisciva	4	2	7	..	2	2	4	8	2	4	1	3
Altri sali	1
Cloroformio	1	3	3	1	1
Benzina e petrolio	1	1	2	1	1	..	1
Creolina	1	1	1	..	1	..	1
Creosoto	1
Cicuta	4	4	3	4	1	2
Laudano, oppio e morfina	2	..	6	..	2	2	9	3	3	..	1	3
Chinino	11	8	7	9	8	5
Stricnina	3	..	1	1	10	3	5	6	3	1
Altri alcaloidi	1	2	1	1	3	5	..	1	1	..
Funghi	18	26	17	12	25	17
Carne infetta	2
Veleni non specificati	7	6	12	13	19	3	17	15	13	7	26	32
Morsi di vipera o di altri animali velenosi .	5	8	11	6	3	5
TOTALE	101	86	99	70	101	57	140	187	120	127	118	116

Giova ricordare che nella classe delle malattie ordinarie sono compresi, nel 1907, altri 57 morti (maschi 50 e femmine 7) per avvelenamento cronico contratto per lo più in dati esercizi professionali. Nel 1906 le morti per avvelenamento cronico furono dichiarate in numero di 55 (maschi 46, femmine 9) e nel 1905 di 54 (maschi 45, femmine 9).

Professioni. — La tavola IX, a pagina 80, dà il numero dei maschi morti per causa violenta accidentale in età di oltre 15 anni, classificati secondo la condizione o professione e secondo la causa dell'infortunio. Ragguagliando i morti per causa violenta accidentale a 100 morti per qualsiasi causa, dello stesso gruppo d'età e professione, ciò che si fa nel prospetto 23, risulta che le professioni in cui gli infortuni mortali sono stati più frequenti, negli anni 1906 e 1907, sono quelle di minatore, cavatore, macchinista, fuochista, ferroviere e tramviere, cocchiere, muratore e militare.

PROSPETTO N. 23.

**Morti per infortunio accidentale su 100 maschi morti per qualsiasi causa
in età di 15 anni e più, negli anni 1906 e 1907.**

	<u>1907</u>	<u>1906</u>		<u>1907</u>	<u>1906</u>
Minatori, marmisti	12.7	12.0	Fornaciai.	4.3	4.0
Macchinisti e fuochisti.	12.5	11.2	Facchini, lavandai, spazzini	4.2	3.7
Detenuti	10.0	6.7	Braccianti, manovali.	3.6	3.3
Ferrovieri e tramvieri.	9.5	10.1	Fabbricanti ed operai non specific.	3.5	3.7
Cocchieri, stallieri, mulattieri, carret.	7.3	6.5	Fabbrì, meccanici, arrotini.	3.5	32.9
Muratori, scalpellini, funisti. . . .	5.2	4.4	Studenti	3.4	2.2
Militari.	5.0	4.3	Marinai.	3.1	2.9
Pastori, mandriani	4.8	4.2	Di qualsiasi professione	2.7	2.5

§ 3. — Morti per omicidio negli anni 1905-1907 classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.

Nel 1907 i morti per omicidio (compresi quelli per infanticidio), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 1283.

Esaminando, in relazione al sesso dei colpiti, i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno le cifre seguenti:

PROSPETTO N. 24.

PERSONE UCCISE MEDIANTE	ANNO 1907			ANNO 1906			ANNO 1905		
	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale
arma da fuoco	408	70	478	393	62	455	436	69	505
arma da taglio	505	74	579	592	84	676	489	61	550
arma contundente	115	13	128	116	20	136	110	24	134
strangolamento	8	13	21	9	10	19	8	6	14
avvelenamento	1	...	1	3	...	3	3	1	4
annegamento	7	4	11	1	2	3	2	7	9
soffocazione	2	6	8	1	2	3	3	3	6
combustione	1	...	1	...	2	2
precipitazione	1	...	1	2	1	3
mezzo non determinato	44	12	56	16	2	18	190	30	220
Totale	1091	192	1283	1134	183	1317	1241	203	1444

§ 4. — Morti per suicidio negli anni 1905-1907 classificati per compartimenti, sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione.

Abbiamo date a pagina LXII le cifre dei suicidii divisi per sesso, in ciascun anno dal 1887 al 1907. Da esse apparisce che il numero dei suicidii è venuto cre-

(a) La statistica degli omicidii, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari. Ad esempio, la media annuale degli omicidii nel quinquennio 1896-1900 fu, secondo la statistica penale, di 2301 e, secondo la statistica sanitaria, di 1485. Ma questa discordanza è naturale ed inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano fortuiti, oppure causati da mano omicida. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, preve laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidii d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o colposa.

scendo fino al 1898, dopo il quale anno si nota una leggiera diminuzione fino al 1903. Nel quadriennio 1904-1907 le morti per suicidio crebbero nuovamente; esse furono 2445 nell'anno 1907, corrispondenti a 7.24 ogni 100,000 abitanti.

Distribuzione geografica. — I suicidii avvenuti negli anni 1905, 1906 e 1907 si ripartiscono fra i vari compartimenti come è indicato qui appresso.

Suicidii negli anni 1905-1907, divisi per compartimenti.

PROSPETTO N. 25.

COMPARTIMENTI	NUMERO DEI SUICIDII						
	Anno 1907		Anno 1906		Anno 1905		
	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	Cifre effettive	Per 100,000 abitanti	
Piemonte	347	10. 11	392	11. 47	370	10. 87	
Liguria	141	12. 10	162	14. 09	151	13. 32	
Lombardia	406	8. 98	365	8. 15	371	8. 36	
Veneto	237	6. 99	235	7. 02	259	7. 82	
Emilia	Ex Ducati	102	8. 78	88	7. 61	99	8. 60
	Romagne	169	12. 46	138	10. 24	156	11. 64
Toscana	210	7. 88	215	8. 12	207	7. 87	
Marche	54	5. 03	75	7. 00	49	4. 56	
Umbria	33	4. 78	41	5. 99	61	8. 95	
Lazio	153	11. 87	97	7. 65	155	12. 38	
Abruzzi e Molise	59	4. 04	46	3. 17	47	3. 25	
Campania	130	4. 05	142	4. 44	123	3. 86	
Puglie	104	5. 07	85	4. 18	75	3. 73	
Basilicata	24	5. 11	20	4. 24	18	3. 79	
Calabrie	37	2. 61	25	1. 77	35	2. 49	
Sicilia	195	5. 45	154	4. 30	150	4. 18	
Sardegna	44	5. 20	39	4. 67	53	6. 41	
REGNO	2 445	7. 24	2 319	6. 91	2 379	7. 13	

Sesso e stato civile. — Fra i 2445 individui morti per suicidio nel 1907, 1821 erano maschi e 624 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 74 maschi e 26 femmine. Nel 1906 su 100 suicidi si erano contate 24 femmine, nel 1905 21, nella media del decennio 1895-904 20.6 e del decennio 1885-94 19.0: è adunque venuta gradatamente crescendo col tempo la proporzione delle femmine che si tolgono volontariamente la vita.

Secondo lo stato civile, i suicidi si distribuivano, negli anni 1905, 1906 e 1907, così:

Suicidi negli anni 1905-1907, classificati per sesso e stato civile.

A) Cifre effettive.

PROSPETTO N. 26.

STATO CIVILE	ANNO 1907			ANNO 1906			ANNO 1905		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi o nubili.	1 078	810	268	971	739	232	1.065	824	241
Coniugati	966	721	245	962	740	222	917	728	189
Vedovi	331	233	98	319	214	105	316	240	76
Ignoto	70	57	13	67	62	5	81	77	4
TOTALE . . .	2 445	1 821	624	2 319	1 755	564	2 379	1 869	510

B) Cifre proporzionali a 100.

STATO CIVILE	A 100 DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE						A 100 DEL TOTALE		
	Anno 1907		Anno 1906		Anno 1905		Anno	Anno	Anno
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	1907	1906	1905
Celibi o nubili.	75	25	76	24	77	23	44	42	45
Coniugati	75	25	77	23	79	21	39	41	39
Vedovi	70	30	67	33	76	24	14	14	13
Ignoto	81	19	93	7	95	5	3	3	3
TOTALE . . .	74	26	76	24	79	21	100	100	100

Età. — Nel prospetto n. 27 è data la classificazione per sesso ed età dei suicidii avvenuti nell'anno 1907 ed è fatto il confronto colle notizie analoghe ottenute per l'anno 1906 e pel decennio 1896-905.

Suicidii negli anni 1907 e 1906 e nel decennio 1896-1905, classificati per sesso e per gruppi d'età.

PROSPETTO N. 27.

A) Cifre effettive.

ANNI D'ETÀ	Anno 1907		Anno 1906		Decennio 1896-1905	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Sotto 15 anni	12	2	7	4	78	18
15-19 "	119	82	119	60	1 053	466
20-24 "	237	114	202	103	2 137	648
25-29 "	161	71	166	66	1 411	449
30-39 "	263	88	290	85	2 419	701
40-49 "	301	83	272	85	2 719	656
50-59 "	311	87	300	52	2 873	618
60-69 "	248	59	225	69	2 187	430
70-79 "	128	28	135	34	1 030	219
80 e più "	28	9	28	5	199	44
Età ignota	13	1	11	1	119	20
TOTALE	1 821	624	1 755	564	16 225	4 269

B) Cifre proporzionali.

ANNI D'ETÀ	A 1000 morti per suicidio (a)						Decennio 1896-1905 Medie annuali su 100.000 abitanti (b)	
	1907		1906		Decennio 1896-1905		Maschi	Femmine
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
Sotto 15 anni.	6.6	3.2	4.0	7.1	4.8	4.2	0.4	0.1
15-19 "	65.8	131.6	68.2	106.6	65.4	109.7	7.0	3.1
20-24 "	131.1	183.0	115.8	182.9	132.7	152.5	16.0	4.7
25-29 "	89.0	114.0	95.2	117.2	87.6	105.7	13.2	4.0
30-39 "	145.5	141.2	166.3	151.0	150.2	165.0	12.4	3.4
40-49 "	166.5	133.2	156.0	151.0	168.8	154.4	15.9	3.7
50-59 "	172.0	139.7	172.0	92.4	178.4	145.4	20.1	4.2
60-69 "	137.2	94.7	129.0	122.5	135.8	101.2	22.3	4.2
70-79 "	70.8	45.0	77.4	60.4	63.9	51.5	21.6	4.6
80 e più	15.5	14.4	16.1	8.9	12.4	10.4	20.1	4.2
TOTALE	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	(c) 13.3	(c) 3.4

Fra i maschi le proporzioni più alte di suicidi per 1000 in totale, sono date da individui fra 40 e 70 anni di età: è risultato però in aumento il numero dei suicidii compiuti da fanciulli al disotto dei 15 anni. Fra le femmine se ne trova una proporzione relativamente più alta in quelle che hanno da 15 a 30 anni. Facendo i rapporti col totale dei viventi coetanei, si trova che il numero dei suicidii nei maschi cresce coll'avanzare dell'età; nelle femmine i rapporti si mantengono più costanti nei differenti gruppi d'età. Tanto fra i maschi quanto fra le femmine si osserva una forte proporzione

(a) Esclusi i suicidii d'età ignota.

(b) Secondo il censimento del 10 febbraio 1901.

(c) I totali sono calcolati sulle cifre della popolazione da 10 anni in su.

di suicidii nel gruppo d'età fra 20 e 25 anni, quando cominciano le prime disillusioni della vita e non si è ben preparati a sostenere la lotta per l'esistenza; poi le proporzioni scemano fino al 50° anno, dopo il quale avviene, specialmente nei maschi, un sensibile aumento.

Mezzi o modi di suicidio. — Rispetto ai mezzi o modi adoperati nel consumarli, la nostra statistica distingue i suicidii in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1905, 1906 e 1907.

Suicidii negli anni 1905-1907, classificati secondo i mezzi o modi adoperati.

PROSPETTO N. 28.

A) Cifre effettive.

MEZZI O MODI del suicidio	ANNO 1907			ANNO 1906			ANNO 1905		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Per annegamento	475	288	187	474	297	177	511	344	167
Con arma da fuoco	673	640	33	610	583	27	599	580	19
Con arma da taglio	103	91	12	93	77	16	92	85	7
Per impiccamento	456	360	96	422	336	86	424	342	82
Per precipitazione	235	162	73	258	163	95	251	185	66
Per schiacciamento	102	93	9	120	113	7	82	72	10
Per avvelenamento	327	140	187	247	120	127	234	118	116
Per asfissia	59	38	21	77	54	23	105	78	27
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	15	9	6	18	12	6	81	65	16
TOTALE	(a) 2 445	1 821	624	(b) 2 319	1 755	564	(c) 2 379	1 869	510

B) Cifre proporzionali a 100 del totale.

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	ANNO 1907		ANNO 1906		ANNO 1905	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Per annegamento	15.81	29.97	16.92	31.38	18.41	32.74
Con arma da fuoco	35.14	5.29	33.22	4.79	31.03	3.73
Con arma da taglio	5.00	1.92	4.39	2.84	4.55	1.37
Per impiccamento	19.77	15.38	19.14	15.25	18.30	16.08
Per precipitazione	8.90	11.70	9.29	16.84	9.90	12.94
Per schiacciamento	5.11	1.44	6.44	1.24	3.85	1.96
Per avvelenamento	7.69	29.97	6.84	22.52	6.31	22.75
Per asfissia	2.09	3.37	3.08	4.08	4.17	5.29
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	0.49	0.96	0.68	1.06	3.48	3.14
TOTALE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Fra i suicidii dell'anno 1907 ne sono compresi 56 (maschi 41 e femmine 15) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 1 maschio e 1 femmina per follia religiosa, 1 maschio e 2 femmine per frenosi isterica, 5 maschi e 1 femmina per frenosi pellagrosa e 11 maschi e 5 femmine per neurastenia.

(b) Fra i suicidii dell'anno 1906 ne sono compresi 36 (23 di maschi e 13 di femmine) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 3 maschi e 3 femmine per frenosi pellagrosa, 2 femmine per frenosi isterica e 9 maschi e 3 femmine per neurastenia.

(c) Fra i suicidii dell'anno 1905 ne sono compresi 33 (26 di maschi e 7 di femmine) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 2 per frenosi epilettica e 1 per frenosi isterica, da femmine; 3 per frenosi alcoolica, 1 per frenosi pellagrosa e 10 per neurastenia, da maschi.

Mesi in cui avvennero i suicidii. — In relazione alle stagioni ed ai mesi nei quali accaddero, i suicidii distribuivansi, in cifre effettive ed in cifre proporzionali a 12,000, secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza nell'anno 1907, si è notata nei mesi di maggio, giugno e luglio; la minore nei mesi di dicembre e gennaio.

Suicidii negli anni 1905-1907, divisi per mesi e per stagioni.

PROSPETTO N. 29.

MESI E STAGIONI	CIFRE EFFETTIVE			PROPORZIONI SU 12,000 (a)		
	1907	1906	1905	1907	1906	1905
Marzo	192	199	187	926	1 015	925
Aprile	214	195	232	1 066	1 025	1 186
Maggio	273	272	254	1 315	1 382	1 258
<i>Primavera</i>	679	666	673	3 307	3 422	3 369
Giugno	265	266	229	1 320	1 398	1 171
Luglio	237	254	262	1 140	1 293	1 299
Agosto	218	204	212	1 051	1 036	1 048
<i>Estate</i>	720	724	703	3 511	3 727	3 518
Settembre	179	164	192	891	862	982
Ottobre	183	172	159	881	873	787
Novembre	181	158	170	901	830	869
<i>Autunno</i>	543	494	521	2 673	2 565	2 638
Dicembre	176	150	155	846	762	767
Gennaio	161	141	166	777	715	823
Febbraio	166	144	161	886	809	885
<i>Inverno</i>	503	435	482	2 509	2 286	2 475
ANNO	2 445	2 319	2 379	12 000	12 000	12 000

(a) Nelle cifre proporzionali furono fatti i calcoli necessari per ridurre i singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero di giorni, cioè a trenta.

Professioni. — La professione, e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidii. Nella tavola XIII, a pagina 85, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1907. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore, esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi che si uccisero in età superiore a 15 anni compiuti, classificati secondo la professione esercitata, tanto in cifre effettive, quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 1901.

**Maschi suicidi in età superiore ai 15 anni negli anni 1897-1906 e nell'anno 1907
classificati per professioni.**

PROSPETTO N. 30.

PROFESSIONI	MASCHI di oltre 15 anni secondo il censimento del 10 febbraio 1901	SUICIDI		
		Cifre effettive		Proporzioni a 100,000 della stessa professione — Periodo 1897-1907
		1907	1897-1906	
Agricoltori, silvicoltori, pastori, braccianti	5 706 152	495	4 660	8
Marinai, pescatori, barcaioli	109 872	7	109	10
Facchini, acquaiuoli, lavandai	72 631	22	191	27
Filatori e tessitori	66 575	10	110	16
Muratori e imbianchini	325 259	62	384	12
Barbieri	48 513	15	155	32
Tipografi, litografi, legatori di libri	30 985	8	100	32
Caffettieri, liquoristi, osti, trattori, vinai	58 275	26	272	46
Guardie campestri, di città, doganali, carcerarie, daziarie, forestali	72 213	35	326	45
Ufficiali e truppa di terra e di mare e pensionati militari	210 000	67	744	35
Professori e maestri	39 557	2	94	22
Capitalisti e benestanti	234 456	128	1 067	46
Medici, dentisti, veterinari	25 401	13	98	40
Sacerdoti e monaci	77 139	6	45	6
Di qualsiasi professione	10 482 781	1 809	16 310	16

ELENCO NOSOLOGICO ADOTTATO PER LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE.

1. Asfissia e apoplessia nel parto.
2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità.
3. Cianosi, vizi congeniti di cuore.
4. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
5. Labbro leporino complicato (gola lupina).
6. Atrofia congenita, atelectasia polmonare, immaturità.
7. Vaiuolo e vaiuoloide.
8. Morbillo (rosolia).
9. Scarlattina.
10. Risipola.
11. Febbre tifoidea, pneumo-tifo, meningio-tifo, paratifo, febbre miliare.
12. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
13. Meningite cerebro-spinale epidemica.
14. Difterite.
15. Laringite crupale.
16. Ipertosse (tosse convulsiva).
17. Grippe o influenza.
18. Febbri da malaria.
19. Cachessia palustre.
20. Dissenteria epidemica.
21. Colèra asiatico.
22. Sifilide.
23. Setticiemia, pioemia, cangrena nosocomiale.
24. Pustola maligna, carbonchio.
25. Moccio (farcino, cimurro).
26. Lebbra (elefantiasi dei greci).
27. Rabbia (idrofobia).
28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate.
29. Tubercolosi disseminata.
30. Meningite tubercolare basilare, idrocefalo acquisito.
31. Tubercolosi polmonare, polmonite caseosa, tisi polmonare.
32. Tabe mesenterica ed intestinale.
33. Scrofolo disseminata.
34. Lupo.
35. Artrite fungosa, sinovite fungosa.
36. Tubercolosi delle ossa.
37. Male vertebrale di Pott.
38. Rachitide.
39. Anemia, clorosi.
40. Leucemia, anemia perniciosa progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin.
41. Porpora emorragica, morbo di Werloff.
42. Emofilia, morbo di Barlow.
43. Scorbuto.
44. Marasmo senile.
45. Pellagra.
46. Gotta.
47. Diabete zuccherino ed insipido.
48. } disseminati in più organi.
49. } dell'utero, vagina, ovaia.
50. } delle mammelle.
51. } della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli.
52. } della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.
53. } dello stomaco, esofago.
54. } del fegato.
55. } della milza, del pancreas, intestino, peritoneo.
56. } delle ossa, delle articolazioni.
57. } dei centri nervosi e degli organi dei sensi.
58. } d'altri organi.
59. Meningite semplice cerebrale e spinale.
60. Mielite, tabe dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séquard, di Morvan.
61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante.
62. Paralisi infantile.
63. Encefalite.
64. Apoplessia e congestione cerebrale.
65. Tumori cerebrali e spinali (a).
66. Rammollimento cerebrale.
67. Paralisi progressiva, demenza paralitica.
68. Epilessia, morbo di Jackson.
69. Convulsioni, isterismo.
70. Corea.
71. Tetano e trisma.
72. Eclampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi.
73. Successioni della pazzia, mania, neurastenia (b).
74. Malattie degli organi della vista (a).
75. Id. degli orecchi, otite, morbo del Ménière (a).

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, per i quali non fu specificata la causa diretta della morte.

76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (a).
77. Bronchite acuta.
78. Id. cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, pitorace, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.) (a).
80. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare.
81. Polmonite crupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, gangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixedema) (a).
85. Gozzo esoftalmico, morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.
87. Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, aterosmia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite).
88. Id. delle vene (flebite, varici, trombosi, emorroidi).
89. Id. dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).
90. Id. del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, miocardite, rottura, ecc.).
91. Id. del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, cancro acquatico, morbo di Riga, glossite, ulcerazione al frenulo (a).
95. Orecchioni.
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (a).
97. Id. dello stomaco, gastrite, atresia, dispepsia, morbo di Ludwig (a).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atrofia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Ittero grave, melena, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (a).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tifoite, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, dentizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali addominali (a).
107. Ernie intestinali e addominali.
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Appendicite, ascesso della fossa iliaca.
- 110^a. Peritonite.
111. Idrope-ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (a).
113. Id. della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (a).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (a).
116. Id. delle capsule soprarrenali (morbo di Addison).
117. Id. dei testicoli (tumori, ecc.) (a).
118. Id. dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (a).
119. Id. dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocèle, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (a).
120. Id. delle mammelle (ascesso, tumori) (a).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metroperitonite puerperale.
126. Sincope ed altri accidenti nel parto.
127. Flemmone, ascesso (a).
128. Gangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta latteaa, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema, edema dei neonati, litopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (a).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psoite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcoolismo cronico.
139. Avvelenamento cronico accidentale o professionale.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

140. in istato di ubbriachezza.
141. per annegamento.
142. per freddo.
143. per insolazione.
144. per fulminazione.
144-a *a*) naturale.
 b) da apparecchi elettrici.
145. per caduta.
146. per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine.
147. per ferite da taglio.
148. per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.
149. per schiacciamento da caduta d'alberi o d'altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere; sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari.
150. per violenze d'animali.
151. per ustione.
152. per soffocamento.
153. per asfissia.
154. per avvelenamenti acuti.
155. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.
156. per cause non determinate.

Morte accidentale violenta

157. Omicidio (compreso quello d'infante).
158. Duello.
159. Condanna alla pena capitale (*a*).
160. per annegamento.
161. con arma da fuoco.
162. con arma da taglio.
163. per impiccamento.
164. per precipitazione.
165. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.
166. per avvelenamento.
167. per asfissia.
168. con altro mezzo e con mezzo non determinato.

Suicidio

Morti per causa ignota o non dichiarata.

(a) Questa pena, cancellata dal Codice penale comune a cominciare dal 1890, è ancora mantenuta nei Codici speciali per l'esercito e la R. marina.

TAVOLE

Anno 1907.

A — Per

N.º dell'Elenco nosologico (α)	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						TOSC			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
1	Affasia ed apoplezia nel parto.	13	11	6	2	9	7	1	23	..	1
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità.	5	12	14	7	..	9	6	31	4	3
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	19	11	9	4	2	7	11	36	10	1
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	2	2	..	1	1	3	..	1
5	Labbro leporino.	2	2	3	3	1	2	1	3
6	Atrofia congenita, immaturità.	709	739	499	343	360	653	386	1 393	226	144
7	Vaiuolo	3	2	..	1
8	Morbillo.	11	132	34	48	20	31	47	135	22	5
9	Scarlattina	1	4	21	38	14	1	6	12	2	9
10	Risipola.	20	21	28	23	15	28	33	121	10	9
11	Febbre tifoidea	61	70	47	27	64	51	76	248	45	29
12	Tifo petecchiale.	2	1	1	1	..
13	Meningite cerebro-spinale epidemica .	1	1
14	Difterite	13	15	41	28	12	40	46	115	21	3
15	Laringite crupale	16	40	34	32	17	32	20	98	13	22
16	Ipertosse	77	91	60	114	66	59	76	308	13	20
17	Influenza	37	49	102	47	31	57	45	98	43	20
18	Febbri da malaria	1	2	2	1	3	1	2	3	14	1
19	Cachessia palustre	1	1	1	..	1	6	..
20	Dissenteria
22	Sifilide	6	5	8	6	5	18	6	24	1	8
23	Setticemia, pioemia	19	21	26	17	15	12	14	78	3	5
24	Pustola maligna, carbonchio	3	..	1	..	1	4	6	6	2
25	Moccio, cimurro	1
26	Lebbra
27	Rabbia	1	1
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	1	1	2	..	2
29	Tubercolosi disseminate.	97	73	99	44	29	60	53	246	31	31
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito	68	61	85	55	52	51	35	190	21	25
31	Tubercolosi polmonare, tisi	313	329	310	270	239	339	300	1 538	161	244
32	Tabes mesenterica	66	48	39	31	57	51	53	164	25	38
33	Scrofola disseminata	9	13	7	4	5	3	12	19	6	5
34	Lupo	1	1	2	1	..	5	1	..
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . .	4	7	5	4	3	2	6	20	3	3

(α) Nell'anno 1907 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (n. 21 dell'Elenco nosologico).

secondo 168 cause di morte.

provincie

Anno 1907.

ANA	MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				N.º dell'Elenco nosologico (α)			
	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA		AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPORASSO	CHIETI
9	3	13	17	6	6	1	7	9	10	5	2	..	1	1
16	9	17	9	9	1	6	7	20	17	18	11	13	8	2
6	7	8	5	4	5	4	10	10	28	4	9	5	4	3
..	..	1	..	2	1	2	6	3	2	3	1	4
3	2	..	1	1	2	1	1	3	8	2	3	2	1	5
409	313	373	464	453	331	403	847	1 101	1 386	557	428	389	297	6
..	3	1	4	1	..	7
13	39	16	23	24	26	38	11	63	432	130	275	90	10	8
9	4	9	40	12	1	2	2	11	24	3	9	1	1	9
19	26	27	26	19	15	17	11	42	120	22	18	19	10	10
55	30	92	44	57	50	44	68	191	310	85	77	58	49	11
..	..	1	1	1	2	12
..	1	1	5	1	11	..	2	13
22	12	18	10	17	6	16	13	24	73	25	8	19	12	14
26	13	10	6	26	5	7	10	39	70	23	21	13	5	15
47	16	48	19	16	33	15	57	77	225	121	54	64	58	16
74	35	97	78	61	79	72	55	177	253	150	159	78	74	17
..	..	1	2	..	3	2	..	8	115	9	40	30	13	18
..	..	2	2	..	1	1	23	2	11	5	3	19
1	1	20
6	5	4	4	9	..	6	6	62	124	20	20	21	17	22
10	18	33	17	22	16	10	3	35	115	17	7	19	10	23
4	..	5	3	..	1	18	19	6	9	5	1	24
..	25
..	26
..	1	2	8	1	1	27
1	1	1	1	3	1	28
49	37	69	88	75	30	57	80	109	219	57	52	35	26	29
58	49	58	37	50	27	34	46	90	341	64	46	43	40	30
448	265	454	264	250	120	144	253	543	1 411	303	224	244	170	31
48	36	72	54	54	43	46	65	154	233	111	93	68	52	32
6	8	9	8	9	7	1	7	16	16	7	6	5	9	33
..	3	1	1	5	..	1	5	3	3	1	2	34
11	4	4	5	1	2	2	5	5	19	8	6	6	3	35

Segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

Anno 1907.

No. dell'elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
1	Asfissia ed apoplessia nel parto	4	6	8	35	7	12	8	6	10	6
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	16	9	23	20	16	10	8	18	15	8
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	9	3	13	13	12	18	6	22	7	8
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	3	3	3	3	4	3	2	2
5	Labbro leporino	3	3	4	4	4	7	1	5	5	4
6	Atrofia congenita, immaturità	314	227	613	685	485	994	552	674	613	483
7	Vaiuolo	1	48	32	4	1	1	1	48	1
8	Morbillo	188	106	306	239	163	385	596	63	390	536
9	Scarlattina	53	5	146	59	5	71	27	19	491	53
10	Risipola	42	18	61	56	33	74	30	86	57	35
11	Febbre tifoidea	69	22	125	162	131	222	149	160	63	112
12	Tifo petecchiale	2	1	1	2	2	1	1	2
13	Meningite cerebro-spinale epidemica	1	22	5
14	Difterite	49	6	38	98	25	14	11	20	14	22
15	Laringite crupale	29	19	53	135	39	67	53	49	33	19
16	Ipertosse	81	24	80	55	64	104	58	99	58	82
17	Influenza	124	98	192	240	188	162	143	326	247	218
18	Febbri da malaria	27	27	35	16	40	86	218	254	156	178
19	Cachessia palustre	11	10	12	9	11	10	44	103	74	59
20	Dissenteria
22	Sifilide	18	10	46	201	29	42	20	63	15	67
23	Setticemia, pioemia	24	6	38	41	28	41	22	41	24	37
24	Pustola maligna, carbonchio	7	7	10	10	5	3	7	13	32	11
25	Moccio, cimurro
26	Lebbra	2	1
27	Rabbia	1	1	4	3	2	1	1
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	3	2	3	3	3	4	1
29	Tubercolosi disseminata	25	16	124	93	63	120	38	108	38	59
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito	52	24	70	197	74	135	51	116	51	28
31	Tubercolosi polmonare, tisi	221	187	467	1 265	378	756	437	744	256	283
32	Tabe mesenterica	77	35	138	308	82	266	124	202	115	71
33	Serofola disseminata	5	6	23	12	24	17	9	23	7	14
34	Lupo	1	3	2	3	1	4	3	9
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa	6	3	7	14	..	9	4	4	1	3

(a) Nell'anno 1907 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (n. 21 dell'Elenco nosologico).

secondo 168 cause di morte.

provincie

Anno 1907.

No. dell'elenco nosologico (a)	CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA	
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
1	11	5	2	12	2	2	1	4	..	5	6	1
2	9	..	15	22	9	3	17	9	14	8	4	2
3	3	7	5	15	9	7	12	3	4	17	6	3
4	1	..	1	2	..	3	1	2	..	4
5	1	1	2	1	1	1	3	3	1	3	..	5
6	424	381	456	808	570	578	899	508	388	594	356	6
7	..	212	2	5	1	..	18	7
8	144	219	38	143	59	119	67	110	54	149	7	8
9	4	367	78	143	53	203	33	384	5	183	..	9
10	32	44	15	28	12	36	36	37	20	50	19	10
11	98	134	155	292	167	175	269	131	135	53	28	11
12	..	4	..	2	..	1	1	1	..	12
13	2	1	1	1	12	6	13
14	18	31	31	124	52	37	13	81	17	43	11	14
15	15	26	21	38	40	48	32	32	10	25	23	15
16	74	54	32	63	29	95	65	156	34	93	47	16
17	213	183	50	95	194	88	58	122	54	165	118	17
18	105	85	122	213	96	48	80	371	200	335	136	18
19	41	25	27	63	20	23	24	128	75	79	28	19
20	20
22	43	52	8	36	24	139	36	13	17	26	7	22
23	17	38	17	34	16	40	15	23	21	29	17	23
24	11	7	2	4	9	4	6	3	2	22	13	24
25	25
26	1	2	..	26
27	2	..	1	2	4	..	2	3	2	27
28	1	2	4	12	8	9	24	5	2	..	3	28
29	70	89	55	74	56	118	125	62	27	140	100	29
30	50	26	26	42	30	43	47	38	18	87	65	30
31	279	277	192	505	287	500	833	359	246	546	476	31
32	72	47	47	93	45	58	120	66	29	74	44	32
33	8	12	13	21	13	18	28	18	17	46	34	33
34	5	4	3	3	1	1	..	3	..	2	1	34
35	6	3	2	10	3	10	9	..	3	9	1	35

No. dell'elenco nosologico (a)

Segue Tav. I. - Morti classificati

Anno 1907.

A - Per

Table of classified deaths by province (ALBANO, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA) and cause of death (Tuberculosis, Cholera, etc.) for 1907.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

secondo 168 cause di morte.

provincie

Anno 1907.

Table of 168 causes of death by province (MANTOVA, MILANO, PAVIA, etc.) for 1907.

Segue Tav. I. — Morti classificati

A — Per

Anno 1907.

No. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA					TOSC				
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	9	11	17	10	9	9	18	48	6	9
37	Morbo di Pott.	11	5	12	4	2	6	6	11	4	5
38	Rachitide	75	49	27	19	22	38	48	26	12	3
39	Anemia	57	95	58	58	24	96	62	96	21	15
40	Leucomia	13	10	14	8	4	7	10	34	12	4
41	Porpora emorragica	1	3	1	3	1	3	2	3
42	Emofilia	1	2	1	1	1	7
43	Scorbuto	2	10	9	5	2	1	1	3
44	Marasmo senile	353	486	337	481	229	458	512	1 329	141	154
45	Pellagra	44	5	27	36	4	15	16	20	1	..
46	Gotta	2	1	..	1	..	2
47	Diabete	11	12	14	8	11	7	8	52	2	14
48	disseminati in più organi	16	18	23	17	15	20	17	88	5	10
49	dell'utero, vagina, ovaia	21	39	26	26	29	21	14	86	20	24
50	delle mammelle	7	8	17	11	7	6	9	34	3	9
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	4	8	2	3	6	5	4	34	2	3
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	9	9	13	7	7	7	9	36	4	13
53	dello stomaco, esofago	119	92	117	93	137	78	120	446	48	41
54	del fegato	46	16	22	17	47	25	26	81	6	16
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	34	33	32	17	50	35	34	117	8	21
56	delle ossa, articolazioni	2	4	8	4	4	4	1	9	..	1
57	dei centri nervosi ed organi dei senzi	5	6	2	2	3	4	2	10	1	..
58	d'altri organi	15	15	28	11	24	19	14	71	4	12
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	63	119	100	89	34	99	52	369	45	46
60	Mielite, tabe dorsale	26	35	24	27	21	12	21	51	5	13
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	4	1	4	2	1	6	..	6
62	Paralisi infantile	4	5	1	2	5	6	1	5	2	1
63	Encefalite	8	12	5	5	3	12	4	15	7	3
64	Apoplessia e congestione cerebrale . .	308	339	382	280	276	364	311	1 111	114	123
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	8	4	8	2	4	4	5	25
66	Rammollimento cerebrale	4	15	51	10	13	12	9	36	1	1
67	Paralisi progressiva, demenza para- litica	54	89	48	36	51	63	55	192	16	38
68	Epilessia, isterismo	11	15	18	15	12	14	22	40	3	3
69	Corea	1	1	..	4	..	1
70	Tetano e trisma	12	10	4	5	9	5	3	11	1	1
71	Eclampsia infantile	108	58	50	69	75	79	95	371	62	41
72	Successioni della pazzia	4	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

secondo 168 cause di morte.

provincie

Anno 1907.

ANA	MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				No. dell'elenco nosologico			
	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PERARO E URBINO	PERUGIA	ROMA		AQUILA DEGLI A- BRUZZI	CAMPORASSO	CHIETI
28	7	17	9	16	6	17	10	27	43	27	11	10	13	36
18	6	10	8	6	5	5	5	10	38	9	3	3	5	37
39	21	17	24	67	89	71	65	109	66	28	31	21	29	38
67	37	46	42	66	54	51	79	167	287	112	117	80	65	39
20	6	15	10	10	11	7	8	34	57	17	43	21	15	40
7	1	2	..	3	2	3	2	3	17	2	4	3	4	41
3	..	2	2	1	2	3	1	6	4	2	3	3	3	42
..	3	1	1	3	2	..	1	..	1	43
510	344	438	284	501	414	512	468	1 118	1 050	794	646	653	580	44
13	3	6	9	4	16	58	42	102	13	1	8	45
1	..	3	1	1	2	2	1	5	14	1	4	6	5	46
28	10	24	12	26	18	8	4	18	107	15	16	13	13	47
21	9	23	19	26	17	12	15	43	77	21	23	17	16	48
29	21	36	24	31	20	21	28	54	148	28	21	31	15	49
16	7	11	9	14	5	8	8	17	44	11	4	10	11	50
5	3	5	3	5	4	6	7	12	16	3	1	3	4	51
14	5	11	15	7	5	8	7	20	34	11	2	7	4	52
83	63	95	109	74	32	66	66	113	191	60	30	24	26	53
25	12	23	22	21	12	18	17	36	96	25	16	11	4	54
27	9	30	23	21	9	25	16	37	96	19	10	8	16	55
3	..	3	4	2	1	2	4	7	22	1	3	4	3	56
5	2	3	3	1	2	4	3	8	9	8	1	2	1	57
27	12	24	24	23	17	18	19	36	70	17	28	27	13	58
100	112	85	53	80	46	38	40	107	350	98	96	60	60	59
29	10	17	23	27	23	16	22	56	64	30	29	29	20	60
6	3	3	3	2	2	3	6	13	15	4	5	7	3	61
2	2	1	..	3	2	7	2	11	9	6	1	1	1	62
9	1	4	2	4	2	8	4	19	27	9	7	6	4	63
382	125	425	318	526	337	451	365	873	1 125	385	442	440	386	64
10	2	4	8	4	4	4	..	14	26	4	5	7	1	65
8	4	14	11	10	11	12	6	31	105	6	5	3	7	66
57	14	58	39	118	55	50	62	104	157	24	24	28	23	67
26	12	13	15	15	14	14	8	45	54	27	17	34	21	68
..	1	2	2	1	1	1	..	4	..	1	2	1	1	69
6	..	5	3	9	7	4	8	8	16	1	..	4	1	71
80	71	107	70	196	140	235	141	388	757	103	123	242	269	72
..	1	..	4	..	8	61	73

Anno 1907.

A — Per

N.º dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	FARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi.	13	12	31	84	23	39	15	20	14	23
37	Morbo di Pott.	4	1	9	14	4	12	6	7	5	4
38	Rachitide	15	7	52	31	21	33	12	36	16	41
39	Anemia.	115	80	195	279	153	377	154	438	214	113
40	Leucemia	27	15	34	118	47	32	26	58	22	10
41	Peripora emorragica.	7	11	17	5	7	12	11	3	5
42	Emofilia.	3	..	2	4	1	7	2	9	1	3
43	Scorbuto	1	1	6	3	..	3	..	4
44	Marasmo senile	642	448	1 283	2 018	1 195	1 410	506	1 057	908	848
45	Pellagra.	1	1
46	Gotta	3	2	6	5	3	8	3	9	4	6
47	Diabete	12	3	32	95	19	25	14	21	12	14
48	disseminati in più organi.	40	17	53	97	39	44	23	53	30	23
49	dell'utero, vagina, ovaia	18	18	43	164	33	73	20	53	25	36
50	delle mammelle	15	5	27	52	16	14	11	15	9	8
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	1	5	14	9	4	3	10	4	5
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	5	3	20	38	10	13	3	10	9	8
53	dello stomaco, esofago	15	18	58	74	28	32	18	41	34	35
54	del fegato	13	7	33	57	18	36	10	30	18	12
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo.	10	10	21	78	15	36	9	26	18	20
56	delle ossa, articolazioni.	1	3	7	11	7	7	3	9	1	5
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi.	3	..	3	2	9	11	2	4	1	4
58	d'altri organi.	22	16	42	64	30	49	15	34	18	20
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	107	45	256	666	178	396	203	334	96	99
60	Mielite, tabe dorsale	23	29	67	116	47	76	21	49	30	27
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson.	5	2	14	11	10	6	5	6	6	6
62	Paralisi infantile	9	2	7	8	7	17	4	7	8	2
63	Encefalite.	2	6	13	22	5	17	15	6	15	11
64	Apoplessia e congestione cerebrale	332	268	812	1 306	591	809	349	621	415	330
65	Tumori cerebrali e spinali (a).	5	1	5	7	6	10	9	9	4	2
66	Rammollimento cerebrale.	7	4	8	6	4	4	..	6	2	3
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	21	17	61	216	58	49	15	36	24	23
68	Epilessia, isterismo	18	16	46	58	52	33	21	30	42	35
69	Corea.	2	1	3	2	1	..	1	4	3	1
70	Tetano e trisma	6	1	11	20	7	11	4	13	3	11
71	Eclampsia infantile	202	123	798	1 063	329	860	388	376	359	430
72	Successioni della pazzia.	1	2	4	5	1	1	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

province

Anno 1907.

CALABRIE	SICILIA								SARDEGNA		N.º dell'elenco nosologico
	COSSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	
21	11	12	17	13	12	28	6	11	38	24	36
7	3	..	2	4	11	8	4	5	12	4	37
28	62	17	56	18	31	24	63	4	88	44	38
114	184	218	422	256	216	319	297	120	209	126	39
23	19	12	64	29	26	20	15	13	34	20	40
7	2	7	8	5	9	11	8	3	12	5	41
2	3	7	7	4	3	11	2	1	2	3	42
1	2	1	1	5	..	10	..	1	3	3	43
1 053	833	682	1 172	718	1 091	1 807	644	550	773	349	44
..	45
9	2	3	9	4	8	3	7	2	3	2	46
14	12	14	36	18	22	60	21	16	22	16	47
28	37	32	61	50	109	91	27	28	19	8	48
31	22	27	65	23	29	62	25	16	19	22	49
13	11	5	15	7	15	18	11	8	9	3	50
2	4	..	6	1	2	6	5	3	5	2	51
9	5	2	15	3	3	6	3	6	6	4	52
25	49	25	45	23	53	54	30	13	33	20	53
13	26	16	28	11	24	31	16	16	14	12	54
13	11	9	21	7	14	30	12	9	20	11	55
3	3	2	4	3	2	3	3	1	3	3	56
2	5	2	9	1	8	2	5	2	4	3	57
21	14	9	26	11	23	30	14	23	20	8	58
65	116	161	190	181	227	462	104	154	118	125	59
46	32	17	31	18	31	27	24	16	26	21	60
3	5	2	4	..	6	5	5	2	3	4	61
2	4	6	9	5	4	7	8	4	14	10	62
9	6	6	10	16	8	15	10	17	17	15	63
429	255	283	545	332	442	596	311	280	285	138	64
8	6	3	5	8	13	14	2	5	8	10	65
5	3	3	5	1	5	17	1	1	7	4	66
28	35	58	92	62	117	207	79	61	60	38	67
29	23	15	26	17	35	48	18	16	36	10	68
1	3	3	1	1	1	1	3	..	70
2	7	1	5	..	4	4	6	..	71
271	169	88	194	119	360	115	159	36	118	58	72
..	..	2	6	..	1	16	..	1	73

Anno 1907.

No. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOMB			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
74	Malattie degli occhi (a)	8	..
75	Malattie degli orecchi (a)	5	2	8	19	19	1	41	12	13	6
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	34	17	17	17	34	7	17	32	28	5
77	Bronchite acuta	741	813	641	977	889	199	1 183	893	649	462
78	Bronchite cronica	149	192	119	314	175	41	76	105	66	63
79	Malattie della pleura (a)	45	55	57	111	109	18	62	77	70	28
80	Congestione ed apoplezia polmonare	18	34	21	47	19	3	26	20	28	14
81	Polmonite crupale	1 202	846	987	1 677	1 377	157	701	732	1 087	383
82	Bronco polmonite acuta	1 062	693	857	1 481	2 247	305	746	597	778	379
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	29	13	9	35	28	8	15	13	9	10
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	3	5	5	8	2	1	4	7	2	5
85	Morbo di Basedow	3	2	9	2	..	3	3	14	1
86	Asma, enfisema polmonare	41	49	54	86	57	11	31	53	52	54
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti	221	125	221	353	392	49	94	229	186	173
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	7	7	6	14	10	3	9	7	3	3
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	4	7	2	9	17	4	1	3	4	4
90	Malattie del cuore	1 537	1 547	1 616	2 821	1 907	305	990	1 230	1 352	780
91	Malattie del pericardio	5	11	7	11	12	1	6	6	8	13
92	Angina pectoris	11	15	10	13	10	3	9	8	7	4
93	Sincope (b)	66	65	71	133	110	12	86	37	84	35
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	11	41	7	33	27	3	23	23	29	10
95	Orecchioni	5	4	2	..	5	1	4	2	2	1
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	19	24	21	18	23	4	13	15	12	15
97	Malattie dello stomaco, atropia (a)	156	162	120	209	168	31	141	138	140	34
98	Ulcera rotonda dello stomaco	11	12	9	34	18	5	6	2	7	4
99	Epatite, cirrosi epatica	112	104	107	151	187	33	68	100	82	55
100	Atrofia gialla acuta del fegato	3	..	1	3	5	2	2	2
101	Calcoli biliari	3	..	10	6	6	1	2	4	5	3
102	Ittero	14	35	36	38	44	9	24	37	45	20
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	2	..	4	..	3	1	1	1
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 659	1 679	1 280	2 051	1 752	365	2 840	2 097	1 721	868
105	Volvolo, occlusione intestinale	58	44	47	107	64	9	32	45	29	22
106	Tumori intestinali e addominali (a)	2	7	7	15	8	..	6	..	7	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

Anno 1907.

No. dell'elenco nosologico	ARDIA				VENETO								EMILIA		No. dell'elenco nosologico
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
..	..	5	1	1	2	74
9	32	5	4	5	14	4	9	8	6	..	4	8	3	75	
4	51	3	4	10	34	7	28	21	10	8	12	10	5	76	
400	1 920	529	189	314	508	273	472	654	418	435	580	500	300	77	
56	156	120	38	63	67	29	77	117	48	62	72	82	42	78	
20	222	46	6	17	34	13	33	37	27	34	43	29	18	79	
11	65	13	1	4	1	6	11	13	9	18	5	13	4	80	
240	2 297	602	294	222	348	167	572	499	475	609	487	561	209	81	
340	2 104	618	205	196	423	162	457	610	488	438	580	594	218	82	
8	32	14	3	4	20	4	14	17	14	9	6	8	5	83	
1	10	1	3	1	1	..	1	3	2	84	
..	2	2	..	1	2	5	3	2	1	1	2	2	2	85	
23	113	69	12	13	19	10	26	37	14	18	16	16	19	86	
129	549	128	32	95	294	84	230	334	341	152	175	317	133	87	
2	11	1	..	4	2	2	4	4	..	4	2	88	
3	18	1	1	3	4	..	5	4	11	1	6	5	1	89	
186	2 768	959	347	387	579	286	658	1 056	663	768	754	854	369	90	
8	19	1	2	2	3	2	8	3	5	5	10	3	2	91	
13	13	6	1	1	13	4	9	10	7	13	10	18	14	92	
27	237	37	14	14	38	19	26	36	34	49	51	30	19	93	
14	49	9	2	9	21	8	8	19	4	9	25	13	3	94	
1	3	4	1	1	1	..	1	1	2	2	95	
14	19	9	4	6	7	3	6	7	10	5	10	7	3	96	
68	325	78	34	40	67	51	66	144	44	65	90	56	54	97	
6	21	5	2	5	8	..	11	24	5	6	5	7	3	98	
56	266	66	10	35	37	29	35	64	59	47	51	53	40	99	
1	2	1	..	1	1	1	..	2	1	1	2	100	
..	13	6	..	1	4	1	..	1	1	1	1	9	1	101	
9	128	15	6	7	32	18	19	26	19	13	20	18	8	102	
4	2	1	3	1	..	1	1	2	1	2	1	103	
759	4 332	1 080	379	418	904	596	695	1 270	865	936	1 084	790	640	104	
20	102	34	18	16	30	19	29	47	23	22	28	33	16	105	
3	20	11	..	1	6	..	1	1	..	1	1	6	2	106	

Segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

Anno 1907.

N.º dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						TOSC			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
74	Malattie degli occhi (a)	1	..	1	1	1
75	Malattie degli orecchi (a)	7	9	7	4	1	2	9	16	..	3
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	8	9	6	5	1	4	8	10	5	2
77	Bronchite acuta	397	626	387	322	187	502	423	861	154	132
78	Bronchite cronica	99	38	87	76	41	46	48	148	24	30
79	Malattie della pleura (a)	15	16	24	23	21	20	11	66	8	7
80	Congestione ed apoplezia polmonare	9	15	7	6	9	3	7	25	4	4
81	Polmonite crupale	235	351	382	359	190	356	308	1 309	157	166
82	Bronco polmonite acuta	249	461	440	427	201	361	310	1 223	132	163
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	3	5	6	5	4	6	4	18	2	..
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	1	3	..	2	1	..	1
85	Morbo di Basedow	2	1	3	1	..	6
86	Asma, enfisema polmonare	14	19	28	21	9	13	9	39	9	4
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti	64	129	100	62	75	71	24	347	24	52
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	5	1	3	3	..	5	4	15
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	5	3	2	5	2	8	5	4	..	2
90	Malattie del cuore	420	595	524	503	357	564	468	1 568	148	251
91	Malattie del pericardio	5	2	2	1	2	4	6	2	1
92	Angina pectoris	8	5	4	1	7	6	6	27	3	4
93	Sincope (b)	16	26	28	29	11	29	20	70	8	10
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	28	26	14	7	17	18	17	17	2	1
95	Orecchioni	1	..	1	2	1	1	2	3
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	3	5	10	3	4	6	6	18	5	1
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	45	50	55	24	34	35	32	108	10	21
98	Ulcera rotonda dello stomaco	4	1	8	12	6	3	5	26	5	4
99	Epatite, cirrosi epatica	24	43	36	41	35	35	29	98	24	17
100	Atrofia gialla acuta del fegato	1	6	1	..
101	Calcoli biliari	1	2	1	..	1	1	1	6	1	2
102	Ittero	16	17	19	15	6	19	7	40	3	7
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1	2	1	2	1	2	3	1	..
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	726	791	601	549	445	851	742	1 708	391	199
105	Volvolo, occlusione intestinale	11	18	28	8	13	13	19	61	1	7
106	Tumori intestinali e addominali (a)	1	1	4	..	3

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.

provincie

Anno 1907.

ANA				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				N.º dell'elenco nosologico
LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
..	1	1	1	3	1	2	74
7	4	..	7	7	2	1	4	10	30	3	4	6	5	75
3	5	10	5	7	5	7	1	8	18	7	7	7	3	76
289	286	260	309	440	235	273	427	998	982	450	568	502	289	77
76	48	50	59	54	73	39	35	138	268	107	131	144	101	78
20	14	25	26	29	16	8	18	33	122	10	30	27	19	79
6	6	9	3	3	1	6	3	12	30	7	2	1	2	80
361	316	314	261	231	195	162	151	617	1 562	392	402	350	215	81
462	259	338	225	277	175	174	203	587	1 289	429	382	407	264	82
10	6	2	2	3	7	1	6	10	32	6	4	16	6	83
..	..	1	1	1	6	2	3	84
1	1	..	4	5	1	2	5	1	1	85
6	10	5	9	18	28	18	17	30	68	30	55	42	78	86
127	58	121	129	129	46	58	62	144	624	125	79	95	79	87
2	2	4	3	6	6	3	7	10	21	7	1	..	8	88
2	4	2	1	5	4	2	3	1	12	1	6	3	2	89
580	372	489	379	557	443	563	397	1 153	1 738	836	623	566	399	90
4	3	..	2	1	2	3	3	6	5	5	11	20	2	91
7	4	6	8	7	11	6	5	11	31	10	13	11	5	92
12	21	27	29	21	14	22	22	45	137	42	36	18	18	93
3	7	4	6	7	8	11	9	30	42	10	49	37	15	94
..	2	1	5	6	1	3	1	1	95
7	4	8	5	6	3	6	5	15	23	5	9	17	6	96
30	22	38	32	23	36	30	31	63	151	68	47	58	60	97
6	3	10	1	2	5	5	4	19	22	6	6	6	5	98
41	30	29	45	32	29	22	24	80	147	53	54	49	28	99
..	1	1	..	3	1	9	1	1	..	1	100
3	..	2	1	3	3	..	3	1	25	1	3	1	1	101
14	5	14	11	11	4	3	15	31	71	13	15	14	7	102
1	1	2	1	5	..	1	..	1	103
506	601	586	493	631	565	476	543	1 332	2 818	1 195	1 267	973	680	104
15	9	19	10	14	12	6	10	43	60	22	24	17	23	105
1	1	3	2	1	1	3	9	2	1	106

Segue TAV. I. — Morti classificati

Anno 1907.

A — Per

N.º dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
74	Malattie degli occhi (a)	1	..	1	3	..	1	1
75	Malattie degli orecchi (a)	1	3	7	18	7	10	4	8	8	6
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	18	4	13	20	4	23	17	23	14	10
77	Bronchite acuta	633	423	1 065	2 068	1 034	2 015	1 079	1 537	1 005	838
78	Bronchite cronica	149	68	221	465	196	400	181	248	186	108
79	Malattie della pleura (a)	24	26	76	114	41	77	40	40	35	22
80	Congestione ed apoplezia polmonare	5	2	7	18	5	17	3	16	3	10
81	Polmonite erupale	419	313	1 160	1 858	722	771	705	984	573	663
82	Bronco polmonite acuta	686	232	1 120	2 417	753	971	594	722	561	588
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	14	3	14	26	12	11	11	20	15	15
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	1	..	2	4	2	1	..	1	4	..
85	Morbo di Basedow	1	1	1	1	1	..
86	Asma, enfisema polmonare	40	53	79	42	56	64	22	37	46	35
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti	91	65	204	517	183	128	66	89	118	76
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	2	2	13	17	9	4	2	8	4	11
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	2	3	6	17	5	3	2	8	9	7
90	Malattie del cuore	737	447	1 449	2 514	1 085	1 276	476	928	775	712
91	Malattie del pericardio	4	5	15	7	17	20	6	6	4	9
92	Angina pectoris	5	7	23	80	24	29	17	18	15	16
93	Sincope (b)	34	28	63	100	49	59	25	41	41	29
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	16	18	16	53	26	29	19	36	22	27
95	Orecchioni	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	23	7	19	22	10	16	21	15	21	10
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	72	27	109	162	128	276	92	150	77	69
98	Ulcera rotonda dello stomaco	4	7	14	16	10	7	10	12	5	8
99	Epatite, cirrosi epatica	61	35	119	225	79	141	79	116	86	86
100	Atrofia gialla acuta del fegato	2	..	2	4	2	5	2	..	1	5
101	Calcoli biliari	1	2	13	4	3	3	2	1	2
102	Ittero	20	14	26	44	27	30	23	29	35	30
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	2	1	..	5	1	2	3	1	3	2
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 285	730	2 754	4 101	1 881	4 465	2 633	3 869	2 129	1 683
105	Volvolo, occlusione intestinale	27	23	49	97	39	54	23	59	37	28
106	Tumori intestinali e addominali (a)	2	1	3	7	5	2	..	1	3	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.

province

Anno 1907.

N.º dell'elenco nosologico	CALABRIE	SICILIA								SARDEGNA		N.º dell'elenco nosologico
		COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	
..	1	1	74
2	1	2	6	2	4	3	4	4	4	3	1	75
8	6	9	23	9	20	15	15	3	20	20	76	
779	927	1 271	2 247	873	1 112	1 310	1 144	527	490	254	77	
178	76	125	212	104	86	188	133	62	141	114	78	
19	39	41	106	25	47	88	32	23	70	27	79	
5	5	1	6	2	6	8	3	2	15	5	80	
470	581	627	991	445	670	1 088	669	406	789	440	81	
391	514	297	682	401	525	544	391	250	342	233	82	
8	12	1	34	5	13	8	2	3	26	18	83	
1	1	3	3	..	1	1	1	1	1	..	84	
..	2	1	..	1	..	2	3	2	85	
37	38	33	41	33	37	50	25	17	41	41	86	
71	47	41	98	32	60	99	37	35	75	44	87	
2	2	1	1	1	1	2	1	2	..	2	88	
1	6	3	8	3	3	4	4	2	13	2	89	
719	600	446	981	449	788	1 038	437	365	567	252	90	
8	9	1	16	11	9	5	6	2	17	7	91	
10	16	8	9	8	8	12	5	2	13	11	92	
29	13	15	55	24	45	79	19	19	33	10	93	
23	17	36	89	36	28	54	154	19	6	8	94	
1	1	5	4	6	5	1	1	..	8	2	95	
7	20	20	36	22	25	9	27	6	39	13	96	
66	121	155	339	98	59	182	169	59	125	70	97	
8	13	4	6	1	8	9	7	1	10	2	98	
83	61	50	142	62	75	120	97	35	102	70	99	
..	1	..	3	1	6	1	5	..	100	
4	4	1	3	1	7	3	3	1	1	1	101	
10	10	18	24	17	18	40	24	11	31	10	102	
1	2	..	7	1	2	5	4	1	2	3	103	
1 376	1 396	1 884	3 761	2 332	1 325	2 360	2 456	1 261	1 771	968	104	
25	27	14	26	12	32	29	12	16	38	12	105	
2	1	4	7	2	7	13	4	2	3	..	106	

No. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOMB			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
107	Ernie intestinali e addominali.	24	28	25	87	41	6	11	14	9	10
108	Malattie da echinococco.	1	..	1	1	..	1	1	..	1
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali.	22	14	8	12	16	2	24	19	22	12
110	Appendicite.	10	18	13	36	22	4	7	9	19	5
110-a	Peritonite.	65	31	82	113	87	14	75	71	70	37
111	Idrope-ascite.	11	14	5	23	6	..	7	6	2	7
112	Malattie dei reni (a).	217	220	263	465	307	52	180	133	207	84
113	Id. della vescica (a).	44	36	52	60	77	17	22	27	41	25
114	Calcoli renali e vescicali.	1	1	1	7	4	1
115	Malattie dell'uretra e prostata (a). . .	12	10	19	32	27	8	2	10	12	5
116	Id. delle capsule surrenali.	1	2	4	..	2	..	1	2	2	1
117	Id. dei testicoli (a).	1
118	Id. dell'ovaia (a).	2	1	..	2	4	1	..	1	1	..
119	Id. dell'utero e vagina (b).	15	11	12	20	16	2	12	13	7	5
120	Id. delle mammelle (b).	1
121	Metrorragia dopo il parto.	9	15	17	25	25	3	21	19	10	7
122	Distocia.	1	4	1	5	2	..	6	5	4	2
123	Eclampsia puerperale.	16	14	7	19	14	2	12	14	15	8
124	Febbre puerperale.	31	33	26	34	27	2	18	19	28	14
125	Pelvi e metroperitonite puerperale. .	2	2	1	10	9	2	12	12	1	5
126	Stincope da parto e altre malattie puerperali.	2	7	4	7	5	..	9	11	2	..
127	Flemmone, ascesso (a).	33	31	26	24	60	5	26	24	26	18
128	Gangrena della pelle.	7	7	14	14	23	2	16	6	9	9
129	Elefantiasi degli arabi.	1	1	1	..
130	Favo, foruncoli.	4	1	2	9	2	..	3	..	3	1
131	Pemfigo, eczema, ectima.	12	6	5	20	23	5	10	13	6	3
132	Sclerema.	32	5	18	19	21	3	73	85	85	70
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a). .	14	17	24	22	44	6	33	30	31	13
134	Reumatismo articolare acuto.	27	37	31	48	47	5	14	14	22	15
135	Id. cronico.	21	19	21	42	38	8	6	12	17	14
136	Psofte.	1
137	Atrofia muscolare progressiva.	2	1	..	4	1	1	..
138	Alcoolismo cronico.	10	18	26	23	35	11	11	36	12	5
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale.	1	..	4	6	4	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio

No. dell'elenco nosologico	ARDIA				VENETO								EMILIA		No. dell'elenco nosologico
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
107	7	55	12	3	11	10	5	12	18	15	12	14	14	9	107
108	1	1	1	3	..	108
109	23	43	15	4	12	20	25	13	6	16	16	25	33	22	109
110	10	35	7	3	8	10	5	7	10	21	4	11	12	8	110
110-a	30	196	68	12	18	44	23	38	53	50	21	59	75	25	110-a
111	4	14	9	2	2	9	7	2	8	4	7	8	2	3	111
112	109	681	208	32	60	137	55	98	153	170	98	143	181	81	112
113	17	71	35	13	14	22	17	22	34	36	19	36	22	16	113
114	3	8	1	1	..	1	..	2	1	1	114
115	6	25	7	2	1	5	4	5	12	10	17	10	11	5	115
116	3	7	3	2	..	2	8	1	1	2	..	3	116
117	117
118	..	2	2	2	1	1	2	..	1	2	..	118
119	5	21	12	3	2	6	6	5	9	5	1	8	16	6	119
120	1	120
121	7	16	5	5	9	8	4	13	10	13	11	11	11	3	121
122	1	10	2	2	1	2	1	1	1	2	122
123	3	32	8	3	3	9	4	6	7	8	4	12	7	4	123
124	8	66	12	6	4	14	6	12	16	13	14	17	13	8	124
125	1	20	3	1	..	3	5	6	2	4	..	2	125
126	1	9	1	..	2	1	2	3	2	3	4	5	3	2	126
127	17	119	37	5	11	18	10	31	20	31	26	20	28	11	127
128	11	40	12	1	2	10	1	10	14	10	14	7	11	8	128
129	1	1	1	129
130	..	11	4	2	..	1	3	1	1	1	2	2	..	5	130
131	5	29	7	3	3	10	5	3	10	9	10	17	9	5	131
132	76	177	11	1	5	30	65	14	22	13	30	14	23	19	132
133	10	126	18	2	..	12	7	10	19	10	12	14	27	11	133
134	18	49	15	7	5	17	5	24	23	16	18	19	24	10	134
135	8	29	14	7	6	5	5	9	12	12	17	15	9	4	135
136	..	3	..	1	1	1	136
137	1	2	2	2	3	1	3	..	3	5	..	137
138	11	46	15	7	18	21	4	23	40	14	28	19	10	2	138
139	..	7	..	1	1	2	..	139

Anno 1907.

A — Per

N.º dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						TOSC			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
107	Ernie intestinali e addominali	6	10	5	10	2	7	13	23	6	10
108	Malattie da echinococco.	3	2	2	..	1	2	2	..
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	26	24	4	6	13	18	10	9
110	Appendicite.	9	11	7	6	2	7	5	10	4	1
110-a	Peritonite.	36	39	43	25	28	27	18	87	11	6
111	Idrope-ascite	2	2	5	2	..	5	2	6	2	2
112	Malattie dei reni (a)	98	99	77	68	65	113	80	364	27	45
113	Id. della vescica (a)	12	23	27	8	12	12	13	65	3	9
114	Calcoli renali e vescicali	3	..	2	1	1	3	..	1
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	9	6	6	7	10	10	6	18	2	1
116	Id. delle capsule surrenali	3	2	4
117	Id. dei testicoli (a)
118	Id. dell'ovaia (a)	2	1
119	Id. dell'utero e vagina (b)	2	8	6	4	1	6	3	11	1	..
120	Id. delle mammelle (b)	1
121	Metrorragia dopo il parto	3	9	9	6	6	11	1	23	2	..
122	Distocia.	2	..	2	2	..	1	1	..	1
123	Eclampsia puerperale	6	6	8	9	3	7	4	16	6	..
124	Febbre puerperale	8	19	17	11	6	11	9	27	6	2
125	Pelvi e metropertonite puerperale	1	3	2	3	..	5	..	4	1	..
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	1	3	5	1	1	4	1	1	2
127	Flemmone, ascesso (a)	10	18	28	37	11	9	22	56	13	16
128	Gangrena della pelle	7	6	2	10	4	7	3	19	1	1
129	Elefantiasi degli arabi	1
130	Favo, foruncoli	2	..	1	1	..	1
131	Penfigo, eczema, ectima.	4	5	9	4	1	3	3	17	2	2
132	Sclerema	34	224	47	27	11	62	6	43	6	2
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	10	16	9	17	8	9	9	35	2	1
134	Reumatismo articolare acuto	15	16	10	7	8	8	9	55	10	..
135	Id. cronico	9	14	12	7	7	5	7	16	1	6
136	Psoite	1
137	Atrofia muscolare progressiva	1
138	Alcolismo cronico	5	2	12	7	1	6	2	12	2	2
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	1	1	1	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

provincie

Anno 1907.

N.º dell'elenco nosologico	ANA				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				N.º dell'elenco nosologico
	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIRNA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E' URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
107	7	7	11	7	14	6	4	6	17	58	10	11	16	12	107
108	2	1	3	..	2	..	4	8	4	108
109	5	2	2	1	12	12	2	12	39	38	10	13	8	4	109
110	5	2	9	7	5	..	2	2	11	42	8	7	4	3	110
110-a	24	12	18	12	35	20	16	19	79	93	35	30	18	11	110-a
111	3	3	3	3	2	..	2	1	5	12	8	17	12	5	111
112	159	67	99	64	125	86	76	92	221	672	183	160	127	101	112
113	18	15	17	12	17	13	16	12	45	64	27	17	28	20	113
114	3	1	2	..	2	1	..	1	3	11	1	3	..	2	114
115	4	10	10	5	5	2	8	12	19	51	5	6	6	6	115
116	2	..	2	1	3	8	2	2	4	1	116
117	1	..	117
118	1	..	2	4	..	1	1	2	1	1	118
119	2	2	3	..	3	4	2	4	4	24	5	10	7	6	119
120	120
121	4	5	8	7	7	6	7	8	16	23	22	12	14	6	121
122	1	..	1	3	1	1	8	8	4	9	3	..	122
123	6	6	11	3	6	6	1	8	13	12	3	7	7	6	123
124	12	6	7	8	5	4	7	4	21	51	17	12	6	8	124
125	1	1	2	2	2	1	..	2	5	6	2	1	2	2	125
126	1	1	2	2	1	2	2	3	1	10	3	3	8	6	126
127	37	16	19	21	17	4	12	9	50	102	10	15	28	9	127
128	11	3	6	12	6	2	3	3	16	27	5	6	5	2	128
129	1	1	129
130	1	2	1	3	14	2	3	8	2	130
131	7	4	11	3	7	1	4	3	11	30	3	4	4	9	131
132	15	2	7	12	15	6	14	9	32	47	11	28	14	5	132
133	19	15	8	3	6	1	4	5	7	31	10	7	6	3	133
134	21	13	9	6	11	13	8	14	22	36	12	14	12	4	134
135	9	9	10	17	5	5	8	4	20	47	27	31	22	6	135
136	2	1	2	136
137	1	1	1	4	2	1	2	3	3	137
138	8	3	2	2	15	6	11	6	16	17	3	1	3	6	138
139	1	1	2	4	..	1	139

Segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

Anno 1907.

N.° dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
107	Ernie intestinali e addominali.	13	14	41	107	26	43	26	39	30	23
108	Malattie da echinococco.	2	1	2	9	1	3	3	5
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali.	19	14	21	7	15	42	17	42	28	20
110	Appendicite.	3	2	13	29	10	17	10	13	8	7
110-a	Peritonite.	27	22	71	131	48	80	23	44	36	38
111	Idrope-ascite.	9	12	26	27	9	24	13	12	12	10
112	Malattie dei reni (a).	179	99	358	929	281	381	174	242	306	192
113	Id. della vescica (a).	28	12	53	137	51	37	20	49	37	17
114	Calcoli renali e vescicali.	4	1	2	11	..	7	3	3	..	8
115	Malattie dell'uretra e prostata (a).	7	3	7	28	9	11	1	8	6	6
116	Id. delle capsule suprarenali.	1	3	3	7	..	2	1	2	1	..
117	Id. dei testicoli (a).	1	..	1	1
118	Id. dell'ovaia (a).	1	..	3	1	1	2	..	3	..	2
119	Id. dell'utero e vagina (b).	11	7	19	17	10	7	16	13	13	7
120	Id. delle mammelle (b).	1
121	Metrorragia dopo il parto.	7	14	22	31	13	12	7	20	16	19
122	Distocia.	5	1	4	3	2	2	3	6	5	7
123	Eclampsia puerperale.	4	4	9	28	6	6	5	10	5	4
124	Febbre puerperale.	21	13	13	19	14	29	18	34	35	34
125	Pelvi e metroperitonite puerperale.	6	2	5	6	3	6	1	2	4	2
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali.	1	..	2	6	4	1	1	7	4	2
127	Flemmone, ascesso (a).	32	19	47	99	26	47	37	47	34	42
128	Gangrena della pelle.	9	1	18	36	19	11	11	21	9	6
129	Elefantiasi degli arabi.	2	1	1
130	Favo, foruncoli.	3	1	4	3	1	3	4	5	1	2
131	Pemfigo, eczema, ectima.	11	5	11	11	7	4	7	13	6	..
132	Sclerema.	10	5	16	48	38	218	48	102	40	36
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a).	7	7	14	31	13	20	10	14	11	12
134	Reumatismo articolare acuto.	12	4	29	41	12	14	13	16	14	16
135	Id. cronico.	24	13	20	29	33	25	15	22	54	25
136	Psoite.	1	..	1	2	2	..
137	Atrofia muscolare progressiva.	8	2	..	1	1	14	1	1
138	Alcolismo cronico.	1	..	2	3	..	1	2	9	3	8
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale.	3	4	3	..	1	4	..	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

secondo 168 cause di morte.

provincie

Anno 1907.

N.° dell'elenco nosologico	CALABRIE		SICILIA							SARDEGNA		N.° dell'elenco nosologico
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
107	26	21	17	45	14	23	41	14	16	34	22	107
108	3	3	2	1	1	1	6	1	2	108
109	23	14	24	40	6	7	4	69	4	26	10	109
110	..	4	7	6	2	3	7	7	4	13	7	110
110-a	35	34	45	71	59	70	92	36	35	39	24	110-a
111	15	24	25	57	19	8	43	35	9	26	16	111
112	177	237	214	434	220	241	311	300	137	239	100	112
113	20	34	13	45	23	32	70	26	27	21	13	113
114	1	1	10	13	3	1	9	7	6	4	12	114
115	10	9	2	15	2	10	16	7	4	10	6	115
116	..	3	1	..	5	1	2	..	4	2	1	116
117	1	117
118	1	..	3	2	1	1	118
119	15	8	5	20	7	9	10	8	3	11	10	119
120	120
121	12	12	8	10	14	15	10	14	7	22	13	121
122	3	2	6	2	4	3	5	1	2	14	1	122
123	8	3	6	7	6	5	8	4	1	6	9	123
124	17	25	11	14	14	16	21	19	14	30	11	124
125	4	8	2	3	1	5	2	2	1	1	..	125
126	7	3	..	2	2	5	1	4	..	126
127	24	47	25	56	30	25	63	23	23	36	18	127
128	3	7	10	12	7	9	37	25	6	10	6	128
129	2	..	129
130	3	2	4	4	1	3	20	5	130
131	7	3	16	5	10	4	8	9	3	4	3	131
132	10	16	6	7	..	9	7	8	2	7	8	132
133	5	18	5	11	7	7	26	6	4	11	13	133
134	18	12	9	20	12	11	8	19	7	25	16	134
135	25	14	10	26	10	7	13	13	2	43	20	135
136	..	2	1	1	..	1	..	136
137	..	2	1	3	..	6	..	137
138	6	2	1	2	..	3	3	2	1	15	4	138
139	1	..	139

Anno 1907.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA				LOMB	
	ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
	140 in stato d'ubriacchezza	2	4	5	5	2	1	3	2	4
141 per annegamento	56	48	53	72	47	3	32	54	31	37
142 per freddo	4	5	6	2	3	1	1	2	2	..
143 per insolazione	2	2	..	1	..	1	1	1	1
144 per fulminazione:										
a) naturale	1	1	5	2	5	1	2	1	8	..
b) da apparecchi elettrici	2	7	4	1	3	2	5	3	1
145 per caduta	80	82	97	152	107	26	48	71	71	22
146 per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine	6	1	3	9	5	5	6	10	5	1
147 per ferite da taglio	1	1
148 per lesioni da macchine agrarie ed industriali	2	2	3	12	4	..	5	1	1	1
149 per schiacciamento	50	24	53	91	56	7	27	38	20	12
150 per violenze d'animali	2	5	4	10	1	1	5	3	1	5
151 per ustione	37	47	60	56	63	14	53	58	59	20
152 per soffocamento	6	..	1	2	7	1	9	19	2	4
153 per asfissia	8	3	5	10	8	2	3	10	12	2
154 per avvelenamenti acuti	15	..	4	9	17	..	3	3	4	2
155 per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	1
156 per cause non determinate	7	2	2	3	21	..	6	8	5	4
157 Omicidio (compreso quello d'infante)	18	15	12	40	39	5	10	20	9	4
160 per annegamento	15	11	17	18	8	1	5	9	7	6
161 con arma da fuoco	20	7	14	49	48	8	5	10	12	6
162 id. da taglio	2	2	2	8	2	..	2	4	3	1
163 per impiccamento	15	23	16	33	12	3	4	5	13	4
164 per precipitazione	4	2	4	13	19	3	3	4	6	2
165 Suiicidio per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	7	4	3	7	5	..	2	5	3	2
166 per avvelenamento	12	1	7	17	24	..	1	..	4	2
167 per asfissia	2	2	5	2	6	1	..	1	2	..
168 con altro mezzo o con mezzo non determinato	3	1
Totale dei morti per causa determinata	15 159	12 939	13 599	22 032	19 437	5 117	13 195	13 168	13 121	7 602
Morti per causa ignota o non dichiarata	95	222	64	229	78	12	28	36	18	12
TOTALE GENERALE	15 254	13 161	13 663	22 261	19 515	3 129	13 223	13 204	13 139	7 614

(a) Nell'anno 1907 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per

Anno 1907.

CAUSE DI MORTE	ARDIA				VENETO							EMILIA		
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA
	140	1	5	1	..	2	6	3	1	1	7	2
141	36	92	43	3	11	49	27	46	51	49	38	31	30	16
142	3	7	2	2	1	..	2	1	2	3	4	3	4	..
143	1	2	2	1	1	3	..	1	2	1	1	2
144	2	..	1	1	4	..	2	6	2	1
145	..	7	3	1	3	1	1	..
146	25	142	25	38	37	24	13	26	63	28	36	42	60	23
147	..	5	2	2	1	6	2	1	7	..	1
148	1	1	..	1
149	..	4	1	1	5	2	..	2	3	..
150	11	129	24	12	10	10	9	11	22	18	20	27	33	7
151	1	5	1	1	..	1	3	..	3	1	1	2
152	32	108	31	8	15	15	14	26	54	16	25	32	33	24
153	4	12	6	3	1	3	4	5	7	2	8	6	3	1
154	..	4	3	..	1	..	2	3	2	8	..
155	2	5	1	2	2	3	1	3	..	2	2	1	1	5
156	1
157	2	5	2	..	3	..	1	2	3	2	5	3
160	1	43	5	4	..	7	2	3	6	6	2	9	8	4
161	9	22	13	4	3	12	8	7	10	12	7	3	15	9
162	3	63	13	2	5	7	..	3	9	18	8	7	23	2
163	..	3	1	..	1	3	1	1	4	4	2	2	2	..
164	8	25	13	3	2	8	1	6	9	14	8	3	32	8
165	5	15	3	1	..	3	3	9	2	2	6	1
166	..	14	3	1	1	1	1	1	4	1
167	1	35	1	2	1	..	3	7	1	4	8	2
168	2	7	2	1	7
Totale dei morti per causa determinata	6 568	34 644	9 428	3 041	3 897	9 023	5 094	8 318	11 491	8 737	8 393	9 667	10 281	5 638
Morti per causa ignota o non dichiarata	7	75	9	10	5	15	4	15	173	32	3	16	30	..
TOTALE GENERALE	6 575	34 719	9 437	3 051	3 902	9 038	5 098	8 333	11 664	8 769	8 396	9 683	10 311	5 638

« condanna alla pena capitale » (n. 159).

Segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

Anno 1907.

Table with 11 columns for provinces (FORLI, MODENA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, REGGIO EMILIA, AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO) and rows for causes of death (140-168). Includes sub-headers 'Segue EMILIA' and 'TOSCA'.

secondo 168 cause di morte.

provincie

Anno 1907.

Table with 14 columns for provinces (LUCCA, MASSA E CARRARA, PISA, SIENA, ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO E URBINO, PERUGIA, ROMA, ABRUZZI E MOLISE) and rows for causes of death (140-168).

(a) Nell'anno 1907 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « con-

danna alla pena capitale » (n. 159).

Segue TAV. I. — Morti classificati

Anno 1907.

A — Per

N.º dell'Elenco nosologico (α)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
140	in stato d'ubriachezza	1	1	1	2	1	1
141	per annegamento.	10	11	27	15	19	39	11	25	13	11
142	per freddo	2	3	2	4	2	1	3	5	8	2
143	per insolazione.	3	1	2	4	6	5	2	1
144	per fulminazione :										
	a) naturale	3	1	7	1	3	2	3	7	13	4
	b) da apparecchi elettrici	1
145	per caduta	46	23	74	139	63	76	42	60	37	57
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine	3	5	8	19	5	19	4	10	3	5
147	per ferite da taglio.	2	2	1	..	1	1
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali.	2	3	1	1	..	1
149	per schiacciamento.	13	6	36	68	17	23	13	24	14	14
150	per violenze d'animali.	3	..	5	5	2	6	10	7	5	2
151	per ustione.	61	46	122	128	104	87	58	70	66	88
152	per soffocamento.	2	3	3	2	5	1	3
153	per asfissia	6	6	5	12	3	6	4	6	7	1
154	per avvelenamenti acuti	2	..	1	3	2	1	9	3	1	2
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi.	1	1
156	per cause non determinate.	3	1	2	2	6	8	1	2	1	..
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	18	11	24	101	37	51	28	25	34	39
160	per annegamento.	1	2	6	1	3	21	7	12	5	1
161	con arma da fuoco.	2	2	4	20	6	14	10	4	3	9
162	id. da taglio.	1	3	7	..	1	3	..
163	per impiccamento.	2	1	1	2	2	7	3	2	4	1
164	per precipitazione	1	1	2	12	2	1	..	3	3	..
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	3	2	..	2	1	2
166	per avvelenamento.	2	..	2	33	2	7	3	3	6	..
167	per asfissia	2	..	1
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato
	Totale dei morti per causa determinata	8 201	4 977	16 635	28 325	12 216	20 549	11 397	16 807	11 964	10 532
	Morti per causa ignota o non dichiarata	13	37	24	128	74	32	83	166	126	184
	TOTALE GENERALE	8 214	5 014	16 659	28 453	12 290	20 581	11 480	16 973	12 090	10 716

(α) Nell'anno 1907 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per

secondo 168 cause di morte.

provincie

Anno 1907.

N.º dell'Elenco nosologico (α)	CALABRIE		SICILIA							SARDEGNA		
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
140	2	1	2	..	140
141	12	6	9	15	10	10	19	9	20	19	9	141
142	2	2	2	1	1	3	1	2	1	6	3	142
143	1	..	1	2	1	..	2	5	1	2	2	143
144	4	4	..	1	7	4	7	5	3	..	4	144
145	47	39	22	34	12	51	54	25	27	48	22	145
146	9	5	2	11	6	6	18	2	8	1	3	146
147	..	1	..	1	1	1	..	147
148	1	..	1	1	..	2	1	1	..	148
149	12	14	34	25	20	19	15	6	9	20	6	149
150	3	..	4	3	1	1	6	6	3	3	1	150
151	66	59	30	47	34	41	52	28	25	49	39	151
152	1	..	1	1	4	3	152
153	5	..	10	3	4	1	16	1	5	4	2	153
154	1	5	1	1	7	4	2	3	6	154
155	2	1	1	155
156	8	2	2	18	2	5	25	3	4	5	1	156
157	34	39	26	45	41	12	36	12	32	26	14	157
160	1	2	5	13	3	2	2	5	6	6	4	160
161	6	5	9	13	3	12	18	7	5	1	10	161
162	1	..	1	4	1	162
163	1	..	1	3	2	5	8	4	3	10	3	163
164	3	2	1	3	2	1	6	1	2	2	1	164
165	..	3	1	165
166	1	1	3	8	2	3	15	4	3	3	4	166
167	1	167
168	1	2	..	1	168
	9 156	9 389	8 931	17 227	9 440	11 127	15 581	11 323	6 440	10 553	5 803	
	104	169	6	105	11	53	41	61	8	392	283	
	9 260	9 758	8 937	17 332	9 451	11 180	15 622	11 384	6 448	10 945	6 086	

« condanna alla pena capitale » (n. 159).

Segue TAV. I. — Morti classificati

B — Per compartimenti e

Anno 1907.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
1	Asfissia ed apoplezia nel parto	111	19	156	136	71	67
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità.	64	18	130	96	74	95
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	87	9	147	93	80	84
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	6	2	16	9	6	6
5	Labbro leporino	19	3	47	12	17	10
6	Atrofia congenita, immaturità	2 984	963	5 931	5 690	5 009	3 638
7	Vaiuolo	35	8	12	5	1	9
8	Morbillo	427	238	1 069	596	404	300
9	Scarlattina	78	34	42	142	155	91
10	Risipola	284	82	424	214	192	271
11	Febbre tifoida	587	148	1 962	915	542	619
12	Tifo petecchiale	2	..	4	2	4	2
13	Meningite cerebro-spinale epidemica	17	..	2	2
14	Difterite	264	80	569	449	343	247
15	Laringite crupale	229	46	618	366	222	208
16	Ipertosse	789	118	979	922	720	547
17	Influenza	717	301	845	819	435	490
18	Febbri da malaria	20	4	51	67	38	23
19	Cachossia palustre	8	..	13	17	9	11
20	Dissenteria	4	1
22	Sifilide	74	71	155	121	78	58
23	Setticemia, pioemia	161	69	337	205	173	178
24	Pustola maligna, carbonchio	10	10	4	6	7	30
25	Moccio, cimurro	1	..
26	Lebbra	3	..	1
27	Rabbia	2	1	2	1	2	1
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	1	8	16	8	7	4
29	Tubercolosi disseminata	505	225	1 137	833	578	604
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito.	482	267	1 147	838	604	473
31	Tubercolosi polmonare, tisi	4 438	1 915	6 281	3 642	2 740	3 674
32	Tabes mesenterica	315	104	846	602	476	490
33	Scrofola disseminata	51	14	165	176	59	73
34	Lupo	12	4	13	10	6	11
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa.	69	33	72	33	37	56

a) Nell'anno 1907 non si verificarono nel Regno casi di morte per « colera asiatico » (n. 21 dell'Elenco nosologico).

secondo 168 cause di morte.

per il complesso del Regno.

Anno 1907.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico (a)
										MASCHI	FEMINE	TOTALE dei morti	
20	9	10	8	60	26	10	22	23	11	462	297	759	1
23	20	17	50	84	36	15	17	89	12	418	422	840	2
23	10	28	22	50	46	7	18	55	23	421	361	782	3
3	2	6	9	16	3	2	3	7	2	63	35	98	4
5	3	8	8	18	13	5	6	12	3	115	74	189	5
2 034	1 101	1 386	1 671	2 324	2 220	613	1 288	4 247	950	22 379	19 670	42 049	6
..	1	4	1	85	3	48	213	26	..	242	209	451	7
99	63	432	505	1 002	1 044	360	899	590	156	4 235	3 949	8 184	8
17	11	24	14	268	117	491	424	849	183	1 527	1 413	2 940	9
62	42	130	69	210	190	57	111	184	69	1 385	1 246	2 581	10
219	191	310	260	509	531	63	344	1 324	81	4 065	4 549	8 614	11
1	1	..	2	8	1	1	6	4	1	14	25	39	12
6	1	11	2	28	2	3	18	40	52	92	13
52	24	73	64	216	45	14	71	355	54	1 574	1 346	2 920	14
48	39	70	62	275	169	33	60	221	48	1 571	1 143	2 714	15
121	77	225	297	304	261	58	210	474	140	2 652	3 490	6 142	16
267	177	253	461	842	631	247	614	661	283	4 084	3 959	8 043	17
5	8	115	92	145	558	156	368	1 130	471	1 791	1 460	3 251	18
1	1	23	21	53	157	74	125	360	107	533	447	980	19
..	..	1	4	2	6	20
21	62	124	81	304	125	15	162	273	33	993	764	1 757	22
51	35	115	53	137	104	24	92	166	46	1 012	934	1 946	23
1	18	19	21	39	23	32	29	30	35	181	133	314	24
..	1	..	1	25
..	2	..	2	..	2	8	2	10	26
1	2	8	2	9	3	..	3	14	5	44	12	56	27
1	1	3	1	5	9	4	4	64	3	72	67	139	28
242	109	219	170	321	266	38	168	517	240	2 812	3 360	6 172	29
157	90	341	193	417	302	51	106	244	152	2 997	2 867	5 864	30
767	543	1 411	941	2 468	1 937	256	839	2 922	1 022	16 406	19 390	35 796	31
208	154	233	324	640	592	115	190	453	118	2 493	3 373	5 865	32
24	16	16	27	70	49	7	34	128	80	454	535	989	33
5	1	5	9	10	4	3	18	11	3	54	71	125	34
10	5	19	18	30	17	1	12	37	10	228	231	459	35

Segue TAV. I. — Morti classificati

B — Per compartimenti e

Anno 1907.

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENEZIA	EMILIA	TOSCANA
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	107	64	183	172	108	132
37	Morbo di Pott	70	21	106	93	66	68
38	Rachitide	64	45	305	515	345	190
39	Anemia	712	189	1 200	1 070	591	380
40	Leucemia	121	52	175	102	79	111
41	Porpora emorragica	24	6	34	23	21	15
42	Emofilia	18	7	31	11	9	15
43	Scorbuto	8	5	18	20	52	7
44	Marasmo senile	4 675	1 164	5 065	4 055	3 257	3 662
45	Pellagra	33	4	475	590	218	68
46	Gotta	9	3	12	8	5	7
47	Diabete	151	100	165	126	106	150
48	disseminati in più organi	264	86	353	254	181	192
49	dell'utero, vagina, ovaia	303	97	350	268	237	254
50	delle mammelle	109	41	147	92	77	98
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	43	20	47	41	43	59
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	115	57	161	129	92	107
53	dello stomaco, esofago	710	289	1 451	992	892	1 005
54	del fegato	223	84	372	204	281	211
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	249	82	387	195	287	269
56	delle ossa, articolazioni	34	6	44	34	39	21
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi	27	6	31	25	24	26
58	d'altri organi	166	81	308	199	175	158
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1 181	405	2 150	1 141	717	862
60	Mielite, tabe dorsale	275	109	407	282	197	160
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	39	25	46	29	32	21
62	Paralisi infantile	23	5	31	41	29	14
63	Encefalite	104	42	234	131	82	45
64	Apoplessia e congestione cerebrale	3 302	925	5 102	3 060	2 898	2 909
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	52	23	93	52	42	54
66	Rammollimento cerebrale	114	24	127	69	167	84
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	434	136	526	392	486	469
68	Epilessia, isterismo	195	59	238	141	127	134
69							
70	Corea	10	7	12	11	3	10
71	Tetano e trisma	72	20	88	97	67	30
72	Eclampsia infantile	979	352	1 188	1 520	558	897
73	Successioni della pazzia	12	14	14	18	4	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

secondo 168 cause di morte.

per il complesso del Regno.

Anno 1907.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
49	27	43	61	166	74	14	55	99	62	737	679	1 416	36
21	10	38	20	32	25	5	14	34	16	314	325	639	37
292	109	66	109	126	81	16	131	213	132	1 384	1 355	2 739	38
250	167	287	374	822	969	214	411	1 848	335	4 590	5 229	9 819	39
36	34	57	96	241	116	22	52	179	54	688	839	1 527	40
10	3	17	13	40	30	3	14	51	17	171	150	321	41
7	6	4	11	10	18	1	8	35	5	109	87	196	42
2	3	2	2	11	7	..	3	18	6	97	67	164	43
1 895	1 118	1 050	2 673	5 586	2 973	908	2 734	6 664	1 122	21 913	26 688	48 601	44
120	102	14	9	..	1	..	1	946	689	1 635	45
6	5	14	16	19	20	4	17	36	5	150	36	186	46
56	18	107	57	161	60	12	40	187	38	955	580	1 535	47
70	43	77	77	246	120	30	88	398	27	1 023	1 483	2 506	48
100	54	148	95	276	146	25	89	247	41	..	2 725	2 725	49
35	17	44	36	115	40	9	32	79	12	26	957	983	50
22	12	16	11	29	17	4	11	23	7	320	85	405	51
27	20	34	24	76	26	9	22	38	10	709	238	947	52
238	113	191	140	193	91	34	109	243	53	3 730	2 714	6 444	53
68	36	96	56	128	76	18	51	142	26	1 075	997	2 072	54
71	37	96	53	134	71	18	44	102	31	887	1 239	2 126	55
9	7	22	11	29	19	1	11	18	6	161	150	311	56
10	3	9	12	17	17	1	11	29	7	155	100	255	57
77	36	70	85	174	98	18	55	136	28	999	895	1 894	58
204	107	350	314	1 252	933	96	300	1 479	243	6 169	5 565	11 734	59
88	56	64	108	282	146	30	105	164	47	1 460	1 069	2 529	60
13	13	15	19	42	17	6	14	24	7	202	160	362	61
14	11	9	9	33	28	8	8	43	24	174	156	330	62
18	19	27	26	48	38	15	26	82	32	540	429	969	63
1 679	873	1 125	1 673	3 309	1 779	415	1 014	2 789	418	17 660	15 610	33 270	64
12	14	26	17	24	28	4	16	50	18	302	223	525	65
39	31	105	21	29	10	2	11	33	11	482	395	877	66
265	104	157	99	373	100	24	86	676	93	2 751	1 689	4 440	67
51	45	54	99	190	84	42	87	175	46	945	822	1 767	68
3	4	..	5	9	5	3	2	10	3	39	58	97	70
28	8	16	6	45	28	3	20	14	6	399	149	548	71
712	388	757	803	2 515	1 624	359	870	1 066	176	8 032	6 682	14 714	72
5	8	61	..	12	1	1	..	26	..	102	76	178	73

Segue TAV. I. — Morti classificati
B — Per compartimenti e

Anno 1907.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
74	Malattie degli occhi (a)	9	3	2	2
75	Malattie degli orecchi (a)	34	20	122	50	41	46
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	85	41	144	130	48	46
77	Bronchite acuta	3 172	1 088	6 225	3 654	3 221	2 714
78	Bronchite cronica	774	216	680	535	511	483
79	Malattie della pleura (a)	268	127	531	238	166	177
80	Congestione ed apoplezia polmonare	120	22	178	67	66	64
81	Polmonite crupale	4 712	1 534	6 286	3 379	2 643	3 192
82	Bronco polmonite acuta	4 093	2 352	5 765	3 354	2 951	3 112
83	Polmonite cronica, gangrena polmonare	86	36	104	88	42	44
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	21	3	33	8	7	2
85	Morbo di Basedow	14	2	25	17	11	13
86	Asma, enfisema polmonare	230	68	407	153	139	91
87	Malattie delle arterie e gangrena senile degli arti	920	434	1 520	1 705	951	937
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	34	13	36	16	23	30
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	22	21	35	34	31	20
90	Malattie del cuore	7 521	2 212	8 912	5 151	4 186	4 255
91	Malattie del pericardio	34	13	63	38	17	22
92	Angina pectoris	49	13	61	67	63	65
93	Sincope (b)	335	122	557	267	188	197
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	92	30	159	103	126	57
95	Orecchioni	11	6	17	5	10	5
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	82	27	101	54	41	54
97	Malattie dello stomaco, atropia (a)	647	199	958	567	353	293
98	Ulcera rotonda dello stomaco	66	23	53	64	44	60
99	Epatite, cirrosi epatica	474	220	703	357	307	313
100	Atrofia gialla acuta del fegato	7	5	10	6	3	10
101	Calcoli biliari	19	7	33	10	16	16
102	Ittero	153	53	284	154	118	101
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	2	4	13	9	10	7
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	6 669	2 157	14 076	6 768	5 393	5 226
105	Volvolo, occlusione intestinale	256	73	302	214	135	141
106	Tumori intestinali e addominali (a)	31	8	47	11	9	15

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.
pel complesso del Regno.

Anno 1907.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
2	1	3	3	1	4	1	1	2	..	21	13	34	74
14	10	30	18	36	22	8	9	25	4	285	204	489	75
20	8	18	24	59	63	14	24	94	40	487	373	860	76
1 375	998	982	1 809	5 223	4 631	1 005	2 544	8 484	744	24 306	23 563	47 869	77
201	138	268	483	1 102	829	186	362	910	255	3 560	4 373	7 933	78
64	33	122	86	281	157	35	80	362	97	1 703	1 121	2 824	79
13	12	30	12	37	36	3	20	28	20	420	308	728	80
739	617	1 562	1 359	4 472	2 460	573	1 714	4 896	1 229	23 544	17 823	41 367	81
829	587	1 239	1 482	5 208	2 287	561	1 493	3 090	575	19 968	19 210	39 178	82
17	10	32	32	69	42	15	36	66	44	448	315	763	83
1	1	6	5	9	2	4	2	10	1	47	68	115	84
6	2	5	2	3	1	1	2	4	5	29	83	112	85
81	30	58	205	270	123	46	110	242	82	1 191	1 154	2 345	86
295	144	324	378	1 060	283	118	194	403	119	6 064	4 021	10 085	87
22	10	21	16	43	14	4	15	9	2	133	175	308	88
14	1	12	12	33	13	9	14	27	15	169	144	313	89
1 960	1 153	1 738	2 424	6 232	2 680	775	2 081	4 454	819	23 733	32 770	56 503	90
9	6	5	38	48	32	4	26	50	24	206	223	429	91
29	11	31	39	139	64	15	42	52	24	466	298	764	92
79	45	137	114	274	125	41	71	256	43	1 551	1 300	2 851	93
35	30	42	111	129	84	22	67	416	14	792	725	1 517	94
3	5	6	6	9	4	2	3	22	10	81	43	124	95
20	15	23	37	81	52	21	37	145	52	456	386	842	96
120	63	151	233	4 498	518	77	255	1 061	195	3 222	2 966	6 188	97
16	19	22	23	51	29	5	29	36	12	307	245	552	98
107	80	147	184	519	336	86	230	581	172	3 271	1 545	4 816	99
3	1	9	3	10	7	1	6	11	5	60	37	97	100
9	1	25	6	20	8	1	10	19	2	65	137	202	101
33	31	71	49	131	82	35	50	152	41	894	644	1 538	102
3	1	5	2	9	6	3	5	20	5	52	52	104	103
2 215	1 332	2 818	4 115	10 751	10 967	2 129	4 455	15 379	2 739	48 710	48 479	97 189	104
42	43	60	86	235	136	37	80	143	50	1 178	855	2 033	105
2	3	9	3	18	3	3	3	39	3	72	135	207	106

Segue TAV. I. — Morti classificati

B — Per compartimenti e

Anno 1907.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
107	Ernie intestinali e addominali	164	47	121	97	63	84
108	Malattie da echinococco	2	1	3	3	10	11
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	56	18	162	133	146	29
110	Appendicite	77	26	95	76	63	52
110-a	Peritonite	291	101	559	306	298	188
111	Idrope-ascite.	53	6	51	47	21	24
112	Malattie dei reni (a)	1 165	359	1 629	914	782	905
113	Id. della vescica (a)	192	94	251	200	132	152
114	Calcoli renali e vescicali.	10	4	13	4	9	10
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	73	35	67	64	64	56
116	Id. delle capsule suprarenali.	7	2	19	16	8	4
117	Id. dei testicoli (a)	1
118	Id. dell'ovaia (a)	5	5	8	5	4	8
119	Id. dell'utero e vagina (b)	58	18	78	42	49	22
120	Id. delle mammelle (b)	1	1	..	1	..
121	Metrorragia dopo il parto	66	28	90	78	58	50
122	Distocia	11	2	28	9	9	5
123	Eclampsia puerperale	56	16	95	55	50	52
124	Febbre puerperale	124	29	171	96	93	77
125	Pelvi e metroperitonite puerperale.	15	11	54	21	16	11
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali.	20	5	33	23	16	14
127	Pleurmonone, ascesso (a)	114	65	272	167	152	200
128	Gangrena della pelle.	42	25	104	68	55	56
129	Elefantiasi degli arabi.	1	1	3	..	2	..
130	Favo, foruncoli.	16	2	24	11	8	3
131	Pemfigo, eczema, ectima	43	25	76	67	40	49
132	Sclerema.	74	24	578	193	447	93
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	77	50	263	84	101	92
134	Reumatismo articolare acuto	143	52	154	127	98	123
135	Id. cronico.	103	46	107	81	67	75
136	Tsoite	5	1	2	3
137	Atrofia muscolare progressiva	3	4	5	14	6	2
138	Alcoolismo cronico.	77	46	143	167	45	33
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	11	4	9	1	4	3

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto, puerperio.

secondo 168 cause di morte.

pel complesso del Regno.

Anno 1907.

MORTE	MARCHI	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'elenco nosologico
											MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
30	17	58	49	201	108	30	70	170	56	836	529	1 365	107	
6	..	8	4	15	11	17	3	48	46	94	108	
38	39	38	35	76	101	28	57	154	36	572	574	1 146	109	
9	11	42	22	57	40	8	11	36	20	380	265	645	110	
88	79	93	94	299	147	36	107	408	63	1 340	1 817	3 157	110-a	
5	5	12	42	83	49	12	49	196	42	285	412	697	111	
379	221	672	571	1 796	797	306	606	1 857	339	6 688	6 610	13 298	112	
58	45	64	92	281	106	37	71	236	34	1 831	214	2 045	113	
4	3	11	6	18	13	..	10	49	16	155	25	180	114	
27	19	51	23	54	20	6	25	56	16	650	6	656	115	
5	3	8	9	14	5	1	3	13	3	66	54	120	116	
..	1	2	1	1	..	6	..	6	117	
2	..	2	2	6	5	..	2	7	1	..	62	62	118	
13	4	24	28	64	36	13	30	62	21	..	562	562	119	
..	1	1	3	4	120	
28	16	23	54	87	39	16	43	78	35	..	789	789	121	
5	8	8	16	15	11	5	12	23	15	..	182	182	122	
21	13	12	23	51	21	5	15	37	15	..	537	537	123	
20	21	51	43	80	81	35	76	109	41	..	1 147	1 147	124	
5	5	6	7	22	9	4	14	16	1	..	217	217	125	
8	1	10	20	13	9	4	12	10	4	..	202	202	126	
42	50	102	63	223	131	34	113	245	54	1 199	827	2 026	127	
14	16	27	18	83	43	9	16	106	16	340	358	698	128	
1	..	1	..	2	2	2	10	5	15	129	
3	3	14	15	12	12	1	7	12	25	108	60	168	130	
15	11	30	20	45	24	6	10	55	7	280	246	526	131	
44	32	47	58	117	368	40	62	39	15	1 209	1 022	2 231	132	
16	7	31	26	72	44	11	35	66	24	500	499	999	133	
46	22	36	42	98	43	14	46	86	41	606	565	1 171	134	
23	20	47	86	119	62	54	64	81	63	397	700	1 097	135	
..	..	2	..	4	..	2	2	2	1	11	13	24	136	
1	4	2	9	10	16	1	3	4	6	52	38	90	137	
38	16	17	13	6	12	3	16	12	19	580	83	663	138	
1	2	4	1	10	5	..	1	..	1	50	7	57	139	

Segue TAV. I. — Morti classificati

B — Per compartimenti e

Anno 1907.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA	REGNO												
								MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	Num. dell'Elenco nosologico (a)									
140	in stato d'ubbrachezza	16	3	19	20	11	6													
141	per annegamento.	229	50	328	302	139	95													
142	per freddo	17	4	19	16	11	7													
143	per insolazione.	4	1	9	9	6	6													
144	per fulminazione:																			
	a) naturale.	9	6	11	16	10	17													
	b) da apparecchi elettrici	13	4	21	5	1	7													
145	per caduta	411	133	442	269	214	233													
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine	19	10	31	21	12	17													
147	per ferite da taglio.	2	..	1	2	1	4													
148	per lesioni di macchine agrarie ed industriali.	19	4	14	9	6	5													
149	per schiacciamento.	218	63	273	127	104	96													
150	per violenze d'animali.	21	2	22	8	9	14													
151	per ustione.	200	77	369	197	201	216													
152	per soffocamento	9	8	59	36	20	12													
153	per asfissia.	26	10	34	8	23	12													
154	per avvelenamenti acuti	28	17	22	14	16	11													
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	..	1	1	1	2													
156	per cause non determinate	14	21	32	19	7	18													
157	Omicidio (compreso quello d'infante).	85	44	96	35	52	73													
160	per annegamento.	61	9	75	62	71	30													
161	con arma da fuoco.	90	56	114	57	53	55													
162	Id. da taglio	14	2	14	18	9	11													
163	per impiccamento	87	15	75	51	75	48													
164	per precipitazione	23	22	38	20	20	24													
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	21	5	30	4	18	7													
166	per avvelenamento.	37	24	44	18	20	26													
167	per asfissia.	11	7	15	7	4	8													
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	3	1	1	..	1	1													
	Totale dei morti per causa determinata	63 729	22 554	100 767	64 620	51 592	50 666													
	Morti per causa ignota o non dichiarata	610	90	195	263	191	92													
	TOTALE GENERALE	64 339	22 644	100 962	64 883	51 783	50 758													

(a) Nell'anno 1907 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per

secondo 168 cause di morte.

per il complesso del Regno.

Anno 1907.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico (a)
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
6	1	6	5	3	2	1	3	1	2	97	8	105	140
69	32	40	47	82	75	13	29	92	28	1 217	433	1 650	141
18	6	1	19	13	9	8	6	11	9	132	42	174	142
6	2	2	5	6	15	2	2	12	4	69	22	91	143
5	9	8	14	15	12	13	12	27	4	137	51	188	144
3	2	3	..	1	1	57	4	61	145
131	82	133	173	345	178	37	143	225	70	2 469	750	3 219	146
12	10	6	13	40	33	3	19	53	4	257	46	303	147
2	..	2	..	5	1	..	2	2	1	20	5	25	148
5	..	1	3	5	2	..	2	5	1	75	6	81	149
44	27	68	60	140	60	14	40	128	26	1 272	216	1 488	150
2	8	5	13	15	23	5	5	24	4	161	19	180	151
100	70	115	170	461	215	66	213	257	88	1 278	1 737	3 015	152
7	2	8	7	10	9	3	7	115	82	197	153
5	5	10	8	32	16	7	6	40	6	178	70	248	154
3	1	6	2	8	13	1	2	21	9	96	78	174	155
..	..	1	..	1	4	1	..	5	8	13	156
4	2	1	11	14	11	1	10	59	6	194	36	230	157
26	22	64	51	191	104	34	112	254	40	1 091	192	1 283	158
12	4	24	19	13	40	5	4	36	10	288	187	475	159
13	9	52	11	34	28	3	20	67	11	640	33	673	160
2	3	6	2	11	1	3	1	6	..	91	12	103	161
10	9	9	12	8	12	4	2	26	13	360	96	456	162
10	4	19	6	18	4	3	5	16	3	162	73	235	163
1	..	2	..	5	5	..	3	1	..	93	9	102	164
4	4	38	7	39	13	6	2	38	7	140	187	327	165
1	2	2	1	1	..	38	21	59	166
1	..	3	4	..	9	6	15	167
20 990	12 926	23 404	28 257	70 354	48 755	11 964	29 277	80 069	16 356	352 108	344 170	696 278	168
122	16	171	205	276	281	126	457	285	675	2 001	2 054	4 055	
21 112	12 942	23 575	28 462	70 630	49 034	12 090	29 734	80 354	17 031	354 109	346 224	700 333	

« condanna alla pena capitale » (n. 159).

TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1907, classificati per sesso e per principali cause di morte.

Avvertenza. — Le 168 voci dell'elenco nosologico che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I sono state qui riassunte in 53, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta o riunendo sotto l'unica e generica voce di « altre malattie » quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

Anno 1907.

Anno 1907.

N. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
		1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	385	316	383	277	331	314	380	282	1 479
6	Atrofia congenita, immaturità	8 765	8 085	4 677	3 974	3 939	3 318	4 998	4 293	22 379	19 670	42 049
39	Anemia	1 275	1 430	1 132	1 227	1 248	1 382	935	1 190	4 590	5 229	9 819
40	Leucemia	174	201	185	208	175	206	154	224	688	839	1 527
44	Marasmo senile	8 311	10 036	4 697	5 779	3 849	4 815	5 056	6 058	21 913	26 688	48 601
97	Malattie dello stomaco, atresia	541	511	525	439	1 098	1 036	1 058	980	3 222	2 966	6 188
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	7 038	6 706	8 477	8 031	21 936	22 170	11 259	11 572	48 710	48 479	97 189
20	Dissenteria	1	3	1	1	..	4	2	6
99	Epatite, cirrosi epatica	813	390	717	304	858	428	883	423	3 271	1 545	4 816
112	Malattie dei reni	2 082	2 029	1 549	1 542	1 273	1 248	1 784	1 791	6 688	6 610	13 298
110	Appendicite	75	70	101	61	116	67	88	67	380	265	645
110-σ	Peritonite	319	487	260	449	367	450	394	431	1 340	1 817	3 157
7	Vaiuolo	16	12	47	31	37	28	142	138	242	209	451
8	Morbillo	1 121	979	1 248	1 167	1 054	1 040	812	763	4 235	3 949	8 184
9	Scarlattina	188	200	269	267	487	407	583	539	1 527	1 413	2 940
10	Risipola	401	373	315	281	247	240	372	352	1 335	1 246	2 581
11	Febbre tifoidea	642	665	571	570	1 408	1 725	1 444	1 589	4 065	4 549	8 614
12	Tifo petecchiale	3	4	2	3	6	6	3	12	14	25	39
13	Meningite cerebro-spinale epidemica	13	17	27	35	40	52	92
16	Ipertosse	911	1 114	827	1 074	603	863	311	439	2 652	3 490	6 142
14	Difterite	327	287	327	263	326	278	594	518	1 574	1 316	2 890
15	Laringite crupale	782	608	281	202	184	117	324	216	1 571	1 143	2 714
18	Febbri da malaria	196	160	202	127	812	688	581	485	1 791	1 460	3 251
19	Caehessia palustre	110	82	97	76	154	136	172	153	533	447	980
17	Influenza	2 747	2 753	1 076	951	49	67	212	188	4 084	3 959	8 043
22	Siflide	281	210	251	200	232	195	229	159	993	764	1 757
71	Tetano e trisma	67	15	114	48	133	57	85	29	399	149	548
24	Pustola maligna, carbonchio	37	20	34	19	65	68	45	26	181	133	314

Segue Tav. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1907, classificati per sesso e per principali cause di morte.

Anno 1907.

Anno 1907.

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno				
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale		
		27	Rabbia	7	3	11	4	13	1	13	4	44	12	56
124	Febbre puerperale	343	..	239	..	249	..	316	..	1 147	1 147		
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	508	..	451	..	447	..	521	..	1 927	1 927		
77	Bronchite acuta	11 212	10 835	6 107	5 761	2 700	2 735	4 287	4 232	24 306	23 563	47 869		
78	Id. cronica	1 473	1 932	757	873	537	566	793	1 002	3 560	4 373	7 933		
81	Polmonite crupale	10 254	8 156	6 977	4 833	2 695	1 985	3 618	2 849	23 544	17 823	41 367		
82	Bronco polmonite acuta	9 224	9 214	5 184	4 650	2 196	2 208	3 364	3 138	19 968	19 210	39 178		
79	Malattie della pleura	478	308	466	336	371	233	388	244	1 703	1 121	2 824		
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	5 058	5 854	4 992	5 784	4 451	5 722	4 717	5 390	19 218	22 750	41 968		
30 a 37	Altre forme tubercolari	1 667	1 881	2 008	2 213	1 941	2 203	1 661	1 783	7 277	8 080	15 357		
90	Malattie del cuore	8 062	11 849	5 442	7 432	4 495	5 816	5 734	7 673	23 733	32 770	56 503		
87	Malattie delle arterie	1 799	1 216	1 489	1 030	1 302	840	1 474	935	6 064	4 021	10 085		
64	Apoplessia o congestione cerebrale	6 022	5 443	4 008	3 431	3 309	2 918	4 321	3 818	17 660	15 610	33 270		
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1 799	1 616	1 697	1 502	1 379	1 352	1 294	1 095	6 169	5 565	11 734		
63	Encefalite	159	125	121	95	120	108	140	101	540	429	969		
72	Eclampsia infantile	2 757	2 197	1 885	1 560	1 675	1 473	1 715	1 452	8 032	6 682	14 714		
134	Reumatismo articolare acuto	183	180	149	125	116	114	153	146	606	565	1 171		
45	Pellagra	236	197	252	204	234	169	224	119	946	689	1 635		
47	Diabete	311	189	231	141	201	106	212	144	955	580	1 535		
138	Alcoolismo cronico	166	16	138	22	126	29	150	16	580	83	663		
48 a 58	Tumori maligni	2 111	2 806	2 227	2 737	2 397	2 998	2 350	3 042	9 085	11 583	20 668		
140 a 156	Morte violenta	per causa accidentale		1 736	1 162	1 798	739	2 403	795	1 892	917	7 829	3 613	11 442
157		per omicidio		241	33	258	41	289	65	303	53	1 091	192	1 283
160 a 168		per suicidio		386	133	556	196	470	164	409	131	1 321	624	2 445
	Altre malattie	8 138	6 489	6 391	5 065	6 266	4 746	6 682	5 225	27 477	21 525	49 002		
	Causa ignota o non dichiarata	627	609	462	472	467	471	445	502	2 001	2 054	4 055		
	TOTALE GENERALE	111 726	111 054	81 997	77 542	81 143	79 883	79 243	77 765	354 109	346 224	700 333		

TAV. III. — Morti nel Regno classificati

(Vedasi l'avvertenza)

Anno 1907.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		non oltre 1 mese		oltre 1 a non oltre 12 mesi (a)		oltre 1 anno a 2 compiuti (b)		oltre 2 anni a 3 compiuti		oltre 3 anni a 4 compiuti		oltre 4 anni a 5 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	351	792	405	302	62	44	14	11	5	6	5	8
6	Atrofia congenita, immaturità.	20 145	18 007	2 234	1 663
39	Anemia	2 370	2 253	872	916	210	220	82	87	39	56
40	Leucemia	82	68	94	92	35	45	14	15	14	13
44	Marasmo senile
97	Malattie dello stomaco, atropia	727	564	1 031	971	383	359	126	139	56	63	25	42
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	3 418	2 708	20 168	18 695	10 463	10 919	2 998	3 225	1 096	1 086	586	716
20	Dissenteria	1	1
99	Epatite, cirrosi epatica	17	18	29	20	26	26	15	11	7	8	10	6
112	Malattie dei reni	98	81	311	284	374	358	308	307	248	233	191	161
110	Appendicite	1	..	2	2	3	3	2	1	1	1	1	1
110-a	Peritonite	38	16	73	54	59	38	29	34	23	23	21	27
7	Vaiuolo	7	5	47	47	47	25	22	15	11	10	11	11
8	Morbillo	21	10	672	571	1 416	1 242	846	817	459	485	317	288
9	Scarlattina	1	1	104	69	204	181	270	220	219	196	161	167
10	Risipola	284	226	223	313	53	37	14	10	11	8	3	4
11	Febbre tifoidea	7	7	136	130	158	149	135	119	119	100	107	113
12	Tifo petecchiale	1	..	1	2	1	2	1	..
13	Meningite cerebro-spinale epidemica	2	5	2	1	3	2	2	3	1	1
16	Ipertosse	78	81	1 273	1 518	734	999	301	425	109	210	64	118
14	Difterite	6	2	124	104	339	274	276	209	259	204	178	135
15	Laringite crupale	31	18	190	148	367	282	307	213	237	159	171	121
18	Febbri da malaria	9	6	253	250	213	187	117	124	73	77	55	63
19	Cachessia palustre	46	37	51	75	33	40	13	16	9	17
17	Influenza	104	83	462	347	266	222	102	104	51	57	40	49
22	Sifilide	214	152	306	322	40	48	6	4	5	2	3	1
71	Tetano e trisma	7	2	3	1	2	2	5	..	4	3	11	4

(a) Si comprendono in questo gruppo quei bambini che erano entrati nel secondo mese di vita, ma non avevano superato il primo anno di
(b) In questo gruppo sono compresi i morti che contavano da 1 anno e 1 giorno ad 1 anno e 365 giorni di età. Con lo stesso metodo sono

per età, sesso e principali cause di morte.

premessa alla Tavola II).

Anno 1907.

MORTI IN ETÀ DI																	Numero dell'elenco nosologico
oltre 5 anni a 10 compiuti		oltre 10 anni a 15 compiuti		oltre 15 anni a 20 compiuti		oltre 20 anni a 25 compiuti		oltre 25 anni a 30 compiuti		oltre 30 anni a 35 compiuti		oltre 35 anni a 40 compiuti		oltre 40 anni a 45 compiuti		Numero dell'elenco nosologico	
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
28	16	9	10	1 a 5	
..	6	
85	109	52	88	32	101	64	127	52	128	49	121	75	137	76	181	39	
35	28	23	34	24	51	24	57	19	74	19	57	27	55	34	43	40	
..	44	
65	92	24	39	19	25	19	35	8	28	16	26	24	23	48	38	97	
1 155	1 335	379	439	253	342	243	351	204	320	202	339	222	385	207	374	104	
..	1	20	
33	22	19	14	27	16	41	14	60	26	97	48	154	67	249	115	99	
491	384	170	200	133	158	136	215	137	293	150	293	181	288	251	303	112	
26	13	27	22	43	27	46	22	24	13	26	11	16	15	24	14	110	
121	133	95	95	102	111	75	203	70	181	57	163	60	156	68	126	110-a	
26	24	9	5	8	12	11	9	10	16	6	10	5	4	2	3	7	
402	416	53	64	13	18	12	14	5	7	3	9	1	2	6	2	8	
337	403	93	91	44	44	18	25	3	7	3	3	5	1	3	3	9	
8	11	8	9	19	25	13	26	17	27	24	23	28	36	39	34	10	
432	440	354	540	533	755	559	559	310	396	255	325	191	198	146	178	11	
3	1	3	6	..	2	1	2	1	3	..	1	1	1	..	2	12	
9	16	9	8	2	8	1	3	1	1	1	1	1	13	
82	131	6	6	1	1	16	
293	318	49	60	16	18	12	4	6	6	3	3	3	2	14	
216	159	30	22	6	3	3	4	..	1	1	2	2	3	..	4	15	
192	165	103	72	96	45	59	54	46	56	50	45	49	40	54	29	18	
36	32	14	17	12	9	13	15	16	10	23	17	20	17	24	17	19	
108	96	70	67	90	86	69	86	62	66	68	98	74	108	97	109	17	
5	5	2	2	12	..	15	16	39	20	49	30	48	22	57	40	22	
55	17	51	18	35	10	26	11	15	8	18	9	18	11	25	10	71	

età vale a dire che erano morti entro i 365 giorni dalla nascita. formati gli altri gruppi.

Segue TAV. III. — Morti nel Regno classificati

Anno 1907.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		oltre 45 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 55 compiuti		oltre 55 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 65 compiuti		oltre 65 anni a 70 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti
6	Atrofia congenita, immaturità
39	Anemia	121	154	155	223	244	306
40	Leucemia	36	33	43	29	42	56	47	35	38	30
44	Marasmo senile	620	877	1 246	1 702
97	Malattie dello stomaco, atresia	47	31	48	50	71	55	104	85	114	88
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	341	364	478	491	571	585	871	912	1 129	1 111
20	Dissenteria	2	1	..
99	Epatite, cirrosi epatica	329	130	392	155	442	171	485	214	358	186
112	Malattie dei reni	294	307	346	338	397	379	562	480	571	461
110	Appendicite	23	13	22	19	25	20	21	20	26	16
110-a	Peritonite	58	78	78	65	61	63	80	83	62	69
7	Vaiuolo	7	2	4	3	2	5	1	1
8	Morbillo	..	2	2	..	1	1	..
9	Scarlattina	..	1	1	1
10	Risipola	36	46	64	33	69	53	103	72	88	66
11	Febbre tifoidea	128	116	108	109	109	74	92	72	86	72
12	Tifo petecchiale	..	1	..	1	1
13	Meningite cerebro-spinale epidemica	1	..	1	1	3	1	1
16	Ipertosse	1	1	1	..
14	Difterite	1	1	..	1	1	1	2	..	1	..
15	Laringite crupale	..	1	4	1	1	2	2
15	Febbri da malaria	71	32	70	37	64	42	71	43	57	26
19	Cachessia palustre	41	18	39	11	39	17	38	25	35	21
17	Influenza	130	96	159	139	183	167	305	283	345	350
22	Sifilide	54	34	45	18	35	20	26	10	15	6
71	Tetano e trisma	17	8	23	7	24	5	21	10	19	6

per età, sesso e principali cause di morte.

Anno 1907.

MORTI IN ETÀ DI														Totale generale			Numero dell'elenco nosologico
oltre 70 anni a 75 compiuti		oltre 75 anni a 80 compiuti		oltre 80 anni a 85 compiuti		oltre 85 anni a 90 compiuti		oltre 90 anni compiuti		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale			
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine						
..	1 479	1 189	2 668	1 a 5		
..	22 379	19 670	42 049	6		
..	12	13	4 590	5 229	9 819	39		
27	16	9	4	1	1	1	1	..	1	..	1	688	839	1 527	40		
3 173	4 277	5 054	6 017	6 789	7 932	3 825	4 313	1 170	1 547	36	23	21 913	26 688	48 601	44		
117	88	85	76	47	39	13	10	3	5	2	5	3 222	2 966	6 188	97		
1 349	1 423	1 150	1 056	758	838	282	292	50	69	47	44	48 710	48 479	97 189	104		
..	4	2	6	20		
268	152	142	87	55	31	12	4	1	..	3	4	3 271	1 545	4 816	99		
570	509	438	323	253	187	55	48	9	9	14	11	6 688	6 610	13 298	112		
12	19	4	11	3	2	2	380	285	645	110		
61	50	31	30	15	15	2	3	1	1	1 340	1 817	3 157	110-a		
..	2	3	..	1	2	..	242	209	451	7		
..	1	1	4	1	4 235	3 949	8 184	8		
..	..	1	1 527	1 413	2 940	9		
97	79	81	54	30	31	29	14	3	3	1	1	1 335	1 246	2 581	10		
58	39	21	32	14	16	4	3	..	1	3	6	4 065	4 549	8 614	11		
1	14	25	39	12		
..	..	1	40	52	92	13		
..	..	1	1	2 652	3 490	6 142	16		
1	2	1	1	3	1	1 574	1 346	2 920	14		
2	..	1	1 571	1 143	2 714	15		
38	31	28	20	10	12	4	2	2	..	7	2	1 791	1 460	3 251	18		
17	22	12	5	2	7	..	2	533	447	980	19		
465	475	365	405	335	312	102	114	29	33	3	7	4 084	3 959	8 043	17		
9	7	4	4	3	1	1	..	993	764	1 757	22		
12	3	7	3	1	1	..	399	149	548	71		

Anno 1907.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI												
		non oltre 1 mese		oltre 1 a non oltre 12 mesi		oltre 1 anno a 2 compiuti		oltre 2 anni a 3 compiuti		oltre 3 anni a 4 compiuti		oltre 4 anni a 5 compiuti		
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
24	Pustola maligna, carbonchio	5	1	8	8	3	3	1	4	2	7	
27	Rabbia	1	1	1	4	..	
124	Febbre puerperale	
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperlo	
77	Bronchite acuta	2 581	1 978	9 169	7 616	4 466	4 297	1 429	1 641	674	711	310	399	
78	Bronchite cronica	75	41	47	23	10	7	8	2	
81	Polmonite crupale	223	151	1 722	1 204	1 271	1 081	516	468	262	244	174	186	
82	Bronco polmonite acuta	441	281	3 783	2 792	2 773	2 567	1 104	1 062	538	562	308	401	
79	Malattie della pleura	5	5	86	46	109	67	67	33	31	15	26	10	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	33	16	246	205	296	268	173	153	117	131	111	128	
30	Altre forme tubercolari	62	54	1 126	918	1 022	953	523	541	360	305	268	269	
32 a 37	Malattie del cuore	28	28	96	137	135	75	40	41	37	36	41	35	
87	Malattie delle arterie	60	31	18	20	3	4	6	1	3	2	4	2	
64	Apoplessia e congestione cerebrale	6	6	20	26	12	13	9	13	7	7	10	7	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	81	82	1 444	1 061	858	729	441	425	353	320	305	257	
63	Encefalite	8	6	64	39	32	35	22	18	12	14	15	12	
72	Eclampsia infantile	2 344	1 825	3 414	2 774	1 145	1016	453	448	277	236	165	196	
134	Reumatismo articolare acuto	5	..	15	6	7	2	2	8	5	4	5	4	
45	Pellagra	1	1	1	
47	Diabete	1	1	..	1	1	1	1	1	1	
138	Alcolismo cronico	
48 a 58	Tumori maligni	6	2	16	19	12	13	15	9	12	14	17	8	
140 a 156	Morte violenta	42	29	145	128	362	271	437	344	358	312	232	232	
157		per omicidio	5	4	3	2	1	1	3	1	3	2	..	1
160 a 168		per suicidio
	Altre malattie	2 577	1 824	1 972	1 771	1 387	1 285	704	689	463	455	286	301	
	Causa ignota o non dichiarata	529	484	299	349	132	118	62	73	41	52	
	TOTALE GENERALE	34 673	29 102	54 420	47 428	30 504	29 555	12 301	12 345	6 691	6 513	4 357	4 573	

Anno 1907.

Numero dell'elenco nosologico		MORTI IN ETÀ DI																Numero dell'elenco nosologico
		oltre 5 anni a 10 compiuti		oltre 10 anni a 15 compiuti		oltre 15 anni a 20 compiuti		oltre 20 anni a 25 compiuti		oltre 25 anni a 30 compiuti		oltre 30 anni a 35 compiuti		oltre 35 anni a 40 compiuti		oltre 40 anni a 45 compiuti		
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
7	11	4	6	9	7	12	3	7	7	6	9	4	11	13	9	24		
2	2	7	1	7	1	8	..	3	..	2	1	2	1	27		
..	32	..	296	..	274	..	221	..	204	..	107		
..	60	..	337	..	395	..	416	..	407	..	279		
448	524	115	141	81	153	105	127	63	131	87	114	80	118	120	139	77		
15	49	15	31	18	54	33	57	29	25	20	52	32	28	38	57	78		
410	378	230	215	579	384	767	495	635	515	774	635	865	622	1 217	756	81		
507	623	139	195	202	263	255	276	212	252	227	294	232	332	386	334	82		
66	55	36	45	68	73	129	75	81	54	77	68	74	52	82	53	79		
382	572	400	1 152	1 760	3 235	3 239	3 918	2 572	3 268	2 041	2 544	1 649	1 859	1 363	1 437	29 e 31		
919	992	512	711	423	672	480	536	321	453	237	329	168	246	156	221	30		
212	296	322	362	338	424	321	431	269	467	347	586	459	685	654	933	32 a 37		
9	13	3	8	8	7	17	23	24	23	49	36	75	35	104	57	87		
30	22	28	25	35	36	52	43	62	65	86	88	146	134	234	231	64		
811	831	417	439	291	369	213	248	126	149	99	105	112	91	91	88	59		
29	28	23	27	20	26	11	11	12	14	12	10	14	14	18	12	63		
212	218	22	29	72		
55	36	71	55	70	53	30	45	34	32	36	32	36	29	41	39	134		
2	3	1	6	1	2	7	3	5	16	10	18	14	29	26	36	45		
4	3	8	8	14	12	14	16	30	18	34	12	31	16	45	30	47		
..	5	1	17	4	22	7	36	7	57	8	138		
47	28	29	19	51	53	55	58	66	110	126	231	181	397	368	723	48 a 54		
478	462	465	170	480	94	471	82	338	69	326	64	396	68	285	85	140		
17	6	38	5	121	16	148	26	157	21	125	25	109	15	86	21	157		
..	..	12	2	119	82	237	114	161	71	136	44	127	44	138	45	160		
729	627	472	404	543	434	518	586	488	570	562	661	676	674	937	767	140 a 156		
114	93	47	54	48	65	56	61	46	68	40	56	40	57	67	68	160 a 168		
9 808	10 168	5 068	6 098	6 806	8 472	8 635	9 722	6 873	8 758	6 601	8 295	6 703	7 747	8 149	8 163			

Anno 1907.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI										
		oltre 45 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 55 compiuti		oltre 55 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 65 compiuti		oltre 65 anni a 70 compiuti		
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
24	Pustola maligna, carbonchio. . .	12	6	13	4	23	9	24	10	13	6	
27	Rabbia	2	1	3	2	2	1	
124	Febbre puerperale.	13	
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	33	
77	Bronchite acuta	140	148	244	241	304	315	515	575	647	830	
78	Bronchite cronica	79	106	154	154	224	272	394	473	492	623	
81	Polmonite erupale	1 406	708	1 672	968	1 832	1 248	2 205	1 686	2 130	1 825	
82	Bronco polmonite acuta.	446	368	681	524	829	721	1 235	1 149	1 395	1 497	
79	Malattie della pleura	74	47	123	49	109	70	149	89	124	82	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare.	1 228	1 091	1 049	790	926	690	753	532	448	356	
30, 32 e 37	Altre forme tubercolari.	137	174	126	169	123	137	104	134	89	111	
90	Malattie del cuore.	782	1 002	1 067	1 545	1 610	2 144	2 642	3 894	3 413	5 025	
87	Malattie delle arterie	135	63	218	113	313	212	606	331	842	538	
64	Apoplessia e congestione cerebrale	410	398	779	773	1 171	1 096	2 089	1 929	2 930	2 502	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	112	60	76	64	75	64	75	59	75	38	
63	Encefalite.	20	11	20	21	30	14	33	30	46	33	
72	Eclampsia infantile	
134	Reumatismo articolare acuto	46	39	27	38	24	20	28	39	23	24	
45	Pellagra.	36	39	65	63	79	63	137	106	201	116	
47	Diabete.	44	38	88	56	121	77	157	103	132	73	
138	Alcoolismo cronico	64	16	83	13	86	3	87	12	54	2	
48 e 58	Tumori maligni.	589	949	891	1 333	1 148	1 528	1 557	1 782	1 511	1 583	
140 a 156	Morto violenta	per causa accidentale	353	87	442	92	431	116	467	165	400	165
157		per omicidio	86	9	59	8	51	8	38	2	13	7
160 a 168		per suicidio	163	38	164	50	147	37	136	32	112	27
	Altre malattie.	1 002	754	1 231	971	1 576	1 164	2 270	1 651	2 511	1 730	
	Causa ignota o non dichiarata.	64	63	99	61	97	100	46	47	80	32	
	TOTALE GENERALE	9 146	7 729	11 454	9 831	13 747	12 131	19 290	18 053	21 826	21 452	

Anno 1907.

MORTI IN ETÀ DI													Totale generale			Numero dell'elenco nosologico
oltre 70 anni a 75 compiuti		oltre 75 anni a 80 compiuti		oltre 80 anni a 85 compiuti		oltre 85 anni a 90 compiuti		oltre 90 anni compiuti		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale		
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine					
5	8	7	2	3	2	181	135	314	24	
1	44	12	56	27	
..	1 147	1 147	124	
..	1 927	1 927	121, 122, 123, 125, 126	
844	1 139	812	997	693	810	291	314	65	82	18	22	24 306	23 563	47 869	77	
657	871	605	735	433	483	150	189	27	32	5	9	3 560	4 373	7 933	78	
2 168	1 841	1 390	1 271	718	686	218	187	33	39	37	25	23 544	17 823	41 367	81	
1 675	1 888	1 383	1 496	851	918	282	300	58	91	26	24	19 908	19 210	39 178	82	
94	62	59	41	29	20	5	7	2	3	4	..	1 703	1 121	2 824	79	
229	208	119	108	48	38	9	12	1	2	26	27	19 218	22 750	41 968	29 e 31	
57	87	34	40	17	18	4	3	2	..	7	7	7 277	8 080	15 357	30, 32 e 37	
4 476	6 142	3 552	4 777	2 133	2 684	596	853	111	169	52	56	23 733	32 770	56 503	90	
1 200	762	1 158	798	820	630	288	266	59	43	12	3	6 064	4 021	10 085	87	
3 671	3 192	3 128	2 639	1 974	1 684	633	565	83	85	35	31	17 080	15 610	33 270	64	
49	40	29	25	17	14	7	2	12	5	6 169	5 565	11 734	59	
39	27	30	14	20	8	9	5	1	540	429	969	63	
..	8 032	6 682	14 714	72	
22	23	14	23	7	11	3	3	606	565	1 171	134	
183	105	130	58	35	17	6	4	1	1	6	2	946	689	1 635	45	
138	60	66	33	17	16	5	2	1	..	2	3	955	580	1 535	47	
43	6	16	2	4	2	3	..	1	..	2	..	580	83	663	188	
1 294	1 374	713	825	300	387	77	103	13	19	11	16	9 085	11 533	20 668	48 e 58	
364	193	243	178	163	141	55	50	7	9	49	7	7 829	3 613	11 442	140 a 156	
11	4	4	2	4	1	1	2	..	1	8	2	1 091	192	1 283	157	
79	19	49	9	25	8	1	..	2	1	13	1	1 821	624	2 445	160 a 168	
2 711	1 743	2 163	1 359	1 235	781	358	240	59	53	47	31	27 477	21 525	49 002		
12	10	8	3	2	3	..	2	1	..	121	135	2 001	2 054	4 055		
26 289	26 999	23 142	23 563	17 866	18 786	7 334	7 915	1 794	2 298	632	528	354 109	346 224	700 333		

TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1907.

Table with columns: CAUSE DI MORTE, ALESSANDRIA, ACQUI, ASTI, CASALE MONFERRATO, NOVI LIGURE, TORTONA, CUNEO, ALBA, MONDOVI, SALUZZO, NOVARA, BIELLA. Rows list various causes of death such as Malattie fetali e vizi congeniti, Atrofia congenita, etc.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1907.

Table with columns: DOMODOSSOLA, PALLANZA, VARALLO, VERCELLI, TORINO, AOSTA, IVREA, PINEROLO, SUSÀ, GENOVA, ALBENGA, CHIVARI, SAVONA, SPEZIA, S. PIER D'ARENA, PORTO MAURIZIO, SAN REMO, Num. dell'elenco nosologico. Rows list various causes of death such as Malattie fetali, Anemia, etc., with numerical data for each commune.

(a) Tale numero è costituito da 17 principali capiluoghi di Distretto, da 61 Comuni non capiluoghi aventi più di 20,000 abitanti, secondo alla stessa data avevano una popolazione inferiore a 20,000 abitanti, ma ne contavano più di 15,000 al 1° gennaio 1882. Si è tenuto conto anche

il censimento del 10 febbraio 1901 e da altri 5 Comuni (Gravina in Puglia, San Marco in Lamis, Avigliano, San Cataldo e Leonforte) che di questi ultimi per rendere possibili i confronti con le statistiche degli anni precedenti nelle quali erano considerati pur essi

Segue Tav. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1907.

Table with 13 columns: Cause di morte, Bergamo, Cuneo, Treviglio, Brescia, Breno, Chiari, Salò, Verolanova, Como, Lecco, Varese, Cremona. Rows include various diseases like Anemia, Malattie dello stomaco, Diarrea, etc., and a 'TOTALE GENERALE' row at the bottom.

(a) Si veggia la nota a pag. 56.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1907.

Table with 22 columns: Casal Maggiore, Crema, Mantova, Viadana, Milano, Abbiategrasso, Gallarate, Lodi, Monza, Pavia, Bobbio, Mortara, Voghera, Vigevano, Sonrio, Belluno, Feltrè, Num. dell'elenco nosologico. Rows include various diseases and a 'TOTALE GENERALE' row at the bottom.

Segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario Anno 1907.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE' and provinces: PADOVA, ESTE, MONSELICE, MONTAGNANA, ROVIGO, ADRIA, TREVISO, CASTELFRANCO VENETO, CONEGLIANO, MONTEBELLUNA, VITTORIO, UDINE. Rows list various diseases like 'Malattie fetali e vizi congeniti', 'Anemia, leucemia', etc., with corresponding death counts.

(a) Si veggia la nota a pag. 56.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1907.

Table with columns for provinces: PORDENONE, VENEZIA, CHIOGGIA, MESTRE, VERONA, LEGNAGO, VICENZA, BASSANO, LONGO, SCHIO, BOLOGNA, INOLA, VERGATO, FERRARA, CENTO, COMACCHIO, ARGENTA, and 'Num. dell'elenco nosologico'. Rows list various diseases with death counts across these provinces.

Segue TAV. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1907.

Table with 13 columns: Num. dell'elenco nosologico, CAUSE DI MORTE, and 12 provincial/city names (PIEMONTE D'ALBA, SORA, AVERSA, etc.). Rows list various diseases like 'Malattie fotali e vizi congeniti' and 'Tubercolosi disseminata e polmonare'.

(a) Si veggia la nota a pag. 56.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1907.

Table with 25 columns: Num. dell'elenco nosologico, 23 provincial/city names (TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, SALERNO, etc.), and Num. dell'elenco nosologico. Rows list various diseases like 'Atrofia congenita immaturità' and 'Morte violenta per omicidio'.

Segue Tav. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1907.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE' and 13 municipalities: PAOLA, ROSSANO, REGGIO DI CALABRIA, GERACE MARINA, PALMI, CANTANISSETTA, PIAZZA ARMERINA, TERRANOVA SICILIA, CASTROGIOVANNI, SAN CATALDO (a), CATANIA, ACIREALE, CALTAGIRONE. Rows list various diseases like 'Malattie fetali e vizi congeniti', 'Anemia, leucemia', etc.

(a) Si veggia la nota a pag. 56.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1907.

Table with columns for 13 municipalities: NIGOSIA, ADERNÒ, BRONTÈ, GIARRE, LEONFORTE (a), PATERNÒ, GIURGENTI, BIVONA, SCIACCA, CANGIATTI, FAVARA, LICATA, MESSINA, CASTROREALE, MISTRETTA, PATI, BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Rows list various diseases like 'Malattie fetali e vizi congeniti', 'Anemia, leucemia', etc.

Segue Tav. V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di Provincia o di Circondario

Anno 1907.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE' and various provinces: PALERMO, CEFALU', CORLEONE, TERMINI IMERESE, MONREALE, PARTINICO, SIRACUSA, MODICA, NOTO, COMISO, RAGUSA, VITTORIA, TRAPANI. Includes a 'TOTALE GENERALE' row at the bottom.

(a) Si veggia la nota a pag. 56.

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

Anno 1907.

Table with columns for various provinces: ALCANTARA, MAZZARA DEL VALLO, CASTELVEFRANO, MARSALA, MONTE SAN GIULIANO, CAGLIARI, IGLESIAS, LANUSEI, ORISTANO, SASSARI, ALGERO, NUORO, OZIERI, TEMPIO PAUSANIA. Includes 'TOTALE' rows for different groups of municipalities and a 'TOTALE GENERALE' row at the bottom.

TAV. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno in età di non oltre 5 anni compiuti classificati per sesso e principali cause di morte.

Anno 1907.

Anno 1907.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	NUMERO DEI MORTI DI											
		non oltre 1 mese		oltre 1 a non oltre 12 mesi compiuti		oltre 1 anno a 2 compiuti		oltre 2 anni a 3 compiuti		oltre 3 anni a 4 compiuti		oltre 4 anni a 5 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	57	43	21	14	4	1	2
6	Atrofia congenita, immaturità	1 702	1 510	219	196
39 e 40	Anemia, leucemia	215	239	61	55	8	14	6	8	1	5
97	Gastrite	85	101	86	128	17	20	3	5	1	6	2	..
104	Enterite, diarrea, colera indigeno	444	466	1 353	1 377	444	469	122	122	38	51	19	23
99	Epatite, cirrosi epatica	1	1	..	2
112	Malattie dei reni	8	13	23	18	14	21	15	13	7	8	8	8
110	Appendicite	1
110-a	Peritonite	8	..	2	..	3	2	..	2	1	..
7	Vaiuolo	1	..	3	1	1	1	2	2
8	Morbillo	1	1	26	18	51	44	29	29	7	18	7	7
9	Scarlattina	4	2	5	3	9	2	3	6	7	7
10	Risipola	17	13	17	15	..	1	..	1	..	1
11	Febbre tifoidea	5	3	2	2	2	2	2	3	4
16	Ipertosse	6	1	55	71	28	40	10	19	2	5	..	3
14	Difterite	2	..	9	7	17	10	6	3	9	5	5	1
15	Laringite crupale	2	..	4	5	9	11	6	4	2	2	4	2
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	2	..	14	15	6	4	5	3	2	4	2	2
17	Influenza	8	6	19	29	9	7	5	5	1	2	1	7
22	Sifilide	137	97	172	207	12	20	..	1	3	1
71	Tetano e trisma	1
77	Bronchite acuta	135	122	425	375	157	170	54	46	25	24	7	13
78	Bronchite cronica	4	8	1	2
81	Polmonite crupale	26	10	81	75	48	61	11	10	5	10	2	3
82	Bronco polmonite acuta	50	30	181	167	100	111	35	31	13	22	12	15
79	Malattie della pleura	6	3	3	1	1
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	2	..	14	18	11	12	12	7	4	9	1	2
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	4	5	46	61	43	53	21	23	19	11	5	10
90	Malattie del cuore	3	1	5	8	4	6	..	1	1	2	1	..
87	Malattie delle arterie	3	2	1	1	..	1
64	Apoplessia e congestione cerebrale	1	1	1	1
59, 3	Meningite semplice cerebrale e spinale	8	4	50	52	23	20	17	14	8	11	4	8
63	Encefalite	1	..	2	1
72	Eclampsia infantile	144	117	192	169	41	48	20	15	10	16	2	7
48 a 58	Tumori maligni	2	..	1	..	2	1	1	1
140 a 156	Morte violenta	21	6	10	10	15	12	17	18	7	11	8	5
157	Altre malattie	309	233	156	214	74	71	28	39	12	14	6	12
	Causa ignota o non dichiarata	35	33	15	12	6	2	2	2
	TOTALE	3 189	2 783	3 449	3 533	1 225	1 299	448	434	192	243	110	147

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che non furono, nell'anno 1907, causa di morte nei bambini illegittimi ed esposti, in età di non oltre 5 anni compiuti.

TAV. VII. — Morti violente accidentali classificate per età, per sesso e secondo le cause che le produssero.

Anno 1907.

Anno 1907.

CAUSE delle morti accidentali	Complesso			NUMERO DEI MORTI DI																			
				non oltre 1 anno		oltre 1 anno a 5 compiuti		oltre 5 anni a 15 compiuti		oltre 15 anni a 30 compiuti		oltre 30 anni a 40 compiuti		oltre 40 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 70 compiuti		oltre 70 anni		Età ignota	
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
Per ubbriachezza	105	97	8	4	..	1	..	9	1	10	1	25	3	20	1	19	2	8	..	1	..
Per annegamento	1 650	1 217	433	9	5	296	214	210	61	248	47	70	23	67	17	91	19	110	19	73	23	10	2
Per freddo	174	132	42	21	16	2	1	3	1	7	2	5	1	15	2	16	2	27	7	54	10	2	..
Per insolazione	91	69	22	..	1	4	4	11	3	11	5	6	..	9	2	8	4	12	3	8
Per fulminazione:																							
a) naturale	188	137	51	1	16	12	46	15	21	6	21	9	16	2	14	4	3	2
b) da apparecchi elettrici	61	57	4	4	2	26	1	12	..	7	..	5	1	3
Per caduta	3 219	2 469	750	13	9	91	65	208	63	366	56	228	31	289	61	396	100	438	148	487	216	13	1
Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	303	257	46	1	..	11	7	44	13	122	9	23	6	25	3	16	4	10	3	1	1	4	..
Per ferite da taglio	25	20	5	1	1	..	2	3	..	7	..	3	..	1	1	3	1	2
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	81	75	6	13	1	32	2	11	..	4	2	10	..	4	..	1	1
Per schiacciamento	1 488	1 272	216	4	1	66	49	159	42	299	25	183	19	173	15	183	19	125	19	70	27	10	..
Per violenza di animali	180	161	19	3	3	8	2	32	1	29	..	13	2	20	4	20	1	22	4	14	2
Per ustione	3 015	1 278	1 737	56	43	811	765	144	385	58	56	24	33	25	38	32	43	34	100	90	272	4	2
Per soffocamento	197	115	82	50	55	33	19	9	2	6	1	2	..	4	1	3	1	2	1	4	2	2	..
Per asfissia	248	178	70	23	17	21	8	13	13	36	9	18	3	19	3	24	3	12	6	10	6	2	2
Per avvelenamenti acuti	174	96	78	2	3	37	19	23	19	8	14	3	6	7	4	7	6	4	6	5	1
Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi	13	5	8	1	1	3	3	1	1	3
Per cause diverse o non determi- nate	230	194	36	4	4	5	3	22	6	40	1	26	1	25	8	22	1	27	4	22	8	1	..
TOTALE	11 442	7 829	3 613	187	157	1 389	1 159	943	632	1 289	245	662	132	738	172	873	208	867	330	832	571	49	7

TAV. VIII. — Morti violente accidentali classificate secondo

Anno 1907.

MESI	COMPLESSO			PER UBBRIACHEZZA		PER ANNEGAMENTO		PER FREDDO		PER INSOLAZIONE		PER FULMINAZIONE		PER SCOSSA ELETTRICA		PER CADUTA	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Gennaio	1 061	629	432	21	2	30	18	52	9	1	1	173
Febbraio	896	544	352	12	1	42	17	38	17	3	2	1	..	155	39
Marzo	941	563	378	7	..	74	27	9	5	3	..	1	..	169	48
Aprile	755	517	238	9	1	70	24	2	1	1	2	..	184	48
Maggio	837	587	250	4	..	106	58	3	1	2	3	2	2	8	..	193	42
Giugno	945	691	251	2	..	154	51	11	2	22	8	7	1	246	70
Luglio	1 067	810	257	3	1	201	58	..	a) 1	15	3	22	9	6	1	252	79
Agosto	1 140	869	271	8	..	194	48	..	b) 1	40	10	20	8	7	..	266	86
Settembre	991	724	267	6	..	82	40	1	3	44	17	5	1	247	89
Ottobre	897	647	250	13	..	104	38	1	1	15	4	7	..	216	85
Novembre	906	598	308	6	2	75	37	9	1	2	..	6	..	198	60
Dicembre	1 006	647	359	6	1	85	17	18	7	3	..	6	..	175	59
ANNO	11 442	7 829	3 613	97	8	1 217	433	132	42	69	22	137	51	57	4	2 469	750

a) Bambina di 2 giorni, morta per freddo in seguito ad abbandono.
 b) Giovane di 25 anni, morta per assideramento in alta montagna.

cause che le produssero, per sesso e per mesi.

Anno 1907.

PER LESIONI causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, mine, ecc.		PER FERITE DA TAGLIO		PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali		PER SCHIACCIA- MENTO		PER VIOLENZE di animali		PER USTIONE		PER SOFFOCA- MENTO		PER ASFISSIA		PER AVVELENA- MENTI ACUTI		PER MORSI di VIPERA o di altri animali velenosi		PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMI- NATE	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
22	4	1	..	4	..	83	8	6	..	181	322	14	8	20	12	2	1	14	2
19	2	3	..	81	24	5	2	136	232	14	7	13	7	5	1	17	1
10	2	2	..	2	2	91	9	6	3	157	262	6	5	13	6	6	7	..	1	7	1
15	3	2	..	3	2	106	10	6	3	78	128	13	5	5	5	4	7	17	1
20	1	1	1	3	..	107	22	15	4	66	95	13	4	13	3	13	8	2	3	16	3
21	4	1	..	6	1	102	20	18	..	65	78	6	4	13	5	8	3	2	1	10	3
13	3	2	..	14	1	127	13	21	..	91	63	6	9	10	3	7	6	1	..	19	7
37	7	1	..	8	..	128	22	26	1	90	64	11	8	8	1	10	10	15	5
34	3	3	1	3	..	138	18	16	1	90	70	10	9	15	4	13	7	..	2	17	2
17	5	4	..	9	..	113	27	16	3	71	60	6	4	22	5	14	14	..	1	19	3
22	4	1	..	13	..	100	24	19	2	104	153	8	8	16	4	11	11	13	2
27	8	2	3	7	..	91	19	7	..	149	210	8	11	30	15	3	3	30	6
257	46	20	5	75	6	1 272	216	181	19	1 278	1 737	116	82	178	70	96	78	5	8	194	36

TAV. X. — Suicidi classificati per compartimenti, per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione.

Anno 1907.

Anno 1907.

	REGNO		PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE		BASILICATA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA			
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.			
Mesi	Gennaio	161	129	32	22	7	5	2	23	4	16	4	15	5	13	1	4	1	2	..	8	3	2	..	6	1	4	1	1	1	6	1	2	1
	Febbraio	166	117	49	21	8	12	2	16	8	13	7	10	8	7	1	1	..	1	..	8	4	2	2	4	4	4	..	1	..	3	..	12	5	2	..
	Marzo	192	140	52	24	5	7	2	24	10	13	3	20	10	13	3	6	3	1	1	11	4	2	..	2	2	5	2	2	..	2	2	8	4	..	1
	Aprile	214	150	64	24	4	6	4	24	13	17	9	16	10	12	5	4	1	1	1	13	3	1	3	6	5	7	..	2	..	2	..	10	4	5	2
	Maggio	273	208	65	32	8	13	2	41	9	14	10	20	8	20	2	4	1	2	2	13	4	2	3	12	4	9	7	1	1	1	1	20	3	4	..
	Giugno	265	198	67	23	7	16	3	35	10	18	8	21	7	15	7	5	1	3	1	8	4	7	1	11	4	4	4	2	1	4	..	19	9	7	..
	Luglio	237	184	53	33	10	15	..	24	5	13	2	12	8	20	3	5	1	4	1	8	4	2	4	12	4	10	2	2	1	2	..	14	6	1	2
	Agosto	218	159	59	22	10	8	1	29	5	19	8	12	4	15	5	1	3	2	2	11	3	4	2	11	5	7	6	2	..	2	2	12	3	2	..
	Settembre	179	127	52	19	8	4	5	26	11	8	4	15	2	12	3	2	..	1	..	7	3	5	1	8	5	4	1	..	2	5	3	9	3	2	1
	Ottobre	183	139	44	12	3	5	5	31	2	12	5	15	5	19	2	5	1	2	2	4	1	..	1	3	5	9	3	3	1	3	1	13	7	3	..
	Novembre	181	137	44	19	7	8	..	19	10	16	3	15	8	15	5	3	1	9	1	5	1	4	1	8	1	12	6	4	..
	Dicembre	176	133	43	15	4	15	1	20	7	13	2	14	4	9	3	1	1	3	..	12	7	4	5	10	1	3	3	1	2	1	1	7	2	5	..
Mezzi di uccisione	Per annegamento	475	288	187	34	27	7	2	50	25	33	29	41	30	25	5	5	7	1	3	15	9	10	9	7	6	24	16	3	2	2	2	23	13	8	2
	Con arma da fuoco	678	640	33	87	3	55	1	109	5	54	3	52	1	51	4	12	1	8	1	52	..	10	1	33	1	27	1	3	..	15	5	61	6	11	..
	Con arma da taglio	103	91	12	11	3	2	..	13	1	14	4	8	1	10	1	2	..	3	..	6	..	2	..	10	1	..	1	3	..	1	..	6
	Per impiccamento	456	360	96	71	16	13	2	60	15	40	11	53	22	41	7	9	1	6	3	8	1	9	3	6	2	10	2	4	2	18	8	12	1
	Per precipitazione	235	162	73	17	6	18	4	25	13	13	7	16	4	17	7	8	2	2	2	14	5	1	5	11	7	3	1	1	2	4	1	10	6	2	1
	Per schiacciamento	102	93	9	20	1	4	1	27	3	4	..	15	3	7	..	1	2	4	1	5	3	..	1
	Per avvelenamento	327	140	187	17	20	9	15	19	25	9	9	4	16	14	12	3	1	2	2	13	25	3	4	16	23	5	8	2	4	1	1	19	19	4	3
	Per asfissia	59	38	21	8	3	5	2	8	7	5	2	2	2	5	3	1	1	1	2	1	1
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	15	9	6	1	2	1	..	1	1	1	..	1	2	1	3	1	
TOTALE	2 445	1 821	624	266	81	114	27	312	94	172	65	192	79	170	40	41	13	22	11	112	41	36	23	89	41	74	30	16	8	26	11	142	53	37	7	

TAV. XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.

Anno 1907.

Anno 1907.

E T À	COMPLESSO			PER ANNEGAMENTO		CON ARMA DA FUOCO		CON ARMA DA TAGLIO		PER IMPICCAMENTO		PER PRECIPITAZIONE		PER SCHIACCIAMENTO		PER AVVELENAMENTO		PER ASFISSIA		CON ALTRO MEZZO O CON MEZZO NON DETERMINATO	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Non oltre 15 anni compiuti	14	12	2	3	1	2	..	1	..	3	..	1	2	1
Oltre 15 anni a 20 compiuti	201	119	82	8	18	50	7	4	..	14	4	8	7	12	1	16	43	7	2
» 20 » 25 »	351	237	114	15	30	133	11	8	1	26	8	9	9	12	1	29	51	3	3	2	..
» 25 » 30 »	232	161	71	20	14	79	3	4	3	25	18	14	6	10	1	7	27	2	3	..	1
» 30 » 40 »	351	263	88	38	23	103	5	16	2	50	14	24	10	11	2	16	27	4	4	1	1
» 40 » 50 »	384	301	83	55	26	105	5	16	3	53	17	23	7	16	1	21	19	10	3	2	2
» 50 » 60 »	398	311	87	58	30	81	..	19	1	78	30	29	7	16	1	23	13	4	4	3	1
» 60 » 70 »	307	248	59	48	36	53	2	13	1	78	5	23	11	11	2	17	1	5	1
» 70 » 80 »	156	128	28	33	6	23	..	9	1	26	4	23	12	3	..	8	4	3	1
» 80 anni compiuti	37	28	9	9	3	5	..	1	..	5	1	6	4	1	..	1	1
Età ignota	14	13	1	1	..	6	2	..	2	..	1	1	1	..
TOTALE	2 445	1 821	624	288	187	640	33	91	12	360	96	162	73	93	9	140	187	38	21	9	6

TAV. XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione.

Anno 1907.

Anno 1907.

MEZZI DI UCCISIONE	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.
Per annegamento	475	288	187	174	105	69	201	124	77	87	51	36	13	8	5
Con arma da fuoco	673	640	33	562	343	19	237	227	10	52	49	3	22	21	1
Con arma da taglio	103	91	12	37	32	5	46	40	6	16	15	1	4	4	..
Per impiccamento	456	360	96	148	126	22	228	174	54	73	54	19	7	6	1
Per precipitazione	235	162	73	93	62	31	84	65	19	50	28	22	8	7	1
Per schiacciamento	102	93	9	58	55	3	30	25	5	10	10	..	4	3	1
Per avvelenamento	327	140	187	175	67	108	112	48	64	31	19	12	9	6	3
Per asfissia	59	38	21	26	17	9	21	14	7	11	7	4	1	..	1
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	15	9	6	5	3	2	7	4	3	1	..	1	2	2	..
TOTALE . . .	2 445	1 821	624	1 078	810	268	966	721	245	331	233	98	70	57	13

TAV. XIII. — Suicidi in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per sesso e secondo la condizione o professione (a).

Anno 1907.

Anno 1907.

PROFESSIONI	SUICIDI	PROFESSIONI	SUICIDI
-------------	---------	-------------	---------

Maschi.

Agricoltori, boscaioli, carbonai	398	Fabbricanti e operai non specificati	26
Braccianti, manovali, cantonieri	89	Marinai, barcaioli	7
Pastori, mandriani	8	Cocchieri, stallieri, carrettieri	25
Minatori, marmisti, cavatori, solfatai	7	Ferrovieri	18
Fabbrì, meccanici, arrotini, stagnini	66	Fattorini postali e telegrafici	6
Macchinisti e fuochisti	3	Farmacisti	11
Fornaciai, cementisti	7	Negozianti, albergatori, sensali, spedizionieri, agenti di cambio, chincaglieri, tabaccai, impresari	116
Vetrai	2	Commessi e ragionieri	25
Muratori, scalpellini, pittori da stanze, imbianchini	62	Futtivendoli, pescivendoli, venditori ambulanti	10
Falegnami, verniciatori, ebanisti, calafati, carpentieri	51	Domestici, uscieri, sagrestiani, cuochi e portieri	44
Cestai	3	Faccini, lavandai, spazzini	22
Tappezzeri	7	Impiegati pubblici e privati, magistrati, pensionati civili	101
Cernitori di stracci	1	Corpi armati (escluso l'esercito)	35
Tipografi, litografi	8	Militari e pensionati militari	67
Tessitori, tintori, cardatori	10	Maestri e professori	2
Conciatori	4	Sacerdoti, monaci	6
Calzolai, sellai	67	Medici, dentisti	13
Sarti	25	Infermieri	2
Cappellai, guantai	4	Avvocati, notai, uscieri giudiziari	14
Barbieri	15	Ingegneri, agrimensori	11
Mugnai, pastai, fornai, panettieri	26	Proprietari, benestanti, capitalisti	128
Orefici, orologiai, gioiellieri	12	Studenti	49
Caffettieri, pasticciieri	7	Mendicanti e ricoverati	6
Trattori, vlnai, osti	19	Altre professioni o professioni ignote	121
Camerieri d'esercizi pubblici	18		
Casari	8		
Macellai, pizzicagnoli	17		
		TOTALE	1809

Femmine.

Contadine e ortolane	129	Levatrici	6
Braccianti	9	Studentesse	2
Filatrici e tessitrici	7	Cameriere e domestiche	51
Sarte, modiste, cucitrici e ricamatrici	30	Lavandaie	1
Operaie in genere	11	Artiste di teatro	4
Merciaie e commercianti	16	Donne di casa	211
Monache	1	Altre professioni o professioni ignote	82
Agiate	54		
Maestre	3		
Stiratrici	5		
		TOTALE	622

(a) Non sono compresi in questo prospetto 12 maschi e 2 femmine suicidatisi in età inferiore ai 15 anni.

