

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA E DEL LAVORO

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

NELL'ANNO 1911



ROMA

TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI

1913



INDICE

INTRODUZIONE.

CAPO I. — Avvertenze preliminari.

§ 1. — Metodo e fonti	Pag.	III
§ 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell' Introduzione	»	V
§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità	»	V

CAPO II. — Mortalità nel Regno e nelle singole Provincie.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1911 e confronto cogli anni precedenti	»	XI
§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1887-1911	»	XV
§ 3. — Morti avvenute nell'anno 1911 in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di provincia	»	XXXV
§ 4. — Distribuzione geografica di alcune malattie, specialmente di quelle infettive, negli anni 1909, 1910 e 1911	»	XXXVII
§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità	»	XLIV
§ 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso	»	XLV
§ 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età	»	XLV
§ 8. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini	»	LII
§ 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile	»	LIV

CAPO III. — Mortalità nei Comuni urbani più importanti.

§ 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, durante il periodo 1881-1911	»	LVIII
§ 2. — Mortalità nelle Città più popolate durante l'anno 1911	»	LXIV

CAPO IV. — Notizie particolari sulle morti violente.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1911	»	LXIX
§ 2. — Morti per causa violenta accidentale negli anni 1909-1911 classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento, e distribuiti per compartimenti	»	LXX
§ 3. — Morti per omicidio negli anni 1909-1911 classificati secondo il sesso e il mezzo d'uccisione	»	LXXV
§ 4. — Morti per suicidio negli anni 1909-1911 classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione, e distribuiti per compartimenti	»	LXXV

APPENDICE.

Confronti internazionali su alcune cause delle morti avvenute in ciascun anno dal 1901 al 1911 in alcuni Stati europei	»	LXXXII
Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte	»	XCIV

TAVOLE.

TAV.	I. — Morti classificati secondo 168 cause di morte:	Pag.
	A. — Per provincie.	2
	B. — Per compartimenti e per il complesso del Regno.	» 32
»	II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1911, classificati per sesso e per le principali cause di morte.	» 42
»	III. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e per le principali cause di morte	» 44
»	IV. — Maschi morti in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per professioni e per le principali cause di morte	» 52
»	V. — Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario e in altri 83 Comuni, classificati secondo le principali cause di morte	» 56
»	VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno in età di non oltre 5 anni compiuti, classificati per sesso e per le principali cause di morte	» 76
»	VII. — Morti per cause violente accidentali classificati secondo il sesso, l'età e la causa della morte	» 77
»	VIII. — Morti per cause violente accidentali classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la causa della morte.	» 78
»	IX. — Maschi morti per cause violente accidentali, in età di oltre 15 anni compiuti, classificati secondo la condizione o professione e secondo la causa della morte	» 80
»	X. — Suicidi classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti	» 82
»	XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età	» 83
»	XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione.	» 84
»	XIII. — Suicidi in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per sesso e secondo la condizione o professione	» 85

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1911

INTRODUZIONE

CAPO I.

AVVERTENZE PRELIMINARI.

§ 1. — Metodo e fonti.

La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto; col principio del 1887 essa venne estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questa statistica si fa per mezzo di una scheda nominativa per ciascun defunto, nella quale è dichiarata la malattia o l'accidente che causò la morte, con attestazione firmata dal medico curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che l'ha dato il permesso di seppellimento; per bambini morti poco dopo il parto si accettano anche le dichiarazioni fatte dalle levatrici.

Le schede si spediscono dai Sindaci dei singoli Comuni all'Ufficio centrale di Statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna dichiarazione sulla causa della morte con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita. Non mancano, adunque, le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza tecnica, sia in coloro che dichiarano le cause di morte, sia in quelli che ne fanno la classificazione per gli scopi statistici, poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono da documenti originali e non da copie.

I medici hanno sempre concorso volenterosamente a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza; poche, relativamente, sono state le lacune per mancate dichiarazioni, come vedremo in appresso; e queste non furono cagionate quasi mai da rifiuto dei medici a rilasciare il certificato, ma dal fatto che in parecchi Comuni molto appartati, specialmente di montagna, non di rado soccombono persone senza aver ricevuto assistenza sanitaria, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di determinare la malattia che fu causa della morte, in modo che si possa poi classificare sotto una delle voci dell'elenco nosologico adottato.

Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria, è stato fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al Sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia o l'accidente che ne fu la causa, cosicchè la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici (a), ma da un preciso obbligo di legge.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti, delle quali si è potuto accertare la causa, sono distribuite sotto 168 voci, secondo un elenco preparato nel 1881 da apposita Commissione medica, e leggermente ritoccato una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Questi ritocchi consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppate in una rubrica sola, al fine di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, e per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, in omaggio, anche, ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica e dalla Commissione internazionale per l'ordinamento delle statistiche sanitarie.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti per tutte le 168 voci e per ciascuno dei Comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Convien conciliare le ragioni della spesa con quelle della scienza che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo coll'offrire la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni in ciascuna provincia e per il complesso del Regno; limitandoci a dare per ciascun Comune capoluogo di provincia o di circondario, per alcuni più importanti Comuni capiluoghi di distretto e per alcuni altri Comuni più popolosi, le cifre dei morti per talune malattie meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica (b).

In fine della presente Introduzione (pagina xciv) è riportato l'elenco delle malattie secondo il quale sono state fatte le classificazioni.

(a) Vedasi l'art. 3 del Regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 448, sulla polizia mortuaria.

(b) Nelle statistiche per gli anni dal 1894 al 1901 i Comuni non capiluoghi per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti erano quelli che al 1° gennaio 1882 contavano più di 15,000 abitanti. A cominciare dall'anno 1902 furono date a parte le notizie, oltrechè pei Comuni capiluoghi di provincia, di circondario e per alcuni più importanti capiluoghi di distretto, anche pei Comuni che al 10 febbraio 1901 avevano più di 20,000 abitanti e per altri 5, che quantunque nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già stati considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano oltre 15,000, e ciò allo scopo di mantenere, nei limiti del possibile, l'uniformità, e quindi la possibilità dei confronti, fra le statistiche degli anni 1902-1911 e quelle degli anni precedenti.

§ 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell'Introduzione.

La presente statistica si svolge in XIII tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta, come si è detto, di 168 voci.

La seconda dà la classificazione dei morti per il complesso del Regno in ciascun trimestre dell'anno 1911, colla divisione per sesso e per le cause di morte più frequenti o più importanti per lo studio delle condizioni sanitarie.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia delle cause di morte più importanti, nel complesso del Regno.

La quarta dà la classificazione dei maschi morti nel Regno in età di oltre 15 anni compiuti per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, nei 137 capiluoghi di circondario, in 17 capiluoghi di distretto e in altri 66 Comuni.

La sesta classifica, secondo le principali cause di morte, i bambini illegittimi e gli esposti morti nel Regno in età non superiore a 5 anni compiuti.

Le rimanenti tavole danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

In questa Introduzione sono riassunti e illustrati i dati esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1911 sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendosi fino al 1887 e, quando era possibile, fino al 1881.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali alla popolazione, calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente.

§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità.

I quozienti di mortalità esposti in questo volume si sono ottenuti dal confronto del numero dei morti colla popolazione presumibilmente presente alla metà di ciascuno degli anni del periodo preso in esame, dedotta dalle popolazioni calcolate al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, poichè essa rappresenta con maggiore esattezza la popolazione media e permette, quindi, di ottenere rapporti più precisi.

Il quinto censimento generale ha accertato che la popolazione presente nel Regno alla mezzanotte tra il 10 e l'11 giugno 1911 era di abitanti 34.671.377.

La popolazione presente alla metà dell'anno 1911 è stata calcolata con lo stesso metodo adottato nelle statistiche degli anni precedenti, a partire dal 1905; e cioè: alle cifre della popolazione presente rilevate con il censimento suddetto

in ciascuna provincia si è aggiunto il numero dei nati nei venti giorni corsi dalla data del censimento a tutto il 30 giugno 1911 e quello degli individui che, nei giorni stessi, trasferirono nella provincia la propria dimora, venendo da altre parti del Regno o dall'estero; e si è poi sottratto il numero dei morti e quello degli individui che, nel detto periodo, fissarono la loro dimora in altre parti del Regno od all'estero.

Con lo stesso procedimento si è calcolata la popolazione in ciascuna provincia e nel Regno alla fine dell'anno 1911, partendo sempre dalla popolazione censita al 10 giugno 1911 e tenendo conto, naturalmente, del doppio movimento, riproduttivo e dislocativo, avvenuto dall'11 giugno al 31 dicembre 1911.

Le notizie intorno a questi movimenti naturali e sociali della popolazione si ricavano dai *registri comunali* di popolazione.

Per disposizione del R. decreto in data 21 settembre 1901, N. 445, in modificazione del R. decreto 4 aprile 1873, N. 1363, serie II, ogni Comune deve tenere un registro della *popolazione stabile*, cioè di quella che vi ha dimora abituale, nel quale si notano le variazioni che avvengono in essa per fatto di nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni. A ciascun Comune si è chiesta notizia delle variazioni avvenute nel numero degli abitanti *residenti*, soltanto per effetto di immigrazioni e di emigrazioni in rapporto con altri Comuni del Regno e coll'estero, non essendosi ritenuto conveniente di richiedere le analoghe notizie dipendenti dal movimento delle nascite e delle morti, perchè questo movimento risulta certamente con maggiore esattezza dai registri degli atti dello stato civile, dai quali si è preferito ricavare le notizie.

Le due fonti di notizie anzidette hanno fornito i dati seguenti:

Movimento della popolazione avvenuto nel Regno durante l'anno 1911 e nei due periodi dall' 11 al 30 giugno e dall' 11 giugno al 31 dicembre dello stesso anno.

PROSPETTO N. ■.

	NATI vivi	MORTI	INSCRITTI nei registri comunali di popolazione perchè immigrati		CANCELLATI dai registri comunali di popolazione perchè emigrati	
			da altri Comuni del Regno	dall'estero	per altri Comuni del Regno	per l'estero
REGNO { Anno 1911	1 093 545	742 811	683 839	79 036	670 963	140 713
{ Dall' 11 al 30 giugno 1911 (a)	55 931	36 945	22 748	2 509	19 061	4 058
{ Dall' 11 giugno al 31 dicembre 1911 (a)	576 243	401 257	364 668	42 027	354 543	74 415

Secondo le disposizioni vigenti devono essere iscritti nel registro della popolazione stabile di ciascun Comune, come provenienti da altri Comuni del Regno, gli individui isolati e le famiglie che vengono a fissare nel Comune la loro dimora abituale, lasciando quella che avevano in altri Comuni del Regno; contemporaneamente

(a) Con le cifre sopra indicate relative ai due periodi, dall' 11 al 30 giugno e dall' 11 giugno al 31 dicembre 1911, si è calcolata la popolazione presente nel Regno alla metà e alla fine del detto anno.

essi dovrebbero essere cancellati dai registri dei Comuni di loro precedente dimora. Adunque, a un totale di 683,839 nuove iscrizioni fatte nell'intero anno 1911, avrebbero dovuto corrispondere altrettante cancellazioni, ma queste ultime si effettuarono solamente per 670,963 individui, e cioè, per ogni 100 nuove iscrizioni si ebbero 98 cancellazioni. La lieve differenza fra le due cifre dipende da qualche irregolarità nella tenuta dei registri comunali.

Gli Uffici municipali, infatti, possono più facilmente aver notizia delle persone le quali vengono a fissare la loro dimora nell'ambito del rispettivo territorio (poichè esse, per molteplici esigenze amministrative e fiscali o per richieste di pubblica assistenza, devono dare contezza di sè e delle loro famiglie alle Amministrazioni locali), che non essere informati di quelle che partono senza darne alcun avviso; donde un maggior numero di iscrizioni di fronte al numero delle cancellazioni.

Questo difetto nella cancellazione degli emigrati non vizia, peraltro, il calcolo dei movimenti di migrazione interna permanente che si faccia per l'insieme del Regno, potendosi esso basare sul solo numero delle nuove iscrizioni, che è certamente più esatto; ma volendo stabilire un bilancio per provincie e per compartimenti, tra gli aumenti e le diminuzioni dipendenti da questi scambi reciproci, occorre integrare le cifre delle emigrazioni per farle coincidere, nel loro complesso, con quelle delle immigrazioni.

Per fare questa integrazione si è supposto che la deficienza riscontrata nelle cifre riguardanti l'intero Regno, si sia verificata in uguale proporzione in tutti i Comuni d'ogni provincia. In altri termini, si sono aumentate le cifre dei cancellati nell'anno 1911 per emigrazione in altri Comuni del Regno, risultanti dai registri anagrafici per ciascuna provincia, dell'1,919 per cento, cioè del quoziente che rappresenta le cancellazioni non effettuate in corrispondenza alle nuove iscrizioni.

Per ciò che riguarda i movimenti migratorii coll'estero, nei registri anagrafici non si prende nota di tutti gli emigrati, nè di tutti i rimpatriati; ma si cancellano soltanto quelli per i quali l'Ufficio municipale o ha ricevuto l'esplicita dichiarazione di trasferire all'estero la dimora abituale, o ha fondati motivi di ritenere che intendano di espatriare a tempo indeterminato, e si inscrivono come immigrati dall'estero coloro che dopo essere stati cancellati in anni precedenti ritornano in patria, come pure gli individui italiani e stranieri venuti per la prima volta dall'estero in Italia a fissarvi la propria dimora.

Non si può assicurare che le cifre degli immigrati e degli emigrati in rapporto coll'estero, desunte dai registri anagrafici, rappresentino esattamente questo movimento dislocativo, in considerazione, anche, che nel 1911, essendosi eseguito il censimento, alcuni Comuni riversarono sul movimento migratorio di detto anno gli aumenti o le diminuzioni risultanti dal raffronto della popolazione censita con quella calcolata nel loro registro di popolazione, di guisa che le cifre da essi fornite non rappresentano il movimento dislocativo proprio dell'anno 1911; ciò non di meno il procedimento che abbiamo esposto per il calcolo della popolazione, adottato fin dal 1905, dà una approssimazione maggiore alla realtà di quella che si poteva ottenere col metodo seguito prima di quell'anno.

Con queste norme è stata calcolata la popolazione media dell'anno 1911 in ciascuna provincia (prospetto n. 2), risultante dalla semisomma di quelle calcolate pel 1° gennaio e pel 31 dicembre dello stesso anno.

Alla metà del 1911 la popolazione nel Regno, calcolata col metodo sopra esposto, è risultata di 34,688,814 abitanti; ed in quattro provincie, e cioè, in quelle di Caserta, Napoli, Salerno e Palermo, la popolazione risultò minore di quella censita al 10 giugno 1911; e tale diminuzione, oltrechè alle cause sopra esposte, si deve attribuire anche alle epidemie di *colera asiatico* e di *vaiuolo*, che, nel mese di giugno 1911, furono causa di numerose morti nelle dette provincie.

E' da avvertire che il calcolo fatto col procedimento indicato dava, alla data del 10 giugno 1911, in 25 provincie una popolazione *inferiore* ed in 44 una popolazione *superiore* a quella risultata dal censimento generale eseguito in quello stesso giorno; con una differenza complessiva, per il Regno, di 423,127 abitanti in più della popolazione censita. Il notevole divario trova la sua spiegazione, principalmente, nelle grandi difficoltà, di cui già si è parlato, che incontrano i Comuni per tenere esatto conto del movimento dislocativo della popolazione; e non è neppure da escludere che ad aggravarlo, in qualche caso, vi abbia anche contribuito la imperfetta esecuzione degli stessi censimenti generali, presi rispettivamente a base e a riconferma del calcolo; senza dire che una qualche differenza fra i risultati delle due indagini è pur giustificata dal fatto che nel calcolo stesso si prescindono dalle modificazioni che avvengono, da un censimento all'altro, nelle cifre della popolazione occasionale o di passaggio. Per togliere queste discordanze, in base ai risultati del censimento al 10 giugno 1911, si sono rettificate le cifre della popolazione già calcolata in ogni provincia alla metà di ciascuno degli anni interceduti fra il quarto ed il quinto censimento (a). Le correzioni di queste cifre sono state fatte ammettendo la doppia ipotesi che le differenze riscontrate siano unicamente dovute alla imperfetta rilevazione, da parte dei Comuni, del movimento annuo della popolazione per immigrazioni ed emigrazioni, nei riguardi con l'estero e con gli altri Comuni del Regno; e che le differenze stesse siansi venute producendo d'anno in anno, per ogni provincia, proporzionalmente alla entità numerica del rispettivo movimento dislocativo suaccennato. Cosicchè, per quelle provincie per le quali il calcolo aveva dato una *eccedenza* di popolazione rispetto al censimento, sono stati, proporzionalmente a quel movimento, attenuati gli aumenti od aggravate le diminuzioni di popolazione risultati dal calcolo per ciascun anno del periodo considerato; e per quelle provincie per le quali il calcolo aveva dato una *deficienza* di popolazione sono stati invece aggravati gli aumenti od attenuate le diminuzioni. La popolazione poi di ogni provincia al 1° gennaio dei singoli anni del periodo è stata ricalcolata in base alle cifre degli aumenti o delle diminuzioni in tal modo rettificate, e facendo la semisomma delle cifre della popolazione calcolata per il principio e per la fine dei singoli anni si sono determinate quelle della popolazione presumibilmente presente alla *metà* degli anni stessi.

Con procedimento analogo si è calcolata la popolazione presente in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, la quale, alla metà dell'anno 1911, è risultata di 6,445,458 abitanti, per il complesso dei medesimi.

Si è ommesso di fare un calcolo analogo per ciascuno dei 137 capiluoghi di circon-

(a) Per tali rettifiche, le cifre della popolazione ed i quozienti di mortalità dati in questo volume, per gli anni dal 1901 al 1910, differiscono leggermente da quelli pubblicati nelle statistiche riguardanti i suddetti anni.

dario, dei 17 principali capiluoghi di distretto e dei 61 Comuni non capiluoghi che contavano più di 20,000 abitanti, per i quali si danno separatamente alcune principali notizie in questo volume, perchè il modo imperfetto col quale sono registrate le migrazioni fra Comune e Comune, rende questo calcolo tanto meno sicuro quanto più è piccola la circoscrizione territoriale alla quale lo si deve applicare.

Invece, per il complesso di tali Comuni, si è calcolata la loro popolazione alla metà dell'anno 1911 partendo dall'ipotesi che in essi la popolazione, dopo il 10 giugno 1911, sia cresciuta nel medesimo rapporto aritmetico col quale crebbe fra i due ultimi censimenti.

Secondo il censimento del 10 giugno 1911, la popolazione nei 137 Comuni capiluoghi di circondario risultò di 2,534,577 abitanti e quella per l'insieme dei 17 principali capiluoghi di distretto e dei 61 grossi Comuni non capiluoghi di 2,040,870. Confrontando tali popolazioni con le corrispondenti censite al 10 febbraio 1901, si è ricavato l'aumento complessivo avvenuto nell'intervallo in questi gruppi di Comuni, e quindi l'aumento medio annuale, nella supposizione che questo aumento fosse avvenuto in proporzione aritmetica, e che esso avesse continuato a verificarsi anche dopo il 10 giugno 1911.

Calcolata in tal modo, la popolazione alla metà dell'anno 1911 è risultata di 2,535,500 per i 137 Comuni capiluoghi di circondario, e di 2,041,674 per l'insieme dei 17 principali capiluoghi di distretto e dei 61 grossi Comuni non capiluoghi.

Nel prospetto N. 2 è indicata la popolazione di ciascuna Provincia e di ciascun Comune capoluogo di provincia alla metà dell'anno 1911, e nel prospetto N. 3 è data la popolazione del Regno e quella dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, presi insieme, alla metà di ciascuno degli anni corsi dal 1887 al 1911.

**Popolazione presente in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia,
calcolata alla metà dell'anno 1911 (a).**

ROSPELTO N. 2.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE calcolata alla metà dell'anno 1911		PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE calcolata alla metà dell'anno 1911	
	delle Province e dei Compartimenti	dei Comuni capoluoghi di provincia		delle Province e dei Compartimenti	dei Comuni capoluoghi di provincia
Alessandria	807 823	75 703	Ancona	320 031	63 261
Cuneo	647 132	27 501	Ascoli Piceno	253 727	30 629
Novara	756 438	54 643	Macerata	258 604	22 963
Torino	1 214 292	427 516	Pesaro e Urbino	261 576	27 355
PIEMONTE	3 425 675	583 368	MARCHE	1 093 938	144 208
Genova	1 050 947	272 522	Perugia - UMBRIA	686 980	65 812
Porto Maurizio	147 215	7 853	Roma - LAZIO	1 303 231	542 764
LIGURIA	1 198 162	280 380	Aquila degli Abruzzi	407 529	21 945
Bergamo	511 546	55 274	Campobasso	349 726	14 381
Brescia	596 887	83 356	Chieti	366 823	25 536
Como	616 533	44 107	Teramo	307 729	24 323
Cremona	318 934	40 471	ABRUZZI E MOLISE	1 431 812	86 185
Mantova	349 232	32 694	Avellino	396 656	23 732
Milano	1 728 145	600 198	Benevento	254 865	24 342
Pavia	512 545	39 502	Caserta	791 261	33 157
Sondrio	130 063	9 124	Napoli	1 309 438	677 581
LOMBARDIA	4 793 935	904 126	Salerno	558 179	45 683
Belluno	192 837	20 693	CAMPANIA	3 310 399	804 495
Padova	519 874	96 363	Bari delle Puglie	891 747	103 702
Rovigo	258 001	12 229	Foggia	467 307	76 730
Treviso	491 724	41 016	Lecce	771 857	36 226
Udine	628 566	47 646	PUGLIA	2 130 921	216 658
Venezia	467 404	160 869	Potenza - BASILICATA	474 251	16 688
Verona	475 478	82 027	Catanzaro	483 590	34 357
Vicenza	496 775	54 387	Cosenza	474 236	24 208
VENETO	3 530 659	515 460	Reggio di Calabria	445 409	43 179
Bologna	578 221	173 190	CALABRIE	1 403 235	101 744
Ferrara	303 183	95 274	Caltanissetta	342 744	41 325
Forlì	301 587	46 069	Catania	789 751	210 866
Modena	353 271	70 986	Girgenti	394 069	26 820
Parma	326 508	51 973	Messina	517 483	(b) 126 557
Piacenza	256 410	38 499	Palermo	795 287	310 591
Ravenna	248 523	71 619	Siracusa	476 919	40 895
Reggio nell'Emilia	310 564	70 470	Trapani	357 218	59 563
EMILIA	2 633 270	618 080	SICILIA	3 673 471	846 617
Arezzo	283 639	47 569	Cagliari	520 441	60 115
Firenze	999 886	233 266	Sassari	332 471	43 145
Grosseto	146 776	12 458	SARDEGNA	852 912	103 260
Livorno	135 811	105 336	Regno	34 688 814	6 445 458
Lucca	333 264	76 191			
Massa e Carrara	212 528	30 843			
Pisa	342 454	65 310			
Siena	241 555	41 640			
TOSCANA	2 695 963	612 613			

(a) Per il metodo seguito nel calcolare la popolazione delle singole Provincie e dei 69 Comuni capoluoghi, veggansi le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I (pag. V e seg.).

(b) Il Comune di Messina non ha potuto fornire i dati sul movimento migratorio durante l'anno 1911, non essendo stato ancora ricostituito in esso l'ufficio d'anagrafe distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908; e quindi, per tale Comune, si è mantenuta invariata la popolazione censita al 10 giugno 1911.

CAPO II.

MORTALITÀ NEL REGNO E NELLE SINGOLE PROVINCE.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1911 e confronto cogli anni precedenti.

Durante l'anno 1911 morirono nel Regno 742,811 individui, esclusi i bambini nati-morti, ma compresi quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto, qualunque morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile: vi figurano, ad esempio, 731 bambini morti per asfissia o apoplezia nel parto, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

Confrontando le cifre dei morti con quelle della popolazione presente o di fatto, calcolata alla metà dello stesso anno 1911, si trova un quoziente di 21.41 morti ogni 1000 abitanti, mentre nel 1910 il quoziente fu di 19.85. Si è avuto, dunque, nell'anno 1911 un aumento nel quoziente di mortalità rispetto all'anno precedente, dovuto, in parte, alle epidemie di *colera asiatico* e di *vaiuolo* che furono causa di numerose morti nel nostro paese in quell'anno. Ma, ad ogni modo, la mortalità italiana è scemata di circa un terzo nello spazio di mezzo secolo (31.06 per ogni mille abitanti nell'anno 1862, contro 21.41 nel 1911).

Nei 69 Comuni capiluoghi di provincia morirono, durante l'anno 1911, 147,710 individui, ciò che dà un quoziente di mortalità di 22.92 ogni 1000 abitanti.

Diamo nel prospetto seguente il numero dei morti nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, durante gli anni corsi dal 1887 al 1911.

Numero dei morti nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia durante gli anni 1887-1911.

PROSPETTO N. 3.

ANNI	REGNO			CAPILUOGHI DI PROVINCIA (69 Comuni)		
	Popolazione calcolata alla metà di ciascun anno	Morti		Popolazione calcolata alla metà di ciascun anno	Morti	
		cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)		cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)
1887	29 614 430	828 992	27.99	4 835 074	140 275	29.01
1888	29 825 022	820 431	27.51	4 892 157	139 566	28.53
1889	30 035 038	768 068	25.57	4 949 084	130 600	26.39
1890	30 245 054	795 911	26.32	5 006 011	138 504	27.67
1891	30 455 070	795 327	26.11	5 062 938	139 629	27.58
1892	30 665 662	802 779	26.18	5 120 021	138 259	27.00
1893	30 875 678	776 713	25.16	5 176 948	136 759	26.42
1894	31 085 694	776 372	24.98	5 233 875	131 030	25.03
1895	31 295 710	783 813	25.05	5 290 802	134 987	25.51
1896	31 506 302	758 129	24.06	5 347 885	129 789	24.27
1897	31 716 318	695 602	21.93	5 404 812	120 710	22.33
1898	31 926 334	732 265	22.94	5 461 739	128 167	23.47
1899	32 136 350	703 393	21.89	5 518 666	126 147	22.86
1900	32 346 366	768 917	23.77	5 575 594	134 547	24.13
1901	32 533 337	715 036	21.98	5 643 615	128 814	22.82
1902	32 699 510	727 181	22.24	5 723 711	129 683	22.66
1903	32 839 509	736 311	22.42	5 809 185	130 549	22.47
1904	33 016 234	698 604	21.16	5 906 984	127 517	21.59
1905	33 193 289	730 340	22.00	5 993 627	137 515	22.94
1906	33 325 098	696 875	20.91	6 079 236	131 728	21.67
1907	33 514 702	700 333	20.90	6 164 710	134 631	21.84
1908	33 826 688	(b) 770 054	(c) 22.76	6 250 418	(d) 200 837	(e) 32.13
1909	34 077 068	738 460	21.67	6 267 609	143 653	22.92
1910	34 376 610	682 459	19.85	6 353 083	131 466	20.69
1911	34 688 814	742 811	21.41	6 445 458	147 710	22.92

(a) Per gli anni dal 1901 al 1910 si sono modificate le cifre della popolazione nel Regno e nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, in base ai risultati del censimento del 10 giugno 1911, e perciò i quozienti di mortalità dati in questo prospetto e nei seguenti per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.

(b) Compresa le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) Il quoziente di mortalità nel Regno durante l'anno 1908, fatta astrazione dalle vittime del terremoto, sarebbe stato di 20.48 per ogni mille abitanti.

(d) Compresa le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 68,283.

(e) Il quoziente di mortalità nel complesso dei 69 Comuni capiluoghi di provincia nell'anno 1908, fatta astrazione dalle vittime del terremoto, sarebbe stato di 21.21 per ogni mille abitanti.

La mortalità nei 69 Comuni capiluoghi di provincia apparisce, in tutti gli anni del periodo 1887-1911, alquanto più alta che nel complesso di tutti i Comuni, e a ciò contribuisce essenzialmente il fatto che i maggiori centri di popolazione sono sede di ospedali o di altri luoghi di cura o di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei Comuni rurali finitimi.

Le cause delle morti avvenute nel 1911 furono specificate dai medici curanti o necroscopi, per 739,185 casi e restarono ignote per 3,626, cioè in 5 casi su 1000, dipendenti in gran parte da che il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, o dal fatto che la causa di morte non era stata designata con precisione sufficiente per poterla classificare in una delle voci dell'elenco.

Confrontando le morti delle quali restò ignota la causa col totale delle morti avvenute nell'anno 1911 in ciascun compartimento, si forma il prospetto seguente, da cui si rileva che il numero delle prime è venuto scemando dal 1887 in poi.

Numero delle morti delle quali non si potè determinare la causa, in ciascun compartimento e nel Regno, negli anni 1887-1911.

PROSPETTO N. 4.

COMPARTIMENTI	TOTALE dei morti nell'anno 1911	MORTI PER CAUSA IGNOTA O NON DICHIARATA															
		Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 morti														
			Anni										Trienni				
			1911	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1899-1901	1896-98	1893-95	1890-92
Piemonte	63 308	655	10	9	7	10	9	13	15	19	21	22	27	29	47	76	72
Liguria	22 508	63	3	2	2	3	4	3	5	6	5	4	6	10	13	18	15
Lombardia	106 612	146	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	6	7	8
Veneto	68 931	146	2	4	4	4	4	3	5	6	6	6	6	9	11	15	11
Emilia	52 575	164	3	4	3	4	4	4	4	6	7	7	6	8	8	11	10
Toscana	51 259	58	1	1	2	2	2	1	2	4	3	3	2	4	5	10	12
Marche	21 660	83	4	3	2	4	6	6	11	9	10	9	11	14	13	18	17
Umbria	13 258	26	2	1	2	1	1	1	3	3	2	3	3	6	9	13	12
Lazio	26 059	46	2	3	3	5	7	7	8	9	9	11	10	9	14	11	13
Abruzzi e Molise	31 754	333	10	12	10	10	7	10	16	20	20	17	22	27	34	39	37
Campania	88 438	515	6	3	2	3	4	4	8	9	12	10	7	7	11	11	15
Puglie	51 250	116	2	4	2	2	6	4	6	6	7	9	7	7	7	10	8
Basilicata	11 585	111	10	7	8	10	10	14	22	31	29	20	20	26	23	43	32
Calabria	30 264	241	8	14	13	9	15	16	22	35	37	43	39	46	61	70	55
Sicilia	85 143	309	4	4	27	9	4	6	8	10	10	8	11	20	27	31	23
Sardegna	18 207	614	34	33	44	38	40	46	59	63	97	96	116	121	142	137	103
REGNO	742 811	3 626	5	5	7	6	6	6	9	11	12	12	13	16	22	28	25

I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non potè determinarsi la causa del decesso, sono più frequenti che altrove in Sardegna e nelle regioni montuose del Piemonte e degli Abruzzi, o in quelle con popolazione poco densa, come la Basilicata e le Calabrie, dove parecchi piccoli centri sono tuttora privi di sanitario, o distano molto dal luogo dove questo risiede.

§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1887-1911.

Nel prospetto seguente sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1911, classificate secondo le malattie che le causarono.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

dal 1887 al 1911, classificate secondo le cause.

NUMERO dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	TRIENNI			ANNI									NUMERO dell'Elenco nosologico									
		1887-89	1890-92	1893-95	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904		1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911		
		(Somma delle cifre dei tre anni)																					
					A) Cifre																		
1	Asfissia ed apoplezia nel parto	9 600	6 481	5 958	1 213	1 101	1 000	1 031	1 007	848	864	679	811	976	711	759	833	734	799	731	1		
2 a 5	Vizi congeniti	9 656	6 060	6 523	1 486	1 572	1 537	1 435	1 353	1 298	1 324	1 354	1 388	1 716	1 777	1 909	1 907	1 871	1 806	1 765	2 a 5		
6	Atrofia congenita, immaturità	158 180	162 087	166 759	50 457	46 690	46 869	45 948	49 409	50 454	50 684	47 057	46 345	45 293	41 441	42 049	43 307	43 632	40 331	39 279	6		
7	Valuolo	47 775	11 380	8 242	2 033	1 003	420	214	316	3 396	2 413	6 049	3 093	482	169	451	559	758	413	4 828	7		
8	Morbillo	58 529	46 346	33 276	11 499	6 156	5 429	7 433	8 827	5 562	9 961	7 283	5 332	6 738	9 726	8 184	11 740	11 043	9 897	8 573	8		
9	Scarlattina	30 125	22 528	14 921	3 234	3 907	4 492	4 487	1 483	1 185	1 338	1 991	1 611	1 689	2 724	2 940	3 464	2 703	2 903	2 515	9		
10	Risipola	14 330	11 420	11 250	3 197	2 779	2 939	2 983	2 633	2 568	2 609	3 149	2 885	2 479	2 534	2 581	2 904	2 862	2 342	2 008	10		
11	Febbre tifoidea	69 206	54 944	44 294	16 397	15 557	17 412	14 963	15 060	11 748	11 358	11 671	12 239	10 896	9 424	8 614	9 287	9 741	8 948	9 537	11		
12	Tifo petecchiale		234	112	50	25	8	1	2	17	3	2	9	38	35	39	25	39	32	24	12		
13	Meningite cerebro spinale epidemica	590	81	3 452	409	216	31	74	21	5	9	3	80	238	91	92	16	12	2	2	13		
14 e 15	Difterite e laringite crupale	73 804	48 440	44 834	9 286	8 881	7 803	6 893	5 790	5 444	4 514	4 064	4 519	4 255	4 253	5 634	5 921	5 781	4 828	3 682	14 e 15		
16	Ipertosse	31 048	29 667	23 786	6 660	7 938	7 420	7 886	6 565	6 916	7 202	6 521	5 958	5 767	6 165	6 142	5 545	5 218	5 416	6 833	16		
17	Infuenza	1 642	32 108	21 151	6 576	3 750	8 765	4 264	17 306	4 079	3 821	7 132	3 794	6 870	4 309	8 043	4 450	5 719	2 780	5 660	17		
18	Febbri da malaria							8 605	12 815	10 552	7 319	6 414	6 357	5 696	3 782	3 251	2 714	2 760	2 870	3 537	18		
19	Cachessia palustre	53 214	49 407	47 051	14 023	11 947	11 378	2 206	3 050	3 006	2 589	2 103	2 106	2 149	1 089	980	764	773	751	883	19		
20	Dissenteria	17 097	2 304	384	717	230	154	131	62	66	52	34	14	197	15	6	4	1	13	5	20		
21	Colera asiatico	8 150		3 060																805	21		
22	Siflide	5 884	6 542	7 056	2 307	2 205	2 247	2 354	2 117	1 965	2 009	1 919	1 849	1 986	1 814	1 757	1 692	1 553	1 730	1 861	22		
23	Setticemia, piemia	6 414	3 185	3 681	1 116	1 146	1 292	1 263	1 526	1 605	1 653	1 807	1 921	1 550	1 684	1 946	2 522	2 597	2 713	3 080	23		
24	Pustola maligna, carbonchio	1 939	1 821	1 854	453	460	433	461	330	341	403	396	355	306	305	314	355	322	260	235	24		
25	Moccio, cimurro	48	23	19	6	2	7	4	2		3	2	3	2	2	1		2	3	4	25		
26	Lebbra	47	12	16	17	21	27	14	11	6	5	11	12	12	10	10	9	14	20	19	26		
27	Rabbia	327	255	229	71	102	66	80	63	55	56	58	45	47	60	56	71	50	65	52	27		
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate.	83	4 537	4 935	205	90	31	26	10	(b) 34	7	11	26	234	1 068	139	86	51	29	42	28		
29	Tubercolosi disseminata	27 532	26 519	26 999	7 767	7 690	7 787	4 729	2 339	2 300	2 636	3 662	3 666	5 979	6 840	6 172	5 747	5 602	5 092	5 490	29		
31	Tubercolosi polmonare, tisi	95 770	98 893	93 174	33 302	30 980	30 548	85 078	39 394	36 212	33 086	33 262	35 486	34 370	34 059	35 796	35 840	36 496	35 359	36 791	31		
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	16 718	17 310	16 281	4 861	4 453	4 535	5 898	5 920	5 751	5 515	5 471	5 465	5 683	5 679	5 864	5 971	6 010	5 898	6 720	30		
32	Tabes mesenterica	37 774	33 252	31 230	10 351	9 263	9 124	8 780	9 155	8 117	7 858	7 251	7 291	7 277	6 187	5 865	5 502	5 684	5 609	6 965	32		
33	Scrofola disseminata	8 991	7 544	6 029	1 908	1 795	1 571	1 425	1 384	1 248	1 116	1 122	1 039	1 122	1 052	989	826	884	773	894	33		
34	Lupo	224	299	259	106	100	85	118	128	102	96	115	106	101	101	125	108	91	85	88	34		

(a) Per maggiori chiarimenti vedasi l'elenco più particolareggiato dato a pagina xciv.
 (b) Compresi 6 morti per *peste bubbonica*

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1911, classificate secondo le cause.

Segue PROSPETTO N. 5.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI			ANNI																dell' Elenco nosologico
		1887-89	1890-92	1893-95	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	
		(Somma delle cifre dei tre anni)																			
<i>Segue A) Cifre assolute.</i>																					
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott.	(a) 3 506	(a) 3 471	(a) 4 024	1 911	1 910	2 076	2 110	1 967	2 032	2 086	2 155	2 194	2 480	2 402	2 514	2 543	2 615	2 521	2 816	35, 36 e 37
38	Rachitide.	8 610	9 344	8 071	3 159	3 153	2 803	3 231	3 539	3 275	3 231	3 305	2 944	3 370	2 817	2 739	2 546	2 733	2 631	3 454	38
39 e 40	Anemia e leucemia.	29 561	24 989	23 332	9 737	9 475	9 547	9 376	9 795	9 364	9 783	10 138	8 911	9 315	14 651	11 346	9 073	9 645	9 027	13 266	39 e 40
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia.	1 603	1 523	1 472	503	411	439	476	508	433	459	480	476	591	547	517	597	584	552	570	41 e 42
43	Scorbuto.	1 445	1 315	1 023	360	236	299	260	265	205	226	214	180	217	193	164	129	159	138	207	43
44	Marasmo senile.	86 127	97 232	106 449	37 656	36 557	41 595	41 870	47 760	46 367	46 398	46 779	43 942	47 583	45 953	48 601	46 502	51 533	48 118	54 183	44
45	Pellagra.	10 284	12 286	9 549	3 076	2 807	3 987	3 836	3 788	3 054	2 376	2 647	2 363	2 357	2 024	1 635	1 334	1 420	1 312	1 222	45
46	Gotta.	670	364	395	153	164	144	146	133	129	127	124	126	132	185	186	218	219	190	199	46
47	Diabete.	1 595	2 109	2 175	833	832	894	1 026	1 082	1 071	1 154	1 139	1 242	1 322	1 394	1 535	1 503	1 551	1 608	1 714	47
48 a 58	Tumori maligni.	38 179	39 080	42 161	15 482	15 967	16 330	16 680	16 873	17 141	17 634	17 774	18 860	19 348	20 053	20 068	21 828	21 871	22 555	23 172	48 a 58
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	43 621	42 931	49 705	16 602	15 235	15 443	13 892	14 407	13 676	13 923	14 655	14 049	13 026	13 057	11 734	11 792	12 476	11 958	13 184	59
60	Mielite, tabe dorsale.	12 050	14 632	14 028	3 681	3 156	3 049	2 820	2 874	2 646	2 698	2 734	2 616	2 773	2 427	2 529	2 279	2 610	2 328	2 621	60
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson.							218	150	127	107	165	203	234	322	362	393	433	380	437	61
64	Apoplessia e congestione cerebrale.							31 440	32 166	32 711	32 563	33 775	32 991	34 263	33 112	33 270	34 658	36 686	35 964	37 321	64
62	Paralisi infantile.	97 527	93 315	93 652	30 639	29 082	29 790	199	280	243	268	200	228	293	322	330	341	333	364	344	62
66	Rammollimento cerebrale.							707	732	834	766	822	841	1 031	836	877	791	949	861	931	66
65	Tumori cerebrali e spinali (b).							390	415	429	437	473	423	532	515	525	152	199	65	84	65
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica.	4 439	6 165	6 180	3 923	4 570	4 928	3 548	3 196	2 834	2 801	2 934	3 135	4 215	4 304	4 440	4 392	4 898	4 735	4 982	67
73	Successioni della pazzia.							71	64	153	130	194	317	1 024	183	178	211	220	101	83	73
63	Encefalite.	7 249	5 080	3 764	1 408	1 164	1 085	1 066	1 208	1 077	1 014	1 079	1 029	1 250	1 186	969	1 085	1 045	1 134	1 174	63
68 e 69	Epilessia ed isterismo.	6 359	6 547	6 000	1 884	1 780	1 734	1 554	1 816	1 928	1 911	1 832	1 878	1 894	1 700	1 767	1 864	1 961	1 819	2 006	68 e 69
70	Corea.	329	292	280	93	75	76	104	76	92	89	105	92	108	72	97	85	102	94	101	70
71	Tetano e trisma.	2 576	2 004	2 439	800	767	757	728	702	639	615	535	646	699	750	548	524	589	487	528	71
72	Eclampsia infantile.	71 022	66 066	60 883	19 716	18 511	17 782	16 817	17 754	16 483	17 004	15 847	15 423	16 191	14 960	14 714	14 611	15 114	14 397	17 675	72
74	Malattie degli occhi (b).	144	276	1 437	540	535	548	123	55	25	43	30	47	45	30	34	33	28	19	28	74
75	Malattie degli orecchi (b).	777	1 291					344	402	376	335	368	355	495	446	489	522	499	397	479	75
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea e della laringe (b).	7 654	11 589	8 563	1 855	1 794	1 730	1 928	1 889	1 901	1 876	1 853	1 908	1 903	1 298	860	1 270	1 384	977	911	76
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c).	198 653	233 550	227 912	72 646	62 362	64 733	51 537	53 029	53 652	56 910	53 721	49 112	46 556	46 998	47 869	42 003	45 154	41 536	49 731	77 e 78
								7 047	8 275	8 555	7 587	8 687	8 289	10 066	7 611	7 933	7 704	8 341	7 504	9 076	

(a) Queste cifre, per gli anni dal 1887 al 1894, si riferiscono alla sola *sinovite fungosa* e non comprendono i morti per *tubercolosi delle ossa*,
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Per gli anni 1899-1911 la voce: « *bronchite acuta e cronica* » comprende due numeri: nel primo si sono classificati i morti per *bronchite acuta*, nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

che, negli anni anteriori al 1895, si sommano con quelli per malattie delle ossa in genere.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

dal 1887 al 1911, classificate secondo le cause.

Segue Prospetto N. 5.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI			1896	1897	1898
		1887-89 (Somma delle cifre dei tre anni)	1890-92	1893-95			
<i>Segue A) Cifre</i>							
79	Malattie della pleura (a)	14 392	12 938	11 189	3 421	2 988	3 097
80	Congestione ed apoplessia polmonare	7 912	5 220	2 932	379	263	376
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (b)	209 790	225 378	235 135	78 508	67 417	73 412
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	15 981	12 554	7 356	1 508	1 293	918
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	349	444	487	173	141	127
85	Morbo di Basedow						
86	Asma, enfisema polmonare	12 129	11 174	8 774	3 223	2 665	2 947
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	12 391	16 300	18 411	5 920	5 990	6 998
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	692	649	671	251	208	241
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	1 559	1 125	743	197	75	47
90, 91 e 93	Malattie del cuore e pericardio, sincope	135 481	144 769	153 358	52 374	49 625	54 233
92	Angina pectoris	1 529	1 614	1 557	503	490	505
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	11 718	10 362	9 321	2 840	2 477	2 492
95	Orecchioni	725	662	621	165	149	149
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	6 549	3 925	3 383	953	912	857
97	Malattie dello stomaco, atresia (a)	19 084	19 069	20 733	7 146	7 482	7 841
98	Ulcera rotonda dello stomaco	1 972	1 700	1 738	560	549	574
99	Epatite, cirrosi epatica	17 944	17 205	16 614	5 504	5 202	5 264
100	Atrofia gialla acuta del fegato	377	359	354	120	112	97
101	Calcoli biliari	322	335	396	117	122	132
102	Ittero	3 026	3 555	3 895	1 377	1 440	1 355
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1 148	632	530	213	115	65
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	279 614	308 056	319 055	103 002	99 622	112 105
105	Volvolo, occlusione intestinale	5 985	5 602	6 124	1 998	2 091	2 214
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (a); idrope ascite	12 871	10 551	8 093	2 243	2 040	2 015
107	Ernie intestinali e addominali	4 766	4 456	4 113	1 392	1 319	1 426
108	Malattie da echinococco	128	129	137	79	63	73
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	14 159	7 579	5 315	1 127	1 533	1 238

A N N I													NUMERO dell' Elenco nosologico	
1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911		
<i>assolute.</i>														
2 979	3 044	2 935	2 965	3 034	2 996	2 874	2 711	2 824	2 839	2 847	2 834	2 986	79	
839	714	664	736	773	716	788	760	728	846	899	800	807	80	
43 846	41 996	43 453	40 481	47 400	37 509	38 812	37 350	41 367	37 294	39 548	32 664	33 993	81 e 82	
28 309	34 105	31 082	33 592	35 742	32 181	34 268	36 286	39 178	37 262	41 544	37 417	45 943		
1 495	1 379	835	667	631	647	628	702	763	639	709	597	611	83	
140	153	115	113	108	113	129	104	115	124	135	153	182	84	
22	35	58	68	61	60	69	75	112	157	103	95	112	85	
3 089	3 393	2 826	2 570	2 891	2 593	3 010	1 777	2 345	2 712	3 071	2 432	2 731	86	
7 183	7 575	7 519	7 681	7 945	8 456	9 765	8 850	10 085	10 880	12 549	11 930	12 681	87	
193	201	178	167	162	143	323	261	308	272	266	198	304	88	
61	26	44	23	34	26	143	151	313	299	259	256	277	89	
54 809	58 778	59 327	58 672	61 599	59 172	62 890	58 362	59 783	61 679	68 034	64 331	67 085	90, 91 e 93	
613	589	580	638	635	666	782	738	764	812	914	916	1 032	92	
2 287	2 374	2 126	2 269	1 971	1 870	1 938	1 781	1 517	1 583	1 580	1 603	1 729	94	
138	126	108	118	142	105	128	110	124	119	107	115	113	95	
1 127	1 097	1 019	976	1 014	903	974	809	842	993	1 016	820	696	96	
7 421	8 123	7 340	8 384	7 778	7 813	7 829	4 767	6 188	7 924	8 468	8 244	11 541	97	
490	556	516	520	490	553	497	534	552	624	606	529	619	98	
5 184	5 344	5 092	5 336	5 063	4 594	5 003	4 747	4 816	5 267	5 605	5 482	5 504	99	
109	90	80	112	112	106	113	99	97	94	96	108	80	100	
199	185	162	180	189	190	203	158	202	212	219	215	278	101	
1 298	1 294	1 396	1 447	1 398	1 482	1 504	1 676	1 538	1 552	1 583	1 511	1 541	102	
26	28	26	37	43	73	163	89	104	112	135	186	163	103	
94 970	115 138	98 551	111 518	108 678	104 578	115 367	108 853	97 189	94 946	105 120	94 877	87 697	104	
2 295	2 343	2 259	2 195	2 287	2 227	2 130	2 098	2 093	1 975	1 980	1 954	2 219	105	
1 903	1 989	1 701	1 663	1 520	1 495	1 386	856	904	712	604	447	475	106 e 111	
1 302	1 369	1 436	1 269	1 295	1 300	1 414	1 333	1 365	1 193	1 306	1 293	1 623	107	
68	81	77	74	72	85	71	80	94	85	74	83	84	108	
1 253	1 206	1 467	1 415	1 283	1 203	1 085	1 149	1 146	1 076	1 115	1 013	1 362	109	

(a) Esclusi i tumori maligni.

(b) I morti per polmonite negli anni 1899-1911 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte

per pneumonite crupale e nel secondo quelle per bronco polmonite acuta.

Segue PROSPETTO N. 5.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI			ANNI							NUMERO dell' Elenco nosologico									
		1887-89	1890-92	1893-95	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902		1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
		(Somma delle cifre dei tre anni)																			
Segue A) Cifre assolute.																					
110 e 110 a	Appendicite e peritonite	13 690	13 638	15 170	5 246	4 755	5 066	4 813	4 981	4 753	5 039	5 239	4 893	4 839	4 050	645 3 157	624 (a) 3 096	693 (a) 3 355	616 (a) 3 401	774 (a) 3 939	110 e 110 a
112	Malattie dei reni (b)	23 527	26 742	31 406	11 461	11 409	12 370	12 806	12 390	12 259	13 066	13 421	13 186	13 094	13 486	13 298	14 150	15 093	15 789	16 633	112
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b)	7 712	8 099	8 694	2 509	2 446	2 388	2 567	2 529	2 452	2 487	2 484	2 351	2 365	2 122	2 225	2 058	2 113	1 995	2 125	113 e 114
115	Malattie dell'uretra e prostata (b)	963	1 154	1 125	450	452	421	447	438	378	370	464	536	604	572	616	606	629	568	608	115
116	Malattie delle capsule soprarrenali	151	227	251	74	83	91	102	119	111	112	122	116	129	129	120	143	148	128	166	116
117	Malattie dei testicoli (b)	218	261	182	19	13	15	17	11	8	4	9	8	20	7	6	7	5	4	2	117
118	Malattie dell'ovaia (c)	687	737	637	186	181	182	208	176	152	164	140	183	178	36	62	21	10	12	18	118
119	Malattie dell'utero e vagina (c)	3 148	4 725	4 633	1 011	986	713	598	613	565	523	421	375	431	578	562	602	545	536	615	119
120	Malattie delle mammelle (c)	92	162	108	24	14	15	13	23	13	15	12	8	25	8	4	4	9	11	15	120
124	Febbre puerperale	7 061	4 845	4 892	1 292	1 199	1 214	1 302	1 033	994	1 037	1 112	1 082	977	1 021	1 147	1 245	1 242	1 011	929	124
121, 122, 123 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	12 869	7 391	6 553	2 335	2 143	2 016	2 270	2 001	1 773	1 770	1 659	1 899	2 221	1 770	1 927	2 070	1 885	1 775	1 683	121, 122, 123, 125 e 126
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), cancrena della pelle	9 151	9 909	8 969	2 647	2 584	2 379	2 528	2 286	2 215	2 166	2 333	2 332	2 454	2 503	2 724	2 079	2 655	1 965	1 832	127 e 128
129	Elefantiasi degli arabi	95	77	78	13	22	11	13	11	3	..	5	8	14	8	15	10	15	18	7	129
130	Favo, foruncoli	733	361	293	215	156	167	180	152	125	154	169	143	178	171	168	127	133	119	107	130
131	Pemfigo, eczema, ectima	3 317	3 038	2 868	797	853	805	793	782	678	713	616	599	629	525	526	582	582	497	533	131
132	Sclerema	9 022	8 654	8 611	2 877	2 714	2 283	2 202	2 262	2 587	2 440	2 303	2 207	2 567	2 171	2 231	2 035	2 197	1 889	1 965	132
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b)	4 772	4 245	3 110	1 105	1 132	1 031	1 059	1 035	1 053	1 186	1 134	1 197	1 168	884	999	941	1 024	973	1 050	133
134	Reumatismo articolare acuto	2 651	2 693	2 721	932	827	896	978	927	857	912	983	953	990	988	1 171	1 410	1 413	1 215	1 142	134
135	Reumatismo cronico	2 850	3 406	2 898	939	837	682	764	840	775	770	822	852	1 102	907	1 097	961	978	856	887	135
136	Psoite	296	85	42	17	21	17	15	12	18	6	16	14	14	14	24	16	17	4	14	136
137	Atrofia muscolare progressiva	385	298	242	120	113	95	86	51	14	24	9	17	63	105	90	79	79	69	87	137
138	Alcoolismo cronico	1 233	1 573	1 744	557	504	541	555	523	414	400	401	509	837	702	663	901	1 403	975	740	138
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	88	138	96	28	40	28	30	33	31	50	43	60	54	55	57	58	64	57	54	139
140 a 156	Morte violenta accidentale	32 814	30 240	28 793	9 628	10 304	10 066	10 229	10 184	10 771	10 493	10 322	11 044	13 146	10 820	11 442	(d) 89 170	12 943	11 006	11 088	140 a 156
157 e 158	Omicidio (compreso quello d'infante)	4 642	4 232	4 564	1 456	1 540	1 706	1 417	1 366	1 262	1 332	1 305	1 312	1 444	1 317	1 283	1 528	1 375	1 158	1 090	157 e 158
159	Condanna alla pena capitale	1	1	159
160 a 168	Suicidio	4 502	5 072	5 343	2 000	1 895	2 059	2 019	2 040	2 014	2 010	1 922	2 156	2 379	2 319	2 445	2 693	2 969	2 880	2 751	160 a 168
	Totale dei morti per causa determinata	2 358 054	2 328 181	2 285 681	744 625	684 258	721 289	693 992	758 398	705 579	718 183	727 178	690 850	723 719	692 388	696 278	(d) 765 310	733 025	679 004	739 185	
	Morti per causa ignota o non dichiarata	59 437	65 836	51 217	13 504	11 344	10 976	9 401	10 519	9 457	8 998	9 133	7 754	6 621	4 487	4 155	4 744	5 435	3 455	3 626	
	Totale generale	2 417 491	2 394 017	2 336 898	758 129	695 602	732 265	703 393	768 917	715 036	727 181	736 311	698 604	730 340	696 875	700 433	(d) 770 054	738 460	682 459	742 811	

(a) I morti per peritonite negli anni 1907-1911 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.
 (d) Compresa le vittime del terremoto avvenuto il 23 dicembre 1903, in numero di 77 283.

per appendicite e nel secondo quelle per peritonite.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

Segue PROSPETTO N. 5.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI			1896	1897	1898
		1887-89	1890-92	1893-95			
		(media annuale)					
B) Cifre proporzionali							
1	Asfissia ed apoplessia nel parto	108	71	64	39	35	31
2 a 5	Vizi congeniti	108	73	70	47	50	48
6	Atrofia congenita, immaturità	1 768	1 774	1 788	1 601	1 472	1 468
7	Vaiuolo	534	125	88	65	32	13
8	Morbillo	655	507	357	365	194	170
9	Searlattina	337	247	160	103	123	141
10	Risipola	160	125	121	101	88	92
11	Febbre tifoidea	886	601	475	520	491	545
13	Meningite cerebro spinale epidemica	7	1	37	13	7	1
14 e 15	Difterite e laringite crupale	825	530	481	295	280	245
16	Ipertosse	347	325	255	211	250	232
17	Influenza	18	351	227	209	118	275
18	Febbri da malaria	595	541	505	445	377	356
19	Cachessia palustre	20	25	4	23	7	5
20	Dissenteria	191	25	4	23	7	5
21	Colera asiatico	91		33			
22	Sifilide	66	72	76	73	70	70
23	Setticemia, pioemia	72	35	39	35	36	40
24	Pustola maligna, carbonchio	22	20	20	14	15	14
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	1	50	53	7	3	1
29	Tubercolosi disseminate	307	290	290	247	242	244
31	Tubercolosi polmonare, tisi	1 070	1 028	990	1 057	977	957
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	187	189	175	154	140	142
32	Tabes mesenterica	422	364	335	329	292	286
33 e 34	Scrofolo disseminata e lupo	103	86	67	64	60	52
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott	(b) 39	(b) 38	(b) 43	60	60	65
38	Rachitide	96	102	87	100	99	88
39 e 40	Anemia e leucemia	331	274	250	309	299	299
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia	18	17	16	16	13	14
44	Marasmo senile	962	1 064	1 141	1 195	1 153	1 303
45	Pellagra	115	134	102	98	89	125

(a) Non si sono fatte le proporzioni ad 1,000,000 di abitanti per quelle cause che hanno dato un numero di morti inferiore a 500, durante in seguito ai risultati del censimento al 10 giugno 1911; e perciò i quozienti di mortalità per le singole cause dati in questo prospetto e nei (b) Veggasi la nota (a) a pag. xviii.

dal 1887 al 1911, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell' Elenco nosologico	ANNI												
	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
	a 1,000,000 di abitanti.												
1	32	31	26	26	21	25	29	21	23	25	22	23	21
2 a 5	45	42	40	40	41	42	52	53	57	56	55	53	51
6	1 430	1 527	1 551	1 550	1 433	1 404	1 365	1 244	1 255	1 280	1 280	1 173	1 132
7	7	10	104	74	184	94	15	5	13	17	22	12	139
8	231	273	171	305	222	161	203	292	244	347	324	288	247
9	140	46	26	41	61	49	51	82	88	102	79	84	73
10	93	81	79	80	96	87	75	70	77	86	81	68	58
11	466	466	361	347	355	371	328	283	257	275	286	260	275
13	2	1	2	9	3	3
14 e 15	214	179	167	138	124	137	128	128	168	175	170	140	106
16	245	203	213	220	199	180	174	185	183	164	153	158	197
17	133	535	125	117	217	115	207	129	240	132	168	81	163
18	268	396	324	224	195	193	172	113	97	80	81	83	102
19	69	94	92	79	64	64	65	33	29	20	23	22	25
20	4	2	2	2	1	..	6
21
22	73	65	60	61	58	56	60	54	52	50	46	50	54
23	39	47	49	51	55	58	47	51	58	75	76	79	89
24	14	10	10	12	12	11	9	9	9	10	9	8	7
28	1	..	1	1	7	32	4	3	1	1	1
29	147	72	71	81	112	111	180	205	184	170	161	143	158
31	1 092	1 218	1 113	1 012	1 013	1 075	1 035	1 022	1 063	1 060	1 071	1 029	1 061
30	184	183	177	169	167	166	171	176	175	177	176	172	191
32	273	283	249	240	221	221	219	186	175	163	167	163	201
33 e 34	48	47	41	37	33	35	37	35	33	23	29	25	23
35, 36 e 37	66	61	62	64	66	66	75	72	75	75	77	73	81
38	101	109	101	99	101	89	102	85	82	75	80	77	100
39 e 40	292	303	288	299	309	270	281	440	339	268	283	263	382
41 e 42	15	16	13	14	15	14	18	16	15	18	17	16	16
44	1 303	1 477	1 425	1 419	1 424	1 331	1 434	1 379	1 450	1 375	1 512	1 400	1 562
45	119	117	94	73	81	72	71	61	49	39	42	28	35

il periodo di osservazione dal 1887 al 1911. Si avverte che per gli anni dal 1901 al 1910 si sono modificate le cifre della popolazione nel Regno, e seguenti, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 5.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI			1896	1897	1898
		1897-99	1898-02	1899-05			
		(media annuale)					
<i>Segue B) Cifre proporzionali</i>							
47	Diabete	18	23	23	26	28	28
48 a 58	Tumori maligni	427	428	452	491	503	511
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	488	470	533	527	480	484
60	Mielite, tabe dorsale						
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	135	160	150	117	100	96
64	Apoplessia e congestione cerebrale						
62	Paralisi infantile	1 090	1 021	1 004	972	917	933
66	Rammollimento cerebrale						
65	Tumori cerebrali e spinali (b)						
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	50	67	66	125	144	154
73	Successioni della pazzia						
63	Encefalite	81	56	40	45	37	34
68 e 69	Epilessia ed isterismo	71	72	64	60	56	54
71	Tetano e trisma	29	22	26	25	24	24
72	Eclampsia infantile	794	723	653	626	584	557
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (b)	85	127	92	59	57	54
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c)	2 220	2 611	2 444	2 306	1 966	2 028
79	Malattie della pleura (b)	161	142	120	109	94	97
80	Congestione ed apoplessia polmonare	88	57	31	12	8	12
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (d)	2 233	2 407	2 521	2 492	2 126	2 299
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	179	137	79	48	41	29
86	Asma, enfisema polmonare	135	122	94	102	84	92
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	138	178	197	188	189	219
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	17	12	8	6	2	1
90, 91 e 93	Malattie del cuore e pericardio, sincope	1 514	1 584	1 644	1 662	1 565	1 700
92	Angina pectoris	17	18	17	16	15	16
94	Malattie della bocca e della lingua (b)	131	113	100	90	78	78
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (b)	73	43	36	30	29	27

dal 1897 al 1911, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell' E 'en nosologico	ANNI													NUMERO dell' E 'en nosologico
	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	
<i>a 1,000,000 di abitanti.</i>														
	32	33	33	35	35	38	40	42	46	44	46	47	49	47
48 a 58	519	522	527	539	541	571	583	620	617	645	642	656	668	48 a 58
59	432	445	420	426	446	426	392	392	350	349	366	348	380	59
60	88	89	81	83	83	79	84	73	75	67	77	68	76	60
61	7	5	4	3	5	6	7	10	11	12	13	11	13	61
64	978	994	1 005	996	1 028	999	1 032	994	993	1 025	1 077	1 046	1 076	64
62	6	9	7	8	6	7	9	10	10	10	10	11	10	62
66	22	23	26	23	25	25	32	25	26	23	28	25	27	66
65	12	13	13	13	14	13	16	15	16	4	6	2	2	65
67	110	99	87	86	89	95	127	129	132	130	144	138	144	67
73	2	2	5	4	6	10	31	5	5	6	6	3	2	73
63	33	37	33	31	33	31	33	36	29	32	31	33	34	63
68 e 69	48	56	59	58	56	57	57	51	53	55	53	53	58	68 e 69
71	23	22	20	19	16	20	21	23	16	15	17	14	15	71
72	523	549	507	520	483	467	488	449	439	432	444	419	510	72
76	60	58	58	57	56	58	57	39	26	38	41	28	26	76
77 e 78	1 604	1 794	1 649	1 740	1 636	1 488	1 403	1 410	1 428	1 242	1 325	1 208	1 434	77 e 78
	219	256	263	232	265	251	303	223	237	228	245	218	262	
79	93	94	90	91	92	91	87	81	84	84	84	82	86	79
80	26	22	20	23	24	22	24	23	22	25	26	23	23	80
81 e 82	1 364	1 238	1 336	1 238	1 443	1 136	1 169	1 121	1 234	1 103	1 161	950	1 063	81 e 82
	881	1 054	955	1 027	1 088	975	1 032	1 089	1 169	1 102	1 219	1 088	1 324	
83	47	43	26	20	19	20	19	21	23	19	21	17	18	83
86	96	105	87	79	88	79	91	53	70	80	90	71	79	86
87	224	234	231	235	242	256	294	266	301	322	368	347	366	87
89	2	1	1	1	1	1	4	5	9	9	8	7	8	89
90, 91 e 93	1 706	1 817	1 824	1 794	1 876	1 792	1 895	1 751	1 784	1 823	1 996	1 871	1 934	90, 91 e 93
92	19	18	18	20	19	20	24	22	23	24	27	27	30	92
94	71	73	65	69	60	57	58	53	45	47	46	47	50	94
96	35	34	31	30	31	27	29	24	25	29	30	24	20	96

(a) Veggasi la nota (a) a pagina xxiv.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Veggasi la nota (c) a pagina xviii.
 (d) Id. (b) id. xx.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI			1896	1897	1898
		1887-89	1890-92	1893-95			
		(media annuale)					
		<i>Segue B) Cifre proporzionali</i>					
97	Malattie dello stomaco, atresia (b)	214	209	222	227	236	246
98	Ulcera rotonda dello stomaco	22	19	19	18	17	18
99	Epatite, cirrosi epatica	201	188	178	175	164	165
102	Ittero	34	39	42	44	45	42
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	3 125	3 372	3 421	3 428	3 141	3 511
105	Volvolo, occlusione intestinale	67	61	66	63	66	69
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (b), idrope ascite	144	116	87	71	64	63
107	Ernie intestinali e addominali	53	49	47	44	42	45
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	158	83	57	36	48	39
110 e 110 a	Appendicite e peritonite	153	149	163	167	150	159
112	Malattie dei reni (b)	263	293	337	364	360	387
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b)	86	89	93	80	77	75
115	Malattie dell'uretra e prostata (b)	11	13	12	14	14	13
119	Malattie dell'utero e vagina (d)	35	52	50	32	31	22
124	Febbre puerperale	79	53	52	41	38	38
121, 122, 123, 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	144	81	70	74	68	63
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), cangrena della pelle	102	108	96	84	81	75
131	Pemfigo, eczema, ectima	37	33	31	25	27	25
132	Sclerema	101	95	92	91	86	72
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b)	53	46	33	35	36	32
134	Reumatismo articolare acuto	30	29	29	30	26	28
135	Reumatismo cronico	32	37	31	30	26	21
138	Alcoolismo cronico	14	17	19	18	16	17
140 a 156	Morte violenta accidentale	387	331	309	306	325	315
157 e 158	Omicidio (compreso quello d'infante)	52	47	49	46	49	53
160 a 168	Suicidio	50	56	57	63	60	64
	Totale dei morti per causa determinata	26 360	25 482	24 510	23 634	21 574	22 592
	Morti per causa ignota o non dichiarata	664	721	549	429	358	344
	Totale generale	27 024	26 203	25 059	24 063	21 932	22 936

dal 1887 al 1911, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell' Elenco nosologico	ANNI													NUMERO dell' Elenco nosologico
	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	
	<i>a 1,000,000 di abitanti.</i>													
	231	251	226	256	237	237	236	143	185	231	243	240	333	97
	15	17	16	16	15	17	15	16	16	18	18	15	18	93
	161	165	157	163	154	151	151	142	144	156	161	159	159	99
	40	40	43	44	43	45	45	50	46	46	46	41	41	102
	2 955	3 560	3 023	3 410	3 309	3 167	3 476	3 266	2 900	2 807	3 085	2 760	2 528	104
	71	72	69	67	70	67	64	63	61	58	58	57	64	105
	60	62	52	51	46	45	42	26	27	21	18	13	14	106 e 111
	41	42	41	39	39	39	43	40	41	35	38	38	47	107
	39	37	45	43	39	36	33	34	34	32	33	30	39	109
	150	154	146	154	160	148	146	122	(c) 94	(c) 92	(c) 98	(c) 99	(c) 114	110 e 110 a
	398	383	377	400	409	398	274	405	397	418	461	459	481	112
	80	78	75	76	76	71	71	64	66	61	62	58	61	113 e 114
	14	15	12	11	14	16	18	17	20	18	18	17	18	115
	19	19	17	16	13	11	13	17	17	18	16	16	18	119
	41	32	31	32	34	33	29	31	34	37	36	29	27	124
	71	62	54	54	51	58	67	53	57	61	55	52	49	121, 122, 123, 125 e 126
	79	71	63	66	71	71	74	75	81	79	78	57	53	127 e 128
	25	24	21	22	19	18	19	16	16	17	17	14	15	131
	69	70	80	75	70	67	77	65	67	62	64	55	57	132
	33	32	32	36	35	36	35	27	30	28	30	23	30	133
	30	29	26	28	30	29	30	30	35	42	41	35	33	134
	24	26	24	24	25	26	33	27	33	28	29	25	26	135
	17	16	13	12	12	15	25	21	20	27	41	28	21	138
	318	315	331	321	314	335	336	325	341	(e) 2 636	380	320	320	140 a 156
	44	40	39	41	40	40	44	40	38	45	40	34	31	157 e 158
	63	63	62	61	59	65	72	70	73	80	87	84	79	160 a 168
	21 595	23 446	21 688	21 963	22 143	20 924	21 803	20 777	20 775	(e) 22 625	21 511	19 752	21 309	
	293	325	291	275	278	235	199	134	121	140	159	100	105	
	21 888	23 771	21 979	22 238	22 421	21 159	22 002	20 911	20 896	(e) 22 765	21 670	19 852	21 414	

(a) Veggasi la nota (a) a pagina xxiv.
(b) Esclusi i tumori maligni.
(c) Veggasi la nota (a) a pagina XXII.
(d) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.
(e) Compresa la vittima del terremoto avvenuto il 23 dicembre 1908.

- 111 -

Dal prospetto n. 5 si rileva che, in generale, le malattie infettive si vennero facendo meno gravi dal 1887 al 1911. La mortalità per *vaiuolo* ebbe i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 al 1904 il vaiuolo assunse di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 74 nel 1902, 184 nel 1903 e 94 nel 1904. Negli anni dal 1905 al 1910 il vaiuolo fu mite, mentre nel 1911 tale morbo inferì più gravemente, tantochè causò 139 decessi ogni milione di abitanti.

La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887 a 247 nel 1911; quella per *scarlattina* da 494 nel 1887 a 73 nel 1911; quella per *febbre tifoidea* da 939 nel 1887 a 275 nel 1911. Il *tifo petecchiale*, che aveva causato parecchie morti nei primi anni di questo periodo di osservazione, in seguito è quasi scomparso dalle tavole necrologiche; la mortalità per *difterite e laringite crupale* è diminuita da 952 nel 1887 a 106 nel 1911 ogni milione di abitanti; quella per *ipertosse* da 376 nel 1887 a 197 nel 1911 e quella per *febbre puerperale* da 85 nel 1887 a 27 nel 1911.

Anche la mortalità per *febbri e cachessia da malaria* presenta un forte miglioramento dal 1887 al 1911 (710 morti ogni milione di abitanti nel primo anno e 127 nell'ultimo) e la diminuzione maggiore si è osservata negli ultimi dieci anni (1902-1911).

Il *colera asiatico*, che nel 1887 fu causa di morte per 8150 individui, scomparve negli anni corsi dal 1888 al 1892; tornò, però, a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3040 decessi, e cessò dopo il gennaio 1894, nel quale mese fu causa di 20 morti soltanto. Tale morbo, che ricomparve in Italia nel 1910 causandovi la morte di 805 persone, nel 1911 si diffuse in 45 provincie del Regno, nelle quali fu causa di 6145 decessi, e cioè, di 177 per ogni milione di abitanti.

E' invece aumentata la mortalità per *influenza*. Questa malattia che, nei tre anni 1887-1889, aveva determinato soltanto 18 morti ogni milione di abitanti, nel 1890 aggravò la mortalità di 11,771 casi (389 per un milione di abitanti); fu gravissima nel 1892 (20,039 morti, cioè 653 ogni milione di abitanti) e sempre grave nel 1894 (14,668 morti, cioè 472 ogni milione di abitanti). Fra il 1895 e il 1899 la mortalità per *influenza* scemò grandemente, ma nel 1900 si ebbe una nuova recrudescenza, 17.306 morti, con vale a dire 535 ogni milione di abitanti, che è il quoziente più alto, dopo quello dell'anno 1892; nell'anno 1901 essa discese al quoziente di 125 morti per ogni milione di abitanti, nel 1902 a quello di 117; tornò ad aggravarsi nel 1903, dando un quoziente di 217 morti ogni milione di abitanti, per discendere nuovamente a quello di 115 nell'anno 1904 e risalire a 207 nel 1905 ed a 240 nel 1907; nel 1908 il quoziente fu di 132, nel 1909 di 168, nel 1910 discese a 81 e nel 1911 risalì a 163.

La mortalità per *siflide* aumentò di anno in anno dal 1887 al 1893, ma negli anni susseguenti si è notata una leggiera diminuzione, almeno per quanto concerne la mortalità infantile, giacchè quella che si verifica negli adulti sfugge in gran parte ad una esatta indagine statistica.

I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, ed erano scesi fino a 53 nel 1895 ed a 45 nel 1904, furono 47 nel 1905, 60 nel 1906, 56 nel 1907, 71 nel 1908, 50 nel 1909, 65 nel 1910 e 52 nel 1911. La serie delle cifre annuali, quantunque irregolare nel suo andamento, accenna ad una

diminuzione nel numero dei morti per *rabbia* nel corso del periodo di osservazione dal 1887 al 1911. Tale fatto può dipendere dall'efficacia dei mezzi adoperati per impedire che si sviluppi l'infezione (sistema Pasteur), o da una più accurata vigilanza esercitata dalle amministrazioni municipali sui cani vaganti, oppure dalla circostanza che la *rabbia*, del pari che altre malattie infettive, può presentare da un anno all'altro forti oscillazioni nel suo grado di frequenza (a).

Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio e pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 235 nel 1911 in cifre assolute).

La *lebbra* causò, in cifre assolute, 22 morti nel 1887 e 19 nel 1911.

La mortalità per *malattie tubercolari* accenna, durante il periodo di osservazione, ad una diminuzione abbastanza sensibile. Infatti, ogni milione di abitanti, nel triennio 1887-1889, si ebbero in media 2128 morti per tubercolosi, considerata nelle sue varie manifestazioni; invece nel triennio 1909-1911 la proporzione è stata solamente di 1672 morti (b). Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della tubercolosi, si hanno, per gli anni 1887 al 1911, le cifre seguenti:

**Morti per malattie tubercolari nel Regno, per ogni milione di abitanti,
negli anni dal 1887 al 1911 (c).**

PROSPETTO N. 6.

MALATTIE tubercolari	TRIENNI			ANNI																	
	1887-89	1890-92	1893-96	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911		
Tubercolosi disseminata . . .	307	290	290	247	242	244	147	72	71	81	112	111	180	205	184	170	161	148	158		
Tubercolosi polmonare, tisi . .	1070	1028	999	1057	977	957	1092	1218	1113	1012	1013	1075	1035	1022	1068	1060	1071	1029	1061		
Scrofolo disseminata e lupo . .	103	96	67	64	60	52	48	47	41	37	38	35	37	35	33	28	29	25	28		
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito	187	189	175	154	140	142	184	183	177	169	167	166	171	170	175	177	176	172	194		
Tabe mesenterica e tubercolosi intestinale	422	364	335	329	292	286	273	283	249	240	221	221	219	186	175	163	167	163	201		
Artriti e sinoviti fungose, tubercolosi delle ossa, morbo di Pott	(d) 39	(d) 38	(d) 43	60	60	65	66	61	62	64	66	66	75	72	75	75	77	73	81		
TOTALE	2128	1995	1909	1911	1771	1746	1810	1864	1713	1603	1617	1674	1717	1690	1710	1673	1684	1610	1723		

La diminuzione è stata più notevole nelle morti per *scrofolo*, *tabe mesenterica* e *tubercolosi intestinale* che non in quelle per *tubercolosi polmonare* o *disseminata in più organi*, prese complessivamente.

(a) Nei 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, che complessivamente comprendono circa un quarto della popolazione del Regno, avvennero 29 casi di morte per *rabbia* nel 1881, 22 nel 1882, 28 nel 1883, 27 nel 1884, 36 nel 1885 e 29 nel 1886.

(b) Nel formare i valori medii si sono compresi fra i morti per malattie tubercolari, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

(c) Si vegga la nota (a) a pagina XII.

(d) Non compresi i morti per tubercolosi delle ossa, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto precedente, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 19, in media, nel triennio 1909-1911; che le dichiarazioni di morte per *bronchite cronica* non sono aumentate dal 1899 in poi (dal quale anno si cominciò a tenerle distinte da quelle per *bronchite capillare acuta*); e che il numero dei morti per *meningite acuta* e per *diarrea* si è mantenuto quasi invariato fra il 1887 ed il 1911, si può legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata nel numero dei morti per malattie tubercolari sia effettiva e non dipenda dall'aver i medici, negli ultimi anni di osservazione, celata più spesso la diagnosi di tali malattie, sostituendovi dichiarazioni di morte per polmonite cronica o per bronchite o per meningite semplice.

Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta scemando dal 1887 in poi.

Mortalità delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto, nel Regno, durante gli anni dal 1887 al 1911.

PROSPETTO N. 7.

	ANNI	NUMERO dei parti semplici e multipli (a)	NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio	NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	OGNI 1000 parti morirono	
					gestanti	neonati
	1887-89. . .	3 508 802	19 930	9 660	5,7	2,8
	1890-92. . .	3 416 431	12 236	6 481	3,6	1,9
	1893	1 158 552	3 990	2 202	3,4	1,9
	1894	1 135 460	4 048	2 188	3,6	1,9
	1895	1 125 131	3 407	1 568	3,0	1,4
	1896	1 128 782	3 627	1 213	3,2	1,1
	1897	1 135 505	3 342	1 101	2,9	1,0
	1898	1 102 373	3 230	1 000	2,9	0,9
	1899	1 121 084	3 572	1 031	3,2	0,9
	1900	1 100 035	3 034	1 007	2,8	0,9
REGNO	1901	1 090 907	2 767	818	2,5	0,8
	1902	1 127 901	2 807	864	2,5	0,8
	1903	1 075 851	2 771	679	2,6	0,6
	1904	1 120 856	2 961	811	2,7	0,7
	1905	1 120 631	3 198	976	2,9	0,9
	1906	1 105 899	2 791	711	2,5	0,6
	1907	1 097 223	3 074	759	2,8	0,7
	1908	1 176 201	3 315	833	2,8	0,7
	1909	1 152 735	3 127	734	2,7	0,6
	1910	1 181 041	2 786	799	2,4	0,7
	1911	1 128 657	2 612	731	2,3	0,6

(a) Il totale dei parti comprende anche quelli di nati morti.

La mortalità per *pellagra* variò in modo irregolare durante il periodo dal 1887 al 1900, ma dopo tale anno essa incominciò a diminuire notevolmente, tantochè nella media del triennio 1909-1911 si ebbero soltanto 38 morti per ogni milione di abitanti, contro 115 registrati nel triennio 1887-89.

I morti per *diabete* furono, in cifre assolute, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1551 nel 1909, a 1608 nel 1910 ed a 1714 nel 1911. Si nota invece una diminuzione nel numero dei morti per *scorbuto*, da 532 nel 1887 a 207 nel 1911, in cifre assolute. Anche i morti per *gota* presentano, in genere, una diminuzione nel periodo d'osservazione; però nel triennio 1909-1911 essi hanno raggiunto una cifra quasi eguale a quella del triennio 1887-89.

Le cifre dei bambini morti poco dopo la nascita per *atrofia congenita* si sono mantenute quasi invariate in ciascun anno del periodo 1887-95, ma diminuirono alquanto negli anni susseguenti. Al contrario, col prolungarsi della vita media dell'uomo, è venuto crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*.

La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti nella media del triennio 1887-89 a 668 nel 1911).

Se si dividono i morti per *tumori maligni*, secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

Morti nel Regno causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi, negli anni dal 1887 al 1911

(in cifre assolute).

PROSPETTO N. 8.

SEDE dei tumori maligni	TRIENNI (media annuale)					ANNI									
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
disseminati in più organi o di sede non specificata	2 787	2 993	3 489	3 553	3 718	3 542	3 905	3 974	3 948	4 609	4 400	5 378	4 578	4 472	4 726
dell'utero, vagina, ovaia	2 403	2 375	2 322	2 469	2 548	2 590	2 502	2 572	2 535	2 778	2 725	2 718	2 715	2 805	2 620
delle mammelle	1 013	862	874	908	910	927	855	973	974	1 019	983	1 010	1 042	1 049	1 050
della vescica, uretra, prostata, pene, testicoli, rene	308	285	259	306	304	346	325	394	408	453	405	430	466	485	512
della bocca, labbra, lingua, palato, fauci, tiroide, laringe, trachea	437	415	555	858	1 100	1 143	1 067	1 233	1 049	805	947	984	957	1 067	1 070
dello stomaco, esofago	3 341	3 739	4 021	4 510	4 697	4 928	5 179	5 356	5 909	6 108	6 441	6 806	6 855	6 876	7 112
del fegato, milza, pancreas, intestino, peritoneo	2 122	2 235	2 380	2 998	3 317	3 559	3 445	3 877	3 974	4 416	4 198	3 723	4 419	4 941	5 229
delle ossa ed articolazioni	254	79	81	202	211	544	409	359	429	283	311	286	261	234	239
dei centri nervosi ed organi dei sensi	61	44	73	123	93	55	87	122	122	122	255	493	578	623	614
TOTALE	12 726	13 027	14 054	15 927	16 898	17 634	17 774	18 860	19 848	20 653	20 668	21 828	21 871	22 555	23 172

Una leggiera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1911 nel numero dei morti per *epilessia*, *epatite* e *reumatismo cronico*; il fatto opposto si è verificato per le malattie delle *arterie*, per i *vizi di cuore* e per le malattie dei *reni*. A determinare questi ultimi aumenti ha contribuito anche il fatto che i medici ora, meno spesso che in passato, rilasciano certificati di cause di morte colle dichiarazioni generiche di asma, idrope ascite, tumori addominali.

Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*, da 805 per un milione di abitanti nel 1887 a 510 nel 1911. E' noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di meningiti e di disturbi dell'apparato digerente; e perciò la diminuzione avvertita può dipendere in parte dall'aver i medici dato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1911 nella mortalità per malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio; infatti i morti per *bronchite acuta e cronica* diedero un quoziente medio di 2416 ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, si mantennero intorno a questo numero fino all'anno 1895, e diminuirono notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1909-1911 scesero a 1564.

A partire dall'anno 1899 i morti per *bronchite* sono stati divisi in due gruppi, secondochè si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di bronchite capillare infantile) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari, è stata, nel 1911, dichiarata come causa di morte di 262 individui per ogni milione di abitanti, ossia di un settimo e più del totale dei morti per *bronchite*, e si è mantenuta quasi invariata nel periodo d'osservazione.

La *polmonite crupale* e la *bronco-polmonite acuta* aggravarono la mortalità di 2350 casi, in media, ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2514 ogni milione di abitanti); negli anni seguenti il quoziente di mortalità per queste cause scemò sensibilmente fino a 2111 nel 1904, a 2201 nel 1905 ed a 2210 nel 1906. Nel 1907 invece il quoziente salì a 2403, nel 1908 si ridusse a 2205, nel 1909 risali a 2380; mentre nel 1910 si ebbe un sensibile miglioramento nei morti per *polmonite*, tantochè il quoziente che fu di 2038, ogni milione di abitanti, è il più basso in tutto il periodo di osservazione. Nel 1911 la mortalità per *polmonite* tornò nuovamente ad aggravarsi, dando un quoziente di 2390 ogni milione di abitanti. Anche per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per *polmonite cruposa* da quelli per *bronco-polmonite acuta*. Nell'anno 1911, i primi risultarono nella proporzione di 1066 e i secondi di 1324 per un milione di abitanti.

I morti per *malattie della pleura* discesero da 159 ogni milione di abitanti nel 1887 a 86 nell'anno 1911.

La mortalità per *diarrea*, *enterite*, *colera indigeno*, *colite*, *proctite* ed *ulcera intestinale* presenta, nel periodo di tempo da noi considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3147 morti ogni milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3650 (il più alto del periodo), nel 1897 scese a 3141, per risalire subito nell'anno appresso a 3511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2955. Nel 1900 la mortalità per le suddette cause tornò ad aggravarsi fortemente, dando un altro massimo quoziente di 3560 ogni milione di abitanti; nel 1906 la proporzione fu di 3266, nel 1907 soltanto di 2900, nel 1908 di 2807, mentre nel 1909 il quoziente tornò a salire a 3085,

per scendere di nuovo nel 1910 a 2760 e nel 1911 a 2528. Questi due ultimi quozienti sono i più bassi fra tutti quelli osservati nel periodo 1887-1911.

I morti per *elmintiasi* sono stati 5104 nel 1887 in cifre assolute, ma le cifre sono diminuite gradatamente negli anni susseguenti fino a 1362 nel 1911. La diminuzione soltanto in parte è un fatto reale e dipende dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; in parte, però, deve essere causata da una maggiore accuratezza dei medici nel fare le diagnosi delle malattie. Un tempo, parecchi casi di malattie dell'apparato digerente nei bambini erano dai medici attribuiti alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata una importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatasi nel canale digerente. Probabilmente dipende da questo stesso motivo la grande diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per *dissenteria*, i quali da 6279 nel 1887, in cifre assolute, sono venuti rapidamente scemando, tanto che se ne osservano pochissimi casi negli anni dal 1906 al 1911. Per i primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per diarrea, mentre negli ultimi vi furono iscritti i soli casi di dissenteria cruenta.

La maggiore precisione della diagnosi da parte dei medici, mentre ha fatto diminuire la cifra dei morti per eclampsia infantile, per *elmintiasi* e per *dissenteria*, ha contribuito a tener alto il numero dei morti per *diarrea* e *gastroenterite*.

L'*alcoolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre assolute. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo salì improvvisamente a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare nel 1895 a 473. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, scemò nei quattro anni susseguenti, ma poi risalì a 837 nel 1905, a 702 nel 1906, a 663 nel 1907, a 901 nel 1908 e a 1408 nel 1909. Negli anni 1910 e 1911 le morti per *alcoolismo cronico* scemarono sensibilmente, tantochè nel 1911 furono soltanto in numero di 740, e cioè poco più della metà di quelle verificatesi nel 1909. Si ritiene da molti medici che ad elevare il quoziente di mortalità per alcoolismo abbia contribuito il movimento di emigrazione e d'immigrazione in rapporto coll'estero, fattosi molto più intenso a cominciare dal 1901. Secondo il loro avviso, le nostre popolazioni rurali abituate ad una vita sobria in paese, messe in contatto colle masse operaie dell'Europa centrale e settentrionale e degli Stati Uniti d'America, dove l'abuso degli alcoolici è molto più frequente che in Italia, vi avrebbero contratto abitudini viziose, che conservano anche dopo il rimpatrio. Nell'anno 1911 avvennero inoltre 68 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi.

Delle morti violente, siano esse dovute a infortunio accidentale, a omicidio o a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo IV della presente Introduzione.

§ 3. — Morti avvenute nell'anno 1911 in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia.

Il prospetto seguente fa conoscere le morti avvenute nell'anno 1911 in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 1000 abitanti. Le cifre di popolazione, alle quali sono ragguagliate quelle dei morti, trovansi indicate nel prospetto 2 a pagina X.

Numero dei morti e quozienti di mortalità per l'anno 1911 in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di provincia.

PROSPETTO N. 9.

PROVINCIE	MORTI				PROVINCIE	MORTI			
	nell'intera Provincia		nel solo Comune capoluogo			nell'intera Provincia		nel solo Comune capoluogo	
	Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 abitanti		Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 abitanti	Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Alessandria	14 531	17.99	1 490	19.68	Ancona	6 260	19.56	1 141	18.04
Cuneo	13 269	20.50	646	23.49	Ascoli Piceno	4 684	18.46	548	17.89
Novara	12 978	17.16	1 119	20.48	Macerata	4 907	18.97	436	18.99
Torino	22 530	18.55	7 533	17.62	Pesaro e Urbino	5 809	22.21	577	21.09
Genova	19 658	18.71	5 764	21.15	Perugia	13 258	19.30	1 364	20.73
Porto Maurizio	2 850	19.36	126	16.03	Roma	26 059	20.00	11 127	20.50
Bergamo	14 250	27.86	1 716	31.05	Aquila degli Abruzzi	8 917	21.88	484	22.06
Brescia	13 635	22.84	2 209	26.50	Campobasso	8 774	25.09	317	22.04
Como	13 337	21.63	1 039	23.56	Chieti	8 078	22.02	567	22.20
Cremona	7 383	21.16	1 837	33.04	Teramo	5 985	19.45	592	24.34
Mantova	7 250	20.76	1 107	33.86	Avellino	8 708	21.95	567	23.89
Milano	38 584	22.33	12 043	20.07	Benevento	5 424	21.28	630	25.88
Pavia	9 254	18.06	1 074	26.92	Caserta	21 529	27.21	782	23.58
Sondrio	2 919	22.44	182	19.95	Napoli	37 125	28.35	18 374	27.12
Belluno	3 975	20.61	533	25.76	Salerno	15 652	28.04	1 243	27.21
Padova	10 148	19.52	2 429	25.21	Bari delle Puglie	22 965	25.75	2 649	25.5
Rovigo	5 322	20.63	323	26.41	Foggia	11 076	23.70	1 255	16.36
Treviso	8 604	17.50	872	21.24	Lecce	17 209	22.30	743	20.51
Udine	13 041	20.75	1 250	26.24	Potenza	11 585	24.43	302	18.10
Venezia	9 723	20.80	3 654	22.71	Catanzaro	10 971	22.69	1 084	31.55
Verona	8 714	18.33	1 908	23.26	Cosenza	10 262	21.64	704	29.08
Vicenza	9 404	18.93	1 357	24.86	Reggio di Calabria	9 031	20.28	1 101	25.50
Bologna	10 733	18.56	3 580	20.67	Caltanissetta	8 441	24.63	901	21.80
Ferrara	6 032	19.57	1 972	20.70	Catania	17 126	21.69	4 347	20.61
Forlì	6 403	21.23	798	17.32	Girgenti	10 492	26.62	780	29.08
Modena	7 647	21.65	1 810	25.50	Messina	9 970	19.27	2 679	21.17
Parma	5 761	17.64	1 331	25.61	Palermo	21 850	27.47	10 794	31.69
Piacenza	5 070	19.77	1 318	34.23	Siracusa	10 550	22.12	826	20.20
Ravenna	4 252	17.11	1 164	16.25	Trapani	6 714	18.80	1 164	19.54
Reggio nell'Emilia	6 677	21.50	1 748	24.80	Cagliari	11 294	21.70	1 260	20.96
Arezzo	5 821	20.52	1 063	22.35	Sassari	6 913	20.79	843	19.54
Firenze	19 029	19.03	5 195	22.27	Regno	742 811	21.41	147 710	22.92
Grosseto	2 679	18.25	344	27.61					
Livorno	3 103	22.85	2 578	24.47					
Lucca	6 014	18.05	1 749	22.96					
Massa e Carrara	4 256	20.03	722	23.41					
Pisa	5 732	16.74	1 227	18.79					
Siena	4 625	19.15	1 219	29.27					

I quozienti massimi di mortalità, nell'anno 1911, si ebbero nelle provincie di Napoli con 28.35 ogni 1000 abitanti, di Salerno (28.04), di Bergamo (27.86), di Palermo (27.47), di Caserta (27.21), di Girgenti (26.62), di Bari (25.75), di Campobasso (25.09), di Caltanissetta (24.63), di Potenza (24.43) e di Foggia (23.70). I quozienti minimi furono dati dalle provincie di Pisa con 16.74 ogni 1000 abitanti, di Ravenna (17.11), di Novara (17.16), di Treviso (17.50), di Parma (17.64), di Alessandria (17.99), di Lucca (18.05) e di Pavia (18.06).

Paragonando fra loro i 69 Comuni capiluoghi di provincia, si rilevano differenze notevoli nei quozienti di mortalità. Dalle cifre massime di 34.23 morti ogni 1000 abitanti in Piacenza, di 33.86 in Mantova, di 33.04 in Cremona, di 31.69 in Palermo, di 31.55 in Catanzaro, di 31.05 in Bergamo, di 29.27 in Siena, di 29.08 in Cosenza e Girgenti; si scende alle cifre minime di 16.03 in Porto Maurizio, di 16.25 in Ravenna, di 16.36 in Foggia, di 17.32 in Forlì, di 17.62 in Torino, di 17.89 in Ascoli Piceno, di 18.04 in Ancona, di 18.10 in Potenza, di 18.79 in Pisa e di 18.99 in Macerata. Questi quozienti sono stati calcolati ragguagliando il numero totale delle morti avvenute in ciascun Comune (comprese quelle verificatesi nella popolazione avventizia o con dimora occasionale) a 1000 abitanti pure della popolazione totale; e perciò nelle città ove trovansi grandi istituti ospitalieri civili e militari ed altre case di ricovero che servono per l'assistenza anche di persone dimoranti in altri Comuni, tali quozienti sono aggravati dal contingente che apporta alla mortalità la popolazione estranea al Comune.

§ 4. — Distribuzione geografica di alcune malattie, specialmente di quelle infettive, negli anni 1909, 1910 e 1911.

Per la singolare importanza delle malattie infettive, come indice delle condizioni igieniche locali, stimiamo utile di metterle in evidenza dove siano state più frequenti e dove meno quelle che nel nostro Paese hanno una maggiore diffusione. A ciò è inteso il prospetto seguente, in cui è indicato, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 100,000 abitanti, il numero dei morti per *vaiuolo*, *morbillo*, *scarlattina*, *difterite* e *laringite crupale*, *ipertosse*, *sifilide*, *pustola maligna* e *carbonchio*, *febbre tifoidea*, *febbri da malaria*, *febbre puerperale*, *tubercolosi disseminata* e *sue manifestazioni locali*, *polmonite acuta* ed inoltre quelli per *pellagra*, nei singoli compartimenti del Regno, durante gli anni 1909, 1910 e 1911.

Morti per alcune malattie infettive e per pellagra, in ciascun

PROSPETTO N. 10.

COMPARTIMENTI	Totale dei morti per qualsiasi causa			Vaiuolo			Morbilli		
	1909	1910	1911	1909	1910	1911	1909	1910	1911
Piemonte	64 990	62 807	63 308	1	10	3	446	629	398
Liguria	23 421	20 181	22 508	5	3	7	557	155	228
Lombardia	106 061	97 021	106 612	9	7	8	1 982	1 437	2 196
Veneto	72 680	63 880	68 931	7	1	5	641	701	339
Emilia	56 764	49 854	52 575	8	1	7	375	246	433
Toscana	55 205	46 479	51 259	1	..	21	857	392	470
Marche	23 052	21 619	21 660	1	1	2	63	190	64
Umbria	14 549	12 769	13 258	2	155	129	89
Lazio	26 105	25 538	26 059	8	..	112	687	957	184
Abruzzi e Molise	34 007	30 299	31 754	11	4	7	579	428	256
Campania	75 484	71 057	88 438	480	299	1 631	1 314	535	847
Puglie	47 688	49 713	51 250	204	13	88	425	1 539	1 323
Basilicata	10 611	11 062	11 585	3	..	3	97	275	332
Calabria	29 166	27 086	30 264	10	62	170	651	307	505
Sicilia	78 653	76 223	85 143	8	9	2 759	2 023	1 777	684
Sardegna	19 124	16 871	18 207	..	3	5	211	170	225
REGNO	738 460	682 459	742 811	758	418	4 828	11 043	9 897	8 573

A) Cifre

compartimento e nel Regno, negli anni 1909, 1910 e 1911.

Scarlattina			Difterite e laringite crupale			Ipertosse			Sifilide			Pustola maligna, carbonchio		
1909	1910	1911	1909	1910	1911	1909	1910	1911	1909	1910	1911	1909	1910	1911
174	102	33	480	406	288	200	659	780	59	59	66	14	18	17
40	21	25	145	102	157	140	142	147	58	55	59	20	10	10
263	91	78	901	690	607	1 105	976	1 097	152	123	159	7	9	9
205	116	69	836	603	411	1 032	816	1 155	79	87	132	12	4	6
187	98	68	694	425	319	406	755	644	90	97	91	11	8	8
181	90	34	417	273	183	483	315	619	74	58	75	23	15	15
41	31	15	139	151	107	253	199	328	17	23	28	2	1	2
43	39	..	88	69	58	154	149	122	33	40	30	3	4	4
42	38	38	201	240	162	225	281	219	111	171	163	19	15	10
175	111	175	266	285	198	160	188	256	75	73	89	12	12	8
451	547	133	592	429	313	142	243	275	260	351	365	34	39	22
84	281	83	223	243	213	346	131	221	134	137	136	22	23	25
62	30	100	53	56	50	80	66	118	16	24	23	20	22	16
223	390	525	160	192	191	99	116	210	179	162	155	48	25	23
530	914	1 139	493	584	374	185	219	571	172	241	257	26	25	31
2	4	..	93	80	51	238	161	71	44	29	33	49	30	24
2 708	2 908	2 515	5 781	4 828	3 682	5 218	5 416	6 838	1 558	1 730	1 861	322	260	235

assolute.

B) Cifre proporzionali

a 100,000 abitanti (a).

Piemonte	1 905	1 833	1 848	13	18	12
Liguria	1 987	1 692	1 879	47	13	19
Lombardia	2 268	2 048	2 224	1	42	30	46
Veneto	2 107	1 830	1 952	19	20	10
Emilia	2 171	1 886	1 959	14	9	16
Toscana	2 073	1 736	1 901	32	15	17
Marche	2 218	1 993	1 980	1	6	18	6
Umbria	2 142	1 871	1 930	23	19	13
Lazio	2 046	1 982	2 000	1	..	9	54	74	14
Abruzzi e Molise	2 393	2 126	2 218	1	41	30	18
Campania	2 315	2 160	2 672	15	9	49	40	16	26
Puglia	2 291	2 363	2 405	10	1	4	20	75	62
Basilicata	2 265	2 350	2 443	1	..	1	21	58	70
Calabria	2 118	1 949	2 157	1	4	12	47	22	36
Sicilia	2 184	2 102	2 318	75	56	49	19
Sardegna	2 276	1 993	2 135	1	25	20	26
REGNO	2 167	1 985	2 141	2	1	14	32	29	25

5	3	1	14	12	8	6	19	23	2	2	2	..	1	..
3	2	2	12	9	13	12	12	12	5	5	5	2	1	1
6	2	2	19	15	13	21	21	23	3	3	3
6	3	2	24	17	12	29	23	33	2	2	4
7	4	3	27	16	12	16	29	24	3	4	3
7	3	1	16	10	7	18	12	23	3	2	3	1	1	1
4	3	1	13	14	10	23	18	30	2	2	3
6	6	..	13	10	8	23	22	18	5	6	4	..	1	1
3	3	3	16	19	12	18	22	17	9	13	13	1	1	1
12	8	12	19	20	14	11	13	18	5	5	6	1	1	1
14	17	4	18	13	9	4	7	8	8	11	11	1	1	1
4	13	4	11	12	10	17	6	10	6	7	6	1	1	1
13	6	21	11	12	11	17	14	25	3	5	5	4	5	3
16	28	37	12	14	14	7	8	15	13	12	11	3	2	2
15	25	31	14	16	10	5	6	16	5	7	7	1	1	1
..	11	9	6	28	19	8	5	3	4	6	4	3
8	8	7	17	14	11	15	18	20	5	5	5	1	1	1

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XII.

Segue PROSPETTO N. 10.

ciascun compartimento e nel Regno, negli anni 1909, 1910 e 1911.

COMPARTIMENTI	Febbre tifoidea			Febbri da malaria						Febbre puerperale			Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali			Polmonite acuta						Pellagra				
	1909	1910	1911	1909		1910		1911		1909	1910	1911	1909	1910	1911	1909		1910		1911		1909	1910	1911		
				Febbri da malaria	Cachessia palustre	Febbri da malaria	Cachessia palustre	Febbri da malaria	Cachessia palustre							Polmo-nite crupale	Bronco polmoni-te acuta	Polmo-nite crupale	Bronco polmoni-te acuta	Polmonite crupale	Bronco polmoni-te acuta					
Piemonte	506	491	615	11	3	17	1	11	1																	
Liguria	225	131	123	4	..	5	1	1	1																	
Lombardia	1 615	1 298	1 764	38	5	19	7	30	5																	
Veneto	1 220	914	1 078	94	17	93	33	115	38																	
Emilia	599	597	631	19	4	23	5	34	6																	
Toscana	724	554	790	62	7	68	14	50	6																	
Marche	318	267	314	5	4	7	1	6	2																	
Umbria	223	251	307	3	2	3	6																	
Lazio	403	491	372	118	19	122	36	150	39																	
Abruzzi e Molise	469	541	494	103	22	116	22	180	23																	
Campania	594	649	675	137	33	175	30	187	37																	
Puglie	739	692	461	418	82	543	106	555	135																	
Basilicata	82	105	101	124	41	135	44	113	41																	
Calabrie	463	456	354	399	119	371	97	338	102																	
Sicilia	1 351	1 394	1 339	750	253	663	225	902	247																	
Sardegna	210	117	116	470	162	511	129	862	196																	
REGNO	9 741	8 948	9 537	2 760	773	2 870	751	3 587	883																	

A) Cifre assolute.																										
Piemonte	128	102	100	5 963	5 996	5 995	4 415	4 197	3 531	4 053	3 407	4 293	36	44	16											
Liguria	26	40	-34	2 582	2 460	2 733	1 538	2 735	1 080	1 974	1 171	2 386	3	1	3											
Lombardia	176	134	145	10 027	9 483	10 119	6 067	6 292	4 623	5 757	5 252	7 120	350	302	334											
Veneto	96	73	72	6 846	6 717	7 351	2 953	3 096	2 186	3 215	2 678	4 074	708	637	531											
Emilia	89	68	70	4 783	4 410	4 778	2 888	3 200	2 151	2 767	2 363	3 262	134	119	111											
Toscana	97	58	49	5 479	5 170	5 656	3 261	3 578	2 214	2 690	2 461	3 433	32	44	48											
Marche	34	22	25	1 438	1 416	1 476	838	1 085	640	947	631	1 113	93	82	81											
Umbria	29	26	32	977	961	1 024	683	629	412	487	569	584	46	55	65											
Lazio	51	39	35	2 362	2 442	2 426	1 419	1 355	1 294	1 329	1 675	1 529	9	15	20											
Abruzzi e Molise	72	46	35	1 849	1 821	1 940	1 511	1 610	1 223	1 401	1 263	1 720	9	9	7											
Campania	125	82	70	4 149	3 915	4 680	4 457	5 428	3 493	4 738	4 452	6 433	..	3	..											
Puglie	79	64	58	3 075	3 134	3 423	2 001	2 107	2 008	2 413	2 776	3 343	1											
Basilicata	23	19	13	507	442	523	480	435	474	474	557	527											
Calabrie	79	73	60	1 413	1 365	1 434	1 603	1 363	1 383	1 268	1 837	1 736	..	1	..											
Sicilia	98	122	102	4 097	3 910	4 283	4 029	3 088	4 687	3 258	4 481	3 717	1											
Sardegna	40	43	29	1 835	1 690	1 923	1 405	716	1 245	616	1 420	686											
REGNO	1 242	1 011	929	57 882	55 837	59 764	39 548	41 544	32 664	37 417	36 998	45 948	1 420	1 812	1 222											

B) Cifre proporzionati a 100,000 abitanti (a).																										
Piemonte	15	14	18											
Liguria	19	11	10											
Lombardia	35	27	37	1	1											
Veneto	35	26	31	3	..	3	1	3	1											
Emilia	23	23	24	1	..	1	..	1											
Toscana	27	21	29	2	..	3	1	2											
Marche	29	25	29	1	..	1											
Umbria	33	37	45											
Lazio	32	38	29	9	1	9	3	12	3											
Abruzzi e Molise	33	38	35	8	2	8	2	13	2											
Campania	18	20	20	4	1	5	1	6	1											
Puglie	35	33	22	20	4	26	5	26	6											
Basilicata	18	22	22	26	9	29	9	24	9											
Calabrie	34	33	25	29	9	27	7	24	7											
Sicilia	38	38	36	21	7	18	6	25	7											
Sardegna	25	14	14	56	19	60	15	101	23											
REGNO	29	26	27	8	2	8	2	10	3																	

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XII.

Osservando la frequenza delle morti causate dalle malattie sopra indicate, durante l'anno 1911, si trova che il *vaiuolo* colpì principalmente la popolazione della Sicilia (75 morti ogni 100,000 abitanti), e poi, a notevole distanza, quella della Campania (49), e quindi, con cifre sempre minori, le popolazioni delle Calabrie (12), del Lazio (9) e delle Puglie (4). Non causò alcuna morte nell'Umbria e fu assai mite negli altri compartimenti.

Il *morbillo* dominò particolarmente nella Basilicata (70 morti ogni 100,000 abitanti), nelle Puglie (62), nella Lombardia (46) e nelle Calabrie (36); le proporzioni più basse si ebbero nelle Marche (6), nel Veneto (10), nel Piemonte (12) e nell'Umbria (13).

La *scarlattina* colpì principalmente la popolazione delle Calabrie (37 morti ogni 100,000 abitanti), della Sicilia (31) e della Basilicata (21); fu mite nel Piemonte, nella Toscana e nelle Marche e non causò alcuna morte nell'Umbria e nella Sardegna.

La *difterite* cagionò un numero relativamente più grande di morti negli Abruzzi e nelle Calabrie (14); ed un numero minore nella Sardegna (6), nella Toscana (7), nel Piemonte e nell'Umbria (8). Coi morti per difterite sono compresi anche quelli per *laringite crupale*.

La *febbre tifoidea* fece maggiori vittime nell'Umbria (45), nella Lombardia (37), nella Sicilia (36) e negli Abruzzi (35). Le proporzioni più basse si ebbero nella Liguria (10), nella Sardegna (14) e nel Piemonte (18).

Le morti per *ipertosse* furono numerose nel Veneto (33), nelle Marche (30), nella Basilicata (25) e nell'Emilia (24); e meno frequenti nella Sardegna e nella Campania (8) e nelle Puglie (10).

Le *febbri da malaria* e la *cachessia palustre*, che nelle provincie continentali situate a nord del parallelo di Roma causarono pochissime morti, nella Sardegna ne causarono 124 ogni 100,000 abitanti, nella Basilicata (33), nella Sicilia e nelle Puglie (32), nelle Calabrie (31), nel Lazio e negli Abruzzi (15) e nella Campania (7).

La *sifilide* cagionò un numero relativamente più grande di morti, massime nell'infanzia, nel Lazio (13) (a), nella Campania e nelle Calabrie (11); ed un minore numero nel Piemonte (2), nella Lombardia, nell'Emilia, nella Toscana e nelle Marche (3).

Le morti per *pustola maligna* furono più frequenti nell'Italia meridionale (Basilicata 3) e nella Sardegna (pure 3); e rarissime nelle provincie dell'Italia settentrionale.

Le morti per *febbre puerperale* si presentarono presso a poco colla stessa frequenza nei diversi compartimenti; nel Regno avvennero nella proporzione di 3 ogni 100,000 abitanti.

Le *affezioni tubercolari* (sotto la quale rubrica sono comprese le morti per *tubercolosi disseminata* in più organi, per *tisi polmonare*, per *meningite tubercolare* e *idrocefalo acquisito*, per *scrofola disseminata* e per *lupo*, per *tabe mesenterica* e tuber-

(a) Conviene rammentare, quando si parla del Lazio, che il territorio di questo compartimento comprende la sola provincia di Roma, nella quale la città capitale ha circa la metà della popolazione totale, onde questo compartimento male si può confrontare con quelli che hanno una superficie più estesa, e nei quali prevale, per numero, la popolazione rurale.

colosi intestinale, per *sinovite* e *artrite fungosa*, per *tubercolosi delle ossa* e per *morbo di Pott*) diedero quozienti più alti di mortalità nella Liguria (228 morti ogni 100,000 abitanti), nella Sardegna (225), nella Lombardia (211), nella Toscana (210) e nel Veneto (208); e più bassi nelle Calabrie (102), nella Basilicata (110), nella Sicilia (117), negli Abruzzi e nelle Marche (135) e nella Campania (141).

Le morti per *polmonite crupale* e per *bronco polmonite acuta* dominarono più che altrove nella Campania (328 morti ogni 100,000 abitanti) nella Liguria (297), nelle Puglie (287), nella Lombardia (259), nelle Calabrie (254), nel Lazio e nella Sardegna (246); e meno nelle Marche (160), nell'Umbria (168) e nel Veneto (191).

Fin qui ci siamo occupati delle infezioni più frequenti. Ma stimiamo utile aggiungere qualche cenno sulla distribuzione territoriale di due altre malattie, le quali meritano di essere ricordate in uno studio di geografia medica, e sono la *pellagra* e l'*alcoolismo cronico ed acuto*.

La *pellagra* è malattia quasi limitata all'Italia settentrionale e centrale. Infatti le morti per questa causa avvennero nel 1911 nella proporzione di 15 ogni 100,000 abitanti nel Veneto, di 9 nell'Umbria, di 7 nelle Marche e nella Lombardia, di 4 nell'Emilia, di 2 nella Toscana e nel Lazio; mentre se ne contarono soltanto 16 casi in Piemonte, 3 in Liguria, 7 negli Abruzzi, 1 nelle Puglie, 4 nelle Calabrie ed 1 in Sicilia, e nessuno nella Campania, Basilicata e Sardegna. Cifre poco differenti si ebbero nei due anni 1909 e 1910.

I morti per *alcoolismo cronico* nel 1911 furono 740 ed i morti per infortuni causati da *ubbrachezza* 68; i quozienti di mortalità più alti si notarono nel Veneto, nelle Marche, nella Liguria, nella Lombardia, nel Piemonte e nel Lazio; i più bassi nelle Puglie, nella Basilicata, nella Sicilia, nella Campania e nelle Calabrie.

Nel prospetto seguente sono posti a raffronto i dati dell'anno 1911 con quelli di ciascuno degli anni dal 1897 al 1910 e dei due quinquenni 1887-91 e 1892-96. Da esso si scorge, pure a traverso una grande irregolarità di cifre, che l'aumento nella mortalità per alcoolismo si è accentuato particolarmente nel quinquennio 1905-1909 in parecchi compartimenti, in alcuni dei quali, come nelle Marche, nella Sardegna, nell'Umbria, nel Veneto, ecc., si ebbero nell'anno 1909 proporzioni molto elevate, mentre negli anni 1910 e 1911 tale mortalità scemò sensibilmente in quasi tutti i compartimenti suindicati. Essa diede nel 1911 un quoziente di 23 per ogni milione di abitanti, che è la metà di quello verificatosi nell'anno 1909.

Morti per alcoolismo cronico e per infortunio causato da ubbriachezza, in rapporto ad un milione di abitanti, in ciascun compartimento e nel Regno, negli anni dal 1887 al 1911 (a).

PROSPETTO N. 11

ANNI	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana	Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	REGNO
1887-91	19.4	35.4	25.5	25.4	12.7	10.1	30.2	13.5	16.1	7.6	5.4	9.0	6.3	10.4	9.6	27.6	16.2
1892-96	27.7	42.4	34.2	29.4	17.5	13.5	31.8	12.9	13.1	8.4	6.6	8.6	11.1	9.6	9.3	27.1	19.5
1897	26.6	34.5	32.9	25.0	17.5	9.3	25.1	10.8	14.0	7.8	4.5	4.8	10.1	5.2	7.0	15.6	16.8
1898	28.0	30.4	30.9	29.4	11.6	16.4	23.9	12.2	23.3	3.5	5.8	5.2	8.1	9.6	7.3	14.2	17.5
1899	26.7	21.7	30.0	33.8	18.2	12.7	31.4	16.7	18.8	11.2	4.5	7.3	6.1	5.9	5.5	28.1	18.1
1900	25.7	36.4	30.0	32.3	11.9	9.1	21.8	9.0	13.5	5.6	5.1	5.6	..	7.3	6.6	31.7	16.8
1901	17.7	25.0	20.9	32.4	7.3	6.7	13.2	12.0	16.7	6.3	7.0	5.1	12.3	5.8	3.7	16.4	13.4
1902	19.7	21.2	15.9	29.8	11.7	6.6	30.9	16.5	10.8	7.0	4.8	4.6	..	2.2	5.1	13.8	12.9
1903	21.4	12.8	22.0	28.2	6.9	7.0	33.7	15.0	7.4	4.2	5.1	3.5	6.3	4.4	2.8	11.2	12.8
1904	21.1	34.2	24.7	33.4	10.0	8.9	35.5	19.5	16.4	12.7	6.0	3.5	6.3	8.0	3.9	35.8	16.6
1905	39.1	40.9	41.4	51.3	24.6	26.8	37.4	17.9	21.2	12.8	11.6	9.0	8.5	13.1	5.0	49.1	27.3
1906	27.9	49.3	40.6	44.5	13.8	15.7	50.7	19.4	32.4	10.7	9.4	6.4	3.7	5.6	31.7	23.6	23.6
1907	27.5	42.7	35.5	55.5	21.9	14.8	41.3	25.2	18.4	12.8	2.8	6.9	8.6	13.9	3.6	25.4	22.9
1908	46.0	45.6	44.8	53.1	24.0	25.3	68.0	41.4	33.3	19.1	12.7	10.2	19.3	15.9	6.4	34.8	30.8
1909	54.8	64.5	50.7	94.8	46.7	35.7	124.1	81.0	50.2	29.5	19.0	13.5	19.2	25.4	8.6	100.0	46.6
1910	38.2	43.6	36.9	69.3	27.6	24.3	69.1	35.2	45.8	17.5	12.5	9.5	8.5	14.4	9.1	54.3	31.6
1911	30.1	38.4	33.0	44.2	17.5	16.3	41.1	23.3	27.6	18.2	12.7	6.1	6.3	15.0	9.0	22.3	23.3

§ 5. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerata nel suo complesso, la mortalità massima nel 1911 si verificò nel 1° trimestre, la minima nel 4°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per malattie fetali e vizi congeniti, atrofia congenita, marasmo senile, malattie dei reni, influenza, difterite e laringite crupale, risipola, febbre puerperale ed altre malattie di parto, malattie del cuore, diabete, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale e bronco polmonite acuta, pleurite, apoplezia cerebrale, encefalite, malattie delle arterie e per alcoolismo cronico. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per reumatismo articolare acuto e per suicidi. In estate (3° trimestre) le morti per febbre tifoidea, anemia e leucemia, gastrite, gastro enterite, epatite, appendicite, peritonite, morbillo, ipertosse, febbri da malaria, sifilide, tetano, pustola maligna, rabbia, affezioni tubercolari, meningite semplice, eclampsia infantile, tumori maligni, cause violente accidentali e per omicidi. In autunno (4° trimestre) toccarono i loro massimi le morti per vaiuolo, scarlattina e pellagra.

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XII.

§ 6. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso.

Morirono nel 1911, in tutto il Regno, 374,006 maschi e 368,805 femmine; nella ragione cioè di 101 maschi ogni 100 femmine: nell'anno 1910 tale rapporto era stato di 103 e nell'anno 1909 di 105.

Quantunque muoiano ogni anno più maschi che femmine, nondimeno parecchie malattie, comuni ai due sessi, sono maggiormente esiziali alle donne.

Infatti, nel 1911 morirono più femmine che maschi per febbre tifoidea, per ipertosse, per malattie tubercolari, per anemia e clorosi, per tabe senile, per tumori maligni, per vizi di cuore, per peritonite ed idrope-ascite e per astioni.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti di bambini nell'atto del parto e quelle per vizi congeniti; le morti per immaturità, per malattie dello stomaco, per sifilide, per febbri da malaria, per pellagra, per apoplezia, per encefalite e mielite, per eclampsia infantile, per polmonite crupale e bronco polmonite acuta, per pleurite, per rabbia, per aterosmia arteriosa, per epatite, per cistite, per sclerema, per alcoolismo e le morti violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio.

Risultanze quasi analoghe presentano le statistiche degli anni 1887 e seguenti.

§ 7. — Cause di morte predominanti nelle diverse età.

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, cioè dalla nascita a non oltre 1 mese, da 1 mese a non oltre 1 anno, e poi di anno in anno fino al 5° e per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della serie. Ma nelle notizie che formano oggetto di questa Introduzione, la classificazione dei morti per età è riassunta in otto gruppi, e cioè: dalla nascita a non oltre 1 anno, da oltre 1 anno a 5 anni compiuti, da oltre 5 a 10 compiuti, da oltre 10 a 20 compiuti, da oltre 20 a 40 compiuti, da oltre 40 a 60 compiuti, da oltre 60 a 80 compiuti e da 80 anni compiuti in su.

Nel prospetto N. 12 sono anche indicate le proporzioni dei morti classificati per malattie predominanti e per gruppi di età ad un milione di viventi coetanei, secondo il censimento del 10 giugno 1911 (a).

Si rileva dal suddetto prospetto che nel gruppo dei bambini d'ambo i sessi, che non avevano oltrepassato il primo anno di età, le cause più frequenti di morte, nell'anno 1911, sono state l'immaturità e la debolezza congenita, la diarrea infantile e la gastro enterite, la bronchite acuta, la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale, l'eclampsia infantile, la gastrite, l'anemia, la meningite semplice cerebrale e spinale e le malattie tubercolari.

(a) I viventi in età dalla nascita ad 1 anno sono, per numero, inferiori ad un milione; lo stesso dicasi per i viventi in età da 80 anni in su; e quindi le cifre [proporzionali calcolate per questi due gruppi ad un milione di viventi risultano più grandi delle cifre assolute dei morti in essi gruppi. Si sarebbe potuto evitare tale inconveniente confrontando i morti a 100,000 viventi, ma così facendo si sarebbe dovuto, in molti casi, fare uso di sole cifre decimali inferiori all'unità.

Nel gruppo da oltre 1 a 5 anni compiuti, per ogni milione di viventi, ne morirono 33,991. Tra le cause delle morti tennero il primo posto quelle per diarrea infantile e gastro enterite (7275 per un milione di viventi), vennero in seguito la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale (5119), la bronchite acuta (4582), le affezioni tubercolari (1904), il morbillo (1818), l'eclampsia infantile (1561), la meningite semplice cerebrale e spinale (1352), l'ipertosse (966), l'anemia (911), le malattie dei reni (863), le morti violente per cause accidentali (753), la difterite e la laringite crupale (746), la gastrite (692) ed il vaiuolo (624).

Nel gruppo da oltre 5 a 10 anni compiuti, per ogni milione di viventi, ne morirono 5291. In esso predominarono le morti per affezioni tubercolari (770 per un milione di viventi), la diarrea e l'enterite con 573, la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale con 562, la meningite semplice con 413, la bronchite acuta con 250, le morti violente per cause accidentali con 246, le malattie dei reni con 238, la febbre tifoidea con 235, il morbillo con 197, la scarlattina con 164, la difterite e laringite crupale con 147 ed il vaiuolo con 132.

Per ogni milione di viventi nel gruppo da 10 a 20 anni ne morirono 4052 ed in tale gruppo un terzo delle morti derivarono dalle affezioni tubercolari (1348 per ogni milione di viventi). Vennero appresso, a grande distanza, la febbre tifoidea (355), la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta (332), la diarrea e la gastro enterite (269), la meningite semplice (202), le morti violente per cause accidentali (196) e le malattie del cuore (191). E' da osservare, inoltre, che in questo gruppo di età le malattie tubercolari danno nelle femmine un quoziente di mortalità assai più grande di quello dei maschi.

Nel gruppo da oltre 20 a 40 anni compiuti, per ogni milione di viventi, ne morirono 7236. Più di un terzo di tali morti era dovuto alle affezioni tubercolari (2576 per un milione di abitanti); seguirono, a grande distanza, le morti per polmonite crupale e per bronco polmonite acuta con 713, l'enterite e la diarrea con 451, le malattie del cuore con 431, la febbre tifoidea con 345, le malattie dei reni con 224 e le morti violente per cause accidentali con 190. E' da osservare, inoltre, che, per ogni milione di donne viventi in questo gruppo di età, ne morirono 442 per malattie di gravidanza, parto e puerperio, compresa la febbre puerperale.

Nel gruppo da oltre 40 a 60 anni compiuti, per ogni milione di viventi, ne morirono 12,657. Tra le cause delle morti tennero il primo posto quelle per polmonite crupale e bronco polmonite acuta (1791 morti per ogni milione di viventi); a queste vennero in seguito le malattie del cuore (1693), le affezioni tubercolari (1476), i tumori maligni (1228), l'enterite e la diarrea (875), l'apoplessia e congestione cerebrale (828), le malattie dei reni (482), la bronchite acuta e cronica (367), l'epatite (320) e le morti violente per cause accidentali (273).

Nel gruppo da oltre 60 a 80 anni compiuti, per ogni milione di viventi, ne morirono 59,446. In esso predominarono le morti per malattie del cuore (12,030 per un milione di viventi), l'apoplessia e congestione cerebrale (7682); il marasma senile (7675), la polmonite crupale e la bronco polmonite acuta (7504), i tumori maligni (3696), la bronchite acuta e cronica (3189), l'enterite e la gastro enterite (2873), le malattie delle arterie (2469) e le malattie dei reni (1534). Le morti per affezioni tubercolari, le quali nei gruppi precedenti occupavano quasi sempre il primo posto, in questo, invece, sono rappresentate da un quoziente basso, e cioè da 1031 morti ogni milione di viventi.

Finalmente circa $\frac{1}{3}$ dei viventi nel gruppo da 80 anni compiuti in su morì per marasma senile. Dopo questa, ma a grandissima distanza, le malattie che causarono una mortalità più rilevante furono quelle del cuore, l'apoplessia e congestione cerebrale, la bronco polmonite acuta e la polmonite crupale, la bronchite acuta e cronica, le malattie delle arterie, l'enterite e la diarrea, i tumori maligni, le malattie dei reni, l'influenza e le morti violente per cause accidentali.

In conclusione, dall'esame delle proporzioni dei morti al totale dei viventi fra gli stessi limiti d'età, risulta che l'anemia, la gastrite, l'enterite e diarrea, la peritonite, il vaiuolo, la risipola, l'ipertosse, la malaria, la siflide, la bronchite acuta, le diverse affezioni tubercolari (esclusa la tubercolosi polmonare) e la meningite semplice furono, nell'anno 1911, più frequenti nel gruppo comprendente i bambini di non oltre un anno che negli altri gruppi di età; mentre il morbillo, la scarlattina, la difterite e laringite crupale dominarono nel gruppo da oltre 1 a 5 anni compiuti. La febbre tifoidea fu più frequente nel gruppo da 10 a 20 anni. La tubercolosi disseminata e polmonare colpì di preferenza il gruppo da oltre 20 a 40 anni, nel quale furono più frequenti anche le morti per omicidio.

L'epatite, il diabete e l'alcoolismo cronico inferirono specialmente nel gruppo da oltre 60 a 80 anni compiuti. Le nefriti, l'appendicite, l'influenza, la bronchite cronica, la polmonite crupale, la bronco polmonite acuta, la pleurite, le malattie del cuore e delle arterie, l'apoplessia e congestione cerebrale, il reumatismo articolare acuto, l'encefalite, la pellagra, i tumori maligni, i suicidi e gl'infortuni riuscirono più spesso letali nelle età estreme (da 80 anni compiuti in su) in confronto cogli altri gruppi d'età.

Come è ovvio, non abbiamo qui fatto cenno speciale delle malattie che sono proprie di qualche determinato gruppo d'età, come le malattie fetali e i vizi congeniti, l'immatùrità, il marasma senile e l'eclampsia infantile.

Segue **Morti nel Regno nell'anno 1911 classificati per età e principali cause di morte.**

B) **Cifre proporzionali a 1000 morti dei rispettivi gruppi di età.**

Segue **PROSPETTO N. 12.**

UMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Numero dei morti d'ambo i sessi in età									TOTALE GENERALE
		di non oltre 1 anno	da oltre 1 anno a 5 anni compiti	da oltre 5 a 10 anni compiti	da oltre 10 a 20 anni compiti	da oltre 20 a 40 anni compiti	da oltre 40 a 60 anni compiti	da oltre 60 a 80 anni compiti	da 80 anni compiti in su		
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	13.3	1.7	1.5	0.6	3.4
6	Atrofia congenita, immaturità	230.3	53.1
39	Aнемia	32.3	27.0	10.6	11.0	13.4	13.2	15.4
40	Leucemia	1.3	4.2	3.3	5.3	6.6	3.8	1.2	0.1	..	2.6
44	Marasmo senile	129.3	473.2	..	73.3
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	43.5	20.5	9.2	4.1	3.0	4.9	3.9	2.1	..	15.6
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	221.3	215.5	109.3	66.9	62.8	69.6	43.4	30.7	..	118.6
99	Epatite, cirrosi epatica	0.9	1.1	2.1	3.2	3.4	25.4	11.7	2.3	..	7.4
112	Malattie dei reni	6.7	25.6	45.4	24.0	31.2	38.4	25.8	11.6	..	22.6
110	Appendicite	0.3	2.7	5.4	2.8	2.1	0.7	0.2	..	1.0
110 a	Peritonite	2.0	4.1	15.6	19.5	14.8	8.1	2.8	0.9	..	5.3
7	Vaiuolo	8.5	18.5	25.1	7.0	5.8	1.6	0.2	0.1	..	6.5
8	Morbillo	9.1	53.8	37.5	3.6	0.8	0.1	11.6
9	Scarlattina	0.9	12.7	31.3	8.1	1.0	0.1	3.4
10	Risipola	5.5	1.0	1.0	2.0	2.3	3.2	1.9	1.4	..	2.7
11	Febbre tifoidea	1.4	10.0	44.9	88.1	48.0	12.4	2.4	0.6	..	12.9
12	Tifo petecchiale	0.1	0.3	0.1	0.1
16	Ipertosse	19.7	28.6	10.0	0.5	0.1	9.2
14	Difterite	1.1	11.9	19.2	3.0	0.3	0.1	2.8
15	Laringite crupale	1.6	10.2	8.8	1.2	0.1	2.2
18	Febbri da malaria	3.6	10.4	16.4	10.8	5.1	4.5	1.8	0.6	..	4.8
19	Cachessia palustre	0.7	2.6	3.1	1.4	1.2	1.7	0.7	0.1	..	1.2
17	Influenza	5.3	5.3	7.5	7.3	6.0	7.7	10.7	10.8	..	7.7
22	Sifilide	5.8	1.0	0.5	0.6	4.1	3.8	0.6	0.2	..	2.5
71	Tetano e trisma	0.1	0.2	3.9	4.3	1.7	1.3	0.4	0.7
24	Pustola maligna, carbonchio	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	1.0	0.3	0.1	..	0.3
27	Rabbia	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1
124	Febbre puerperale	1.4	11.8	1.1	1.3
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1.7	20.7	2.8	2.3
77	Bronchite acuta	135.7	135.7	47.6	19.4	13.1	15.8	28.5	31.9	..	67.3
78	Bronchite cronica	8.5	5.1	7.3	7.8	13.5	25.2	20.6	..	12.3
81	Polmonite crupale	22.4	40.7	36.3	43.0	62.9	93.2	65.9	28.8	..	50.0
82	Bronco polmonite acuta	57.5	110.9	70.9	39.5	36.3	49.4	60.5	44.2	..	62.2
79	Malattie della pleura	1.1	3.8	6.6	7.5	9.6	7.7	3.5	1.0	..	4.0
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	4.2	12.9	43.6	243.2	313.6	100.9	13.6	1.5	..	57.2
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	16.2	43.5	103.0	91.6	44.8	16.5	3.8	0.8	..	23.7
90	Malattie del cuore	1.7	7.2	22.5	47.4	60.0	134.7	202.7	127.2	..	83.6
87	Malattie delle arterie	0.7	0.4	0.8	0.9	3.2	17.9	41.6	43.5	..	17.2
64	Apoplessia e congestione cerebrale	0.2	0.6	1.9	4.0	11.3	65.9	129.4	91.3	..	50.5
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	21.0	40.1	78.7	50.1	16.4	7.4	1.8	0.6	..	17.8
63	Encefalite	0.9	1.6	3.5	3.0	1.9	2.6	1.6	0.8	..	1.6
72	Eclampsia infantile	69.7	46.3	23.8	3.0	23.9
134	Reumatismo articolare acuto	0.2	0.3	3.9	6.4	2.9	2.7	1.8	0.3	..	1.5
45	Pellagra	0.4	0.1	1.0	3.9	3.9	0.9	..	1.7
47	Diabete	0.1	0.5	1.8	2.2	6.5	4.7	0.8	..	2.3
138	Alcoolismo cronico	1.6	4.0	1.5	0.1	..	1.0
48 a 58	Tumori maligni	0.3	1.1	4.6	7.0	21.1	97.7	62.3	16.9	..	31.3
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale	1.8	22.3	46.8	48.6	26.5	21.7	10.3	6.0	..	15.0
157	{ per omicidio	0.1	0.1	0.9	5.3	7.6	3.2	0.5	0.1	..	1.5
160 a 163	{ per suicidio	9.8	16.4	9.7	2.5	0.7	..	3.7
	Altre malattie	51.3	57.5	88.8	78.8	86.9	114.9	91.6	46.5	..	75.2

Segue **Morti nel Regno nell'anno 1911 classificati per età e principali cause di morte.**

(C) **Cifre proporzionali ad 1.000.000 di viventi costanti (a).**

Segue **PROSPETTO N. 13**

NUMERO dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Numero dei morti d'ambo i sessi in età								TOTALE GENERALE
		di non oltre 1 anno (b)	da oltre 1 anno a 5 anni compiuti	da oltre 5 a 10 anni compiuti	da oltre 10 a 20 anni compiuti	da oltre 20 a 40 anni compiuti	da oltre 40 a 60 anni compiuti	da oltre 60 a 80 anni compiuti	da 80 anni compiuti in su (b)	
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	2 361	56	8	2	72
6	Atrofia congenita, immaturità	40 982	1 132
39	Anemia	5 742	911	55	44	96	204	327
40	Leucemia	237	140	17	21	47	48	71	38	55
44	Marasmo senile	7 675	121 092	1 562
97	Malattie dello stomaco, atrespia	7 736	692	43	16	22	61	233	536	333
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	39 373	7 275	573	269	451	875	2 873	7 840	2 528
99	Epatite, cirrosi epatica	157	36	11	13	61	320	692	582	159
112	Malattie dei reni	1 194	863	238	97	224	482	1 534	2 062	481
110	Appendicite	4	10	14	22	20	27	44	59	22
110a	Peritonite	355	140	82	78	108	102	166	243	114
7	Vaiuolo	1 520	624	132	28	42	20	12	29	139
8	Morbillo	1 624	1 818	197	14	6	1	2	13	247
9	Scarlattina	154	429	164	33	7	1	2	4	73
10	Risipola	973	35	5	8	17	40	113	368	58
11	Febbre tifoidea	258	339	235	353	345	156	146	159	275
12	Tifo petecchiale	1	1	1	1	1	1
16	Ipertosse	3 506	966	53	2	1	..	1	4	197
14	Difterite	198	401	101	12	2	1	3	4	59
15	Laringite crupale	276	345	46	5	1	..	2	8	48
18	Febbri da malaria	644	352	86	43	37	57	108	146	102
19	Cachessia palustre	124	87	16	6	8	21	43	29	25
17	Influenza	950	178	39	30	43	97	638	2 757	163
22	Sifilide	1 025	35	3	3	30	48	38	46	54
71	Tetano e trisma	11	7	21	17	12	16	21	13	15
24	Pustola maligna, carbonchio	11	5	2	3	4	13	15	17	7
27	Rabbia	2	2	1	1	2	1	..	1
124	Febbre puerperale	6	85	14	27
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	7	148	35	49
77	Bronchite acuta	24 140	4 582	250	78	91	198	1 604	8 163	1 434
78	Bronchite cronica	285	27	29	56	169	1 495	5 276	262
81	Polmonite crupale	3 984	1 374	190	173	452	1 171	3 915	7 368	1 066
82	Bronco polmonite acuta	10 230	3 745	372	159	261	620	3 589	11 314	1 324
79	Malattie della pleura	188	130	35	30	69	97	206	268	86
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonee	745	434	229	979	2 254	1 268	808	385	1 219
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	2 881	1 470	541	369	322	208	223	209	504
90	Malattie del cuore	310	244	118	191	431	1 693	12 030	32 552	1 888
87	Malattie delle arterie	124	13	4	4	23	224	2 469	11 142	366
64	Apoplessia e congestione cerebrale	35	19	10	16	81	828	7 682	23 339	1 076
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	3 732	1 352	413	202	118	93	108	146	380
63	Encefalite	152	54	18	12	13	33	92	209	34
72	Eclampsia infantile	12 401	1 561	125	12	510
134	Reumatismo articolare acuto	40	10	21	26	21	34	104	209	33
45	Pellagra	2	1	2	1	7	49	230	230	35
47	Diabete	6	2	2	7	16	81	276	205	49
138	Alcoolismo cronico	12	51	86	38	21
48 a 58	Tumori maligni	49	36	24	28	152	1 228	3 696	4 326	668
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale	316	753	246	196	190	273	610	1 548	320
157	{ per omicidio	15	4	5	21	55	40	33	21	31
160 a 168	{ per suicidio	40	118	122	151	180	79
	Altre malattie	9 189	1 938	467	318	625	1 447	5 427	11 803	1 599
	Causa ignota o non dichiarata	843	237	43	25	49	88	89	256	105
	TOTALE GENERALE	178 797	88 991	5 291	4 052	7 288	12 657	59 446	256-145	21 414

(a) Secondo il censimento del 10 giugno 1911.

(b) Veggasi la nota a pagina XLV.

§ 8. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini.

I bambini morti prima di aver compiuto cinque anni di età sono stati divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima; in questa seconda categoria sono compresi anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI a pagina 76).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1911 a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 50 ed entro il primo anno d'età 152; e che per 1000 nati illegittimi ed esposti, ne morirono nel primo mese 105 ed entro il primo anno di età 242.

Mortalità nel Regno dei bambini di età non superiore ad un anno, senza distinzione di sesso.

PROSPETTO N. 13.

	NATI VIVI nel 1911	MORTI NEL 1911		MORTI PER 1000 NATI VIVI					
		Non oltre 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	Non oltre 1 mese			Da 1 mese ad 1 anno		
				1909	1910	1911	1909	1910	1911
Legittimi	1 039 559	52 044	106 234	58	49	50	96	87	102
Illegittimi ed esposti	53 986	5 677	7 413	107	98	105	117	115	137

Mortalità nel Regno dei bambini di età non superiore a 5 anni, distinti per sesso.

PROSPETTO N. 14.

	BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1911				PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti sotto 5 anni			
	Non oltre 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	da oltre 1 anno a non oltre 5 anni compiuti	Totale dei bambini morti sotto i 5 anni	1909	1910	1911	
Legittimi	Maschi	28 456	56 254	55 493	140 203	53	53	52
	Femmine	23 588	49 980	54 375	127 943	47	47	48
Illegittimi ed esposti	Maschi	2 949	3 719	2 034	8 702	50	50	51
	Femmine	2 728	3 694	2 104	8 526	50	50	49

La proporzione delle bambine illegittime morte nei primi cinque anni d'età, è maggiore che non fra i legittimi.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti nel Regno durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi, negli anni 1909, 1910 e 1911.

Cause più frequenti delle morti nel Regno dei bambini di età non superiore ad un anno, negli anni 1909, 1910 e 1911.

PROSPETTO N. 15.

CAUSE DI MORTE (a)	PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età					
	Legittimi			Illegittimi ed esposti		
	1909	1910	1911	1909	1910	1911
Malattie fetali e vizi congeniti	2.1	2.1	2.0	2.6	2.5	2.8
Atrofia congenita, immaturità.	37.8	33.9	34.4	65.3	60.7	65.7
Anemia, leucemia	3.0	2.6	5.1	5.1	5.0	7.9
Malattie dello stomaco, atrepsia.	4.4	4.2	6.3	12.4	11.0	15.8
Diarrea, enterite, colera indigeno	44.0	37.4	33.7	60.6	58.5	51.0
Epatite	0.1	0.1	0.1	..	0.2	0.2
Malattie dei reni	0.7	0.7	1.0	1.3	1.2	1.4
Peritonite e appendicite.	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
Vaiuolo	0.2	0.1	1.4	0.1	0.1	0.6
Morbillo	1.6	1.4	1.4	1.5	0.9	1.3
Scarlattina.	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
Risipola	1.1	0.9	0.8	1.1	0.8	1.3
Febbre tifoidea	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Ipertosse	2.3	2.4	3.1	2.0	2.1	2.8
Difterite e laringite crupale	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
Febbri da malaria e cachessia palustre	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.7
Influenza	0.9	0.5	0.8	0.6	0.3	0.9
Sifilide	0.4	0.3	0.4	7.5	9.1	11.1
Bronchite acuta	19.0	16.6	21.0	19.0	17.3	24.5
Polmonite crupale	3.2	2.8	3.5	3.7	3.0	4.1
Bronco polmonite acuta	7.5	6.9	8.9	7.1	7.8	10.5
Malattie della pleura	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	2.4	2.3	3.1	3.2	3.7	4.2
Malattie del cuore	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
Malattie delle arterie.	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4
Apoplessia e congestione cerebrale	0.1	0.1	..
Meningite semplice cerebrale e spinale	2.6	2.6	3.3	1.8	1.6	2.9
Encefalite	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Eclampsia infantile	9.6	8.6	10.8	10.9	10.6	13.0
Morte violenta accidentale	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4
TOTALE DEI MORTI PER QUALSIASI CAUSA .	153.6	136.2	152.3	224.5	213.2	242.5

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che negli anni 1909-1911 non furono causa di morte nei bambini di non oltre un anno d'età o ne causarono un numero minimo.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è assai più grande di quella dei legittimi, e ciò perchè non pochi fra i primi nascono con una costituzione fisica debole o sono affetti da lue congenita; ma, forse in misura maggiore, vi contribuiscono il difetto di cure e l'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per susseguente matrimonio dei genitori, ed i bambini morti dopo essere stati legittimati sono classificati fra i legittimi, mentre nella statistica dei nati sono stati iscritti fra gli illegittimi.

§ 9. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile.

Nella tavola IV, a pagina 52, sono classificati i maschi morti nel 1911 in età di oltre 15 anni compiuti, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da quella tavola si può rilevare in quali professioni gli individui maschi adulti siano di preferenza colpiti da determinate malattie.

Convien per altro stare in guardia contro alcune cause di errore in cui si può incorrere nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni. Alcune professioni, come quelle di medico, avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedono una carriera preparatoria assai lunga, e pertanto possono essere esercitate solo da individui che abbiano almeno 23 o 24 anni di età; e per queste professioni non vi possono essere morti di età più giovane, mentre si hanno molti morti fra 15 e 20 anni nelle professioni di agricoltore o di marinaio o di tipografo. D'altra parte, non pochi individui, coll'avanzare dell'età, cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro forze, devono procurarsi una occupazione meno faticosa. Si troveranno perciò pochi morti in età avanzata fra i commessi di negozio, non perchè siano morti quasi tutti in età giovane, ma perchè parecchi col tempo sono diventati padroni e all'atto di morte sono registrati fra i negozianti; così pure parecchi facchini e marinai vecchi sono ridotti alla condizione di bracciante, e quasi tutti gli impiegati, i maestri, gli ufficiali dell'esercito e le guardie sono passati, nell'età avanzata, nella categoria dei pensionati.

Nei confronti istituiti nelle pagine seguenti, ci siamo limitati a indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, durante l'anno 1911, in età di 15 anni e più, che esercitavano la medesima professione. Accanto alle proporzioni dell'anno 1911 abbiamo indicate, a titolo di confronto, anche quelle degli anni 1909 e 1910.

Su 100 maschi morti nel Regno, in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia, negli anni 1909, 1910 e 1911.

Morti per febbri da malaria e cachessia palustre.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Pastori, mandriani . .	1.4	1.6	1.9	Agricoltori, boscaioli .	0.7	0.8	0.6
Corpi armati (escluso l'esercito)	0.3	0.4	1.0	Macchinisti e fuochisti . .	0.6	0.6	0.6
				Di qualsiasi professione	0.4	0.5	0.4

Morti per febbre tifoidea.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Militari	11.4	11.9	13.0	Fattorini postali e telegrafici	1.7	2.1	2.0
Studenti	7.2	5.5	4.7	Camerieri d'esercizi pubblici	3.0	1.5	2.0
Lattai e casari	2.8	4.5	4.6	Conciatori	0.4	1.2	1.9
Macchinisti e fuochisti .	1.2	2.6	3.5	Tipografi, litografi . .	3.3	3.0	1.9
Infermieri	2.4	2.5	2.7	Commessi e ragionieri	1.9	3.4	1.8
Fabbrì, meccanici, arrotini	1.8	2.2	2.3	Ferrovieri e tramvieri	2.5	2.9	1.8
Vetrai	3.7	..	2.1	Di qualsiasi professione	1.4	1.4	1.4
Fabbricanti ed operai non specificati . .	2.3	1.5	2.0				

Morti per pellagra.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Mendicanti e ricoverati	1.0	1.0	0.8	Agricoltori, boscaioli .	0.6	0.6	0.5
Cestai	0.6	Di qualsiasi professione	0.4	0.4	0.3

Morti per apoplezia cerebrale.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Sacerdoti, monaci . .	12.7	13.3	13.4	Cappellai, guantai . .	7.1	8.0	10.6
Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziarì	10.2	12.8	13.2	Medici, veterinari . . .	9.3	13.0	10.5
Proprietari e benestanti	11.9	12.5	13.1	Sarti	11.0	11.8	10.5
Droghieri e farmacisti .	10.9	13.3	12.1	Domestici, portieri . .	11.0	12.2	10.4
Impiegati e pensionati civili	11.2	12.4	11.2	Lattai e casari	7.1	11.2	10.4
Maestri e professori . .	12.8	10.7	11.0	Cestai	6.6	7.2	10.3
Caffettieri, pasticciieri .	8.2	9.3	10.7	Mendicanti e ricoverati	10.2	10.6	10.2
Ingegneri, agrimensori .	13.8	12.7	10.7	Filatori, tessitori, tintori	10.8	12.2	10.0
				Di qualsiasi professione	9.4	10.0	9.3

Segue Su 100 maschi morti nel Regno, in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia, negli anni 1909, 1910 e 1911.

Morti per tubercolosi disseminata e tisi polmonare.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Studenti	41.3	42.6	38.4	Falegnami, verniciatori .	14.8	15.6	15.7
Tipografi, litografi . .	26.9	25.4	29.4	Calzolai, sellai	15.0	15.1	15.4
Camerieri d'esercizi pubblici	26.8	26.8	27.5	Sarti	16.5	16.5	15.3
Commessi e ragionieri .	24.6	22.2	23.7	Cappellai, guantai . . .	19.3	10.8	15.3
Barbieri	21.9	21.3	21.2	Fabbricanti ed operai non specificati	15.5	16.6	15.2
Vetrai	17.8	15.2	20.3	Caffettieri, pasticciere .	12.6	11.6	15.0
Fattorini postali e telegrafici	16.6	20.0	19.1	Mecchinisti e fuochisti .	16.0	13.1	14.0
Fabbri, meccanici, arrotini	19.0	18.9	19.0	Muratori, scalpellini, fumisti	12.8	14.0	13.7
Infermieri	19.2	21.8	18.7	Fornaciai	9.6	10.6	13.5
Orefici, orologiai . . .	16.5	17.5	17.4	Mugnai, pastai, fornai .	11.7	13.0	12.4
Ferrovieri e tramvieri .	17.4	15.8	16.6	Facchini, lavandai, spazzini	10.6	12.2	12.0
Cestai	10.4	15.0	16.6	Di qualsiasi professione .	8.6	9.0	8.5
Tappezzieri e materassai	11.5	13.7	16.6				

Morti per polmonite crupale e bronco polmonite acuta.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Pastori, mandriani . . .	18.3	18.6	18.6	Facchini, lavandai, spazzini	16.3	13.2	13.7
Agricoltori, boscaioli .	14.9	13.3	14.4	Braccianti, manovali . .	14.6	12.4	13.0
Minatori, marmisti . . .	16.5	14.7	14.1	Di qualsiasi professione	13.1	11.6	12.4

Morti per malattie del cuore.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Agricoltori, boscaioli .	14.4	15.2	14.3	Proprietari e benestanti	12.8	14.3	13.4
Domestici, portieri . . .	13.3	14.7	14.3	Cartai	14.4	18.1	13.2
Trattori, vinai	12.8	14.1	14.2	Negozianti, albergatori .	13.2	13.1	13.2
Sacerdoti, monaci	12.2	12.8	14.1	Mugnai, pastai, fornai .	12.3	14.4	13.2
Tappezzieri e materassai	14.3	12.4	13.8	Filatori, tessitori, tintori	14.9	14.0	13.2
Droghieri e farmacisti .	10.3	10.6	13.5	Di qualsiasi professione .	12.9	13.7	12.9

Segue Su 100 maschi morti nel Regno, in età di 15 anni e più per qualsiasi malattia, negli anni 1909, 1910 e 1911.

Morti per enterite e diarrea.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Marinai, pescatori . . .	4.2	5.2	8.5	Pastori, mandriani . . .	4.1	5.3	5.8
Mendicanti e ricoverati	7.3	6.3	8.4	Di qualsiasi professione	4.0	4.1	5.0
Conciatori	6.0	2.7	6.2				

Morti per malattie renali.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Maestri e professori . .	5.3	5.4	7.6	Impiegati e pensionati civili	3.7	4.5	4.1
Vetrai	3.0	3.6	7.0	Sacerdoti, monaci . . .	4.3	5.8	4.0
Ingegneri, agrimensori .	4.1	7.4	6.0	Conciatori	3.2	5.1	4.0
Infermieri	4.0	4.2	6.0	Orefici, orologiai . . .	5.0	4.1	4.0
Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari	5.5	6.5	5.7	Negozianti, albergatori	3.8	4.1	4.0
Medici, veterinari . . .	3.9	6.1	5.6	Domestici, portieri . .	2.6	4.4	3.6
Cartai	2.0	2.9	5.6	Corpi armati (escluso l'esercito)	2.6	4.1	3.6
Camerieri d'esercizi pubblici	3.9	2.8	4.5	Fattorini postali e telegrafici	2.4	2.9	3.6
Droghieri e farmacisti .	2.9	3.3	4.4	Proprietari e benestanti	3.6	3.8	3.4
Macchinisti e fuochisti	3.3	4.5	4.1	Di qualsiasi professione	2.5	2.8	2.6

Morti per cirrosi del fegato.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Trattori, vinai	5.6	5.8	6.7	Fattorini postali e telegrafici	2.9	2.9	2.8
Caffettieri, pasticciieri .	3.7	2.7	3.9	Infermieri	3.2	5.9	2.7
Macellai, pizzicagnoli . .	4.5	4.3	3.8	Ferrovieri e tramvieri .	2.3	2.7	2.7
Droghieri e farmacisti	2.9	5.9	3.7	Proprietari e benestanti	2.4	2.6	2.4
Cappellai, guantai . . .	3.4	3.6	3.6	Impiegati e pensionati civili	2.7	2.9	2.4
Negozianti, albergatori .	3.4	4.3	3.5	Di qualsiasi professione	1.8	1.9	1.7
Conciatori	2.0	1.2	3.1				

CAPO III.

MORTALITA' NEI COMUNI URBANI PIU' IMPORTANTI.

§ 1. — Confronto fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni, durante il periodo 1881-1911.

Giova mettere a raffronto le cifre della mortalità avvenuta nei Comuni capiluoghi di provincia e di circondario con quelle di tutti gli altri Comuni. I Comuni del primo gruppo sono, per la massima parte, grossi centri di popolazione urbana, mentre quelli del secondo gruppo sono, per lo più, piccoli centri e i loro abitanti vivono, per la maggior parte, sparsi per le campagne. Dal confronto fra le due serie di cifre si potrà rilevare quale influenza eserciti la distribuzione territoriale della popolazione sulle condizioni sanitarie di essa.

Nel prospetto n.º 16 diamo le cifre concernenti il periodo 1881-1886 per ciò che riguarda i 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto, e quelle relative agli anni 1887-1911 per i 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario e per i rimanenti Comuni del Regno. Per gli anni 1902-1911 abbiamo anche indicato separatamente le cifre che si riferiscono ai 78 Comuni di media importanza, ai quali si è già ripetutamente accennato (a).

Le cifre di popolazione che hanno servito per il calcolo dei quozienti di mortalità negli anni 1887-1911, si sono ottenute coi criteri esposti nel paragrafo 3 del Capo I (pag. V) e rappresentano la popolazione totale dei rispettivi Comuni, sia stabile, sia occasionale; così pure nelle cifre dei decessi sono compresi tutti i morti nel territorio del Comune, senza distinzione di dimora.

Confrontando la mortalità nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario con quella degli altri Comuni del Regno, nei periodi di tempo considerati nel prospetto n.º 16, si notano le seguenti differenze:

Il *morbillo*, la *scarlattina* e l'*ipertosse* causarono un numero di morti minore, relativamente alla popolazione, nei centri principali che non nei piccoli Comuni.

Il *vaiuolo* nel periodo 1887-1901 diede nelle Città un quoziente di mortalità poco più grande di quello verificatosi nei piccoli Comuni; nel quadriennio 1902-1905 fu più grave nei secondi che nelle prime; nel triennio 1906-1908 si mantenne quasi con lo stesso quoziente nei due gruppi di Comuni e nel triennio 1909-1911, e specialmente nell'anno 1911, diede un quoziente più grande nelle Città in confronto a quello dei piccoli Comuni.

(a) Ricordiamo che questo numero è costituito da 17 capiluoghi di distretto e da 61 Comuni non capiluoghi che avevano, al 10 febbraio 1901, più di 20,000 abitanti.

La febbre *tifoidea* negli anni 1887-1897 diede nei piccoli Comuni un quoziente di mortalità più grande di quello osservatosi nei grossi centri; nel quadriennio 1898-1901 si mantenne con lo stesso quoziente nei due gruppi di Comuni, e per tutti gli anni seguenti causò nelle Città un quoziente più alto di quello dei piccoli Comuni.

Quanto alla *difterite* si osservano piccolissime differenze fra i centri principali ed i piccoli Comuni.

L'*infezione malarica*, nei Comuni rurali, ebbe un grado di perniciosità quasi doppio di quello che spiegò nei maggiori centri, sebbene questi siano di preferenza sede di ospedali o di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei piccoli Comuni finitimi.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* furono alquanto più esiziali nei centri principali che nei piccoli Comuni; la *sifilide* diede nelle Città un quoziente di mortalità quattro volte più grande di quello osservato in media nei Comuni minori; e la proporzione delle morti per *alcoolismo cronico* fu nelle prime più che doppia di quella calcolata per l'insieme dei secondi. Anche la *tisi* e le altre *malattie tubercolari* diedero nelle prime quozienti di mortalità molto più alti di quelli osservati nei secondi; la *diarrea* e l'*enterite* fecero invece un numero relativamente maggiore di vittime nei piccoli Comuni in confronto delle Città.

Le morti per *pellagra*, per *febbre puerperale* e quelle *violente per cause accidentali* avvengono quasi con pari frequenza nelle popolazioni dei due gruppi di Comuni; quelle per *suicidio* invece sono quasi tre volte più numerose, rispetto alla popolazione, nei grossi centri.

Nei 78 Comuni non capiluoghi, che abbiamo considerati a parte, la mortalità per vaiuolo, morbillo, scarlattina, febbri da malaria e diarrea, è stata, negli anni 1902-1911, più forte che nei Comuni capiluoghi, e ciò perchè i primi appartengono, per la maggior parte, ai compartimenti dell'Italia meridionale, nei quali le morti per malattie infettive sono relativamente più frequenti che altrove.

Presa nel suo insieme la mortalità nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario fu nel 1911 di 226 ogni 10,000 abitanti, mentre negli altri 8117 Comuni non oltrepassò i 210. In questo secondo gruppo sono compresi anche i 78 Comuni suaccennati, nei quali la mortalità raggiunse la proporzione di 239 per 10,000 abitanti.

Morti nei Comuni capiluoghi di provincia, di circondario o distretto ed in altri 78 Comuni più

PROSPETTO N. 10.

Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea e tifo petecchiale	Difterite e laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre
---------	----------	-------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------	--

A) Cifre

Morti nei 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto (*)		1881-86	12 151	27 529	12 360	42 867	39 777	11 251	20 951
anni	1887-93	1887-93	15 375	23 679	10 251	33 141	(a) 24 848	(b) 3 247	18 176
	>	1894-97	1 890	7 702	2 292	13 919	11 202	4 194	9 026
	>	1898-901	1 686	5 538	1 628	14 678	5 869	4 502	8 396
	>	1902-905	2 249	6 201	1 318	13 064	4 636	3 876	5 257
	anno	1906	47	1 799	586	2 559	1 191	980	800
	>	1907	53	1 529	598	2 391	1 514	1 030	801
Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario.	>	1908	137	2 435	612	2 514	1 501	813	605
	>	1909	367	2 445	308	2 789	1 481	777	649
	>	1910	228	2 052	657	2 489	1 225	969	661
	>	1911	2 258	1 861	617	2 665	1 030	1 188	735
	anni	1902-905	3 191	1 683	392	2 936	792	1 081	1 999
	anno	1906	6	465	285	542	215	224	386
Morti nei 78 Comuni non capiluoghi, ma assai popolosi (**)	>	1907	26	393	90	527	248	312	349
	>	1908	74	484	175	590	282	288	263
	>	1909	134	734	90	575	298	203	228
	>	1910	20	1 150	281	569	276	196	237
	>	1911	844	375	239	545	254	328	315
	anni	1887-93	46 418	94 149	48 998	116 364	(a) 93 781	(b) 20 177	99 746
>	1894-97	6 750	30 276	13 174	47 311	34 016	27 343	43 704	
>	1898-901	2 660	21 713	10 019	44 524	20 066	24 285	43 216	
>	1902-905	9 788	23 113	5 311	33 152	12 716	21 572	29 476	
anno	1906	122	7 927	2 138	6 900	3 062	5 185	4 671	
>	1907	398	6 655	2 342	6 262	4 120	5 112	3 430	
Morti negli altri Comuni del Regno (e).	>	1908	422	9 305	2 852	6 798	4 420	4 732	2 873
	>	1909	391	8 598	1 395	6 991	4 300	4 441	2 884
	>	1910	185	7 845	2 246	6 491	3 603	4 447	2 960
	>	1911	2 570	6 712	1 898	6 896	2 652	5 645	3 685

popolosi (1), confrontati coi morti negli altri Comuni del Regno, durante gli anni dal 1881 al 1911.

Sifilide	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Pellagra	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	Febbre puerperale	Alcoolismo cronico	Morti violente per cause accidentali	Suicidi	Totale dei morti per qualsiasi causa
----------	---	----------	--	--	-------------------	--------------------	--------------------------------------	---------	--------------------------------------

assolute.

6 632	141 543	13 480	85 819	123 648	2 878	1 790	15 468	4 477	1 243 177
8 312	140 479	6 712	131 572	(b) 64 011	(b) 1 034	(b) 742	(b) 7 007	(b) 2 418	1 371 161
5 177	77 120	3 036	80 529	85 522	1 173	783	(c) 6 982	(c) 2 637	736 089
5 100	75 694	4 210	80 092	88 364	997	807	9 875	3 736	732 257
4 804	73 571	2 545	(d) 41 698 39 761	93 325	1 008	816	11 331	3 894	740 542
1 112	19 186	565	(d) 10 192 10 910	23 738	304	292	2 719	1 035	183 664
1 059	19 549	406	(d) 11 476 11 536	22 056	295	250	3 034	1 194	186 938
1 023	19 833	349	(d) 9 715 10 695	20 875	310	313	(f) 72 015	1 337	(f) 251 988
954	19 819	410	(d) 10 617 12 738	23 265	319	571	3 779	1 380	198 603
1 082	19 011	359	(d) 8 904 10 893	20 720	287	399	2 937	1 343	182 591
1 165	20 457	282	(d) 9 754 13 376	21 576	266	250	2 877	1 359	202 905
395	12 841	582	(d) 9 337 7 950	34 490	134	80	2 309	378	182 462
98	3 254	126	(d) 2 117 2 074	8 609	54	28	543	111	43 584
74	3 283	117	(d) 2 309 2 320	8 121	65	28	601	104	44 220
88	3 154	81	(d) 2 170 2 261	7 847	55	42	(g) 636	134	(g) 43 224
75	3 195	87	(d) 2 309 2 509	8 770	62	55	601	143	45 675
79	3 135	105	(d) 1 916 2 237	7 869	56	35	537	127	44 258
82	3 445	91	(d) 2 271 3 074	6 196	50	25	595	121	48 732
6 493	288 705	19 108	370 212	(b) 248 776	(b) 3 903	(b) 992	(b) 23 457	(b) 2 739	4 217 060
4 012	155 232	9 146	223 915	337 324	4 436	1 376	(c) 22 841	(c) 2 990	2 277 827
3 583	152 750	10 455	216 111	332 460	3 546	1 226	31 375	4 396	2 187 354
2 959	142 460	7 198	(d) 122 504 96 022	346 816	3 200	1 331	33 674	4 573	2 151 894
702	37 134	1 459	(d) 27 153 25 376	85 115	717	410	6 101	1 284	513 211
698	37 776	1 229	(d) 29 891 27 642	75 133	832	413	8 408	1 251	513 395
669	36 701	985	(d) 27 579 26 567	74 071	935	588	(h) 17 155	1 356	(h) 513 066
599	37 563	1 010	(d) 28 931 28 806	81 855	923	837	9 164	1 589	539 857
648	36 326	953	(d) 23 760 26 524	74 157	724	576	8 069	1 537	499 868
696	39 307	940	(d) 27 239 32 567	66 121	663	490	8 211	1 395	539 906

o distretto.

riferiscono soltanto agli anni 1894, 1896 e 1897. — (d) Il primo numero riguarda i morti per polmonite crupale; il secondo quelli per non capiluoghi di provincia, nè di circondario. — (f) Compresa le vittime del terremoto, in numero di 68 983. — (g) Compresi 4 morti nel

(*) Per gli anni 1881-86 la statistica delle cause di morte si limitava a dare le notizie per soli Comuni capiluoghi di provincia, di circondario o distretto. — (**) Veggasi la nota (a) a pagina LVIII. — (a) Non compresi i morti per laringite crupale. — (b) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1891-92-93. — (c) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1894, 1896 e 1897. — (d) Il primo numero riguarda i morti per polmonite crupale; il secondo quelli per non capiluoghi di provincia, nè di circondario. — (f) Compresa le vittime del terremoto, in numero di 68 983. — (g) Compresi 4 morti nel disastro del terremoto. — (h) Compresa le vittime del terremoto, in numero 8.300.

Segue **Morti nei Comuni capiluoghi di provincia, di circondario o distretto ed in altri 78 Comuni più**

Segue **PROSPETTO N. 16.**

	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea e tifo petecchiale	Difterite o laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre
B) Cifre proporzionali							
Morti nei 284 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto (*)	2.8	6.4	2.9	9.9	9.2	2.6	4.9
anni 1881-86							
> 1887-88	3.1	4.7	2.0	6.6	(a) 4.9	(b) 1.5	3.6
> 1894-97	0.6	2.5	0.8	4.6	3.7	1.4	3.0
> 1898-901	0.5	1.8	0.5	4.6	1.9	1.4	2.7
> 1902-905	0.7	1.9	0.4	3.9	1.4	1.2	1.6
anno 1106	0.1	2.1	0.7	3.0	1.4	1.1	0.9
Morti nei 206 Comuni capiluoghi di provincia e di circondario.							
> 1907	0.1	1.8	0.7	2.8	1.8	1.2	0.9
> 1908	0.2	2.8	0.7	2.9	1.7	0.9	0.7
> 1909	0.4	2.8	0.9	3.2	1.7	0.9	0.7
> 1910	0.3	2.3	0.7	2.8	1.4	1.1	0.7
> 1911	2.5	2.1	0.7	3.0	1.1	1.3	0.8
anni 1902-905	4.1	2.1	0.5	3.7	1.0	1.4	2.5
anno 1906	..	2.3	1.4	2.7	1.1	1.1	1.9
> 1907*	0.1	2.0	0.4	2.6	1.2	1.6	1.7
Morti nei 78 Comuni non capiluoghi, ma assai popolosi (**)							
> 1908	0.4	2.4	0.9	2.9	1.3	1.4	1.3
> 1909	0.7	3.6	0.4	2.8	1.2	1.0	1.1
> 1910	0.1	5.7	1.4	2.8	1.4	1.0	1.2
> 1911	4.1	1.8	1.2	2.7	1.2	1.6	1.5
anni 1887-98	2.9	5.8	3.0	7.2	(a) 5.8	(b) 2.9	6.2
> 1894-97	0.7	3.2	1.4	5.0	3.6	2.9	5.1
> 1898-901	0.3	2.2	1.0	4.6	2.1	2.5	4.4
> 1902-905	1.0	2.3	0.5	3.4	1.3	2.2	3.0
anno 1906	..	3.2	0.9	2.8	1.2	2.1	1.6
Morti negli altri Comuni del Regno (c).							
> 1907	0.2	2.7	0.9	2.5	1.7	2.1	1.4
> 1908	0.2	3.7	1.1	2.7	1.8	1.9	1.1
> 1909	0.2	3.4	0.7	2.8	1.7	1.8	1.1
> 1910	0.1	3.1	0.9	2.5	1.4	1.7	1.2
> 1911	1.0	2.6	0.7	2.7	1.0	2.2	1.4

(*) Veggasi a nota (*) a pag. LX.
 (**) Veggasi la nota (a) a pag. LVIII.
 (a) Non compresi i morti per laringite crupale. — (b) Queste cifre si riferiscono soltanto agli anni 1891-92-93. — (c) Queste cifre si riferiscono alla provincia, né di circondario. — (d) Escludendo le vittime del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1908, il quoziente si riduce a 3.5. — (e) Escludendo le vittime del terremoto, il quoziente si riduce a 209.4. — (f) Escludendo le vittime del terremoto, il quoziente si riduce a 3.5. — (g) Escludendo

popolosi (1), confrontati coi morti negli altri Comuni del Regno, durante gli anni dal 1881 al 1911.

Sifilide	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Pellagra	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	Febbre puerperale	Alcolismo cronico	Morti violente per cause accidentali	Suicidi	Totale dei morti per qualsiasi causa
1.5	32.8	3.1	19.9	28.7	0.7	0.4	3.6	1.0	288.1
1.7	27.9	1.3	26.2	(b) 29.1	(b) 0.5	(b) 0.3	(b) 3.2	(b) 1.1	272.7
1.7	25.4	1.0	26.5	28.1	0.4	0.3	(c) 3.1	(c) 1.2	242.1
1.6	23.9	1.3	25.3	27.9	0.3	0.3	3.1	1.2	231.5
1.4	22.2	0.8	(d) 12.6 12.0	28.2	0.3	0.2	3.4	1.2	223.5
1.3	22.5	0.7	(d) 11.9 12.8	27.8	0.4	0.3	3.2	1.2	215.1
1.2	22.3	0.5	(d) 13.3 13.4	25.5	0.3	0.3	3.5	1.4	216.4
1.2	22.7	0.4	(d) 11.1 12.2	23.9	0.4	0.4	(f) 32.4	1.5	(g) 288.3
1.1	22.6	0.5	(a) 12.1 14.5	26.5	0.4	0.7	4.3	1.6	226.4
1.2	21.4	0.4	(d) 10.0 12.3	23.4	0.3	0.4	3.3	1.5	205.8
1.3	22.8	0.3	(d) 10.9 14.9	24.0	0.3	0.3	3.2	1.5	225.9
0.5	16.4	0.7	(d) 11.9 10.1	44.0	0.2	0.1	2.9	0.5	232.6
0.5	16.3	0.6	(d) 10.6 10.4	43.2	0.3	0.1	2.7	0.6	218.5
0.4	16.3	0.6	(d) 11.5 11.6	40.4	0.3	0.1	3.0	0.5	220.1
0.4	15.6	0.4	(d) 10.7 11.2	38.8	0.3	0.2	3.1	0.7	213.7
0.4	15.7	0.4	(d) 11.3 12.3	43.1	0.3	0.3	3.0	0.7	224.3
0.4	15.5	0.5	(d) 9.4 11.3	38.8	0.3	0.2	2.6	0.6	218.2
0.4	16.9	0.4	(d) 11.1 15.1	30.3	0.2	0.1	2.9	0.6	238.7
0.4	17.9	1.2	22.9	(b) 35.5	(b) 0.6	(b) 0.1	(b) 3.4	(b) 0.4	261.2
0.4	16.3	1.0	23.5	35.4	0.5	0.1	(c) 3.2	(c) 0.4	239.3
0.4	15.7	1.1	22.2	34.1	0.4	0.1	3.2	0.5	224.7
0.3	14.4	0.7	(d) 12.4 9.7	35.2	0.3	0.1	3.4	0.5	218.2
0.3	15.0	0.6	(d) 11.0 10.2	34.3	0.3	0.2	3.3	0.5	207.1
0.3	15.2	0.5	(d) 12.0 11.1	30.2	0.3	0.2	3.4	0.5	206.4
0.3	14.6	0.4	(d) 11.0 10.6	29.5	0.4	0.2	(h) 6.8	0.5	(i) 206.5
0.2	14.8	0.4	(d) 11.4 11.4	32.3	0.4	0.3	3.6	0.6	213.3
0.3	14.2	0.4	(d) 9.3 10.4	29.1	0.3	0.2	3.2	0.6	196.0
0.3	15.3	0.4	(d) 10.6 12.7	25.7	0.3	0.2	3.2	0.5	210.0

soltanto agli anni 1894, 1896 e 1897. — (d) Il primo numero riguarda i morti per polmonite crupale; il secondo quelli per bronco polmonite acuta. — (e) Nel complesso dei morti negli altri Comuni del Regno sono compresi anche quelli dei 78 Comuni popolosi, ma non capiluoghi di provincia, né di circondario. — (f) Escludendo le vittime del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1908, il quoziente si riduce a 3.5. — (g) Escludendo le vittime del terremoto, il quoziente si riduce a 203.2. — (h) Escludendo le vittime del terremoto, il quoziente si riduce a 3.5. — (i) Escludendo

§ 2. — Mortalità nelle Città più popolose durante l'anno 1911.

Prendiamo ora in esame, in modo più particolareggiato, la mortalità avvenuta durante l'anno 1911 nei 31 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60,000 abitanti.

Nel prospetto N. 17 i morti nei suddetti Comuni sono classificati secondo alcune cause più frequenti o più caratteristiche, sia in cifre assolute, sia in rapporto a 10,000 abitanti (a).

Dal detto prospetto rilevasi che il *vaiuolo*, nell'anno 1911, colpì in modo gravissimo la città di Palermo, dove si contarono 50 morti per tale morbo per ogni 10,000 abitanti. Anche in Napoli si ebbero a lamentare molte vittime per detta infezione, mentre nelle altre città più popolose pochi furono i morti di vaiuolo, anzi 19 di esse ne furono immuni.

Il *morbillo* assunse una certa gravità in Bari, Padova, Alessandria, Pistoia, Modena e Perugia; non causò alcuna morte a Spezia e Taranto.

La *scarlattina* causò parecchie morti a Palermo, Catania, Bari, Brescia e Padova; poche nelle altre Città e nessuna in Ferrara, Foggia, Lucca, Perugia, Pisa, Cagliari e Spezia.

La *febbre tifoidea* cagionò il maggior numero di morti relativamente alla popolazione, in Messina, Brescia, Perugia, Pistoia, Milano e Verona; ed il minore in Genova, Marsala, Napoli, Bari, Palermo, Spezia, Foggia, Taranto e Torino.

La *difterite* e la *laringite crupale* dominarono in Genova, Brescia e Ancona.

I morti per *ipertosse* toccarono il massimo in Padova, Taranto, Ravenna, Perugia e Lucca; ed il minimo in Foggia, Napoli, Cagliari e Palermo. Nel Comune di Bari non si ebbe alcuna morte per ipertosse durante l'anno 1911.

Le *febbri* e la *cachessia da malaria* fecero maggiori vittime che altrove in Taranto (5.5 morti ogni 10,000 abitanti), Foggia (3.8) e Marsala (2.3). Seguono, a distanza, Roma (1.2) (b), Cagliari (1.2), Ferrara (0.6), Catania (0.5) e Palermo (0.4). Nelle rimanenti città la mortalità per malaria fu lievissima, anzi in Firenze, Venezia, Livorno, Alessandria, Modena, Reggio Emilia, Pisa, Ancona, Spezia e Pistoia essa fu nulla nel 1911.

La *sifilide* diede i maggiori quozienti di mortalità in Messina (7.2 morti ogni 10,000 abitanti), Verona (6.8), Napoli (3.0) e Roma (2.4); ed i minori in Pistoia, Torino, Perugia, Modena, Spezia e Lucca. Nel Comune di Ravenna, durante il 1911, non si ebbe alcuna morte per sifilide.

(a) Ricordiamo che i quozienti di mortalità sono stati calcolati in base al numero delle morti avvenute in ciascun Comune, sia fra gli individui che vi dimoravano abitualmente, sia fra gli avventizi, i quali potevano aver contratto la malattia che ne causò la morte dopo il loro arrivo nel Comune o essersivi recati già infermi per farsi curare in qualche istituto ospitaliero.

(b) Circa la frequenza delle *febbri da malaria in Roma*, occorre tener conto del gran numero di lavoranti avventizi nell'Agro e nel suburbio, che colti dalla febbre, vengono a cer-

Le morti per *febbre puerperale* avvennero, presso a poco, colla stessa frequenza nelle Città più popolose; in **Alessandria, Modena e Perugia** non si ebbe alcuna morte per tale infezione.

La mortalità per *atrofia congenita* presentò i più alti quozienti in **Reggio nell'Emilia, Ferrara, Modena, Padova, Bari, Pistoia, Ravenna, Messina e Cagliari**; e i più bassi in **Ancona, Alessandria, Napoli, Torino, Spezia, Pisa, Genova e Brescia**.

La *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* diedero in **Napoli, Firenze, Lucca, Genova, Bari e Brescia**, un quoziente di mortalità assai più grande di quello riscontrato in **Marsala, Catania, Foggia, Ravenna, Ferrara, Torino e Perugia**.

La *bronchite acuta e cronica* determinò una mortalità considerevole nelle città di **Bari, Catania, Taranto, Napoli, Foggia e Palermo**; mentre in quelle di **Spezia, Genova, Bologna, Pisa, Milano, Torino, Roma, Firenze, Ancona, Pistoia, Venezia, Ravenna e Ferrara** riuscì assai meno letale.

La mortalità per le malattie *tubercolari*, prese complessivamente, presentò i quozienti massimi in **Firenze, Brescia, Verona, Padova, Venezia e Genova**; e i minimi in **Foggia, Marsala, Catania, Ravenna, Perugia, Messina, Palermo e Napoli**.

Le *malattie del cuore* cagionarono una mortalità relativamente alta in **Torino, Brescia, Verona, Genova, Venezia, Napoli, Reggio nell'Emilia, Livorno e Perugia**, al paragone di quella verificatasi in **Marsala, Foggia, Spezia, Ravenna, Padova, Bari e Roma**.

care ricovero e soccombono negli ospedali della Città. Dalla tabella seguerisulta che negli anni 1881-96 circa un terzo delle morti avvenute in Roma per febbri malariche fu dato dalla popolazione avventizia, e che negli anni 1897-1911 questa ne ha dato più della metà.

Morti per febbri da malaria e cachessia palustre nel Comune di Roma negli anni dal 1881 al 1911.

MORTI per febbri malariche nella popolazione	TRIENNI (media annuale)				ANNI																		
	1881-83	1884-86	1887-89	1890-92	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Stabile . .	349	258	241	169	114	86	105	76	37	75	47	48	30	26	20	28	30	20	18	26	26	14	30
Avventizia	199	125	120	62	75	54	84	61	36	95	40	75	46	27	26	27	35	30	26	32	36	27	34
TOTALE	548	383	361	231	189	140	189	137	73	170	87	123	76	53	46	55	65	50	44	58	62	41	64

Come si vede, le condizioni di Roma rispetto all'endemia malarica, sono molto migliorate dal 1881 al 1911. Difatti, il numero assoluto dei morti è scemato da 650 nel 1881 a 64 nel 1911; mentre negli stessi anni la popolazione è cresciuta da 300,467 a 542,764, cosicchè il quoziente di mortalità per febbri malariche è sceso, nel periodo considerato, da 21.6 a 1.2, per ogni 10,000 abitanti.

Classificando i morti per febbri da malaria nell'anno 1911, secondo il luogo in cui erano domiciliati, si hanno le cifre seguenti:

ANNO	POPOLAZIONE		NUMERO DEI MORTI PER FEBBRI DA MALARIA PROVENIENTI		PROPORZIONE DEI MORTI A 10,000 ABITANTI	
	della città	del suburbio e dell'agro romano	dalla città	dal suburbio e dall'agro romano	nella città	nel suburbio e nell'agro romano
1911	504,566	37,557	27	37	0.54	9.85

L'*apoplessia* e la *congestione cerebrale* fecero il maggior numero di vittime in Brescia, Verona, Reggio Emilia, Perugia e Firenze; e il minore in Foggia, Catania, Taranto, Bari, Genova, Spezia, Messina, Livorno, Marsala, Torino, Cagliari e Roma.

L'*enterite*, la *diarrea* e le altre malattie infiammatorie del canale intestinale colpirono più gravemente i cittadini di Palermo, Catania, Taranto, Napoli e Brescia; mentre quelli di Firenze, Bologna, Spezia, Lucca, Ancona, Torino, Foggia, Verona e Marsala ne soffrirono molto meno, tantochè la percentuale in alcuni di questi ultimi Comuni, per esempio in Firenze, fu circa un quinto di quella verificatasi in Palermo.

L'*alcoolismo cronico* causò parecchie morti in Verona, Padova, Alessandria, Ancona, Perugia e Venezia, in confronto a Palermo, Napoli, Catania, Messina, Livorno, Bari, Foggia e Spezia, nelle quali città furono rari i casi di morte per alcoolismo. Nelle città di Lucca, Ravenna, Modena, Taranto e Marsala non si verificò alcun caso di morte per abuso di bevande alcoliche, durante l'anno 1911.

Le morti violente per *cause accidentali* avvennero con maggior frequenza in Brescia, Spezia, Napoli, Bologna, Messina e Reggio Emilia; i *suicidi* in Firenze, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Torino, Livorno, Spezia, Roma, Alessandria e Reggio Emilia; gli *omicidi* in Palermo, Napoli, Catania, Roma, Ravenna e Taranto. Nelle città di Livorno, Verona, Modena, Perugia e Pistoia non si ebbe alcun morto per omicidio durante l'anno 1911.

Morti durante il 1911 nei 81 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60,000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

PROSPETTO N. 17.

A) Cifre assolute.

COMUNI	Vaiuolo	Morbilli	Scarlattina	Febbre tifoidea	Difterite e laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrofia congenita, immaturità	Bronchite acuta	Bronchite cronica	Polmonite crupale	Bronco polmonite acuta	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Aponlessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	Alcolismo cronico	Morte violenta			Totale dei morti per qualsiasi causa
																				per causa accidentale	per omicidio	per suicidio	
Napoli	294	102	5	81	102	15	4	204	11	349	966	327	737	1659	1297	1467	898	2038	4	231	74	94	18374
Milano	152	17	232	39	60	4	78	27	513	327	43	613	990	1581	1074	741	988	12	190	16	166	12043
Roma	2	59	20	127	90	73	64	130	10	506	243	97	785	658	1445	779	526	1073	14	172	35	114	11127
Torino	11	6	76	36	33	2	14	17	283	174	86	361	468	1143	1006	408	536	9	139	10	105	7533
Palermo	1711	8	132	53	18	10	12	29	6	421	450	149	501	263	580	644	377	1635	4	80	42	36	10794
Genova	5	65	4	25	77	20	1	34	9	211	132	25	253	615	832	611	218	462	9	76	9	76	5764
Firenze	27	3	78	27	34	..	27	8	206	117	51	282	494	828	369	353	240	7	59	5	71	5195
Catania	11	7	29	59	13	10	11	22	4	236	485	35	168	174	267	323	134	824	2	47	12	22	4347
Bologna	46	5	55	20	30	1	16	3	197	56	47	208	248	419	342	240	191	6	61	5	47	3580
Venezia	2	4	41	12	25	..	15	4	157	115	13	144	259	497	359	237	294	11	52	1	45	3654
Messina	6	15	2	75	16	12	1	91	4	173	141	17	153	123	207	211	104	319	1	44	3	11	2679
Livorno	7	19	4	31	7	15	..	7	1	86	106	24	105	169	279	222	90	264	1	31	..	24	2578
Bari delle Puglie	76	14	15	8	..	2	15	2	175	248	70	79	250	255	146	71	259	1	32	3	13	2649
Padova	1	62	10	25	13	32	1	9	3	181	78	18	91	169	311	134	107	256	12	25	1	17	2429
Ferrara	1	3	..	20	15	5	6	6	2	198	73	7	55	123	233	160	127	207	2	27	1	10	1972
Brescia	17	9	47	23	3	1	9	4	65	65	20	120	122	236	187	171	250	2	44	2	13	2209
Verona	16	1	31	8	11	1	56	2	95	92	20	90	109	275	184	135	116	15	23	..	15	1908
Foggia	3	..	13	6	1	29	7	1	96	98	38	65	71	77	89	39	99	1	19	3	4	1255
Lucca	2	..	19	6	15	1	4	4	85	74	35	69	180	225	124	113	91	..	18	2	6	1749
Alessandria	45	1	17	6	14	..	5	..	33	54	15	72	101	170	116	89	147	8	20	2	16	1490
Ravenna	3	1	15	11	18	1	..	4	107	48	11	64	65	99	95	78	132	..	20	4	10	1164
Modena	38	2	16	9	13	..	3	..	137	77	14	66	116	172	134	106	135	..	20	..	9	1810
Reggio nell'Emilia	14	3	20	3	13	..	11	2	147	96	13	57	113	163	150	113	197	3	25	1	15	1748
Perugia	30	..	27	11	15	1	2	..	86	95	8	63	66	107	133	104	126	6	16	..	9	1364
Pisa	3	..	22	7	6	..	6	1	48	27	13	25	127	182	108	81	101	1	14	3	10	1227
Ancona	5	1	17	13	5	..	7	2	27	41	6	42	86	135	100	80	76	7	12	1	4	1141
Cagliari	7	..	15	5	1	7	11	3	82	45	12	56	72	168	93	57	169	1	16	3	5	1260
Spezia	1	12	6	10	..	3	2	50	27	4	60	119	190	98	59	86	1	27	3	16	1103
Taranto	16	..	1	12	12	20	38	6	2	71	128	16	62	93	163	105	45	265	..	12	4	3	1528
Pistoia	37	2	28	10	6	..	1	5	103	36	14	74	103	155	137	72	171	2	23	..	7	1440
Marsala	1	1	1	6	2	7	15	5	2	86	37	4	36	43	77	49	59	97	..	17	2	5	838

Segue Morti durante il 1911 nei 31 Comuni che, alla metà del detto anno, contavano più di 60,000 abitanti, classificati secondo alcune cause di morte più frequenti o notevoli.

Segue PROSPETTO N. 17.

B) Cifre proporzionali a 10,000 abitanti della popolazione totale dei Comuni.

COMUNI	Popolazione calcolata alla metà dell'anno 1911 (a)	Vainolo	Morbilli	Scarlattina	Febbre tifoidea	Difterite e laringite crupale	Ipertosse	Febbri da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Febbre puerperale	Atrafia congenita, immaturità	Bronchite acuta	Bronchite cronica	Polmonite crupale	Bronco polmonite acuta	Tubercolosi disseminata e sue manifestazioni locali	Malattie del cuore	Apoplessia e congestione cerebrale	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	Alcolismo cronico	Morte violenta			Totale dei morti per qualsiasi causa
																					per causa accidentale	per omicidio	per suicidio	
Napoli	677 581	4.3	1.5	0.1	1.2	1.5	0.2	0.1	3.0	0.2	5.2	14.3	4.8	10.9	24.5	19.1	21.7	13.3	31.0	0.1	3.5	1.1	1.4	271.2
Milano	600 198	..	2.5	0.3	3.9	0.6	1.0	0.1	1.3	0.4	8.5	5.4	0.7	10.2	16.5	26.3	17.9	12.3	16.5	0.2	3.2	0.3	2.8	200.7
Roma	542 764	..	1.1	0.4	2.3	1.7	1.3	1.2	2.4	0.2	9.3	4.5	1.8	14.5	12.1	26.6	14.4	9.7	19.8	0.3	3.2	0.6	2.1	205.0
Torino	427 516	..	0.3	0.1	1.8	0.8	0.8	..	0.3	0.4	6.6	4.1	2.0	8.4	10.9	26.7	23.5	9.5	12.5	0.2	3.3	0.2	2.5	176.2
Palermo	340 591	50.2	0.2	3.9	1.6	0.5	0.3	0.4	0.9	0.2	12.4	13.2	4.4	14.7	7.7	17.0	18.9	11.1	49.5	0.1	2.3	1.2	1.1	316.9
Genova	272 522	0.2	2.4	0.1	0.9	2.8	0.7	..	1.2	0.3	7.7	4.8	0.9	9.3	22.6	30.5	22.4	8.0	17.0	0.3	2.8	0.3	2.8	211.5
Firenze	233 266	..	1.2	0.1	3.3	1.2	1.5	..	1.2	0.3	8.8	5.0	2.2	12.1	21.2	35.5	15.8	15.1	10.3	0.3	2.5	0.2	3.0	222.7
Catania	210 866	0.5	0.3	1.4	2.8	0.6	0.5	0.5	1.0	0.2	11.2	23.0	1.7	8.0	8.3	12.7	15.3	6.4	39.1	0.1	2.2	0.6	1.0	206.1
Bologna	173 190	..	2.7	0.3	3.2	1.2	1.7	0.1	0.9	0.2	11.4	3.2	2.7	12.0	14.3	24.2	19.7	13.9	11.0	0.3	3.5	0.3	2.7	206.7
Venezia	160 869	..	0.1	0.2	2.5	0.7	1.6	..	0.9	0.2	9.8	7.1	0.8	9.0	16.1	30.9	22.3	14.7	18.3	0.7	3.2	0.1	2.8	227.1
Messina	126 557	0.5	1.2	0.2	5.9	1.3	0.9	0.1	7.2	0.3	13.7	11.1	1.3	12.1	9.7	16.4	16.7	8.2	25.2	0.1	3.5	0.2	0.9	211.7
Livorno	105 336	0.7	1.8	0.4	2.9	0.7	1.4	..	0.7	0.1	8.2	10.1	2.3	10.0	16.0	26.5	21.1	8.5	25.1	0.1	2.9	..	2.3	244.7
Bari delle Puglie	103 702	..	7.3	1.4	1.4	0.8	..	0.2	1.4	0.2	16.9	23.9	6.8	7.6	24.1	24.6	14.1	6.8	25.0	0.1	3.1	0.3	1.3	255.4
Padova	96 363	0.1	6.4	1.0	2.6	1.3	3.3	0.1	0.9	0.3	18.8	8.1	1.9	9.4	17.5	32.3	13.9	11.1	26.6	1.2	2.6	0.1	1.8	252.1
Ferrara	95 274	0.1	0.3	..	2.1	1.6	0.5	0.6	0.6	0.2	20.8	7.7	0.7	5.8	12.9	25.1	16.8	13.3	21.7	0.2	2.8	0.1	1.0	207.0
Brescia	83 356	..	2.0	1.1	5.6	2.8	0.4	0.1	1.1	0.5	7.8	7.8	2.4	14.4	14.6	34.3	22.4	20.5	30.0	0.2	5.3	0.2	1.6	265.0
Verona	82 027	..	2.0	0.1	3.8	1.0	1.3	0.1	6.8	0.2	11.6	11.2	2.4	11.0	13.3	33.5	22.4	16.5	14.1	1.8	2.8	..	1.8	232.6
Foggia	78 730	..	0.4	..	1.7	0.8	0.1	3.8	0.9	0.1	12.5	12.8	5.0	8.5	9.3	10.0	11.6	5.1	12.9	0.1	2.5	0.4	0.5	163.6
Lucca	76 191	..	0.3	..	2.5	0.8	2.0	0.1	0.5	0.5	11.2	9.7	4.6	9.1	23.6	29.5	16.3	14.8	11.9	..	2.4	0.3	0.8	229.6
Alessandria	75 708	..	5.9	0.1	2.2	0.8	1.8	..	0.7	..	4.4	7.1	2.0	9.5	13.3	22.5	15.3	11.8	19.4	1.1	2.6	0.3	2.1	196.8
Ravenna	71 619	..	0.4	0.1	2.1	1.5	2.5	0.1	..	0.6	14.9	6.7	1.5	8.9	9.1	13.8	13.3	10.9	18.4	..	2.8	0.6	1.4	162.5
Modena	70 986	..	5.4	0.3	2.3	1.3	1.8	..	0.4	..	19.3	10.8	2.0	9.3	16.3	24.2	18.9	14.9	19.0	..	2.8	..	1.3	255.0
Reggio nell'Emilia	70 470	..	2.0	0.4	2.8	0.4	1.8	..	1.6	0.3	20.9	13.6	1.8	8.1	16.0	23.1	21.3	16.0	28.0	0.4	3.5	0.1	2.1	248.0
Perugia	65 812	..	4.6	..	4.1	1.7	2.3	0.2	0.3	..	13.1	14.4	1.2	9.6	10.0	16.3	21.0	15.8	19.1	0.9	2.4	..	1.4	207.3
Pisa	65 310	..	0.5	..	3.4	1.1	0.9	..	0.9	0.2	7.3	4.1	2.0	3.8	19.4	27.9	16.5	12.4	15.5	0.2	2.1	0.5	1.5	187.9
Ancona	63 261	..	0.8	0.2	2.7	2.1	0.8	..	1.1	0.3	4.3	6.5	0.9	6.6	13.6	21.3	15.8	12.6	12.0	1.1	1.9	0.2	0.6	180.4
Cagliari	60 115	..	1.2	..	2.5	0.8	0.2	1.2	1.8	0.5	13.6	7.5	2.0	9.3	12.0	27.9	15.5	9.5	28.1	0.2	2.7	0.5	0.8	209.6
Spesia	73 746	0.1	1.6	0.8	1.4	..	0.4	0.3	6.8	3.7	0.5	8.1	16.1	25.8	13.3	8.0	11.7	0.1	3.7	0.4	2.2	149.6
Taranto	69 380	2.3	..	0.1	1.7	1.7	2.9	5.5	0.9	0.3	10.2	18.4	2.3	8.9	13.4	23.5	15.1	6.5	38.2	..	1.7	0.6	0.4	220.2
Pistoia	67 504	..	5.5	0.3	4.1	1.5	0.9	..	0.1	0.7	15.3	5.3	2.1	11.0	15.3	23.0	20.3	10.7	25.3	0.3	3.4	..	1.0	213.3
Marsala	65 497	0.2	0.2	0.2	0.9	0.3	1.1	2.3	0.8	0.3	13.1	13.3	0.6	5.5	6.6	11.8	7.5	9.0	14.8	..	2.6	0.3	0.8	127.9

(a) Per il calcolo della popolazione si veggano le spiegazioni date nel paragrafo 3 del Capo I (pag. V e seguenti).

CAPO IV.

NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1911.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti nel Regno per causa violenta accidentale e quello dei morti per omicidio e suicidio, divisi per sesso, negli anni dal 1887 al 1911.

Classificazione delle morti violente nel Regno, durante gli anni dal 1887 al 1911.

PROSPETTO N. 18.

ANNI	NUMERO DEI MORTI								
	Per causa violenta accidentale			Per omicidio (a)			Per suicidio		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
1887.	11 180	7 513	3 662	1 547	1 358	189	1 449	1 182	267
1888.	11 356	7 664	3 692	1 637	1 433	204	1 560	1 280	310
1889.	10 278	6 868	3 410	1 458	1 273	185	1 463	1 144	319
1890.	9 784	6 557	3 227	1 317	1 128	189	1 652	1 353	296
1891.	10 310	6 869	3 441	1 407	1 205	202	1 697	1 381	316
1892.	10 146	6 831	3 315	1 558	1 358	200	1 723	1 392	331
1893.	10 008	6 586	3 422	1 648	1 424	224	1 737	1 432	305
1894.	9 891	6 484	3 407	1 429	1 238	191	1 732	1 381	351
1895.	8 894	5 833	3 061	1 487	1 276	211	1 874	1 507	367
1896.	9 628	6 283	3 345	1 456	1 256	200	2 000	1 594	406
1897.	10 304	6 741	3 563	1 540	1 327	213	1 895	1 505	390
1898.	10 066	6 700	3 366	1 706	1 457	249	2 059	1 629	430
1899.	10 229	6 743	3 486	1 417	1 211	206	2 019	1 594	425
1900.	10 184	6 780	3 404	1 306	1 103	203	2 040	1 615	425
1901.	10 771	7 008	3 763	1 262	1 071	191	2 014	1 597	417
1902.	10 493	6 867	3 626	1 332	1 133	199	2 010	1 580	430
1903.	10 322	6 804	3 518	1 305	1 106	199	1 922	1 537	385
1904.	11 044	7 480	3 564	1 312	1 135	177	2 156	1 705	451
1905.	13 146	8 720	4 426	1 444	1 241	203	2 379	1 869	510
1906.	10 820	7 192	3 628	1 317	1 134	183	2 319	1 755	564
1907.	11 442	7 829	3 613	1 283	1 091	192	2 445	1 821	624
1908.	(b) 89 170	46 794	42 376	1 528	1 296	232	2 093	2 079	614
1909.	12 643	8 843	4 100	1 375	1 133	242	2 969	2 275	694
1910.	11 003	7 544	3 462	1 158	942	216	2 880	2 190	690
1911.	11 088	7 543	3 545	(c) 1 090	889	201	2 751	1 939	815

Sopra 344,503 morti per causa violenta accidentale negli anni dal 1887 al 1911, 217,081 erano maschi e 127,422 femmine, cioè, ogni 100, se ne contarono 63 dei primi e 37 delle seconde.

(a) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e derivati da duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente, i quali ai termini dell'art. 49 del Codice penale possono essere non punibili.

(b) Compresi i morti nel disastro del terremoto avvenuto il 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) In questo numero sono compresi 4 omicidi (3 maschi e 1 femmina) dipendenti dalla esecuzione di ordini impartiti dall'Autorità competente, dei quali 2 nella provincia di Parma, 1 in quella di Pisa ed 1 in Potenza; e 26 di persone rivestite di pubblica autorità (sette carabinieri, un soldato, due guardie di città, due guardie municipali, una guardia carceraria, due guardie forestali, quattro guardie notturne e sette guardiani campestri) delle quali s'ignora se e quante perirono nel compimento del proprio dovere. Nel 1911 non si ebbe alcuna dichiarazione di morte avvenuta in duello. Per gli anni [anteriori veggansi i volumi che si riferiscono agli anni dal 1905 al 1910.

§ 2. — **Morti per causa violenta accidentale negli anni 1909-911 classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento, e distribuiti per compartimenti.**

Distribuzione geografica. — Le morti accidentali, negli anni 1909, 1910 e 1911, si ripartivano geograficamente come apparisce dal prospetto sottostante.

Morti accidentali negli anni 1909-1911 divise per compartimenti.

PROSPETTO N. 19.

COMPARTIMENTI	ANNO 1909		ANNO 1910		ANNO 1911	
	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti (a)	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti (a)	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti
Piemonte	1 301	38.14	1 187	34.64	1 078	31.47
Liguria	458	38.86	366	30.68	396	33.05
Lombardia	1 927	41.21	1 678	35.42	1 599	33.35
Veneto	1 249	36.21	1 069	30.62	1 086	30.76
Emilia	942	36.04	796	30.12	802	29.89
Toscana	886	33.28	743	27.75	770	28.56
Marche	444	41.12	335	30.88	357	32.63
Umbria	308	45.35	267	39.11	255	37.12
Lazio	532	41.70	431	33.44	447	34.30
Abruzzi e Molise	577	40.59	474	33.25	506	35.34
Campania	1 479	45.36	1 237	37.61	1 198	36.19
Puglie	633	30.41	625	29.70	611	28.67
Basilicata	192	40.98	206	43.77	173	36.48
Calabrie	594	43.13	452	32.52	518	36.91
Sicilia	1 179	32.74	920	25.37	1 033	28.12
Sardegna	242	28.80	220	25.99	259	30.37
REGNO	12 943	37.93	11 006	32.02	11 088	31.96

La maggior frequenza delle morti accidentali, nell'anno 1911, si osservò nella Umbria, nelle Calabrie, nella Basilicata, nella Campania e negli Abruzzi; e la minore nella Sicilia, nella Toscana e nelle Puglie.

Età e sesso. — Nel 1911 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 34 erano in età non superiore ai 15 anni, 46 fra 15 e 60 anni e 20 di oltre 60 anni. Nelle femmine, gli infortuni furono relativamente più numerosi nell'infanzia e nell'adolescenza (54 per cento in età non superiore ai 15 anni) e nell'età avanzata (24 per cento di oltre 60 anni), mentre le età fra 15 e 60 anni non diedero che un quoziente di 22 per cento.

Nel prospetto seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1909-1911.

(a) Si veggia la nota (a) a pagina XII.

Morti nel Regno per cause violente accidentali, durante gli anni 1909-1911, classificati secondo la causa e il sesso.

PROSPETTO N. 21.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI												
	Cifre assolute						Cifre proporzionali a 100 per quals'asi causa						
	Anno 1909		Anno 1910		Anno 1911		Anno 1909		Anno 1910		Anno 1911		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
In stato d'ubbrichezza	(a) 168	(a) 12	(b) 103	(b) 7	(c) 62	(c) 6	1.90	0.29	1.37	0.20	0.82	0.17	
Annegamento	1 289	461	1 244	512	1 318	483	14.58	11.24	16.49	14.79	17.43	13.62	
Freddo	128	40	72	22	113	33	1.45	0.98	0.95	0.64	1.50	0.93	
Insolazione	38	18	23	13	95	31	0.43	0.44	0.30	0.38	1.26	0.87	
Fulminazione	naturale	121	36	103	51	186	61	1.37	0.88	1.37	1.47	2.47	1.72
	da apparecchi elettrici	75	6	55	3	59	7	0.85	0.15	0.73	0.09	0.78	0.20
Caduta	2 956	862	2 509	717	2 214	701	33.43	21.03	33.26	20.71	29.35	19.77	
Lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	273	48	247	41	(d) 312	49	3.09	1.17	3.27	1.18	4.14	1.38	
Ferita d'arma da punta e taglio	32	3	47	9	17	12	0.36	0.07	0.62	0.26	0.23	0.34	
Lesioni da macchine agrarie ed industriali	110	6	88	12	82	8	1.24	0.15	1.17	0.35	1.09	0.23	
Schiacciamento	1 756	591	1 399	261	(e) 1 377	(e) 261	19.86	14.41	18.54	7.54	18.26	7.36	
Violenza d'animali	185	25	131	19	135	19	2.09	0.61	1.74	0.55	1.79	0.54	
Ustione	1 241	1 700	1 186	1 608	1 139	1 632	14.03	41.46	15.72	46.45	15.10	46.04	
Soffocamento	136	84	89	48	97	72	1.54	2.05	1.18	1.39	1.29	2.03	
Asfissia	172	60	142	64	150	57	1.94	1.46	1.88	1.85	2.00	1.61	
Avvelenamento acuto	100	84	68	67	114	86	1.13	2.05	0.90	1.94	1.51	2.43	
Morsi di vipera o di altri animali velenosi	7	6	6	3	10	2	0.08	0.15	0.08	0.09	0.13	0.06	
Diverse o non determinate	56	58	32	5	63	25	0.63	1.41	0.43	0.12	0.85	0.70	
TOTALE	8 843	4 100	7 544	3 462	7 543	3 545	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

(a) Dei 180 casi di morte in stato d'ubbrichezza nell'anno 1909, 132 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 48 per infortunio causato dall'ubbrichezza, e cioè, 35 per caduta, 7 per annegamento, 5 per assideramento ed 1 per asfissia.

(b) Dei 110 casi di morte in stato d'ubbrichezza nell'anno 1910, 71 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 39 per infortunio causato dall'ubbrichezza, e cioè, 28 per caduta, 4 per annegamento, 6 per assideramento ed 1 per asfissia.

(c) Dei 63 casi di morte in stato d'ubbrichezza nell'anno 1911, 47 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 21 per infortunio causato dall'ubbrichezza, e cioè, 16 per caduta, 1 per annegamento e 4 per assideramento.

(d) Compresi 8 soldati e 1 ufficiale morti per ferite d'arma da fuoco riportate nella guerra in Libia.

(e) Nei 1638 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1911, ve ne sono compresi 53 per investimento da automobile (33 maschi e 20 femmine) e 31 per investimento da bicicletta (18 maschi e 13 femmine).

Per le morti dovute ad avvelenamento acuto, sia accidentale, sia volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze velenifiche introdotte nell'organismo. Tra gli avvelenamenti acuti accidentali abbiano compresi quelli causati da morsicatura di vipera o di altri animali velenosi. Qui appresso sono riferiti i casi avvenuti negli anni 1909, 1910 e 1911.

Morti nel Regno per avvelenamento acuto e per morsi di vipera o di altri animali velenosi, negli anni 1909, 1910 e 1911, classificati per sesso e secondo la specie del veleno.

PROSPETTO N. 22.

NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto						Suicidi per avvelenamento					
	1909		1910		1911		1909		1910		1911	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Acido solforico	15	6	8	3	13	4	12	8	10	16	10	14
Id. nitrico	1	5	4	3	1	2	1
Id. muriatico	5	1	1	5	1	4	4	2	2
Id. arsenioso, liquore del Fowler	1	1	1	2	1	1	6	7	4	2	3	5
Id. ossalico	1	..	1
Id. fenico	2	1	2	1	4	4	4	2	4	8	2	4
Id. acetico	2
Id. prussico, emulsione di mandorle ed es- senze amare	2	5	1	8	1	5	..	1	2
Altri acidi ed acidi non specificati	5	2	3	3	2	3	2
Fosforo	1	..	1	2	..	3	3	13	3	18	4	11
Ammoniaca	1	..	1	1	2
Tintura di iodio	1	..	2	2	..	1
Cianuro e bicromato di potassio	1	..	1	5	..	10	1
Solfato ed acetato di rame	3	1	2	1	6	3	9	4	10	7	4	5
Sali di piombo	1	1	1	..	1
Sublimato corrosivo	5	6	5	13	10	7	66	131	85	143	92	178
Lisciva	3	5	2	4	5	4	..	10	8	17	7	23
Altri sali	1	3	1	2
Cloralio	1	2	..	1	1
Cloroformio	1	2	3	2	1	2	2	1
Benzina e petrolio	4	1	1	1
Formalina	2
Creolina	1	1	1
Creosoto	1	2
Cicuta	1	2	1	1	..	2
Stramonio, strofanto, colchico e canfora	1	2	2	1
Digitalina	1
Belladonna e atropina	2	1	2	1
Laudano, oppio, morfina, stovaina, eroina e ve- ronal	4	..	4	3	2	..	7	2	2	1	11	4
Chinino	6	2	6	8	8	5	1
Stricnina	2	..	3	1	2	1	15	3	6	1	11	3
Nicotina	1
Altri alcaloidi	1	..	1	1	2	1	..	1	..
Funghi	28	29	6	15	32	32
Carne infetta e pesce guasto	1	3	2	5	7
Veleni non specificati	10	11	7	5	15	6	7	7	16	6	3	5
Morsi di vipera o di altri animali velenosi	7	6	6	3	10	2
TOTALE	107	90	74	70	124	88	157	201	172	230	166	264

Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1909-1911,
classificati per gruppi d'età e per sesso

PROSPETTO N. 20.

ETÀ DEI DEFUNTI	CIFRE ASSOLUTE									CIFRE PROPORZIONALI a 100 morti accidentali					
	Anno 1909			Anno 1910			Anno 1911			1909		1910		1911	
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Non oltre 1 anno	361	179	182	298	155	143	303	154	149	2	5	2	4	2	4
Oltre 1 anno a 5 compiuti .	2 615	1 411	1 204	2 486	1 341	1 145	2 526	1 373	1 153	16	30	18	33	18	33
» 5 anni a 15 »	1 606	957	649	1 497	926	571	1 621	1 017	604	11	16	12	16	14	17
» 15 » 30 »	1 762	1 445	317	1 535	1 264	271	1 701	1 432	269	16	8	17	8	19	8
» 30 » 40 »	973	792	181	805	661	144	754	636	118	9	4	9	4	8	3
» 40 » 50 »	1 174	953	221	914	746	168	866	678	188	11	5	10	5	9	5
» 50 » 60 »	1 372	1 086	286	990	792	198	933	718	215	12	7	10	6	10	6
» 60 » 70 »	1 411	1 020	391	1 110	838	272	1 095	814	281	12	10	11	8	11	8
Oltre 70 anni	1 563	938	625	1 341	798	543	1 277	712	565	11	15	11	16	9	16
Età ignota	106	62	44	30	23	7	12	9	3
TOTALE	12 943	8 843	4 100	11 006	7 544	3 462	11 088	7 543	3 545	100	100	100	100	100	100

Cause. — Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute nei maschi durante l'anno 1911, si notarono le cadute, gli schiacciamenti, gli annegamenti e le ustioni. Nelle femmine prevalgono le ustioni (46 su 100) e vengono quindi le cadute, gli annegamenti e gli schiacciamenti.

Giova ricordare che tra i morti per malattie ordinarie sono compresi, nel 1911, altri 54 individui (maschi 42 e femmine 12) morti per avvelenamento cronico contratto per lo più in dati esercizi professionali. Nel 1910 le morti per avvelenamento cronico furono dichiarate in numero di 57 (maschi 49 e femmine 8) e nel 1909 di 64 (maschi 53 e femmine 11).

Professioni. — La tavola IX, a pagina 80, dà il numero dei maschi morti per causa violenta accidentale in età di oltre 15 anni, classificati secondo la condizione o professione e secondo la causa dell'infortunio. Ragguagliando i morti per causa violenta accidentale classificati per professione a 100 morti per qualsiasi causa, della corrispondente età e professione, ciò che si fa nel prospetto seguente, risulta che le professioni in cui gli infortuni mortali sono stati più frequenti, nell'anno 1911, sono quelle di ferroviere, tramviere, macchinista, fuochista, minatore, marmista, cocchiere, carrettiere, militare e muratore.

PROSPETTO N. 23.

Morti nel Regno per causa violenta accidentale classificati per professione, su 100 maschi morti per qualsiasi causa in età di 15 anni e più, negli anni 1909, 1910 e 1911.

	1909	1910	1911		1909	1910	1911
Ferrovieri e tramvieri	11.4	15.8	12.1	Corpi armati (escluso l'esercito)	6.3	3.0	3.6
Macchinisti e fuochisti	14.5	9.6	11.7	Pastori, mandriani	5.1	3.7	3.6
Minatori, marmisti	13.6	14.7	10.0	Fabbrì, meccanici, arrotini	3.5	3.4	3.4
Cocchieri, stallieri, mulattieri, carrettiere	8.9	6.7	6.4	Facchini, lavandai, spazzini	4.6	3.7	3.2
Militari	7.6	5.8	5.4	Studenti	3.5	2.9	3.1
Fabbricanti ed operai non specificati	4.7	4.4	4.9	Marinai, pescatori	4.2	3.4	3.1
Muratori, scalpellini, fuochisti	5.3	4.9	4.8	Braccianti, manovali	4.1	3.4	3.1
Fornaciai	3.6	4.6	4.5	Di qualsiasi professione	3.0	2.7	2.4
Lattai e casari	2.5	2.2	3.6				

§ 3. — Morti per omicidio negli anni 1909-1911 classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.

Nel 1911 i morti per omicidio (compresi quelli per infanticidio), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 1090.

Esaminando, in relazione al sesso dei colpiti, i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno, per il Regno, le cifre seguenti:

PROSPETTO N. 24.

PERSONE UCCISE MEDIANTE	ANNO 1909			ANNO 1910			ANNO 1911		
	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale
arma da fuoco . . .	523	107	630	451	87	538	476	76	552
arma da taglio . . .	445	79	524	323	77	400	260	70	330
arma contundente. . .	132	29	161	116	25	141	78	17	95
strangolamento . . .	11	9	20	12	8	20	9	11	20
avvelenamento . . .	3	1	4	2	..	2	2	3	5
annegamento	5	5	5	4	9	2	4	6
soffocazione . . .	3	5	8	5	5	10	9	4	13
combustione	1	..	1	1	..	1
precipitazione . . .	5	1	6	2	2	4	3	2	5
mezzo non determinato	11	6	17	25	8	33	49	14	63
Totale . . .	1133	242	1375	942	216	1158	889	201	1090

§ 4. — Morti per suicidio negli anni 1909-1911 classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione, e distribuiti per compartimenti.

Abbiamo dato a pagina LXIX le cifre dei suicidi divisi per sesso, in ciascun anno dal 1887 al 1911. Da esse apparisce che il numero dei suicidi è venuto crescendo fino al 1898, dopo il quale anno si nota una leggiera diminuzione fino al 1903.

(a) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano fortuiti, oppure causati da mano omicida. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, previe laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidi d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

Negli anni seguenti le morti per suicidio crebbero notevolmente, tantochè esse furono 2754 nell'anno 1911, corrispondenti a 7.94 ogni 100,000 abitanti, mentre nell'anno 1887 diedero soltanto un quoziente di 4.89.

Distribuzione geografica. — I suicidi avvenuti negli anni 1909, 1910 e 1911 si ripartiscono nei vari compartimenti come è indicato qui appresso.

Suicidi avvenuti negli anni 1909-1911, distribuiti per compartimenti.

PROSPETTO N. 25.

COMPARTIMENTI	NUMERO DEI SUICIDI						
	Anno 1909		Anno 1910		Anno 1911		
	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti (a)	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti (a)	Cifre assolute	Per 100,000 abitanti	
Piemonte	446	13.08	446	13.02	425	12.41	
Liguria	194	16.46	183	15.34	192	16.02	
Lombardia	422	9.02	440	9.29	434	9.05	
Veneto	317	9.19	289	8.28	278	7.87	
Emilia {	Ex Ducati	119	9.81	116	9.45	91	7.30
	Romagne	211	15.06	195	13.77	165	11.49
Toscana	276	10.37	243	9.08	243	9.01	
Marche	97	8.98	83	7.65	71	6.49	
Umbria	60	8.83	58	8.50	47	6.84	
Lazio	162	12.70	152	11.79	146	11.20	
Abruzzi e Molise	64	4.50	80	5.61	60	4.19	
Campania	163	5.00	190	5.78	188	5.68	
Puglie	108	5.19	87	4.13	97	4.55	
Basilicata	22	4.70	16	3.40	29	6.11	
Calabrie	40	2.90	34	2.45	29	2.07	
Sicilia	213	5.92	216	5.96	210	5.72	
Sardegna	55	6.54	52	6.14	49	5.75	
REGNO	2 969	6.71	2 880	8.38	2 754	7.94	

La maggior frequenza delle morti per suicidio, nell'anno 1911, si osservò nella Liguria, nel Piemonte, nelle Romagne e nel Lazio; e la minore nelle Calabrie, negli Abruzzi, nelle Puglie, nella Campania, nella Sicilia e nella Sardegna.

(a) Si veggia la nota (a) a pagina XII.

Sesso e stato civile. — Fra i 2754 individui morti per suicidio nel 1911, 1939 erano maschi e 815 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 70 maschi e 30 femmine. Nel 1910 su 100 suicidi si erano contate 24 femmine, nel 1909 23, nel 1908 pure 23, nel 1907 26, nel 1906 24, nel 1905 21, e in media nel decennio 1895-904 20.6 e nel decennio 1885-94 19.0: è adunque venuta crescendo col tempo, ma specialmente nell'ultimo anno, la proporzione delle femmine che si tolsero volontariamente la vita, mentre il numero dei maschi è sensibilmente diminuito.

Secondo lo stato civile, i suicidi si distribuivano, negli anni 1909, 1910 e 1911, così:

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1909-1911, classificati per sesso e stato civile.

A) Cifre assolute.

PROSPETTO N. 26.

STATO CIVILE	ANNO 1909			ANNO 1910			ANNO 1911		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi o nubili . . .	1 245	956	289	1 275	932	343	1 246	856	390
Coniugati	1 258	966	292	1 160	913	247	1 106	795	311
Vedovi	379	283	96	354	270	84	320	209	111
Ignoto	87	70	17	91	75	16	82	79	3
TOTALE . . .	2 969	2 275	694	2 880	2 190	690	2 754	1 939	815

B) Cifre proporzionali.

STATO CIVILE	OGNI 100 SUICIDI DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE						OGNI 100 SUICIDI IN TOTALE		
	Anno 1909		Anno 1910		Anno 1911		Anno	Anno	Anno
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	1909	1910	1911
Celibi o nubili . . .	77	23	73	27	69	31	42	44	45
Coniugati	77	23	79	21	72	28	42	40	40
Vedovi	75	25	76	24	65	35	13	12	12
Ignoto	80	20	82	18	96	4	3	4	3
TOTALE . . .	77	23	76	24	70	30	100	100	100

Età — Nel prospetto seguente è data la classificazione per sesso e per gruppi d'età dei suicidi avvenuti nell'anno 1911, ed è fatto il confronto colle notizie analoghe del periodo 1896-908 e degli anni 1909 e 1910.

Suicidi nel Regno avvenuti nel periodo 1896-1908 e negli anni 1909, 1910 e 1911, classificati per sesso e per gruppi d'età.

PROSPETTO N. 23.

A) Cifre assolute.

ANNI D'ETÀ	Periodo 1896-1908		Anno 1909		Anno 1910		Anno 1911	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Sotto 15 anni	107	28	10	8	15	6	20	9
15-19 »	1 435	693	125	90	122	129	132	112
20-24 »	2 839	982	242	112	264	132	257	157
25-29 »	1 916	642	211	84	203	78	196	114
30-39 »	3 275	978	341	112	345	97	279	114
40-49 »	3 656	897	407	93	336	88	290	100
50-59 »	3 867	827	415	78	417	86	313	99
60-69 »	2 925	618	327	71	300	42	246	71
70-79 »	1 411	315	149	32	134	29	148	31
80 e più »	283	64	31	10	38	2	36	7
Età ignota.	166	27	17	4	16	1	22	1
TOTALE	21 880	6 071	2 275	694	2 190	690	1 939	815

B) Cifre proporzionali.

ANNI D'ETÀ	Ogni 100 morti per suicidio (a)								Anno 1911	
	Periodo 1896-1908		1909		1910		1911		Suicidi per ogni 100,000 viventi (b)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Sotto 15 anni	0.5	0.5	0.4	1.2	0.7	0.9	1.0	1.1	(c) 1.8	(c) 0.8
15-19 »	6.6	11.5	5.5	13.1	5.6	18.7	6.9	13.7	8.5	6.7
20-24 »	13.1	16.2	10.7	16.2	12.1	19.1	13.4	19.3	18.4	10.3
25-29 »	8.8	10.6	9.4	12.2	9.3	11.3	10.2	14.0	17.3	8.7
30-39 »	15.1	16.2	15.1	16.2	15.9	14.1	14.6	14.0	14.3	5.3
40-49 »	16.8	14.8	18.0	13.5	15.5	12.8	15.1	12.3	16.8	5.5
50-59 »	17.8	13.7	18.4	11.3	19.2	12.5	16.4	12.2	20.9	6.4
60-69 »	13.5	10.2	14.5	10.3	13.8	6.1	12.8	8.7	22.4	6.3
70-79 »	6.5	5.2	6.6	4.6	6.2	4.2	7.7	3.8	28.6	5.8
80 e più	1.3	1.1	1.4	1.4	1.7	0.3	1.9	0.9	31.3	5.6
TOTALE	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	(d) 16.0	(d) 6.3

Fra i maschi le proporzioni più alte di suicidi ogni 100 del totale, sono date da individui fra 30 e 60 anni di età: fra le femmine se ne trova una proporzione relativamente più alta in quelle che hanno da 15 a 40 anni. Facendo i rapporti col totale dei viventi coetanei, si trova che il numero dei suicidi nei maschi cresce coll'avanzare dell'età; nelle femmine i rapporti si mantengono più costanti nei differenti gruppi d'età. Tanto fra i maschi quanto fra le femmine si osserva una forte propor-

(a) Esclusi i suicidi d'età ignota.

(b) Secondo il censimento del 10 giugno 1911.

(c) Queste proporzioni sono state calcolate sui viventi in età dai 12 ai 14 anni compiuti.

(d) I totali sono stati calcolati sulle cifre della popolazione da 12 anni in su.

zione di suicidi nel gruppo d'età fra 20 e 25 anni, quando cominciano le prime disillusioni della vita e non si è ben preparati a sostenere la lotta per l'esistenza; poi le proporzioni scemano fino al 40° anno, dopo il quale avviene, specialmente nei maschi, un sensibile aumento.

Mezzi o modi di suicidio. — Rispetto ai mezzi e modi adoperati nel consumarli, la nostra statistica distingue i suicidi in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1909, 1910 e 1911.

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1909-1911, classificati secondo i mezzi o modi adoperati.

PROSPETTO N. 25.

A) Cifre assolute.

MEZZI O MODI del suicidio	ANNO 1909			ANNO 1910			ANNO 1911		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Per annegamento . . .	633	441	192	552	380	172	496	279	217
Con arma da fuoco . . .	709	670	39	725	689	36	743	705	38
Con arma da taglio . . .	148	131	17	116	101	15	81	71	10
Per impiccamento . . .	519	416	103	520	420	100	513	379	134
Per precipitazione . . .	357	253	104	337	236	101	292	185	107
Per schiacciamento . . .	139	126	13	126	113	13	101	89	12
Per avvelenamento . . .	358	157	201	402	172	230	430	166	264
Per asfissia	71	52	19	80	61	19	82	55	27
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . .	35	29	6	22	18	4	16	10	6
TOTALE . . .	^(a) 2 969	2 375	694	^(b) 2 880	2 190	690	^(c) 2 754	1 939	815

B) Cifre proporzionali a 100 del totale.

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	ANNO 1909		ANNO 1910		ANNO 1911	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Per annegamento	19.38	27.67	17.35	24.93	14.39	26.63
Con arma da fuoco	29.45	5.62	31.46	5.22	36.36	4.66
Con arma da taglio	5.76	2.45	4.61	2.17	3.66	1.23
Per impiccamento	18.29	14.84	19.18	14.49	19.55	16.44
Per precipitazione	11.12	14.99	10.78	14.64	9.54	13.13
Per schiacciamento	5.54	1.87	5.16	1.89	4.59	1.47
Per avvelenamento	6.90	28.96	7.85	33.33	8.56	32.39
Per asfissia	2.29	2.74	2.79	2.75	2.84	3.31
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	1.27	0.86	0.82	0.58	0.51	0.74
TOTALE . . .	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Fra i suicidi dell'anno 1909 sono compresi 41 (di maschi 28 e di femmine 13) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi e 1 femmina per frenosi pellagrosa, 3 maschi e 1 femmina per frenosi alcoolica, 1 maschio per frenosi sensoria e 11 maschi e 5 femmine per neurastenia.

(b) Fra i suicidi dell'anno 1910 sono compresi 43 (di maschi 29 e di femmine 14) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 1 maschio e 1 femmina per frenosi pellagrosa, 2 maschi per frenosi alcoolica e 12 maschi e 6 femmine per neurastenia.

(c) Fra i suicidi dell'anno 1911 sono compresi 50 (di maschi 23 e di femmine 27) compiuti in stato di delirio per psicopatia, fra cui 1 maschio per frenosi sensoria, 6 maschi e 3 femmine per frenosi alcoolica e 10 maschi e 10 femmine per neurastenia.

Mesi in cui avvennero i suicidi. — In relazione alle stagioni e ai mesi nei quali accaddero, i suicidi distribuiransi, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 12,000 (a), secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza si è notata, nell'anno 1911, nell'estate e nella primavera; la minore nell'inverno e nell'autunno.

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1909-1911, divisi per mesi e per stagioni.

PROSPETTO N. 29.

MESI E STAGIONI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI SU 12,000 (a)		
	1909	1910	1911	1909	1910	1911
Marzo	224	265	269	891	1 082	1 150
Aprile	278	245	255	1 142	1 035	1 128
Maggio	332	303	274	1 318	1 238	1 173
<i>Primavera</i> . . .	834	813	798	3 351	3 355	3 451
Giugno	308	341	282	1 265	1 441	1 248
Luglio	332	283	314	1 318	1 158	1 345
Agosto	267	257	249	1 060	1 052	1 066
<i>Estate</i>	907	881	845	3 643	3 651	3 659
Settembre	254	200	232	1 043	845	1 027
Ottobre	204	199	201	809	816	863
Novembre	223	191	158	916	807	699
<i>Autunno</i>	681	590	591	2 768	2 468	2 589
Dicembre	204	189	175	809	773	748
Gennaio	186	203	179	739	828	765
Febbraio	157	204	166	690	925	788
<i>Inverno</i>	547	596	520	2 238	2 526	2 301
ANNO	2 969	2 880	2 754	12 000	12 000	12 000

(a) Nel calcolare le cifre proporzionali furono fatte le operazioni necessarie per ridurre i giorni dei singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero, cioè a trenta.

Professioni. — La professione, e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidi. Nella tavola XIII, a pagina 85, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1911. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore, esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi che si uccisero in età superiore a 15 anni compiuti, classificati secondo la professione esercitata, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 1901, non essendo ancora noti i dati del censimento del 10 giugno 1911 relativi alla popolazione classificata secondo le professioni.

Maschi suicidi nel Regno in età superiore ai 15 anni, negli anni 1897-1910 e nell'anno 1911, classificati per professioni.

PROSPETTO N. 30.

PROFESSIONI	MASCHI di oltre 15 anni secondo il censimento del 10 febbraio 1901	SUICIDI		
		Cifre assolute		Proporzioni a 100,000 della stessa professione — Periodo 1897-1911
		1897-1910	1911	
Agricoltori, silvicoltori, pastori, braccianti . .	5 706 152	7 016	475	9
Marinai, pescatori, barcaiuoli. . . , . . .	109 872	163	16	11
Facchini, acquaiuoli, lavandai.	72 631	311	16	30
Filatori e tessitori	66 575	184	11	20
Muratori e imbianchini	325 259	683	71	15
Barbieri	48 513	225	21	34
Tipografi, litografi, legatori di libri	30 985	149	9	34
Caffettieri, liquoristi, osti, trattori, vinai . .	58 275	396	27	48
Guardie campestri, di città, doganali, carce- rarie, daziarie, forestali	72 213	450	16	43
Ufficiali e truppa di terra e di mare e pen- sionati militari	210 000	1 070	83	37
Professori e maestri	39 557	131	9	24
Capitalisti e benestanti	234 456	1 545	132	48
Medici, dentisti, veterinari	25 401	140	16	41
Sacerdoti e monaci	77 139	70	4	6
Di qualsiasi professione	10 482 781	24 628	1 919	17

APPENDICE

Confronti internazionali (1)

Per mettere meglio in evidenza le condizioni sanitarie dell'Italia in confronto con quelle degli altri Stati di Europa, che pubblicano statistiche regolari delle cause di morte per l'intera popolazione, abbiamo compilati i seguenti prospetti comparativi della mortalità nei vari Stati europei per *vaiuolo, morbillo, scarlattina, febbre tifoidea, difterite e laringite crupale, ipertosse, malattie tubercolari e tumori maligni*, in ciascuno degli anni corsi dal 1901 al 1911, e in cifre proporzionali a un milione di abitanti.

Per il Belgio, la Francia, la Scozia, la Svezia e la Svizzera le notizie si arrestano all'anno 1910, per la Serbia all'anno 1909, non essendo state finora pubblicate da detti Stati le statistiche per gli anni più recenti.

Diamo anche un prospetto comparativo della mortalità generale su 1000 abitanti nei vari Stati, in ciascun anno dal 1901 al 1911.

Esaminando la *mortalità generale*, cioè per qualsiasi malattia, durante il decennio 1901-1910, il quoziente più alto, fra gli Stati presi qui in esame, è dato dalla Rumania (25.76 ogni 1000 abitanti, nella media annuale del detto decennio); vengono subito dopo l'Ungheria (25.71), la Spagna (25.20), l'Austria (23.34), la Serbia (pure 23.34) e l'Italia (21.36). Seguono la Francia (19.38), la Prussia (18.48), l'Irlanda (17.42), la Svizzera (16.76), la Scozia (16.60), il Belgio (16.45), l'Inghilterra e Galles (15.38), l'Olanda (15.20) e la Svezia (14.90).

Venendo ora ad esaminare la mortalità secondo le singole malattie, troviamo che la mortalità per *vaiuolo*, fatta eccezione della Spagna, è più grave da noi che negli altri Stati. Nella Svezia, nella Rumania, nella Prussia, nell'Olanda, nell'Irlanda e nell'Austria sono rarissimi i casi di morte per vaiuolo e pochi casi pure se ne osservano nella Svizzera. Nell'Inghilterra e nella Scozia, durante il quadriennio 1901-1904, vi furono molte vittime di tale morbo, ma negli anni seguenti se ne verificarono rarissimi casi. Nell'Ungheria, nella media del decennio

(1) Avvertiamo che per tali confronti ci siamo valse dei dati pubblicati nell'*Annual Report of the Registrar-General of births, deaths, and marriages in England and Wales, 1911, London*, nel quale sono esposte, per ciascun Stato e per ciascun anno, le sole cifre assolute dei morti per le malattie qui considerate.

1901-1910, si verificarono 15 casi di morte per vaiuolo per ogni milione di abitanti, nel Belgio 53, nell'Italia 54 e nella Spagna 198. Nella Francia, per la quale abbiamo un periodo di osservazione di soli cinque anni (1906-1910), vi furono, per ogni milione di abitanti, 16 morti per vaiuolo nel 1906, 68 nel 1907 e soltanto 4 nel 1908, 2 nel 1909 e 2 nel 1910.

La mortalità per *morbillo* fu in Italia di 256 ogni milione di abitanti, nella media del decennio 1901-1910: questa proporzione venne superata dalla Spagna, dove i morti per morbillo furono 526, dall'Ungheria con 425, dal Belgio con 356, dall'Austria con 338, dalla Scozia pure con 338, dall'Inghilterra e Galles con 309 e dall'Olanda con 301. All'opposto, la mortalità per morbillo fu inferiore alla nostra nella Svezia (76 per ogni milione di abitanti nel decennio 1901-1910), nell'Irlanda 152, nella Svizzera 155, nella Rumania 209 e nella Prussia 220. Nella Francia, nel quinquennio 1906-1910, si osservarono soltanto 88 morti per morbillo ogni milione di abitanti.

La *scarlattina*, che in Italia causò 67 morti ogni milione di abitanti nella media del decennio 1901-1910, fu causa di 1222 morti in Serbia ogni milione di abitanti, di 605 in Ungheria, di 545 in Rumania, di 462 in Austria, di 248 in Prussia, di 137 nel Belgio, di 106 nell'Inghilterra e Galles, di 87 nella Scozia, di 77 nella Spagna e di 72 nella Svezia. Soltanto l'Olanda, la Francia, l'Irlanda e la Svizzera diedero una mortalità per scarlattina inferiore alla nostra (1).

La mortalità per *febbre tifoidea*, durante la media del suddetto decennio, diede in Italia un quoziente di 312 ogni milione di abitanti, che è superiore a quello degli altri Stati, fatta eccezione per la Serbia, dove esso toccò i 562 e per la Spagna dove raggiunse i 384. Nell'Ungheria tale quoziente fu di 276, nell'Austria di 170, nella Rumania di 161, nel Belgio di 139, nella Francia di 114, nell'Irlanda di 104, nell'Inghilterra e Galles di 92, nella Scozia pure di 92, nell'Olanda e nella Svezia di 75, nella Prussia di 71 e nella Svizzera di 51. Il quoziente di mortalità per febbre tifoidea nella Serbia, che, come abbiamo visto, è il più grande fra tutti quelli osservati (562 per ogni milione di abitanti), presenta forti oscillazioni da un anno all'altro del periodo d'osservazione; ed infatti, nel quadriennio 1901-1904, esso fu di 810, nell'anno 1905 scese repentinamente a 162, nel triennio 1906-1908 oscillò fra 165 e 132, mentre nel 1909 salì improvvisamente a 1225, superando così di gran lunga il quoziente verificatosi nel quadriennio 1901-1904.

La mortalità per *difterite e laringite crupale*, che in Italia causò 148 morti ogni milione di abitanti nella media del decennio 1901-1910, fu elevatissima in Serbia (549) e assai considerevole in Ungheria (438), nell'Austria (360), nella Prussia (327), nella Svezia (246), nella Spagna (226), nell'Inghilterra e Galles (193), nel Belgio (186), nella Svizzera (178) e nella Scozia (175). Soltanto l'Irlanda con 129 morti, l'Olanda con 107, la Rumania con 99 e la Francia con 85, diedero una mortalità per difterite inferiore alla nostra.

L'*ipertosse* fece tra noi un numero di vittime relativamente basso in confronto della maggior parte degli altri Paesi. Infatti, nel decennio 1901-1910, sopra un mi-

(1) Si avverte che per la Serbia il periodo d'osservazione si riferisce, per tutte le malattie qui contemplate, al novennio 1901-1909, e per la Francia al quinquennio 1906-1910, non avendosi per tali Stati i dati per gli anni più recenti.

lione di abitanti ne morirono per ipertosse, in media annuale, 1881 in Serbia, e, a grandissima distanza, 442 in Scozia, 402 in Austria, 391 in Ungheria, 356 nel Belgio, 310 nella Prussia, 278 nell'Inghilterra e Galles, 238 nell'Irlanda, 212 nella Spagna, 201 nell'Olanda, 194 nella Rumania, 186 nella Svizzera e **183** nell'Italia. Soltanto nella Francia e nella Svezia il quoziente di mortalità per ipertosse apparisce minore di quello osservato in Italia, essendo stato rispettivamente di 85 e 161.

Le *malattie tubercolari* causarono negli Stati esteri, qui considerati, una mortalità generalmente più grave che non in Italia. Prendendo in esame soltanto la *tubercolosi polmonare*, per la quale si hanno dati più completi, si rileva che essa, nel decennio 1901-1910, causò in media per anno **1050** morti ogni milione di abitanti in **Italia**, 1098 nel Belgio, 1163 nell'Inghilterra e Galles, 1302 nell'Olanda, 1380 nella Scozia, 1412 nella Spagna, 1773 nella Svizzera, 1831 nella Francia, 2029 nell'Irlanda e 2924 nella Serbia.

Pur sommando insieme tutte le *affezioni tubercolari*, l'**Italia** si trova sempre in buone condizioni rispetto alla mortalità per dette cause; infatti il quoziente di mortalità per affezioni tubercolari fu tra noi di **1669** per ogni milione di abitanti nella media annuale del decennio 1901-1910, quasi uguale a quello dell'Inghilterra, dove fu di 1657; nella Prussia invece tale quoziente salì a 1768, nell'Irlanda a 2639, nell'Austria a 3230 e nell'Ungheria a 3855.

Relativamente buone sono pure le condizioni dell'Italia rispetto alla mortalità per *tumori maligni*. La proporzione dei morti per questa causa fu nella Svizzera di 1271 ogni milione di abitanti nella media del decennio 1901-1910, di 1001 nell'Olanda, di 922 nella Scozia, di 903 nell'Inghilterra e Galles, di 762 nell'Austria, di 755 nella Francia, di 737 nell'Irlanda, di 698 nella Prussia, di 604 nel Belgio e di **594** nell'Italia. Soltanto nell'Ungheria e nella Spagna il quoziente di mortalità per tumori maligni fu alquanto minore di quello osservato in Italia, essendo stato rispettivamente di 413 e 471.

A). — Mortalità generale in alcuni Stati europei, durante gli anni dal 1901 al 1911

(Cifre proporzionali a 1000 abitanti)

STATI		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Italia		21.98	22.24	22.42	21.16	22.00	20.91	20.90	22.76 (a)	21.67	19.85	21.41
Austria e Ungheria	Austria	24.03	24.74	23.83	23.77	25.14	22.55	22.74	22.46	22.92	21.18	21.93
	Ungheria	25.43	27.06	26.23	25.00	28.23	25.12	25.66	25.23	25.56	23.60	25.03
Belgio		17.07	17.30	16.99	16.89	16.53	16.42	15.76	16.51	15.78	15.20	?
Francia		20.14	19.50	19.26	19.42	19.64	19.86	20.16	18.90	19.15	17.78	19.62
Regno Unito del- la Gran Breta- gna e Irlanda	Inghilterra e Galles	16.91	16.25	15.46	16.34	15.30	15.47	15.11	14.85	14.62	13.50	14.60
	Irlanda	17.79	17.52	17.51	18.04	17.06	16.92	17.62	17.54	17.09	17.08	16.53
	Scozia	17.89	17.29	16.76	17.09	16.23	16.37	16.62	16.64	15.85	15.26	15.10
Olanda		17.23	16.26	15.58	15.93	15.32	14.78	14.60	15.03	13.70	13.55	14.50
Prussia		20.51	19.16	19.71	19.24	19.61	17.91	17.83	17.90	16.97	15.98	17.21
Rumania		26.18	27.73	24.80	24.39	24.68	23.87	26.30	27.38	27.43	24.81	25.27
Serbia		21.01	22.29	23.08	21.08	24.28	24.08	22.43	23.72	29.27	22.14	21.80
Spagna		27.74	26.04	24.95	25.69	25.80	26.06	24.53	23.83 (b)	24.00 (b)	23.34 (b)	23.19 (b)
Svezia		16.05	15.37	15.09	15.29	15.62	14.37	14.59	14.91	13.67	14.04	13.78
Svizzera		17.96	17.05	17.39	17.53	17.58	16.63	16.44	15.82	16.10	15.13	?

(a) Compresa le vittime del terremoto avvenuto il 28 dicembre 1908, in numero di 77,233. Escludendo tali vittime, il quoziente di mortalità si riduce a 20.48 per ogni 1000 abitanti.

(b) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

B). — Mortalità per valuolo in alcuni Stati europei, durante gli anni dal 1901 al 1911

(Cifre proporzionali ad 1.000.000 di abitanti)

STATI		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Italia		104	74	184	94	15	5	13	17	22	12	139
Austria e Ungheria	Austria	4	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0.2	1
	Ungheria	43	17	13	22	23	12	7	6	5	6	4
Belgio		38	95	233	93	34	6	8	6	5	9	?
Francia		(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	16	68	4	2	2	?
Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda	Inghilterra e Galles	11	75	23	15	3	1	0.3	0.3	1	1	1
	Irlanda	0.4	0.2	9	4	1	0	0.2	0	0	0	0
	Scozia	62	18	9	41	1	0.2	0.2	1	0	0	?
Olanda		1	1	4	2	2	1	1	0.2	0	0	0
Prussia		1	0.4	0.4	0.5	0.3	1	1	2	0.5	1	1
Rumania		0.2	2	0.3	3	0	0.3	0	0	0.1	0	2
Spagna (b)		281	298	249	151	144	227	168	145 (c)	204 (c)	108 (c)	76 (c)
Svezia		0	0.2	0.4	0.2	1	0	0	0.2	0	0	?
Svizzera		11	1	1	1	10	4	2	1	1	1	?

(a) I dati per l'intera Francia si hanno soltanto a partire dall'anno 1906, perchè prima di detto anno la statistica francese delle cause di morte riguardava le sole città principali.

(b) Compresi i morti per varicella.

(c) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

C). — Mortalità per morbillo in alcuni Stati europei, durante gli anni dal 1901 al 1911

(Cifre proporzionali ad 1.000.000 di abitanti)

STATI		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Italia		171	305	222	161	203	292	244	347	324	288	247
Austria e Ungheria	Austria	311	647	207	306	249	332	246	283	440	355	237
	Ungheria	413	518	354	301	444	492	424	455	396	449	427
Belgio		299	479	331	390	342	340	275	404	359	342	?
Francia		(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	96	96	82	73	94	?
Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda	Inghilterra e Galles	277	392	275	366	326	275	364	228	356	232	363
	Irlanda	103	243	155	118	184	88	133	196	101	195	98
	Scozia	369	308	250	331	362	313	248	535	189	473	?
Olanda		525	458	227	439	213	249	259	272	165	199	208
Prussia		309	285	270	202	170	242	181	190	169	183	136
Rumania		192	461	322	261	49	34	214	245	103	208	285
Spagna		990	573	530	516	723	454	355	372 (b)	398 (b)	352 (b)	375 (b)
Svezia		73	123	155	33	27	37	82	91	41	101	?
Svizzera		248	135	159	286	187	160	170	62	101	94	?

(a) I dati per l'intera Francia si hanno soltanto, a partire dall'anno 1906, perchè prima di detto anno la statistica francese delle cause di morte riguardava le sole città principali.

(b) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

D). — Mortalità per scarlattina in alcuni Stati europei, durante gli anni dal 1901 al 1911.

(Cifre proporzionali ad 1.000.000 di abitanti).

STATI		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Italia		36	41	61	49	51	82	88	102	79	84	73
Austria o Ungheria	Austria	478	563	582	361	297	385	361	535	572	484	287
	Ungheria	594	724	830	729	458	439	582	665	517	511	651
Belgio		207	144	100	103	106	108	127	163	159	150	?
Francia		(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	23	41	38	39	25	?
Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda	Inghilterra e Galles	133	148	125	112	113	101	93	81	91	66	52
	Irlanda	46	42	48	46	39	34	23	16	29	39	67
	Scozia	133	116	90	61	46	50	50	81	118	126	
Olanda		19	24	24	32	34	28	47	52	30	19	19
Prussia		340	315	346	280	201	260	222	219	215	138	126
Rumania		496	676	598	328	178	199	353	777	1077	768	426
Serbia		709	1023	989	935	899	1717	1427	1413	1883	?	?
Spagna		61	63	54	52	55	73	122	114 (b)	89 (b)	83 (b)	38 (b)
Svezia		94	84	68	83	118	73	41	47	50	61	?
Svizzera		21	22	47	80	89	43	39	40	46	27	?

(a) I dati per l'intera Francia si hanno soltanto a partire dall'anno 1906, perchè prima di detto anno la statistica francese delle cause di morte riguardava le sole città principali.

(b) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

— Mortalità per febbre tifoidea in alcuni Stati europei, durante gli anni dal 1901 al 1911

(Cifre proporzionali ad 1.000.000 di abitanti)

STATI		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Italia		361	347	355	371	328	283	257	275	286	260	275
Austria e Ungheria	Austria	224	181	198	194	179	150	150	150	142	133	96
	Ungheria	286	274	282	257	327	274	269	247	307	241	230
Belgio		222	178	156	149	137	123	119	112	93	104	?
Francia		(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	139	131	123	98	80	?
Regno Unito del- la Gran Bret- agna e Irlanda	Inghilterra e Galles	155	126	101	94	90	92	68	76	60	53	67
	Irlanda	186	138	109	106	114	90	82	77	70	63	81
	Scozia	160	122	122	90	81	87	79	60	63	56	?
Olanda		91	86	85	89	83	80	65	63	54	51	53
Prussia		127	80	80	79	74	64	57	53	49	47	61
Rumania		110	101	145	127	114	156	174	207	289	157	210
Serbia		959	846	700	735	162	165	132	132	1225	?	?
Spagna		514	458	433	443	376	421	355	327 (b)	276 (b)	237 (b)	267 (b)
Svezia (c)		125	104	53	51	98	63	63	88	44	57	?
Svizzera		72	61	49	76	49	47	49	37	31	41	?

(a) I dati per l'intera Francia si hanno soltanto a partire dall'anno 1906, perchè prima di detto anno la statistica francese delle cause di morte riguardava le sole città principali.

(b) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

(c) Inclusi i morti per polimieliti acute.

F). — Mortalità per difterite e laringite croupale in alcuni Stati europei, durante gli anni dal 1901 al 1911
(Cifre proporzionali ad 1.000.000 di abitanti).

STATI		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Italia		167	138	124	137	128	128	168	175	170	140	106
Austria e Ungheria	Austria	500	424	419	443	394	336	249	287	289	262	255
	Ungheria	477	463	546	454	409	356	355	454	447	416	417
Belgio		257	263	199	182	175	166	156	166	153	142	?
Francia		(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	84	93	88	89	72	?
Regno Unito del- la Gran Breta- gna e Irlanda	Inghilterra e Galles	299	256	197	187	175	192	177	169	155	122	138
	Irlanda	149	166	152	133	127	137	98	112	121	99	108
	Scozia	196	175	158	164	157	187	157	160	195	198	?
Olanda		178	157	127	120	101	83	81	81	78	68	72
Prussia		483	401	415	388	324	266	244	253	250	243	254
Rumania		211	158	132	99	74	67	56	45	52	97	145
Serbia		764	728	760	511	533	517	410	324	392	?	?
Spagna		338	280	252	202	185	177	189	203 (b)	219 (b)	216 (b)	190 (b)
Svezia		508	338	265	257	324	216	156	119	132	145	?
Svizzera		315	214	158	175	190	145	147	155	157	122	?

(a) I dati per l'intera Francia si hanno soltanto a partire dall'anno 1906, perchè prima di detto anno la statistica francese delle cause di morte riguardava le sole città principali.

(b) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

G). — Mortalità per ipertosse in alcuni Stati europei, durante gli anni dal 1901 al 1911

(Cifre proporzionali ad 1.000.000 di abitanti)

STATI		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Italia		213	220	199	180	174	185	183	164	153	158	197
Austria e Ungheria	Austria	461	602	445	359	358	483	383	321	304	300	412
	Ungheria	363	657	483	270	335	403	436	311	342	309	263
Belgio		348	384	391	412	376	351	322	362	280	329	?
Francia		(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	89	90	89	66	89	?
Regno Unito del- la Gran Breta- gna e Irlanda	Inghilterra e Galles	313	298	286	354	256	242	296	281	203	246	217
	Irlanda	253	226	240	352	132	211	184	216	268	296	186
	Scozia	614	392	429	527	488	295	534	458	470	211	?
Olanda		232	198	160	258	221	178	181	229	171	179	184
Prussia		402	376	325	330	360	312	231	275	251	234	203
Rumania		98	230	216	97	156	196	165	349	157	279	183
Serbia		1543	2024	2878	1738	1639	1523	1791	2076	1716	?	?
Spagna		208	226	241	241	230	232	177	250 (b)	182 (b)	128 (b)	127 (b)
Svezia		171	209	183	169	145	166	118	178	138	130	?
Svizzera		253	151	164	241	186	182	120	134	229	198	?

(a) I dati per l'intera Francia si hanno soltanto a partire dall'anno 1906, perchè prima di detto anno la statistica francese delle cause di morte riguardava le sole città principali

(b) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

H). — Mortalità per malattie tubercolari in alcuni Stati Europei, durante gli anni dal 1901 al 1911
(Cifre proporzionali ad 1.000.000 di abitanti).

STATI	1901		1902		1903		1904		1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911	
	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari	Tubercolosi polmonare	Altre forme tubercolari
Italia	1113	600	1012	591	1013	604	1075	599	1035	682	1022	668	1068	642	1060	613	1071	613	1029	581	1061	662
Austria { Austria	3345		3378		3369		3324		3611		3161		3163		3039		3030		2877		2937	
Ungheria { Ungheria	3657		3851		3896		3929		4485		3892		3910		3761		3686		3483		3671	
Belgio	1351	?	1316	?	1086	?	1091	?	1075	?	1056	?	1008	?	1010	?	1019	?	972	?	?	?
Francia	(a)		(a)		(a)		(a)		(a)		1821	?	1903	?	1863	?	1781	?	1788	?	?	?
Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda { Inghilterra e Galles	1264	543	1234	508	1205	540	1244	546	1146	495	1157	498	1148	469	1127	473	1091	446	1015	419	1062	406
Irlanda	2147	626	2120	550	2164	593	2231	649	2095	606	2031	642	2012	650	1941	634	1835	580	1716	568	1730	465
Scozia	1513	?	1458	?	1462	?	1476	?	1388	?	1405	?	1380	?	1299	?	1274	?	1142	?	?	?
Olanda	1373	?	1325	?	1341	?	1309	?	1373	?	1352	?	1312	?	1210	?	1237	?	1189	?	1186	?
Prussia	1938		1887		1950		1900		1898		1713		1703		1633		1547		1515		1512	
Serbia	2431	?	2656	?	2775	?	2770	?	3325	?	2874	?	2925	?	3119	?	3437	?	?	?	?	?
Spagna	1536	?	1492	?	1437	?	1505	?	1408	?	1436	?	1404	?	1378 (b)	?	1274 (b)	?	1254 (b)	?	1223 (b)	?
Svizzera	1868	?	1855	?	1861	?	1858	?	1886	?	1800	?	1682	?	1686	?	1628	?	1609	?	?	?

(a) I dati per l'intera Francia si hanno soltanto a partire dall'anno 1906, perchè prima di detto anno la statistica francese delle cause di morte riguardava le sole città principali.
(b) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

I). — Mortalità per tumori maligni in alcuni Stati europei, durante gli anni dal 1901 al 1911

(Cifre proporzionali ad 1.000.000 di abitanti)

STATI		1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Italia		527	539	541	571	583	620	617	645	642	656	668
Austria e Ungheria	Austria	729	742	737	749	762	779	774	780	787	779	823
	Ungheria	359	382	394	409	408	409	427	441	445	456	464
Belgio		?	?	585	561	587	585	601	638	642	633	?
Francia		(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	695	746	765	777	792	?
Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda	Inghilterra e Galles	843	846	874	882	889	922	915	933	961	967	993
	Irlanda	651	645	690	693	748	792	761	756	798	835	817
	Scozia	818	823	837	859	900	976	979	986	1016	1027	?
Olanda		937	950	989	979	1012	1007	1018	1028	1026	1064	1071
Prussia		617	619	652	686	694	704	734	736	748	785	806
Spagna		424	433	441	466	458	476	475	514 (b)	510 (b)	517 (b)	514 (b)
Svizzera		1278	1258	1297	1286	1295	1290	1225	1280	1267	1235	?

(a) I dati per l'intera Francia si hanno soltanto a partire dall'anno 1906, perchè prima di detto anno la statistica francese delle cause di morte riguardava le sole città principali.

(b) I dati relativi alla Spagna, per gli anni 1908-1911, sono provvisori.

Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte.

1. Asfissia e apoplessia nel parto.
2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostrosità.
3. Cianosi, vizi congeniti di cuore.
4. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
5. Labbroleporino complicato (golalupina).
6. Atrofia congenita, atelectasia polmonare, immaturità.
7. Vaiuolo e vaiuoloide.
8. Morbillo (rosolia).
9. Scarlattina.
10. Risipola.
11. Febbre tifoidea, pneumo-tifo, meningotifo, paratifo, febbre miliare.
12. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
13. Meningite cerebro-spinale epidemica.
14. Diftèrite.
15. Laringite crupale.
16. Ipertosse (tosse convulsiva).
17. Grippe o influenza.
18. Febbri da malaria.
19. Cachessia palustre.
20. Dissenteria epidemica.
21. Colèra asiatico.
22. Siflide.
23. Setticemia, pioemia, cangrena nosocomiale.
24. Pustola maligna, carbonchio.
25. Moccio (farcino, cimurro).
26. Lebbra (elefantiasi dei greci).
27. Rabbia (idrofobia).
28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate.
29. Turbercolosi disseminata.
30. Meningite tubercolare, basilare, idrocefalo acquisito.
31. Turbercolosi polmonare, polmonite caseosa, tisi polmonare.
32. Tabè mesenterica ed intestinale.
33. Scrofola disseminata.
34. Lupo.
35. Artrite fungosa, sinovite fungosa.
36. Tubercolosi delle ossa.
37. Male vertebrale di Patt.
38. Rachitide.
39. Anemia, clorosi.
40. Leucemia, anemia pernicioso progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin.
41. Porpora emorragica, morbo di Werloff.
42. Emofilia, morbo di Barlow.
43. Scorbuto.
44. Marasmo senile.
45. Pellagra.
46. Gotta.
47. Diabete zuccherino ed insipido.
48. Tumori maligni } disseminati in più organi.
49. Tumori maligni } dell'utero, vagina, ovaia.
50. Tumori maligni } delle mammelle.
51. Tumori maligni } della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli.
52. Tumori maligni } della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.
53. Tumori maligni } dello stomaco, esofago.
54. Tumori maligni } del fegato.
55. Tumori maligni } della milza, del pancreas, intestino, peritoneo.
56. Tumori maligni } delle ossa, delle articolazioni.
57. Tumori maligni } dei centri nervosi e degli organi dei sensi.
58. Tumori maligni } d'altri organi.
59. Meningite semplice cerebrale e spinale.
60. Mielite, tabè dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séguar, di Morvan.
61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante.
62. Paralisi infantile.
63. Encefalite.
64. Apoplessia e congestione cerebrale.
65. Tumori cerebrali e spinali (a).
66. Rammollimento cerebrale.
67. Paralisi progressiva, demenza paralitica.
68. Epilessia, morbo di Jackson.
69. Convulsioni, isterismo.
70. Corea.
71. Tetano e trisma.
72. Eclampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi.
73. Successioni della pazzia, mania, neurastenia (b).
74. Malattie degli organi della vista (a).
75. Id. degli orecchi, otite, morbo del Ménière (a).

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, pei quali non fu specificata la causa diretta della morte.

76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (a).
77. Bronchite acuta.
78. Id. cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, piotorace, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.) (a).
80. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare.
81. Polmonite erupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, cangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixedema) (a).
85. Gozzo esoftalmico, morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.
87. Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, ateromasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite).
88. Id. delle vene (flebite, varici, trombosi, emorroidi).
89. Id. dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).
90. Id. del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, miocardite, rottura, ecc.).
91. Id. del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, canero acquatico, morbo di Riga, glossite, ulcerazione al frenulo (a).
95. Orecchioni.
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (a).
97. Id. dello stomaco, gastrite, atrepsia, dispepsia, morbo di Ludwig (a).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atrofia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Ittero grave, melena, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (a).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tifite, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, dentizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali e addominali (a).
107. Ernie intestinali e addominali.]
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Appendicite. ascesso della fossa iliaca.
- 110^a. Peritonite.
111. Idrope-ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (a).
113. Id. della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (a).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (a).
116. Id. delle capsule soprarrenali (morbo di Addison).
117. Id. dei testicoli (tumori, ecc.) (a).
118. Id. dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (a).
119. Id. dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocole, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (a).
120. Id. delle mammelle (ascesso, tumori) (a).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metroperitonite puerperale.
126. Sincope ed altri accidenti nel parto.
127. Flemmone, ascesso (a).
128. Cangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta lattea, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema; edema dei neonati, lithopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (a).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psoite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcoolismo cronico.
139. Avvelenamento cronico accidentale o professionale.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

- 140. in istato di ubbriachezza.
- 141. per annegamento.
- 142. per freddo.
- 143. per insolazione.
- 144. per fulminazione:
 - a) naturale.
 - b) da apparecchi elettrici.
- 145. per caduta.
- 146. per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine.
- 147. per ferite da taglio.
- 148. per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.
- 149. per schiacciamento da caduta d'alberi o d'altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere; sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari.
- 150. per violenze d'animali.
- 151. per ustione.
- 152. per soffocamento.
- 153. per asfissia.
- 154. per avvelenamenti acuti.
- 155. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.
- 156. per cause non determinate.

Morte accidentale violenta

- 157. Omicidio (compreso quello d'infante)
- 158. Duello.
- 159. Condanna alla pena capitale (a).
- 160. per annegamento.
- 161. con arma da fuoco.
- 162. con arma da taglio.
- 163. per impiccamento.
- 164. per precipitazione.
- 165. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.
- 166. per avvelenamento.
- 167. per asfissia.
- 168. con altro mezzo o con mezzo non determinato.

Suicidio

Morti per causa ignota o non dichiarata.

(a) Questa pena, cancellata dal Codice penale comune, andato in vigore nel 1890, è ancora mantenuta nei Codici penali speciali per l'Esercito e per la Marina.

TAVOLE



Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
1	Astissia ed apoplessia nel parto . . .	8	19	19	32	19	1	27	12	21	4
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	15	13	8	19	9	3	14	30	12	14
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	18	6	15	18	10	2	20	17	15	7
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	1	4	1	..	1	1	2	1
5	Labbro leporino	3	5	7	8	4	2	14	13	5	2
6	Atrofia congenita, immaturità	477	676	544	826	701	82	869	832	497	514
7	Vaiuolo	1	..	2	..	7	6	..
8	Morbillo	167	105	60	66	195	33	145	66	250	30
9	Scarlattina	9	9	6	9	21	4	..	12	4	2
10	Risipola	55	31	34	64	67	7	35	35	36	19
11	Febbre tifoidea	151	115	103	246	106	17	192	228	224	172
12	Tifo petecchiale	1	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica
14	Difterite	23	33	40	75	117	4	37	51	35	13
15	Laringite crupale	38	26	29	24	32	4	35	35	40	17
16	Ipertosse	256	107	230	187	141	6	179	155	92	33
17	Influenza	80	69	134	136	122	14	42	87	75	110
18	Febbri da malaria	1	1	6	3	1	2	1	9
19	Cachessia palustre	1	1
20	Dissenteria	1	..	1
21	Colera asiatico.	33	..	3	..	266	..	14
22	Sifilide	13	14	15	24	46	13	4	21	15	5
23	Setticemia, pioemia	42	34	43	95	85	2	44	52	35	37
24	Pustola maligna, carbonchio	4	5	2	6	9	1	1	1	1	..
25	Moccio, cimurro	1
26	Lebbra	1	2
27	Rabbia	1	..	1
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	1	..	1	1	3	..
29	Tubercolosi disseminata	120	73	107	143	254	19	101	131	117	65
30	Meningite tubercul., idrocefalo acquisito	147	48	135	193	295	17	122	110	188	94
31	Tubercolosi pulmonare, tisi	971	639	1 082	1 651	1 663	237	607	678	934	399
32	Tabe mesenterica	97	78	91	121	115	14	132	122	142	78
33	Scrofolo disseminata	13	14	10	20	14	1	9	19	13	5
34	Lupo	1	2	2	4	2	3	1
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa	12	7	13	21	21	2	12	9	13	5

Numero dell'elenco nosologico	BARDIA				VENETO								EMILIA	
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA
1	3	47	14	5	9	31	7	19	20	21	20	33	6	8
2	16	34	13	2	3	21	7	17	12	11	18	15	15	9
3	9	40	3	3	9	9	5	7	10	8	8	9	11	10
4	..	2	1	..	2	3	1
5	2	9	4	..	1	..	2	4	5	6	4	6	6	3
6	438	2 171	373	114	302	1 031	740	603	679	705	524	766	905	717
7	..	2	1	4	1	2
8	208	1 268	214	15	4	116	21	17	87	38	36	20	51	15
9	16	22	22	23	4	3	11	9	11	8	12	14
10	22	134	38	9	7	36	7	15	36	26	30	23	30	47
11	120	635	146	47	30	163	91	146	164	119	180	185	155	62
12	1	1	1	1	1
13	1	..
14	21	110	19	13	29	24	26	43	57	25	27	18	41	50
15	14	147	14	6	22	7	6	40	33	16	12	21	12	14
16	108	368	111	51	69	152	55	216	171	158	182	152	219	38
17	41	208	84	49	37	69	36	117	149	108	56	92	82	49
18	4	10	4	..	1	8	53	1	7	36	9	..	1	30
19	1	3	1	5	9	..	2	17	4	1	..	5
20
21	..	8	4	16	116	7	28
22	12	97	5	..	4	9	3	5	11	17	64	19	20	8
23	29	197	58	9	19	48	18	24	54	46	44	31	80	42
24	1	4	1	1	1	..	1	1	1	1	1	..
25	1
26	1	1
27	..	4	1	2	..	2	5	..
28	..	4	2	1
29	84	319	61	17	44	110	60	85	151	74	94	131	131	79
30	90	466	139	15	57	143	74	141	193	176	128	146	133	58
31	312	2 874	603	129	291	636	240	518	841	668	538	590	654	309
32	60	318	90	16	37	97	65	80	110	107	117	107	125	69
33	3	34	7	..	15	31	7	17	13	18	8	27	7	9
34	1	6	1	2	1	2	1	3	1
35	6	25	7	1	1	9	1	8	8	7	13	7	3	4

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
1	Asfissia ed apoplessia nel parto . . .	12	23	10	1	2	12	2	11	3	..
2	Iidrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	7	11	14	11	3	7	5	33	1	2
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo.	7	10	2	5	3	13	3	26	7	1
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	1	3	2	2
5	Labbro leporino	1	1	..	2	1	3	2	4	1	..
6	Atrofia congenita, immaturità	556	801	422	283	302	674	328	1 110	182	106
7	Vaiuolo	2	..	1	1	4	9
8	Morbillo	63	118	6	95	20	62	129	179	38	19
9	Scarlattina	4	11	9	5	6	7	1	24	1	4
10	Risipola	19	19	21	11	13	12	14	83	16	4
11	Febbre tifoidea	107	76	51	52	67	61	81	323	58	34
12	Tifo petecchiale	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica.	1
14	Difterite	42	20	21	19	28	7	15	43	3	3
15	Laringite crupale	19	8	8	13	7	..	10	36	5	5
16	Ipertosse	105	63	26	57	72	64	25	252	35	16
17	Influenza	33	33	42	11	23	24	26	85	33	15
18	Febbri da malaria	1	..	2	..	4	2	37	..
19	Cachessia palustre	1	5
20	Dissenteria	1
21	Colera asiatico	18	9	..	1	..	370
22	Sifilide	7	7	4	22	3	14	12	31	1	7
23	Setticemia, pioemia	23	35	52	15	21	23	25	105	13	20
24	Pustola maligna, carbonchio	4	..	1	..	1	1	1	8	..	1
25	Moccio, cimurro	1
26	Lebbra
27	Rabbia	1	..	2	2
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	2	..	1	1	1	..
29	Tubercolosi disseminata	91	68	58	34	52	60	53	215	23	46
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito.	51	60	91	66	52	61	43	222	26	38
31	Tubercolosi polmonare, tisi	326	372	310	314	262	293	303	1 485	197	233
32	Tabe mesenterica	72	75	40	44	28	53	56	235	44	20
33	Scrofolo disseminata	7	6	5	7	2	15	11	16	4	4
34	Lupo	1	2	..	1	..	1	1	2	..
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . .	5	7	10	3	..	2	2	18	3	8

Numero dell'Elenco nosologico	S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	L A Z I O	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'Elenco nosologico
	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
1	10	4	10	6	7	2	3	5	11	18	3	3	4	1	1
2	12	7	14	12	7	8	7	3	12	19	12	5	16	11	2
3	7	10	5	3	5	3	4	7	11	20	3	3	4	3	4
4	1	1	3	1	2	1	..	1	4
5	..	1	1	1	3	..	1	2	2	8	4	3	2	..	5
6	367	243	296	323	372	312	300	553	924	1 305	473	177	374	311	6
7	1	..	3	4	2	112	2	3	2	..	7
8	9	12	62	22	33	1	10	15	89	184	60	100	90	6	8
9	3	..	1	..	3	3	8	1	..	38	47	13	65	50	9
10	18	14	22	11	13	21	12	7	39	90	15	16	9	10	10
11	63	34	108	89	90	89	73	62	307	372	172	132	91	99	11
12	2	2	1	2	12
13	13
14	7	5	15	5	15	19	13	8	37	120	33	37	21	13	14
15	9	6	13	3	23	5	14	10	21	42	18	36	24	16	15
16	75	118	84	14	119	72	36	101	122	219	92	16	89	59	16
17	29	17	27	64	26	38	46	64	97	226	92	67	53	72	17
18	1	..	4	2	1	2	1	2	3	150	4	105	68	3	18
19	1	..	1	1	..	6	39	2	13	6	2	19
20	1	20
21	3	45	8	..	2	47	..	131	59	307	61	7	21
22	9	1	9	5	9	7	8	4	30	163	19	23	41	6	22
23	27	15	32	26	40	13	15	12	50	177	26	28	30	12	23
24	1	1	2	1	..	1	1	..	4	10	1	2	4	1	24
25	25
26	1	1	1	26
27	8	..	1	27
28	2	1	1	4	28
29	38	42	49	73	42	33	36	67	120	163	42	53	31	50	29
30	76	46	53	30	53	39	37	41	88	338	87	77	61	29	30
31	419	322	417	253	281	154	145	225	633	1 555	333	221	243	177	31
32	55	55	72	57	51	36	52	72	120	257	112	108	86	90	32
33	8	11	7	13	10	2	2	8	12	17	13	10	11	5	33
34	..	1	1	..	1	2	2	..	1	9	..	1	1	..	34
35	8	..	6	1	6	..	3	2	10	26	3	..	3	9	35

ANNO 1911.

A) Per

province

ANNO 1911.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO	CALABRIE		SICILIA							SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA		COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIREGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
1	Asfissia ed apoplessia nel parto . . .	3	10	20	20	7	14	5	6	10	7	13	18	..	5	2	6	4	8	..	2	3	1
2	Iidrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	20	9	22	37	24	8	18	17	9	5	6	2	11	17	16	4	33	10	8	12	5	2
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	4	3	8	9	6	8	3	25	3	7	4	12	5	18	4	3	17	13	4	16	4	3
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	2	1	4	6	4	2	1	4	1	..	1	..	2	3	3	1	1	2	..	4
5	Labbro leporino	2	1	..	8	3	5	5	6	3	3	1	1	..	3	2	1	4	4	2	1	4	5
6	Atrofia congenita, immaturità	326	193	548	815	418	1 126	559	674	536	519	373	429	517	810	612	515	958	594	385	602	304	6
7	Vainolo	7	3	743	840	38	7	..	81	3	43	122	5	3	13	223	6	2 499	1	14	5	..	7
8	Morbillo	39	99	362	285	62	1 108	122	93	332	174	99	232	121	60	206	56	73	158	10	39	186	8
9	Scarlattina	53	13	39	18	10	31	32	20	100	33	402	90	50	237	7	11	370	378	86	9
10	Risipola	13	6	40	45	26	64	30	80	31	36	37	30	14	39	19	32	38	27	10	29	10	10
11	Febbre tifoidea	106	39	184	179	167	142	148	171	104	136	109	109	153	241	202	187	282	148	126	71	45	11
12	Tifo petecchiale	1	..	2	2	1	2	..	2	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica	13
14	Difterite	18	4	47	18	16	17	15	21	16	28	46	23	19	82	22	43	36	31	8	21	9	14
15	Laringite crupale	21	9	36	115	29	54	47	56	34	42	24	28	12	37	13	13	36	12	10	13	8	15
16	Ipertossie	52	16	57	68	82	103	72	46	118	82	43	85	70	88	21	73	103	172	38	53	18	16
17	Influenza	98	55	191	127	115	73	149	244	148	128	141	115	38	56	221	44	43	75	47	155	98	17
18	Febbri da malaria	22	27	97	11	30	51	250	254	113	156	103	79	82	273	62	64	105	215	101	559	303	18
19	Cachessia palustre	5	6	19	1	6	15	40	80	41	44	34	24	16	54	16	6	28	88	37	132	64	19
20	Dissenteria	1	20
21	Colera asiatico	91	26	740	873	432	105	116	36	13	82	56	2	166	364	278	88	830	62	150	66	6	21
22	Sifilide	12	16	35	270	32	60	19	57	23	79	29	47	12	36	14	108	44	22	21	26	7	22
23	Setticemia, pioemia	25	6	54	118	158	48	30	74	31	48	47	38	25	55	32	53	65	50	37	49	25	23
24	Pustola maligna, carbonchio	5	8	5	4	5	10	10	16	11	8	9	3	8	4	3	7	2	4	19	5	24
25	Moccio, cimurro	1	25
26	Lebbra	3	..	1	2	..	1	1	..	1	..	1	1	1	26
27	Rabbia	1	1	3	2	..	1	..	4	..	1	1	5	2	1	27
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	1	2	1	5	1	..	1	1	2	1	1	28
29	Tubercolosi disseminata	42	19	95	111	61	71	37	120	50	52	62	40	48	60	34	58	100	76	22	142	81	29
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito	46	37	87	247	67	174	92	194	55	41	50	24	31	50	44	47	95	44	32	80	105	30
31	Tubercolosi polmonare, tisi.	196	137	498	1 296	401	655	420	772	258	304	323	219	205	491	205	413	751	298	234	601	516	31
32	Tabes mesenterica	103	40	204	409	177	345	116	208	107	70	90	46	63	123	57	50	165	62	40	122	90	32
33	Scrofolo disseminata	11	11	19	25	18	38	6	24	14	10	9	10	8	15	12	8	26	16	8	55	31	33
34	Lupo	1	1	2	1	1	..	4	..	1	2	..	1	1	2	1 3	1	2	1	4	34
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa	8	2	8	18	7	13	9	9	10	5	3	5	5	7	7	2	14	6	2	8	5	35

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOMBARDIA				VENETO						EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico							
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRASCIÀ	COMO	CREMONA	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO		UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi.	18	26	23	38	51	8	29	29	37	11	13	84	21	6	21	26	18	21	41	21	35	31	35	13	36	
37	Morbo di Pott	14	10	10	41	21	1	10	11	13	10	5	34	8	4	11	3	5	12	24	9	12	15	11	9	37	
38	Rachitide	7	23	20	19	46	2	72	52	60	29	63	80	21	5	10	146	209	55	53	96	52	48	41	117	38	
39	Anemia	209	173	174	155	150	35	137	188	126	95	79	420	95	21	57	206	141	129	217	224	156	172	51	157	39	
40	Leucemia	29	26	22	64	54	5	25	29	25	35	10	70	21	3	5	23	17	15	21	21	16	10	19	10	40	
41	Porpora emorragica	4	7	4	5	4	..	8	6	6	4	3	11	2	..	1	4	4	5	1	2	4	3	11	5	41	
42	Emofilia	2	4	7	6	5	..	3	5	3	1	..	11	5	2	..	1	2	2	6	2	3	2	3	2	42	
43	Scorbuto	2	..	1	..	5	..	2	1	2	3	22	8	3	..	2	3	1	1	3	6	3	3	19	8	43	
44	Marasmo senile	1 165	1 147	998	1 833	1 041	212	566	668	721	503	402	1 738	676	207	360	561	419	526	1 070	398	572	611	721	344	44	
45	Pellagra	11	..	5	..	3	..	73	74	15	49	18	86	13	6	8	148	36	57	73	51	58	100	19	17	45	
46	Gotta	2	5	4	2	7	1	..	2	4	..	1	1	1	1	..	1	3	1	1	46	
47	Diabete	26	31	37	78	83	8	15	29	38	15	20	82	17	4	8	26	5	18	37	19	29	25	32	10	47	
48	disseminati in più organi	55	42	87	115	81	13	37	63	59	30	32	172	44	5	35	34	12	40	48	53	44	34	53	14	48	
49	dell'utero, vagina, ovaia	52	28	69	122	103	11	25	40	33	22	31	146	30	7	15	23	20	27	39	37	27	43	58	32	49	
50	delle mammelle	18	18	27	62	43	1	14	27	23	16	13	60	13	9	5	9	3	16	17	14	17	9	17	9	50	
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	19	12	21	17	17	3	8	16	5	4	6	25	10	1	2	8	7	2	2	21	7	6	10	5	51	
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	22	16	23	59	36	9	12	26	20	16	16	66	21	3	5	27	10	16	14	35	20	14	37	15	52	
53	dello stomaco, esofago	187	167	200	272	276	41	153	227	233	126	101	589	187	42	38	116	45	92	186	110	94	57	215	57	53	
54	del fegato	78	41	82	80	84	13	57	71	56	35	24	157	52	1	10	38	20	28	46	44	25	29	73	36	54	
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	64	60	88	139	98	19	55	84	76	51	46	173	54	18	18	29	10	35	44	35	21	26	83	22	55	
56	delle ossa, articolazioni	2	3	9	17	12	1	6	4	6	8	3	7	4	5	2	5	2	7	6	5	4	5	16	2	56	
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi	12	9	11	17	19	6	14	15	12	5	5	42	20	..	6	10	6	11	7	11	6	6	9	..	57	
58	d'altri organi	38	20	38	55	45	12	16	41	30	20	13	102	24	9	15	27	11	24	27	27	20	29	10	15	58	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	272	214	249	362	409	50	372	358	326	145	100	1 086	172	38	101	169	111	142	185	202	155	183	145	72	59	
60	Mielite, tabe dorsale	64	56	66	97	105	12	61	55	42	28	35	129	38	14	16	27	13	34	61	28	46	37	39	14	60	
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	9	6	16	21	16	1	7	6	7	7	7	33	6	..	3	2	4	4	8	2	3	3	11	3	61	
62	Paralisi infantile	10	4	7	11	2	4	4	5	3	2	1	11	..	2	2	8	2	7	13	12	1	1	1	2	62	
63	Encefalite	25	18	25	86	41	8	18	44	26	15	12	77	19	1	7	15	12	32	98	17	11	19	16	21	63	
64	Apoplessia e congestione cerebrale	930	664	685	1 158	837	130	652	826	715	512	589	1 789	540	88	105	549	266	371	381	504	632	522	671	332	64	
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	2	3	..	7	9	1	4	1	1	2	..	10	..	65	
66	Rammollimento cerebrale	33	17	8	41	14	8	25	29	10	20	16	38	13	..	1	11	5	5	11	15	10	11	50	17	66	
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	134	109	97	138	148	15	59	115	85	62	71	183	42	13	22	58	22	42	86	44	59	55	129	62	67	
68 e 69	Epilessia, isterismo	48	44	48	61	67	14	37	34	41	14	14	100	16	9	13	13	2	27	40	19	17	32	32	12	68 e 69	
70	Corea	4	..	2	2	1	..	1	2	5	1	3	7	1	..	4	1	1	..	1	1	2	1	70	
71	Tetano e trisma	24	5	18	15	16	2	16	22	5	21	6	21	16	2	4	8	10	21	15	6	8	8	14	2	71	
72	Eclampsia infantile	187	246	129	298	375	49	178	151	171	80	102	419	60	37	33	255	51	248	312	253	98	273	77	53	72	
73	Successioni della pazzia	1	1	3	5	1	4	..	73

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Segue TAV. I. — Morti classificate secondo 168 cause di morte.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

A — Per

provincie.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA										TOSCANA				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'elenco nosologico
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	19	18	13	9	13	13	52	5	6	16	21	17	21	19	8	11	13	23	32	25	13	13	13	36	
37	Morbo di Pott	6	6	9	4	1	8	4	7	1	21	6	11	3	7	5	2	4	12	29	9	2	2	7	37	
38	Rachitide	90	89	53	6	28	51	60	50	4	27	17	16	17	89	117	69	46	80	104	37	29	23	35	38	
39	Anemia	47	44	65	47	15	74	47	81	20	37	40	36	47	67	67	71	30	186	342	102	125	71	97	39	
40	Leucemia	14	13	18	14	5	14	13	23	13	17	11	9	7	19	11	10	7	40	66	20	82	34	19	40	
41	Porpora emorragica	1	..	2	2	..	1	2	7	..	2	1	3	1	2	1	2	4	3	14	2	2	3	4	41	
42	Emofilia	1	..	5	1	1	..	1	8	1	1	1	3	1	2	1	2	4	3	4	1	4	1	4	42	
43	Scorbuto	1	10	6	3	3	5	..	4	..	4	1	2	3	6	3	2	2	3	4	1	4	2	1	43	
44	Marasmo senile	350	594	332	385	236	511	517	1 457	171	596	390	440	270	536	475	497	493	1 281	1 209	910	847	900	620	44	
45	Pellagra	10	14	14	29	2	6	10	22	..	8	1	4	3	6	15	32	28	65	20	..	1	..	6	45	
46	Gotta	1	1	3	1	2	1	2	3	10	7	3	7	8	1	46	
47	Diabete	15	29	12	13	11	8	12	62	3	23	9	20	13	24	8	9	7	27	127	22	7	13	11	47	
48	disseminati in più organi	29	29	28	21	28	38	21	86	8	32	21	30	13	27	13	26	17	61	85	23	45	33	26	48	
49	dell'utero, vagina, ovaia	24	38	37	19	29	33	17	96	11	32	17	26	20	13	9	18	22	60	164	33	15	29	19	49	
50	delle mammelle	7	4	14	11	8	6	9	23	3	19	6	14	10	11	6	13	7	17	50	12	10	15	3	50	
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	5	4	5	3	10	10	5	19	2	10	4	10	4	6	5	6	2	3	27	4	4	8	2	51	
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, della fauci, della tiroide, laringe, trachea	11	10	14	10	12	10	6	36	6	10	9	17	10	14	4	1	12	11	69	10	4	8	6	52	
53	dello stomaco, esofago	140	112	130	96	144	73	145	449	60	93	54	119	148	66	29	74	63	94	206	60	33	21	24	53	
54	del fegato	41	27	17	23	33	21	24	106	15	43	13	35	17	29	16	21	21	36	81	19	16	18	8	54	
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	36	36	46	21	43	26	24	128	17	43	13	35	17	29	16	21	21	36	81	19	16	18	8	54	
56	delle ossa, articolazioni	3	1	2	4	2	7	2	9	..	4	1	2	3	2	1	1	1	3	8	..	1	1	..	56	
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi	9	8	9	2	6	5	1	29	3	8	1	6	3	6	8	4	2	10	31	10	12	9	8	57	
58	d'altri organi	20	20	19	17	28	10	21	53	4	21	9	27	18	12	14	17	12	31	77	10	12	22	16	58	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	67	107	78	60	32	137	55	273	47	99	76	110	34	78	47	84	38	103	339	111	130	73	54	59	
60	Mielite, tabe dorsale	20	26	24	23	14	20	23	63	7	20	18	17	18	30	24	26	29	57	87	42	40	27	27	60	
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	1	2	3	4	7	3	..	17	1	6	3	4	3	2	5	6	27	5	9	8	..	61	
62	Paralisi infantile	9	5	2	1	1	2	5	6	2	2	1	2	1	4	2	5	4	11	12	1	7	6	..	62	
63	Encefalite	10	4	8	5	8	7	8	19	1	8	1	4	4	13	3	6	11	24	35	8	23	8	10	63	
64	Apoplessia e congestione cerebrale	416	437	381	338	297	415	381	1 280	133	418	140	462	335	491	343	431	390	881	1 291	458	406	501	465	64	
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	3	1	..	3	2	2	3	14	2	3	1	6	65	
66	Rammollimento cerebrale	7	24	39	7	6	18	5	38	2	18	1	8	12	17	9	3	11	25	113	10	7	7	11	66	
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	58	95	43	40	57	59	61	177	27	49	21	61	71	73	38	66	93	147	187	24	24	21	28	67	
68	Epilessia, isterismo	10	8	16	11	5	20	22	41	1	15	16	20	31	15	8	19	19	41	48	37	22	21	31	68	
69	Corea	1	1	1	1	2	1	..	1	..	2	1	2	3	1	1	2	4	70	
71	Tetano e trisma	11	9	5	5	8	10	5	12	..	4	3	6	1	8	5	6	4	2	16	3	2	10	5	71	
72	Eclampsia infantile	152	62	72	66	63	111	110	424	86	82	80	119	93	225	172	305	195	430	796	180	152	307	364	72	
73	Successioni della pazzia	2	1	..	3	..	2	7	6	..	4	2	16	3	1	1	1	..	73	

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi .	37	10	32	99	42	40	21	24	23	26
37	Morbo di Pott	5	6	13	20	10	10	9	12	5	10
38	Rachitide	28	11	33	50	37	77	37	63	25	66
39	Anemia	123	144	334	367	341	466	195	323	162	121
40	Leucemia	22	15	47	116	49	34	41	81	30	20
41	Porpora emorragica	4	3	7	23	5	13	3	12	1	9
42	Emofilia	5	1	7	9	7	6	3	3	2	3
43	Scorbuto	1	2	2	1	9	..	2	1	1
44	Marasmo senile	847	505	1 674	2 755	1 543	1 627	596	1 207	937	950
45	Pellagra	1
46	Gotta	5	4	7	7	6	5	3	8	5	4
47	Diabete	7	5	39	81	19	37	7	21	13	23
48	disseminati in più organi	33	27	94	104	54	87	27	74	32	39
49	dell'utero, vagina, ovaia	14	10	44	131	25	67	35	65	17	40
50	delle mammelle	7	5	17	53	20	22	10	21	7	15
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	4	2	3	28	4	12	6	12	7	7
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	9	1	16	38	16	19	9	13	8	5
53	dello stomaco, esofago	15	17	62	70	28	38	19	48	44	33
54	del fegato	20	8	37	91	20	36	14	42	20	14
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	17	12	30	109	30	53	19	27	25	16
56	delle ossa, articolazioni	2	1	4	7	..	3	3	..
57	dei centri nervosi ed organi dei sensi	6	5	12	14	5	12	5	4	10	8
58	d'altri organi	20	11	21	65	18	36	9	31	10	12
59	Meningite semplice cerebrale e spinale .	130	59	337	995	243	416	263	380	112	166
60	Mielite, tabe dorsale	31	22	72	129	45	71	17	41	26	31
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	7	1	3	24	7	10	5	11	5	5
62	Paralisi infantile	3	2	10	10	9	19	2	7	6	4
63	Encefalite	9	5	18	25	15	20	10	18	12	9
64	Apoplessia e congestione cerebrale . .	391	331	1 057	1 640	641	999	512	788	463	366
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	2	..
66	Rammollimento cerebrale	1	1	10	11	3	14	2	9	7	5
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	19	22	76	254	101	55	24	56	30	27
68 e 69	Epilessia, isterismo	21	16	69	97	108	24	18	28	28	43
70	Corea	1	..	4	1	3	4	1	2	1	..
71	Tetano e trisma	7	..	10	12	6	8	3	14	1	4
72	Eclampsia infantile	240	211	1 137	1 490	449	1 321	634	412	337	482
73	Successioni della pazzia	1	4	12	1	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		Numero dell'elenco nosologico
COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	CIRIGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
15	11	22	26	13	13	26	10	13	31	35	36	
4	2	6	12	8	8	4	6	5	7	10	37	
27	77	33	40	40	25	46	70	14	118	63	38	
97	161	366	427	409	180	519	346	192	315	159	39	
20	20	31	69	53	43	59	23	22	37	21	40	
3	4	5	8	6	6	15	7	5	8	5	41	
1	3	7	8	3	7	21	11	3	5	3	42	
1	5	9	..	2	..	25	1	..	5	..	43	
1 060	725	637	1 200	801	1 105	1 808	583	596	893	435	44	
2	2	1	45	
6	6	1	12	4	7	9	7	..	3	2	46	
18	14	10	44	21	24	46	30	22	15	25	47	
24	38	47	59	55	79	118	42	42	34	20	48	
28	34	27	56	17	27	62	28	22	19	12	49	
16	8	9	23	4	8	22	9	8	5	10	50	
5	..	2	5	2	2	6	3	3	4	3	51	
10	7	2	12	6	11	7	13	3	11	6	52	
34	35	19	63	18	67	51	30	19	50	32	53	
15	11	17	46	21	20	64	19	18	16	9	54	
19	22	15	50	20	23	56	20	13	21	11	55	
2	1	1	3	2	1	1	1	56	
9	8	..	8	5	6	11	7	4	7	5	57	
18	12	12	32	11	18	30	21	13	9	11	58	
115	145	163	225	129	181	622	82	216	142	106	59	
31	38	11	54	13	30	45	23	18	42	21	60	
9	8	1	9	1	5	6	5	3	5	5	61	
3	6	8	1	6	4	8	8	5	7	9	62	
13	7	3	10	26	11	19	5	10	17	18	63	
477	281	284	586	341	382	814	351	368	315	180	64	
..	2	65	
9	6	..	4	..	9	10	1	2	9	4	66	
28	30	57	113	87	106	263	61	69	73	24	67	
16	24	10	30	22	33	61	17	10	35	28	68 e 69	
..	2	1	2	2	2	5	1	..	2	2	70	
4	5	2	5	..	4	4	12	2	71	
353	221	143	305	213	316	162	159	59	129	64	72	
..	1	73	

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOMBARDIA					VENETO										EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico	
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	Como	CREMONA	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA		FERRARA
74	Malattie degli occhi (a)	1	1	12	..	1	2	..	74	
75	Malattie degli orecchi (a)	10	6	12	23	25	1	34	17	12	7	4	137	3	1	3	6	1	5	4	6	5	5	9	5	75
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	13	16	13	18	21	5	22	30	25	6	7	76	10	9	11	27	4	18	22	25	10	27	11	5	76
77	Bronchite acuta	644	801	613	1 032	817	134	1 102	856	634	306	473	1 964	467	187	285	553	288	529	694	481	436	499	477	344	77
78	Bronchite cronica	175	232	165	347	150	41	87	121	56	64	68	191	104	33	45	58	38	67	118	39	88	76	113	40	78
79	Malattie della pleura (a)	71	42	56	103	128	17	67	57	78	28	24	197	38	8	11	34	15	28	34	40	44	25	37	19	79
80	Congestione ed apoplezia polmonare	17	27	24	51	24	6	26	11	25	14	9	58	16	5	6	7	4	15	18	13	14	13	20	7	80
81	Polmonite crupale	869	656	658	1 224	1 025	146	594	619	707	352	206	2 071	496	207	180	351	136	425	403	361	420	312	594	186	81
82	Bronco polmonite acuta	1 044	838	842	1 569	2 113	273	787	807	804	353	404	3 094	667	204	222	566	183	594	778	677	492	502	685	316	82
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare.	19	15	14	29	13	5	22	9	16	12	1	39	12	2	11	19	2	11	10	16	7	10	11	4	83
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	9	6	3	13	6	1	5	11	20	3	1	14	2	2	1	2	1	9	4	4	2	3	3	2	84
85	Morbo di Basedow	..	4	3	9	4	..	4	4	4	1	1	8	5	2	2	5	4	..	2	6	1	85	
86	Asma, enfisema polmonare	42	32	66	76	65	14	35	52	64	53	29	140	56	14	23	20	13	29	50	27	26	26	29	14	86
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	266	183	299	477	445	42	126	241	212	180	161	750	186	44	71	338	141	299	395	370	229	191	266	153	87
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	3	6	6	10	7	..	7	5	4	4	3	14	5	7	..	2	5	4	1	4	34	1	88
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite).	3	7	6	12	9	..	5	6	4	3	4	18	2	1	3	3	1	1	3	5	3	1	5	2	89
90	Malattie del cuore	1 682	1 751	1 797	3 220	2 100	331	1 140	1 409	1 633	802	660	3 298	1 048	386	381	672	358	720	1 217	793	872	888	951	428	90
91	Malattie del pericardio	7	5	6	13	2	2	8	4	5	1	5	13	3	1	2	..	4	2	4	6	9	5	..	91	
92	Angina pectoris	8	7	12	32	16	1	9	8	8	9	8	25	9	..	2	14	8	11	9	14	14	10	22	12	92
93	Sincope (b)	25	17	25	29	36	7	40	15	38	10	9	176	29	4	3	16	6	15	11	6	31	12	40	7	93
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	10	51	13	34	45	3	29	25	32	16	18	95	13	3	7	19	8	9	27	15	12	11	9	8	94
95	Orecchioni	4	1	1	..	4	..	2	3	3	2	..	3	1	..	1	1	4	..	1	1	2	95
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	18	11	13	21	22	4	9	13	14	7	7	22	4	4	3	8	5	3	8	4	2	4	7	4	96
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	132	239	185	350	265	37	250	310	229	103	121	566	102	90	86	126	96	194	336	163	140	147	59	176	97
98	Ulcera rotonda dello stomaco	6	15	22	34	27	3	5	8	13	9	3	20	2	2	3	9	1	12	20	5	6	8	6	1	98
99	Epatite, cirrosi epatica	107	99	138	201	188	31	91	108	116	55	54	291	71	14	37	49	40	53	72	68	52	51	74	33	99
100	Atrofia gialla acuta del fegato	1	4	1	..	1	1	..	1	3	4	1	1	1	2	1	2	..	2	..	2	100
101	Calcoli biliari	..	3	9	10	16	..	3	2	2	2	1	18	4	4	..	2	1	3	3	2	13	1	101
102	Ittero	24	28	32	40	38	3	30	32	38	31	14	111	19	2	10	27	16	25	23	18	26	28	17	17	102
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1	4	1	2	3	2	1	1	2	1	..	2	3	1	..	1	3	2	..	2	1	103
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 699	1 632	709	1 769	1 767	308	3 346	1 707	1 706	680	891	4 609	827	383	282	1 151	495	707	1 672	809	820	973	781	571	104
105	Volvolo, occlusione intestinale	70	51	45	83	73	7	41	40	40	11	16	110	28	13	16	28	14	22	51	25	24	32	16	18	105
106	Tumori intestinali e addominali (a)	1	2	8	2	3	2	..	106

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Esclusa la siacope da parto.

Segue TAV. I. — Morti classificati

A — Per

ANNO 1911.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
74	Malattie degli occhi (a)	1	1	1	2	..	1
75	Malattie degli orecchi (a)	5	3	6	19	4	11	8	7	4	3
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	14	8	18	39	9	19	15	21	12	15
77	Bronchite acuta.	636	498	1 343	2 122	929	3 298	1 179	1 805	1 058	1 043
78	Bronchite cronica	152	75	264	539	246	615	227	298	191	170
79	Malattie della pleura (a)	21	24	69	187	43	125	56	42	47	44
80	Congestione ed apoplezia polmonare	13	6	10	16	12	28	3	10	3	14
81	Polmonite crupale.	444	300	1 240	1 806	662	1 184	715	877	557	771
82	Bronco polmonite acuta	613	374	1 398	3 145	903	1 677	732	934	527	647
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare.	6	3	15	25	9	25	5	15	3	6
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	1	2	2	5	3	1	2	..	1	2
85	Morbo di Basedow	1	5	6	1	..	3	3	..
86	Asma, enfisema polmonare.	64	48	72	64	74	57	50	45	70	62
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	109	81	225	665	220	143	91	130	112	120
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	3	1	4	13	11	1	2	1	2	..
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	3	4	17	11	5	7	5	5	3	3
90	Malattie del cuore.	906	528	1 906	2 927	1 353	1 644	696	1 233	952	859
91	Malattie del pericardio	..	1	10	24	5	7	7	7	11	13
92	Angina pectoris	22	11	53	123	37	24	19	16	12	27
93	Sincope (b)	14	6	31	62	28	11	12	22	20	7
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	21	16	34	64	34	67	42	43	24	45
95	Orecchioni	2	4	1	7	1	1	1	..
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	10	4	15	11	15	11	26	12	15	23
97	Malattie dello stomaco, atresia (a)	148	99	258	526	245	367	86	297	144	132
98	Ulcera rotonda dello stomaco	9	2	15	17	10	15	4	9	8	11
99	Epatite, cirrosi epatica	61	34	135	276	111	178	88	153	105	102
100	Atrofia gialla acuta del fegato.	..	1	1	1	3	4	3	..	1	1
101	Calcoli biliari	3	..	8	15	4	10	..	6	8	3
102	Ittero	13	11	32	66	27	28	21	25	28	31
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	4	..	3	8	7	4	..	4	..	2
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 269	569	3 402	5 964	3 181	1 514	1 239	2 491	2 016	1 202
105	Volvolo, occlusione intestinale	34	21	52	92	39	53	36	66	31	38
106	Tumori intestinali e addominali (a)	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.
province.

ANNO 1911.

Numero dell'Elenco nosologico	CALABRIE		SICILIA							SARDEGNA		
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
..	..	1	1	1	..	2	..	74
10	4	5	14	2	3	5	6	6	4	2	..	75
10	10	3	9	20	9	26	10	8	16	11	..	76
843	1 103	1 275	1 972	1 304	887	1 267	864	584	650	404	..	77
158	75	176	248	176	102	292	126	54	180	117	..	78
28	44	42	85	42	31	85	27	30	65	40	..	79
9	7	6	4	5	6	11	5	6	9	6	..	80
452	614	506	931	466	572	1 104	571	331	923	497	..	81
536	540	455	766	601	477	661	477	280	431	255	..	82
2	4	6	8	1	8	8	..	3	7	13	..	83
..	2	1	1	..	1	1	2	..	3	1	..	84
5	1	1	2	85
57	49	43	44	45	20	33	16	18	39	33	..	86
101	78	61	94	54	74	109	56	46	118	75	..	87
2	1	1	2	1	2	2	..	4	1	88
7	5	5	2	1	2	5	1	3	1	89
838	643	502	1 082	546	821	1 422	544	434	830	338	..	90
5	3	3	11	9	4	4	7	1	15	6	..	91
20	15	6	13	19	10	23	11	6	6	8	..	92
9	5	5	4	7	3	15	4	7	14	5	..	93
26	19	45	83	37	18	46	154	30	15	10	..	94
5	7	7	1	7	2	2	2	4	..	95
18	3	19	24	7	14	23	28	11	22	11	..	96
87	188	207	510	225	112	312	372	106	170	117	..	97
11	14	2	8	8	12	8	4	3	10	5	..	98
100	86	50	147	39	85	138	97	51	135	48	..	99
1	..	1	1	..	1	1	2	1	2	100
5	1	..	5	2	1	5	4	1	4	1	..	101
15	13	17	20	8	12	33	28	16	26	12	..	102
1	4	1	7	4	7	9	4	1	7	4	..	103
1 202	894	600	2 902	1 273	1 244	2 918	1 678	865	1 112	756	..	104
25	29	22	33	22	30	30	23	8	38	20	..	105
..	1	106

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
107	Ernie intestinali e addominali	32	23	27	84	41	7	12	8	19	9
108	Malattie da echinococco	1	4	1
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	12	22	15	10	8	..	32	19	20	18
110	Appendicite	10	12	18	33	24	1	7	14	14	11
110a	Peritonite	47	65	80	125	96	12	80	89	62	33
111	Idrope-ascite	8	21	15	17	2	2	4	2	6	..
112	Malattie dei reni (a)	220	214	272	489	380	51	248	193	300	136
113	Id. della vescica (a)	34	33	40	90	58	9	23	37	32	24
114	Calcoli renali e vescicali	1	4	6	4	1	4	..	3	..
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	11	19	25	39	27	2	10	10	13	8
116	Id. delle cuspide soprarrenali	5	3	3	7	5	1	2	..	1	3
117	Id. dei testicoli (a)
118	Id. dell'ovaia (a)	1	..	2	1	..	1	1
119	Id. dell'utero e vagina (b)	5	15	13	45	18	2	11	14	12	10
120	Id. delle mammelle (b)	1
121	Metrorragia dopo il parto	10	25	7	18	22	3	13	18	9	3
122	Distocia	2	2	2	4	3	1	2	6	4	..
123	Eclampsia puerperale	6	9	9	17	6	1	14	8	7	7
124	Febbre puerperale	13	27	18	42	29	5	27	17	16	7
125	Pelvi e metroperitonite puerperale	5	6	3	5	..	1	4	1	5	2
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	3	5	..	5	2	2	6	3	6	2
127	Flemmone, ascesso (a)	22	24	26	31	53	7	21	31	25	19
128	Cangrana della pelle	6	2	1	..	5	5	..	2
129	Elefantiasi degli arabi	1	..	2
130	Favo, foruncoli	1	1	5	3	3	..	3	3	2	2
131	Pemfigo, eczema, ectima	6	17	10	23	17	2	14	16	10	6
132	Sclerema	20	11	16	12	13	2	48	70	61	58
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	14	17	31	50	48	7	32	27	36	10
134	Reumatismo articolare acuto	23	34	33	39	40	7	6	23	17	11
135	Id. cronico	10	20	12	47	25	6	11	18	13	12
136	Psoite	1	1
137	Atrofia muscolare progressiva	1	..	2	1	6	1	2	..
138	Alcolismo cronico	25	22	20	30	40	4	16	19	13	6
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	2	..	1	2	5	1	1	1	4	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

Numero dell'elenco nosologico	BARDIA				VENETO								EMILIA		
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
107	14	55	13	7	9	13	8	9	24	17	8	14	19	9	107
108	1	1	1	2	..	1	1	1	1	..	108
109	17	44	8	8	11	22	24	25	10	14	13	21	46	42	109
110	17	58	10	8	3	4	2	6	13	19	3	4	15	10	110
110a	41	204	62	3	24	63	28	61	74	49	40	53	78	30	110a
111	5	12	7	1	6	1	4	1	6	1	..	3	3	..	111
112	111	887	202	53	69	160	52	120	190	218	126	122	207	115	112
113	16	69	46	4	15	36	16	23	36	24	16	14	29	12	113
114	1	1	1	..	1	2	2	1	1	3	1	2	1	..	114
115	7	37	8	2	4	16	3	11	15	13	10	13	13	4	115
116	1	6	3	..	1	2	..	4	4	2	4	3	3	1	116
117	117
118	1	118
119	2	20	2	1	5	8	3	5	8	13	6	5	14	4	119
120	1	1	1	1	..	120
121	5	19	8	1	12	10	3	10	12	11	9	16	7	6	121
122	..	8	2	1	3	1	1	1	2	..	3	1	122
123	3	33	10	3	2	12	3	6	11	6	5	8	7	8	123
124	7	58	9	4	8	7	5	6	17	13	7	9	17	10	124
125	..	12	6	1	1	2	2	..	3	3	2	2	3	1	125
126	6	8	1	..	2	1	..	3	7	2	5	3	1	2	126
127	18	100	17	1	6	18	7	20	27	25	20	15	28	15	127
128	4	5	6	2	1	1	3	5	1	3	5	..	5	2	128
129	129
130	3	13	2	1	2	2	2	8	1	..	3	130
131	12	41	8	1	1	11	10	9	12	6	6	6	4	9	131
132	65	158	12	2	7	28	86	16	16	10	14	12	9	16	132
133	18	108	18	3	2	14	11	16	16	14	7	13	19	13	133
134	10	59	11	4	11	13	10	15	23	16	21	20	11	12	134
135	6	24	5	9	4	6	3	11	11	8	10	18	10	4	135
136	1	1	136
137	..	4	3	2	..	1	1	1	3	1	..	137
138	12	59	13	7	9	24	4	21	26	21	18	20	10	3	138
139	..	9	1	1	1	..	139

segue TAV. I. — Morti classificati

ANNO 1911.

A — Per

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELLE-MILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
107	Ernie intestinali e addominali	8	17	18	12	7	8	9	36	1	6
108	Malattie da echinococco	1	..	2	2	1	..
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	35	45	11	6	23	26	9	2	5	4
110	Appendicite	4	9	11	8	3	5	2	16	4	1
110a	Peritonite	49	63	42	40	25	53	31	141	15	11
111	Idrope-ascite	3	3	3	3	1	3	3	7	1	1
112	Malattie dei reni (a)	113	103	86	71	85	125	83	406	61	44
113	Id. della vescica (a)	14	22	21	6	12	10	7	70	5	19
114	Calcoli renali e vescicali	5	2	..	2	2	2	1	2	1	2
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	8	9	6	9	6	6	1	23	5	5
116	Id. delle cospule soprarrenali	1	2	1	..	2	2	1	8	..	1
117	Id. dei testicoli (a)	1
118	Id. dell'ovaia (a)	1	1	4
119	Id. dell'utero e vagina (b)	8	7	1	6	3	4	3	8	2	4
120	Id. delle mammelle (b)	1	1	1	1
121	Metrorragia dopo il parto	6	8	6	5	1	11	10	11	4	1
122	Distocia	2	3	2	1	3	4	5	1	..
123	Eclampsia puerperale	7	1	5	5	3	4	6	10	4	1
124	Febbre puerperale	2	9	4	12	9	7	4	21	4	2
125	Pelvi e metropertoneite puerperale	2	2	2	1	1	2	3
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	5	2	2	3	2	1	2	2
127	Flemmone, ascesso (a)	5	18	25	19	6	8	11	34	6	14
128	Cangrena della pelle	2	1	1	1	7
129	Elefantiasi degli arabi	1
130	Favo, foruncoli	3	..	3	1	1	1	1	2
131	Pemfigo, eczema, ectima	3	10	1	9	1	0	5	14	1	2
132	Sclerema	25	195	49	29	11	63	10	30	3	4
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	4	19	18	5	3	4	5	37	3	3
134	Reumatismo articolare acuto	8	13	19	11	2	11	6	39	3	5
135	Id. cronico	4	7	9	10	3	6	6	22	3	4
136	Psoite	1
137	Atrofia muscolare progressiva	1	1	1	..	2
138	Alcolismo cronico]	5	8	5	8	..	6	8	16	4	3
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	2	2	..

secondo 168 cause di morte.

province.

ANNO 1911.

S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	L A Z I O	A B R U Z Z I E M O L I S E					Numero dell'Elenco nosologico
L U C C A	M A S S A E C A R R A R A	P I S A	S I E N A	A N C O N A	A S C O L I P I C E N O	M A G E R A T A	P E S A R O E U R B I N O	P E R U G I A	R O M A	A Q U I L A D E G L I A - B R U Z Z I	C A M P O B A S S O	C H I E T I	T E R A M O		
8	14	10	15	8	4	8	8	23	64	22	17	26	11	107	
..	..	4	3	1	1	3	10	2	..	108	
7	5	2	5	7	4	7	17	33	30	15	31	4	10	109	
11	8	6	9	6	2	2	7	9	46	8	5	4	4	110	
43	32	31	26	25	26	24	16	74	141	32	40	36	33	110a	
2	1	..	2	1	..	7	5	4	13	5	7	111	
172	60	97	83	122	131	119	92	248	850	218	204	191	145	112	
25	13	16	10	20	7	16	15	38	46	16	24	21	17	113	
1	1	2	2	2	2	1	3	2	10	1	2	114	
5	7	7	6	4	2	1	3	6	39	8	1	1	2	115	
2	1	4	1	1	..	5	11	2	2	1	2	116	
..	1	117	
1	1	2	118	
2	3	5	2	5	5	4	4	9	15	9	5	4	2	119	
1	1	1	120	
6	4	3	4	3	1	3	4	9	20	11	11	14	10	121	
1	3	1	2	1	2	2	8	8	2	6	1	122	
5	3	1	6	10	4	6	9	12	14	2	10	3	7	123	
6	2	5	5	4	6	7	8	32	35	3	12	12	8	124	
2	1	3	1	2	2	2	..	1	5	1	1	2	1	125	
3	2	2	2	1	2	..	7	7	6	1	2	2	2	126	
9	6	14	10	11	7	5	5	27	67	8	22	17	21	127	
2	1	4	2	1	1	..	1	3	11	..	2	1	3	128	
..	129	
..	1	1	1	8	..	2	3	3	130	
6	2	4	4	5	5	5	4	5	16	6	7	4	2	131	
6	6	6	7	11	2	9	14	27	61	3	24	16	7	132	
17	8	10	12	5	5	7	3	18	28	8	9	9	4	133	
5	7	7	9	8	4	11	6	17	41	21	19	10	7	134	
15	7	7	2	2	8	4	6	15	39	32	17	13	5	135	
1	..	1	1	1	136	
2	1	1	2	1	..	1	10	..	2	1	5	137	
1	3	4	..	15	5	8	16	16	34	10	4	5	3	138	
1	1	1	..	1	..	1	..	2	1	..	139	

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

Numero dell'Elenco nomenclologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
107	Ernie intestinali e addominali	31	16	39	127	34	67	32	59	36	29
108	Malattie da echinococco.	1	7	..	3	4	3	..	1
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	37	12	54	22	20	76	31	37	11	14
110	Appendicite	5	7	16	65	13	14	9	17	6	6
110a	Peritonite	47	19	80	169	63	95	33	71	46	52
111	Idrope-ascite	5	10	13	21	5	16	9	7	6	8
112	Malattie dei reni (a)	202	133	493	1 420	296	672	252	364	279	247
113	Id. della vescica (a)	22	12	63	132	44	48	25	15	35	27
114	Calcoli renali e vescicali	1	..	3	15	4	2	2	1
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	6	..	6	29	1	1	..	2	5	4
116	Id. delle capsule surrenali	1	1	10	5	5	1	1	2	1
117	Id. dei testicoli (a)
118	Id. dell'ovaia (a)
119	Id. dell'utero e vagina (b)	13	4	15	35	7	20	7	15	10	13
120	Id. delle mammelle (b)	1
121	Metrorragia dopo il parto	8	5	10	25	18	17	12	17	13	11
122	Distocia	3	2	1	8	4	3	2	4	5	6
123	Eclampsia puerperale	3	2	11	25	3	5	8	13	2	9
124	Febbre puerperale	12	8	20	16	14	14	13	31	13	21
125	Pelvi e metropertonite puerperale	5	..	9	6	2	4	2	6	5	1
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	1	2	6	3	4	5	4	4	1	2
127	Flemmone, ascesso (a)	15	10	53	107	30	46	28	34	28	37
128	Cangrena della pelle	2	1	6	3	2	3	5	5	1	2
129	Elefantiasi degli arabi	1	1	1
130	Favo, foruncoli	3	4	3	5	..	1
131	Pemfigo, eczema, ectima	5	3	12	15	5	7	7	12	6	7
132	Sclerema.	8	4	16	82	9	194	54	69	58	30
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	13	4	15	36	7	32	5	23	15	13
134	Reumatismo articolare acuto	15	7	30	40	13	36	16	16	15	33
135	Id. cronico	15	11	15	40	18	20	14	12	23	21
136	Psoite.	1	1	1	..
137	Atrofia muscolare progressiva.	3	..	5	4	1	1	..	1	4	..
138	Alcoolismo cronico	1	2	5	10	15	3	6	2	3	6
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	1	..	5	..	2	1	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

Numero dell'Elenco nomenclologico	CALABRIE										SICILIA							SARDEGNA		Numero dell'Elenco nomenclologico
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
107	31	21	27	38	19	22	39	24	18	17	26	107								
108	2	..	1	3	..	2	4	2	2	3	1	108								
109	17	22	26	61	8	13	6	48	12	23	8	109								
110	8	8	6	16	11	8	12	12	2	15	12	110								
110a	34	44	78	63	86	50	150	53	52	50	51	110a								
111	6	11	11	25	9	5	18	14	10	19	6	111								
112	318	216	277	535	290	236	511	283	181	213	155	112								
113	27	20	27	51	22	28	48	26	22	12	12	113								
114	1	3	..	16	3	3	13	6	3	3	2	114								
115	7	2	1	9	2	7	15	1	5	2	10	115								
116	2	1	1	3	3	4	4	2	1	2	2	116								
117	117								
118	1	118								
119	12	12	5	25	9	8	14	7	4	13	6	119								
120	..	1	1	..	120								
121	15	11	2	9	7	5	13	13	11	22	11	121								
122	8	2	1	2	2	3	6	1	1	9	2	122								
123	9	2	3	4	4	5	6	3	2	4	2	123								
124	19	20	12	21	11	10	21	18	9	22	7	124								
125	2	1	2	4	..	5	1	2	..	3	..	125								
126	2	3	2	4	2	3	2	1	7	126								
127	42	43	23	33	29	15	49	34	20	22	13	127								
128	2	4	1	4	..	1	11	6	..	2	1	128								
129	129								
130	3	..	2	5	..	5	2	2	3	29	9	130								
131	6	4	9	9	4	4	7	3	6	13	5	131								
132	7	22	1	9	1	4	11	4	..	2	..	132								
133	5	16	4	18	11	6	12	5	11	9	2	133								
134	24	15	8	17	14	8	20	11	5	25	16	134								
135	18	16	9	7	7	11	18	12	3	29	19	135								
136	1	1	..	136								
137	1	2	1	..	1	1	1	1	137								
138	8	6	..	5	2	5	5	2	7	15	3	138								
139	1	1	1	..	1	..	139								

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BERGASCA	COMO	CREMONA
140	in stato d'ubriachezza	2	..	3	1	2	..	1	2	1	3
141	per annegamento	53	36	50	71	40	12	42	47	38	41
142	per freddo	3	4	6	1	2	..	3	2	3	2
143	per insolazione	1	..	3	1	3	1	2	1	1	1
144	per fulminazione:										
	a) naturale	5	3	5	6	3	..	3	6	2	..
	b) da apparecchi elettrici	2	2	4	5	..	1	3	2	1
145	per caduta	46	60	90	133	109	18	57	57	54	23
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	4	5	4	8	10	1	11	19	4	..
147	per ferite da taglio	1	1	1	..
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali	2	1	3	1	..	2	6	1	1
149	per schiacciamento	40	27	38	97	70	8	23	49	26	16
150	per violenze d'animali	1	4	4	2	2	2	..	3	2	2
151	per ustione	49	28	41	53	78	10	37	57	34	10
152	per soffocamento	5	3	4	7	2	1	6	10	5	5
153	per asfissia	3	8	9	10	4	..	3	3	1	1
154	per avvelenamenti acuti	3	..	7	2	7	1	2	8	2	..
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi
156	per cause non determinate	2	..	2	1	2	1	2	2
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	14	4	13	30	30	5	7	10	8	3
160	per annegamento	22	10	21	32	10	1	3	8	10	4
161	con arma da fuoco	24	12	18	43	51	11	2	16	17	7
162	id. da taglio	4	..	1	7	3	..	1	1	1	..
163	per impiccamento	17	19	27	41	16	7	3	5	14	7
164	per precipitazione	7	9	5	16	33	10	3	4	3	1
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	10	2	1	12	3	4	2	4	7	1
166	per avvelenamento	9	7	2	29	23	4	1	2	2	..
167	per asfissia	3	4	10	13	3	1	..	1	1
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	1
	Totale dei morti per causa determinata	14 442	13 064	12 916	22 231	19 599	2 846	14 232	13 612	13 323	7 377
	Morti per causa ignota o non dichiarata	89	205	62	299	59	4	18	23	14	6
	TOTALE GENERALE	14 531	13 269	12 978	22 530	19 658	2 850	14 250	13 635	13 337	7

(a) Nell'anno 1911 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 153 dell'Elenco nosologico) e per « condanna

Numero dell'Elenco nosologico (a)	B A R D I A				V E N E T O							E M I L I A		
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA
140	..	4	..	2	1	5	2	1	1	3
141	37	103	45	11	13	46	43	42	50	60	35	29	37	31
142	1	6	2	1	1	1	1	..	1	1	1	1	2	..
143	2	6	1	1	1	6	10	1	2	1	..
144	..	2	..	2	..	1	1	..	5	1	2	1	1	..
145	18	87	32	30	24	26	6	28	65	32	33	32	52	21
146	..	4	4	3	4	3	..	4	10	1	1	4	4	..
147	1	..	1	1
148	..	14	3	1	2	1	4	3
149	12	132	29	18	11	18	5	21	37	17	16	38	40	13
150	1	4	2	1	..	3	..	3	3	2	1	..	4	2
151	20	101	24	10	18	23	17	26	39	22	12	21	37	18
152	1	18	3	1	..	2	1	5	3	3	6	2	3	6
153	3	11	..	1	..	2	1	3	6	1	3	4	1	2
154	2	12	1	..	1	5	1	2	19	2	3	..	2	5
155
156	..	5	1
157	2	29	4	1	3	6	1	7	3	3	2	3	12	3
160	9	29	9	1	1	6	7	2	7	11	8	9	23	13
161	3	67	5	2	5	8	4	5	9	12	12	8	13	6
162	..	8	2	..	2	2	2	3	4	1	1
163	8	27	12	3	6	2	..	8	21	15	6	9	28	3
164	4	18	4	2	1	4	4	11	2	3	12	2
165	2	16	2	2	5	..	4	1	5	..
166	5	51	6	..	1	3	4	1	6	11	4	4	5	4
167	1	6	1	7	..	1	3	1
168	1	1	1	1
	7 244	38 541	9 232	2 905	3 953	10 141	5 321	8 591	12 990	9 692	8 714	9 383	10 699	6 022
	6	43	22	14	22	7	1	13	51	31	..	21	34	10
	7 250	38 584	9 254	2 919	3 975	10 148	5 322	8 604	13 041	9 723	8 714	9 404	10 733	6 032

alla pena capitale » (n. 159).

Numero dell'Elenco nosologico (α)	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
		140	in stato d'ubriachezza	1	..	1	..	2	1
141	per annegamento	19	16	26	14	19	22	20	29	4	6
142	per freddo	9	3	1	1	2	1	..	3
143	per insolazione	1	1
144	per fulminazione :										
	a) naturale	2	2	..	1	6	4	6	1
	b) da apparecchi elettrici	1	2	..	1
145	per caduta	19	35	31	20	18	27	22	89	15	13
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	2	1	1	1	1	1	8	14	3	1
147	per ferite da taglio	2	1
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali	1	..	2	..	1	2
149	per schiacciamento	7	8	19	18	11	4	10	34	12	3
150	per violenze d'animali	2	2	2	1	..	1	2	1	..
151	per ustione	21	21	15	16	8	16	26	54	10	11
152	per soffocamento	1	1	2	3	..	4	2	2
153	per asfissia	5	1	3	6	3	1	1
154	per avvelenamenti acuti	1	1	..	1	3	7	..	3
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1
156	per cause non determinate	3	2	1	1	2
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	6	6	7	..	5	4	6	9	4	..
160	per annegamento	4	10	5	2	12	6	..	14	2	1
161	con arma da fuoco	5	2	5	3	8	2	5	35	1	9
162	id. da taglio	3	1	..	7	..	1
163	per impiccamento	3	6	6	..	1	13	3	18	6	5
164	per precipitazione	1	2	2	..	2	6	..	11	2	3
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	3	1	..	1	..	1	..	1
166	per avvelenamento	3	2	2	4	2	2	1	19	2	6
167	per asfissia	1	2	1	1	..	8	1	..
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	1
	Totale dei morti per causa determinata	6 401	7 640	5 742	5 048	4 241	6 618	5 810	19 014	2 673	3 096
	Morti per causa ignota o non dichiarata	2	7	19	22	11	59	11	15	6	7
	TOTALE GENERALE	6 403	7 647	5 761	5 070	4 252	6 677	5 821	19 029	2 679	3 103

(α) Nell'anno 1911 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna

Numero dell'Elenco nosologico (α)	S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	LAZIO	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'Elenco nosologico (α)
	L U C C A	M A S S A E C A R R A R A	P I S A	S I E N A	A N C O N A	A S C O L I P I C E N O	M A G E R A T A	P E S A R O E U R B I N O	P E R U G I A	R O M A	A Q U I L A D E G L I A B R U Z Z I	C A M P O B A S S O	C H I E T I	T E R A M O	
	140	..	1	1	2	1	..	2	
141	14	6	5	10	28	15	6	19	47	39	7	8	13	18	141
142	..	2	1	..	4	2	..	17	3	1	4	5	1	1	142
143	1	..	1	1	2	..	1	2	1	8	2	3	2	..	143
144	1	..	6	5	1	1	2	2	12	16	8	7	6	1	144
145	1	..	1	1	3	..	5	1	..	
146	31	37	23	22	22	25	21	27	79	108	35	37	28	34	145
147	..	2	3	2	3	3	3	6	13	13	5	2	5	..	146
148	1	..	1	2	1	1	2	1	147
149	1	1	2	1	3	5	..	1	148
150	14	23	13	7	9	12	8	10	28	79	15	9	14	9	149
151	..	1	2	1	..	2	1	1	1	7	1	3	..	2	150
152	21	23	14	16	10	21	19	24	59	134	55	51	16	35	151
153	1	1	1	..	5	..	1	..	1	3	152
154	..	1	1	4	..	1	1	6	1	..	2	5	153
155	3	..	1	1	..	3	2	17	1	4	1	1	154
156	1	2	1	155
157	1	3	5	..	2	1	4	156
158	4	6	7	2	6	5	3	5	18	57	15	15	6	5	157
160	1	1	4	5	5	2	1	5	6	34	5	4	3	5	160
161	5	1	8	5	7	2	5	7	12	45	4	2	6	2	161
162	1	1	1	1	..	2	1	3	1	..	2	..	162
163	1	2	5	10	2	1	5	5	14	12	3	4	6	2	163
164	4	2	2	5	3	1	1	6	4	24	1	2	1	1	164
165	1	3	1	1	165
166	2	1	5	4	3	1	..	1	6	24	3	..	2	..	166
167	1	..	3	..	1	2	167
168	3	1	1	168
	6 013	4 252	5 729	4 614	6 254	4 666	4 882	5 775	13 232	26 013	8 802	8 725	7 875	5 959	
	1	4	3	11	6	18	25	34	26	46	55	49	203	26	
	6 014	4 256	5 732	4 625	6 260	4 684	4 907	5 809	13 258	26 059	8 917	8 774	8 078	5 985	

« alla pena capitale » (n. 159).

Segue TAV. I. — Morti classificati

ANNO 1911. A — Per

Numero dell'Elenco nosologico (α)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
140	in stato d'ubriachezza	3	4	2	2
141	per annegamento	18	7	25	35	15	45	12	24	11	6
142	per freddo	1	1	3	3	3	3	2	4	1	3
143	per insolazione	2	1	5	3	2	2	3	3	3	1
144	per fulminazione:										
	a) naturale	4	3	7	3	7	3	1	2	4	6
	b) da apparecchi elettrici	1	3
145	per caduta	28	23	60	141	55	68	36	51	48	45
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	8	2	10	14	10	8	7	8	7	4
147	per ferite da taglio.	1	1	2	..	4
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali	5	1	4	3	1	1	1
149	per schiacciamento.	11	4	38	93	24	32	14	18	13	9
150	per violenze d'animali	1	1	3	8	3	3	..	1	3	1
151	per ustione	85	37	117	75	115	82	53	70	71	65
152	per soffocamento	3	..	2	5	4	..	4	3	..	4
153	per asfissia	13	..	4	4	..	5	5	3	6	2
154	per avvelenamenti acuti	1	2	2	6	1	1	6	2	1	4
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	1	1	1	..
156	per cause non determinate	3	2	5	3	4	1	1	3	3
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	19	..	32	102	19	28	26	21	22	30
160	per annegamento	4	4	6	3	6	20	5	10	4	1
161	con arma da fuoco.	5	4	12	36	5	13	4	6	3	4
162	id. da taglio.	1	3	1	1	1	1	1	1
163	per impiccamento	2	3	6	2	6	1	..	9	1
164	per precipitazione	2	5	15	3	2	1	2	5	3
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	1	1	1
166	per avvelenamento.	1	2	52	2	10	4	8	7	5
167	per asfissia	1
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	1
	Totale dei morti per causa determinata.	8 698	5 332	21 498	36 855	15 490	22 913	11 058	17 163	11 474	10 913
	Morti per causa ignota o non dichiarata	10	42	31	270	162	52	18	46	111	58
	TOTALE GENERALE	8 708	5 424	21 529	37 125	15 652	22 965	11 076	17 209	11 585	10 971

(α) Nell'anno 1911 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna

secondo 168 cause di morte. provincie.

ANNO 1911.

Numero dell'Elenco nosologico (α)	CALABRIE		SICILIA							SARDEGNA		Numero dell'Elenco nosologico (α)
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
140	1	..	1	1	..	2	1	1	1	1	..	140
141	6	28	4	24	5	17	22	23	7	30	15	141
142	4	1	1	2	4	..	1	2	1	142
143	2	2	3	3	3	3	3	2	7	1	1	143
144	4	..	15	7	10	3	7	7	4	8	3	144
	2	1	
145	61	49	14	39	18	45	65	28	28	37	25	145
146	4	13	4	10	14	1	21	4	4	4	3	146
147	2	1	..	147
148	1	2	1	2	2	..	1	148
149	11	16	22	31	19	32	13	13	12	16	11	149
150	2	1	2	6	7	4	6	1	5	7	3	150
151	80	54	36	47	27	43	77	26	24	42	34	151
152	2	4	..	1	..	1	..	1	2	1	2	152
153	..	9	6	5	7	1	10	2	..	3	..	153
154	2	..	7	4	2	8	2	1	4	5	2	154
155	1	1	155
156	3	2	..	1	8	5	1	156
157	17	42	30	36	61	14	98	13	41	17	17	157
160	1	..	3	8	2	6	2	4	3	10	1	160
161	3	4	9	16	17	11	18	9	8	7	3	161
162	1	..	1	1	..	162
163	1	..	2	5	6	7	10	2	1	5	7	163
164	1	4	..	2	2	1	164
165	1	..	1	165
166	1	2	1	6	5	2	23	4	4	3	9	166
167	1	2	167
168	2	..	2	168
	10 193	8 917	8 417	17 092	10 462	9 918	21 784	10 463	6 698	10 989	6 604	
	69	114	24	31	30	52	66	87	16	305	309	
	10 262	9 081	8 441	17 126	10 492	9 970	21 850	10 550	6 714	11 294	6 913	

alla pena capitale » (n. 159).

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
1	Asfissia ed apoplezia nel parto	78	20	133	160	74	46
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	55	12	135	104	77	86
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	57	12	114	65	61	62
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	5	1	7	3	10	3
5	Labbro leporino	23	6	49	28	17	10
6	Atrofia congenita, immaturità	2 523	783	5 808	5 350	4 680	2 955
7	Vaiuolo	3	7	8	5	7	21
8	Morbillo	398	228	2 196	339	433	470
9	Scarlattina	33	25	78	69	68	34
10	R.sipola	184	74	328	180	172	182
11	Febbre tifoidea	615	123	1 764	1 078	631	790
12	Tifo petecchiale	4	2	..	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	1
14	Difterite	171	121	299	249	238	96
15	Laringite crupale	117	36	308	162	81	87
16	Ipertosse	780	147	1 097	1 155	644	619
17	Influenza	419	136	696	664	297	296
18	Febbri da malaria	11	1	30	115	34	50
19	Cachessia palustre	1	1	5	38	6	6
20	Dissenteria	1	1	1
21	Colera asiatico	36	266	22	136	62	427
22	Sifilide	66	59	159	132	91	75
23	Setticemia, piemia	214	87	461	284	291	263
24	Pustola maligna, carbonchio	17	10	9	6	8	15
25	Moccio, cimurro	1	..	1	1
26	Lebbra	3	..	1	1	2
27	Rabbia	6	5	6	4
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	2	..	8	..	5	6
29	Tubercolosi disseminata	443	273	895	749	573	539
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	523	312	1 224	1 058	572	534
31	Tubercolosi polmonare, tisi	4 343	1 900	6 536	4 322	2 840	3 629
32	Tabe mesenterica	387	129	958	720	506	591
33	Scrofola disseminata	57	15	90	136	58	74
34	Lupo	9	..	13	7	8	6
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa	53	23	78	54	34	46

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
17	11	18	11	60	25	10	38	25	5	439	292	731	1
25	12	19	44	112	43	9	13	99	17	394	463	862	2
19	11	20	13	30	36	3	23	64	20	314	296	610	3
1	3	1	4	17	7	..	1	11	2	53	23	76	4
6	2	8	9	14	16	3	5	16	5	131	83	217	5
1 537	921	1 305	1 641	2 300	2 359	536	1 321	4 371	906	20 853	18 426	39 279	6
2	..	112	7	1 631	88	3	170	2 759	5	2 515	2 313	4 828	7
64	89	184	256	847	1 323	332	505	684	225	4 322	4 251	8 573	8
15	..	33	175	133	83	100	525	1 139	..	1 297	1 218	2 515	9
53	39	90	50	130	174	31	103	179	39	1 014	991	2 008	10
314	307	372	494	675	461	104	354	1 339	116	4 154	5 083	9 537	11
4	1	2	..	3	2	1	4	8	16	24	12
..	2	..	2	13
55	37	120	104	103	56	16	97	241	30	1 116	917	2 033	14
52	21	42	94	210	157	34	94	133	21	964	685	1 649	15
328	122	219	256	275	221	118	210	571	71	2 900	3 933	6 833	16
174	97	226	284	596	466	148	384	524	253	2 865	2 795	5 660	17
6	3	150	180	187	555	113	338	902	862	1 887	1 650	3 537	18
2	6	39	23	37	135	41	102	245	196	468	415	883	19
..	1	1	1	4	5	20
49	..	131	434	2 162	257	13	140	1 938	72	3 037	3 108	6 145	21
28	30	163	89	365	136	23	155	257	33	1 041	820	1 861	22
80	50	177	96	361	152	31	133	326	74	1 619	1 461	3 080	23
2	4	10	8	22	25	16	28	31	24	160	75	235	24
..	1	4	..	4	25
1	4	2	2	3	..	10	9	19	26
..	..	8	1	7	5	..	1	9	..	37	15	52	27
1	..	4	..	3	6	..	1	6	..	28	14	42	28
178	120	163	176	328	228	50	154	398	223	2 603	2 887	5 490	29
175	88	333	254	484	400	55	115	343	185	3 483	3 237	6 720	30
805	633	1 555	974	2 528	1 847	258	846	2 658	1 117	17 071	19 720	36 791	31
211	120	257	396	933	669	107	206	560	212	3 090	3 875	6 965	32
22	12	17	39	84	68	14	29	93	86	414	480	894	33
5	1	9	2	6	4	1	3	10	4	32	56	88	34
11	10	26	15	43	31	10	13	43	13	281	222	503	35

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	105	59	230	214	133	154
37	Morbo di Pott	75	22	95	91	54	80
38	Rachitide	69	48	382	669	475	197
39	Anemia	711	185	1 161	1 302	500	331
40	Leucemia	141	59	218	128	107	104
41	Porpora emorragica	20	4	40	24	22	17
42	Emofilia	19	5	30	18	13	21
43	Scorbuto	3	5	41	22	55	7
44	Marasmo senile	5 143	1 253	5 481	4 517	3 473	4 014
45	Pellagra	16	3	334	531	111	48
46	Gotta	13	8	9	6	2	6
47	Diabete	172	91	220	167	130	155
48	disseminati in più organi	299	94	442	300	240	225
49	dell'utero, vagina, ovaia	271	114	334	231	270	238
50	delle mammelle	125	44	175	90	78	97
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	69	20	75	55	52	54
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	120	45	180	141	119	104
53	dello stomaco, esofago	326	317	1 658	763	967	1 104
54	del fegato	281	97	453	240	271	263
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	351	117	557	218	313	327
56	delle ossa, articolazioni	31	13	43	36	37	26
57	dei centri nervosi ed organi del sensi	49	25	113	63	48	56
58	d'altri organi	151	57	255	186	169	168
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1 097	459	2 597	1 308	698	741
60	Mielite, tabe dorsale	283	117	402	262	180	177
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	52	17	73	29	34	28
62	Paralisi infantile	32	6	23	46	23	20
63	Encefalite	154	49	212	211	79	48
64	Apoplezia e congestione cerebrale	3 437	967	5 711	3 330	3 287	3 271
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	2	3	22	3	21	22
66	Rammollimento cerebrale	99	22	156	69	168	87
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	478	163	630	388	543	501
68	Epilessia, isterismo	201	81	265	163	114	150
69	Corea	8	1	20	8	6	5
70	Tetano e trisma	62	18	109	80	64	31
71	Eclampsia infantile	860	424	1 198	1 523	656	1 051
72	Successioni della pazzia	2	..	8	1	12	38

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

MARCHI	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
51	28	32	64	220	85	23	52	129	66	846	799	1 645	36
18	12	29	20	54	31	5	16	49	17	346	322	668	37
321	80	104	129	159	177	25	170	268	181	1 766	1 688	3 454	38
285	186	342	398	1 309	1 134	162	379	2 439	474	5 309	6 030	11 348	39
47	40	66	155	249	156	30	60	300	58	885	1 033	1 918	40
9	3	14	11	42	28	1	16	52	13	162	154	316	41
13	3	4	10	29	12	2	7	60	8	147	107	254	42
..	..	2	5	6	11	1	7	37	5	125	82	207	43
2 001	1 281	1 209	3 277	7 324	3 430	987	2 735	6 730	1 323	24 638	29 545	54 183	44
81	65	20	7	..	1	..	4	1	..	620	602	1 222	45
8	10	7	19	29	16	5	16	40	5	168	31	199	46
48	27	127	56	151	65	13	55	197	40	1 014	700	1 714	47
83	61	85	127	312	188	32	101	442	54	1 265	1 820	3 085	48
62	60	164	96	224	167	17	102	239	31	..	2 620	2 620	49
37	17	50	40	162	53	7	39	83	15	23	1 027	1 050	50
19	3	27	18	41	30	7	12	23	7	415	97	512	51
31	11	69	28	80	41	8	22	54	17	742	328	1 070	52
237	94	206	138	192	105	44	102	272	82	3 949	3 163	7 112	53
87	36	84	61	176	92	20	40	205	25	1 229	1 202	2 431	54
72	54	105	73	193	99	25	57	197	35	1 169	1 629	2 798	55
5	3	8	5	7	10	3	3	7	2	133	106	239	56
20	19	31	39	42	21	10	25	41	12	331	283	614	57
55	34	77	69	135	76	10	42	137	20	881	760	1 641	58
197	103	389	368	1 764	1 059	112	426	1 618	248	6 787	6 397	13 184	59
109	57	87	136	299	129	26	100	194	63	1 531	1 090	2 621	60
14	6	27	22	42	26	5	22	30	10	247	190	437	61
15	11	12	14	34	28	6	13	40	16	177	167	344	62
33	24	35	49	72	48	12	29	84	35	675	499	1 174	63
1 655	881	1 291	1 920	4 060	2 299	463	1 124	3 130	495	19 510	17 811	37 321	64
..	1	6	2	..	2	..	43	41	84	65
40	25	113	35	26	25	7	20	26	13	557	374	931	66
270	147	187	97	472	135	30	85	759	97	3 080	1 902	4 982	67
61	41	48	114	311	70	28	113	183	63	1 056	950	2 006	68 e 69
4	2	3	8	9	7	1	2	13	4	45	56	101	70
23	2	16	20	35	25	1	13	15	14	381	147	528	71
897	430	796	1 003	3 527	2 367	337	1 056	1 357	193	9 514	8 161	17 675	72
1	..	1	1	17	..	1	..	1	..	57	26	83	73

Segue TAV. I. — Morti classificate
B — Per compartimenti e

ANNO 1911.

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
74	Malattie degli occhi (a)	4	4	2
75	Malattie degli orecchi (a)	51	26	115	35	38	38
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	60	26	185	144	55	49
77	Bronchite acuta	3 090	951	6 079	3 765	3 041	2 489
78	Bronchite cronica	919	191	724	529	544	551
79	Malattie della pleura (a)	272	145	497	231	170	205
80	Congestione ed apoplezia polmonare	119	30	164	90	88	51
81	Polmonite crupale	3 407	1 171	5 252	2 678	2 363	2 461
82	Bronco polmonite acuta	4 293	2 386	7 120	4 074	3 262	3 433
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	77	18	113	86	51	41
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	31	7	58	26	8	4
85	Morbo di Basedow	16	4	23	15	11	4
86	Asma, enfisema polmonare	216	79	443	214	130	151
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	1 225	437	1 900	2 037	1 037	1 034
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	25	7	42	23	90	38
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	23	9	43	20	27	19
90	Malattie del cuore	8 450	2 431	10 381	5 901	4 476	4 325
91	Malattie del pericardio	31	4	40	28	17	19
92	Angina pectoris	59	17	76	82	87	76
93	Sincope (b)	96	43	321	100	102	141
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	108	48	231	108	98	66
95	Orecchioni	3	4	13	8	7	7
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	63	26	80	37	43	36
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	956	302	1 771	1 288	830	471
98	Ulcera rotonda dello stomaco	77	30	62	64	43	60
99	Epatite, cirrosi epatica	545	219	800	422	319	358
100	Atrofia gialla acuta del fegato	5	1	11	9	4	11
101	Calcoli biliari	22	16	32	15	29	34
102	Ittero	133	41	277	173	140	115
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	8	5	11	6	9	22
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	5 809	2 075	14 149	6 909	4 875	5 131
105	Volvolo, occlusione intestinale	249	80	299	212	172	160
106	Tumori intestinali e addominali (a)	1	..	15	..	9	12

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

secondo 168 cause di morte.
pel complesso del Regno.

ANNO 1911.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
1	..	2	4	2	3	..	2	2	2	19	9	28	74
10	7	5	23	37	26	4	17	41	6	280	199	479	75
31	13	16	30	88	55	12	35	85	27	517	394	911	76
1 564	893	1 043	1 754	5 528	6 280	1 058	2 989	8 153	1 054	25 217	24 514	49 731	77
192	143	267	535	1 276	1 140	191	403	1 174	297	4 159	4 017	9 076	78
42	44	105	98	344	223	47	116	342	105	1 764	1 222	2 986	79
21	16	25	14	57	41	3	30	43	15	179	328	507	80
631	569	1 675	1 263	4 452	2 776	557	1 837	4 481	1 420	20 699	16 294	36 993	81
1 113	584	1 529	1 720	6 433	3 343	527	1 723	3 717	686	23 101	22 842	45 943	82
8	6	29	13	58	45	3	12	34	20	380	234	614	83
3	6	4	4	13	3	1	4	6	4	66	116	182	84
3	2	4	2	12	4	3	6	1	2	19	93	112	85
109	32	84	270	322	152	70	168	219	72	1 371	1 360	2 731	86
401	192	1 067	539	1 300	364	112	299	494	193	7 705	4 976	12 681	87
2	6	12	5	32	4	2	3	12	1	151	153	304	88
10	6	13	7	40	17	3	15	19	1	160	117	277	89
2 201	1 318	2 167	2 839	7 620	3 573	952	2 340	5 351	1 168	28 104	37 389	65 493	90
4	5	5	15	40	21	11	21	39	21	146	175	321	91
39	18	47	45	246	59	12	62	93	14	647	385	1 032	92
21	14	94	48	141	45	20	21	45	19	750	521	1 271	93
31	34	39	93	169	152	24	90	413	25	877	852	1 729	94
5	2	2	5	7	9	1	5	26	6	56	57	113	95
19	3	27	40	55	49	15	44	126	33	389	317	696	96
265	124	261	565	1 276	750	144	407	1 844	287	5 936	5 005	11 541	97
25	15	31	27	53	28	8	36	45	15	350	269	619	98
122	56	221	220	617	419	105	288	610	183	3 675	1 829	5 504	99
3	..	7	4	6	7	1	2	7	2	48	32	80	100
8	4	22	10	30	16	8	9	18	5	101	177	278	101
40	15	74	51	149	74	28	59	134	38	658	583	1 541	102
..	3	7	11	22	8	..	7	33	11	91	72	163	103
1 939	1 488	3 024	3 977	14 385	5 244	2 016	3 298	11 510	1 868	43 905	43 792	87 697	104
82	33	30	110	238	155	31	92	168	58	1 307	912	2 219	105
..	1	1	..	16	23	39	106

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
107	Ernie intestinali e addominali	166	48	137	102	98	99
108	Malattie da echinococco	1	4	4	5	4	10
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	59	8	166	140	234	39
110	Appendicite	73	25	139	54	65	57
110a	Peritonite	317	108	574	392	381	330
111	Idrope-ascite	61	4	37	22	19	17
112	Malattie dei reni (a)	1 195	431	2 130	1 057	905	1 006
113	Id. della vescica (a)	197	67	251	180	126	165
114	Calcoli renali e vescicali	11	5	10	13	14	12
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	94	29	95	85	61	59
116	Id. delle capsule surrenali	18	6	16	20	12	13
117	Id. dei testicoli (a)	1	1
118	Id. dell'ovaia (a)	3	1	2	1	2	6
119	Id. dell'utero e vagina (b)	78	20	72	53	47	29
120	Id. delle mammelle (b)	2	2	3	3
121	Metrorragia dopo il parto	61	25	76	83	50	43
122	Distocia	10	4	23	8	15	15
123	Eclampsia puerperale	41	7	85	53	40	36
124	Febbre puerperale	100	34	145	72	70	49
125	Pelvi e metroperitonite puerperale	19	1	31	15	12	12
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	13	4	32	23	18	13
127	Flemmone, ascesso (a)	103	60	232	138	124	104
128	Cangrena della pelle	8	1	29	19	11	17
129	Elefantiasi degli arabi	1	2	1	..
130	Favo, foruncoli	10	3	28	16	12	3
131	Pemfigo, eczema, ectima	56	19	108	61	43	38
132	Sclerema	59	15	474	189	397	72
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	112	55	252	93	85	95
134	Reumatismo articolare acuto	129	47	141	129	87	81
135	Id. cronico	89	31	98	71	53	66
136	Psoite	1	..	2	..	2	2
137	Atrofia muscolare progressiva	4	6	12	6	4	5
138	Alcoolismo cronico	97	44	145	143	45	39
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	5	6	16	1	3	3

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

MORTE	MASCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico
											MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
28	23	61	76	247	158	36	81	187	73	964	659	1 623	107	
2	3	10	2	8	10	..	3	14	4	44	40	84	108	
35	33	30	60	145	144	11	53	174	31	681	681	1 362	109	
17	9	46	21	106	40	6	22	67	27	445	329	774	110	
91	74	141	141	378	199	46	130	537	101	1 844	2 095	3 939	110a	
1	7	5	29	54	32	6	25	92	25	177	259	436	111	
464	248	856	788	2 544	1 288	279	781	2 313	398	8 260	8 423	16 683	112	
58	38	46	78	273	118	35	74	224	24	1 770	181	1 954	113	
8	2	10	3	23	6	..	5	44	5	113	28	171	114	
10	6	39	15	42	3	5	13	40	12	600	8	608	115	
6	5	11	7	17	7	2	4	18	4	92	74	166	116	
..	2	..	2	117	
2	1	18	18	118	
18	9	15	20	74	42	10	37	72	19	..	615	615	119	
..	1	1	..	1	1	..	1	1	14	15	120	
11	9	20	46	66	46	13	37	60	33	..	679	679	121	
5	2	8	17	18	9	5	16	16	11	..	182	182	122	
29	12	14	22	44	26	2	20	27	6	..	464	464	123	
25	32	35	35	70	58	13	60	102	29	..	929	929	124	
6	1	5	5	22	12	5	4	14	3	..	167	167	125	
10	7	6	7	16	13	1	7	13	8	..	191	191	126	
28	27	67	68	215	108	28	122	203	35	975	687	1 662	127	
3	3	11	6	14	13	1	8	23	3	81	89	170	128	
..	3	2	5	7	129	
2	1	8	8	10	5	..	4	19	38	110	57	167	130	
19	5	16	19	40	26	6	17	42	18	301	232	533	131	
36	27	61	50	119	317	58	59	30	2	1 012	953	1 965	132	
20	18	28	30	75	60	15	34	67	11	545	505	1 050	133	
29	17	41	57	105	68	15	72	83	41	573	569	1 142	134	
20	15	39	67	99	46	23	55	67	48	308	579	887	135	
..	..	1	1	1	1	1	1	..	1	8	6	14	136	
4	1	10	8	13	2	4	3	4	1	55	32	87	137	
44	16	34	22	33	11	3	20	26	18	655	85	740	138	
3	..	1	3	6	2	1	1	2	1	42	12	54	139	

Segue TAV. I. — Morti classificate
B — Per compartimenti e

ANNO 1911.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
140	in stato d'ubriacchezza	6	2	13	13	2	5
141	per annegamento	210	52	364	318	184	94
142	per freddo	14	2	20	7	19	6
143	per insolazione	5	4	13	22	1	5
144	per fulminazione:						
	a) naturale	19	3	15	11	6	29
	b) da apparecchi elettrici.	8	5	21	8	2	5
145	per caduta	329	127	358	246	223	252
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	21	11	45	27	11	33
147	per ferite da taglio	1	1	2	2	2	5
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali	6	1	27	4	11	3
149	per schiacciamento	211	78	305	163	120	116
150	per violenze d'animali	11	4	15	12	13	8
151	per ustione	171	88	293	178	152	175
152	per soffocamento	19	3	49	22	20	6
153	per asfissia	30	4	23	20	18	7
154	per avvelenamenti acuti	12	8	27	33	10	17
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi.	1	1
156	per cause non determinate	5	3	9	..	7	3
157	Omicidio (compreso quello d'infante).	61	35	65	28	43	38
160	per annegamento	85	11	73	51	75	28
161	con arma da fuoco.	97	62	119	63	44	69
162	Id. da taglio	12	3	13	13	6	12
163	per impiccamento	104	23	79	67	60	50
164	per precipitazione	37	43	39	25	27	29
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	25	7	34	12	11	1
166	per avvelenamento	47	27	67	34	24	40
167	per asfissia	17	16	10	9	9	13
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato.	1	4	..	1
	Totale dei morti per causa determinata	62 653	22 445	106 466	68 785	52 411	51 201
	Morti per causa ignota o non dichiarata.	655	63	146	146	164	58
	TOTALE GENERALE	63 308	22 508	106 612	68 931	52 575	51 259

(a) Nell'anno 1911 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico) e per « condanna

secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

ANNO 1911.

MORTE	MARCHES	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico (a)
											MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
	1	..	2	4	9	2	..	1	7	1	62	6	68	140
	68	47	39	46	100	81	11	40	102	45	1 318	483	1 801	141
	23	3	1	11	11	9	1	8	8	3	113	33	146	142
	5	1	8	7	13	8	3	5	24	2	95	31	126	143
	6	12	16	22	24	6	4	10	53	11	186	61	247	144
	4	..	5	1	4	3	..	59	7	66	
	95	79	108	134	307	155	48	153	237	62	2 214	701	2 915	145
	15	13	13	12	44	23	7	21	58	7	312	19	361	146
	2	..	2	1	2	6	2	1	17	12	29	147
	4	3	5	1	6	8	1	2	7	1	82	8	90	148
	39	28	79	47	170	64	13	36	142	27	1 377	261	1 638	149
	4	1	7	6	16	9	3	4	31	10	135	19	154	150
	74	59	134	187	429	205	71	199	280	76	1 139	1 632	2 771	151
	6	1	..	4	14	7	..	10	5	3	97	72	169	152
	5	1	6	3	21	13	6	11	31	3	150	57	207	153
	4	2	17	7	12	9	1	6	28	7	114	86	200	154
	1	2	..	1	3	..	1	2	10	2	12	155
	1	3	5	7	13	6	3	8	15	..	63	25	88	156
	19	18	57	41	172	75	22	89	293	34	889	201	1 090	157
	13	6	34	17	23	35	4	2	28	11	279	217	496	160
	21	12	45	14	62	23	3	11	88	10	705	38	743	161
	2	1	3	3	5	3	1	2	1	1	71	10	81	162
	13	14	12	15	13	7	9	2	33	12	379	134	513	163
	11	4	24	5	25	5	5	4	6	3	185	107	292	164
	1	3	1	1	2	1	2	..	89	12	101	165
	5	6	24	5	57	22	7	8	45	12	166	264	430	166
	2	..	2	..	1	3	..	55	27	82	167
	3	1	1	1	4	..	10	6	16	168
	21 577	13 232	26 013	31 421	87 923	51 134	11 474	30 023	84 834	17 593	372 237	366 948	739 185	
	83	26	46	333	515	116	111	241	309	614	1 769	1 857	3 626	
	21 660	13 258	26 059	31 754	88 438	51 250	11 585	30 264	85 143	18 207	374 006	368 805	742 811	

alla pena capitale » (n. 159).

— 42 —

TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1911, classificati per sesso e per principali cause di morte.

Avvertenza. — Le 168 voci dell'elenco nosologico, che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I, sono state qui riassunte in 53, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta, o riunendo sotto l'unica e generica voce di « *altre malattie* » quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
		1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	358	360	302	299	338	279	336	224	1 334
6	Atrofia congenita, immaturità	7 460	6 867	4 445	3 835	4 423	3 798	4 525	3 926	20 853	18 426	39 279
39	Anemia	889	1 041	935	1 179	2 280	2 374	1 205	1 445	5 309	6 039	11 348
40	Leucemia	199	244	224	259	256	265	206	265	895	1 033	1 918
44	Marasmo senile	8 636	10 261	5 196	6 096	5 228	6 505	5 578	6 688	24 638	29 545	54 183
97	Malattie dello stomaco, atresia	1 124	1 038	1 096	1 035	2 462	2 318	1 254	1 214	5 936	5 605	11 541
101	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	5 353	5 156	7 612	7 324	23 011	23 413	7 929	7 899	43 905	43 792	87 697
26	Dissenteria	1	..	1	1	1	..	1	1	4	5
99	Epatite, cirrosi epatica. . .	904	402	827	396	1 001	576	943	453	3 675	1 829	5 504
112	Malattie dei reni	2 313	2 439	1 866	1 917	1 987	2 089	2 094	1 978	8 260	8 423	16 683
110	Appendicite	88	60	103	69	144	112	110	88	415	329	774
110- <i>a</i>	Peritonite.	377	471	377	491	604	621	486	512	1 844	2 095	3 939
7	Vaiuolo	86	108	219	201	682	579	1 528	1 425	2 515	2 313	4 828
8	Morbillo.	1 160	1 080	1 212	1 230	1 314	1 320	636	621	4 322	4 251	8 573
9	Scarlattina.	259	280	288	238	362	317	388	383	1 297	1 218	2 515
10	Risipola	319	301	235	228	180	196	280	269	1 014	994	2 008
11	Febbre tifoidea	606	623	531	584	1 682	1 935	1 635	1 941	4 454	5 083	9 537
12	Tifo petecchiale	2	2	2	3	8	3	4	8	16	24
13	Meningite cerebro spinale epidemica	2	2	..	2
16	Ipertosse	747	984	786	1 064	943	1 329	424	556	2 900	3 933	6 833
14	Difterite	383	290	225	161	198	197	310	269	1 116	917	2 033
15	Laringite crupale.	363	259	172	128	132	81	297	217	964	685	1 649
18	Febbri da malaria	196	123	204	183	1 005	911	482	433	1 887	1 650	3 537
19	Cachessia palustre	73	85	77	51	177	152	141	127	468	415	883
17	Influenza	2 088	2 087	523	473	97	75	157	160	2 865	2 795	5 660
22	Siflide	270	197	239	187	287	246	245	190	1 041	820	1 861
71	Tetano e trisma	54	17	105	52	136	46	86	32	381	147	528
24	Pustola maligna, carbonchio .	38	10	30	5	55	39	37	21	160	75	235

Segue TAV. II — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1911, classificati per sesso e per principali cause di morte.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno			
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale	
		27	Rabbia	8	1	10	2	11	9	8	3	37	15
124	Febbre puerperale	257	..	202	..	234	..	236	..	929	929	
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	458	..	399	..	401	..	425	..	1 683	1 683	
77	Bronchite acuta	9 714	9 323	6 031	5 735	4 975	5 077	4 197	4 379	25 217	24 514	49 731	
78	Bronchite cronica	1 494	1 919	887	1 021	864	932	914	1 045	4 159	4 917	9 076	
81	Polmonite crupale	8 672	6 877	5 631	4 245	2 919	2 352	3 477	2 820	20 690	16 294	36 983	
82	Bronco polmonite acuta	9 626	9 916	5 861	5 457	3 768	3 801	3 846	3 668	23 101	22 842	45 943	
79	Malattie della pleura	489	362	471	317	424	294	380	249	1 764	1 222	2 986	
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	5 191	5 876	5 280	5 739	4 719	5 881	4 484	5 111	19 674	22 607	42 281	
30 a 37	Altre forme tubercolari	1 765	1 833	2 219	2 347	2 740	2 931	1 788	1 880	8 492	8 991	17 483	
90	Malattie del cuore	8 862	12 790	6 554	8 533	6 048	7 681	6 640	8 385	28 104	37 389	65 493	
87	Malattie delle arterie	2 524	1 711	1 876	1 134	1 657	1 068	1 643	1 063	7 705	4 976	12 681	
64	Apoplessia e congestione cerebrale	6 355	5 601	4 532	4 189	3 990	3 774	4 633	4 247	19 510	17 811	37 321	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1 534	1 378	1 748	1 575	2 188	2 245	1 317	1 199	6 787	6 397	13 184	
63	Encefalite	192	149	158	137	183	99	142	114	675	499	1 174	
72	Eclampsia infantile	2 591	2 060	2 261	1 947	2 885	2 626	1 777	1 528	9 514	8 161	17 675	
134	Reumatismo articolare acuto	154	155	162	151	124	123	133	140	573	569	1 142	
45	Pellagra	159	135	148	149	143	167	170	151	620	602	1 222	
47	Diabete	339	249	258	148	210	146	207	157	1 011	700	1 714	
138	Alcoolismo cronico	204	25	153	26	143	16	155	18	655	85	740	
48 a 58	Tumori maligni	2 490	3 136	2 431	3 104	2 717	3 551	2 499	3 244	10 137	13 035	23 172	
140 a 156	Morte violenta {	per causa accidentale	1 592	1 150	1 672	741	2 506	837	1 773	817	7 543	3 545	11 088
157		per omicidio	174	49	198	38	284	67	233	47	889	201	1 090
160 a 168		per suicidio	443	171	576	235	558	237	362	172	1 939	815	2 754
	Altre malattie	7 798	6 259	6 473	4 722	9 844	8 278	6 835	5 296	30 950	24 555	55 505	
	Causa ignota o non dichiarata	469	511	433	345	480	628	387	373	1 769	1 857	3 626	
	TOTALE GENERALE.	107 182	107 187	88 854	80 326	103 370	103 237	79 600	78 105	374 006	368 805	742 811	

TAV. III. — Morti nel Regno classificati per

(Vedasi l'avvertenza)

ANNO 1911.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		non oltre 1 mese		oltre 1 a non oltre 12 mesi (a)		oltre 1 anno a 2 compiuti (b)		oltre 2 anni a 3 compiuti		oltre 3 anni a 4 compiuti		oltre 4 anni a 5 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	916	747	309	291	55	65	18	13	10	11	10	6
6	Atrofia congenita, immaturità	18 065	15 857	2 788	2 569
39	Anemia	2 758	2 745	1 024	1 228	245	266	101	96	36	58
40	Leucemia	118	109	151	147	56	58	20	14	14	11
44	Marasmo senile
97	Malattie dello stomaco, atresia	1 391	1 150	2 548	2 326	804	861	192	229	59	82	43	52
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	2 243	1 791	17 049	16 051	8 519	8 727	2 119	2 239	890	933	468	505
20	Dissenteria	1	1
99	Epatite, cirrosi epatica	28	23	47	52	35	31	11	14	10	5	8	7
112	Malattie dei reni	134	69	471	470	564	585	410	393	273	256	228	186
110	Appendicite	1	1	2	2	8	6	2	4	1	7	5
110-a	Peritonite	40	32	159	109	107	120	52	54	46	28	33	28
7	Vaiuolo	64	43	675	675	479	353	273	267	198	213	169	141
8	Morbillo	7	5	814	731	1 530	1 436	825	875	449	473	263	245
9	Scarlattina	2	1	79	66	211	165	235	191	189	169	138	142
10	Risipola	210	199	261	263	44	38	10	10	2	7	3	3
11	Febbre tifoidea	3	3	134	107	157	188	170	144	120	95	112	110
12	Tifo petecchiale	1	1	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica
16	Ipertosse	72	107	1 401	1 780	872	1 149	274	474	132	201	54	85
14	Difterite	2	5	106	77	288	192	202	165	151	125	123	100
15	Laringite crupale	18	9	130	108	278	185	199	134	129	90	79	64
18	Febbri da malaria	5	13	315	284	277	275	160	140	91	85	88	66
19	Cachessia palustre	45	74	78	69	45	30	23	22	9	17
17	Influenza	84	86	404	337	200	149	69	67	31	34	28	19
22	Sifilide	197	165	303	317	37	38	7	11	11	7	3	2
71	Tetano e trisma	5	2	3	1	4	1	3	1	6	1	6	1

(a) Si comprendono in questo gruppo quei bambini che erano entrati nel secondo mese di vita, ma non avevano superato il primo anno di età.
 (b) In questo gruppo sono compresi i morti che contavano da 1 anno e 1 giorno ad 1 anno e 365 giorni di età. Con lo stesso metodo sono

età, sesso e per principali cause di morte.

(Vedasi l'avvertenza)

ANNO 1911.

Numero dell'elenco nosologico	MORTI IN ETÀ DI																Numero dell'elenco nosologico
	oltre 5 anni a 10 compiuti		oltre 10 anni a 15 compiuti		oltre 15 anni a 20 compiuti		oltre 20 anni a 25 compiuti		oltre 25 anni a 30 compiuti		oltre 30 anni a 35 compiuti		oltre 35 anni a 40 compiuti		oltre 40 anni a 45 compiuti		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
1 a 5	13	16	3	13	1 a 5
6	6
39	93	115	55	73	61	116	51	115	79	160	86	148	96	175	98	159	39
40	39	25	27	41	36	43	19	66	18	93	29	103	36	32	33	54	40
44	44
97	93	88	17	53	17	26	16	33	17	29	22	24	33	30	37	29	97
104	1 061	1 090	501	523	399	436	404	534	427	584	439	699	501	686	561	679	104
20	1	1	..	20
99	21	21	26	17	30	16	38	37	66	44	91	66	156	77	242	108	99
112	503	390	157	185	151	175	184	280	191	331	187	330	202	417	289	337	112
110	34	19	56	21	42	32	37	23	23	26	32	14	20	16	27	15	110
110-a	153	155	138	114	127	162	141	164	81	164	78	163	59	158	80	115	110-a
7	248	247	58	42	60	35	63	73	29	66	45	46	39	37	32	26	7
8	352	386	36	36	11	16	10	15	5	10	3	6	1	7	1	2	8
9	293	324	75	82	36	52	25	19	5	7	4	6	..	3	2	3	9
10	9	10	7	5	11	33	13	25	12	22	16	25	21	23	30	25	10
11	423	460	440	563	599	842	656	684	353	500	273	331	211	258	144	168	11
12	1	1	..	1	1	6	1	2	1	2	..	1	2	12
13	1	13
16	77	120	8	4	..	3	2	2	..	2	16
14	187	190	33	31	9	9	4	5	2	1	1	3	1	1	..	1	14
15	97	76	17	11	1	3	2	3	1	3	..	3	..	15
18	164	159	90	61	87	62	51	47	35	40	37	52	45	40	52	40	18
19	30	31	12	7	12	7	7	5	16	12	6	8	10	16	18	11	19
17	88	60	33	47	65	59	45	52	38	55	37	60	50	69	55	45	17
22	7	3	6	2	9	1	26	16	47	30	48	29	46	39	56	31	22
71	57	20	66	17	25	11	34	3	15	5	17	10	20	13	15	8	71

formati gli altri gruppi.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI MORTI IN ETÀ DI																								Numero dell'Elenco nosologico					
		oltre 45 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 55 compiuti		oltre 55 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 65 compiuti		oltre 65 anni a 70 compiuti		oltre 70 anni a 75 compiuti		oltre 75 anni a 80 compiuti		oltre 80 anni a 85 compiuti		oltre 85 anni a 90 compiuti		oltre 90 anni compiuti		Età ignota		Totale generale							
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Totale				
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1 334	1 162	2 496	1 a 5	
6	Atrofia congenita, immaturità	20 853	18 426	39 279	6	
39	Anemia	108	149	170	189	239	234	11	13	5 309	6 039	11 348	39
40	Leucemia	35	43	43	36	50	25	64	42	46	23	30	10	13	5	6	1	1	1	1	1	1	1	885	1 033	1 918	40		
44	Marasmo senile	629	961	1 305	1 794	3 456	4 619	5 790	6 632	7 485	8 547	4 404	4 866	1 552	2 087	17	39	24 638	29 545	54 183	44				
97	Malattie dello stomaco, atropia	58	37	61	55	64	61	89	92	108	109	114	99	79	76	59	41	11	11	2	4	2	8	5 936	5 605	11 541	97				
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	609	662	719	857	821	860	1 042	1 218	1 154	1 238	1 280	1 427	1 069	1 000	634	655	240	233	54	60	99	102	43 905	43 792	87 697	104				
20	Dissenteria.	1	1	4	5	20		
99	Epatite, cirrosi epatica . .	328	124	407	175	519	206	547	232	457	242	341	174	186	93	60	47	16	13	1	2	4	3	3 675	1 829	5 504	99				
112	Malattie dei reni.	323	373	416	421	511	460	672	630	699	649	769	663	498	454	298	225	94	57	19	15	17	22	8 260	8 423	16 683	112				
110	Appendicite	25	20	30	21	20	18	27	26	16	26	17	13	6	14	5	4	4	1	4	1	445	329	774	110				
110-a	Peritonite	87	86	80	76	83	63	82	81	84	79	77	64	29	45	21	24	5	7	1	..	1	1	1 844	2 095	3 939	110-a				
	Vaiuolo	23	10	10	11	14	6	8	4	7	6	7	5	4	..	1	3	2	1	..	6	4	2 515	2 313	4 828	7					
8	Morbillo.	2	1	1	..	2	..	1	..	1	2	2	1	..	2	3	5	4 322	4 251	8 573	8					
9	Scarlattina.	1	1	1	..	2	2	2	1	..	1	1 297	1 218	2 515	9					
10	Risipola	28	35	32	35	51	27	60	36	47	43	50	47	40	48	40	23	12	10	3	..	2	2	1 014	994	2 008	10				
11	Febbre tifoidea	130	151	119	129	84	104	92	80	84	71	46	51	42	13	11	11	8	4	1	3	2	8	4 454	5 083	9 537	11				
12	Tifo petecchiale	1	1	1	8	16	24	12				
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	2	..	2	13				
16	Ipertosse	1	1	2	2	1	4	2	2 900	3 933	6 833	16					
14	Difterite.	2	2	1	1	5	1	1	..	1	1	..	1	2	1	1 116	917	2 033	14					
15	Laringite crupale	2	2	1	1	1	2	..	964	685	1 649	15					
18	Febbri da malaria	55	30	58	35	55	48	62	58	72	39	45	37	21	20	11	8	7	4	2	3	2	4	1 887	1 650	3 537	18				
19	Cachessia palustre	17	15	25	11	26	18	26	14	23	21	25	11	12	10	1	3	..	2	1	..	1	1	468	415	883	19				
17	Influenza	77	64	107	77	109	103	176	202	235	252	324	320	278	305	224	205	84	91	22	33	2	4	2 865	2 795	5 660	17				
22	Sifilide	64	29	42	24	45	26	39	19	24	16	14	9	3	2	7	3	..	1	1 041	820	1 861	22				
71	Tetano e trisma	12	13	21	11	17	11	23	3	14	7	14	5	2	1	1	2	1	..	381	147	528	71				

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DI MORTI IN ETÀ DI																								Numero dell'Elenco nosologico					
		non oltre 1 mese		oltre 1 a non oltre 12 mesi		oltre 1 anno a 2 compiuti		oltre 2 anni a 3 compiuti		oltre 3 anni a 4 compiuti		oltre 4 anni a 5 compiuti		oltre 5 anni a 10 compiuti		oltre 10 anni a 15 compiuti		oltre 15 anni a 20 compiuti		oltre 20 anni a 25 compiuti		oltre 25 anni a 30 compiuti		oltre 30 anni a 35 compiuti			oltre 35 anni a 40 compiuti		oltre 40 anni a 45 compiuti		
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
24	Pustola maligna, carbonchio	1	..	7	3	4	2	..	1	1	3	3	2	5	4	4	2	7	5	6	2	6	2	11	4	5	4	12	5	24	
27	Rabbia	1	1	1	2	1	4	2	5	1	4	..	3	2	1	..	5	1	4	..	27	
124	Febbre puerperale	38	..	220	..	261	..	194	..	126	..	78	124		
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	48	..	321	..	358	..	334	..	303	..	103	121, 122, 123, 125, 126		
77	Bronchite acuta	2 365	1 738	10 159	8 875	4 984	4 869	1 632	1 792	672	748	304	366	401	536	96	171	100	171	126	162	91	128	69	135	79	100	99	111	77	
78	Bronchite cronica	298	314	128	84	39	36	30	28	30	70	21	40	42	99	59	85	42	87	49	80	50	76	66	84	78	
81	Polmonite crupale	227	160	1 956	1 475	1 368	1 160	578	500	309	274	211	210	344	370	167	194	464	309	639	427	517	402	562	515	682	538	923	559	81	
82	Bronco polmonite acuta	493	360	4 844	4 102	3 768	3 511	1 517	1 467	686	743	413	455	631	765	213	253	253	379	344	377	271	310	245	342	252	330	325	339	82	
79	Malattie della pleura	10	7	86	77	116	81	69	53	43	30	22	21	72	58	30	40	68	71	135	76	86	80	80	58	69	66	57	60	79	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	28	33	346	307	321	292	177	207	116	135	102	106	379	480	432	1 135	1 890	3 302	3 336	3 874	2 739	3 288	2 062	2 563	1 600	1 882	1 370	1 343	29 e 31	
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	84	54	1 452	1 171	1 203	1 124	601	587	397	388	335	294	1 039	989	604	758	485	700	541	606	345	464	240	373	186	294	152	245	30, 32 a 37	
90	Malattie del cuore	56	27	106	108	211	198	99	84	64	56	51	57	202	240	260	302	350	406	360	461	335	559	373	685	559	773	723	972	90	
87	Malattie delle arterie	27	38	27	27	12	6	8	5	4	4	2	3	7	8	6	5	8	6	14	12	21	19	38	14	77	21	103	50	87	
64	Apoplessia e congestione cerebrale	7	2	11	14	15	15	6	8	3	4	5	7	17	21	19	22	35	36	41	44	59	79	97	123	157	168	261	265	64	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	102	70	1 837	1 563	1 071	983	583	498	387	402	308	303	767	782	400	391	258	342	216	197	123	171	100	109	85	115	90	70	59	
63	Encefalite	14	5	69	58	55	36	32	25	10	11	8	5	37	31	22	20	14	20	18	20	12	14	10	18	23	12	33	16	63	
72	Eclampsia infantile	2 166	1 644	4 388	3 688	1 639	1 549	565	571	303	261	167	182	242	227	44	39	72	
134	Reumatismo articolare acuto	7	7	13	11	6	7	2	3	3	2	5	6	43	34	59	41	44	33	27	37	22	17	22	30	18	27	24	31	131	
45	Pellagra	1	1	3	1	4	3	..	1	1	2	..	3	5	7	6	22	5	23	16	36	45	
47	Diabete	1	1	..	4	1	1	2	1	2	..	1	..	7	2	9	12	19	11	19	15	15	11	24	21	30	13	38	33	47	
138	Alcoolismo cronico	1	1	20	1	31	9	40	7	57	7	138	
48 a 58	Tumori maligni	4	8	18	17	15	16	14	24	12	16	15	8	47	43	34	42	71	47	73	78	101	132	157	247	210	441	377	747	48 a 58	
140 a 156	Morte violenta	per causa accidentale	35	26	119	123	333	313	477	354	324	275	239	211	489	433	328	171	548	105	482	90	402	74	334	57	302	61	328	80	140 a 156
157		per omicidio	5	7	1	1	2	2	1	3	2	..	4	2	15	3	28	4	96	18	121	24	131	25	107	15	76	18	69	15	157
160 a 168		per suicidio	20	9	132	112	257	157	196	114	119	65	160	49	125	42	160 a 168
	Altre malattie	2 287	1 810	2 604	2 105	1 641	1 503	872	803	551	448	357	325	969	780	615	462	602	513	601	729	631	736	677	838	831	878	1 002	933		
	Causa ignota o non dichiarata	411	396	205	221	83	104	53	48	42	31	80	86	45	41	49	46	49	57	65	80	52	60	45	70	61	61		
	TOTALE GENERALE	31 405	26 816	59 978	53 674	33 024	32 218	18 028	12 951	6 926	6 834	4 549	4 476	9 875	9 973	5 622	6 111	7 829	9 010	9 297	10 275	7 695	9 694	6 920	9 016	7 097	8 633	8 122	8 283		

ANNO 1911.

ANNO 1911.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI										MORTI IN ETÀ DI										Totale generale			Numero dell'elenco nosologico			
		oltre 45 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 55 compiuti		oltre 55 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 65 compiuti		oltre 65 anni a 70 compiuti		oltre 70 anni a 75 compiuti		oltre 75 anni a 80 compiuti		oltre 80 anni a 85 compiuti		oltre 85 anni a 90 compiuti		oltre 90 anni compiuti		Età ignota		Maschi		Femmine	Totale	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine							
24	Pustola maligna, carbonchio	17	5	16	7	17	8	16	6	9	4	6	3	5	1	1	1	1	1	1	160	75	235	24
27	Rabbia	1	..	1	..	5	4	..	2	1	37	15	52	27	
124	Febbre puerperale	9	..	3	929	929	124	
121, 122 123, 125 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	31	..	5	1 683	1 683	(121, 122 123, 125 126)		
77	Bronchite acuta	130	131	163	163	243	268	384	445	579	669	761	957	828	936	598	655	262	273	72	91	20	24	25 217	24 514	49 731	77	
78	Bronchite cronica	86	110	144	186	208	231	381	429	523	638	686	844	676	728	408	462	155	156	36	44	2	6	4 159	4 917	9 076	78	
81	Polmonite crupale	1 119	552	1 307	751	1 497	1 014	1 847	1 470	1 951	1 648	1 816	1 664	1 301	1 149	644	623	218	197	33	46	19	27	20 699	16 294	36 993	81	
82	Bronco polmonite acuta	456	375	622	526	786	661	1 148	1 157	1 437	1 555	1 671	1 869	1 409	1 531	910	1 007	321	307	65	94	21	21	23 101	22 842	45 943	82	
79	Malattie della pleura	108	50	115	53	110	56	136	75	112	73	103	62	71	43	23	24	10	6	..	1	3	1	1 764	1 222	2 986	79	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	1 250	1 011	1 089	769	888	642	672	494	458	370	261	207	100	91	34	32	8	11	2	5	14	28	10 674	22 607	42 281	29 e 31	
30	Altre forme tubercolari	176	195	150	167	129	155	140	143	104	114	54	95	39	41	21	16	5	7	1	..	9	8	8 402	8 991	17 483	30	
32 a 37	Malattie del cuore	952	1 165	1 361	1 712	1 863	2 414	3 067	4 231	4 246	5 778	5 142	7 097	4 246	5 669	2 433	3 108	855	1 020	143	221	47	66	28 104	37 389	65 493	32 a 37	
37	Malattie delle arterie	168	60	309	123	459	208	762	389	1 076	660	1 599	1 068	1 494	1 053	1 002	779	390	321	82	89	10	8	7 705	4 976	12 681	87	
64	Apoplessia e congestione cerebrali	451	454	784	885	1 209	1 151	2 271	2 088	3 279	2 872	4 213	3 766	3 628	3 093	2 118	1 927	654	621	133	125	38	21	19 510	17 811	37 321	64	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	77	79	91	78	64	61	66	53	49	44	56	32	32	22	12	14	7	1	..	1	6	11	6 787	6 397	13 184	59	
63	Encefalite	27	24	31	22	49	14	43	33	64	31	39	37	31	24	27	11	4	4	2	2	1	..	675	499	1 174	63	
72	Eclampsia infantile	9 514	8 161	17 675	72	
134	Reumatismo articolare acuto	29	17	26	34	33	30	41	35	47	48	48	55	32	36	16	23	6	5	573	569	1 142	134	
45	Pellagra	22	32	49	44	57	66	92	94	122	96	116	84	95	55	22	21	5	5	2	3	620	602	1 222	45	
47	Diabete	77	36	86	62	124	79	166	129	170	114	119	94	73	42	26	16	5	2	1	1 014	700	1 714	47	
138	Alcoolismo cronico	76	8	77	10	93	7	91	8	82	12	57	10	21	2	6	1	2	1	2	655	85	740	138	
48 a 58	Tumori maligni	576	1 070	981	1 450	1 318	1 579	1 633	1 952	1 760	1 854	1 412	1 630	882	1 006	323	450	81	142	14	21	6	15	10 137	13 035	23 172	48 a 58	
140 a 156	Morte violenta	per causa accidentale	350	108	354	96	364	119	452	137	362	144	278	215	240	174	134	113	49	55	11	8	9	3	7 543	3 545	11 088	140 a 156
157		per omicidio	50	6	52	13	47	11	32	14	30	5	10	6	5	5	3	1	1	2	3	889	201	1 090	157	
160 a 168		per suicidio	165	58	163	59	150	40	139	31	107	40	96	18	52	13	25	5	9	2	2	..	22	1	1 939	815	2 754	160 a 168
	Altre malattie	1 154	919	1 414	1 102	1 759	1 252	2 400	1 754	2 795	1 835	3 104	2 107	2 321	1 494	1 281	804	332	277	71	55	79	93	30 950	24 535	55 505		
	Causa ignota o non dichiarata	56	59	78	83	93	81	38	40	29	41	32	51	26	31	16	28	7	8	1	1	153	133	1 769	1 837	3 606		
	TOTALE GENERALE	9 556	8 409	11 808	10 589	14 277	12 421	19 656	18 918	23 769	23 266	28 232	29 530	25 633	25 960	18 947	19 924	8 281	8 722	2 330	3 015	645	697	874 006	368 805	742 811		

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE											Professioni e cause di morte																	Numero dell'Elenco nosologico
	Agricoltori, boscaioli, carbonai	Braccianti, manovali, cantonieri, selciatori	Pastori e mandriani	Minatori, marmisti, cavatori, solfatori, salinai	Fabbrici, meccanici, elettricisti, arrotini, maiscalchi, calderai, stagnai	Macchinisti e fuochisti	Fornaciari, vasa, cementisti	Vetri e fabbricanti conterie	Muratori, scalpellini, funisti, piombisti, copritetti, pittori di stanze, imbianchini	Falegnami, verniciatori, ebanisti, carrozzai, sednai, calafati, carpentieri, segatori di legna	Cestai e impagliatori	Tappezzieri e materassai	Cartai e cernitori di stracci	Tipografi, legatori, litografi	Filatori, tessitori, tintori, cordai	Conciatori, salatori e verniciatori di pelli	Calzolari, sellai, pellettieri, valigia	Sarti	Cappellai, guantai, borrettai	Barbieri	Mugnai, pastai, fornai, panettieri	Orefici, orologiai, gioiellieri	Caffettieri, pasticciieri, cioccolattieri, birrai	Trattori, vinali, osti, liquoristi	Camerieri d'esercizi pubblici	Lattai e casari	Macellai, pizzicagnoli, trippaioli		
39 e 40	Anemia leucemia	574	90	12	8	33	7	4	1	42	49	1	1	..	1	9	2	45	10	1	2	16	1	6	11	3	..	13	39 e 40
44	Marasmo senile	12 574	1 919	224	98	330	8	39	3	524	453	19	19	25	16	150	24	520	269	34	79	199	23	34	60	20	19	101	44
97	Malattie dello stomaco, atrespia	357	36	6	2	16	..	2	..	21	12	..	1	1	1	5	..	18	11	2	4	15	1	2	8	1	1	5	97
104 e 20	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, dissenteria, ecc.	4 446	804	108	66	200	13	23	4	290	268	8	7	7	13	55	20	269	110	6	44	131	12	16	39	13	8	54	104 e 20
99	Epatite, cirrosi epatica	1 084	202	29	20	94	4	10	2	111	89	2	4	4	1	11	10	116	39	10	20	51	4	21	77	12	4	44	99
112	Malattie dei reni	1 748	351	40	45	143	13	13	10	152	152	3	7	11	14	34	13	135	70	6	27	57	18	16	29	24	7	39	112
110 e 110-a	Appendicite e peritonite	577	84	18	9	34	4	7	1	47	42	2	1	1	6	9	1	34	16	2	6	16	8	5	8	6	3	7	110 e 110-a
7	Vaiuolo	113	15	5	9	6	1	7	4	1	11	2	..	1	3	1	1	..	1	..	1	7
8	Morbillo	23	4	1	1	1	8
9	Scarlattina	30	4	1	2	1	1	9
10	Risipola	165	42	4	2	2	17	13	1	..	2	1	3	2	5	6	1	6	4	2	3	4	2	1	7	10
11	Febbre tifoidea	1 161	197	26	18	107	11	9	3	103	90	1	3	1	10	21	6	67	40	4	6	30	5	..	13	11	13	11	11
12	Tifo petecchiale	2	12
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	13
16	Ipertosse	2	1	16
14	Difterite	10	5	1	1	14
15	Laringite crupale	7	1	1	1	1	15
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	556	64	35	5	6	2	2	..	13	12	3	..	20	5	1	..	11	1	1	..	2	18 e 19	
17	Influenza	858	124	22	9	35	1	1	1	60	40	2	2	..	16	1	48	21	1	..	15	3	3	9	2	2	6	17	
22	Sifilide	96	33	3	2	13	1	2	1	27	11	..	1	2	3	3	2	20	9	..	3	8	..	1	4	4	..	8	22
71	Tetano e trisma	134	24	1	1	5	..	2	..	5	7	2	1	1	1	1	1	1	1	14	
24	Pustola maligna, carbonchio	54	14	2	..	1	4	1	2	4	6	1	3	2	..	1	21	
27	Rabbia	9	3	1	1	27	
77	Bronchite acuta	2 071	296	48	32	86	6	13	3	132	123	5	3	3	7	21	4	117	55	5	19	72	11	10	28	11	4	23	77
78	Bronchite cronica	1 628	250	33	32	71	2	3	4	117	81	..	1	3	14	35	8	92	57	..	19	43	5	5	21	5	12	19	78
81	Polmonite crupale	7 838	1 197	244	130	314	16	41	9	496	363	10	8	10	30	80	21	271	108	12	49	159	18	39	66	23	22	47	81
82	Bronco polmonite acuta	4 631	763	101	68	201	16	20	6	313	260	11	12	13	24	52	16	257	97	18	36	127	24	24	49	21	7	47	82
79	Malattie della pleura	487	96	14	8	38	5	3	1	55	35	1	3	1	3	6	1	35	18	2	8	13	5	5	5	2	6	9	79
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	4 880	1 279	71	158	882	44	72	29	910	856	29	36	19	156	151	24	823	368	42	203	304	79	80	130	148	24	112	29 e 31
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	1 018	239	29	29	90	4	6	4	107	104	4	4	1	19	12	3	111	73	1	12	41	8	4	13	4	5	16	30, 32 a 37
90	Malattie del cuore	12 307	1 823	201	157	503	31	57	13	751	599	15	30	26	50	170	42	625	272	31	117	323	12	66	163	50	34	153	90
87	Malattie delle arterie	2 417	492	40	25	144	9	13	3	218	189	6	6	7	20	48	8	154	88	9	34	91	28	20	48	24	8	40	87
64	Apoplessia e congestione cerebrale	8 032	1 390	122	93	332	15	41	11	521	502	18	14	18	31	129	30	480	252	29	77	225	30	57	101	28	29	100	64
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	507	98	25	14	35	7	6	4	60	38	..	2	3	3	4	2	31	11	1	3	11	5	..	7	5	2	7	59
63	Encefalite	136	30	2	1	10	1	3	1	16	11	1	3	1	6	2	1	2	4	2	4	4	..	1	5	63
134	Reumatismo articolare acuto	179	36	3	2	11	19	8	2	2	1	9	7	2	2	6	2	3	3	1	..	3	134
45	Pellagra	436	61	3	..	2	..	1	..	6	5	1	4	1	4	1	4	2	1	3	45
47	Diabete	230	38	4	5	16	..	1	..	23	16	..	1	1	4	6	2	22	14	2	5	6	7	1	10	9	47
138	Alcolismo cronico	148	52	1	4	28	4	2	1	25	17	..	2	2	2	4	3	40	5	1	4	16	1	2	22	2	..	13	138
48 a 58	Tumori maligni	3 942	789	53	44	190	20	36	9	325	295	11	12	14	24	73	9	212	91	10	25	102	33	26	71	27	18	72	48 a 58
140 a 156	Morte violenta } per causa accidentale	1 847	471	66	141	157	37	24	4	317	116	3	4	1	11	30	5	75	26	4	10	55	2	11	10	15	10	22	140 a 156
157	Morte violenta } per omicidio	301	55	47	22	20	1	6	1	32	18	2	2	1	2	3	1	34	3	4	4	10	2	3	5	2	1	6	157
160 a 168	Morte violenta } per suicidio	392	77	6	8	75	2	7	4	71	47	4	4	3	9	11	2	60	19	4	21	28	13	13	14	20	6	26	160 a 168
160 a 168	Altre malattie	7 997	1 488	182	127	400	28	63	10	673	521	14	26	17	54	120	49	560	224	27	105	239	56	51	109	48	27	134	
	Causa ignota o non dichiarata	299	50	24	9	11	1	2	..	21	15	..	1	..	1	1	2	22	5	..	3	6	2	3	3	..	2	..	
	TOTALE GENERALE	86 804	15 086	1 857	1 404	4 643	315	534	143	6 637	5 464	175	217	197	531	1 287	322	5 356	2 408	274	959	2 443	453	535	1 148	538	280	1 165	

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	ALESSANDRIA	ACQUI	ASTI	CASALE MON-FERRATO	NOVI LIGURE	TORTONA	CUNEO	ALBA	MONDOVI	SALUZZO	NOVARA	BIELLA
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	5	6	3	..	3	3	7	2
6	Atrofia congenita, immaturità	33	10	20	17	9	5	33	14	12	12	46	8
39 e 40	Anemia, leucemia	60	4	17	7	3	4	13	2	3	1	31	9
44	Marasmo senile	128	21	50	61	14	42	32	29	10	19	78	34
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	35	3	3	7	3	6	9	3	7	5	5	2
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	147	25	86	61	28	41	84	19	59	36	58	25
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica	18	1	7	9	4	2	4	3	2	1	14	5
112	Malattie dei reni	24	8	17	12	7	3	11	..	9	7	26	21
110	Appendicite	2	1	1	1	1
110-a	Peritonite	5	1	1	4	1	1	4	1	1	3	8	2
7	Vaiuolo
8	Morbillo	45	1	31	..	7	..	20	..	13	1
9	Scarlattina	1	1	3	1	2	..	2
10	Risipola	1	3	5	6	..	1	2	3	..	2	7	2
11	Febbre tifoidea	17	3	23	13	3	5	7	2	2	2	17	9
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica
16	Ipertosse	14	4	8	4	3	2	4	4	1	7	11	..
14	Difterite	4	3	2	1	1	1	1	7	..
15	Laringite erupale	2	1	2	2	1	1	1	1	1
18 e 19	Febbrì da malaria e cachessia palustre	2	1
17	Influenza	14	..	1	2	3	..	4	2	3	3	3	5
22	Sifilide	5	..	1	1	2	1	1	1	6	..
71	Tetano e trisina	3	..	4	2	..	1	4	..
24	Pustola maligna, carbonchio	1	2	..	1
27	Rabbia
124	Febbre puerperale	1	..	3	..	1	1	..	5	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1	3	1	2	3	..	1	1	..	1	2	..
77	Bronchite acuta	54	11	10	19	10	3	47	14	8	11	24	18
78	Bronchite cronica	15	..	13	11	..	3	16	1	10	5	9	9
81	Polmonite erupale	72	12	34	24	17	39	21	17	14	11	23	25
82	Bronco polmonite acuta	101	32	54	22	58	20	36	9	37	6	51	37
79	Malattie della pleura	8	2	5	2	1	2	6	10	3
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	136	36	50	57	32	33	57	10	32	22	134	37
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	34	8	10	26	8	11	11	5	9	5	36	9
90	Malattie del cuore	116	35	89	64	42	32	73	38	67	46	119	51
87	Malattie delle arterie	27	2	6	28	4	7	4	2	24	5	38	9
64	Apoplessia e congestione cerebrale	39	14	61	37	20	20	29	22	21	28	65	24
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	28	3	11	9	9	3	10	6	3	..	5	11
63	Encefalite	3	1	2	3	1	..	2	1	8	1
72	Eclampsia infantile	10	2	18	1	6	3	19	5	3	4	8	2
134	Reumatismo articolare acuto	2	..	1	2	1	2	..	2	..
45	Pellagra	1	..	1	3	..
47	Diabete	2	1	1	3	..	2	1	2	2	1	5	1
138	Alcolismo cronico	8	..	1	1	2	8	..
48 a 58	Tumori maligni	58	8	25	36	24	20	25	12	25	7	51	26
140 a 156	Morte violenta } per causa accidentale	20	6	19	13	3	7	3	6	10	6	19	10
157	Morte violenta } per omicidio	2	2	3	..	1	..	1	3	2
160 a 168	Morte violenta } per suicidio	16	2	9	5	7	2	3	2	1	4	4	7
	Altre malattie	120	17	45	53	24	13	58	14	28	25	141	37
	Causa ignota o non dichiarata	5	3	1	2	1	1
	TOTALE GENERALE	1,490	291	718	631	381	341	646	282	435	295	1,119	448

DOMODOSSOLA	FALLANZA	VARALLO	VERCELLI	TOBINO	AOSTA	IVERA	PINEROLO	RUSA	GENOVA	ALBENGA	CHIAVARI	SAVONA	SPEZIA	S. PIER D'ARENA	PORTO MAURIZIO	SAN REMO	Num. dell'elenco nosologico
1	1	30	1	15	..	1	1	2	4	..	3	1 a 5
11	3	1	42	283	9	..	3	2	211	9	16	27	50	66	5	..	6
2	..	1	1	70	2	..	1	..	49	2	1	15	2	16	..	6	39 e 40
2	8	14	40	287	7	37	41	11	165	6	16	52	50	34	8	20	44
1	4	..	7	114	6	..	10	1	90	4	3	8	11	12	2	4	97
10	2	6	44	536	19	15	24	7	462	9	14	88	36	97	14	22	104
..	20
..	2	..	11	91	3	2	7	1	65	1	4	8	16	10	..	5	99
5	2	1	20	220	2	4	5	..	136	1	13	13	32	11	2	11	112
1	1	20	1	9	1	1	110
2	..	3	3	40	1	4	3	..	30	..	6	5	6	6	..	3	110-a
..	5	1	7
1	1	..	2	11	1	..	65	1	1	4	..	13	8
..	6	4	2	..	1	9
..	28	3	1	8	1	2	5	4	4	..	3	10
1	..	1	14	76	13	3	5	..	25	1	1	10	12	5	..	2	11
..	12
..	13
1	..	3	11	33	5	3	2	1	20	..	1	18	10	3	16
..	1	..	3	35	2	..	73	3	4	..	1	14
..	2	1	4	1	3	3	..	2	15
1	2	2	1	18 e 19
5	..	1	3	45	10	2	3	..	21	3	6	1	11	4	1	1	17
2	2	14	..	1	34	2	3	1	22
..	3	5	..	1	4	..	1	3	..	2	71
..	4	5	1	24
..	1	17	1	..	9	1	2	27
..	124
1	1	2	..	17	..	2	11	1	5	121 a 123, 125, 126
1	8	5	10	174	9	12	18	2	132	9	19	60	27	64	7	23	77
2	6	1	7	86	3	2	9	1	25	1	2	6	4	9	3	5	78
4	4	5	25	361	5	20	14	8	253	15	15	60	60	56	8	10	81
5	4	4	34	468	4	10	24	9	615	8	45	86	119	123	10	31	82
..	..	1	2	45	3	1	3	1	36	3	1	4	8	8	5	2	79
17	13	9	87	920	18	12	28	4	662	12	27	83	148	101	13	58	29 e 31
4	17	223	4	..	5	1	170	5	9	22	42	35	2	9	30, 32 a 37
10	10	20	115	1,006	55	50	52	16	611	11	28	112	98	73	17	53	90
5	3	..	26	242	4	2	6	..	171	1	2	16	13	19	3	8	87
1	5	6	36	408	7												

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	BERRAMO	CLUSONE	TREVIGLIO	BRESCIA	BRENO	CHIARI	SALÒ	VEROLANUOVA	COMO	LRICO	VARESE	CREMONA
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	5	..	1	7	..	2	1	..	5	1	4	6
6	Atrofia congenita, immaturità	59	14	6	65	8	32	2	6	26	1	12	93
39 e 40	Anemia, leucemia	48	5	11	31	2	6	2	1	15	1	..	23
44	Marasmo senile	103	8	29	66	5	1	..	9	81	5	16	35
97	Malattie dello stomaco, atresia	17	2	18	23	3	9	14	1	1	17
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	283	55	53	250	14	46	8	19	105	12	44	74
20	Dissenteria	1
99	Epatite, cirrosi epatica	17	..	3	27	..	3	2	..	11	7	4	20
112	Malattie dei reni	46	2	5	40	1	5	4	..	30	2	16	37
110	Appendicite	1	1	..	1	1	2	6
110-a	Peritonite	17	1	1	13	1	6	1	1	8	1	9	7
7	Vaiuolo
8	Morbillo	2	17	8
9	Scarlattina	9	1
10	Risipola	4	..	1	10	2	..	4	1	2	6
11	Febbre tifoidea	31	2	20	47	2	10	4	1	12	2	13	55
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica
16	Ipertosse	7	11	..	3	3	..	3	..	1
14	Difterite	5	..	2	20	1	3	..	2	..
15	Laringite crupale	1	..	1	3	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	1
17	Influenza	4	6	..	4	..	1	2	1	3	1
22	Sifilide	2	9	..	1	8	3
71	Tetano e trisma	5	..	3	9	1	..	1	1	..	12
24	Pustola maligna, carbonchio	1
27	Rabbia	1	1
124	Febbre puerperale	5	4	..	2	3
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	7	..	3	10	..	1	2	1	2	4
77	Bronchite acuta	26	10	32	65	6	5	2	4	17	11	15	17
78	Bronchite cronica	12	..	3	20	2	1	1	2	4	2	3	11
81	Pneumonia crupale	74	6	17	120	3	11	8	3	53	14	26	102
82	Bronco pneumonia acuta	98	10	11	122	8	20	9	4	66	7	32	46
79	Malattie della pleura	22	..	1	16	..	2	12	5	1	14
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	145	6	22	228	2	10	14	6	105	22	32	128
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	46	..	21	58	..	9	..	1	23	9	5	42
90	Malattie del cuore	122	6	41	187	7	29	21	15	158	40	52	114
87	Malattie delle arterie	34	1	1	63	..	3	1	1	14	2	10	63
64	Apoplezia e congestione cerebrale	112	9	22	171	4	23	5	12	76	23	28	80
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	28	6	21	48	2	5	1	9	27	10	8	14
63	Encefalite	4	..	1	3	..	2	1	1	1	1
72	Eclampsia infantile	16	1	..	11	1	3	2	3	3
134	Reumatismo articolare acuto	6	1	..	1	5	5
45	Pellagra	16	1	..	9	..	7	3	1	1	..	1	2
47	Diabete	3	5	1	..	5	1	4	5
138	Alcolismo cronico	6	2	..	2	2	..	1	1
48 a 58	Tumori maligni	77	5	14	144	4	17	5	8	46	18	30	98
140 a 156	Morte violenta	29	1	9	44	1	6	4	1	12	9	8	19
157	per causa accidentale	3	2	1	1	2
160 a 168	per omicidio	6	..	1	13	8	3	5	6
	per suicidio
	Altre malattie	166	9	33	191	..	24	10	7	31	22	38	161
	Causa ignota o non dichiarata	1	..	1	3	4	1	1	..	2	..
	TOTALE GENERALE	1 716	173	410	2 209	81	307	125	116	1 039	241	444	1 337

Num. dell'elenco nosologico	CASALMAGGIORE	CREMA	MANTOVA	VIADANA	MILANO	ABBATEGRASSO	GALLARATE	LODI	MONZA	PAVIA	BOBBIO	MORTARA	VOGHERA	VIGEVANO	SONDRIO	BELLUNO	FELTRE	Num. dell'elenco nosologico
1 a 5	1	..	1	..	22	1	9	1	4	2
6	25	9	39	10	513	5	8	25	65	41	1	1	19	10	..	42	47	1 a 5
39 e 40	22	4	9	3	83	6	6	9	20	12	..	1	11	9	2	2	7	6
44	36	24	41	19	577	51	12	25	53	23	4	2	25	21	12	35	25	39 e 40
97	5	1	23	10	130	..	1	5	11	13	3	4	4	6	8	8	7	44
104	26	24	168	41	988	29	39	58	111	58	6	15	54	13	18	41	25	97
20	104
99	3	5	10	4	146	6	2	4	6	11	4	4	3	2	3	20
112	7	10	31	11	363	11	7	23	26	46	..	1	22	9	4	6	6	99
110	..	1	7	..	42	3	3	3	1	..	1	112
110-a	..	3	4	1	95	..	3	3	13	11	6	1	..	3	1	110-a
7	7
8	4	6	46	16	152	..	5	8	86	19	7	7	..	1	..	8
9	2	..	17	9
10	6	..	51	1	2	..	5	7	2	3	1	10
11	5	14	16	3	232	6	8	29	13	31	..	3	6	..	3	5	5	11
12	12
13	13
16	..	1	2	..	60	1	3	..	14	1	15	8	1	32	6	16
14	..	1	33	1	2	3	7	14
15	..	1	6	..	2	..	6	1	1	1	..	3	..	15
18 e 19	4	18 e 19
17	20	1	3	7	52	14	5	4	2	1	4	3	3	24	..	9	1	17
22	..	1	12	..	78	..	1	1	1	2	1	..	2	..	22
71	..	2	1	..	7	3	1	4	..	1	2	1	..	2	2	71
24	1	24
27	3	27
124	..	3	2	1	27	2	1	5	1	..	1	3	124
121 a 123, 125, 126	1	..	4	1	32	2	..	1	5	5	..	1	1	2	1	3	4	121 a 123, 125, 126
77	23	5	55	41	327	8	6	23	74	32	5	6	9	14	5	26	16	77
78	2	1	7	4	43	1	..	7	1	13	4	1	2	3	1	78
81	8	26	51	6	613	26	15	30	44	57	7	9	30	15	12	29	15	81
82	31	16	73	9	990	15	7	34	88	94	10	9	47	53	22	20	22	82
79	2	2	7	1	112	..	2	2	3	11	4	2	..	4	2	79
29 e 31	18	39	69	19	1 284	22	23	85	99	117	7	14	45	42	12	38	30	29 e 31
30, 32 a 37	4	28	36	8	297	5	4	17	28	42	5	2	21	5	4	23	9	30, 32 a 37
90	29	37	67	50	1 074	42	26	97	93	108	11	14	41	58	22	46	34	90
87	3																	

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PADOVA	ESTE	MONSELICE	MONTAGNANA	ROVIGO	ADRIA	TRIVISO	CASTELFRANCO VENETO (a)	CONEGLIANO	MONTebelluna	VITTORIO	UDINE
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	18	..	2	1	1	2	3	6	2	..	4	10
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	181	24	41	20	18	49	33	15	6	23	27	47
39 e 40	Anemia, leucemia . . .	32	4	4	11	5	8	17	2	2	6	1	23
14	Marasmo senile . . .	127	19	20	9	12	36	23	17	1	19	29	41
97	Malattie dello stomaco, atrepsia . . .	37	6	7	..	5	10	28	..	4	3	2	20
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	256	41	21	24	20	81	55	24	10	22	29	131
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica . . .	13	3	..	3	4	3	14	3	3	2	1	12
112	Malattie dei reni . . .	70	3	2	3	4	6	11	3	5	3	5	29
110	Appendicite . . .	2	1	..	1	..	1	2
110-a	Peritonite . . .	10	6	..	1	3	5	10	3	5	..	4	20
7	Vainolo . . .	1
8	Morbillo . . .	62	7	3	5	6	1	4
9	Scarlattina . . .	10	2	1	..	1	..	2
10	Risipola . . .	14	..	1	1	2	1	3
11	Febbre tifoidea . . .	25	6	11	1	2	8	12	3	3	6	2	13
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica
16	Ipertosse . . .	32	1	..	9	..	4	7	..	1	11	2	7
14	Difterite . . .	12	..	1	..	2	2	13	4	2	2	1	7
15	Laringite crupale . . .	1	1	1	14	1	2	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . .	1	5
17	Influenza . . .	12	4	..	3	2	6	5	3	..	1	21	10
22	Sifilide . . .	9	5	2
71	Tetano e trisma . . .	5	1	..	2	8	3	3	1	2	8
24	Pustola maligna, carbonchio
27	Rabbia
124	Febbre puerperale . . .	3	3	1	1	1	1
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	2	2	1	1	2	2	1	1	1	4
77	Bronchite acuta . . .	78	12	18	8	13	16	22	19	17	17	14	31
81	Bronchite cronica . . .	18	2	2	2	4	6	1	6	1	4	4	10
78	Polmonite crupale . . .	91	5	3	2	3	11	38	5	28	9	32	43
82	Bronco polmonite acuta . . .	169	10	21	15	8	17	51	12	11	11	34	63
79	Malattie della pleura . . .	13	3	1	5	1	3	1	5	5
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . .	225	13	30	14	40	33	92	19	27	20	32	119
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	86	18	12	7	18	27	31	6	9	10	19	52
90	Malattie del cuore . . .	134	19	24	16	29	24	78	34	17	20	42	89
87	Malattie delle arterie . . .	117	23	16	4	21	19	41	2	16	12	10	90
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . .	107	28	18	26	13	22	39	15	11	14	17	46
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	20	2	8	2	9	6	11	2	3	3	12	9
63	Encefalite . . .	3	1	2	2	19	1	1	..	2	62
72	Eclampsia infantile . . .	13	6	2	2	12	20	..	5	5	9
134	Reumatismo articolare acuto . . .	5	2	4	4	2	3
45	Pellagra . . .	44	11	7	..	3	6	5	1	11
47	Diabete . . .	13	2	..	2	1	2	..	1	4
138	Alcolismo cronico . . .	12	2	1	1	..	1	3	3	6
48 a 58	Tumori maligni . . .	101	9	8	11	16	19	50	9	12	11	18	63
140 a 156	Morte violenta } per causa accidentale . . .	25	2	7	4	7	5	12	3	6	7	6	22
157	Morte violenta } per omicidio . . .	1	1	1	1	..
160 a 168	Morte violenta } per suicidio . . .	17	3	1	2	1	3	13
	Altre malattie . . .	201	28	21	17	39	69	79	17	14	14	23	106
	Causa ignota o non dichiarata . . .	1	1	3	2	1
	TOTALE GENERALE . . .	2 420	330	310	219	323	526	872	268	229	269	419	1 250

Num. dell'elenco nosologico	PORDENONE	VENEZIA	CHIOGGIA	MESTRE	VERONA	LEGNAGO	VICENZA	BASSANO	LONIGO	SCHIO	BOLOGNA	IMOLA	VERGATO	FERRARA	CENTO	COMACCHIO	ARGENTA	Num. dell'elenco nosologico
1 a 5	..	21	4	2	14	1	8	7	5	3	..	4	2	2	..	1 a 5
6	8	157	92	17	95	6	117	13	1	23	197	54	7	198	26	12	30	6
39 e 40	4	58	52	18	31	21	28	6	3	9	18	13	..	32	8	6	18	39 e 40
14	22	107	51	10	78	29	65	22	14	11	179	53	12	79	38	9	28	44
97	3	32	31	6	13	11	4	5	7	..	20	5	3	31	7	7	4	97
104	61	294	164	22	116	51	118	26	13	20	191	93	8	207	7	25	32	104
20	20
99	..	30	4	3	12	4	6	3	..	1	40	5	1	13	..	1	6	99
112	7	118	15	7	25	7	21	3	7	3	93	26	..	32	11	4	7	112
110	2	17	1	1	1	10	3	1	1	..	110
110-a	2	14	6	4	8	3	9	3	1	2	29	4	1	13	2	110-a
7	1	7
8	9	2	..	16	16	..	9	46	3	8
9	..	4	1	..	3	5	9
10	1	10	3	2	4	2	4	2	..	1	6	1	..	27	..	3	..	10
11	4	41	14	1	31	4	21	4	3	7	55	15	2	20	7	1	7	11
12	12
13	13
16	..	25	12	..	11	9	1	3	5	..	30	18	2	5	..	1	7	16
14	4	11	1	1	7	..	2	2	18	..	1	11	4	14
15	..	1	5	1	1	1	2	1	1	..	2	4	..	1	..	15
18 e 19	17	..	1	1	6	..	4	..	18 e 19
17	3	39	13	1	7	1	26	2	4	1	17	2	1	19	1	5	1	17
22	..	15	1	1	56	2	13	16	6	..	6	22
71	1	..	1	..	2	1	..	2	..	2	8	71
24	1	1	24
27	4	1	27
124	..	4	1	..	2	1	3	3	..	2	2	124
121 a 123, 125, 126	1	8	4	..	1	1	2	1	1	4	6	1	..	6	1	1	..	121 a 123, 125, 126
77	10	115	76	12	92	11	36	30	7	7	56	48	4	73	28	8	20	77
81	..	13	7	..	20	..	2	..	1	5	47	11	..	7	6	1	7	81
78	9	144	18	18	90	6	33	4	1	10	208	28	2	55	7	2	11	78
82	31	259	76	45	109	10	103	15	11	29	248	79	2	123	12	7	11	82
79	2	22	1	3	20	..	4	1	3	1	22	3	..	10	1	1	1	79
29 e 31	13	360	43	40	191	27	130	43	25	43	286	72	7	172	30	12	19	29 e 31
30, 32 a 37	13	137	45	21	84	18	65	19	7	8	133	41	4	67	16	8	8	30, 32 a 37
90	26	359	72	19	184													

Num dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	COPPARO	PORTOMAGGIORE	FORLÌ	CESENA	RIMINI	MODENA	MIRANDOLA	PAVULLO NEL FRIGNANO	CARPI	PARMA	BORGOSAN DONINO	BORGOTARO
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	4	1	3	1	3	20	4	4
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	89	43	48	65	142	137	46	50	44	97	25	..
39 e 40	Anemia, leucemia . . .	5	8	4	6	13	14	5	4	7	19	4	..
44	Marasmo senile . . .	15	35	44	20	59	186	27	24	26	48	34	10
97	Malattie dello stomaco, atresia . . .	12	64	6	19	19	39	7	..	19	44	..	1
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	29	52	101	120	169	135	31	24	48	82	21	2
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica . . .	3	1	6	6	4	14	2	3	7	11	2	2
112	Malattie dei reni . . .	15	4	18	23	22	18	3	8	10	21	5	4
110	Appendicite . . .	1	..	3	5	..	1	1	8	..	1
110-a	Peritonite . . .	1	2	6	2	7	15	3	1	3	7	3	3
7	Vaiuolo . . .	1	..	2	1
8	Morbillo	4	34	38	..	4	17
9	Scarlattina . . .	1	2	..	1	1	2	..	1	..	4
10	Risipola . . .	4	1	1	6	1	7	2	7	..	3
11	Febbre tifoidea . . .	4	5	12	24	17	16	3	3	7	16	5	..
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica
16	Ipertosse	7	4	28	4	13	1	5	9	2	1	..
14	Difterite . . .	5	..	5	5	14	3	..	7	1	18	..	1
15	Laringite crupale . . .	1	..	3	1	2	6	1	2
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . .	4	1
17	Influenza . . .	2	2	13	2	9	14	2	..	4	7	..	5
22	Sifilide	1	..	3	3	1	4	..	1
71	Tetano e trisma	5	1	3	1	..	2	3	1	..
24	Pustola maligna, carbonchio	2	2	1
27	Rabbia
124	Febbre-puerperale . . .	2	1	1	..	1
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	4	4	4	2	1	..	3	1
77	Bronchite acuta . . .	25	34	31	51	65	77	14	46	62	37	33	41
78	Bronchite cronica . . .	2	1	16	14	10	14	2	2	1	16	2	5
81	Polmonite crupale . . .	19	11	18	53	28	66	17	21	17	42	14	19
82	Bronco polmonite acuta . . .	14	30	35	43	84	116	9	16	42	82	14	7
79	Malattie della pleura . . .	2	..	1	2	4	7	1	..	4	11	2	2
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . .	32	26	78	76	57	128	23	5	44	131	20	8
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	14	9	23	24	28	44	11	5	9	60	9	3
90	Malattie del cuore . . .	25	22	68	71	74	134	18	26	35	99	41	23
87	Malattie delle arterie . . .	9	4	27	15	15	46	2	4	9	33	4	..
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . .	16	25	59	62	74	106	16	9	29	78	33	9
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	5	6	17	10	10	33	7	5	3	9	3	5
63	Encefalite	1	1	2	2	..	1	..	1
72	Eclampsia infantile . . .	2	6	8	45	13	15	9	2	8	11	1	4
134	Reumatismo articolare acuto . . .	2	4	2	5	1	..	1	9	3	1
45	Pellagra	1	1	1	..	3	1	1
47	Diabete . . .	1	1	5	3	4	13	1	2	1	6
138	Alcolismo cronico . . .	1	2	1	..	1	1	1
48 a 58	Tumori maligni . . .	22	13	60	64	59	74	11	12	27	104	27	7
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale . . .	16	5	8	18	15	20	3	5	4	18	4	6
157	Morte violenta { per omicidio	3	..	1	1
160 a 168	Morte violenta { per suicidio . . .	2	3	3	6	3	9	1	1	1	6
	Altre malattie . . .	57	14	57	82	80	207	46	7	98	172	33	21
	Causa ignota o non dichiarata	3	5	1	..	1
	TOTALE GENERALE . . .	468	444	798	988	1 163	1 810	332	307	609	1 381	345	198

(a) Si veggia la nota a pag. 56.

Num. dell'Elenco nosologico	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	RAVENNA	FABENZA	LUGO	REGGIO NELL'EMILIA	GUASTALLA	AREZZO	CORTONA	F. RENZE	PISTOIA	ROCCA SAN CASCIANO	SAN MINIATO	EMPOLI	PRATO IN TOSCANA	GROSSETO	LIVORNO	Num. dell'Elenco nosologico
1 a 5	4	1	1	2	..	11	3	2	1	18	9	..	2	1	6	1	2	1 a 5
6	55	11	107	30	37	147	10	75	40	206	103	7	33	22	75	21	86	6
39 e 40	17	2	4	5	5	49	3	14	2	20	8	5	5	15	39 e 40
44	70	11	42	36	21	139	6	86	65	342	84	5	44	35	55	11	118	44
97	4	2	29	7	11	20	12	17	2	42	6	..	1	1	11	7	33	97
104	101	9	132	53	47	197	24	136	110	240	171	7	33	31	107	29	234	104
20	20
99	13	3	12	3	..	8	1	13	4	57	14	..	2	1	5	1	15	99
112	28	4	20	25	11	35	6	20	11	178	19	1	5	13	17	10	39	112
110	3	1	3	2	..	1	..	6	2	1	1	1	110
110-a	13	1	7	3	2	9	2	4	5	41	13	2	5	6	10	2	6	110-a
7	7
8	34	..	3	..	11	14	..	13	2	27	37	14	12	19	8
9	3	..	1	..	4	3	..	1	..	3	2	2	..	4	9
10	2	1	3	1	2	6	1	1	1	22	6	..	4	3	1	1	1	10
11	23	1	15	8	12	20	4	10	15	78	23	..	21	23	24	10	31	11
12	12
13	13
16	13	1	18	16	3	13	2	5	6	34	6	1	16	13	14	10	15	16
14	5	1	8	2	4	3	..	4	..	20	2	..	1	1	4	..	2	14
15	5	..	3	2	1	7	8	2	4	..	5	15
18 e 19	2	..	7	..	2	4	5	3	4	12	7	..	1	..	6	4	12	18 e 19
17	2	..	7	..	2	4	5	3	4	12	7	..	1	..	6	4	12	17
22	20	2	11	..	7	..	27	1	1	1	7	22
71	2	1	2	2	1	3	3	1	3	1	71
24	1	2	1	1	1	..	1	24
27	1	2	1	1	1	27
124	4	2	4	1	1	2	..	1	..	8	5	1	..	1	1	124
121 a 123, 125, 126	4	3	3	1	2	3	9	1	..	3	1	2	3	2	121 a 123, 125, 126
77	38	1	48	38	28	96	14	66	56	117	36	15	10	6	23	17	106	77
78	10	1	11	5	7	13	3	12	13	51	14	..	3	2	10	2	24	78
81	56	12	64	49	20	57	10	50	11	282	74	7	18	35	35	27	105	81
82	119	10	65	62	32	113	19	50	21	494	103	4	41	31	75	28	169	82
79	7	..	2	2	2	5	4	4	1	45	7	..	1	..	3	2	16	79
29 e 31	147	7	81	57	37	110	20	78	54	648	122	11	33	40	84	33	215	29 e 31
30, 32 a 37	43	4	18	13	11	53	10	17	3	180	33	7	14	13	31	7	64	30, 32 a 37
90	96	9	95	63	67	150	25	84	39	369	137	8	52	42	88	20	222	90
87	30	4	29	15	5	26	8	25	2	206	24	1	2	9	26	3	92	87
64	81	9	78	57	44	113	15	77	51	353	72	8	41	36	75	13	90	64
59	7	2	8	3	1	33	9	14	2	49	26	2	4	6	17	3	40	59
63	2	2	2	4	..	2	2	5	2	1	..	1	63
72	14	1	20	12	3	20	3	12	4	54	19	..	4	11	5	3	36	72
134	3	2	4	..	2	1	14	5	..	1	1	1	1	4	134
45	21	1	1	..	2	7	6	1	45
47	4	..	2	2	2	2	..	5	1	28	5	1	1	1	2	1	9	47
138	3	3	..	2	..	7	2	1	138
48 a 58	68	11	96	73	46	74	13	33	38	335	60	6	13	23	67	18	119	48 a 58
140 a 156	17	3	20	9	2	25	3	13	13	59	23	2	4	8	8	8	3	

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE													PEDIMONTE D'ALIFE	SORA	AVERSA	MADDALONI	S. MARIA CAPUA VETERE	SESSA AURUNCA	NAPOLI	CASORIA	CASTELLANMARE DI STABIA	POZZUOLI	AFRAGOLA	SAN GIOVANNI A TEDIUCCIO
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1	..	2	5	37	..	2	2	2	3												
6	Atrofia congenita, immaturità	4	13	9	32	5	19	349	14	33	27	7	11												
39 e 40	Anemia, leucemia	2	4	67	7	2	19	256	3	10	16	8	6												
44	Marasmo senile	10	16	52	38	45	41	1 431	30	77	42	24	39												
97	Malattie dello stomaco, atrepsia.	1	8	2	17	4	13	241	4	6	15	5	6												
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	8	89	223	67	86	32	2 098	139	178	106	129	144												
20	Dissenteria												
99	Epatite, cirrosi epatica	3	..	4	2	7	3	170	3	9	5	..	2												
112	Malattie dei reni	..	10	21	17	17	11	933	11	43	15	11	24												
110	Appendicite	1	1	2	..	26	..	3												
110-α	Peritonite	2	1	1	1	91	..	7	4	4	1												
7	Vainolo	162	..	7	3	294	2	3	21												
8	Morbillo	..	19	31	..	1	3	102	9	5	..												
9	Scarlattina	1	1	5	..	1												
10	Risipola	1	..	2	1	1	..	14	1	4	2												
11	Febbre tifoidea	..	8	3	1	..	3	81	1	1	7	..	5												
12	Tifo petecchiale												
13	Meningite cerebro spinale epidemica												
16	Ipertosse	..	1	1	3	15	2	4												
14	Difterite	..	1	1	3	1	..	10	1	1												
15	Laringite crupale	..	2	1	1	92	2	1	1												
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	..	1	2	14	4	1												
17	Influenza	..	2	1	1	..	5	70	..	2	1	..	5												
22	Sifilide	..	1	1	1	2	..	204	2	3	3	2	3												
71	Tetano e trisma	1	3	1												
21	Pustola maligna, carbonchio	..	1	1	3	1	1												
27	Rabbia	2												
124	Febbre puerperale	1	1	11	1												
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	..	1	3	..	1	1	38	1	1												
77	Bronchite acuta	6	38	62	22	26	41	966	29	53	22	33	48												
78	Bronchite cronica	3	6	8	11	20	9	327	8	16	3	..	6												
81	Polmonite crupale	3	13	36	26	25	48	737	32	95	78	96	16												
82	Bronco polmonite acuta	8	23	101	39	23	37	1 659	37	79	51	68	67												
79	Malattie della pleura	1	2	2	3	4	3	112	1	5	1	7	6												
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	4	15	25	14	13	16	919	19	30	15	13	21												
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	2	5	16	22	5	7	378	8	40	7	17	24												
90	Malattie del cuore	21	56	69	36	65	51	1 467	37	75	39	71	43												
87	Malattie delle arterie	6	10	7	8	11	12	432	1	13	7	3	6												
64	Apoplessia e congestione cerebrale	9	26	63	23	37	40	898	16	48	24	33	34												
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	3	8	8	4	14	4	529	12	71	28	18	32												
63	Encefalite	..	1	2	11	..	1	..	1	2												
72	Eclampsia infantile	11	22	50	16	30	48	718	21	15	21	31	36												
134	Reumatismo articolare acuto	2	1	..	4	20	..	2	..	1	..												
45	Pellagra												
47	Diabete	1	1	4	..	3	1	43	..	5	2												
138	Alcolismo cronico	4												
48 a 58	Tumori maligni	2	4	15	10	14	11	463	3	22	12	4	6												
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale	1	5	2	3	4	7	234	3	10	6	..	6												
157	per omicidio	..	1	2	1	74	1												
160 a 168	per suicidio	..	1	1	..	1	..	94	..	3	2	..	1												
	Altre malattie	28	41	117	145	170	79	1 608	40	133	31	37	36												
	Causa ignota o non dichiarata	6	1	101	..	16												
	TOTALE GENERALE	140	464	1 185	574	652	597	18 374	496	1 118	595	629	669												

TORRE ANNUNZIATA	TORRE DEL GRECO	SALERNO	CAMPAGNA	SALA CONSILINA	VALLO DELLA LUCANIA	CAVA DEI TIRRENI	BARI BELLEPUGLIE	ALTAMURA	BARILETTA	ANDRIA	BISCEGLIE	BITONTO	CANOSA DI PUGLIA	CORATO	GIORDA DAL COLLE	GRAVINA IN PUGLIA (α)	Num. dell'Elenco nosologico
1	4	1	2	2	7	..	3	3	2	2	..	1	..	1	1 a 5
31	23	81	6	6	7	16	175	29	53	55	50	30	59	45	16	17	6
26	13	37	5	..	3	6	32	10	10	9	15	19	42	21	9	10	39 e 40
64	98	112	11	27	12	33	151	40	51	66	43	58	30	90	46	40	41
10	23	13	..	11	2	7	78	4	16	3	7	10	2	13	11	5	97
392	374	238	27	16	3	237	259	31	66	39	21	66	97	42	81	105	104
..	20
7	9	6	1	2	..	14	9	5	14	4	7	9	3	15	5	6	99
14	30	18	4	1	..	14	59	25	18	36	15	23	11	49	12	13	112
1	1	2	..	1	1	..	1	2	..	110
7	8	8	8	1	..	9	9	5	6	3	1	2	1	15	9	..	110-α
13	276	1	..	7	6	1	7
1	1	76	289	..	15	4	10	..	15	..	216	8
..	1	1	14	1	9
3	1	5	1	1	7	2	2	1	1	3	3	2	..	1	10
2	10	7	..	1	4	9	15	4	..	2	4	5	4	5	2	18	11
..	12
..	13
4	..	1	1	5	..	1	14	20	5	2	9	16
..	2	1	1	2	1	..	14
1	4	7	1	6	..	3	3	3	1	4	10	15
..	1	5	4	2	1	2	3	17	4	2	3	7	2	1	18 e 19
1	5	12	1	2	3	6	9	1	1	3	3	..	5	2	17
7	4	2	..	1	15	2	..	1	1	4	2	2	1	3	22
..	1	71
..	24
..	27
..	2	2	1	1	..	1	..	124
..	..	4	1	3	1	1	3	2	3	..	2	..	121 a 123, 125, 126
101	42	45	23	6	13	102	243	123	181	123	118	168	91	324	71	138	77
8	9	19	1	1	..	45	70	10	42	31	30	55	5	59	14	13	78
51	43	40	6	6	4	49	79	106	45	163	53	29	30	25	42	15	81
106	75	104	11	6	19	39	250	27	87	139	88	93	38	92	53	17	82
4	6	6	2	4	5	2	4	38	4	2	1	10	2	2	79
33	27	47	11	7	5	28	117	36	27	42	22	11	12	15	16	13	29 e 31
33	12	19	3	..	2	15	138	31	31	32	20	16	12	41	4	16	30, 32 a 37
52	75	85	11	21	14	71	146	49	79	97	52	75	32	56	61	19	90
15	9	16	24	..	3	4	18	3	9	3	2	3	1	9	4	2	87
28	49	55	7	6	3	40	71	20	33	61	36	40	38	46	29	22	64
37	48	20	..	3	3	42	99	8	10	8	9	..	28	22	12	16	59
..	..	2	3	1	3	1	4	1	1	1	..	63
46	37	45	10	10	2	17	181	11	34	408	29	42	16	32	30	25	72
1	2	1	..	1	2	1	3	6	1	2	1	1	1	..	134
..	45
..	2	3	12	1	4	2	1	1	..	1	47
..	1	138
9	21	19	2	1	4	8	54	19	12	28	17	12	10	13	13	5	48 a 58
15	10	12	3	4	4	10	32	9	14	15	5	9	4	18	6	7	140 a 156
2	1	2	2	3	2	4	4	1	..	1	157
2	..	3	..	2	1	1	13	1	2	2	1	..	1	6	1	..	160 a 168
91	64	145	10	5	8	77	148	50	42	102	38	59	19	39	46	46	..
1	..	1	26	2	..	3	3	..	1
1 228	1 416	1 243	197	153	130	919											

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	MOLFETTA	MONOPOLI	RUVO DI PUGLIA	TERLIZZI	TRANI	FOGGIA	BOVINO	SAN SEVERO	CERIGNOLA	MONTES. AN- GELO	SAN MARCO IN LAMIS (c)	LECCE
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	3	1	3	4	1	2	2	7	4	2
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	30	6	22	23	44	96	14	32	47	39	13	28
39 e 40	Anemia, leucemia	7	19	9	10	9	21	16	10	68	18	4	12
44	Marasmo senile	68	48	37	69	52	75	13	40	43	55	18	65
97	Malattie dello stomaco, atropsia . . .	10	3	20	..	2	8	..	3	5	1	..	21
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ul- cera intestinale, ecc.	55	62	43	7	38	91	3	117	129	51	13	95
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica	12	5	5	1	6	9	1	6	9	4	3	4
112	Malattie dei reni	25	16	35	33	23	14	4	7	18	20	17	24
110	Appendicite	1	..	1	..	1	2	1	1	1
110-a	Peritonite	3	1	3	7	5	..	1	1	5	..	1	5
7	Vaiuolo
8	Morbillo	14	4	..	3	3	1
9	Scarlattina	1	1
10	Risipola	16	..	1	..	3	2	..	2	..	3	..	3
11	Febbre tifoidea	10	9	4	4	21	13	3	18	3	10	4	7
12	Tifo petecchiale	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica
16	Ipertosse	12	1	1	17	1	1	1	2	6	..	17	..
14	Difterite	2	1	..	1	1	1	5	1
15	Laringite crupale	1	..	5	..	3	5	3	9	4	1	2	3
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	2	1	2	..	1	29	8	9	12	3	14	10
17	Influenza	3	8	..	3	33	3	5	5	7	5	2	12
22	Sifilide	5	1	2	3	6	7	..	1	1	..	1	8
71	Tetano e trisma	1
24	Pustola maligna, carbonchio	2	2	..
27	Rabbia
121	Febbre puerperale	4	1	1	..	1	1	2	..
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1	1	1	2	4	1	..	2	2	3	3
77	Bronchite acuta	151	70	65	92	73	98	38	13	203	76	29	26
78	Bronchite cronica	30	13	23	18	19	38	..	21	19	12	6	24
81	Polmonite crupale	87	15	15	82	19	65	11	42	75	13	47	16
82	Bronco polmonite acuta	83	10	54	21	51	71	2	108	99	19	20	37
79	Malattie della pleura	3	1	1	8	4	11	2	2	8	..	2	..
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare .	49	20	11	23	45	44	9	63	30	13	18	61
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	9	5	27	35	17	33	15	7	22	27	17	33
90	Malattie del cuore	59	32	43	38	57	89	18	42	53	41	34	60
87	Malattie delle arterie	3	9	8	10	8	1	4	4	2	11	4
64	Apoplessia e congestione cerebrale .	41	33	26	31	30	39	7	42	48	16	33	45
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	20	..	21	18	4	22	6	7	41	10	45	13
63	Encefalite	1	..	2	4
72	Eclampsia infantile	16	16	23	30	41	174	2	46	111	15	24	8
134	Reumatismo articolare acuto	2	2	1	1	2	2
45	Pellagra
47	Diabete	1	1	2	1	..	2	1
138	Alcoolismo cronico	1	1
48 a 58	Tumori maligni	17	13	10	11	14	21	..	8	16	5	2	23
140 a 156	Morte { per causa accidentale	11	4	7	4	10	19	2	8	10	10	8	7
157	{ per omicidio	1	..	2	..	3	2	3	4	2	1
160 a 168	{ per suicidio	2	1	2	4	..	1	1	1	1	1
	Altre malattie	45	30	68	35	67	82	9	34	64	49	24	64
	Causa ignota o non dichiarata	3	3
	TOTALE GENERALE	918	457	603	649	692	1 255	196	719	1 176	539*	443	743

BRINDISI	GALLIPOLI	TARANTO	FRANCAVILLA FONTANA	MARTINA FRAN- CA	OSTUNI	POTENZA	LAGONERRO	MATERA	MERLI	AVIGLIANO (c)	CATANZARO	COTRONE	MONTREONE DI CALABRIA	NICASTRO	COSENZA	CASTROVILLARI	Num. dell'Elenco nosologico
1	..	3	8	1	..	1	1	3	1	2	1 a 5
20	5	71	15	..	14	11	5	10	22	43	72	21	27	35	29	7	6
10	4	23	36	20	21	6	..	12	5	4	9	4	16	3	14	5	39 e 40
27	24	83	61	30	41	20	15	27	23	23	83	16	20	24	57	13	44
11	..	37	7	3	7	1	..	6	5	3	4	4	1	25	9	..	97
107	16	265	32	93	61	58	11	228	59	57	170	47	45	63	94	35	104
..	20
6	3	9	8	2	3	..	2	3	3	2	7	5	7	5	2	2	99
14	5	27	8	13	6	9	1	9	7	15	18	10	6	11	15	3	112
..	..	2	..	1	1	1	2	110
6	2	4	..	4	2	1	..	4	1	2	2	1	1	4	3	1	110-a
..	..	16	34	2	7
..	1	4	..	51	1	..	11	1	..	5	10	..	8
..	3	4	1	1	1	20	..	9
11	..	12	1	7	9	1	1	4	..	2	8	3	3	5	10	1	10
..	11
..	12
4	..	20	2	2	1	3	3	..	8	5	..	13
..	..	5	..	3	..	4	3	1	..	2	1	..	14
..	..	7	..	1	..	1	..	1	1	..	5	3	1	1	1	1	15
28	5	38	3	2	..	3	..	4	10	12	2	6	5	6	18 e 19
5	2	23	14	5	3	1	..	2	8	..	5	5	5	..	9	1	17
7	..	6	1	1	..	1	1	..	15	3	5	18	11	1	22
..	..	1	2	71
..	..	1	1	1	2	..	24
..	27
1	..	2	1	..	2	2	2	1	2	1	124
2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	..	1	2	2	..	121 a 123, 125, 126
31	14	123	131	36	51	29	8	112	38	9	97	17	20	41	40	11	77
22	..	16	17	18	8	10	..	13	3	..	24	5	2	10	9	9	78
50	12	62	17	15	17	12	6	34	15	8	42	17	13	17	37	4	81
30	3	93	14	20	22	16	..	38	13	26	33	36	10	53	57	11	82
3	..	4	2	2	1	1	..	3	2	1	1	..	1	..	1	..	79
44	11	109	14	31	37	12	5	11	8	7	30	7	11	16	34	6	29 e 31
14	16	54	16	6	16	5	1	14	12	3	14	3	10	3	13	1	30, 32 a 37
33	19	105	37	37	44	27	13	41	37	19	75	18	25	32	40	16	90
9	1	7	6	4	1	8	2	2	2	1	11	4	2	5	5	2	87
23	16	45	27	37	45	10	5	21	11	19	40	5	10	18	27	7	61
41	1	41	10	8	9	3	..	12	..	3	11	5	2	4	8	1	59
..	1	1	1	1	..	2	1	..	1	..	63
19	14	25	4	7	9	10	3	8	7	8	87	11	9	30	46	1	72
..	1	2	..	1	1	..	6	1	..	1	4	1	134
1	45
..	..	2	1	1	7	..	1	2	..	2	47
1	1	1	..	138
7	6	29	9	7	18	1	..	6	10	4	21	2	9	9	13	5	48 a 58
13	5	12	4	6	6	9	..	2	6	5	6	5	4	3	6	5	140 a 156
4	..	4	..	1	2	1	1	1	2	1	1	..	157
1	..	3	1	1	..	1	2	1	6	3	..	159 a 163
34	10	111	23	43	31	19	4	21	16	25	99	16	38	52	40	10	..
5	..	15	2	7	33	1	7
648	199	1 528	522	473	505	302	84	706	338								

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PALERMO	CEPALÙ	CORLEONE	TERMINI IMERSE	MONREALE	PARTINICO	SIRACUSA	MODICA	NOTO	COMISO	RAGUSA	VITTORIA	TRAPANI
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	18	2	1	1	1	2	1	2	2	5	
6	Atrofia congenita, immaturità	421	5	19	16	21	18	49	84	33	37	40	43	37
39 e 40	Anemia, leucemia	283	4	..	16	16	7	46	52	22	15	6	31	26
44	Marasmo senile	689	33	27	39	81	61	47	68	33	49	33	35	88
97	Malattie dello stomaco, atropsia	183	2	4	..	1	2	12	41	14	35	51	48	13
101	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 685	20	17	44	139	54	118	108	90	82	203	96	169
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica	58	3	4	6	1	5	5	18	4	4	5	8	7
112	Malattie dei reni	246	2	9	16	15	11	26	18	28	9	11	27	39
110	Appendicite	8	1	..	1	1	2	3	1	..
110-a	Peritonite	75	1	4	4	5	3	5	4	2	2	6	5	6
7	Vainolo	1 711	..	1	4	135	6
8	Morbillo	8	1	2	1	2	2	7	3	2	82	..
9	Scarlattina	132	21	23	29	26	73	9	..	61	29	40
10	Risipola	12	3	..	3	1	1	7	1	1	..	1	2	..
11	Febbre tifoidea	53	14	1	16	14	24	11	30	8	3	14	5	22
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica
16	Ipertosse	10	1	..	2	11	23	11	3	9	5	12
14	Difterite	10	3	1	..	1	2	1	..	2
15	Laringite crupale	8	2	1	2	..	4	2	1	2	..	4
13 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	12	1	3	1	2	13	21	31	33	8	19	5	17
27	Influenza	7	3	..	2	..	5	11	4	8	2	..	14	..
22	Sifilide	29	1	..	3	6	2	..	1	3	7	..
71	Tetano e trisma	4
24	Pustola maligna, carbonchio	2	2	..	1	1	..
27	Rabbia
121	Febbre puerperale	6	1	..	1	1	1	..	3	1	1
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	10	..	2	1	..	4	2	1	2	..	1	2	..
77	Bronchite acuta	450	12	49	18	49	13	69	107	23	80	30	66	78
78	Bronchite cronica	149	1	3	3	5	12	13	9	3	14	8	5	8
81	Polmonite crupale	501	12	31	24	15	61	39	44	57	16	32	72	54
82	Bronco polmonite acuta	263	7	13	20	16	14	24	56	18	11	22	82	31
79	Malattie della pleura	42	4	2	1	5	..	2	4	1	..	1	3	9
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	422	8	8	23	28	30	51	23	17	21	35	35	45
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	158	4	..	13	9	3	31	7	5	3	7	15	18
90	Malattie del cuore	644	16	25	30	18	20	40	61	28	24	58	39	73
87	Malattie delle arterie	50	4	..	10	3	3	3	4	2	4	6	5	5
64	Apoplessia e congestione cerebrale	377	7	10	25	17	21	41	21	18	14	30	43	69
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	419	1	7	7	12	10	5	1	1	..	1	11	53
63	Encefalite	7	1	2	..
72	Eclampsia infantile	69	3	1	5	7	20	1	6	11	10	3
134	Reumatismo articolare acuto	7	..	1	..	2	2	..	1	2	..	2
45	Pellagra	1
47	Diabete	30	2	1	1	5	2	1	2	2	3	3
138	Alcolismo cronico	4	1	2	..
48 a 58	Tumori maligni	192	5	5	4	12	12	18	22	6	11	14	13	31
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	80	7	5	15	7	8	7	7	10	7	3	8	11
157	per omicidio	42	..	6	3	3	5	1	..	3	..	2	1	6
160 a 163	per suicidio	36	2	4	2	5	2	2	..	1	1	7
	Altre malattie	1 120	48	13	23	60	51	68	136	21	43	143	37	144
	Causa ignota o non dichiarata	52	3	1	..	1	7
	TOTALE GENERALE	10 794	241	271	427	754	525	826	1 115	526	518	890	879	1 164

e in altri 83 Comuni (a) classificati secondo le principali cause di morte.

ALCAMO	MAZZARA DEL VALLO	CASTELVETRANO	MARSALA	MONTESANGLIANO	CAGLIARI	IGLESIAS	LANUSEI	ORISTANO	SASSARI	ALGHERO	NUORO	OZIERI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE dei morti nei 89 Comuni Capiluoghi di provincia	TOTALE dei morti nei 137 Comuni capiluoghi di circondario	TOTALE dei morti nei 17 Comuni capiluoghi di distretto aventi più di 20.000 abitanti	Num. dell'elenco nosologico
1	..	3	..	2	7	3	..	5	2	2	..	3	..	418	153	133	1 a 5
57	24	24	86	12	82	34	1	5	39	18	4	12	10	6 601	2 802	2 373	6
33	6	24	8	5	41	29	1	2	15	9	3	6	7	2 293	974	1 047	39 e 40
70	27	63	62	43	63	22	3	11	43	22	5	20	21	8 231	3 713	3 210	44
18	2	..	11	9	16	10	6	..	2	2	2	1 963	840	804	97
186	107	65	97	46	169	40	2	19	122	57	17	20	23	15 237	6 339	6 196	104
..	2	..	1	20
4	7	3	3	3	10	6	1	2	1	5	1 335	438	326	99
23	15	15	30	10	26	8	..	5	23	7	5	9	6	4 207	1 311	1 127	112
1	3	1	273	52	37	110
3	3	6	8	7	5	1	6	1	..	1	4	879	315	288	110-a
1	6	..	1	1	2 094	164	814	7
2	1	3	1	..	7	1	1	..	6	1 101	760	375	8
..	3	1	1	11	1	386	231	239	9
..	4	1	4	1	1	414	169	111	10
42	3	6	6	8	15	3	2	7	..	5	1	1 747	915	545	11
..	3	12
..	1	13
4	..	9	7	1	1	731	47	328	16
1	2	1	3	1	1	523	123	128	14
2	2	1	2	1	1	..	1	1	253	126	126	15
12	38	11	15	13	7	24	..	17	20	8	4	..	8	244	451	315	18 e 19
1	8	6	1	..	16	3	1	..	9	1	..	773	386	291	17
2	..	1	5	..	11	1	1	..	1	1 010	155	82	22
..	3	1	141	54	43	71
1	1	1	1	32	21	14	24
2	..	1	2	..	3	2	2	20	3	3	27
5	..	1	2	4	2	1	1	282	125	113	124
40	49	55	87	32	45	28	5	1	49	18	11	4	37	6 118	3 569	1 464	125, 126
11	2	5	4	2	12	10	2	3	15	3	2	1	4	1 612	735	776	77
64	21	38	36	9	56	60	3	24	66	39	8	11	19	6 874	2 880	2 271	78
54	23	7	43	5	72	38	1	12	40	3	5	4	9	9 953	3 423	3 074	81
3	1	2	..	3	7	3	4	2	1	1	..	897	217	229	82
17	13	10	51	25	116	22	5										

TAV. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno in età di non oltre 5 anni compiuti, classificati per sesso e per principali cause di morte.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	NUMERO DEI MORTI DI											
		non oltre 1 mese		oltre 1 a non oltre 12 mesi compiuti		oltre 1 anno a 2 compiuti		oltre 2 anni a 3 compiuti		oltre 3 anni a 4 compiuti		oltre 4 anni a 5 compiuti	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	63	58	15	15	1	2	..	2	1
6	Atrofia congenita, immaturità	1 562	1 440	274	270
39 e 40	Anemia, leucemia	191	236	48	93	14	16	6	4	3	4
97	Malattie dello stomaco, atresia	175	199	220	257	31	41	4	10	1	5	2	4
4	Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc.	314	320	1 096	1 021	345	394	69	98	35	23	9	16
20	Dissenteria	1
99	Epatite, cirrosi epatica	1	4	4	3	..	1	1
112	Malattie dei reni	10	11	19	36	26	28	13	14	10	5	8	5
110	Appendicite	1
110-α	Peritonite	1	2	8	1	5	3	1	1	2
7	Vaiuolo	1	..	15	16	13	12	3	4	5	4	2	3
8	Morbillo	33	35	60	65	24	36	11	17	3	4
9	Scarlattina	2	2	5	2	4	3	2	1	4	1
10	Risipola	16	9	20	23	2	2
11	Febbre tifoidea	4	3	6	8	6	6	4	2	4	2
16	Ipertosse	4	4	60	82	37	51	11	19	6	3	1	..
14	Difterite	6	5	12	4	2	9	4	3	1	1
15	Laringite crupale	4	5	10	3	7	4	4	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	1	17	19	10	16	5	5	3	2	2	2
17	Influenza	6	8	22	12	5	6	..	2	1	1	1	1
22	Sifilide	123	130	162	185	11	8	3	3	2
71	Tetano e trisma	1	1	..
21	Pustola maligna, carbonchio	1	..	1	2
77	Bronchite acuta	151	116	536	517	171	174	53	57	19	11	9	13
78	Bronchite cronica	12	14	7	1	2	1
81	Polmonite crupale	34	24	85	81	38	39	17	8	8	7	4	4
82	Bronco polmonite acuta	60	41	248	219	160	138	54	52	16	23	12	6
79	Malattie della pleura	1	3	3	3	..	3	1	1
29 e 31	Tubercolosi disseminate e polmonare	2	2	29	23	17	17	12	11	3	6	3	2
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	10	3	81	78	51	36	25	18	16	5	15	9
90	Malattie del cuore	4	1	7	5	11	12	1	2	3	..
87	Malattie delle arterie	8	5	4	3	1
61	Apoplessia e congestione cerebrale	1
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	9	2	75	69	27	26	11	12	6	13	9	9
63	Encefalite	1	..	3	3	..	1	1	1
72	Eclampsia infantile	120	100	254	217	65	67	26	18	15	3	11	4
131	Reumatismo articolare acuto	2	1	1
47	Diabete	1
48 a 58	Tumori maligni	1	1	1	1	..	1	1	..
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale	4	1	6	8	11	14	-8	16	5	7	5	2
157	Altre malattie { per infanticidio	2	3
	Causa ignota o non dichiarata	266	231	199	227	89	74	31	37	15	9	9	11
	TOTALE	2 949	2 728	8 719	8 694	1 290	1 362	417	475	204	159	123	108

(a) In questo elenco sono citate soltanto quelle cause che nell'anno 1911 produssero la morte di bambini illegittimi ed esposti in età di non oltre 5 anni compiuti.

TAV. VII. — Morti per cause violente accidentali classificati secondo il sesso, l'età e la causa della morte

ANNO 1911.

ANNO 1911.

CAUSE delle morti accidentali	Complesso			NUMERO DEI MORTI DI																			
				non oltre 1 anno		oltre 1 anno a 5 compiuti		oltre 5 anni a 15 compiuti		oltre 15 anni a 30 compiuti		oltre 30 anni a 40 compiuti		oltre 40 anni a 50 compiuti		oltre 50 anni a 60 compiuti		oltre 60 anni a 70 compiuti		oltre 70 anni		Età ignota	
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
In stato d'ubriachezza	68	62	6	4	1	..	1	7	..	10	..	15	1	8	2	15	..	2	1	1	..
Per annegamento	1 801	1 318	483	7	8	325	241	320	63	297	62	72	12	66	30	61	17	88	18	80	32	2	..
Per freddo	146	113	33	26	16	1	..	3	..	2	1	5	1	5	2	9	4	26	4	36	5
Per insolazione.	126	45	31	1	1	7	1	13	3	18	4	8	2	14	4	15	8	11	5	8	3
Per fulminazione:																							
a) naturale	247	186	61	4	1	21	5	51	21	26	11	30	11	31	4	17	7	6	1
b) da apparecchi elettrici	66	59	7	1	..	6	..	28	..	15	..	6	4	2	1	1	2
Per caduta	2 915	2 214	701	14	8	96	43	221	58	330	50	205	29	249	58	307	92	415	133	376	230	1	..
Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	361	312	49	2	3	14	10	59	18	138	11	39	2	21	2	24	..	11	2	2	1	2	..
Per ferite da armi da punta e taglio	29	17	12	2	2	1	4	4	3	4	3	3	2	..	1	..
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	90	82	8	1	10	2	41	2	10	..	12	1	6	..	3	2
Per schiacciamento	1 638	1 377	261	..	4	74	61	188	49	371	24	172	14	176	18	169	31	142	34	84	26	1	..
Per violenze di animali	154	135	19	3	2	7	3	11	6	21	1	9	..	21	2	24	1	24	1	15	3
Per ustione	2 771	1 139	1 632	41	59	747	724	110	355	52	65	32	37	20	43	27	38	31	66	78	243	1	2
Per soffocamento	169	97	72	38	32	27	27	9	10	7	2	4	..	4	..	4	..	2	..	2	1
Per asfissia	207	150	57	19	12	22	10	9	6	40	6	14	4	16	3	8	3	13	4	9	9
Per avvelenamenti acuti.	200	114	86	3	..	34	25	27	24	10	16	8	3	10	4	8	9	10	2	4	3
Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi.	12	10	2	2	..	4	..	1	..	1	1	1	2
Per cause diverse o non determi- nate.	88	63	25	..	4	6	3	5	..	14	1	2	..	13	5	11	5	5	1	7	6
TOTALE	11 088	7 543	3 545	154	149	1 373	1 153	1 017	604	1 432	269	636	118	678	188	718	215	814	281	712	565	9	3

TAV. VIII. — Morti per cause violente accidentali classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la causa della morte.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

MESI	COMPLESSO			IN STATO D'UBBRIACHEZZA		PER ANNEGAMENTO		PER FREDDO		PER INSOLAZIONE		PER FULMINAZIONE				PER CADUTA		PER LESIONI causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.		PER FERITE DA ARMI DA PUNTA E TAGLIO		PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali		PER SCHIACCIAMENTO		PER VIOLENZE di animali		PER USTIONE		PER SOFFOCAMENTO		PER ASPISSIA		PER AVVELENAMENTI ACUTI		PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi		PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMINATE	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	NATURALE		DA APPARECCHI ELETTRICI		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
												M.	F.	M.	F.																								
Gennaio	957	560	397	6	..	43	14	53	13	1	..	1	1	133	53	21	5	2	1	7	1	100	10	6	1	151	282	3	8	22	3	2	4	1	..	8	1
Febbraio	975	537	438	6	1	41	19	37	14	4	..	3	..	155	38	15	4	2	1	8	..	94	16	4	2	134	332	7	3	15	6	3	1	6	1
Marzo	810	495	315	7	2	62	26	7	4	1	..	5	..	148	55	20	3	1	1	5	..	89	16	5	1	121	184	6	10	10	6	3	6	5	1
Aprile	762	505	257	5	..	74	47	3	1	1	..	2	..	151	49	19	2	2	..	9	..	127	16	6	..	79	127	9	6	7	5	5	2	2	1	4	1
Maggio	750	522	228	8	..	111	62	3	..	12	3	2	..	158	51	19	1	5	..	109	25	5	..	67	67	5	6	9	4	5	8	1	..	3	1
Giugno	901	645	256	2	..	162	61	9	2	13	8	5	1	220	83	18	2	1	..	5	..	101	17	13	..	64	61	7	2	11	6	10	8	2	..	2	2
Luglio	1 197	911	286	3	1	280	57	45	14	49	14	9	2	223	71	23	6	3	2	14	..	115	32	23	..	77	68	12	7	11	6	10	5	2	..	7	1
Agosto	1 174	898	276	4	1	223	48	29	10	61	23	9	..	232	63	23	3	1	2	4	5	131	28	25	2	79	65	14	7	12	3	12	9	1	1	8	6
Settembre	972	697	275	6	..	104	61	2	..	9	5	33	12	4	..	239	69	44	9	1	2	9	..	123	18	10	7	73	63	8	10	10	5	10	5	1	..	6	4
Ottobre	967	689	278	7	..	99	36	1	4	1	11	1	210	65	42	4	2	1	5	1	141	43	20	1	82	91	11	5	15	3	32	24	7	2
Novembre	762	537	225	2	1	70	33	3	6	..	6	..	174	51	24	4	1	1	7	1	114	18	12	1	92	100	7	4	5	2	9	7	5	2
Dicembre	861	547	314	6	..	46	19	7	1	1	..	2	2	171	53	39	6	1	1	4	..	98	22	6	4	120	184	8	4	23	8	13	7	2	3
ANNO	11 088	7 548	3 545	62	6	1 318	483	113	33	95	31	186	61	59	7	2 214	701	72	49	17	12	82	8	1 377	261	135	19	1 139	1 632	97	72	150	57	114	86	10	2	68	25

TAV. IX. — Maschi morti per cause violente accidentali, in età di oltre 15 anni, classificati secondo la condizione o professione e secondo la causa della morte.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

PROFESSIONI	TOTALE dei maschi da 15 anni in su morti per cause violente	IN STATO D'URBRIACHEZZA	PER ANNEGAMENTO	PER FREDDO	PER INSOLAZIONE	PER FULMINAZIONE		PER SIONI usate da coppia di coltelli, armi da fuoco, ecc.	PER FERITE DA ARMI DA PUNTA E TAGLIO	PER LESIONI da macchine agrarie ed industriali	PER SCHIACCIAMENTO	PER VIOLENZE di animali	PER USTIONE	PER SOFFOCAMENTO	PER ASPISSIA	PER AVVELENAMENTI ACUTI	PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi	PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMINATE
						NATURALE	DA APPARECCHI ELETTRICI											
Agricoltori, boscaioli, carbonai	1 847	21	216	27	37	98	4	90	5	16	288	70	98	10	29	20	3	20
Braccianti, manovali, cantonieri, selciatori	471	8	50	7	6	9	3	16	1	5	146	5	27	4	8	4	..	5
Pastori e mandriani	66	..	8	3	1	12	1	6	5	2	5	..	3	1
Minatori, marmisti, cavatori, solfatai	141	..	4	1	..	2	1	16	79	..	10	2	8	1
Fabbi, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai, stagnini	157	1	21	5	..	3	15	9	..	12	31	..	10	..	3
Macchinisti e fuochisti	37	..	3	2	..	4	16	..	4
Fornaciai, vasai, cementisti	21	..	1	3	2	8	3
Vetrai	4	..	2	1
Muratori, scalpellini, pittori di stanze, imbianchini. Falegnami, verniciatori, carrozzai, sediai, calafati, carpentieri, segatori di legna	317	2	26	4	2	3	4	12	61	1	10	..	6	2	..	2
Impagliatori	3	3
Tappezzieri e materassai	4	..	1	..	1	1
Cartai	1	..	1
Tipografi, legatori, litografi	11	..	5	2	1
Filatori, tessitori, tintori, cardatori, cordai	39	..	10	1	..	1	5
Conciatori	5	..	2	1
Calzolai, sellai, pellettieri, valigiai	75	3	13	3	8	..	1	10	2	3	1	3	4	..	2
Sarti	26	2	7	1	..	2	1	..	4	..	1	..	1	1
Cappellai	4	..	1	1
Barbieri	10	..	2	..	1	1	1
Mugnai, pastai, fornai, panettieri	55	1	13	2	1	2	..	4	11	..	2	..	4
Orologiai e gioiellieri	2	1	1
Caffettieri e pasticciari	11	..	1	1	1	1
Trattori, vinai, osti, liquoristi	10	..	2	1	1	1	1
Camerieri d'esercizi pubblici	15	..	5	..	2	2
Lattai e casari	10	..	3	..	1	1	..	2	..	1
Macellai e pizzicagnoli	22	1	1	1	1	..	4	1	..	1	2	..	1	..
Fabbricanti e operai non specificati	206	1	23	2	2	4	12	8	2	12	51	2	13	1	12	3
Marinai, pescatori, barcaiuoli, palombari, capitani marittimi	76	..	33	2	..	2	1	6	8	1
Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulattieri	229	7	14	1	1	2	..	2	1	..	93	20	7	1
Ferrovieri e tramvieri	103	..	1	..	1	..	1	1	..	1	87	1
Fattorini postali e telegrafici	15	..	4	1	1	1	..	1	4	..	1
Droghieri e farmacisti	6	2	..	1	..	1
Negozianti, sensali, agenti di cambio, impresari. Commessi e ragionieri	83	1	11	..	2	2	..	4	1	2	15	2	3	1
Fruttivendoli, pescivendoli, venditori ambulanti. Domestici, uscieri, sagrestani, cuochi e portieri. Pacchini, lavandai, spazzini, crivellatori, spaccalagna	9	..	2	1	2
Impiegati pubblici e privati, pensionati civili	37	1	8	8	..	1	..	1
Corpi armati (escluso l'esercito)	42	..	7	..	2	3	..	2	6	..	1	..	1	2
Militari e pensionati militari	70	2	8	..	3	1	..	2	19	..	1	1	1	1	..	1
Maestri e professori	66	..	11	1	1	1	..	2	17	..	4	4
Sacerdoti e monaci	26	..	7	3	5	1	1	..	1
Medici	77	..	20	..	1	..	3	10	..	2	10	6	2	2
Infermieri	12	..	4	1	..	1
Avvocati, notai, uscieri giudiziari	19	..	2	2	..	1	..	1	1
Ingegneri e agrimensori	3	1	1
Proprietari e benestanti	6	..	3	1	..	1
Studenti	7	..	2	1	1	1	..	1	1
Médecanti e ricoverati	135	..	15	2	..	4	1	9	..	1	22	4	4	1	5	2	..	3
Altre professioni o professioni ignote	27	..	13	..	1	3	5	1
TOTALE	34	1	6	7	1	1	4	2	1	1	1	..	1
TOTALE	236	1	53	9	3	10	..	17	2	2	42	1	15	..	5	2	..	1
TOTALE	4 999	58	666	83	74	161	52	1 237	14	72	1 115	114	241	23	100	50	4	52

TAV. X. — Suicidi classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

		REGNO		PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE		BASILICATA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		
Totale		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Mesi	Gennaio	179	126	53	21	9	12	4	33	7	19	3	6	3	11	5	3	2	..	1	3	1	1	1	3	2	2	1	2	1	1	7	7	..	2	
	Febbraio	166	119	47	23	4	12	3	20	6	11	5	12	9	7	7	1	6	1	4	1	9	4	1	3	1	..	2	1	9	3	1	..
	Marzo	269	198	71	28	10	14	2	28	9	20	12	16	6	16	8	8	2	2	1	10	5	6	4	14	5	9	..	1	1	3	..	16	5	7	1
	Aprile	255	180	75	28	10	15	6	26	13	19	6	15	6	18	11	3	3	3	..	8	2	3	2	13	3	8	5	1	2	5	1	11	5	4	..
	Maggio	274	193	81	33	12	17	4	26	11	16	7	22	11	17	7	2	1	5	1	6	5	5	1	11	5	8	5	1	2	2	1	17	6	5	2
	Giugno	282	203	79	39	13	12	7	33	17	26	5	16	11	18	6	5	..	5	1	8	4	8	..	8	4	6	2	3	1	4	..	11	7	1	1
	Luglio	314	225	89	36	13	13	10	24	8	25	7	19	10	16	3	6	2	7	3	17	5	4	..	20	6	7	9	2	..	2	..	25	10	2	3
	Agosto	249	171	78	33	9	13	6	20	7	18	8	13	8	14	5	4	..	5	1	13	4	..	6	13	7	7	1	3	1	3	..	9	13	3	2
	Settembre	232	162	70	20	10	5	2	32	14	14	7	15	5	16	6	9	4	3	..	13	3	3	2	8	6	7	1	1	1	1	2	11	5	4	2
	Ottobre	201	140	61	19	8	19	2	23	13	14	6	12	7	15	5	2	1	3	..	6	6	..	2	9	5	5	2	2	8	3	3	1
	Novembre	158	103	55	16	9	6	1	18	11	8	4	13	6	15	6	3	2	2	..	3	4	1	1	8	5	1	2	..	1	7	3	2	..
	Dicembre	175	119	56	17	5	5	2	27	8	13	5	10	5	8	3	5	3	3	1	9	4	2	3	9	7	2	2	2	4	8	3	..
Mezzi di uccisione	Per annegamento	496	279	217	50	35	7	41	32	31	20	44	31	13	15	6	7	6	..	24	10	9	8	7	16	20	15	3	1	1	1	11	17	6	5	
	Con arma da fuoco	743	705	38	95	2	59	3	112	7	61	2	39	5	69	..	20	1	11	1	42	3	13	1	60	2	23	..	2	1	10	1	79	9	10	..
	Con arma da taglio	81	71	10	10	2	3	..	12	1	11	2	5	1	9	3	2	..	1	..	3	..	2	1	5	..	3	..	1	..	2	..	1	..	1	..
	Per impiccamento	513	379	134	77	27	19	4	61	18	53	14	40	20	35	15	11	2	10	4	10	2	9	6	11	2	6	1	6	3	2	..	20	13	10	3
	Per precipitazione	292	185	107	30	7	26	17	22	17	19	6	16	11	18	11	8	3	4	..	8	16	3	2	16	9	3	2	4	1	2	2	3	3	3	..
	Per schiacciamento	101	89	12	20	5	6	1	33	1	10	2	11	1	1	..	3	..	1	1	2	..	1	1	1
Per avvelenamento	430	166	264	18	29	13	14	19	48	11	23	9	15	19	21	..	5	2	4	11	13	1	4	26	31	6	16	2	5	6	2	17	28	16	6	
Per asfissia	82	55	27	13	4	10	6	10	..	4	5	5	4	7	6	1	1	2	1	1	
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	16	10	6	..	1	3	1	1	..	2	1	1	..	1	1	1	3	
TOTALE		2 754	1 939	815	313	112	143	49	310	124	203	75	169	87	171	72	51	20	38	9	102	44	37	23	128	60	63	34	18	11	23	6	185	75	85	14

TAV. XI. — Suicidi classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

E T À	COMPLESSO			PER ANNEGAMENTO		CON ARMA DA FUOCO		CON ARMA DA TAGLIO		PER IMPICCAMENTO		PER PRECIPITAZIONE		PER SCHIACCIAMENTO		PER AVVELLENAMENTO		PER ASPISSIA		CON ALTRO MEZZO O CON MEZZO NON DETERMINATO	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Non oltre 15 anni compiuti	29	20	9	4	2	4	10	2	2	4	..	1
Oltre 15 anni a 20 compiuti.	244	132	112	8	17	53	11	3	..	26	5	9	15	9	1	22	60	2	3
» 20 » 25 »	414	257	157	23	34	157	12	4	1	15	12	17	13	11	5	27	76	3	4
» 25 » 30 »	310	196	114	21	26	95	9	8	2	23	15	11	11	10	4	19	43	9	4
» 30 » 40 »	393	279	114	28	29	121	3	12	3	44	20	24	13	13	1	26	37	10	4	1	4
» 40 » 50 »	390	290	100	41	29	92	1	14	2	60	28	31	17	17	1	25	17	7	4	..	1
» 50 » 60 »	412	313	99	54	35	85	1	13	..	84	29	29	12	15	..	22	18	9	4	2	..
» 60 » 70 »	317	246	71	51	29	64	..	9	1	56	17	27	14	10	..	16	6	11	3	2	1
» 70 » 80 »	179	143	31	34	12	20	..	4	1	46	5	28	10	4	..	6	3	4	..	2	..
» 80 anni compiuti	43	36	7	10	4	3	..	3	..	12	1	7	2	1
Età ignota	23	22	1	2	..	11	1	1	..	3	..	2	3	..
TOTALE	2 754	1 989	815	279	217	705	38	71	10	379	134	185	107	89	12	166	264	55	27	10	6

TAV. XII. — Suicidi classificati secondo lo stato civile, il sesso ed i mezzi o modi di uccisione.

ANNO 1911.

ANNO 1911.

MEZZI DI UCCISIONE	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femm.
Per annegamento	496	279	217	167	88	79	242	143	99	76	37	39	11	11	..
Con arma da fuoco	743	705	38	424	397	27	242	231	11	42	42	..	35	35	..
Con arma da taglio	81	71	10	27	27	..	45	36	9	4	3	1	5	5	..
Per impiccamento	513	379	134	162	122	40	250	184	66	86	58	28	15	15	..
Per precipitazione	292	185	107	116	71	45	119	77	42	51	32	19	6	5	1
Per sobriacciamento	101	89	12	48	39	9	37	34	3	13	13	..	3	3	..
Per avvelenamento	430	166	264	259	86	173	139	67	72	27	10	17	5	3	2
Per asfissia	82	55	27	38	23	15	26	20	6	18	12	6
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	16	10	6	5	3	2	6	3	3	3	2	1	2	2	..
TOTALE	2 754	1 939	815	1 246	856	390	1 106	795	311	320	209	111	82	79	3

**TAV. XIII. — Suicidi in età di oltre 15 anni compiuti, classificati per sesso
e secondo la condizione o professione (a).**

ANNO 1911.

ANNO 1911.

PROFESSIONI	SUICIDI	PROFESSIONI	SUICIDI
-------------	---------	-------------	---------

Maschi.

Agricoltori e carbonai	392	Macellai, pizzicagnoli, trippaioli	29
Braccianti, manovali, cantonieri, selciatori	77	Fabbricanti e operai non specificati	36
Pastori e mandriani	6	Marinai, pescatori, capitani marittimi	16
Minatori, marmisti, solfatai	8	Cocchieri, stallieri, carrettieri, mulattieri	30
Fabbri, meccanici, elettricisti, arrotini, maniscalchi, calderai; stagnini	75	Ferrovieri e tranvieri	20
Macchinisti	2	Fattorini postali e telegrafici	13
Fornaciai e vasai	7	Droghieri e farmacisti	9
Vetrai	4	Negozianti, albergatori, sensali, spedizionieri, agenti di cambio, chiucaglieri, impresari.	127
Muratori, scalpellini, fumisti, pittori di stanze.	71	Commessi e ragionieri	30
Falegnami, verniciatori, ebanisti, sediai, carpentieri, segatori di legno.	47	Fruttivendoli, friggitori, venditori ambulanti.	23
Cestai	4	Domestici, uscieri, cuochi, portieri	25
Tappezzieri e materassai	4	Facchini, lavandai, spazzini, crivellatori, lampionai	16
Cartai	3	Impiegati pubblici e privati, pensionati civili	134
Tipografi, legatori, litografi	9	Corpi armati (escluso l'esercito)	16
Filatori, tessitori, tintori	11	Militari e pensionati militari	83
Conciatori	2	Maestri e professori	9
Calzolai, sellai, pellettieri	60	Sacerdoti	4
Sarti	19	Medici e veterinari	16
Cappellai	4	Infermieri	4
Barbieri	21	Avvocati, notai, uscieri giudiziari	15
Mugnai, pastaï, fornai, panettieri	28	Ingegneri, agrimensori, architetti	8
Orefici, orologiai, gioiellieri	13	Proprietari e benestanti	132
Caffettieri e pasticciieri	13	Studenti	38
Trattori, osti, liquoristi	14	Mendicanti e ricoverati	11
Camerieri di esercizi pubblici	20	Altre professioni o professioni ignote	158
Lattai e casari	6	TOTALE	1 919

Femmine.

Contadine	116	Agiate	53
Braccianti	16	Maestre	6
Filatrici e tessitrici	18	Impiegate e pensionate	7
Sarte, modiste, cucitrici, orlatrici	57	Levatrici	5
Stiratrici	5	Studentesse	5
Operai in genere	27	Artiste di teatro	2
Merciaie e commercianti	14	Prostitute	1
Cameriere e domestiche	47	Donne di casa	317
Commesse	3	Altre professioni	76
Infermiere	1	TOTALE	806

(a) Non sono compresi in questo prospetto 20 maschi e 9 femmine suicidatisi in età inferiore ai 15 anni compiuti.

