

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA

---

STATISTICA  
DELLE CAUSE DI MORTE

NEGLI ANNI 1931 E 1932

PARTE I — INTRODUZIONE



ROMA  
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA  
Via Emilio Morosini, 17  
—  
1935 - Anno XIII



A S. E. IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI

CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO

ECCELLENZA,

*Il volume che ho l'onore di presentare all'E. V. contiene la relazione illustrativa delle cause di morte negli anni 1931 e 1932, accresciuto di alcune nuove rilevazioni ed elaborazioni concernenti :*

a) *il calcolo dei quozienti specifici di mortalità per sesso e per età nel triennio 1930-32 per alcune malattie importanti dal punto di vista sociale ed assistenziale — elaborazione che era stata eseguita solo parzialmente nel 1901 e nel 1911.*

b) *i dati sulle cause di natimortalità del biennio 1931-32.*

c) *la classificazione dei morti, negli anni 1931 e 1932 secondo le cause con distinzione dei casi in cui la morte avvenne dopo atto operatorio.*

*Nel 1931, è stata adottata la nuova nomenclatura nosologica delle cause di morte, stabilita nella IV Conferenza Internazionale, riunitasi a Parigi nell'ottobre 1929 e alla quale l'Italia ha aderito. Secondo i voti espressi nella suddetta Conferenza, i dati riguardanti il 1931 sono stati classificati, per due tavole, secondo la vecchia e la nuova nomenclatura nosologica, al fine di avere criteri per la comparabilità : inoltre particolareggiate tabelle di confronto fanno risultare le differenze fra la nuova nomenclatura e quella usata in precedenza.*

*La mortalità generale e quella per la maggior parte delle cause prese in speciale esame in questo volume, dimostrano una tendenza alla diminuzione, ed è di particolare interesse la diminuzione della mortalità che si osserva per la tubercolosi e per la malaria, sicura dimostrazione dell'efficacia delle provvidenze stabilite in questo campo dal Governo Fascista.*

*Notasi, invece, un aumento nella mortalità per diabete, più accentuato per le femmine, e un aumento nella mortalità per tumori maligni nei maschi e nelle femmine; per queste, però, i quozienti specifici di mortalità per sesso e per età segnalerebbero, generalmente, per il 1930-32 una lieve diminuzione in confronto degli analoghi quozienti di mortalità per il 1920-22.*

*La presente relazione è stata curata dal Col. Medico L. De Berardinis, Capo del Reparto delle Statistiche demografiche e sanitarie, coadiuvato dal Segretario Dr. G. Giannelli.*

Roma, 31 agosto 1935 - Anno XIII.

IL PRESIDENTE  
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
FRANCO SAVORGNAN

# INDICE

## STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE NEGLI ANNI 1931 E 1932

### PARTE I<sup>a</sup> - INTRODUZIONE

---

#### ERRATA - CORRIGE

Pagina 91* — ultima riga . . . . .	<i>invece di</i>	Totale
	<i>leggasi</i>	Totale (b)
» 94* — ultima riga del prospetto LX — anno 1932 . . . . .	<i>invece di :</i>	
	<i>leggasi</i>	237
» 126* — prima riga — 6 <sup>a</sup> colonna . . . . .	<i>invece di .</i>	4437
	<i>leggasi</i>	24437

§ 5. — Morti per suicidio classificati per Compartimenti, sesso, stato civile, età, mezzi o modi di uccisione, mesi e professioni . . . . .	»	105*
---	---	------

#### APPENDICE.

<b>Le cause di natimortalità, nel biennio 1931-32. . . . .</b>	»	<b>115*</b>
--	---	-------------

#### ALLEGATI.

I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 . . . . .	»	133*
II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura . . . . .	»	146*
<i>Fac-simile</i> della scheda individuale (modello B) per i morti (maschi) . . . . .	»	160*

---



## AVVERTENZE

---

1. — Tutti i dati contenuti nel presente volume, a meno che non sia diversamente indicato, si riferiscono al Regno nei confini prebellici, fino a tutto l'anno 1923; dal 1924 in poi, i dati si riferiscono al Regno negli attuali confini.

2. — Nei prospetti e nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

Due puntini (.), per i numeri relativi, quando non raggiungano la cifra significativa nell'ordine minimo considerato (0,001; 0,01; ecc.).

La linea (—), quando non è stato registrato alcun caso, oppure non si conoscono i dati.

3. — Nei prospetti, la somma delle cifre proporzionali non sempre dà, nel totale, cento o mille, ecc., a causa degli arrotondamenti.

4. — Gli Elenchi nosologici delle cause di morte adottati nel presente volume sono quelli stabiliti dalla IV Conferenza internazionale (tenuta a Parigi nell'ottobre 1929), costituiti da una nomenclatura dettagliata di 200 voci, una intermedia di 85 voci ed una abbreviata di 43 voci (*a*).

Nelle tavole IV-A, IV-B e V i morti nel 1931 sono stati classificati anche secondo le voci dell'Elenco nosologico adottato dall'Istituto Centrale di Statistica a datare dal 1924, e ciò per avere elementi di comparabilità fra le statistiche compilate secondo i nuovi elenchi e le statistiche precedenti.

Nell'Allegato I, le voci della nomenclatura nosologica usata dal 1924 al 1930, non perfettamente comparabili con la nomenclatura internazionale, sono state suddivise nelle sottovoci necessarie a ricostruire con perfetta comparabilità le voci della nuova nomenclatura.

5. — I dati contenuti nel presente volume si riferiscono alla circoscrizione territoriale quale era, rispettivamente, al 31 dicembre degli anni o dei periodi considerati, secondo le variazioni effettuate a detta data (*b*).

6. — I quozienti di mortalità, per il 1931, sono stati calcolati sulla popolazione presente censita al 21 aprile 1931, e, per il 1932, sulla popolazione presente calcolata alla metà del 1932.

7. — In quanto ai criteri ed ai metodi seguiti per stabilire la popolazione cui riferire il numero dei morti, veggasi il « Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile » negli anni 1931 e 1932 (*c*).

8. — Per la fonte da cui derivano i dati della presente pubblicazione e per le notizie sul contenuto di essa, si veggia la « Statistica delle Cause di morte » negli anni 1928, 1929 e 1930 » (*d*).

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte e dizionario delle malattie*. — 4<sup>a</sup> edizione — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato — 1933-XI, pag. 55 e seguenti.

(b) Per le variazioni territoriali delle circoscrizioni amministrative del Regno, si vedano le pubblicazioni seguenti:

1° *Variazioni nelle circoscrizioni amministrative del Regno avvenute nell'intervallo fra il censimento del 10 febbraio 1901 e quello del 10 giugno 1911*, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — Direzione Generale della Statistica e del Lavoro — Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1911.

2° *Variazioni di territorio e di nome avvenute nelle circoscrizioni amministrative del Regno durante il periodo fra il V ed il VI censimento (10 giugno 1911 — 1° dicembre 1921) ed il periodo dal 1° dicembre 1921 al 31 dicembre 1924*, a cura del Ministero dell'Economia Nazionale — Direzione Generale della Statistica — Roma, Libreria dello Stato, 1925-III.

3° *Idem. . . idem. . . , dal 1° gennaio 1925 al 31 marzo 1927*, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica — Roma, Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, 1927-V.

4° *Idem. . . idem. . . , dal 1° aprile 1927 al 15 ottobre 1930*, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1930-IX.

5° *Variazioni di territorio, di nome e di confine delle circoscrizioni comunali e provinciali del Regno*, disposte con Leggi e Regi Decreti dal 16 ottobre 1930-VIII al 31 marzo 1934-XII, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII.

6° Per maggiori dettagli, veggasi anche: *Statistica delle Cause di morte nell'anno 1927*, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1931-IX, pagine 30\* e 31\*.

(c) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nel 1931* — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII.

*Idem. . . idem. . . , nel 1932* — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII.

(d) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle Cause di morte nell'anno 1928* — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1932-X.

*Idem. . . , idem. . . , per gli anni 1929 e 1930, Parte 1<sup>a</sup> — Introduzione* — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1934-XII.



## INTRODUZIONE

## CAPO I.

MORTALITÀ NEL REGNO  
E NEI COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA.

A) *Mortalità nel Regno.* — Dai numeri indici riportati nel seguente prospetto, si rileva che il quoziente di mortalità ha tendenza nettamente decrescente, eccettuato, naturalmente, il periodo bellico.

PROSPETTO I.

PERIODI	MORTI		NUMERI INDICI (mortalità del quadrienn. 1872-75 = 100).	PERIODI	MORTI		NUMERI INDICI (mortalità del quadrienn. 1872-75 = 100)
	cifre assolute	‰ abitanti (a)			cifre assolute	‰ abitanti (a)	
Vecchi confini				Vecchi confini			
1872-75 (media ann.)	827 971	30.5	100	1915-18 (media ann.)	(b) 970 429	26.4	87
1876-80 »	820 892	29.4	96	1919-21 »	666 771	18.3	60
1881-85 »	786 656	27.3	90	Attuali confini			
1886-90 »	811 601	27.2	89	1922-25 (media ann.)	669 487	17.3	57
1891-95 »	787 001	25.5	84	1926-30 »	641 956	16.0	52
1896-900 »	731 661	22.9	75	1931 . . . . .	609 405	14.8	49
1901-05 »	721 494	22.0	72	1932 . . . . .	610 646	14.7	48
1906-10 »	717 636	21.2	70				
1911-14 »	671 480	19.1	63				

Il numero indice, da 100 nel quadriennio 1872-75, è sceso a 49 nel 1931 e a 48 nel 1932, sintomo, questo, del miglioramento verificatosi nell'ultimo mezzo secolo nel tenore di vita di vaste classi della popolazione italiana e dei continui progressi dell'igiene, della profilassi e della terapia.

(a) Le cifre proporzionali sono state calcolate sulla popolazione presente alla metà di ciascun periodo. Per l'anno 1931 esse sono state calcolate sulla popolazione presente censita al 21 aprile 1931.

(b) La media annuale dei morti nel periodo 1915-18 comprende, oltre le perdite dovute alla guerra, anche i morti — determinati a calcolo — nei 234 Comuni (per il 1917) e nei 236 Comuni (per il 1918) appartenenti alle Province venete invase in tutto o in parte dal nemico, e per i quali non si ebbero le notizie per i due detti anni.

B) *Mortalità nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia, durante gli anni dal 1924 al 1932.* — Si è calcolata la mortalità nel complesso dei Comuni che erano capiluoghi di Provincia nei singoli anni dal 1924 al 1932, nella loro rispettiva circoscrizione territoriale, alla fine di ogni anno, e i risultati sono riportati nel seguente prospetto, dal quale si rileva, in generale, un decremento della mortalità, pur rilevandosi nel 1931 e nel 1932 un leggero aumento rispetto al 1930.

PROSPETTO II.

A N N I	Morti ‰ abitanti	A N N I	Morti ‰ abitanti	A N N I	Morti ‰ abitanti
1924 (a) . . . . .	17.44	1927 (b) . . . . .	15.93	1930 (b) . . . . .	13.94
1925 (a) . . . . .	17.47	1928 (b) . . . . .	15.78	1931 (b) . . . . .	14.49
1926 (a) . . . . .	17.18	1929 (b) . . . . .	16.33	1932 (b) . . . . .	14.71


I quozienti di mortalità nel complesso dei 76 Comuni capiluoghi di Provincia, per gli anni dal 1924 al 1926, e dei 92 Comuni capiluoghi di Provincia, per gli anni 1927 e 1928, differiscono da quelli pubblicati nel volume delle Cause di morte per l'anno 1928, essendo state rettificata, in seguito ai nuovi calcoli, le cifre riguardanti le popolazioni.

Nel suddetto volume, inoltre, vi è un prospetto indicante la mortalità nel complesso di 69 Comuni capiluoghi di Provincia, negli anni dal 1887 al 1928.


(a) I Comuni capiluoghi di Provincia, considerati per gli anni dal 1924 al 1926, sono 76 e comprendono, oltre i 69 vecchi capiluoghi, anche quelli di *La Spezia, Fiume, Pola, Trieste, Trento, Zara e Taranto*, i quali contavano una popolazione complessiva di 572 955 abitanti alla metà del 1924, di 578 836 alla metà del 1925 e di 602 590 alla metà del 1926.

(b) I Comuni capiluoghi di Provincia, considerati per gli anni dal 1927 al 1932, sono 92 e comprendono, oltre i 76, di cui alla nota (a), (escluso però il Comune di *Caserta*, il quale aveva 35 966 abitanti alla metà del 1926 e, che dal 1° gennaio 1927, non è più capoluogo di Provincia, in seguito alla soppressione della Provincia omonima), anche quelli di *Aosta, Vercelli, Savona, Varese, Bolzano, Gorizia, Pistoia, Terni, Frosinone, Rieti, Viterbo, Pescara, Brindisi, Matera, Enna, Ragusa e Nuoro*, i quali contavano, complessivamente, una popolazione di 584 815 abitanti alla metà del 1927, di 630 603 alla metà del 1928, di 640 077 alla metà del 1929, di 646 081 alla metà del 1930, di 658 160 al censimento del 21 aprile 1931 e di 660 862 alla metà del 1932.

## MORTALITA' PER ALCUNE CAUSE.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

## CAPO II.

## CAUSE DELLE MORTI.

**§ 1. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1931 e 1932.**

Le cause delle morti furono specificate dai medici curanti o necroscopi per 608 807 casi nel 1931 e per 609 652 nel 1932, e restarono ignote, rispettivamente, per 598 e 994, cioè in 10 e in 16 casi su 10 000. Ciò perchè o il defunto non ricevette assistenza medica, o perchè la causa della morte non venne designata con precisione sufficiente per poterla classificare in una delle voci dell'Elenco. Nel 1930, le cause che restarono ignote furono nella proporzione del 13 su 10 000, nel 1929 del 15, nel 1928 del 18, nel 1927 del 14, nel 1926 del 15, nel 1925 del 92 e nel 1924 del 175.

Il miglioramento avutosi a partire dal 1926, in confronto agli anni precedenti, nella specificazione delle cause di morte da parte dei medici curanti, si deve attribuire ad una più accurata revisione, fatta dall'Istituto Centrale di Statistica, delle schede, modelli *B* e *B-bis*, le quali, se mancanti della causa di morte o di altre notizie, vennero rinviate alle rispettive Prefetture o ai Comuni, affinchè fossero completate.

Nel prospetto III sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni 1931 e 1932, classificate secondo la nomenclatura nosologica intermedia stabilita a Parigi nel 1929. Le cifre contenute in detto prospetto costituiscono una nuova serie di dati e sono comparabili alle analoghe contenute nei volumi precedenti dal 1887 al 1930, solo per alcune voci. Il lettore, che vorrà rendersi un conto più esatto della comparabilità dei dati della nuova serie con quelli della serie precedente, oltre a consultare i dati delle tavole IV-A; IV-B e V con quelli delle tavole VI-A, VI-B e X, per l'anno 1931, potrà consultare anche gli Allegati a pagina 133\* e 146\* del presente volume.

Dal prospetto III si rileva che le malattie che diedero, nel 1932, un numero di morti superiore a 10 000 furono, in ordine decrescente: *polmoniti*; malattie del cuore (*endocardite acuta e cronica*, malattie del *miocardio*, malattie delle *arterie coronarie e angina pectoris* e altre malattie del cuore); *enteriti e ulcere intestinali*; *emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale*; *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*; *cancro ed altri tumori maligni*; malattie dell'*infanzia* (*debolezza congenita, nascita prematura, conseguenze del parto* e altre malattie speciali dell'*infanzia*); *bronchiti*; *nefriti*; morti per *causa accidentale*; *influenza*; *arteriosclerosi e cangrena*.

Si esclude la *senilità*, in quanto in essa possono addensarsi cause di morte non bene specificate.

## Morti avvenute nel Regno, negli anni 1931 e 1932, classificate secondo le cause.

## PROSPETTO III.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CIFRE ASSOLUTE		CIFRE PROPORZIONALI A 1000000 DI ABITANTI	
		1931	1932	1931	1932
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie</b> . . . . .	89835	87995	2182	2114
1, 2	Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi . . . . .	6160	6272	150	151
3	Tifo petecchiale . . . . .	4	4	..	..
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	4	2	..	..
7	Morbillo . . . . .	3410	3045	83	73
8	Scarlattina . . . . .	1903	1619	46	39
9	Tosse convulsa . . . . .	2972	2948	72	71
10	Difterite . . . . .	3182	3066	77	74
11	Influenza . . . . .	13237	13346	323	321
13	Dissenteria . . . . .	511	504	12	12
23	Tubercolosi dell'apparato respiratorio (a) . . . . .	33061	31998	803	769
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi . . . . .	11479	11213	279	269
34	Sifilide . . . . .	1351	1375	33	33
36	Infezione purulenta e setticemia, non puerp. . . . .	4348	4522	106	109
38	Malaria . . . . .	3101	3171	75	76
dal 39 al 42	Malattie dovute a protozoi od elminti . . . . .	853	758	21	18
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	4209	4152	102	100
	<b>II. - Tumori (neoplasie)</b> . . . . .	31115	32088	756	771
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni . . . . .	30342	30190	737	725
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	773	1898	19	46
	<b>III. - Malattie reumatiche, (c)</b> . . . . .	9559	9982	232	240
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	1813	2423	44	58
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	855	1365	21	33
59	Diabete mellito . . . . .	3658	3654	89	88
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	768	875	19	21
66	Mal. ghiandola tiroide e ghiand. paratiroidi . . . . .	573	552	14	13
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	1892	1113	46	27
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli org. ematopoietici</b> . . . . .	3020	3051	73	73
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	1365	1321	33	32
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie ed altre mal. del sangue (d) . . . . .	1655	1730	40	42
	<b>V. - Avvelenamenti cronici e intossicazioni</b> . . . . .	509	682	12	16
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	465	628	11	15
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	44	54	1	1
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso e degli org. dei sensi</b> . . . . .	73357	73512	1782	1766
79	Meningite semplice . . . . .	2880	2731	70	66
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	380	352	9	8
82	Emorragia cerebr., embolia e trombosi cerebr. . . . .	56435	57098	1371	1372
83	Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	734	777	18	19
84	Demenza precoce ed altre psicosi . . . . .	951	1172	23	28
85	Epilessia . . . . .	1349	1566	33	38
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	9532	8878	234	213
88, 89	Mal. dell'occhio, dell'orecchio e dei loro annessi. . . . .	936	938	24	23
	<b>VII. - Malattie dell'apparato circolatorio</b> . . . . .	77572	80562	1884	1935
90	Pericardite . . . . .	191	182	5	4
91	Endocardite acuta . . . . .	444	422	11	10
92	Endocardite cronica, compr. le affez. valvolari. . . . .	24451	23246	594	558
93	Malattie del miocardio . . . . .	22101	23487	537	564
94	Malattie delle art. coronarie e ang. pectoris . . . . .	2672	3278	65	79
95	Altre malattie del cuore . . . . .	18318	15790	445	379
96	Aneurisma, escluso l'aneurisma del cuore . . . . .	839	818	20	20
97, 98	Arteriosclerosi (e) e gangrena . . . . .	6999	11778	170	283
dal 99 al 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	1557	1561	38	38

(a) (compresi i gangli tracheo-bronchiali). (b) (o il cui carattere maligno non è specificato). (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) (eccettuate le malattie delle arterie coronarie).

## Morti avvenute nel Regno, negli anni 1931 e 1932, classificate secondo le cause.

Segue: PROSPETTO III.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CIFRE ASSOLUTE		CIFRE PROPORZIONALI A 1000000 DI ABITANTE	
		1931	1932	1931	1932
	<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .</b>	<b>107681</b>	<b>112877</b>	<b>2615</b>	<b>2707</b>
106	Bronchiti . . . . .	18995	18739	461	450
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	81158	85324	1971	2050
110	Pleuriti . . . . .	2653	2808	64	67
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. dell'appar. resp., esclusa la tbc. . . . .	4875	5806	118	139
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente . . . . .</b>	<b>92598</b>	<b>86046</b>	<b>2249</b>	<b>2067</b>
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . . . . .	2412	2537	59	61
119	Enteriti al disotto di due anni . . . . .	56590	51126	1374	1228
120	Enteriti e ulcera intestinale (2 anni ed oltre) . . . . .	12635	11477	307	276
121	Appendicite . . . . .	2449	2488	59	60
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	4210	4401	102	106
124	Cirrosi del fegato . . . . .	4954	5185	121	125
125, 126, 127	Altre malattie del fegato e delle vie biliari, (a) . . . . .	3052	2893	74	70
115, 116, 118, { 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente . . . . .	6286	5939	153	143
	<b>X. - Malattie dell'apparato urinario e genitale . . . . .</b>	<b>21041</b>	<b>21351</b>	<b>511</b>	<b>513</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	15887	15734	386	378
133	Altre malattie dei reni, (b) . . . . .	590	1028	14	25
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	454	452	11	11
135	Malattie della vescica, esclusi i tumori . . . . .	1632	1562	40	38
136	Malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. . . . .	218	224	5	5
137	Malattie della prostata . . . . .	1828	1908	44	46
138, 139	Malattie degli organi genitali, (c) . . . . .	432	443	10	11
	<b>XI. - Malattie della gravidanza, parto e puerperio . . . . .</b>	<b>2854</b>	<b>2851</b>	<b>69</b>	<b>71</b>
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . . .	201	211	5	5
144	Emorragia puerperale . . . . .	546	576	13	14
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali . . . . .	1083	1163	26	28
146, 147	Tossiemia della gravidanza (d). . . . .	598	600	15	14
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	426	401	10	10
	<b>XII. - Malattie della pelle e del tessuto cellulare . . . . .</b>	<b>1979</b>	<b>1807</b>	<b>48</b>	<b>43</b>
151, 152, 153	Malattie della pelle e del tessuto cellulare . . . . .	1979	1807	48	43
	<b>XIII. - Malattie delle ossa e organi della locomozione . . . . .</b>	<b>1034</b>	<b>910</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
154, 155, 156	Malattie delle ossa e degli org. della locom. (e) . . . . .	1034	910	25	22
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti . . . . .</b>	<b>2554</b>	<b>2503</b>	<b>62</b>	<b>60</b>
157	Vizi di conform. congeniti (esclusi i nati morti) . . . . .	2554	2503	62	60
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia . . . . .</b>	<b>29009</b>	<b>29886</b>	<b>705</b>	<b>718</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	14919	14081	362	338
159	Nascita prem. (non compresi i nati morti) . . . . .	9711	9963	236	239
160	Conseguenze del parto . . . . .	451	733	11	18
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	3928	5109	95	123
	<b>XVI. - Senilità . . . . .</b>	<b>41235</b>	<b>39992</b>	<b>1001</b>	<b>961</b>
162	Senilità . . . . .	41235	39992	1001	961
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali . . . . .</b>	<b>19154</b>	<b>19154</b>	<b>465</b>	<b>460</b>
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	4141	4058	101	97
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	1077	1042	26	25
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	13803	14012	335	337
195	Altre morti violente (f). . . . .	132	40	3	1
196, 197	Ferite di guerra, (g) . . . . .	1	—	—	—
198	Esecuzione giudiziaria . . . . .	—	2	—	—
	<b>Totale dei morti per causa determinata . . . . .</b>	<b>604106</b>	<b>605149</b>	<b>14671</b>	<b>14539</b>
	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate . . . . .</b>	<b>5299</b>	<b>5497</b>	<b>129</b>	<b>132</b>
199, 200	Morte improv. e cause non spec. o mal definite . . . . .	5299	5497	129	132
	<b>Totale generale . . . . .</b>	<b>609405</b>	<b>610646</b>	<b>14800</b>	<b>14671</b>

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) (albuminuria e eclampsia). (e) (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (f) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (g) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

Nella Parte II « Tavole », i morti nel 1931 sono stati classificati secondo le cause indicate dalla nomenclatura usata dall'Istituto Centrale di Statistica dal 1924 (Tavole IV-A, IV-B e V) e secondo la nomenclatura internazionale (Parigi, 1929). L'Allegato I mette il lettore in grado di avere elementi per giudicare sulla comparabilità dei dati classificati secondo la precedente e la nuova nomenclatura nosologica e di calcolare eventuali coefficienti di correzione per i confronti nel tempo.

In esso sono riportati i dati solo per le voci della nuova nomenclatura che non hanno perfetta corrispondenza di contenuto con la vecchia. Infatti, ciascuna delle voci della nuova nomenclatura indicate nell'Allegato suddetto, comprende solo in parte le cause che erano comprese nella analoga voce della nomenclatura precedente, oppure non solo le comprende tutte, ma comprende anche parti di altra voce.

Ad esempio:

La voce della nuova nomenclatura nosologica n. 31 « *Altre localizzazioni della tubercolosi* » comprende la sotto voce 49-b « *Tubercolosi degli altri organi ed organi non specificati* » della vecchia nomenclatura, più una parte della voce n. 69 « *malattie delle capsule surrenali (morbo di Addison)* » della vecchia nomenclatura, e precisamente, la « *Tubercolosi delle ghiandole surrenali* ».

Poichè le voci della vecchia nomenclatura erano comprensive di più cause che si sono ripartite in voci diverse della nuova, nello spoglio delle schede di morte del 1931, queste voci della vecchia nomenclatura sono state suddivise in tante sottovoci quante erano necessarie per smistare il loro contenuto fra le voci della nuova nomenclatura; in tal modo per ciascuna di queste, può calcolarsi la percentuale dei casi che essa contiene in più o in meno, a confronto della voce analoga della nomenclatura precedente, o viceversa.

Riferendoci all'esempio più sopra citato, la voce 31 della nuova nomenclatura comprende, per i maschi, 13 casi, di cui 3 casi per *tubercolosi delle ghiandole surrenali*, che, nella vecchia nomenclatura, erano compresi fra i 119 casi di *malattie delle capsule surrenali*. Adottando l'ipotesi che la percentuale trovata nel 1931 sussista anche in altri anni ad esso successivi, si dovrà togliere alla voce 31 della nuova nomenclatura il 23% dei casi, per rendere comparabili i dati con quelli degli anni precedenti al 1931.

## § 2. — Cenni sulla intensità e la frequenza di alcune cause di morte.

Si è ritenuto opportuno di illustrare brevemente la frequenza, la distribuzione territoriale, le variazioni stagionali, ecc. di alcune cause di morte più importanti per il loro carattere di malattie infettive facilmente diffusibili, o perchè sono fra quelle che danno una maggiore mortalità, o perchè hanno una speciale importanza ai fini sociali ed assistenziali. Per il *morbillo*, *scarlattina*, *febbre tifoidea* e *paratifo*, *difterite* e *croup*, *pertosse*, *poliomielite anteriore acuta*, *tubercolosi dell'apparato respiratorio*, *tubercolosi delle meningi* e *del sistema nervoso centrale*, *altre forme tubercolari*, *tumori maligni*, *diabete mellito*, *malattie del cuore*, *cirrosi alcoolica del fegato ed alcoolismo cronico*, *malattie della gravidanza*, *parto e puerperio*, *malattie della prima infanzia*, *cause violente: accidentali*, *omicidi* e *suicidi*, sono stati calcolati, per il Regno e per i singoli Compartimenti, i quozienti di mortalità media annua per i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22 e 1930-32, riferendo la media annuale dei morti alle popolazioni censite, rispettivamente, al 10 febbraio 1901, al 10 giugno 1911, al 1° dicembre 1921 e al 21 aprile 1931, elaborazione che è stata iniziata per alcune delle suddette cause fin dal 1927.

In base a tali quozienti sono stati calcolati, per le suddette malattie:

a) i numeri indici della mortalità nei singoli Compartimenti e nel Regno, facendo uguale a 100 la mortalità del triennio 1900-02, al fine di renderne più evidente l'andamento nel tempo;

b) i numeri indici della mortalità nei Compartimenti, facendo uguale a 100 la mortalità del Regno nei singoli periodi, allo scopo di rendere più evidente la intensità di tale fenomeno nei singoli Compartimenti.

Inoltre, per il *morbillo*, *scarlattina*, *difterite* e *croup*, *febbre tifoidea* e *paratifo*, *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, *tubercolosi polmonare e disseminata*, *altre forme di tubercolosi*, *pleurite*, *bronchite cronica*, *peritonite senza causa indicata*, *meningite semplice*, *malaria*, *tumori maligni*, *diabete mellito*, *convulsioni* nei bambini in età inferiore a 5 anni, *malattie del cuore*, *enteriti* al disotto di 2 anni, *malattie della gravidanza*, *parto e puerperio*, *cause violente: accidentali* e *suicidi*, sono stati calcolati, per i suddetti trienni, quozienti specifici di mortalità per sesso e per età (\*) in base ai dati risultanti dai censimenti della popolazione, eseguiti a metà circa dei trienni. Per le già accennate malattie della *gravidanza*, *parto e puerperio*, per il triennio 1930-32, sono stati calcolati anche quozienti specifici, mettendo in rapporto il numero delle donne morte per queste cause, in età da 15 a 54 anni, distinte secondo lo stato civile, col numero dei parti classificati, anche essi, secondo l'età e lo stato civile delle partorienti.

A proposito della comparazione nel tempo e nello spazio della mortalità per le suddette malattie, è opportuno premettere che essa avrà un diverso significato a seconda che trattisi di malattie infettive acute a carattere epidemico o di altre

---

(\*) Nello stabilire i gruppi di età per il calcolo della mortalità, si è tenuto conto delle conoscenze acquisite circa la maggiore o minore frequenza delle singole cause di morte nelle varie età: ne consegue che la comparabilità dei quozienti di mortalità, relativi ai singoli gruppi di età, sussiste soltanto in corrispondenza a uno stesso intervallo di tempo o ad intervalli di tempo di eguale durata.



malattie. Nel primo caso, poichè vien messa a confronto, nel tempo, la mortalità riscontratasi in un triennio, ad intervalli decennali, gli aumenti o diminuzioni, possono essere un indice, rispettivamente, di peggiorate o migliorate condizioni igieniche, profilattiche od assistenziali, ma possono anche dipendere da particolari caratteristiche di gravità che le epidemie assumono in alcuni periodi. Altrettanto dicasi per quanto riguarda la comparazione della mortalità nello spazio, perchè possono essersi verificate epidemie estese e gravi in alcuni Compartimenti in certi trienni, nei quali, in altri Compartimenti, le epidemie furono limitate e lievi. Ciò, a prescindere dalla influenza che la diversa composizione per età della popolazione di ciascun Compartimento può avere sui quozienti di mortalità, e che è anche opportuno tener presente, perchè la massima parte di queste malattie colpisce con grande prevalenza nella prima e nella seconda infanzia (1).

Gli aumenti o diminuzioni della mortalità per la maggior parte delle altre malattie possono essere messi in relazione con mutamenti nella composizione per età della popolazione, con più precisi accertamenti di diagnosi, con miglioramenti nelle opere igieniche, nella profilassi, nell'assistenza sociale, perchè per esse o non si possono invocare le circostanze accennate o si possono invocare solo limitatamente.

Nel prospetto XLVII a pag. 70\*, risultano i quozienti di letalità per alcune malattie infettive soggette a denuncia, ottenuti mettendo a confronto il numero dei casi denunciati (vedi *Bollettino Sanitario del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Sanità Pubblica*), col numero dei morti.

A proposito di tali quozienti, è bene tener presente che in quei casi in cui la malattia assume un andamento benigno, il che particolarmente può avvenire per il *morbillo*, per la *pertosse*, per l'*influenza* e per la *malaria*, fra le malattie qui considerate, può non essere richiesta l'opera del medico, nè mancano casi nei quali la denuncia non viene fatta. Ne deriva che le denunce registrate possono essere inferiori ai casi realmente verificatisi, e quindi la letalità indicata essere superiore alla reale.

### Morbillo.

Dall'esame del prospetto IV-B risulta che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *morbillo* (morti per 100 000 abitanti), prendendo a base quella del 1900-02, è diminuita dell'1 % nel triennio 1910-12, mentre nei trienni 1920-22 e 1930-32 è diminuita, rispettivamente, del 60 e del 59 %.

Nei singoli Compartimenti, la mortalità nel triennio 1930-32 è minore, in modo più o meno sensibile, rispetto a quella del periodo base, fatta eccezione soltanto per le Puglie e la Sardegna, in cui, rispettivamente, è aumentata del 19 e del 30 %.

In tutti i tre periodi considerati, i numeri indici dei Compartimenti dell'Italia Settentrionale (fatta eccezione solo per l'Emilia nel triennio 1910-12) e dell'Italia Centrale, degli Abruzzi e Molise, della Campania e della Lucania sono tutti inferiori al periodo base, mentre nelle Puglie, nelle Calabrie, nella Sicilia e nella Sardegna, si notano, in alcuni periodi, alti numeri indici, da attribuirsi, con tutta probabilità,

---

(1) Cfr. L. DE BERARDINIS - *Malattie sociali, in trattato elementare di Statistica* - Milano, A. Giuffrè, Editore, 1933-XI.

ad estese e gravi epidemie di *morbillo*: così nelle Puglie e nella Sicilia, nel triennio 1910-12, e nella Sardegna nei due primi trienni.

Dallo stesso prospetto, si deduce che la mortalità per *morbillo*, in ciascuno dei periodi considerati, è, in generale, più alta nell'Italia Meridionale a confronto di quella dell'Italia Centrale, Settentrionale ed Insulare.

Aggiungiamo, inoltre: il numero dei maschi morti per *morbillo* è maggiore di quello delle femmine, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1932, fatta eccezione per il 1919, in cui si ebbe una leggerissima prevalenza delle femmine; il maggior numero di dette morti si è verificato nei mesi di febbraio, gennaio, giugno, marzo e luglio nel 1931, e di febbraio e marzo nel 1932; il *morbillo* dà il massimo numero delle morti nei primi dieci anni di vita. Nelle età successive i casi di morte si vanno facendo sempre più rari in relazione alla minore frequenza dei casi di malattia in tali età. La mortalità per questa infezione, nel primo anno di vita, durante il biennio 1931-32, è stata superiore negli illegittimi (9,7 su 10 000 nati vivi) in confronto ai legittimi (6,4). La letalità, ottenuta ragguagliando il numero delle morti attribuite a tale infezione al numero dei casi denunziati alle Autorità sanitarie, ha oscillato, nel periodo dal 1925 al 1932, fra un minimo di 3,4 % nel 1932 e un massimo di 6,1 % nel 1926.

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per età e sesso (prospetto V), si nota che la mortalità per *morbillo* è particolarmente intensa fino all'età di

#### Mortalità per morbillo (per 100 000 abitanti).

PROSPETTO IV-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	22.7	12.6	5.1	3.9
Liguria . . . . .	23.9	12.4	4.1	2.5
Lombardia . . . . .	30.5	29.5	9.2	8.5
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	3.4
Veneto . . . . .	21.3	12.9	4.5	5.9
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	7.1
Emilia . . . . .	17.3	21.0	5.7	6.6
Toscana . . . . .	17.5	13.4	8.0	4.4
Marche . . . . .	19.4	11.1	6.6	4.8
Umbria . . . . .	16.2	12.8	8.1	3.0
Lazio . . . . .	44.9	38.9	18.2	13.7
Abruzzi e Molise . . . . .	24.7	23.7	11.4	11.1
Campania . . . . .	34.6	25.4	12.2	14.6
Puglie . . . . .	23.5	58.5	17.1	27.9
Lucania . . . . .	76.6	51.9	38.0	33.9
Calabrie . . . . .	28.3	34.3	21.3	9.5
Sicilia . . . . .	18.5	31.4	9.6	14.1
Sardegna . . . . .	10.7	22.3	17.4	13.9
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>25.0</b>	<b>24.8</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>

(a) Per la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia e Zara, si conosce il numero dei morti per le singole cause soltanto dal 1924 in poi.

## Numeri indici della mortalità per morbillo (a).

PROSPETTO IV-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	55	23	17	91	51	51	39
Liguria . . . . .	52	17	10	96	50	41	25
Lombardia . . . . .	96	30	28	122	119	93	85
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	34
Veneto . . . . .	61	21	28	85	52	46	59
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	71
Emilia . . . . .	121	33	38	69	85	57	66
Toscana . . . . .	77	46	25	70	54	80	44
Marche . . . . .	57	34	25	78	45	66	48
Umbria . . . . .	79	50	19	65	52	81	30
Lazio . . . . .	87	41	31	180	157	182	137
Abruzzi e Molise . . . . .	96	46	45	99	96	115	111
Campania . . . . .	74	35	42	138	103	122	146
Puglie . . . . .	249	73	119	94	236	171	279
Lucania . . . . .	68	50	44	307	210	380	339
Calabrie . . . . .	121	75	34	113	139	213	95
Sicilia . . . . .	170	52	77	74	127	96	141
Sardegna . . . . .	208	162	130	43	90	174	139
<b>REGNO</b> { vecchi confini (b) . . . . .	<b>99</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .							<b>100</b>

## Quozienti specifici di mortalità per morbillo.

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO V.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (c)	15.59	13.62	14.63	12.91	12.32	12.62	6.58	6.10	6.34	8.77	7.54	8.17
1 anno . . . . .	17.84	15.37	16.63	15.19	14.34	14.77	7.71	7.12	7.42	9.12	7.75	8.45
2 anni . . . . .	33.03	29.33	31.22	36.14	32.43	34.32	13.87	13.45	13.67	18.74	16.88	17.83
3 " . . . . .	19.40	18.70	19.06	20.08	20.06	20.07	10.85	9.94	10.41	8.46	8.03	8.25
4 " . . . . .	10.99	11.30	11.14	11.69	12.06	11.87	6.30	6.40	6.35	3.70	3.90	3.80
5-9 " . . . . .	7.02	7.46	7.24	6.99	7.00	7.00	3.94	4.36	4.14	2.15	2.14	2.14
10-14 " . . . . .	2.08	2.21	2.14	1.84	2.01	1.93	1.04	1.15	1.09	0.55	0.72	0.63
15-19 " . . . . .	0.28	0.31	0.30	0.20	0.27	0.23	0.18	0.18	0.18	0.13	0.14	0.13
20-24 " . . . . .	0.11	0.17	0.14	0.07	0.11	0.09	0.12	0.07	0.10	0.04	0.08	0.06
25-44 " . . . . .	0.12	0.12	0.12	0.14	0.09	0.11	0.13	0.06	0.10	0.04	0.03	0.04
45-49 " . . . . .	0.05	0.07	0.06	0.03	0.04	0.04	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
45- <sup>(1)</sup> . . . . .	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	..	0.01	0.01
<b>Totale (d)</b> . . . . .	<b>2.63</b>	<b>2.37</b>	<b>2.50</b>	<b>2.62</b>	<b>2.35</b>	<b>2.48</b>	<b>1.05</b>	<b>0.95</b>	<b>1.00</b>	<b>1.07</b>	<b>0.93</b>	<b>1.00</b>

(a) I numeri indici di questo prospetto e di quelli analoghi susseguenti, furono calcolati su medie di due o tre cifre decimali, di cui la seconda e la terza non vennero indicate nei prospetti.

(b) Si avverte che le proporzioni date in questo prospetto per il complesso del Regno, per il triennio 1930-32, non rispecchiano esattamente i vecchi confini, perchè esse comprendono in più il numero dei morti nei 21 Comuni, già appartenenti alla Venezia Giulia, che dal 1924 si trovano tuttora aggregati alla Provincia di Udine, nei 3 Comuni, già appartenenti alla Venezia Tridentina, che pure dal 1924 si trovano aggregati alla Provincia di Belluno e nei 2 Comuni staccati nel 1929 dalla Provincia di Trento ed aggregati a quella di Vicenza.

In seguito alle variazioni territoriali, verificatesi fino a tutto il 31 dicembre 1932, i 21 Comuni aggregati alla Provincia di Udine si sono ridotti a 12, considerando in quest'ultima cifra anche i Comuni di *Pontebba Nova* e di *Laglesie San Leopoldo* aggregati al Comune di *Pontebba*. Nei 5 Comuni, già appartenenti alla Venezia Tridentina, non si verificarono variazioni di territorio.

Complessivamente, i 17 suddetti Comuni contavano una popolazione presente, censita al 21 aprile 1931, di 44 456 abitanti.

(c) Le cifre in carattere tondo sono state calcolate mettendo in rapporto il numero dei morti durante il triennio, in età da 0 a 1 anno, con una media aritmetica ponderata dei nati vivi nel triennio e nell'anno precedente. La media ponderata si è ottenuta dando il peso uno ai nati vivi nell'anno precedente il triennio, il peso tre al primo e secondo anno del triennio, il peso due all'ultimo anno del triennio. Ciò, partendo dall'ipotesi che i morti in ciascun anno di calendario derivino per il 66,6% dai nati dell'anno osservato e per il 33,3% dai nati dell'anno precedente. Cfr., a tale proposito, *Movimento della popolazione* nell'anno 1932, a pag. 71\* e seguenti.

(d) Esclusa l'età ignota.

quattro anni : nei primi tre anni di vita si presenta costantemente superiore nei maschi, mentre nelle età successive accade, generalmente, il contrario : nel complesso delle età note, la mortalità dei maschi è sempre superiore a quella delle femmine, ed essa presenta una notevole diminuzione nei trienni 1920-22 e 1930-32 rispetto ai due primi periodi considerati, specialmente nei primi dieci anni di vita.

### Scarlattina.

Esaminando il prospetto VI-B risulta che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *scarlattina* (morti per 100 000 abitanti), in tutti i periodi, ha superato quella del triennio 1900-02, presentando il massimo aumento nel 1910-12 (96 %).

Nel 1930-32, la mortalità verificatasi nell'Umbria, Lazio, Lucania, Calabrie, Sicilia e Sardegna è più alta di quella del periodo base (1900-02), specialmente nel Lazio e nella Sardegna : nella Lombardia, nell'Umbria, Lazio e Sicilia, anche negli altri due trienni presi in esame, la mortalità è più alta che nel 1900-02.

Sono da notare gli alti numeri indici in corrispondenza della Sicilia, nel triennio 1910-12 ; dell'Umbria e del Lazio, nel 1920-22 ; e nel Lazio e nella Sardegna, nel 1930-32, presumibilmente dovuti ad estese e gravi epidemie di *scarlattina*.

La mortalità nel Regno, appare, nei periodi considerati, in generale, più alta nell'Italia Meridionale ed Insulare (eccetto la Sardegna per i primi tre periodi) che nell'Italia Centrale e Settentrionale.

Aggiungiamo inoltre : il numero dei maschi morti per *scarlattina* è maggiore di quello delle femmine, come risulta in tutti gli anni di osservazione dal 1887 in poi, fatta eccezione per il 1902, 1920, 1928, 1931 e 1932, nei quali anni si ebbe una leggera prevalenza nelle femmine ; il maggior numero di morti si è verificato, nel 1931, in ottobre e luglio e, nel 1932, in ottobre e settembre ; la *scarlattina*, come il *morbillo*, dà il massimo numero dei morti nei primi dieci anni di vita ; la mortalità nel primo anno di vita, durante il biennio 1931-32, è stata superiore nei legittimi (1,0 su 10 000 nati vivi) in confronto agli illegittimi (0,6) ; infine, la letalità per tale infezione, nel Regno, ottenuta ragguagliando il numero dei morti al numero dei casi denunciati alle Autorità sanitarie, ha oscillato, nel periodo dal 1925 al 1932, fra un minimo di 7,8 % nel 1932 ed un massimo di 16,5 % nel 1926.

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per sesso ed età (prospetto VII), si rileva che i quozienti relativi ai primi cinque anni di vita, salvo rare eccezioni, sono notevolmente più alti che nelle età successive, nelle quali, generalmente, diminuiscono col crescere delle età. La mortalità nei maschi è, si può dire, costantemente, superiore a quella delle femmine nei primi cinque anni di vita. In ogni classe di età, salvo da 45 anni in su, la mortalità, nel triennio 1910-12, supera, sia per i maschi sia per le femmine, quella degli altri periodi considerati.

Anche nel 1920-22 la mortalità si mantenne alta, quantunque inferiore a quella del 1910-12, in ogni classe di età, e fu superiore o uguale a quella del triennio 1930-1932, salvo un'eccezione per i maschi da 25 a 44 anni.

## Mortalità per scarlattina (per 100 000 abitanti).

## PROSPETTO VI-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	1.0	1.6	0.8	0.6
Liguria . . . . .	3.6	1.6	0.9	0.6
Lombardia . . . . .	0.7	1.7	2.9	0.7
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	2.6
Veneto . . . . .	2.6	3.1	0.7	1.1
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	2.6
Emilia . . . . .	2.0	3.2	1.4	0.8
Toscana . . . . .	4.4	1.9	0.9	0.7
Marche . . . . .	4.4	1.8	2.5	1.4
Umbria . . . . .	1.0	2.2	11.7	1.3
Lazio . . . . .	1.3	3.5	32.0	11.3
Abruzzi e Molise . . . . .	5.7	8.7	5.2	3.5
Campania . . . . .	5.1	8.1	4.0	4.2
Puglie . . . . .	11.9	11.1	15.0	5.9
Lucania . . . . .	14.9	11.4	6.2	22.7
Calabrie . . . . .	16.3	31.1	5.8	22.2
Sicilia . . . . .	4.1	32.5	10.1	7.5
Sardegna . . . . .	0.3	0.2	0.1	16.1
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>4.1</b>	<b>8.1</b>	<b>5.3</b>	<b>4.3</b>

## Numeri indici della mortalità per scarlattina (b).

## PROSPETTO VI-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	155	75	55	25	20	15	13
Liguria . . . . .	44	25	17	88	20	17	15
Lombardia . . . . .	225	389	93	18	21	55	16
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	61
Veneto . . . . .	117	26	43	64	39	13	26
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	59
Emilia . . . . .	159	68	40	50	40	26	19
Toscana . . . . .	43	20	17	106	23	17	17
Marche . . . . .	41	57	32	108	23	48	33
Umbria . . . . .	208	1110	124	26	27	219	30
Lazio . . . . .	278	2562	902	30	43	603	261
Abruzzi e Molise . . . . .	154	92	62	138	108	98	81
Campania . . . . .	158	79	82	124	100	76	97
Puglie . . . . .	94	126	49	289	138	283	136
Lucania . . . . .	77	42	153	362	141	117	526
Calabrie . . . . .	191	35	137	396	386	108	514
Sicilia . . . . .	796	247	185	99	403	190	174
Sardegna . . . . .	92	48	6452	6	3	2	373
<b>REGNO</b> { vecchi confini (c) . . . . .	<b>196</b>	<b>129</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
{ attuali confini . . . . .							

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

### Quozienti specifici di mortalità per scarlattina.

(Cifre proporzionali a 10000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

#### PROSPETTO VII.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
meno di 1 anno (a)	1.14	1.01	1.03	1.77	1.51	1.64	1.53	1.28	1.41	1.18	0.83	1.01
	1.31	1.14	1.23	2.08	1.75	1.92	1.80	1.50	1.65	1.23	0.86	1.05
1 anno . . .	2.64	2.41	2.52	5.22	4.30	4.76	4.15	3.31	3.74	3.69	3.05	3.38
2 anni . . .	2.60	2.20	2.40	5.75	4.90	5.33	5.45	4.54	5.00	3.48	3.48	3.48
3 » . . .	2.59	2.09	2.34	5.29	4.86	5.08	4.83	4.69	4.77	3.01	3.05	3.03
4 » . . .	2.37	2.24	2.31	4.03	3.97	4.00	3.77	3.33	3.55	2.30	2.25	2.28
5-9 » . . .	0.91	0.89	0.90	1.67	1.79	1.73	1.21	1.31	1.26	0.86	0.94	0.90
10-14 » . . .	0.21	0.23	0.22	0.42	0.53	0.48	0.26	0.28	0.27	0.17	0.28	0.22
15-19 » . . .	0.08	0.09	0.09	0.24	0.24	0.24	0.11	0.16	0.14	0.09	0.12	0.10
20-24 » . . .	0.05	0.07	0.06	0.17	0.13	0.15	0.05	0.10	0.08	0.05	0.09	0.07
25-44 » . . .	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.05	0.02	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03
45- <sup>u</sup> . . . . .	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
<b>Totale (b) . .</b>	<b>0.44</b>	<b>0.39</b>	<b>0.41</b>	<b>0.85</b>	<b>0.76</b>	<b>0.81</b>	<b>0.56</b>	<b>0.51</b>	<b>0.53</b>	<b>0.45</b>	<b>0.42</b>	<b>0.43</b>

(a) Veggasi la nota (c) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

### Febbre tifoidea e paratifo.

Dall'esame dei numeri indici del prospetto VIII-B risulta che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *febbre tifoidea e paratifo* (morti per 100 000 abitanti) è diminuita, a confronto del 1900-02, del 36 % nei trienni 1910-12 e 1920-22 e del 61 % nel 1930-32.

Per i singoli Compartimenti, la mortalità risulta, nei trienni considerati, costantemente inferiore a quella del periodo base 1900-02, eccetto nel Piemonte, nella Liguria e nella Sardegna, in cui si nota, nel triennio 1920-22, rispettivamente, un aumento del 5 %, dell'8 % e del 58 %.

La mortalità, inoltre, si dimostra, nei Compartimenti della Lombardia, dell'Umbria e degli Abruzzi e Molise, superiore a quella media del Regno in tutti i periodi considerati.

Aggiungiamo che: il numero delle femmine morte per dette infezioni è, quasi costantemente, maggiore di quello dei maschi, facendo eccezione soltanto l'anno 1915; il maggior numero dei morti si ebbe, nel Regno, per l'anno 1931,

nei mesi di settembre, agosto, ottobre e luglio, e, per l'anno 1932, in ottobre, settembre, novembre ed agosto; dette infezioni danno il massimo numero delle morti nelle età giovanili da 15 a 29 anni, e sono rari i casi di morte nelle età più avanzate; la mortalità dei bambini legittimi nel primo anno di vita, nel biennio 1931-32, contrariamente a ciò che si è verificato nel biennio 1929-30, è stata superiore (0,4 su 10 000 nati vivi) a quella degli illegittimi ed esposti (0,3).

La letalità per *febbre tifoidea e paratifo*, nel Regno, ottenuta ragguagliando il numero delle morti attribuite a tali infezioni al numero dei casi denunciati alle Autorità sanitarie, ha oscillato, nel periodo dal 1925 al 1932, fra un minimo di 16,3 %, nel 1932 ed un massimo di 25,5 % nel 1925.

Esaminando i quozienti specifici per sesso e per età (prospetto IX), si nota che la mortalità più alta — salvo un'eccezione per la classe di età 0-4 nel 1900-02 — si riscontra nelle classi di età da 15 a 24 anni: nel complesso delle età note è sempre superiore nelle femmine, così pure, in genere, nei singoli gruppi di età.

Nei riguardi della mortalità per sesso, si nota, prescindendo da quella del 1900-02 per l'età 0-4 anni, che il massimo si verifica per le femmine in età da 15 a 19 anni in tutti i periodi considerati, mentre, per i maschi, si riscontra nell'età 20-24 per i trienni 1900-02 e 1910-12 e nell'età 15-19 per i trienni 1920-22 e 1930-32 (a).

La mortalità complessiva dei maschi dal periodo 1900-02, rispetto a quella degli altri trienni successivi considerati, è diminuita progressivamente e in misura notevole; lo stesso dicasi per le femmine, per le quali, però, fa eccezione il triennio 1920-22 in cui la mortalità è stata alquanto superiore a quella del triennio 1910-12. Nei singoli gruppi di età, sia dei maschi sia delle femmine, e salvo qualche eccezione, si ha un andamento analogo a quello sopra detto.

---

(a) Su tale fatto si ritiene opportuno richiamare particolarmente l'attenzione del lettore, dato che alcuni AA. hanno ritenuto di poter attribuire alcune variazioni nell'andamento della mortalità nei maschi in età superiore ai 20 anni in confronto delle femmine, alle vaccinazioni antitifiche ed antiparatifiche eseguite sui militari chiamati alle armi: nel nostro R. Esercito e nella R. Armata, tale vaccinazione fu resa obbligatoria dal R. D. L. 3 gennaio 1915, n. 18, convertito nella Legge 29 marzo 1917, n. 620.

## Mortalità per febbre tifoidea e paratifo (per 100 000 abitanti).

## PROSPETTO VIII-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32 (b)
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	18.6	15.6	19.6	10.9
Liguria . . . . .	16.0	15.0	17.2	13.2
Lombardia . . . . .	42.2	31.2	41.3	19.8
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	9.3
Veneto . . . . .	34.2	26.8	26.3	15.8
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	10.1
Emilia . . . . .	28.9	21.0	22.0	14.7
Toscana . . . . .	43.0	22.8	22.5	11.9
Marche . . . . .	34.3	25.4	27.8	16.5
Umbria . . . . .	40.0	37.1	32.9	22.5
Lazio . . . . .	41.1	29.5	22.8	13.0
Abruzzi e Molise . . . . .	45.0	32.6	28.3	22.4
Campania . . . . .	35.0	18.4	17.0	16.0
Puglie . . . . .	64.9	25.3	18.2	17.5
Lucania . . . . .	37.5	19.8	25.2	18.4
Calabrie . . . . .	44.2	26.0	26.4	13.6
Sicilia . . . . .	61.9	35.7	23.5	14.0
Sardegna . . . . .	16.3	13.1	25.8	11.4
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>39.2</b>	<b>25.2</b>	<b>25.2</b>	<b>15.2</b>

## Numeri indici della mortalità per febbre tifoidea e paratifo (c).

## PROSPETTO VIII-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	84	105	58	47	62	78	71
Liguria . . . . .	94	108	82	41	59	68	86
Lombardia . . . . .	74	98	47	108	124	164	130
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	61
Veneto . . . . .	78	77	46	87	106	104	103
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	66
Emilia . . . . .	73	76	51	74	83	87	97
Toscana . . . . .	53	52	28	110	90	89	78
Marche . . . . .	74	81	48	88	101	110	108
Umbria . . . . .	93	82	56	102	147	131	148
Lazio . . . . .	72	55	32	105	117	91	86
Abruzzi e Molise . . . . .	72	63	50	115	129	112	147
Campania . . . . .	53	49	46	89	73	68	105
Puglie . . . . .	39	28	27	166	100	72	115
Lucania . . . . .	53	67	49	96	79	100	121
Calabrie . . . . .	59	60	31	113	103	105	89
Sicilia . . . . .	58	38	23	158	141	93	92
Sardegna . . . . .	81	158	70	42	52	102	75
<b>REGNO</b> { vecchi confini (d) . . . . .	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
} attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Nel numero dei morti per *febbre tifoidea e paratifo*, per il solo anno 1932, non è compreso un decesso per *febbre miliare*.

(c) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(d) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.



- **Quozienti specifici di mortalità per febbre tifoidea e paratifo.**

(Cifre proporzionali a 10000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

## PROSPETTO IX.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32 (*)		
	medie annuali											
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
0-4 . . . . .	6.34	6.40	6.37	3.05	2.89	2.97	2.19	2.13	2.16	1.07	1.13	1.10
5-9 . . . . .	3.49	4.31	3.89	2.20	2.56	2.38	1.93	2.48	2.20	1.22	1.63	1.42
10-14 . . . . .	2.95	4.11	3.52	2.13	2.96	2.54	2.26	3.31	2.77	1.55	2.09	1.81
15-19 . . . . .	4.90	6.19	5.55	3.49	4.33	3.93	4.29	5.15	4.72	2.66	2.79	2.73
20-24 . . . . .	5.55	5.58	5.57	4.61	3.89	4.24	2.88	4.42	3.67	2.38	2.53	2.45
25-34 . . . . .	3.44	3.99	3.72	2.69	2.89	2.79	1.58	3.32	2.51	1.66	1.94	1.80
35-44 . . . . .	2.34	2.74	2.55	1.75	1.92	1.84	1.51	2.32	1.93	0.76	1.28	1.04
45- <sup>00</sup> . . . . .	2.44	2.27	2.35	1.43	1.33	1.38	1.65	1.66	1.66	0.85	0.93	0.90
<b>Totale (a) . . . . .</b>	<b>3.72</b>	<b>4.11</b>	<b>3.92</b>	<b>2.45</b>	<b>2.60</b>	<b>2.53</b>	<b>2.15</b>	<b>2.88</b>	<b>2.52</b>	<b>1.41</b>	<b>1.63</b>	<b>1.52</b>

(\*) Non sono compresi i casi di morte per *febbre miliare* (3 nel 1930, 2 nel 1931 e 1 nel 1932).

(a) Esclusa l'età ignota.

**Difterite e croup.**

Dall'esame dei numeri indici del prospetto X-B risulta che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *difterite* e *croup* (morti per 100000 abitanti) ha subito una diminuzione del 28 % nel triennio 1910-12, del 51 % nel triennio 1920-22 e del 52 % nel triennio 1930-32, in confronto del triennio 1900-02.

Nei singoli Compartimenti si nota come, nella maggioranza di essi, nel triennio 1930-32, la mortalità sia stata notevolmente inferiore a quella del periodo base (1900-02); soltanto nelle Marche, nel Lazio, negli Abruzzi e Molise, nella Campania e nella Sardegna, la mortalità nel 1930-32 è stata superiore a quella del periodo base, in misura oscillante fra un minimo del 3 % ed un massimo del 51 %.

In modo quasi costante, la mortalità per *difterite* e *croup* supera quella media del Regno, nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia, nel Lazio e negli Abruzzi e Molise, cui si aggiungono, nel 1930-32, la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia e Zara, e ne rimane al di sotto nel Piemonte, nella Liguria, nella Campania, nelle Puglie, nella Lucania, nella Sicilia e nella Sardegna.

Aggiungiamo, inoltre: il numero dei maschi morti per *difterite* e *croup*, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1932, è maggiore di quello delle femmine; le morti nel Regno, sia nel 1931 che nel 1932, come anche risulta dalle cifre delle denunce di *difterite* nel Regno, sono state più numerose nei primi e negli ultimi tre mesi dell'anno; il massimo numero di morti si ha nei primi dieci anni di vita, dopo i quali i casi di morte si vanno facendo sempre più rari; nel biennio 1931-32, simil-

mente al biennio 1929-30 e all'anno 1928, la mortalità dei bambini nel primo anno di vita è stata inferiore nei legittimi (2,9 su 10 000 nati vivi) a confronto degli illegittimi ed esposti (3,8).

La letalità per *difterite e croup*, ottenuta ragguagliando il numero delle morti attribuite a tale infezione al numero dei casi denunciati alle Autorità sanitarie, ha oscillato, nel periodo dal 1925 al 1932, tra un minimo di 11,6 % nel 1930 ed un massimo di 18,8 % nel 1925.

Esaminando i quozienti specifici per sesso e per età (prospetto XI), si nota che la mortalità per questa infezione è particolarmente elevata nelle classi di età da 1 a 4 anni: nei primi cinque anni di vita è più accentuata nel sesso maschile, mentre, nelle età successive, salvo eccezioni, questo rapporto si inverte: nel complesso, la mortalità, nei periodi triennali considerati, si rivela superiore nel sesso maschile.

Il massimo della mortalità si riscontra costantemente nel secondo anno di vita, sia nei maschi che nelle femmine.

L'andamento della mortalità complessiva per *difterite e croup* mostra, dal triennio 1900-02 in confronto ai trienni 1910-12 e 1920-22, una progressiva e notevole diminuzione, sia nei maschi che nelle femmine, mentre la mortalità del triennio 1930-32 è rimasta quasi uguale a quella del triennio 1920-22; e tale diminuzione è stata più accentuata nelle femmine in confronto ai maschi. I singoli gruppi di età, pur presentando delle irregolarità specialmente nei maschi, seguono un andamento analogo a quello detto di sopra.

#### Mortalità per difterite e croup (per 100 000 abitanti).

PROSPETTO X-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	15.3	9.3	8.1	4.5
Liguria . . . . .	14.6	11.4	7.3	4.3
Lombardia . . . . .	33.9	13.5	7.4	8.7
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	10.8
Veneto . . . . .	18.9	13.5	11.9	10.2
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	9.9
Emilia . . . . .	17.0	13.4	9.3	7.3
Toscana . . . . .	21.5	7.9	8.4	6.1
Marche . . . . .	8.8	11.1	8.9	11.4
Umbria . . . . .	15.3	8.4	12.0	9.7
Lazio . . . . .	10.2	14.1	9.0	11.7
Abruzzi e Molise . . . . .	9.0	16.0	8.2	9.9
Campania . . . . .	8.7	10.8	6.6	8.9
Puglie . . . . .	12.2	10.0	6.1	4.0
Lucania . . . . .	9.0	10.9	7.1	7.6
Calabria . . . . .	12.4	13.2	7.7	8.4
Sicilia . . . . .	10.3	12.0	5.2	6.4
Sardegna . . . . .	5.0	7.2	6.1	7.6
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>16.2</b>	<b>11.7</b>	<b>8.0</b>	<b>7.9</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

## Numeri indici della mortalità per difterite e croup (a).

PROSPETTO X-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennic 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	61	53	29	94	80	101	57
Liguria . . . . .	78	50	30	90	98	91	55
Lombardia . . . . .	40	22	26	210	116	93	110
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	137
Veneto . . . . .	71	63	54	117	115	150	129
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	126
Emilia . . . . .	79	55	43	105	115	117	92
Toscana . . . . .	37	39	28	133	68	105	78
Marche . . . . .	126	102	130	54	95	112	144
Umbria . . . . .	55	79	63	95	72	151	122
Lazio . . . . .	138	88	115	63	121	113	148
Abruzzi e Molise . . . . .	177	91	110	56	137	103	126
Campania . . . . .	124	76	103	54	92	83	113
Puglie . . . . .	82	50	33	75	85	76	51
Lucania . . . . .	121	79	84	56	93	89	97
Calabrie . . . . .	107	63	68	77	113	97	107
Sicilia . . . . .	116	50	62	64	103	65	82
Sardegna . . . . .	144	122	151	31	62	77	96
<b>REGNO</b> { vecchi confini (b) . . . . .	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .							<b>100</b>

## Quozienti specifici di mortalità per difterite e croup.

(Cifre proporzionali a 10000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO XI.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (c) {	4.47	3.54	4.02	4.76	3.82	4.30	4.32	3.16	3.76	3.08	2.59	2.84
1 anno . . . . .	5.12	3.99	4.57	5.60	4.45	5.04	5.06	3.69	4.40	3.20	2.66	2.94
2 anni . . . . .	12.37	10.34	11.56	13.01	9.58	11.33	8.80	7.19	8.02	9.19	7.34	8.28
3 » . . . . .	12.37	10.22	11.32	9.44	7.97	8.72	7.45	5.83	6.66	6.34	5.92	6.13
4 » . . . . .	10.70	9.48	10.11	7.18	6.24	6.72	6.89	5.76	6.34	5.45	4.62	5.04
5-9 » . . . . .	8.24	8.40	8.32	5.70	5.00	5.36	5.02	4.24	4.64	4.33	3.92	4.13
10-14 » . . . . .	3.15	3.52	3.33	1.66	1.81	1.73	1.48	1.65	1.56	1.48	1.53	1.50
15-19 » . . . . .	0.61	0.70	0.66	0.30	0.29	0.30	0.35	0.30	0.32	0.30	0.31	0.31
20-24 » . . . . .	0.14	0.15	0.14	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.05	0.06	0.06
25-44 » . . . . .	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.03	0.06	0.04	0.02	0.04	0.03
45-69 » . . . . .	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02
45-69 . . . . .	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
<b>Totale (d) . . . . .</b>	<b>1.71</b>	<b>1.52</b>	<b>1.62</b>	<b>1.30</b>	<b>1.04</b>	<b>1.17</b>	<b>0.88</b>	<b>0.72</b>	<b>0.80</b>	<b>0.86</b>	<b>0.72</b>	<b>0.79</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (c) a pag. 13\*.

(d) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

### Pertosse.

Esaminando il prospetto XII-B, risulta che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *pertosse* (morti per 100 000 abitanti) è diminuita del 14 % nel 1910-12, del 56 % nel 1920-22 e del 69 % nel 1930-32, rispetto a quella del triennio 1900-02.

Nei singoli Compartimenti, nei trienni 1920-22 e 1930-32, non ha superato quella del rispettivo periodo base, e solamente nel triennio 1910-12, nel Veneto, nel Lazio e nella Lucania la mortalità è stata alquanto superiore a quella del 1900-02.

Nella Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Umbria e Sardegna, quasi costantemente, la mortalità è stata superiore a quella del Regno, e così pure nella Venezia Tridentina, durante il triennio 1930-32.

Aggiungiamo che: il numero dei maschi morti per tale malattia è inferiore a quello delle femmine, in tutti gli anni dal 1887 al 1932; le morti nel Regno, durante il 1931, sono state più numerose nei mesi di aprile, luglio e marzo, e, durante il 1932, nei mesi di aprile, giugno e maggio; il massimo numero di morti si riscontra nei primi cinque anni di vita, pur notandosi un certo numero di decessi nel gruppo da 5 a 9, e, nelle successive età, rarissimi sono i casi di morte; nel biennio 1931-32, come nel 1929-30, la mortalità per tale malattia nei bambini nel primo anno di vita, è stata superiore negli illegittimi ed esposti (16,7 su 10 000 nati vivi) in confronto ai legittimi (15,4).

La letalità per *pertosse* nel Regno, ottenuta ragguagliando il numero delle morti per tale infezione al numero dei casi denunciati alle Autorità sanitarie, ha oscillato, nel periodo dal 1925 al 1932 (i soli anni in cui sono date le denunce), fra un minimo di 9,9 % nel 1930 ed un massimo di 15,0 % nel 1929.

#### Mortalità per pertosse (per 100 000 abitanti).

##### PROSPETTO XII-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	22.7	17.7	6.0	4.9
Liguria . . . . .	17.3	13.1	8.4	4.6
Lombardia . . . . .	27.6	22.9	10.6	9.2
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	8.7
Veneto . . . . .	30.9	32.0	14.7	9.1
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	5.7
Emilia . . . . .	28.3	23.4	12.8	6.9
Toscana . . . . .	23.1	18.7	8.6	6.0
Marche . . . . .	22.4	22.2	11.1	6.8
Umbria . . . . .	23.2	15.4	9.9	8.4
Lazio . . . . .	12.9	16.4	8.3	5.9
Abruzzi e Molise . . . . .	17.6	14.6	11.7	6.6
Campania . . . . .	10.8	8.1	5.3	5.2
Puglie . . . . .	11.1	10.6	8.0	5.5
Lucania . . . . .	13.5	16.9	6.0	8.3
Calabrie . . . . .	20.8	14.9	5.8	9.1
Sicilia . . . . .	15.6	11.6	6.0	3.2
Sardegna . . . . .	33.3	26.4	19.6	10.3
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>21.2</b>	<b>18.2</b>	<b>9.3</b>	<b>6.7</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

## Numeri indici della mortalità per pertosse (a).

PROSPETTO XII-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	78	27	22	107	97	65	73
Liguria . . . . .	76	48	26	81	72	90	69
Lombardia . . . . .	83	39	33	130	125	114	137
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	130
Veneto . . . . .	103	47	29	146	175	158	137
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	86
Emilia . . . . .	83	45	24	133	128	138	104
Toscana . . . . .	81	37	26	109	103	92	90
Marche . . . . .	99	50	30	106	122	120	102
Umbria . . . . .	66	43	36	109	85	106	126
Lazio . . . . .	127	64	46	61	90	89	89
Abruzzi e Molise . . . . .	83	66	38	83	80	125	99
Campania . . . . .	75	49	48	51	45	57	78
Puglie . . . . .	95	72	50	52	58	86	83
Lucania . . . . .	126	44	61	63	93	64	124
Calabrie . . . . .	72	28	44	98	82	62	137
Sicilia . . . . .	75	38	20	73	64	64	48
Sardegna . . . . .	79	59	31	157	145	210	155
<b>REGNO</b> { vecchi confini (b) . . . . .	<b>86</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

## Poliomielite anteriore acuta.

Dall'esame del prospetto XIII-B si rileva che nel Regno, nei vecchi confini, in tutti i periodi considerati, la mortalità per *poliomielite anteriore acuta* (morti per 100 000 abitanti) è stata superiore a quella del periodo base, rispettivamente, del 25 %, del 78 % e del 17 % nei trienni 1910-12, 1920-22 e 1930-32.

Nei singoli Compartimenti, in tutti i periodi considerati, la mortalità è risultata superiore a quella del periodo base 1900-02, eccetto, nel triennio 1910-12, nella Liguria e nel Lazio; nel triennio 1920-22 nella Liguria; e nel triennio 1930-32 nella Liguria, nel Veneto, nell'Emilia, nel Lazio, nella Sicilia e nella Sardegna.

È da segnalare il rilevante aumento della mortalità, rispetto al periodo base, verificatosi nei trienni 1920-22 e 1930-32 nella Lucania.

Si nota inoltre che la mortalità per *poliomielite anteriore acuta* è stata più alta in quasi tutti i periodi considerati, a confronto di quella media del Regno, nelle Marche, nell'Umbria, nelle Puglie, nella Lucania, nelle Calabrie, nella Sicilia e nella Sardegna.

Aggiungiamo che: il numero dei maschi morti per tale malattia, durante il periodo di osservazione dal 1899 (primo anno per il quale se ne conosce il numero) al 1932, è, generalmente, maggiore di quello delle femmine, eccetto nel 1930 in cui si è osservato il contrario; le stagioni, sembra, non abbiano alcuna influenza sul numero dei morti, poichè esso non offre, nel complesso del Regno, fino al 1930 (ultimo anno per il quale ne è data la classificazione per mesi), differenze notevoli fra le singole stagioni.

## Mortalità per poliomielite anteriore acuta (per 100 000 abitanti).

PROSPETTO XIII-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	0,6	0,6	0,9	0,7
Liguria . . . . .	0,6	0,4	0,4	0,5
Lombardia . . . . .	0,5	0,6	0,9	0,7
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	0,7
Veneto . . . . .	1,0	1,2	1,3	0,8
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	0,4
Emilia . . . . .	0,8	1,1	1,2	0,7
Toscana . . . . .	0,7	0,8	1,3	0,9
Marche . . . . .	1,3	1,5	3,0	3,4
Umbria . . . . .	1,3	1,5	3,9	2,2
Lazio . . . . .	1,2	1,0	2,2	0,9
Abruzzi e Molise . . . . .	0,7	1,1	1,2	1,1
Campania . . . . .	0,8	1,0	1,5	0,9
Puglie . . . . .	0,9	1,4	2,0	1,1
Lucania . . . . .	0,4	1,1	2,1	1,2
Calabrie . . . . .	1,0	1,1	1,7	1,8
Sicilia . . . . .	0,9	1,3	1,5	0,7
Sardegna . . . . .	1,0	2,0	2,4	1,0
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>

## Numeri indici della mortalità per poliomielite anteriore acuta (b).

PROSPETTO XIII-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	102	161	116	70	57	64	71
Liguria . . . . .	65	58	71	80	42	26	49
Lombardia . . . . .	114	169	131	63	57	60	72
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	71
Veneto . . . . .	123	135	82	122	121	93	87
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	40
Emilia . . . . .	136	144	88	101	111	82	77
Toscana . . . . .	116	200	127	83	77	93	91
Marche . . . . .	111	224	261	163	145	206	371
Umbria . . . . .	108	291	160	167	144	273	232
Lazio . . . . .	85	185	76	144	98	151	96
Abruzzi e Molise . . . . .	162	172	155	85	111	83	115
Campania . . . . .	130	186	114	98	102	102	97
Puglie . . . . .	148	213	115	114	135	136	114
Lucania . . . . .	256	520	305	51	104	148	134
Calabrie . . . . .	112	169	173	126	113	119	189
Sicilia . . . . .	134	161	78	115	124	104	78
Sardegna . . . . .	197	241	98	125	197	169	106
<b>REGNO</b> } vecchi confini (c) . . . . .	<b>125</b>	<b>178</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>REGNO</b> } attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

## Influenza.

La mortalità per *influenza* negli anni 1931 e 1932 è stata, rispettivamente, di 323 e di 321 per un milione di abitanti. Negli anni antecedenti, dal 1887 in poi, i quozienti che superano quelli suddetti si riscontrano nel 1890 (389 per un milione di abitanti); 1892 (653); 1894 (472); 1900 (535); 1918 (7743); 1919 (881); 1920 (672); 1922 (361); 1926 (344) e 1929 (482).

I Compartimenti in cui la mortalità raggiunse il massimo furono, nel 1931, la Lucania (62,6 su 100 000 abitanti), le Puglie (62,1) ed il Piemonte (45,8); i minimi si osservarono nella Venezia Giulia e Zara (16,7) e nella Sicilia (19,0).

Nel 1932 la mortalità raggiunse i massimi nelle Puglie (52,1 su 100 000 abitanti), nella Campania (44,5), nella Sardegna (44,3) e nelle Calabrie (40,8); i minimi si osservarono nella Liguria (14,9), nell'Emilia (22,9), nel Veneto (24,0) e nella Lombardia (24,7).

Il numero dei maschi morti per *influenza*, durante i 46 anni del periodo di osservazione dal 1887 al 1932, è maggiore di quello delle femmine, fatta eccezione, però, per gli anni 1903, 1910, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1923 e 1931, nei quali si è verificato il fatto opposto, maggiormente accentuatosi nel 1918 (76 maschi per ogni 100 femmine).

Il numero delle morti per *influenza* nel Regno, per il 1931, è stato maggiore nei mesi di febbraio, marzo, gennaio e aprile; e nel 1932, in aprile, marzo, maggio e febbraio.

Andamento presso a poco analogo si è verificato nei singoli Compartimenti, sia nel 1931 che nel 1932.

Anche dalle denunce d'*influenza* fatte nel complesso del Regno, durante gli anni 1931 e 1932, risulta, all'incirca, lo stesso andamento.

L'*influenza* dà, in genere, il massimo numero delle morti nelle età avanzate e nei primi cinque anni di vita.

Nel biennio 1931-32, la mortalità per *influenza* nei bambini nel primo anno di vita è stata maggiore nei legittimi (19,2 su 10 000 nati vivi) in confronto agli illegittimi (18,9), al contrario del biennio 1929-30, in cui si ebbero negli illegittimi (27,7 su 10 000 nati vivi) in confronto ai legittimi (18,2).

La letalità per *influenza*, ottenuta ragguagliando il numero delle morti per tale infezione al numero dei casi denunciati alle Autorità sanitarie, fu del 13,6 % nel 1925, del 7,4 % nel 1926, del 7,5 % nel 1927, del 13,3 % nel 1928, del 7,0 % nel 1929, del 25,7 % nel 1930, del 9,5 % nel 1931 e dell'11,8 % nel 1932.

Questa forte differenza nella letalità del 1925, del 1928, del 1930 e del 1932 in confronto a quella del 1926, del 1927 e del 1929, può presumersi che dipenda da due ragioni: o da un andamento più benigno assunto dall'*influenza* nel 1926, nel 1927 e nel 1929, o da una maggiore diligenza nel denunciare i casi constatati. Ambedue le ipotesi sembrano plausibili e possono, forse, essere concomitanti. In favore della prima si ricorda che molte malattie a carattere endemico od epidemico assumono, di anno in anno, caratteri diversi di gravità in relazione a fattori che spesso sfuggono ad ogni indagine; in favore della seconda, il fatto che l'obbligo

della denuncia della *influenza* data dal 15 ottobre 1923, e, infatti, solo dal 1925 sono pubblicati nel *Bollettino Sanitario* del Ministero dell'Interno i casi denunciati nel Regno; è lecito supporre che con l'andare del tempo l'obbligo della denuncia sia maggiormente osservato da parte dei medici.

### Sifilide.

La *sifilide* è raramente indicata come causa diretta di morte negli adulti, e quindi sfugge, in gran parte, ad una esatta rilevazione.

La mortalità per questa infezione aumentò dal 1887 al 1893 (da 64 per ogni milione di abitanti nel 1887 a 77 nel 1893, anno, quest'ultimo, in cui si è avuto il massimo quoziente fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi).

Negli anni dal 1894 al 1899 la mortalità si mantenne ancora alta, ma, a partire dal 1900 fino al 1914, diminuì sensibilmente, oscillando, in questo periodo, fra un minimo di 46 per ogni milione di abitanti nel 1909 e un massimo di 65 nel 1900.

Negli anni bellici, il quoziente di mortalità (49) fu di poco inferiore a quello verificatosi nel triennio anteguerra (51); e negli anni dal 1919 al 1930 i quozienti si ridussero ancora, oscillando fra un minimo di (31) nel 1930 (il più piccolo quoziente fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi) e un massimo di (45) nel 1925.

Negli anni 1931 e 1932, il quoziente è stato di 33 per ogni milione di abitanti.

I Compartimenti in cui la mortalità per *sifilide* raggiunse il massimo furono, nel 1931, la Campania (8,4 su 100 000 abitanti), il Lazio (5,9) e la Lucania (5,3); i minimi si osservarono nella Toscana e Umbria (1,3), nell'Emilia (1,6), nella Venezia Tridentina e nel Piemonte (1,7) e nel Veneto (1,9).

Nel 1932, la mortalità raggiunse il massimo nella Campania (8,8 su 100 000 abitanti), nel Lazio e nella Lucania (5,2); i minimi si verificarono nell'Umbria (0,6), nella Liguria (1,2), nella Toscana (1,5), nel Piemonte, nelle Marche e nella Sardegna (1,7).

Il numero dei maschi morti per *sifilide*, negli anni 1887, 1888, 1889, 1891 e 1893, è inferiore a quello delle femmine; nel 1890 si ha lo stesso numero nei due sessi, nel 1892 e dal 1894 al 1932 il numero dei maschi è maggiore di quello delle femmine, specialmente negli anni dal 1904 in poi.

Negli anni 1931 e 1932 si sono avuti, rispettivamente, 143 e 150-maschi per 100 femmine.

La *sifilide* dà il massimo numero delle morti nel primo anno di vita.

La mortalità dei bambini nel primo anno di vita, nel biennio 1931-32, è assai più alta negli illegittimi ed esposti in confronto ai legittimi, tantochè, nel Regno, per ogni 10 000 nati vivi illegittimi ed esposti ne morirono per *sifilide*, durante il primo anno di vita, 39,9, mentre, per ogni 10 000 nati vivi legittimi, ne morirono soltanto 4,5, con comportamento analogo a quello del biennio 1929-30 (34,6 illegittimi ed esposti, contro 4,0 legittimi, morti nel primo anno di vita, su 10 000 nati vivi della rispettiva filiazione).



### Tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi.

Il numero dei morti, nel Regno, per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, per ogni milione di abitanti, risulta dal prospetto seguente, per il periodo 1887-1932. Fatta uguale a 100 la mortalità del triennio 1887-89 (\*), e seguendo l'andamento di essa nel tempo, si possono distinguere tre periodi:

il primo, nel quale l'andamento può considerarsi costantemente e progressivamente decrescente, va dal triennio 1887-89 all'anno 1914, in cui il numero indice da 100 discende a 68;

il secondo, nel quale l'andamento è progressivamente crescente, va dal 1915 al 1918: in questo periodo il numero indice risale fino a 82 nel 1917 e a 98 nel 1918,

#### Mortalità per tubercolosi (in tutte le sue varie forme e sedi) dal 1887 al 1932.

PROSPETTO XIV.

PERIODI	CIFRE PROPORZIONALI A 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (mortalità del triennio 1887-89 = 100)	PERIODI	CIFRE PROPORZIONALI A 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (mortalità del triennio 1887-89 = 100)
1887-89 (media annuale).	(a) 2 128	100	1919 . . . . .	1 725	81
1890-92 ..	(a) 1 995	94	1920 . . . . .	1 598	75
1893-95 ..	(a) 1 909	90	1921 . . . . .	1 421	67
1896-98 ..	1 809	85	1922 . . . . .	1 430	67
1899-901 ..	1 796	84	1923 . . . . .	1 462	69
1902-04 ..	1 629	77	1924 . . . . .	1 562	73
1905-07 ..	1 706	80	1925 . . . . .	1 532	72
1908-10 ..	1 655	78	1926 . . . . .	1 467	69
1911-13 ..	1 567	74	1927 . . . . .	1 363	64
1914 . . . . .	1 449	68	1928 . . . . .	1 279	60
1915 . . . . .	1 576	74	1929 . . . . .	1 237	58
1916 . . . . .	1 664	78	1930 . . . . .	1 115	52
1917 . . . . .	1 749	82	1931 . . . . .	1 082	51
1918 . . . . .	2 090	98	1932 . . . . .	1 038	49

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

nel quale anno, in dipendenza della *pandemia influenzale*, tutte le cause di morte raggiunsero un limite superiore al normale;

il terzo va dal 1919 al 1932 ed in esso l'andamento, pur con delle irregolarità, torna ad assumere un carattere decrescente, tantochè i numeri indici degli anni 1931 e 1932 (51 e 49, rispettivamente) sono i più bassi fra tutti quelli dei periodi considerati.

Si può, quindi, concludere che la mortalità per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, eccetto che nel periodo bellico, abbia avuto un andamento decrescente.

Esaminando i quozienti di mortalità specifici (prospetto XVII) per tutte le forme *tubercolari*, possiamo notare quanto segue:

per i maschi, **escludendo** la classe di età a meno di 1 anno, il massimo della mortalità si riscontra, per i primi tre periodi considerati, nel gruppo da 20 a 24 anni;

(\*) Nel formare i valori medi, si sono compresi fra i morti per *tubercolosi*, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

per il 1930-32 nella classe da 25-29; il minimo, nella classe da 10 a 14 in tutti i periodi;

per le femmine, invece, il massimo della mortalità si nota nella classe di età da 20 a 24 anni per tutti i periodi; ed il minimo (escludendo il gruppo d'età da 75 anni ed oltre), nella classe da 70 a 74 per il primo periodo e nella classe da 5 a 9 per gli altri tre periodi.

I quozienti di mortalità sono superiori nei maschi, nelle classi di età da 0 a 4 anni e in quelle da 45 a 74, salvo alcune eccezioni; per il triennio 1920-22, a queste classi si aggiungono quelle dei maschi da 20 a 29, e per il triennio 1930-32, quelle da 30 a 44 anni.

Nei riguardi della diminuzione della mortalità fra il 1900-02 e il 1930-32, raggruppando i dati in classi più ampie di età (a), si nota che nella classe da 0 a 4 anni la mortalità è diminuita del 68 % per i maschi e del 70 % nelle femmine; nelle classi da: 5 a 14, del 47 % per i maschi e del 57 % per le femmine; 15 a 24 anni, del 39 % per i maschi e del 32 % per le femmine; 25 a 34 anni, del 28 % per i maschi e del 35 % per le femmine; 35 a 44 anni, del 38 % nelle femmine e solo dell'11 % nei maschi; e nelle classi di età successive, da un massimo del 26 % per le femmine da 45 anni in su ad un minimo dell'11 % per i maschi da 45 a 64 anni.

Diamo, nel prospetto seguente, le cifre assolute dei morti, nel Regno, per *tuberculosis dell'apparato respiratorio*, delle *meningi* e del *sistema nervoso centrale*,

**Morti per tubercolosi (in tutte le sue varie forme e sedi) e rapporti dei sessi, nei periodi sottoindicati.**

PROSPETTO XV.

PERIODI (media annuale)	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO RESPIRATORIO			TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE			ALTRE FORME TUBERCOLARI			COMPLESSO DELLE MALATTIE TUBERCOLARI		
	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F
1887-89 . .	14 067	17 856	79	3 039	2 534	120	11 970	14 039	85	29 076	34 429	84
1890-92 . .	14 023	17 275	81	3 080	2 690	114	10 861	12 834	85	27 964	32 799	85
1893-95 . .	14 296	16 762	85	2 857	2 570	111	10 604	12 243	87	27 757	31 575	88
1896-98 . .	14 535	17 075	85	2 341	2 275	103	9 752	11 396	86	26 628	30 746	87
1899-901 . .	16 890	20 005	84	3 061	2 795	110	7 089	8 222	86	27 040	31 022	87
1902-04 . .	15 574	18 371	85	2 819	2 665	106	6 546	7 584	86	24 939	28 620	87
1905-07 . .	15 886	18 856	84	2 931	2 811	104	7 447	8 955	83	26 264	30 622	86
1908-10 . .	16 829	19 069	88	3 097	2 862	108	6 693	7 868	85	26 619	29 799	89
1911-14 . .	15 798	18 234	87	3 067	2 949	104	6 598	7 547	87	25 463	28 730	89
1915-17 . .	17 735	20 127	88	3 552	3 371	105	7 336	8 065	91	28 623	31 563	91
1918 . . . .	23 576	25 788	91	3 580	3 387	106	8 648	8 965	96	35 804	38 140	94
1919-20 . .	19 732	21 704	91	3 142	2 989	105	6 209	6 411	97	29 083	31 104	94
1921-23 . .	17 747	19 595	91	2 922	2 774	105	4 679	5 130	91	25 348	27 499	92
1924-26 . .	20 790	23 327	89	3 081	3 040	101	4 333	4 867	89	28 204	31 234	90
1927-30 . .	17 385	19 762	88	2 737	2 647	103	3 630	4 198	86	23 752	26 607	89
1931 . . . .	15 927	17 131	93	2 304	2 364	100	3 174	3 576	89	21 465	23 071	93
1932 . . . .	15 456	16 542	93	2 353	2 256	104	3 068	3 536	87	20 877	22 334	93

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Notiziario demografico* del 15 giugno 1935-XIII, n. 6, pag. 168.

per le *altre forme tubercolari* e per il complesso di tutte le *malattie tubercolari*, durante il periodo dal 1887 al 1932, con la distinzione del sesso e la proporzione dei maschi per 100 femmine.

Il numero assoluto dei maschi morti per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, è costantemente inferiore a quello delle femmine, come risulta dalle cifre contenute nel prospetto XV. Nel periodo anteguerra, la differenza, a favore dei maschi, si può, salvo rare eccezioni, considerare più elevata che negli anni di guerra e negli anni successivi.

Fra il numero dei maschi e delle femmine morti per alcune delle *forme tubercolari*, però, non esistono gli stessi rapporti che fra i morti di ciascun sesso per *tutte le forme tubercolari*.

Infatti, nei morti per *tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale*, il numero dei maschi supera costantemente quello delle femmine, eccetto nel 1931 in cui è uguale; per i morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* e per le *altre forme di tubercolosi*, il numero dei maschi è costantemente inferiore a quello delle femmine, e le differenze più sensibili, in genere, si notano nei riguardi delle morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio*. Anche le differenze fra il numero dei maschi e delle femmine, morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio*, sembrano essersi ridotte durante la guerra e sembra che tale riduzione si sia mantenuta anche nel dopo guerra.

La mortalità per le diverse *forme tubercolari*, nel periodo dal 1887 al 1932, risulta dal prospetto seguente:

### Mortalità per tubercolosi (in tutte le sue varie forme e sedi) dal 1887 al 1932.

PROSPETTO XVI.

PERIODI	TUBERCOLOSI DISSEMINATA	TUBERCOLOSI POLMONARE, TISI	SCROFOLO DISSEMINATA E LUPUS	MENINGITE TUBERCOLARE E IDROCEFALO ACQUISTO	TABE MESENTERICA E TUBERCOLOSI INTESTINALE	ARTRITE E SINOVITE FUNGOSA, TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DI ALTRI ORGANI, MORBO DI POTI	COMPLESSO DELLE MALATTIE TUBERCOLARI
1887-89 (media annuale) . . .	307	1 070	103	187	422	(a) 39	2 128
1890-92 » . . .	290	1 028	86	189	364	(a) 38	1 995
1893-95 » . . .	290	999	67	175	335	(a) 43	1 909
1896-98 » . . .	244	997	58	146	302	62	1 809
1899-901 » . . .	97	1 141	45	181	269	63	1 796
1902-04 » . . .	101	1 033	36	167	227	65	1 629
1905-07 » . . .	190	1 042	35	172	193	74	1 706
1908-10 » . . .	161	1 053	27	175	164	75	1 655
1911-13 » . . .	139	978	23	175	173	79	1 567
1914-16 » . . .	133	986	22	181	159	82	1 563
1917-19 » . . .	153	1 226	21	186	169	100	1 855
1920-23 » . . .	84	1 040	14	158	108	74	1 478
1924-27 » . . .	50	1 097	12	154	95	72	1 480
1928-30 » . . .	43	893	8	129	71	66	1 210
1931 . . . . .	40	803	6	115	57	60	1 082
1932 . . . . .	43	(b) 769	6	111	55	54	1 038

Cifre proporzionali a 1 000 000 di abitanti

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per *malattie delle ossa* in genere.

(b) Compresi i morti per *tubercolosi dei gangli tracheo-bronchiali*. Nell'anno 1931, i morti per detta causa furono in numero di 3 (Allegato I).

Dal prospetto XVI si rileva che la diminuzione della mortalità per le varie forme della *tubercolosi*, dal periodo 1887-89 all'anno 1932, è stata più notevole per la *scrofolo* (94 %), *tube mesenterica e tubercolosi intestinale* (87 %), *tubercolosi disseminata* (86 %), *meningite tubercolare* (41%), che non per la *tubercolosi polmonare e tisi* (28 %).

Il numero dei morti per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, è probabilmente superiore a quello indicato nei prospetti dati nelle pagine precedenti, non essendovi compresi quei casi che, pur essendo di natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *bronchite cronica*, di *meningite semplice*, di *pleurite* o di *peritonite*, senza specificare se fossero di natura tubercolare.

Sembra utile, per ciò, vedere anche quale sia stato, nel tempo, l'andamento della mortalità per le malattie ora citate, perchè se esso segna una diminuzione pari o maggiore a quella della *tubercolosi*, si può presumere che non debbano essere molti i casi di queste malattie che possano celare forme di natura tubercolare non dichiarate.

La diminuzione della mortalità per il complesso delle malattie *tubercolari*, dalla media del triennio 1887-1889, a quella del decennio 1923-32, è stata del 38 %; durante lo stesso periodo la mortalità per *meningite semplice* ha avuto una diminuzione del 77 % e quella per *pleurite*, grosso modo (a), una diminuzione del 46 %. La mortalità per *bronchite cronica*, dalla media del triennio 1899-901 (b) a quella del decennio 1923-32, è aumentata appena dell'1 % (c); per tutte le forme *tubercolari*, in questi periodi, la diminuzione è stata del 27 %.

La mortalità per *peritonite*, dalla media del triennio 1908-10 (d) a quella del decennio 1923-32, è diminuita del 25 %; per tutte le forme *tubercolari*, nello stesso periodo, la diminuzione è stata del 21 %.

Anche mettendo a confronto i quozienti specifici di mortalità secondo il sesso e l'età per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi* con quelli per *bronchite cronica*, *meningite semplice*, *pleurite*, *peritonite* senza causa indicata (veggansi i prospetti seguenti, dal n. XVII al XXI), si rileva che, in genere, vi è stata diminuzione della mortalità per tutte le forme *tubercolari* nei singoli gruppi di età in ciascun sesso e nel complesso, nel triennio 1930-32 a confronto del triennio base 1900-02, e che lo stesso comportamento, anzi quasi sempre in maggiore misura, si dimostra nella mortalità per le altre cause suddette.

(a) Per ottenere la migliore comparabilità fra i dati relativi ai morti per malattie della *pleura* negli anni dal 1887 al 1923 e quelli dal 1924 al 1931, si è dovuto per quest'ultimo gruppo di anni unificare le voci «malattie della *pleura* (n. 105)», «malattie del *mediastino* (n. 111)», e «altre malattie dell'apparato respiratorio (n. 112)». Nel 1932 si sono unificate le voci «*Pleuriti* (n. 110)» e «altre malattie dell'apparato respiratorio, compresa la *cangrena del polmone* (n. 114 b)»: in queste voci, però, a confronto di quelle sopra menzionate, non sono compresi, i morti per *emotorace* e vi sono invece compresi i morti per *cangrena polmonare*.

(b) Negli anni precedenti, i morti per *bronchite cronica* non erano tenuti distinti da quelli per *bronchite acuta*.

(c) Nel 1932 nella voce «*bronchite cronica* (n. 106 b)» non sono compresi i morti per *catarro soffocante* e per *catarro bronchiale* non specificato, di età superiore a 60 anni.

(d) Negli anni precedenti, i morti per *peritonite* erano uniti a quelli per *appendicite*.

Sembra quindi potersi ritenere che il miglioramento riscontrato nella mortalità per malattie *tubercolari* non subisca, o subisca in minima parte, l'influenza delle denunce delle morti per *bronchite cronica*, *pleurite*, *meningite* e *peritonite*, in cui non è stata indicata la natura tubercolare.

### Quozienti specifici di mortalità per tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi.

(Cifre proporzionali a 10000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

#### PROSPETTO XVII.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali									M	F	M F
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F			
meno di 1 anno (a)	34.14	31.35	32.78	27.86	23.82	25.89	19.99	17.42	18.74	12.12	10.35	11.26
	39.06	35.40	37.26	32.78	27.73	30.31	23.41	20.35	21.92	12.61	10.64	11.64
1-4 anni . . .	23.12	23.33	23.22	17.13	16.62	16.88	13.49	12.53	13.02	7.52	7.03	7.28
5-9 » . . .	7.32	9.19	8.24	6.67	7.76	7.21	5.79	6.55	6.16	3.41	3.61	3.51
10-14 » . . .	4.95	10.58	7.74	4.88	9.74	7.27	4.26	7.92	6.06	3.15	5.14	4.13
15-19 » . . .	13.61	22.81	18.25	14.19	22.67	18.58	11.83	20.41	16.11	8.54	14.87	11.69
20-24 » . . .	25.98	29.25	27.64	26.57	27.90	27.26	29.05	25.79	27.37	15.40	20.31	17.86
25-29 » . . .	24.84	29.12	27.04	25.71	27.71	26.78	25.56	24.34	24.90	16.48	19.18	17.87
30-34 » . . .	19.97	24.47	22.29	21.58	23.96	22.84	20.40	21.14	20.79	15.85	15.35	15.59
35-39 » . . .	17.36	20.92	19.17	18.73	19.63	19.20	17.10	17.78	17.46	15.16	12.73	13.84
40-44 » . . .	15.40	17.15	16.29	16.38	15.87	16.12	15.07	15.36	15.22	14.17	11.02	12.46
45-49 » . . .	14.72	13.76	14.23	16.39	12.79	14.55	13.95	12.78	13.36	13.61	9.82	11.59
50-54 » . . .	14.98	12.10	13.50	14.70	10.58	12.60	13.07	11.37	12.21	13.28	8.68	10.89
55-59 » . . .	13.81	10.78	12.28	14.08	10.33	12.19	12.79	10.20	11.49	12.47	8.04	10.19
60-64 » . . .	13.45	10.14	11.76	12.47	9.35	10.87	11.71	9.43	10.55	11.15	8.18	9.61
65-69 » . . .	11.63	9.61	10.61	11.42	9.75	10.58	10.42	8.88	9.64	9.76	7.69	8.69
70-74 » . . .	10.43	7.89	9.15	8.99	8.03	8.50	8.81	8.44	8.62	7.19	5.95	6.54
75- <sup>00</sup> . . . . .	6.75	7.01	6.88	6.45	6.57	6.51	6.02	6.68	6.36	4.21	4.44	4.34
<b>Totale (b) . .</b>	<b>16.05</b>	<b>18.30</b>	<b>17.18</b>	<b>15.49</b>	<b>16.74</b>	<b>16.13</b>	<b>14.18</b>	<b>15.03</b>	<b>14.61</b>	<b>10.60</b>	<b>10.99</b>	<b>10.80</b>

(a) Veggasi la nota (c) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

**Quozienti specifici di mortalità per bronchite cronica (a).**

(Cifre proporzionali a 10000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO XVIII

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I-4 . . . . .	0.50	0.42	0.46	2.07	2.35	2.21	0.99	1.06	1.02	0.14	0.13	0.13
5-9 . . . . .	0.32	0.49	0.40	0.20	0.31	0.25	0.09	0.12	0.11	0.02	0.02	0.02
10-14 . . . . .	0.22	0.29	0.25	0.08	0.23	0.15	0.07	0.10	0.08	0.01	0.03	0.02
15-19 . . . . .	0.15	0.24	0.20	0.21	0.47	0.34	0.12	0.22	0.17	0.05	0.05	0.05
20-24 . . . . .	0.23	0.31	0.27	0.41	0.60	0.51	0.23	0.30	0.27	0.06	0.09	0.08
25-29 . . . . .	0.26	0.39	0.33	0.48	0.59	0.54	0.22	0.28	0.25	0.10	0.09	0.10
30-34 . . . . .	0.30	0.36	0.33	0.48	0.67	0.58	0.18	0.29	0.24	0.15	0.09	0.12
35-39 . . . . .	0.36	0.49	0.43	0.57	0.73	0.65	0.27	0.35	0.31	0.19	0.15	0.17
40-44 . . . . .	0.60	0.72	0.66	0.66	0.76	0.71	0.37	0.52	0.45	0.32	0.29	0.30
45-49 . . . . .	0.85	0.92	0.89	1.04	1.09	1.07	0.62	0.58	0.60	0.66	0.53	0.59
50-54 . . . . .	1.65	1.73	1.69	1.64	1.92	1.78	1.15	1.34	1.25	1.21	1.08	1.14
55-59 . . . . .	3.09	3.32	3.20	3.03	3.15	3.09	1.92	2.21	2.06	2.37	2.12	2.24
60-64 . . . . .	5.63	7.80	6.74	5.71	6.17	5.94	4.12	4.97	4.55	5.14	5.39	5.27
65-69 . . . . .	10.90	14.79	12.86	10.30	12.02	11.16	7.37	8.59	7.98	9.75	10.21	9.99
70-74 . . . . .	22.80	30.09	26.48	18.82	21.54	20.20	14.38	16.47	15.45	18.93	20.23	19.61
75- <sup>oo</sup> . . . . .	49.04	58.89	53.98	38.41	42.27	40.38	28.70	30.64	29.70	49.42	47.99	48.66
<b>Totale (b) . . . . .</b>	<b>2.22</b>	<b>2.79</b>	<b>2.51</b>	<b>2.22</b>	<b>2.54</b>	<b>2.38</b>	<b>1.54</b>	<b>1.78</b>	<b>1.66</b>	<b>2.13</b>	<b>2.25</b>	<b>2.19</b>

**Quozienti specifici di mortalità per meningite semplice.**

(Cifre proporzionali a 10000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO XIX.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (c)	34.03	27.12	30.67	29.63	25.53	27.63	16.07	13.25	14.70	7.27	6.45	6.87
1 anno . . . . .	38.93	30.62	34.86	34.88	29.71	32.35	18.83	15.49	17.20	7.56	6.63	7.10
2 anni . . . . .	24.56	22.56	23.58	22.35	20.39	21.38	9.57	8.25	8.93	4.02	3.07	3.55
3 » . . . . .	15.14	13.60	14.38	12.25	10.81	11.55	6.47	5.12	5.81	2.24	2.16	2.20
4 » . . . . .	11.00	10.55	10.78	9.22	8.83	9.03	5.10	4.80	4.95	1.53	1.44	1.49
I-4 » . . . . .	9.30	9.23	9.27	7.22	7.34	7.28	4.03	3.39	3.72	1.11	1.09	1.10
5-9 » . . . . .	15.19	14.15	14.68	12.92	11.96	12.45	6.78	5.79	6.29	2.24	1.95	2.10
10-14 » . . . . .	5.14	5.24	5.19	3.78	3.98	3.88	2.18	2.15	2.17	0.78	0.70	0.74
15-19 » . . . . .	2.62	2.66	2.64	1.96	2.00	1.98	1.21	1.21	1.21	0.54	0.49	0.51
20-24 » . . . . .	2.14	2.24	2.19	1.58	1.78	1.69	1.07	1.06	1.07	0.47	0.37	0.42
25-29 » . . . . .	1.89	1.72	1.80	1.45	1.28	1.36	0.86	0.82	0.84	0.34	0.29	0.31
30-34 » . . . . .	1.33	1.46	1.40	0.96	1.15	1.06	0.55	0.69	0.62	0.30	0.24	0.27
35-39 » . . . . .	1.09	1.24	1.17	0.85	0.97	0.92	0.61	0.51	0.56	0.31	0.24	0.27
40-44 » . . . . .	1.25	1.22	1.23	0.86	0.98	0.92	0.57	0.55	0.56	0.28	0.24	0.26
45-49 » . . . . .	1.34	1.19	1.26	0.88	0.79	0.83	0.53	0.43	0.48	0.26	0.23	0.24
50-54 » . . . . .	1.42	1.00	1.21	1.04	0.78	0.91	0.59	0.48	0.54	0.32	0.24	0.28
55-59 » . . . . .	1.46	1.03	1.24	0.99	0.78	0.89	0.64	0.50	0.57	0.37	0.26	0.31
60-64 » . . . . .	1.72	1.15	1.43	1.03	0.79	0.91	0.61	0.44	0.53	0.37	0.26	0.32
65-69 » . . . . .	1.68	1.20	1.44	0.99	0.69	0.84	0.66	0.44	0.55	0.32	0.24	0.28
70-74 » . . . . .	1.85	1.45	1.65	1.11	0.94	1.02	0.67	0.46	0.56	0.39	0.23	0.31
75- <sup>oo</sup> . . . . .	2.53	1.79	2.16	1.26	0.77	1.01	0.69	0.51	0.60	0.34	0.26	0.30
<b>Totale (b) . . . . .</b>	<b>4.61</b>	<b>4.02</b>	<b>4.31</b>	<b>3.68</b>	<b>3.26</b>	<b>3.47</b>	<b>1.84</b>	<b>1.55</b>	<b>1.69</b>	<b>0.76</b>	<b>0.62</b>	<b>0.69</b>

(a) Negli anni anteriori al 1932 i morti per bronchite al di sopra di 60 anni e prima di 60 anni erano collocati, rispettivamente, fra i decessi per bronchite cronica e per bronchite acuta. Nel 1932, i morti per bronchite, senza specificazione, sono collocati in una voce separata. (b) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*. (c) Veggasi la nota (e) a pag. 13\*.

### Quozienti specifici di mortalità per pleurite.

(Cifre proporzionali a 1000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO XX.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02 (*)			1910-12 (*)			1920-22 (*)			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (a)	1.70	1.47	1.59	1.49	1.17	1.34	1.61	1.00	1.32	1.33	0.99	1.16
	1.95	1.66	1.81	1.76	1.36	1.57	1.89	1.17	1.54	1.38	1.02	1.20
1-4 anni . . .	1.24	0.95	1.10	1.55	1.12	1.34	1.65	1.12	1.39	1.47	1.01	1.24
5-9 » . . .	0.32	0.27	0.30	0.32	0.30	0.31	0.28	0.31	0.29	0.22	0.21	0.21
10-14 » . . .	0.24	0.26	0.25	0.17	0.21	0.19	0.22	0.18	0.20	0.16	0.18	0.17
15-19 » . . .	0.42	0.31	0.36	0.40	0.35	0.37	0.49	0.35	0.42	0.33	0.28	0.30
20-24 » . . .	0.90	0.49	0.69	0.95	0.48	0.71	1.01	0.58	0.79	0.51	0.31	0.41
25-29 » . . .	0.83	0.55	0.68	0.74	0.55	0.64	0.66	0.52	0.59	0.40	0.34	0.37
30-34 » . . .	0.70	0.62	0.66	0.76	0.49	0.62	0.66	0.55	0.60	0.39	0.36	0.38
35-39 » . . .	0.79	0.72	0.76	0.65	0.57	0.61	0.66	0.51	0.58	0.48	0.36	0.41
40-44 » . . .	1.04	0.68	0.86	0.86	0.58	0.71	0.73	0.52	0.62	0.60	0.42	0.51
45-49 » . . .	1.23	0.72	0.97	1.16	0.61	0.88	0.96	0.70	0.83	0.77	0.45	0.60
50-54 » . . .	1.52	0.85	1.18	1.45	0.70	1.07	1.29	0.67	0.98	0.96	0.55	0.75
55-59 » . . .	1.95	1.05	1.49	1.73	0.86	1.29	1.52	0.76	1.14	1.34	0.77	1.05
60-64 » . . .	2.66	1.67	2.15	2.18	1.24	1.70	2.18	1.13	1.65	1.71	0.98	1.33
65-69 » . . .	3.14	1.86	2.50	2.34	1.43	1.88	2.84	1.32	2.08	2.31	1.40	1.84
70-74 » . . .	3.55	2.40	2.97	2.86	1.69	2.27	2.96	1.72	2.33	2.69	1.57	2.10
75- <sup>oo</sup> . . . . .	4.22	3.18	3.70	3.57	1.90	2.72	3.14	2.20	2.65	2.77	1.68	2.19
<b>Totale (b) . .</b>	<b>1.08</b>	<b>0.75</b>	<b>0.92</b>	<b>1.01</b>	<b>0.66</b>	<b>0.83</b>	<b>0.98</b>	<b>0.54</b>	<b>0.80</b>	<b>0.78</b>	<b>0.53</b>	<b>0.65</b>

### Quozienti specifici di mortalità per peritonite, senza causa indicata.

(Cifre proporzionali a 1000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO XXI.

GRUPPI DI ETÀ	1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali								
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (a)	2.76	2.18	2.48	2.81	2.17	2.50	1.16	0.82	1.00
	3.25	2.54	2.90	3.29	2.53	2.92	1.21	0.84	1.03
1-4 anni . . .	1.14	1.18	1.16	1.01	0.96	0.99	0.44	0.44	0.44
5-9 » . . .	0.76	0.78	0.77	0.77	0.79	0.78	0.38	0.46	0.42
10-14 » . . .	0.67	0.61	0.64	0.63	0.65	0.64	0.32	0.28	0.30
15-19 » . . .	0.76	0.79	0.77	0.83	0.69	0.76	0.36	0.36	0.36
20-24 » . . .	0.79	1.16	0.98	0.69	1.04	0.87	0.33	0.51	0.42
25-29 » . . .	0.68	1.45	1.09	0.61	1.42	1.04	0.37	0.66	0.52
30-34 » . . .	0.65	1.43	1.06	0.57	1.25	0.93	0.39	0.62	0.51
35-39 » . . .	0.66	1.41	1.05	0.60	1.24	0.94	0.40	0.72	0.58
40-44 » . . .	0.86	1.27	1.07	0.74	1.15	0.95	0.48	0.60	0.55
45-49 » . . .	0.93	0.96	0.95	0.91	1.00	0.96	0.51	0.57	0.54
50-54 » . . .	0.93	0.93	0.93	1.05	0.88	0.96	0.69	0.63	0.66
55-59 » . . .	1.16	0.90	1.03	1.00	1.00	1.00	0.83	0.65	0.74
60-64 » . . .	1.40	1.31	1.36	1.39	1.17	1.28	0.83	0.79	0.81
65-69 » . . .	1.64	1.64	1.64	1.54	1.51	1.52	1.08	0.86	0.96
70-74 » . . .	1.87	1.97	1.92	1.72	1.62	1.67	1.25	1.08	1.16
75- <sup>oo</sup> . . . . .	2.00	2.08	2.04	1.90	1.89	1.90	1.28	1.18	1.23
<b>Totale (b) . .</b>	<b>0.97</b>	<b>1.15</b>	<b>1.06</b>	<b>0.92</b>	<b>1.07</b>	<b>0.99</b>	<b>0.51</b>	<b>0.58</b>	<b>0.55</b>

(\*) Dal 1900 al 1922 nella voce malattie della pleura sono comprese le malattie del mediastino, le altre malattie dell'apparato respiratorio (tracheostenosi, pleurodinia, pneumopatia, ecc.) e l'emotorace.

(a) Veggasi la nota (c) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

**Mortalità per tubercolosi dell'apparato respiratorio** (per 100 000 abitanti).

PROSPETTO XXII-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32 (a)
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	136.7	123.5	122.3	86.9
Liguria . . . . .	171.0	152.4	146.0	100.5
Lombardia . . . . .	147.9	128.4	126.1	92.9
Venezia Tridentina (b) . . . . .	—	—	—	125.9
Veneto . . . . .	116.9	116.0	124.4	89.3
Venezia Giulia e Zara (b) . . . . .	—	—	—	145.2
Emilia . . . . .	118.0	101.9	99.2	74.9
Toscana . . . . .	139.2	126.4	120.6	95.7
Marche . . . . .	82.6	73.4	84.3	63.5
Umbria . . . . .	83.3	84.8	97.5	69.5
Lazio . . . . .	117.0	113.6	111.0	74.4
Abruzzi e Molise . . . . .	69.8	66.6	65.9	52.6
Campania . . . . .	81.4	72.2	72.6	55.3
Puglie . . . . .	94.0	84.3	91.5	72.5
Lucania . . . . .	52.2	52.1	60.6	41.4
Calabrie . . . . .	69.6	58.0	65.5	48.8
Sicilia . . . . .	85.6	70.7	70.8	60.2
Sardegna . . . . .	118.6	121.6	149.9	123.7
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>111.6</b>	<b>101.3</b>	<b>102.9</b>	<b>79.8</b>

**Numeri indici della mortalità per tubercolosi dell'apparato respiratorio** (c).

PROSPETTO XXII-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	90	89	64	122	122	119	109
Liguria . . . . .	89	85	59	153	150	142	126
Lombardia . . . . .	87	85	63	133	127	123	116
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	158
Veneto . . . . .	99	106	76	105	114	121	112
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	182
Emilia . . . . .	86	84	63	106	101	96	94
Toscana . . . . .	91	87	69	125	125	117	120
Marche . . . . .	89	102	77	74	72	82	79
Umbria . . . . .	102	117	83	75	84	95	87
Lazio . . . . .	97	95	64	105	112	108	93
Abruzzi e Molise . . . . .	95	94	75	63	66	64	66
Campania . . . . .	89	89	68	73	71	71	69
Puglie . . . . .	90	97	77	84	83	89	91
Lucania . . . . .	100	116	79	47	51	59	52
Calabrie . . . . .	83	94	70	62	57	64	61
Sicilia . . . . .	83	83	70	77	70	69	75
Sardegna . . . . .	102	126	104	106	120	146	155
<b>REGNO</b> { vecchi confini (d) . . . . .	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 29\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(c) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(d) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.



**Quozienti specifici di mortalità per tubercolosi disseminata e polmonare.**

(Cifre proporzionali a 10000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

## PROSPETTO XXIII.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32 (*)		
	medie annuali									M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF			
meno di 1 anno (a)	4.30	4.41	4.36	5.86	5.56	5.72	4.52	3.82	4.18	3.29	2.65	2.98
	4.92	4.98	4.95	6.90	6.48	6.69	5.29	4.46	4.89	3.42	2.72	3.08
1-4 anni . . .	4.40	4.75	4.57	4.00	4.05	4.02	3.36	3.20	3.28	1.87	1.77	1.82
5-9 " . . .	2.22	3.62	2.91	1.79	2.65	2.21	1.54	2.26	1.89	0.77	0.99	0.88
10-14 " . . .	2.41	6.73	4.55	2.03	5.90	3.94	1.75	4.70	3.20	1.15	2.90	2.01
15-19 " . . .	11.08	18.91	15.03	11.16	18.68	15.05	9.17	16.88	13.01	6.55	12.52	9.52
20-24 " . . .	23.21	26.00	24.62	22.91	24.30	23.64	25.00	22.59	23.76	13.15	17.90	15.53
25-29 " . . .	22.64	25.99	24.36	23.00	24.42	23.76	22.86	21.63	22.20	14.62	17.15	15.92
30-34 " . . .	18.16	21.76	20.01	19.36	20.91	20.18	18.16	18.74	18.47	14.38	13.60	13.96
35-39 " . . .	15.59	18.37	17.01	16.82	16.96	16.90	15.06	15.61	15.35	13.64	11.13	12.27
40-44 " . . .	13.97	14.81	14.40	14.64	13.55	14.08	13.42	13.27	13.34	12.65	9.45	10.91
45-49 " . . .	13.23	11.86	12.54	14.47	10.81	12.60	12.34	10.88	11.60	12.23	8.32	10.15
50-54 " . . .	13.18	10.07	11.59	12.83	8.75	10.75	11.58	9.25	10.40	11.92	7.11	9.42
55-59 " . . .	12.01	8.90	10.44	12.27	8.29	10.27	11.20	8.23	9.71	11.00	6.30	8.58
60-64 " . . .	11.35	7.82	9.54	10.53	7.39	8.93	10.10	7.22	8.63	9.72	6.39	8.00
65-69 " . . .	8.99	7.19	8.08	9.25	7.51	8.38	8.71	6.47	7.58	8.22	5.81	6.98
70-74 " . . .	7.74	5.55	6.63	7.23	5.59	6.40	6.83	5.80	6.31	5.76	4.44	5.07
75- <sup>00</sup> . . . .	4.44	4.07	4.25	4.62	4.38	4.50	4.59	3.95	4.26	3.12	2.71	2.90
<b>Totale (b) . . .</b>	<b>10.94</b>	<b>12.85</b>	<b>11.90</b>	<b>11.02</b>	<b>12.16</b>	<b>11.60</b>	<b>10.67</b>	<b>11.43</b>	<b>11.06</b>	<b>8.24</b>	<b>8.58</b>	<b>8.41</b>

(\*) Veggasi la nota (b) a pag. 29\*.

(a) Veggasi la nota (c) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

L'esame dei numeri indici del prospetto XXII-B mostra come la mortalità per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* nel Regno (nei vecchi confini), sia discesa dal triennio 1900-02 a quello 1930-32, eccetto l'aumento di un punto nel 1920-22 in confronto al 1910-12, dimostrando così, nel 1930-32, la notevole diminuzione del 31 % a confronto del periodo base (1900-02).

Nei singoli Compartimenti, si nota che, nei periodi considerati, la mortalità risulta inferiore a quella base, eccetto, nel triennio 1910-12, nell'Umbria, nella Sardegna e nella Lucania che risulta uguale; nel triennio 1920-22, nel Veneto, nelle Marche, nell'Umbria, nella Lucania e nella Sardegna; nel triennio 1930-32, solamente nella Sardegna.

Nello stesso prospetto appare evidente una maggiore intensità delle morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale e in parte di quelli della Centrale, a confronto della mortalità media del Regno. La Sardegna ha una mortalità costantemente superiore a quella del Regno, caratteristica che sembra abbia, nel tempo, una tendenza al graduale aumento.

Esaminando poi i quozienti specifici di mortalità per *tubercolosi disseminata e polmonare (a)* secondo il sesso e l'età (prospetto XXIII), si nota come, nei periodi triennali esaminati, nel complesso, la mortalità sia più accentuata nel sesso femminile. Questa caratteristica si nota, in genere, anche nei singoli gruppi di età fino al 39° anno. Invece nelle successive età, eccetto nel gruppo 40-44, nel triennio 1900-02, la mortalità si dimostra nettamente e costantemente superiore nel sesso maschile.

Nei maschi di ogni età la mortalità è discesa da 10,94 a 8,24 fra i periodi estremi, però, si nota prima un lieve aumento tra il 1900-02 e il 1910-12 e poi una diminuzione del solo 3 % nel 1920-22 e del 25 % nel 1930-32, rispetto al 1° periodo. Per le femmine, di ogni età, è discesa da 12,85 a 8,58 fra il primo e l'ultimo periodo, del 5 % fra il primo e il secondo, dell'11 % fra il primo ed il terzo e del 33 % fra il primo e il più recente. La diminuzione della mortalità nel sesso femminile è ben più manifesta che nel sesso maschile, salvo per i gruppi di età da 15 a 29 anni e da 70 a 74, in cui la diminuzione nei maschi è superiore a quella delle femmine; ciò nonostante la mortalità continua ad essere più alta nelle femmine.

Nel 1930-32, raggruppando i dati in classi più ampie di età (b), si nota che l'altezza dei quozienti di mortalità dei maschi scende al minimo nel gruppo da 5 a 14 anni e sale ad un massimo nelle età da 25 a 34: nelle femmine si ha lo stesso andamento, ma il minimo è circa il doppio di quello dei maschi ed il massimo è più elevato: la mortalità delle femmine da 25 a 34 anni si differenzia di poco da quella del gruppo immediatamente precedente, cosicchè, ne risulta che il massimo di mortalità si ha nelle classi da 15 a 34 anni.

---

(a) Nel prospetto XXIII è data la mortalità complessiva per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* e per *tubercolosi disseminata*, perchè nella statistica delle Cause di morte fino a tutto l'anno 1924, i morti per le due dette forme di *tubercolosi*, classificati secondo l'età, non sono tenuti distinti.

(b) Vedi nota (a) a pag. 28\*.

**Mortalità per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale** (per 100 000 abitanti).

## PROSPETTO XXIV-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	13.7	13.6	10.9	9.1
Liguria . . . . .	25.3	23.1	15.8	11.3
Lombardia . . . . .	24.4	22.3	19.1	12.9
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	10.6
Veneto . . . . .	26.6	26.6	26.6	17.5
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	15.6
Emilia . . . . .	21.2	20.2	20.0	12.3
Toscana . . . . .	16.5	18.2	14.5	10.1
Marche . . . . .	16.0	14.1	13.6	9.6
Umbria . . . . .	12.2	13.1	14.2	10.4
Lazio . . . . .	28.4	27.3	22.6	14.5
Abruzzi e Molise . . . . .	16.3	15.6	12.9	10.3
Campania . . . . .	15.5	13.3	10.1	7.7
Puglie . . . . .	16.1	19.5	15.4	14.5
Lucania . . . . .	9.2	11.6	7.6	6.2
Calabrie . . . . .	10.5	8.4	7.8	6.2
Sicilia . . . . .	7.3	8.2	8.2	7.7
Sardegna . . . . .	13.2	19.5	18.3	20.1
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>17.6</b>	<b>17.6</b>	<b>15.4</b>	<b>11.6</b>

**Numeri indici della mortalità per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale** (b).

## PROSPETTO XXIV-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	99	79	67	78	77	71	79
Liguria . . . . .	91	62	45	144	131	103	98
Lombardia . . . . .	92	78	53	138	127	124	111
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	91
Veneto . . . . .	100	100	66	151	151	173	151
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	134
Emilia . . . . .	95	94	58	120	115	130	106
Toscana . . . . .	110	88	61	94	104	94	87
Marche . . . . .	88	85	60	91	80	89	83
Umbria . . . . .	107	116	85	69	74	92	90
Lazio . . . . .	96	80	51	161	155	147	125
Abruzzi e Molise . . . . .	96	79	63	93	89	84	88
Campania . . . . .	85	65	50	88	75	66	66
Puglie . . . . .	121	96	90	91	111	100	125
Lucania . . . . .	126	82	68	52	66	49	54
Calabrie . . . . .	80	75	59	60	48	51	54
Sicilia . . . . .	113	98	106	41	47	47	67
Sardegna . . . . .	147	139	152	75	111	119	174
<b>REGNO</b> { vecchi confini (c) . . . . .	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

**Mortalità per malattie tubercolari, esclusa la tubercolosi dell'apparato respiratorio e la tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale (per 100 000 abitanti).**

PROSPETTO XXV-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	27.1	29.6	21.0	13.7
Liguria . . . . .	32.3	35.4	21.3	14.1
Lombardia . . . . .	44.1	44.6	30.0	16.3
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	22.5
Veneto . . . . .	46.2	50.7	34.3	21.1
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	19.5
Emilia . . . . .	48.4	44.7	28.4	17.4
Toscana . . . . .	44.0	47.7	35.3	19.7
Marche . . . . .	42.8	39.5	31.6	17.5
Umbria . . . . .	49.1	41.1	31.2	19.1
Lazio . . . . .	54.5	38.1	24.6	13.3
Abruzzi e Molise . . . . .	56.6	43.6	28.7	17.6
Campania . . . . .	53.4	43.3	26.9	13.8
Puglie . . . . .	68.3	49.5	35.1	19.1
Lucania . . . . .	40.7	36.9	25.6	15.9
Calabrie . . . . .	32.2	32.8	21.5	12.9
Sicilia . . . . .	29.8	31.6	15.9	10.8
Sardegna . . . . .	41.6	66.6	43.8	28.3
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>43.7</b>	<b>41.9</b>	<b>27.8</b>	<b>16.5</b>

**Numeri indici della mortalità per malattie tubercolari, esclusa la tubercolosi dell'apparato respiratorio e la tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale (b).**

PROSPETTO XXV-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	109	77	50	62	71	76	83
Liguria . . . . .	110	66	44	74	84	77	85
Lombardia . . . . .	101	68	37	101	106	108	99
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	136
Veneto . . . . .	110	74	46	106	121	123	128
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	118
Emilia . . . . .	92	59	36	111	107	102	106
Toscana . . . . .	109	80	45	101	114	127	119
Marche . . . . .	92	74	41	98	94	114	106
Umbria . . . . .	84	63	39	112	98	112	116
Lazio . . . . .	70	45	24	125	91	88	80
Abruzzi e Molise . . . . .	77	51	31	129	104	103	106
Campania . . . . .	81	50	26	122	103	97	84
Puglie . . . . .	73	51	28	156	118	126	116
Lucania . . . . .	91	63	39	93	88	92	96
Calabrie . . . . .	102	67	40	74	78	77	78
Sicilia . . . . .	106	53	36	68	75	57	66
Sardegna . . . . .	160	105	68	95	159	158	171
<b>REGNO</b> { <b>vecchi confini (c)</b> . . . . .	<b>96</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ <b>attuali confini</b> . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

Dall'esame del prospetto XXIV-B risulta che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *tubercolosi delle meningi* e del *sistema nervoso centrale*, in confronto del triennio 1900-02, è risultata uguale nel 1910-12, ma è discesa del 13 % nel triennio 1920-22 e del 35 % nel triennio 1930-32. La mortalità del 1930-32 è minore di quella del periodo base in tutti i Compartimenti, eccettuati la Sicilia e la Sardegna.

Esaminando la mortalità dei Compartimenti, nei singoli periodi, in confronto a quella media del Regno, si nota che in alcuni di essi, come la Liguria, la Lombardia, il Veneto, la Venezia Giulia e Zara (per il triennio 1930-32), l'Emilia, il Lazio e la Sardegna, la mortalità è quasi costantemente superiore a quella del Regno. L'Italia Settentrionale appare così, quella che ha il maggior numero di Compartimenti con mortalità superiore alla media del Regno.

**Quozienti specifici di mortalità per le altre forme tubercolari  
(esclusa la tubercolosi disseminata e polmonare).**

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO XXVI.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
meno di 1 anno (a)	29.83	26.94	28.43	22.00	18.26	20.18	15.47	13.60	14.56	8.84	7.70	8.28
	34.13	30.41	32.31	25.89	21.26	23.62	18.13	15.89	17.04	9.19	7.92	8.56
1-4 anni . . .	18.72	18.58	18.65	13.13	12.57	12.86	10.14	9.33	9.74	5.65	5.26	5.46
5-9 » . . .	5.10	5.57	5.33	4.87	5.12	4.99	4.25	4.29	4.27	2.64	2.62	2.63
10-14 » . . .	2.55	3.85	3.19	2.85	3.83	3.33	2.51	3.22	2.86	1.99	2.24	2.11
15-19 » . . .	2.53	3.90	3.22	3.03	3.99	3.53	2.66	3.53	3.09	1.99	2.35	2.17
20-24 » . . .	2.78	3.24	3.01	3.65	3.60	3.63	4.05	3.20	3.61	2.25	2.41	2.33
25-29 » . . .	2.19	3.13	2.68	2.71	3.29	3.02	2.70	2.71	2.71	1.86	2.04	1.95
30-34 » . . .	1.81	2.71	2.27	2.22	3.05	2.66	2.24	2.40	2.32	1.48	1.75	1.62
35-39 » . . .	1.76	2.55	2.16	1.90	2.67	2.30	2.04	2.17	2.11	1.52	1.60	1.56
40-44 » . . .	1.43	2.34	1.89	1.74	2.32	2.04	1.65	2.09	1.88	1.53	1.57	1.55
45-49 » . . .	1.49	1.90	1.69	1.92	1.98	1.95	1.62	1.90	1.76	1.37	1.50	1.44
50-54 » . . .	1.80	2.03	1.92	1.86	1.83	1.85	1.49	2.13	1.81	1.36	1.57	1.47
55-59 » . . .	1.80	1.88	1.84	1.81	2.04	1.93	1.59	1.98	1.78	1.48	1.74	1.61
60-64 » . . .	2.10	2.33	2.22	1.93	1.95	1.94	1.61	2.22	1.92	1.44	1.79	1.62
65-69 » . . .	2.64	2.42	2.53	2.16	2.23	2.20	1.71	2.41	2.06	1.54	1.88	1.71
70-74 » . . .	2.68	2.35	2.51	1.76	2.44	2.10	1.97	2.63	2.31	1.42	1.51	1.47
75- <sup>(a)</sup> . . . . .	2.32	2.94	2.63	1.83	2.19	2.01	1.43	2.73	2.10	1.09	1.73	1.43
<b>Totale (b) . .</b>	<b>5.10</b>	<b>5.45</b>	<b>5.28</b>	<b>4.47</b>	<b>4.58</b>	<b>4.53</b>	<b>3.51</b>	<b>3.60</b>	<b>3.55</b>	<b>2.36</b>	<b>2.41</b>	<b>2.39</b>

(a) Veggasi la nota (c) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

Dall'esame del prospetto XXV-B risulta che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *malattie tubercolari* (esclusa la *tubercolosi dell'apparato respiratorio* e la *tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale*) segna una progressiva e sensibile diminuzione, essendo discesa del 4 % nel 1910-12, del 36 % nel 1920-22 e del 63 % nel 1930-32 a confronto del triennio base 1900-02.

Nei singoli Compartimenti, la mortalità è in diminuzione, eccettuati il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Veneto, la Toscana, le Calabrie e la Sicilia, nei quali Compartimenti la mortalità del triennio 1910-12 è stata superiore a quella del triennio base, e la Sardegna, nella quale la mortalità, tanto del triennio 1910-12 quanto del triennio 1920-22, è stata pure superiore al periodo base.

La sensibile diminuzione avutasi nei singoli Compartimenti nel triennio 1930-32, a confronto del periodo base, va da un minimo del 32 % nella Sardegna ad un massimo del 76 % nel Lazio.

Esaminando la mortalità dei Compartimenti in confronto a quella del Regno, nei singoli periodi considerati, si nota che la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, gli Abruzzi e Molise, le Puglie e la Sardegna, hanno costantemente, o quasi costantemente, una mortalità superiore a quella media del Regno, cui si aggiungono, nel triennio 1930-32, la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia e Zara.

Esaminando infine i quozienti specifici di mortalità per le *altre forme tubercolari* (esclusa la *tubercolosi polmonare e disseminata*) secondo il sesso e l'età (prospetto XXVI), si nota come la mortalità sia stata, nei periodi triennali considerati, costantemente superiore, sia pure in modo non sensibile, nel sesso femminile. Questo comportamento, salvo alcune eccezioni, si verifica anche nei singoli gruppi di età.

La mortalità si dimostra molto accentuata nei primi cinque anni di vita a confronto delle età successive, sia nei maschi che nelle femmine; diminuisce notevolmente nelle età seguenti fino a 34 anni, tocca i minimi, in genere, da 35 a 59 anni, e nelle età avanzate subisce, in genere, un lieve aumento.

Inoltre, essa dimostra, nei periodi considerati, una progressiva e notevole diminuzione, più accentuata nelle femmine che nei maschi; per i maschi di ogni età è discesa, da 5,10 a 2,36; e per le femmine di ogni età, da 5,45 a 2,41, con una diminuzione, per i maschi, del 12 % fra il primo e il secondo periodo, del 31 % fra il primo ed il terzo e del 54 % fra il primo ed il più recente; per le femmine, rispettivamente, del 16, del 34 e del 56 %. Anche nei singoli gruppi di età considerati, si rileva lo stesso comportamento, eccetto nelle età avanzate (50 anni ed oltre) in cui la diminuzione è sensibilmente più accentuata nel sesso maschile.

Chiudiamo questi cenni sulla mortalità per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, col dire che nel biennio 1931-32, la mortalità nei bambini nel primo anno di vita è stata maggiore negli illegittimi che nei legittimi, come nel biennio 1929-30.

### Febbri da malaria e cachessia palustre.

Una forte diminuzione si è avuta nei morti per *malaria e cachessia palustre*; ed infatti, mentre nel 1887 si verificarono nel Regno 21 033 decessi per tale morbo, pari a 710 per un milione di abitanti, nel triennio 1912-14 morirono, in media, soltanto 2 623 persone, e cioè, 74 per un milione di abitanti. Il quoziente di morta-

lità, durante gli anni bellici, è stato peraltro più alto di quello verificatosi nell'ora detto triennio, ma se si pensa alle condizioni eccezionali create dalla guerra, si può affermare che il servizio di profilassi della *malaria* è stato molto accurato, essendosi riusciti a infrenare l'inevitabile aggravamento di essa. Un miglioramento della mortalità si iniziò subito dopo la guerra e si accentuò nel 1923, nel quale anno le morti diedero un quoziente di 89 per un milione di abitanti. Nel 1924 si ebbe una leggera recrudescenza rispetto all'anno antecedente e dal 1925 al 1932, i quozienti, pure attraverso oscillazioni, mostrano una tendenza alla diminuzione: nel 1931 e 1932 si sono avuti, rispettivamente, 75 e 76 morti per *malaria* per un milione di abitanti.

Il Compartimento in cui la mortalità raggiunse il massimo fu, nel 1931, la Lucania (80,2 su 100 000 abitanti); vengono poi, a grande distanza, la Sardegna (43,7), le Puglie (29,6), le Calabrie (23,7) e la Sicilia (12,1). I minimi si osservarono nel Piemonte e nella Venezia Tridentina (0,3), nella Venezia Giulia e Zara, nell'Emilia e nell'Umbria (0,4), nella Lombardia (0,5), nella Liguria e nelle Marche (0,7).

Nel 1932 il massimo della mortalità fu raggiunto anche nella Lucania (60,8 su 100 000 abitanti), vengono poi, a grande distanza, le Puglie (38,2), la Sardegna (36,6), le Calabrie (22,8) e la Sicilia (12,3). I minimi si osservarono nella Liguria (0,1), nel Piemonte (0,3), nell'Umbria (0,4), nella Lombardia (0,5), nell'Emilia (0,6) e nelle Marche (0,7). Come si vede, analogo andamento della mortalità per *febbri da malaria e cachessia palustre* si è avuto nei Compartimenti, sia nel 1931 che nel 1932; devesi, però, notare che nella Venezia Tridentina non si è verificato alcun decesso per *malaria* nel 1932 e che nella Venezia Giulia e Zara, nell'Emilia, nella Toscana, nel Lazio e nelle Puglie si è avuto, nel 1932, un aumento di essa più o meno sensibile a confronto dell'anno 1931.

Il numero dei maschi morti per *malaria e cachessia palustre* è maggiore di quello delle femmine, come risulta in tutti gli anni del periodo di osservazione dal 1887 al 1932, e ciò, forse, in dipendenza del maggior rischio che i maschi corrono di contrarre tale infezione nei lavori all'aperto.

Il numero delle morti nel Regno, per il 1931 come per il 1932, è stato maggiore nel 2° semestre, con i massimi negli ultimi mesi dell'estate e nei primi dell'autunno, con un comportamento pressochè analogo a quello verificatosi nel 1929 e nel 1930. Per i singoli Compartimenti, in cui si ha maggiore mortalità per *malaria*, si osserva un andamento quasi analogo.

Dalle denunce di *malaria e cachessia palustre*, nel complesso del Regno, si osserva che il maggior numero di esse, nel 1931 e nel 1932, va dal mese di giugno al mese di novembre, con comportamento analogo a quello degli anni 1928, 1929 e 1930.

La *malaria* dà il maggior numero di morti nei primi dieci anni di vita.

Nel biennio 1931-32, la mortalità nei bambini legittimi (3,5 su 10 000 nati vivi), nel primo anno di vita, è stata superiore a quella degli illegittimi (2,8) al contrario di ciò che si è verificato nel biennio 1929-30 (3,0 su 10 000 nati vivi nei legittimi e 3,3 negli illegittimi).

La letalità per *malaria* nel Regno, ottenuta ragguagliando il numero delle morti per tale morbo, al numero dei casi denunziati alle Autorità sanitarie, ha oscillato, nel periodo dal 1925 al 1932, da un minimo di 1,2 % negli anni 1926 e 1928 ad un massimo di 1,6 % nel 1932.

Esaminando i quozienti specifici di mortalità, secondo il sesso e l'età, per *malaria e cachessia palustre* (prospetto XXVII) si nota, che, nel complesso, la mortalità è costantemente superiore nel sesso maschile, probabilmente in relazione al maggior rischio che hanno i maschi di contrarre l'infezione per ragioni di lavoro. Questo comportamento si verifica anche nei singoli gruppi di età, eccetto, nel 1900-02, nell'età da 0 a 4 anni, in cui la mortalità delle femmine è superiore a quella dei maschi.

La mortalità per *malaria* incide maggiormente nei primi cinque anni di vita, diminuisce, in genere, sensibilmente nelle età successive, fino a 24 anni, per poi dimostrare una tendenza all'aumento.

La mortalità per *malaria* ha subito una sensibile diminuzione nel triennio 1930-32 a confronto del 1900-02, e tale diminuzione è risultata maggiore nelle femmine che nei maschi. Un comportamento analogo si osserva nei singoli gruppi di età, eccetto nel gruppo da 15 a 34 anni nel quale, quantunque in lieve misura, la diminuzione è stata maggiore nei maschi.

#### Quozienti specifici di mortalità per *malaria e cachessia palustre*.

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

##### PROSPETTO XXVII.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-4 . . . . .	13.80	14.42	14.11	4.05	3.96	4.01	4.48	4.18	4.34	2.27	2.21	2.24
5-9 . . . . .	3.64	3.45	3.55	1.01	0.86	0.94	1.01	0.90	0.96	0.68	0.55	0.62
10-14 . . . . .	1.92	1.36	1.64	0.44	0.35	0.40	0.64	0.47	0.56	0.49	0.30	0.40
15-24 . . . . .	1.75	1.07	1.41	0.49	0.31	0.40	0.87	0.39	0.63	0.40	0.26	0.33
25-34 . . . . .	1.78	1.35	1.56	0.47	0.40	0.43	0.82	0.51	0.65	0.40	0.31	0.36
35-44 . . . . .	2.43	1.64	2.03	0.62	0.44	0.53	0.93	0.51	0.71	0.61	0.39	0.49
45-54 . . . . .	3.59	1.95	2.76	0.92	0.52	0.71	1.11	0.57	0.84	0.87	0.40	0.62
55-64 . . . . .	4.99	3.21	4.08	1.35	0.81	1.08	1.56	0.97	1.26	1.18	0.65	0.91
65- <sup>(a)</sup> . . . . .	7.26	6.05	6.65	1.78	1.19	1.48	2.25	1.62	1.93	1.38	0.94	1.15
<b>Totale (a) . . . . .</b>	<b>4.40</b>	<b>3.67</b>	<b>4.03</b>	<b>1.21</b>	<b>0.95</b>	<b>1.08</b>	<b>1.38</b>	<b>0.97</b>	<b>1.18</b>	<b>0.85</b>	<b>0.62</b>	<b>0.73</b>

(a) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

#### Tumori maligni.

Nel prospetto XXVIII è dato il numero assoluto dei morti per *tumori maligni* dal 1887 al 1932 e il quoziente di mortalità per 100 000 abitanti. È noto come questo quoziente possa essere fortemente influenzato dalla diversa composizione per età della popolazione, perchè i *tumori maligni* sono molto rari nelle età giovani. Ci serviamo, tuttavia, di questi quozienti per un primo esame dell'andamento



di detta mortalità, nel tempo e nello spazio, per poi esaminare più correttamente, con quozienti di mortalità per età, l'andamento di essa attraverso il tempo nel Regno.

L'esame dei numeri indici mostra come la mortalità per *tumori maligni* sia gradualmente aumentata dal triennio 1887-89 al triennio 1920-22. Essa dimi-

### Morti per tumori maligni dal 1887 al 1932.

PROSPETTO XXVIII.

PERIODI	SEDE DEI TUMORI MALIGNI				TOTALE	PER 100 000 ABITANTI	NUMERI INDICI (mortalità del triennio 1887-1889 = 100)
	utero, vagina, ovaia	mammelle	stomaco ed esofago	disseminati in più organi, di altri organi o di sede non specificata			
1887-89 (media annuale)	2 403	1 013	3 341	5 969	12 726	42.7	100
1890-92 » »	2 375	862	3 739	6 051	13 027	42.8	100
1893-95 » »	2 322	874	4 021	6 837	14 054	45.2	106
1896-98 » »	2 469	908	4 510	8 040	15 927	50.2	118
1899-901 » »	2 548	910	4 697	8 743	16 898	52.3	122
1902-04 » »	2 555	918	5 154	9 462	18 089	55.0	129
1905-07 » »	2 679	992	6 154	10 398	20 223	60.7	142
1908-10 » »	2 746	1 034	6 846	11 459	22 085	64.8	152
1911-13 » »	2 604	1 045	7 175	12 333	23 157	66.1	155
1914-16 » »	2 724	1 066	7 597	12 788	24 175	66.6	156
1917-19 » »	2 599	1 082	7 370	12 861	23 912	67.1	157
1920-22 » »	2 607	1 143	8 274	13 423	25 447	69.5	163
1923-25 » »	2 720	1 514	20 923		25 157	65.9	154
1926-28 » »	2 666	1 510	19 851		24 027	60.3	141
1929-31 » »	2 979	1 798	23 728		28 505	69.7	163
1931 . . . . .	3 070	1 892	10 819	14 561	30 342	73.7	173
1932 . . . . .	3 147	2 000	11 049	13 994	30 190	72.5	170

nuisse nei successivi trienni 1923-25 e 1926-28 e risale poi, nuovamente, segnando il massimo nel 1931.

È da notare, però, che per gli anni 1924 e 1925 fu condotta una indagine particolare sui morti per *tumori maligni* a mezzo di una speciale scheda di rilevazione, e la diminuzione della mortalità riscontratasi in tale periodo è forse da attribuirsi ad una maggiore accuratezza nella rilevazione, potendosi supporre che i medici non abbiano dichiarato come morti per *tumori maligni* individui in cui la causa di morte non fosse perfettamente accertata.

Si è ritenuto opportuno di dare anche le cifre proporzionali a 100 000 abitanti dei morti per *tumori maligni* distinti secondo il sesso e la sede del tumore nei pe-

riodi triennali attorno ai censimenti con i relativi numeri indici, facendo uguale a 100 la mortalità del periodo 1900-02 (prospetto XXIX).

Dall'esame di detti numeri indici si nota un andamento diverso, nel tempo, della mortalità per *tumori maligni* nelle varie sedi, e cioè: una diminuzione per i *tumori maligni dell'utero, vagina ed ovaia*, dal triennio 1900-02 al 1930-32, più

### Mortalità per tumori maligni.

PROSPETTO XXIX.

SEDE DEI TUMORI MALIGNI	CIFRE PROPORZIONALI A 100 000 ABITANTI								NUMERI INDICI (triennio 1900-02 = 100)					
	1900-02		1910-12		1920-22		1930-32		1910-12		1920-22		1930-32	
	medie annuali													
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Utero, vagina, ovaia	—	15.64	—	14.97	—	13.84	—	14.64	—	96	—	88	—	91
Mammelle . . . . .	0.13	5.47	0.10	5.76	0.12	5.95	0.13	8.94	77	105	92	109	100	162
Stomaco ed esofago.	17.08	12.52	22.96	17.38	26.19	18.47			134	139	153	148		
Disseminati in più organi, di altri organi o di sede non specificata . . . . .	28.52	26.61	35.73	34.34	37.50	34.82			125	129	131	131	152	127
<b>REGNO</b> (vecchi con. (a) /attuali con.	45.72	60.23	58.80	72.45	63.81	73.08			129	120	140	121	151	121
							70.19	74.15						

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

accentuata nel 1920-22; un aumento nel sesso femminile per i *tumori maligni delle mammelle*, specialmente nel 1930-32; e pure un aumento, in ambedue i sessi, per i *tumori maligni* dello stomaco, dell'esofago e degli altri organi, eccetto che per le femmine nel triennio 1930-32, nel quale, la mortalità per l'insieme di queste localizzazioni, pur superando notevolmente la mortalità del triennio 1900-02, è leggermente inferiore a quella dei trienni 1920-22 e 1910-12.

Dal prospetto XXX-B si rileva che la mortalità per *tumori maligni*, nel Regno, nei vecchi confini, ha avuto un andamento progressivamente crescente dal triennio base 1900-02 al triennio 1930-32, segnando un aumento del 24 % nel 1910-12, del 29 % nel 1920-22 e del 34 % nel 1930-32.

I numeri indici della mortalità mostrano un progressivo aumento nel Piemonte, nella Liguria, nella Lombardia, nell'Emilia, nella Toscana, nell'Umbria e nella Sardegna; e, salvo qualche oscillazione, anche nel Veneto e nel Lazio.

Nei restanti Compartimenti, la mortalità del triennio 1930-32, eccetto nella Campania, è superiore a quella del periodo base, pur segnando, generalmente, una diminuzione in confronto del 1910-12 e del 1920-22.

Dallo stesso prospetto si nota che la mortalità più elevata, in confronto alla mortalità media del Regno, è data costantemente dalla Toscana, cui segue l'Emilia. Il minimo è dato dalla Sardegna per i primi tre periodi e dalla Lucania e Calabrie per il triennio 1930-32. E da notarsi, inoltre, che il massimo della mortalità, nel triennio 1930-32, è dato dalla Venezia Tridentina.

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per *tumori maligni* secondo il sesso e l'età (prospetto XXXI e grafico a pag. 48\*), si rileva, come, in complesso, questa mortalità sia costantemente superiore nelle femmine, ciò che si verifica, salvo alcune eccezioni, specialmente nel triennio 1930-32, anche nei singoli gruppi di età considerate.

La mortalità nell'età da 5 a 14 anni è notevolmente inferiore a quella dell'età da 0-4, aumenta poi gradatamente nei gruppi di età successivi, per raggiungere il massimo nell'età da 75-79 anni: questo comportamento si verifica anche in ciascun sesso, separatamente, e in tutti i periodi.

Se si escludono i quozienti di mortalità delle classi di età inferiori a 30 anni, quozienti che offrono ampie oscillazioni dovute presumibilmente allo scarso numero dei casi, si può notare che, in tutte le successive classi di età, la mortalità segna, per i maschi, dal 1900-02 al 1930-32, un aumento, molto più accentuato che nelle femmine; per queste, invece, nel 1930-32, si nota una diminuzione a confronto del 1920-22, salvo che nelle età di 80 anni ed oltre.

Per il triennio 1930-32 è stato possibile calcolare quozienti specifici di mortalità per *tumori maligni*, distinti per sede, secondo il sesso e l'età (prospetto XXXII). Per qualunque localizzazione, considerata in detto prospetto, eccetto che per i *neoplasmi della mammella* e per i *tumori maligni degli organi genitali*, si nota che, la mortalità è sempre superiore nel sesso maschile, al contrario, in genere, di ciò che si verifica, come sopra è detto, quando si considerano i quozienti specifici di mortalità per *tumori maligni* nel loro insieme. Da ciò si deduce che sensibilmente incide nella mortalità femminile la mortalità per *tumori maligni negli organi genitali* e delle *mammelle*, tanto da rendere superiore a quella dei maschi la mortalità del complesso dei *tumori maligni* nel sesso femminile. Dallo stesso prospetto ancor meglio si nota come i *tumori maligni* siano affezioni delle età avanzate, poichè, per tutte le localizzazioni, la mortalità risulta sensibilmente più accentuata nelle età non inferiori ai 65 anni e minima fino al 40° anno.

A complemento di quanto abbiamo esposto sulla mortalità per *tumori maligni*, aggiungiamo che essa è stata, nel 1931 e nel 1932, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, sensibilmente superiore a quella degli altri Comuni, il che può dipendere dall'affluenza nei luoghi di cura, che tali Comuni offrono, dei malati del territorio circostante.

Fra i Comuni che al censimento del 21 aprile 1931, contavano una popolazione presente superiore ai 100 000 abitanti, i massimi della mortalità per *tumori maligni* si ebbero nel 1931, in Firenze (17,7 su 10 000 abitanti), Bologna (17,1), Torino (13,5), Trieste (13,4) e Venezia (13,2); i minimi in Bari (2,8), Taranto (3,7), Messina (4,5), Palermo (4,7), Catania (4,8) e Reggio di Calabria (4,9); nel 1932 i massimi si verificarono in Firenze (16,8), Bologna (15,3), Trieste (13,4), Brescia (13,1), Torino (12,7), Livorno (12,5) e Venezia (12,2); i minimi in Bari (4,1), Palermo (4,4), Reggio di Calabria (4,5), Messina (4,6), Taranto (5,1) e Catania (5,5).

Le morti per *tumori maligni* sono più numerose nelle femmine che nei maschi, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1932.

Sembra che le stagioni non abbiano nessuna influenza sul numero di queste morti.

I *tumori maligni* danno il maggior numero di morti nell'età avanzate: più della metà dei morti, nel 1931 e nel 1932, come nel 1929 e nel 1930, era in età da 60 a 79 anni.

## Mortalità per tumori maligni (per 100 000 abitanti).

PROSPETTO XXX-A

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	52.5	73.3	81.7	94.7
Liguria . . . . .	63.0	76.6	84.1	92.6
Lombardia . . . . .	70.5	85.5	93.6	95.7
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	120.7
Veneto . . . . .	55.9	65.8	64.5	76.8
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	84.3
Emilia . . . . .	77.7	94.5	97.9	102.7
Toscana . . . . .	83.5	97.4	105.9	112.7
Marche . . . . .	61.7	70.6	72.1	70.5
Umbria . . . . .	47.9	58.1	58.3	64.2
Lazio . . . . .	55.4	68.4	76.1	70.0
Abruzzi e Molise . . . . .	37.2	47.7	47.2	45.0
Campania . . . . .	39.1	46.0	44.9	35.7
Puglie . . . . .	33.2	41.3	38.6	36.4
Lucania . . . . .	32.0	40.4	41.0	33.7
Calabrie . . . . .	30.2	38.1	38.6	33.8
Sicilia . . . . .	33.9	44.4	41.6	38.7
Sardegna . . . . .	20.9	34.0	36.6	40.1
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>53.0</b>	<b>65.7</b>	<b>68.5</b>	<b>72.2</b>

## Numeri indici della mortalità per tumori maligni (b).

PROSPETTO XXX-B

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	140	156	180	99	111	119	131
Liguria . . . . .	121	133	147	119	116	123	128
Lombardia . . . . .	121	133	136	133	130	137	132
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	167
Veneto . . . . .	118	115	137	106	100	94	106
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	117
Emilia . . . . .	122	126	132	147	144	143	142
Toscana . . . . .	117	127	135	157	148	155	156
Marche . . . . .	114	117	114	116	107	105	98
Umbria . . . . .	121	122	134	90	88	85	89
Lazio . . . . .	124	137	126	104	104	111	97
Abruzzi e Molise . . . . .	128	127	121	70	73	69	62
Campania . . . . .	118	115	91	74	70	66	49
Puglie . . . . .	124	116	110	63	63	56	50
Lucania . . . . .	126	128	105	60	61	60	47
Calabrie . . . . .	126	128	112	57	58	56	47
Sicilia . . . . .	131	123	114	64	68	61	54
Sardegna . . . . .	163	175	192	39	52	53	56
<b>REGNO</b> } vecchi confini (c) . . . . .	<b>124</b>	<b>129</b>	<b>134</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>REGNO</b> } attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

**Quozienti specifici di mortalità per tumori maligni.**

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

PROSPETTO XXXI.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-4 . . . . .	0.35	0.32	0.33	0.37	0.44	0.40	0.41	0.42	0.41	0.37	0.27	0.32
5-14 . . . . .	0.14	0.12	0.13	0.24	0.22	0.23	0.20	0.19	0.19	0.25	0.19	0.22
15-29 . . . . .	0.35	0.47	0.41	0.58	0.54	0.56	0.50	0.50	0.50	0.54	0.48	0.51
30-39 . . . . .	1.53	2.94	2.25	1.84	3.12	2.51	1.72	2.77	2.28	1.82	2.76	2.33
40-44 . . . . .	3.34	7.23	5.32	4.23	7.62	5.98	4.01	7.06	5.57	4.29	6.95	5.73
45-49 . . . . .	5.56	11.09	8.36	7.07	12.53	9.86	7.18	11.61	9.42	7.73	11.10	9.52
50-54 . . . . .	9.73	14.96	12.41	11.64	17.71	14.74	12.24	16.85	14.57	13.45	15.90	14.73
55-59 . . . . .	14.47	19.12	16.81	18.13	22.42	20.29	19.71	22.48	21.10	20.84	21.43	21.14
60-64 . . . . .	22.00	24.53	23.29	26.37	28.91	27.67	28.85	29.82	29.35	31.53	28.54	29.99
65-69 . . . . .	28.87	29.90	29.39	36.02	37.76	36.89	38.98	39.19	39.09	43.01	37.83	40.34
70-74 . . . . .	33.77	34.91	34.35	42.15	45.73	43.97	47.14	45.53	46.32	53.07	45.25	49.00
75-79 . . . . .	35.17	38.91	37.02	47.47	50.41	48.94	50.06	51.51	50.78	53.61	49.31	51.35
80 w . . . . .	29.52	37.25	33.49	37.84	46.72	42.45	40.24	42.77	41.60	43.29	45.51	44.51
<b>Totale (a) . . .</b>	<b>4.57</b>	<b>6.02</b>	<b>5.30</b>	<b>5.90</b>	<b>7.26</b>	<b>6.59</b>	<b>6.40</b>	<b>7.32</b>	<b>6.86</b>	<b>7.02</b>	<b>7.42</b>	<b>7.22</b>

**Quozienti specifici di mortalità per tumori maligni, distinti per sede nel triennio 1930-32.**

(Cifre proporzionali a 10.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

(medie annuali)

PROSPETTO XXXII.


GRUPPI DI ETÀ	CAVITÀ BOCCALE, STOMACO, FEGATO, PERITONEO E INTESTINO			ORGANI GENITALI (b)			MAMMELLA			PELLE			CARCINOMATOSI SAR- COMATOSI DIFFUSA, TUMORI MALIGNI DI ALTRI ORGANI E DI ORGANI NON SPECI- FICATI		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
	0-4 . . . . .	0.07	0.05	0.06	0.04	0.01	0.03	..	0.01	..	..	..	..	0.24	0.20
5-14 . . . . .	0.05	0.03	0.04	0.01	..	0.01	..	..	..	0.01	..	..	0.18	0.15	0.17
15-29 . . . . .	0.11	0.10	0.11	0.04	0.10	0.07	..	0.02	0.01	0.01	..	0.01	0.37	0.26	0.32
30-39 . . . . .	0.91	0.70	0.80	0.11	0.94	0.56	..	0.44	0.24	0.03	0.02	0.03	0.75	0.67	0.71
40-44 . . . . .	2.56	1.90	2.20	0.19	2.47	1.43	0.01	1.20	0.66	0.11	0.03	0.06	1.41	1.36	1.38
45-49 . . . . .	5.21	3.39	4.24	0.33	3.67	2.11	0.01	1.99	1.06	0.17	0.05	0.11	2.02	2.00	2.01
50-54 . . . . .	9.38	6.01	7.63	0.56	4.41	2.56	0.02	2.50	1.31	0.35	0.12	0.23	3.13	2.87	3.00
55-59 . . . . .	15.32	9.57	12.36	0.82	5.05	2.99	0.01	3.03	1.56	0.56	0.19	0.37	4.12	3.59	3.85
60-64 . . . . .	23.36	14.91	18.99	1.64	5.57	3.67	0.04	3.05	1.60	0.69	0.44	0.56	5.80	4.58	5.17
65-69 . . . . .	31.70	21.81	26.61	2.77	6.06	4.46	0.09	3.34	1.76	1.27	0.74	0.99	7.19	5.88	6.52
70-74 . . . . .	38.19	26.50	32.10	4.03	5.97	5.04	0.10	4.07	2.17	2.06	1.51	1.77	8.68	7.19	7.91
75-79 . . . . .	36.96	28.64	32.59	4.53	5.60	5.09	0.13	4.48	2.41	3.00	2.41	2.69	8.99	8.19	8.57
80 w . . . . .	26.01	22.46	24.07	4.18	4.71	4.47	0.17	5.54	3.11	5.62	5.09	5.53	7.31	7.70	7.53
<b>Totale (a) . . .</b>	<b>4.82</b>	<b>3.45</b>	<b>4.12</b>	<b>0.43</b>	<b>1.54</b>	<b>1.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.89</b>	<b>0.46</b>	<b>0.25</b>	<b>0.17</b>	<b>0.21</b>	<b>1.51</b>	<b>1.36</b>	<b>1.43</b>

(a) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

(b) Compresi i tumori della vescica (ottenuti a calcolo per le femmine per il 1932) ed esclusi i tumori del rene dell'uomo (ottenuti a calcolo per il 1932). La ripartizione per età dei dati ottenuti a calcolo è stata fatta proporzionalmente ai dati noti.

## MORTALITA' PER DIABETE MELLITO E PER TUMORI MALIGNI, PER SESSO ED ETA' (\*).

(Scala logaritmica).



(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 10\*.

## Diabete mellito.

Si è presa in particolare considerazione la mortalità per *diabete mellito*, dato l'allarme gettato dai sanitari per l'aumento della morbilità e della mortalità di esso, considerate dalla maggior parte degli Autori come dovute all'attività più febbrile della vita moderna, in cui sono più frequenti che in passato le ansie e le emozioni violente. Bisogna, però, considerare che l'aumento, che noi riscontriamo studiando le cifre, può essersi accentuato anche dal maggior numero di diagnosi di tale malattia, dovute al diffondersi dell'uso di mezzi più moderni di indagine clinica.

Dall'esame del prospetto XXXIII-B appare come la mortalità nel Regno per *diabete mellito* sia aumentata, a confronto del triennio 1900-02, scelto come base, del 41% nel triennio 1910-12, del 45% nel triennio 1920-22 e del 156% (cioè più che raddoppiata) nel triennio 1930-32. Anche nei singoli Compartimenti, eccetto la Lucania, nel 1910-12 e 1920-22, la mortalità supera costantemente, nei periodi triennali considerati, quella del periodo base, e nel triennio 1930-32, rispetto al periodo base, risulta più che triplicata nel Piemonte e più che raddoppiata in quasi tutti gli altri Compartimenti: inoltre, la mortalità risulta superiore a quella media del Regno, in tutti o quasi tutti i periodi triennali considerati, nella Liguria, nella Toscana, nell'Umbria, nel Lazio, nella Campania, nella Sicilia e nella Sardegna.

Dato il concetto predominante che il *diabete mellito* sia una malattia in certo modo legata alle condizioni di alimentazione e di vita della civiltà moderna, specialmente nei grandi centri, si sono calcolati quozienti di mortalità nel complesso dei capiluoghi di Provincia e degli altri Comuni di ciascun Compartimento, dai quali risulta come, nel periodo di osservazione di 4 anni (1929-32), la mortalità per *diabete mellito* sia sensibilmente più accentuata nei capiluoghi di Provincia che negli altri Comuni, eccetto nel 1929 l'Umbria, nel 1930 la Lucania e nel 1931 la Venezia Tridentina, in cui si è verificato un comportamento contrario.

La mortalità per *diabete mellito* nei 22 Comuni che al censimento del 21 aprile 1931 contavano più di 100 000 abitanti, tanto nell'anno 1931 quanto nel 1932, raggiunge i massimi nei Comuni di: Catania (2,0 e 1,8, rispettivamente, per 10 000 abitanti), Roma (1,9 e 1,7), Genova (1,8 e 1,9) e Napoli (1,8 in entrambi gli anni). I minimi, nei due anni suddetti, in Ferrara (0,3 e 0,7), Verona (0,5 e 0,7) e Taranto (0,6 in entrambi gli anni).

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per *diabete mellito* secondo il sesso e l'età (prospetto XXXIV e grafico a pagina 48\*), si nota come, nei periodi considerati, la mortalità sia costantemente superiore nel sesso maschile e lo stesso comportamento, in generale, si verifica anche nei singoli gruppi di età considerati. La mortalità aumenta gradatamente fino al 44° anno e poi si accentua sensibilmente nei gruppi di età successivi, sia nei maschi che nelle femmine.

Nel triennio 1930-32 a confronto del 1900-02, la mortalità per singoli gruppi di età considerati si presenta, in generale, aumentata, specialmente, e in maggior misura, nel sesso femminile, nel quale, in alcuni gruppi di età, specialmente nelle età avanzate, la mortalità si rileva più che triplicata o quadruplicata così da raggiungere quasi l'altezza della mortalità dei maschi. Fa eccezione il gruppo di età da 15-24, la cui mortalità risulta, nel 1930-32 a confronto del 1900-02, leggermente diminuita nei maschi ed uguale nelle femmine.

**Mortalità per diabete mellito** (per 100 000 abitanti).PROSPETTO **XXXIII-A.**

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02 (*)	1910-12 (*)	1920-22 (*)	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	2.9	5.1	4.9	9.9
Liguria . . . . .	5.7	8.3	8.3	16.0
Lombardia . . . . .	2.8	4.2	4.4	7.6
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	5.7
Veneto . . . . .	2.7	4.1	3.6	6.7
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	8.3
Emilia . . . . .	3.0	4.0	4.3	8.1
Toscana . . . . .	4.0	5.6	5.0	8.9
Marche . . . . .	3.5	4.7	4.6	8.8
Umbria . . . . .	3.5	4.2	5.7	10.4
Lazio . . . . .	5.2	8.5	8.0	12.5
Abruzzi e Molise . . . . .	3.1	4.2	4.7	6.5
Campania . . . . .	3.9	5.1	5.7	9.9
Puglie . . . . .	3.0	3.2	3.6	5.9
Lucania . . . . .	3.1	2.4	3.0	5.1
Calabrie . . . . .	2.7	3.4	3.1	5.6
Sicilia . . . . .	3.7	5.2	5.6	9.8
Sardegna . . . . .	4.0	5.5	6.0	7.6
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>3.4</b>	<b>4.8</b>	<b>4.9</b>	<b>8.6</b>

**Numeri indici della mortalità per diabete mellito** (b).PROSPETTO **XXXIII-B.**

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	178	169	341	85	107	100	114
Liguria . . . . .	147	146	282	167	173	169	185
Lombardia . . . . .	149	157	271	83	87	90	88
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	66
Veneto . . . . .	151	130	245	81	86	73	78
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	96
Emilia . . . . .	133	143	270	89	84	88	94
Toscana . . . . .	139	125	222	118	116	103	103
Marche . . . . .	132	130	250	104	97	94	102
Umbria . . . . .	118	160	294	105	87	116	121
Lazio . . . . .	164	154	241	153	177	163	144
Abruzzi e Molise . . . . .	134	152	209	92	87	97	76
Campania . . . . .	131	147	255	114	106	116	114
Puglie . . . . .	107	119	197	88	67	73	68
Lucania . . . . .	77	96	164	92	50	61	59
Calabrie . . . . .	128	117	210	78	71	63	65
Sicilia . . . . .	140	151	265	109	108	114	114
Sardegna . . . . .	137	151	191	118	114	123	89
<b>REGNO</b> { <b>vecchi confini</b> (c) . . . . .	<b>141</b>	<b>145</b>	<b>256</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ <b>attuali confini</b> . . . . .							<b>100</b>

(\*) Sono compresi i morti per *diabete insipido* (cifre trascurabili).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.



**Quozienti specifici di mortalità per diabete mellito.**

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

## PROSPETTO XXXIV.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02 (*)			1910-12 (*)			1920-22 (*)			1930-32		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
0-9 . . . . .	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04
10-14 . . . . .	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06
15-24 . . . . .	0.14	0.09	0.11	0.14	0.09	0.12	0.12	0.07	0.10	0.13	0.09	0.11
25-34 . . . . .	0.22	0.12	0.17	0.23	0.16	0.19	0.20	0.14	0.17	0.25	0.15	0.19
35-44 . . . . .	0.34	0.20	0.27	0.39	0.25	0.32	0.34	0.25	0.29	0.40	0.32	0.36
45-54 . . . . .	0.71	0.37	0.53	0.91	0.53	0.71	0.78	0.62	0.70	1.19	1.02	1.10
55-64 . . . . .	1.51	0.92	1.21	2.20	1.44	1.81	2.01	1.58	1.79	3.21	3.21	3.21
65- <sup>(a)</sup> . . . . .	2.37	1.18	1.77	3.35	2.13	2.73	3.37	2.38	2.87	5.85	5.36	5.60
<b>Totale (a) . .</b>	<b>0.43</b>	<b>0.24</b>	<b>0.34</b>	<b>0.58</b>	<b>0.38</b>	<b>0.48</b>	<b>0.56</b>	<b>0.42</b>	<b>0.49</b>	<b>0.89</b>	<b>0.84</b>	<b>0.86</b>

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 50\*.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

**Convulsioni nei bambini in età inferiore ai 5 anni.**

Il quoziente di mortalità per *convulsioni* nei bambini, in età inferiore ai 5 anni, nel Regno, è diminuito progressivamente e sensibilmente dall'anno 1925 (a) (291 per un milione di abitanti) al 1930 (157). Nel 1931 e nel 1932 si nota ancora una nuova diminuzione, e cioè, 149 e 138, rispettivamente, per ogni milione di abitanti.

Poichè spesso, con la voce *convulsioni* viene indicato l'episodio finale della malattia, è da ritenere che, almeno in parte, la diminuzione della mortalità sia dovuta ad una più esatta specificazione della malattia prima, e della quale lo stato eclampico ha rappresentato l'accidente terminale.

È da notare, inoltre, che dal 1924 furono tenute distinte dalle malattie delle *ghiandole tiroidi, paratiroidi e del timo*, quelle delle *ghiandole paratiroidi* delle quali, in massima parte, lo stato spasmodico è l'espressione.

Forti differenze si osservano nella mortalità fra i singoli Compartimenti: nel 1931, dai massimi di 54,6 su 100 000 abitanti nella Lucania, di 40,2 nelle Calabrie, di 39,9 nella Campania e di 32,7 nelle Puglie, si scende a cifre minime di 3,5 nel Piemonte, di 3,9 nella Liguria, di 4,8 nella Toscana, di 4,9 nella Lombardia e nella Sardegna e di 5,9 nell'Emilia. Nel 1932, dai massimi di 43,9 nella Lucania, di 38,8 nella Campania, di 32,2 nelle Calabrie e di 31,4 nelle Puglie, si scende a cifre minime di 2,1 nella Liguria, di 3,1 nel Piemonte, di 4,1 nella Sardegna, di 4,2 nella Lombardia, di 4,9 nella Toscana e di 5,8 nell'Emilia.

(a) La comparabilità dei dati per le *convulsioni* nei bambini, in età inferiore ai 5 anni, si può fare per gli anni dal 1925 in poi, perchè, da tale anno, i morti per detta causa, in età non inferiore ai 5 anni, non furono più compresi in questa voce, mentre precedentemente vi erano compresi i morti di età non superiore ai 15 anni.

**Quozienti specifici di mortalità per convulsioni nei bambini  
in età inferiore ai cinque anni.**

(Cifre proporzionali a 10000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO XXXV.

SESSO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Maschi . . . . .	43.17	37.15	35.62	14.26
Femmine . . . . .	37.11	32.78	31.21	12.33
<b>Totale . . .</b>	<b>40.20</b>	<b>35.01</b>	<b>33.47</b>	<b>13.31</b>

Mettendo a confronto la mortalità dei Compartimenti, negli anni 1931 e 1932, con quella del 1929 e 1930 si nota: 1° che, in generale, i massimi ed i minimi della mortalità si sono verificati negli stessi Compartimenti, nei quattro anni suddetti; 2° che nella maggiore parte di essi, nel 1932, vi è una più o meno sensibile diminuzione della mortalità per *convulsioni* nei bambini in età inferiore ai 5 anni, rispetto all'anno 1931.

Il numero dei maschi morti è maggiore di quello delle femmine, come risulta in tutti gli anni dal 1925 al 1932.

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per *convulsioni*, nei bambini in età inferiore ai 5 anni, secondo il sesso (prospetto XXXV), si rileva come la mortalità sia andata sempre diminuendo nei primi tre trienni considerati per subire una notevolissima diminuzione nel 1930-32 (il 67 % a confronto del 1900-02) cui forse non sono estranei e le accennate variazioni nella nomenclatura nosologica ed una maggiore esattezza di diagnosi.

La mortalità si presenta nei trienni considerati costantemente superiore nel sesso maschile.

### Malattie del cuore.

Esaminando il prospetto XXXVI-B risulta che, per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per le malattie del *cuore*, nei periodi 1910-12, 1920-22, ha superato il periodo base, rappresentato dal triennio 1900-02, rispettivamente del 7 e del 5 %, mentre, nel triennio 1930-32, la mortalità è diminuita del 9 % in confronto allo stesso periodo base.

Nei Compartimenti l'andamento, nel tempo, pure essendo alquanto diverso da quello del complesso del Regno, mostra che nel triennio 1930-32 si è avuta una diminuzione in quasi tutti i Compartimenti in confronto al periodo base. Fanno eccezione il Piemonte, la Liguria, gli Abruzzi e Molise, le Puglie, la Sicilia e la Sardegna.

Nello stesso prospetto, in cui è fatta uguale a 100 la mortalità media del Regno, si rileva che la mortalità per malattie del *cuore* è stata superiore a quella del Regno, in tutti i periodi esaminati, nel Piemonte, Liguria, Lombardia (cui si aggiunge anche la Venezia Tridentina, nel triennio 1930-32), negli Abruzzi e Molise, nella Campania e nella Lucania.

Aggiungiamo inoltre che il numero dei maschi morti per malattie del cuore è inferiore a quello delle femmine, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1932; che tali malattie danno assai più della metà dei morti in età da 60 a 79 anni, mentre pochi sono i casi di morte nell'età infantile.

Esaminando i quozienti specifici di mortalità secondo il sesso e l'età (prospetto XXXVII), si rileva che, nel complesso, in tutti i periodi considerati, la mortalità risulta sensibilmente superiore nel sesso femminile. Ciò si verifica anche nei singoli gruppi di età, eccetto nell'età 0-4 anni nei trienni 1900-02, 1910-12 e 1920-22 e nell'età 15-24 nel triennio 1920-22.

La mortalità per malattie del cuore, dopo aver subito nei trienni 1900-02, 1910-12 e 1920-22 una diminuzione nell'età 5-9 a confronto dell'età 0-4, comincia nei gruppi di età successivi ad aumentare gradualmente, per raddoppiarsi, all'incirca, nell'età 45-54 a confronto dell'età 35-44 e aumentare rapidamente nei gruppi di età successivi. Lo stesso comportamento si ha nel biennio 1931-32, però, non si nota una diminuzione della mortalità nell'età 5-9 a confronto dell'età 0-4, ma già il principio del graduale andamento suindicato.

Nel 1931-32, a confronto del triennio 1900-02, si dimostra una diminuzione percentuale dell'8 % della mortalità per malattie del cuore. Questa diminuzione, che appare più accentuata nelle femmine (10 %) che nei maschi (6 %), si verifica in tutte le classi di età ed è particolarmente manifesta nella classe di età 0-4 fra il 1920-22 e il 1931-32, il che presumibilmente può essere dovuto anche al numero non notevole dei casi caduti sotto osservazione.

#### Mortalità per malattie del cuore (per 100 000 abitanti).

PROSPETTO XXXVI-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	210,8	238,2	235,1	215,9
Liguria . . . . .	181,5	196,6	201,0	190,1
Lombardia . . . . .	196,6	206,5	198,7	170,9
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	196,9
Veneto . . . . .	157,0	167,3	157,8	141,6
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	117,8
Emilia . . . . .	165,2	167,7	161,2	144,2
Toscana . . . . .	182,4	158,5	166,0	141,0
Marche . . . . .	190,0	195,5	193,7	140,4
Umbria . . . . .	179,1	188,7	185,6	150,3
Lazio . . . . .	148,5	154,9	148,3	127,2
Abruzzi e Molise . . . . .	172,6	191,8	193,9	173,0
Campania . . . . .	209,0	210,1	194,5	167,2
Puglie . . . . .	137,2	158,0	152,4	138,7
Lucania . . . . .	180,8	193,2	205,4	162,4
Calabrie . . . . .	144,8	161,0	178,1	137,8
Sicilia . . . . .	107,3	141,5	145,3	122,5
Sardegna . . . . .	94,4	130,5	122,0	99,2
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>169,8</b>	<b>181,9</b>	<b>178,0</b>	<b>153,7</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

## Numeri indici della mortalità per malattie del cuore (a).

PROSPETTO XXXVI-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	113	112	102	124	131	132	140
Liguria . . . . .	108	111	105	107	108	113	124
Lombardia . . . . .	105	101	87	116	114	112	111
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	128
Veneto . . . . .	107	100	90	92	92	89	92
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	77
Emilia . . . . .	102	98	87	97	92	91	94
Toscana . . . . .	87	91	77	107	87	93	92
Marche . . . . .	103	102	74	112	107	109	91
Umbria . . . . .	105	104	84	105	104	104	98
Lazio . . . . .	104	100	86	87	85	83	83
Abruzzi e Molise . . . . .	111	112	100	102	105	109	113
Campania . . . . .	101	93	80	123	115	109	109
Puglie . . . . .	115	111	101	81	87	86	90
Lucania . . . . .	107	114	90	106	106	115	106
Calabrie . . . . .	111	123	95	85	89	100	90
Sicilia . . . . .	132	135	114	63	78	82	80
Sardegna . . . . .	138	129	105	56	72	69	65
<b>REGNO</b> { vecchi confini (b) . . . . .	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .							<b>100</b>

## Quozienti specifici di mortalità per malattie del cuore.

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

PROSPETTO XXXVII.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1931-32(*)		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-4 . . . . .	2.13	1.84	1.99	2.68	2.37	2.53	3.43	2.90	3.17	0.68	0.71	0.69
5-9 . . . . .	1.30	1.55	1.42	1.23	1.31	1.27	1.28	1.42	1.35	0.70	0.77	0.74
10-14 . . . . .	1.41	1.92	1.66	1.41	1.80	1.60	1.55	1.95	1.75	1.08	1.40	1.24
15-24 . . . . .	2.25	2.71	2.48	2.48	2.74	2.61	2.44	2.35	2.39	1.50	1.74	1.62
25-34 . . . . .	3.09	5.02	4.08	3.34	4.77	4.10	3.20	3.84	3.54	2.07	2.88	2.49
35-44 . . . . .	5.67	8.81	7.26	6.55	8.79	7.72	5.39	7.21	6.34	4.06	5.34	4.76
45-54 . . . . .	12.58	16.35	14.49	13.44	16.60	15.05	12.24	14.98	13.62	8.94	11.85	10.47
55-64 . . . . .	35.56	48.10	41.92	36.31	47.26	41.87	33.54	43.07	38.35	27.36	34.71	31.15
65- w . . . . .	138.47	183.07	160.95	146.97	192.77	170.14	144.12	184.39	164.58	132.03	160.39	146.83
<b>Totale (c) . . . . .</b>	<b>14.46</b>	<b>19.47</b>	<b>16.98</b>	<b>15.93</b>	<b>20.46</b>	<b>18.23</b>	<b>15.70</b>	<b>19.81</b>	<b>17.78</b>	<b>13.59</b>	<b>17.48</b>	<b>15.58</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (d) a pag. 13\*.

(\*) Non si sono dati i quozienti specifici per il triennio 1930-32, perchè nella tavola in cui i morti nel 1930 sono classificati per età, le malattie del cuore si trovano unite a quelle del pericardio. Nel biennio 1931-32 vi sono compresi i decessi per malattie di Hodgson, di Adams-Stokes e per Tachicardia.

**Bronchite acuta e cronica (\*)**

Nel Regno, la mortalità per *bronchiti (acute e croniche)*, attraverso oscillazioni più o meno ampie nel lungo periodo di osservazione che va dal 1887 al 1932, ha un andamento decrescente con un massimo nel triennio 1890-92 (2611 morti su 1 000 000 di abitanti) ed un minimo nel 1930 (419). Nel 1918, in rapporto con la *pandemia influenzale*, si nota un accentuatissimo balzo in aumento della mortalità per *bronchiti* a confronto dell'anno antecedente e susseguente (1733 nel 1918, 1273 nel 1917 e 1053 nel 1919); nel 1931 e nel 1932 la mortalità è stata, rispettivamente, di 461 e di 450 morti su un milione di abitanti, con una diminuzione, cioè, di circa l'80 % a confronto del triennio 1887-89. Occorre però notare che nel 1924 furono mutati i criteri di classificazione, essendosi classificate le morti per *bronchite capillare*, non più fra le *bronchiti acute* ma fra le *bronco polmoniti*.

Volendosi considerare le morti per *bronchite acuta* separatamente da quelle per *bronchite cronica*, è bene tener presente che, negli anni anteriori al 1931, i morti per *bronchite (senz'altra indicazione sulla scheda)*, al di sopra di 60 anni e prima di 60 anni, erano classificati, rispettivamente, fra i decessi per *bronchite cronica* e per *bronchite acuta*.

Nella nuova nomenclatura nosologica, invece, i morti per *bronchite senza altra indicazione*, negli anni 1931 e 1932, sono stati classificati in una voce separata, e quindi le proporzioni per 100 000 abitanti, qui appresso indicate, per le due specie di *bronchite*, non sono comparabili con quelle date nelle statistiche degli anni anteriori al 1931.

I Compartimenti in cui la mortalità per *bronchite acuta* raggiunse il massimo furono nel 1931 la Lucania (23,4 per ogni 100 000 abitanti), le Puglie (14,4) e gli Abruzzi e Molise (12,9); i minimi si ebbero nella Venezia Tridentina (3,3), nella Toscana (4,1), nel Piemonte (4,3) e nella Lombardia (4,6). Nel 1932 i massimi della mortalità per *bronchite acuta* si verificarono nei seguenti Compartimenti: Lucania (21,0), Puglie (17,0), Calabrie (10,8) e Sicilia (10,0); i minimi si ebbero nella Venezia Tridentina (3,8), nella Lombardia e Toscana (4,0), nel Piemonte e Marche (4,4) e nella Liguria (4,6).

I Compartimenti in cui la mortalità per *bronchite cronica* raggiunse i massimi furono, nel 1931, la Lucania (38,2 su 100 000 abitanti), le Puglie (26,2) e gli Abruzzi e Molise (23,1); i minimi si ebbero nella Venezia Tridentina (10,5), nella Liguria (11,5) e nella Lombardia (12,5). Nel 1932, i massimi della mortalità per *bronchite cronica* si verificarono nella Lucania (38,3), nelle Puglie (27,9) e negli Abruzzi e Molise (24,6); i minimi si ebbero nella Liguria (9,4), nella Venezia Tridentina (10,5), nel Veneto (11,1) e nella Lombardia (12,2).

In generale, quindi, la mortalità per *bronchite acuta* e la mortalità per *bronchite cronica* hanno i massimi e minimi negli stessi Compartimenti.

---

(\*) Nella nomenclatura usata dall'Istituto fin dal 1924, nei morti per *bronchiti* vi sono compresi anche i decessi per *catarro soffocante* (7 casi nel 1931, veggasi l'Allegato I), che invece a cominciare dal 1931 sono compresi nella voce «*congestione, edema, embolia, infarto emorragico e trombosi del polmone*».

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per *bronchite cronica* secondo il sesso e l'età (prospetto XVIII), si rileva come nel complesso la mortalità nei periodi triennali considerati, sia superiore nel sesso femminile. Questo comportamento si verifica, salvo rare eccezioni, anche nei singoli gruppi di età per i primi tre trienni considerati. Nel triennio 1930-32, invece, sembra che questo rapporto, in genere, si inverta, in quanto solamente nei gruppi di età 10-14, 20-24, 60-64, 65-69 e 70-74 la mortalità risulta maggiore nelle femmine, mentre nei rimanenti gruppi di età considerati la mortalità risulta superiore nei maschi od uguale in ambedue i sessi, presumibilmente a causa del diverso metodo di classificazione adoperato per i morti per *bronchite*, come già si è detto.

In genere, la mortalità minima per *bronchite cronica* si ha nell'età da 10 a 19 anni e la massima nelle età avanzate.

Nel tempo, dal triennio 1900-02 al 1920-22, la mortalità per *bronchite cronica* mostra una diminuzione, che si rileva notevolmente più accentuata nel sesso femminile, mentre nel triennio 1930-32 detta mortalità è alquanto risalita.

A complemento delle notizie sopra dette aggiungiamo che: il numero delle femmine morte per il complesso delle *bronchiti* è superiore a quello dei maschi, sia nel 1931 che nel 1932; il maggior numero dei morti si ha nei mesi freddi, ed infatti nel 1931 i massimi si notano in febbraio, gennaio, marzo e dicembre, e nel 1932 in marzo, febbraio e gennaio, verificandosi nei singoli Compartimenti, all'incirca, lo stesso comportamento; i morti per *bronchite acuta* appartengono, per la maggior parte, a bambini in età da 0 a 2 anni; nel biennio 1931-32 la mortalità per *bronchite acuta* nei bambini nel primo anno di vita, è stata superiore, in modo però non notevole, nei legittimi (45,0 su 10 000 nati vivi) a confronto degli illegittimi ed esposti (42,9).

### Broncopolmonite acuta e polmonite lobare.

A) *Broncopolmonite acuta*. — Nelle statistiche delle cause di morte, i decessi per *bronchite capillare* furono classificati, fino a tutto il 1923, fra le *bronchiti acute* e, dal 1924 in poi, fra le *broncopolmoniti*; per questo, la comparazione nel tempo della mortalità per *broncopolmonite* è possibile solo dal 1924. Essa ha una tendenza alla diminuzione, con riesacerbazioni nel 1926 e nel 1929, nei quali anni anche la mortalità per *influenza* ha avuto notevoli aumenti in confronto degli anni contigui, onde è a presumersi che gli aumenti bruschi della mortalità per *broncopolmonite*, verificatisi in detti anni, siano principalmente dovuti a forme di origine *influenzale* e per le quali tale natura non era indicata; chè altrimenti sarebbero state classificate fra le morti dovute ad *influenza*. Nel 1930 essa raggiunse il minimo (1231 per un milione di abitanti) e risalì nel 1931 (1358) e nel 1932 (1416).

La mortalità nei singoli Compartimenti oscilla, nel 1931, fra un minimo di 73 su 100 000 abitanti nella Venezia Tridentina (83, pure nella Venezia Tridentina, nel 1932), ed un massimo, nel 1931, di 205 nella Lucania (230, nella Campania, nel 1932): generalmente i più alti quozienti di mortalità si riscontrano nell'Italia Meridionale ed Insulare.

Le morti per *broncopolmonite* sono più numerose nei maschi che nelle femmine, come risulta in tutti gli anni del periodo di osservazione dal 1899 al 1932, fatta eccezione, però, per gli anni 1918 e 1920, nei quali dette morti sono state più numerose nelle femmine in confronto ai maschi.

B) *Polmonite lobare*. — Solo dal 1899 i morti per *polmonite lobare* furono distinti dai morti per *bronco polmonite*. La mortalità media annua per *polmonite lobare* dal 1899 al 1907, desunta da medie triennali, fu superiore a quella per *broncopolmonite*; nei trienni 1908-10 e 1911-13 e negli anni successivi essa fu sempre inferiore, sino a distanziarsene, in questi ultimi anni, di più della metà.

Poichè non si è modificato con l'andar del tempo il criterio di classificazione dei dati e poichè le oscillazioni annue della mortalità per *polmonite lobare* sono generalmente sincrone con quelle della mortalità per *broncopolmonite*, è a suporsi una reale diminuzione di essa.

Il minimo della mortalità si ebbe nel 1930 (558 morti per un milione di abitanti): come per la *broncopolmonite*, essa aumentò, rispettivamente, a 613 e 634 nel 1931 e nel 1932.

La mortalità nei singoli Compartimenti oscilla fra un minimo di 39 su 100 000 abitanti (Marche) ed un massimo di 87 (Puglie) nel 1931; nel 1932, fra un minimo di 41 (Veneto) ed un massimo di 90 (Campania). Se si eccettua la Venezia Tridentina, che occupa in ambedue gli anni il penultimo posto in una scala crescente della mortalità per Compartimenti, la mortalità più intensa si riscontra nei Compartimenti dell'Italia Meridionale e Insulare: fanno eccezione per il 1932 gli Abruzzi e Molise.

Le morti per *polmonite lobare* sono notevolmente più numerose nei maschi che nelle femmine, forse in relazione alla maggiore esposizione dei maschi alle cause predisponenti, come raffreddamenti, strapazzi, ecc. e ciò risulta in tutti gli anni del periodo di osservazione dal 1899 al 1932, fatta eccezione per il 1918, l'anno della *pandemia influenzale*, nel quale dette morti sono state in numero maggiore nelle femmine in confronto ai maschi.

Il maggior numero di morti per *broncopolmonite* e *polmonite lobare* nel Regno, si verifica nei mesi freddi: nel 1931, i massimi si ebbero in febbraio, gennaio, marzo e dicembre; nel 1932, i massimi si verificarono in marzo, febbraio e gennaio. I minimi, nel 1931, si ebbero in settembre, agosto, luglio e giugno, e nel 1932, in settembre, ottobre, agosto e luglio.

Un andamento quasi analogo si osserva nei singoli Compartimenti.

Nei primi due anni di vita si ha un forte numero di bambini morti per questo gruppo di cause; il numero dei morti diminuisce nelle età della fanciullezza e giovinezza ed incomincia, in genere, ad accentuarsi a partire dall'età di 30 anni, per subire un graduale aumento col passare alle età avanzate.

Nel biennio 1931-32 la mortalità per *broncopolmonite* e *polmonite lobare*, nei bambini nel primo anno di vita, è stata inferiore nei legittimi (177,6 su 10 000 nati vivi) a confronto degli illegittimi ed esposti (219,5).

### Enteriti al disotto di 2 anni (\*).

Dal 1924, le morti per *enteriti*, nei bambini in età inferiore ai 2 anni, sono state tenute distinte, per tutte le classificazioni, da quelle avvenute, per la stessa causa, in individui di età superiore a 2 anni.

Nel periodo 1924-32 si nota, nel Regno, nella mortalità per *enteriti* nei bambini al disotto di 2 anni, un aumento fino all'anno 1926 ed una tendenza alla diminuzione dal 1927 in poi; ed infatti, tale mortalità fu di 1611, per ogni milione di abitanti nel 1924, di 1618 nel 1925, di 1716 nel 1926, di 1666 nel 1927, di 1682 nel 1928, di 1510 nel 1929, di 1363 nel 1930, di 1374 nel 1931 e di 1228 nel 1932.

Il numero dei maschi morti per *enteriti* è maggiore di quello delle femmine, come risulta in tutti gli anni dal 1895 al 1932.

Il numero dei morti, nel Regno, per il 1931, comincia a salire nel mese di giugno, raggiunge i massimi in luglio e agosto, per poi discendere nei mesi successivi; anche nel 1932, nel 1929 e 1930 si ha un andamento, all'incirca, analogo, il che conferma, quanto era già noto sulla maggiore frequenza delle malattie del tubo digerente nei mesi estivi. Un andamento poco differente si osserva nei singoli Compartimenti.

Nel biennio 1931-32, con lo stesso comportamento verificatosi nel biennio 1929-30, la mortalità dei bambini per *enteriti* nel primo anno di vita, è stata maggiore fra gli illegittimi ed esposti (426,9 su 10 000 nati vivi) che fra i legittimi (391,6).

Esaminando i quozienti specifici di detta mortalità, dati nel prospetto XXXVIII, notasi come essa, nel Regno, sia diminuita sensibilmente nel 1930-32 a

#### Quozienti specifici di mortalità per enteriti (al disotto di due anni).

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

##### PROSPETTO XXXVIII.

SESSO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Maschi . . . . .	410.67	297.44	330.66	287.19
Femmine . . . . .	403.59	288.55	313.99	278.74
<b>Totale . . .</b>	<b>407.20</b>	<b>293.08</b>	<b>322.53</b>	<b>283.05</b>

confronto del 1900-02, pur dimostrando, nel 1920-22, un discreto aumento rispetto al triennio 1910-12. La mortalità è sempre, nei quattro trienni considerati, superiore nel sesso maschile.

Esaminando poi i quozienti specifici per Compartimenti, calcolati sulla media annua desunta dal triennio 1930-32 (prospetto XXXIX), si rileva che 9 Compartimenti (Liguria, Toscana, Emilia, Marche, Piemonte, Veneto, Venezia Giulia

(\*) Nella nomenclatura usata dall'Istituto Centrale di Statistica dal 1924 al 1930, in questa voce non erano comprese l'*infezione intestinale* e l'*enterocolite muco membranosa* al disotto di due anni.



e Zara, Venezia Tridentina ed Umbria) hanno una mortalità non superiore al 212,6 per 10 000 censiti della stessa età; per gli altri Compartimenti essa è superiore con un massimo di 542,8 per la Lucania. La massima parte dei Compartimenti (10 su 18), e cioè i 9 sopracitati più il Lazio, hanno una mortalità che oscilla fra 112 e 213; 5 Compartimenti fra 296 e 367; 3 Compartimenti (Puglie, Sicilia e Lucania) fra 410 e 542.

### Quozienti specifici di mortalità per enteriti (al disotto di due anni).

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età).

#### PROSPETTO XXXIX.

COMPARTIMENTI	1930-32 (*)	COMPARTIMENTI	1930-32 (*)	COMPARTIMENTI	1930-32 (*)
Liguria . . . . .	112.5	Venezia Giulia e Zara	187.2	Campania . . . . .	335.8
Toscana . . . . .	123.5	Venezia Tridentina .	202.7	Lombardia . . . . .	366.8
Emilia . . . . .	141.6	Umbria . . . . .	212.6	Abruzzi e Molise . .	367.6
Marche . . . . .	173.5	Lazio . . . . .	213.0	Puglie . . . . .	410.6
Piemonte . . . . .	179.7	Sardegna . . . . .	296.7	Sicilia . . . . .	428.8
Veneto . . . . .	185.0	Calabrie . . . . .	309.2	Lucania . . . . .	542.8

(\*) Media annuale.

### Cirrosi alcoolica del fegato e alcoolismo cronico.

Nei trienni 1900-02, 1910-12 e 1920-22, i morti per *cirrosi alcoolica del fegato* erano stati inclusi in un'unica voce: *epatite e cirrosi*. Per dedurre, quindi, da questa unica voce, i morti per *cirrosi epatica* di origine *alcoolica* nei suddetti tre trienni, si è supposto che essi stessero al totale dei morti per *malattie epatiche* nella stessa proporzione verificatasi per il settennio 1924-30 tanto nel Regno, quanto in ciascun Compartimento, e ciò allo scopo di dare per queste cause di morte, data l'importanza sociale di esse, notizie particolareggiate analoghe a quelle date per le precedenti malattie.

Dall'esame del prospetto XI-B risulta che la mortalità per *cirrosi alcoolica del fegato* ed *alcoolismo cronico* nel Regno, nei vecchi confini, ha avuto un notevole aumento nel triennio 1910-12 rispetto al periodo base 1900-02 (46 %), mentre nei trienni 1920-22 e 1930-32, rispetto al 1900-02, l'aumento è risultato poco notevole (3 %).

Esaminando i numeri indici dei singoli Compartimenti, si nota quanto segue:

Nel triennio 1910-12, tutti i Compartimenti hanno dimostrato un aumento di mortalità per *cirrosi alcoolica del fegato* ed *alcoolismo cronico* rispetto al triennio 1900-02, e specialmente il Lazio, nel quale si è verificato l'aumento del 107 %. Nel triennio 1920-22, invece, in tutti i Compartimenti si nota una diminuzione di mortalità in confronto al triennio 1910-12, e nel 1930-32, in confronto al 1920-22, si nota pure una diminuzione di mortalità nella Liguria, Veneto, Emilia, Lazio, Puglie e Calabrie, mentre nei restanti Compartimenti si osserva il fatto opposto.

**Mortalità per cirrosi alcoolica del fegato e alcoolismo cronico (per 100 000 abitanti).**

PROSPETTO XL-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	2.7	3.5	2.7	3.9
Liguria . . . . .	3.3	4.1	3.6	2.0
Lombardia . . . . .	2.8	3.4	2.2	2.3
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	2.5
Veneto . . . . .	3.9	5.5	3.9	2.4
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	2.0
Emilia . . . . .	1.5	2.4	2.1	2.1
Toscana . . . . .	1.1	1.9	1.3	1.6
Marche . . . . .	2.8	5.2	3.0	3.4
Umbria . . . . .	1.6	2.9	2.3	3.1
Lazio . . . . .	1.7	3.5	2.1	1.5
Abruzzi e Molise . . . . .	1.0	1.9	1.5	1.7
Campania . . . . .	0.7	1.1	0.9	1.3
Puglie . . . . .	0.8	0.9	0.7	0.5
Lucania . . . . .	0.6	0.8	0.4	0.8
Calabria . . . . .	0.8	1.5	0.9	0.8
Sicilia . . . . .	0.6	0.7	0.4	0.7
Sardegna . . . . .	2.3	3.5	1.6	1.8
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>1.8</b>	<b>2.7</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>

**Numeri indici della mortalità per cirrosi alcoolica del fegato e alcoolismo cronico (b).**

PROSPETTO XL-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	132	101	145	146	131	143	203
Liguria . . . . .	122	108	59	182	152	191	103
Lombardia . . . . .	122	79	84	151	126	116	123
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	132
Veneto . . . . .	143	102	61	210	206	206	123
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	107
Emilia . . . . .	158	141	139	82	89	112	110
Toscana . . . . .	169	115	141	62	72	69	84
Marche . . . . .	184	108	120	154	194	161	177
Umbria . . . . .	176	139	189	90	108	121	163
Lazio . . . . .	207	126	89	91	129	111	77
Abruzzi e Molise . . . . .	182	148	161	57	70	81	87
Campania . . . . .	158	119	175	40	43	46	67
Puglie . . . . .	116	84	71	42	33	34	29
Lucania . . . . .	138	70	130	33	31	23	41
Calabria . . . . .	188	108	100	43	56	45	42
Sicilia . . . . .	125	74	119	31	26	22	36
Sardegna . . . . .	155	71	81	123	131	85	97
<b>REGNO</b> { vecchi confini (c) . . . . .	<b>146</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

Passando ad esaminare, nei vari periodi, i numeri indici della mortalità predetta nei singoli Compartimenti, fatta uguale a 100 la mortalità del Regno, si può presumere che il consumo dell'alcool debba essere tuttora, in genere, più diffuso (tenuto conto del periodo di tempo necessario allo stabilirsi delle alterazioni anatomo-patologiche e funzionali proprie di tale malattia) nell'Italia Settentrionale e Centrale che non nella Meridionale e specialmente nella Sicilia. Nella Sardegna, la mortalità per *cirrosi alcoolica del fegato ed alcoolismo cronico* supera la media del Regno nei primi due periodi considerati, mentre nei trienni 1920-22 e 1930-32, ne è inferiore.

### Malattie della gravidanza, parto e puerperio.

La mortalità per malattie della *gravidanza, parto e puerperio* è stata calcolata mettendo in rapporto il numero delle donne morte per tali malattie col numero dei parti avvenuti durante i periodi in esame (prospetto XLI).

Dal triennio 1887-89 al quinquennio 1900-04, la mortalità suddetta ha subito una progressiva e notevole diminuzione: nel 1900-04 la diminuzione raggiunta è del 54 % in confronto del periodo base. Dopo un lieve rialzo nel quinquennio 1905-1909, la mortalità ha raggiunto un minimo nel 1910-14 (23,6 per 10 000 parti) e poi, può dirsi, stabilizzata intorno al 27 per 10 000 parti.

#### Mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio, dal 1887 al 1932.

PROSPETTO XLI.

P E R I O D I	MORTE PER MALATTIE DELLA GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO		NUMERI INDICI (mortalità del triennio 1887-89 = 100)
	cifre assolute	su 10 000 parti	
1887-89 (media annuale) . . . . .	6 643	56,8	100
1890-94 » » . . . . .	4 055	35,5	63
1895-99 » » . . . . .	3 436	30,6	54
1900-04 » » . . . . .	2 872	26,0	46
1905-09 » » . . . . .	3 101	27,4	48
1910-14 » » . . . . .	2 730	23,6	42
1915-19 » » . . . . .	2 293	27,1	48
1920-24 » » . . . . .	3 114	26,7	47
1925-29 » » . . . . .	2 958	26,6	47
1930 . . . . .	2 976	26,6	47
1931 . . . . .	2 854	27,2	48
1932 . . . . .	2 951	29,2	51
1930-32 (media annuale) . . . . .	2 927	27,6	49

La mortalità per malattie della *gravidanza, parto e puerperio* può scindersi in due componenti: la prima, dovuta alle *infezioni puerperali*, la seconda alle altre malattie della *gravidanza, parto e puerperio*.

La mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali* (prospetto XLII) è discesa del 74 % dal 1887-89 al 1910-14; negli anni successivi essa è tornata leggermente ad aumentare, e sembra, dal 1925 ad oggi, essersi stabilizzata intorno al 10,5 per 10 000 parti.

La riduzione della mortalità per *setticemia* ed altre *infezioni puerperali* ha risentito più che la mortalità per le altre malattie della *gravidanza, parto e puerperio* delle migliorate condizioni di assistenza e profilassi.

## Mortalità per setticemia ed infezioni puerperali, compreso l'aborto settico, dal 1887 al 1932.

PROSPETTO XLII.

P E R I O D I	PARTI SEMPLICI e MUL- TIPLI (a)	MORTE PER SETTICEMIA ED INFEZIONI PUERPERALI		NUMERI INDICI (mortalità del triennio 1887-89 = 100)
		cifre assolute	su 10 000 parti	
1887-89 (media annuale)	I 169 631	4 560	39.0	100
1890-94 » »	I 142 089	2 458	21.5	55
1895-99 » »	I 122 575	I 883	16.8	43
1900-04 » »	I 103 114	I 375	12.5	32
1905-09 » »	I 130 538	I 402	12.4	32
1910-14 » »	I 156 212	I 194	10.3	26
1915-19 » »	845 166	I 001	11.8	30
1920-24 » »	I 165 070	I 409	12.1	31
1925-29 » »	I 110 646	I 170	10.5	27
1930 . . . . .	I 116 908	I 132	10.1	26
1931 . . . . .	I 048 285	I 083	10.3	26
1932 . . . . .	I 012 143	I 163	11.5	29
1930-32 (media annuale)	I 059 112	I 126	10.6	27

## Mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio (per 10 000 parti).

PROSPETTO XLIII-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
m e d i e a n n u a l i												
Piemonte . . . . .	12.9	17.3	30.2	14.0	15.7	29.7	13.2	13.9	27.1	13.0	18.3	31.3
Liguria . . . . .	13.9	14.2	28.2	12.3	15.2	27.4	13.2	11.9	25.0	10.8	18.7	29.5
Lombardia . . . . .	13.7	13.0	26.8	10.5	13.2	23.6	14.0	14.6	28.6	11.9	16.4	28.3
Venezia Tridentina (b) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	24.3
Veneto . . . . .	9.3	12.7	22.0	6.0	11.9	17.9	7.2	11.1	18.3	9.3	14.3	23.6
Venezia Giulia e Zara(b) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	16.2	31.8
Emilia . . . . .	13.4	15.9	29.3	9.0	13.9	22.9	12.8	14.1	26.8	11.8	18.1	29.9
Toscana . . . . .	9.7	12.0	21.7	8.3	13.1	21.4	12.0	13.4	25.4	10.7	17.3	28.0
Marche . . . . .	10.0	13.1	23.1	8.3	13.3	21.7	10.2	13.3	23.4	8.5	13.9	22.3
Umbria . . . . .	12.5	16.0	28.6	14.5	14.8	29.3	15.4	14.3	29.6	10.7	18.0	28.6
Lazio . . . . .	14.0	12.9	26.9	10.3	12.3	22.6	14.5	13.4	28.0	12.6	18.2	30.7
Abruzzi e Molise . . . . .	12.8	17.3	30.1	11.2	19.2	30.4	13.0	19.3	32.4	10.2	21.2	31.4
Campania . . . . .	10.5	12.3	22.8	8.7	13.4	22.1	10.4	14.3	24.7	9.6	18.5	28.1
Puglie . . . . .	12.0	10.9	22.8	9.2	11.7	21.0	8.9	12.2	21.0	7.8	14.9	22.7
Lucania . . . . .	14.4	17.3	31.8	11.8	12.9	24.7	13.3	19.1	32.4	11.5	17.7	29.2
Calabrie . . . . .	15.7	15.8	31.5	14.3	15.4	29.8	13.4	16.2	29.5	11.5	15.8	27.2
Sicilia . . . . .	10.0	11.1	21.1	9.9	9.4	19.3	9.1	13.4	22.5	9.1	15.6	24.7
Sardegna . . . . .	19.4	25.6	44.9	14.9	22.5	37.3	16.8	18.5	35.4	11.7	20.7	32.4
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>12.1</b>	<b>13.9</b>	<b>25.9</b>	<b>10.0</b>	<b>13.4</b>	<b>23.4</b>	<b>11.4</b>	<b>14.0</b>	<b>25.4</b>	<b>10.6</b>	<b>17.0</b>	<b>27.6</b>

(a) Nel numero dei parti sono compresi anche quelli di nati morti.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

Nel prospetto XLIII-B, sono dati i numeri indici della mortalità per malattie della *gravidanza, parto e puerperio* nel complesso e nelle due componenti già accennate, per i periodi 1910-12, 1920-22 e 1930-32.

Fatto uguale a 100 il periodo base 1900-02, risulta, dagli indici contenuti nel suddetto prospetto, che nel Regno (nei vecchi confini) la mortalità in complesso è diminuita, dal 1900-02 al 1910-12, del 10 %; nel 1920-22 del 2 %; e nel 1930-32 è invece aumentata del 6 %.

La mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali* ha avuto, rispettivamente, una diminuzione del 17 %, del 5 % e del 13 %; mentre le altre malattie della *gravidanza, parto e puerperio* sono diminuite solo del 3 % nel periodo 1910-12, e sono aumentate, rispettivamente, dell'1 e del 23 % nei periodi 1920-22 e 1930-32.

La mortalità per il complesso delle malattie in esame, nel 1930-32, è inferiore a quella del periodo base solo in 4 Compartimenti (Marche, Lucania, Calabria e Sardegna); nell'Umbria e nelle Puglie è uguale. La mortalità per *setticemia e infezioni puerperali* è aumentata solo dell'1 % e del 10 %, rispettivamente, nel Piemonte e nella Toscana, mentre nel Veneto si è mantenuta allo stesso livello del periodo base; la mortalità per le restanti malattie della *gravidanza, parto e puerperio* è aumentata in tutti i Compartimenti, eccetto nelle Calabrie, in cui è rimasta uguale, e nella Sardegna, in cui ha subito una diminuzione del 19 %.

### Numeri indici della mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio (a).

PROSPETTO XLIII-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100								
	1910-12			1920-22			1930-32		
	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
	medie annuali								
Piemonte . . . . .	108	91	98	102	81	90	101	106	104
Liguria . . . . .	88	107	97	94	84	89	77	132	105
Lombardia . . . . .	76	101	88	102	112	107	87	126	106
Veneto . . . . .	65	94	82	78	88	83	100	113	107
Emilia . . . . .	68	87	78	95	89	91	88	114	102
Toscana . . . . .	85	109	98	123	112	117	110	144	129
Marche . . . . .	83	102	94	102	102	101	85	106	97
Umbria . . . . .	116	92	102	123	89	104	86	112	100
Lazio . . . . .	74	95	84	104	104	104	90	141	114
Abruzzi e Molise . . . . .	88	111	101	102	111	108	79	122	104
Campania . . . . .	83	108	97	99	116	108	92	150	123
Puglie . . . . .	77	108	92	74	112	92	65	137	100
Lucania . . . . .	82	75	78	92	110	102	79	102	92
Calabrie . . . . .	91	97	95	85	103	94	73	100	86
Sicilia . . . . .	98	85	91	91	121	107	90	141	117
Sardegna . . . . .	77	88	83	87	72	79	60	81	72
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>83</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>123</b>	<b>106</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

## Numeri indici della mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio. (a)

Segue: PROSPETTO XLIII-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	mortalità del Regno = 100											
	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
	medie annuali											
Piemonte . . . . .	107	125	116	139	117	127	114	100	106	123	107	113
Liguria . . . . .	116	102	109	123	113	117	115	85	99	102	110	107
Lombardia . . . . .	114	94	103	104	98	101	122	104	113	112	97	102
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	143	140
Veneto . . . . .	76	92	85	60	89	77	63	80	72	87	84	85
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	95	115
Emilia . . . . .	111	115	113	90	104	98	111	101	106	111	106	108
Toscana . . . . .	81	87	84	83	98	91	104	96	100	101	102	101
Marche . . . . .	83	94	89	83	100	93	88	95	92	80	82	81
Umbria . . . . .	103	115	110	144	110	125	134	102	117	101	106	104
Lazio . . . . .	116	93	104	104	92	97	126	96	110	118	107	111
Abruzzi e Molise . . . . .	106	125	116	113	143	130	114	138	127	96	124	113
Campania . . . . .	87	89	88	87	100	94	90	102	97	91	109	102
Puglie . . . . .	100	79	88	92	88	90	77	88	83	73	88	82
Lucania . . . . .	120	125	123	118	97	106	116	137	127	108	104	106
Calabrie . . . . .	130	114	121	144	115	127	117	116	116	108	93	98
Sicilia . . . . .	83	80	81	98	70	82	79	96	89	85	92	89
Sardegna . . . . .	161	185	173	149	168	160	146	132	139	110	122	117
<b>REGNO</b> { vecchi confini (b)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
{ attuali confini												

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(b) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

Fatta uguale a 100 la mortalità per il complesso delle suddette malattie nel Regno e confrontando ad essa la mortalità nei Compartimenti nel 1900-02, 1910-12, 1920-1922 e 1930-32, abbiamo che, costantemente, il Piemonte, la Lombardia, l'Umbria, gli Abruzzi e Molise, la Lucania e la Sardegna hanno una mortalità superiore a quella media del Regno.

Un analogo esame della mortalità per la *setticemia ed infezioni puerperali* ci fa notare che il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, l'Umbria, il Lazio, la Lucania, le Calabrie e la Sardegna, hanno, costantemente, una mortalità superiore a quella del Regno; mentre per le altre malattie della *gravidanza, parto e puerperio* la mortalità è, costantemente, superiore od uguale a quella del Regno per il Piemonte, l'Emilia, l'Umbria, gli Abruzzi e Molise e la Sardegna. Si aggiunga ancora che, nel triennio 1930-32, per il quale si hanno le notizie delle nuove Terre, la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia e Zara hanno una mortalità per il complesso delle malattie della *gravidanza, parto e puerperio*, superiore a quella media del Regno: ciò si osserva, per i due detti Compartimenti, anche nella mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali*, mentre la mortalità per le altre malattie della *gravidanza, parto e puerperio* solo nella Venezia Tridentina è superiore alla media del Regno.

A complemento delle predette notizie, aggiungiamo che, secondo lo stato civile, le 2853 donne morte nel 1931, in età da 15 a 54 anni, per malattie della *gravidanza, parto e puerperio* (comprese le *infezioni puerperali*) si ripartivano così: nubili 222, coniugate 2575, vedove 53 e di stato civile ignoto 3; nel 1932, le 2951 donne morte per le suddette malattie, si ripartivano in: 257 nubili, 2658 coniugate, 33 vedove, 1 divorziata e 2 di stato civile ignoto.

Esaminando i quozienti specifici per età (prospetto XLIV) si nota che la mortalità nelle donne per il complesso delle malattie della *gravidanza, parto e puerperio* è venuta scemando dal triennio 1900-02 al triennio 1930-32, e che la diminuzione maggiore si riscontra nell'età da 45 a 54 anni. In tutti i periodi considerati, il massimo della mortalità si osserva nell'età da 25 a 34 anni.

Le partorienti negli anni 1930, 1931 e 1932 sono state classificate secondo l'età e lo stato civile. Mettendo in rapporto il numero delle donne morte per malattie della *gravidanza, parto e puerperio* con il numero dei parti avvenuti nella stessa età (prospetto XLIV, ultima colonna), si rileva che la maggiore mortalità si verifica nell'età da 45 a 54 anni, fatto che concorda con la pratica clinica che insegna come esista una maggiore pericolosità del travaglio del parto nelle donne che per l'avanzata età hanno perduto l'elasticità giovanile dei tessuti degli organi genitali, necessaria per un normale espletamento di esso.

Esaminando poi i quozienti specifici di mortalità per malattie della *gravidanza, parto e puerperio*, ottenuti negli anni 1930, 1931 e 1932, mettendo in rapporto il numero delle donne in età da 15 a 54 anni, distinte secondo il loro stato civile, con il numero dei parti classificati anch'essi secondo lo stato civile delle partorienti (prospetto XLV), si rileva che nel complesso, la mortalità tende ad aumentare, essendosi verificato, nel 1932, un aumento percentuale del 9% a confronto del 1930.

La mortalità fra le donne nubili, vedove e divorziate è stata di circa il doppio di quella verificatasi per le coniugate, e l'aumento della mortalità nel 1932, a confronto del 1930, è notevolmente più sensibile fra le donne nubili, vedove e divorziate (18%) che fra le coniugate (8%).

**Quozienti specifici di mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio, nei trienni sottoindicati.**

PROSPETTO XLIV.

GRUPPI DI ETÀ	su 10000 donne censite della stessa età				su 10000 parti
	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32	1930-32
	medie annuali				
15-24 anni . . . . .	2.08	1.98	1.73	1.63	22.37
25-34 " . . . . .	5.59	4.79	4.89	4.01	23.83
35-44 " . . . . .	5.10	4.34	4.14	3.67	41.88
45-54 " . . . . .	0.42	0.31	0.35	0.21	58.83
<b>Totale (a) . . . . .</b>	<b>3.33</b>	<b>2.91</b>	<b>2.87</b>	<b>2.47</b>	<b>27.64</b>

(a) Esclusa l'età ignota.

**Quozienti specifici di mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio, nelle donne da 15 a 54 anni, distinte secondo lo stato civile, nel triennio 1930-32.**

(su 10 000 parti).

PROSPETTO XLV.

STATO CIVILE	ANNI			TRIENNIO 1930-32
	1930	1931	1932	
Nubili, vedove e divorziate . . . . .	46.12	50.86	54.43	50.40
Coniugate . . . . .	25.59	25.90	27.73	26.37
<b>Totale (a) . . . . .</b>	<b>26.62</b>	<b>27.19</b>	<b>29.14</b>	<b>27.61</b>

(a) Escluso lo stato civile ignoto.

**Mortalità per malattie della prima infanzia e per vizi di conformazione congeniti, nel 1° anno di vita.**

Le voci della vecchia nomenclatura, riguardanti le *malattie della prima infanzia* e i *vizi di conformazione congeniti*, sono state raggruppate con altri criteri nella nuova nomenclatura, come risulta nell'allegato II a pagina 146\*: inoltre, come è stato altra volta accennato (b), non si è sempre seguito lo stesso criterio nella classificazione di alcune voci di questa rubrica. Si è ritenuto, quindi, più opportuno raggruppare in un'unica voce ciò che era trattato, nei volumi precedenti, in tre distinti paragrafi: *asfissia e apoplessia nel parto*; *malattie fetali e vizi congeniti* — limitando questi alle morti avvenute nel primo anno di vita —; *debolezza congenita, immaturità e malattie speciali dei neonati*.

Analogamente a quanto è stato fatto per altre malattie, si sono messi in confronto i dati per Compartimenti e per il Regno per i trienni 1910-12; 1920-22 e 1930-32: si è dovuto escludere il triennio 1900-02, perchè dalle statistiche del tempo non risultano i dati dei morti per le suddette malattie nel 1° anno di vita, nei singoli Compartimenti del Regno.

Dal prospetto XLVI-B si rileva che la mortalità per *malattie della prima infanzia e per vizi di conformazione congeniti*, nel Regno, nei vecchi confini, è diminuita nei trienni 1920-22 e 1930-32, rispetto al periodo base 1910-12, rispettivamente del 21 % e del 17 %. Analogo comportamento si nota, in genere, nei singoli Compartimenti, eccetto nella Campania, nelle Puglie e nella Lucania, in cui, nel triennio 1930-32, si rileva che la mortalità è aumentata rispettivamente del 4 %, del 14 % e del 15 % a confronto del triennio base 1910-12.

Mettendo a confronto la mortalità media del Regno con quella dei singoli Compartimenti, si nota che, in tutti e tre i periodi considerati, o in due di essi, si è verificata una mortalità superiore a quella del Regno nella Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Puglie e Sicilia, cui si aggiungono, nel 1930-32, la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia e Zara; mentre nel Piemonte, Liguria, Lazio, Campania e Calabrie, la mortalità ne è stata inferiore nei tre periodi considerati.

(b) Cfr. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle cause di morte per gli anni 1929 e 1930* — Parte I — Introduzione, nota (b), pag. 63\*.



**Mortalità per malattie della prima infanzia  
e per vizi di conformazione congeniti, nel primo anno di vita (per 1000 nati vivi).**

PROSPETTO XLVI-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali		
Piemonte . . . . .	324.2	242.8	269.9
Liguria . . . . .	285.5	205.7	232.2
Lombardia . . . . .	369.4	202.9	323.4
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	360.9
Veneto . . . . .	435.0	318.5	314.6
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	456.6
Emilia . . . . .	513.4	381.6	382.5
Toscana . . . . .	406.7	288.4	301.0
Marche . . . . .	456.3	360.3	360.9
Umbria . . . . .	458.6	349.3	342.2
Lazio . . . . .	344.0	222.8	277.9
Abruzzi e Molise . . . . .	371.7	325.1	334.3
Campania . . . . .	228.6	209.8	237.8
Puglie . . . . .	306.6	302.1	350.3
Lucania . . . . .	308.1	281.5	354.6
Calabria . . . . .	276.0	231.1	243.1
Sicilia . . . . .	379.1	323.6	285.9
Sardegna . . . . .	345.1	291.4	290.3
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>367.0</b>	<b>291.5</b>	<b>306.8</b>

**Numeri indici della mortalità per malattie della prima infanzia  
e per vizi di conformazione congeniti, nel primo anno di vita (b).**

PROSPETTO XLVI-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1910-12 = 100		mortalità del Regno = 100		
	1920-22	1930-32	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali				
Piemonte . . . . .	75	83	88	83	88
Liguria . . . . .	72	81	78	71	76
Lombardia . . . . .	79	88	101	100	105
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	118
Veneto . . . . .	73	72	119	109	103
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	149
Emilia . . . . .	74	74	140	131	125
Toscana . . . . .	71	74	111	99	98
Marche . . . . .	79	79	124	124	118
Umbria . . . . .	76	75	125	120	112
Lazio . . . . .	65	81	94	76	91
Abruzzi e Molise . . . . .	87	90	101	112	109
Campania . . . . .	92	104	62	72	78
Puglie . . . . .	99	114	84	104	114
Lucania . . . . .	91	115	84	97	116
Calabria . . . . .	84	88	75	79	79
Sicilia . . . . .	85	75	103	111	93
Sardegna . . . . .	84	84	94	100	95
<b>REGNO</b> { vecchi confini (c) . . . . .	<b>79</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .					<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

### Marasma senile.

I quozienti di mortalità per *marasma senile* sono saliti da 962, per ogni milione di abitanti nella media del triennio 1887-89, a una media di 1382 nel quinquennio 1919-23, di 1456 nel 1924, di 1604 nel 1925 e di 1538 nel 1926. Dal 1927 al 1930 la mortalità è andata diminuendo, segnando nel 1930 il minimo quoziente di mortalità (906). Nel 1931 e nel 1932 si sono avuti, rispettivamente, 1101 e 961 morti su un milione di abitanti, con una diminuzione, nel 1932, a confronto del 1925, del 40 %.

È da notare che sotto la voce « *marasma senile* » è presumibile vadano compresi molti casi di morte relativi a individui, che, giunti ad una età avanzata, muoiono con sintomi *marantici* che possono essere la conseguenza di malattie di organi interni, difficilmente diagnosticabili, come potrebbero, ad esempio, essere le forme lente di *sclerosi polmonare* di natura *tubercolare*, o *carcinomi* di organi interni e specialmente dell'*apparato digerente*, che, senza dare disturbi di canalizzazione, hanno portato a un progressivo decadimento generale dell'organismo.

Una maggiore esattezza nelle diagnosi, facilitata dal progressivo miglioramento dei mezzi di indagine diagnostica, può influire sull'abbassamento del quoziente di mortalità per *marasma senile*: inoltre, l'insistente opera di propaganda che l'Istituto Centrale di Statistica ha fatto direttamente e indirettamente, affinché i medici segnalassero, con la maggiore accuratezza possibile, la causa che determinò la morte dell'infermo, può anche influire sulla diminuzione notevole che si riscontra nei quozienti di mortalità per *marasma senile* dal 1927 in poi.

I Compartimenti in cui la mortalità per *marasma senile* raggiunse il massimo furono, nel 1931, la Sicilia (171,2 per ogni 100 000 abitanti), la Venezia Giulia e Zara (170,0), la Lucania (161,7) e gli Abruzzi Molise (150,9); nel 1932, la Venezia Giulia e Zara (164,7), la Sicilia (152,3) e gli Abruzzi e Molise (148,2). I minimi, nel 1931, si verificarono nella Liguria (54,1), nella Lombardia (62,6) e nel Lazio (66,9); nel 1932, nella Liguria (52,3), nella Lombardia (57,7) e nel Lazio (69,1). Un simile comportamento regionale, all'incirca, si è verificato nel 1929 e 1930.

Le morti per *marasma senile* sono più numerose nelle femmine che nei maschi, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1932.

PROSPETTO XLVII

---

**Quozienti di letalità nel Regno per malattie infettive  
soggette a denuncia, durante gli anni dal 1888 al 1932.**



### § 3. — Mortalità nel Regno dei bambini, durante il primo anno di vita, per cause, in relazione alla legittimità dei natali.

I bambini morti prima di aver compiuto il primo anno di vita sono stati divisi in due gruppi: nel primo mese di vita e da un mese a meno di un anno, e per ciascun gruppo si è rilevata la loro nascita legittima od illegittima, com-

**Bambini d'ambo i sessi morti nel Regno nel primo anno di vita, distinti secondo la filiazione, negli anni 1930, 1931 e 1932.**

PROSPETTO XLVIII.

ANNI FILIAZIONE	NATI VIVI	MORTI		SU 100 MORTI NEL PRIMO ANNO DI VITA, DELLA MEDESIMA FILIAZIONE, MORIRONO		SU 1000 NATI VIVI MORIRONO DELLA MEDESIMA FILIAZIONE		
		nel primo mese di vita	da un mese a meno di un anno	nel primo mese di vita	da un mese a meno di un anno	nel primo mese di vita	da un mese a meno di un anno	
1930	Legittimi (a) . . . . .	1 037 983	37 124	70 290	34.56	65.44	35.77	67.72
	Illegittimi ed esposti . . . . .	54 695	3 200	4 669	40.67	59.33	58.51	85.36
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1 092 678</b>	<b>40 324</b>	<b>74 959</b>	<b>34.98</b>	<b>65.02</b>	<b>36.90</b>	<b>68.60</b>
1931	Legittimi (a) . . . . .	973 893	36 782	71 511	33.97	66.03	37.77	73.43
	Illegittimi ed esposti . . . . .	52 304	3 073	4 500	40.58	59.42	58.75	86.04
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1 026 197</b>	<b>39 855</b>	<b>76 011</b>	<b>34.40</b>	<b>65.60</b>	<b>38.84</b>	<b>74.07</b>
1932	Legittimi (c) . . . . .	939 098	35 781	66 367	35.03	64.97	38.10	70.67
	Illegittimi ed esposti . . . . .	51 897	3 060	4 248	41.87	58.13	58.96	81.85
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>990 995</b>	<b>38 841</b>	<b>70 615</b>	<b>35.49</b>	<b>64.51</b>	<b>39.19</b>	<b>71.26</b>

prendendo fra i legittimi anche quei bambini in cui non fu indicata la modalità della filiazione, se legittima od illegittima (a).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel primo anno di vita, nel complesso del Regno, a 1000 nati vivi, si trova che, nel 1930, per 1000 nati vivi legittimi, ne morirono nel primo mese 35,77, ed entro il primo anno di vita 103,48; nel 1931, ne morirono, rispettivamente, 37,77 e 111,20; e nel 1932, 38,10 e 108,77.

(a) Si è creduto opportuno di considerare come legittimi i bambini per i quali venne omessa, sulle schede di morte, l'indicazione della filiazione, in numero di 1021 nell'anno 1930, di 530 nel 1931 e di 553 nel 1932 (vedi tavola VI per l'anno 1930 e 1932 e tavola XI per il 1931), ciò che rappresenta soltanto, meno dell'1% del totale di tutti i bambini morti nel Regno nel primo anno di vita.

In quanto alla mortalità dei bambini illegittimi ed esposti nel primo anno di vita, si ha, che nel 1930, per ogni 1 000 nati vivi illegittimi ed esposti, ne morirono nel primo mese 58,51, ed entro il primo anno di vita 143,87; nel 1931 ne morirono, rispettivamente, 58,75 e 144,79; e nel 1932, 58,96 e 140,82.

Osservando, anche negli anni precedenti, i rapporti di composizione riguardanti i morti su 100 della medesima filiazione, rispettivamente per i legittimi e per gli illegittimi ed esposti, nel primo mese di vita e da un mese a meno di un anno di età, ed i rapporti di derivazione riguardanti i morti legittimi ed illegittimi nelle stesse età, per 1 000 nati vivi della medesima filiazione, viene convalidata l'opinione del Brend e del Savorgnan (a), che le cause che producono la morte nei primi quindici giorni di vita sono da ritenersi, per la massima parte, di origine prenatale, dipendenti da malattie costituzionali materne e fetali, o da condizioni di lavoro o di ambiente, verificatesi durante la gravidanza, o da accidenti durante il parto. Infatti, su 100 morti della medesima filiazione, di legittimi ne sono morti nel primo mese di vita, nel 1930, 34,56 e di illegittimi 40,67; nel 1931, rispettivamente, 33,97 e 40,58; e, nel 1932, 35,03 e 41,87: cioè la quota percentuale dei morti nel primo mese di vita è maggiore negli illegittimi che nei legittimi.

Considerando le cifre proporzionali a 1000 nati vivi della medesima filiazione, si nota che la mortalità degli illegittimi è notevolmente superiore a quella dei legittimi sia nel primo mese di vita che da un mese a meno di un anno di età; questa differenza è sensibilmente più accentuata nel primo mese di vita. Ora quelle cause di morte sopra dette, prese in considerazione dal Brend e dal Savorgnan, che agiscono nel periodo della gestazione sull'organismo materno (e quindi sul feto), o durante il parto, sono, per ragioni ovvie, molto più diffuse in condizione di illegittimità e spiegano questa più accentuata differenza.

Questo fatto viene anche convalidato dall'osservazione dei quozienti di mortalità, per singole cause, nei bambini nel primo anno di vita (prospetto XLIX), dai quali si nota come negli illegittimi il maggior aumento della mortalità si verifica proprio per quelle cause che generalmente agiscono o nel periodo della gestazione o durante il parto o nell'immediato *post partum*, come le *malattie della prima infanzia* e la *sifilide*.

Il prospetto suddetto indica, per le malattie dell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi e illegittimi ed esposti, morti nel Regno durante il primo anno di vita, confrontati a 10 000 nati vivi, durante il biennio 1931-32, e da esso si rileva che la mortalità dei bambini illegittimi ed esposti nel primo anno di vita è assai più elevata di quella dei legittimi. Infatti, nel biennio 1931-32, per 10 000 nati vivi illegittimi ed esposti ne morirono 1428, mentre per 10 000 nati vivi legittimi ne morirono soltanto 1100. La maggiore mortalità nell'infanzia di nascita illegittima è, più specialmente, dovuta, come si è già accennato, alle *malattie della prima infanzia* (453 morti illegittimi, nel biennio 1931-32, su 10 000 nati vivi della stessa categoria, contro 283 legittimi),

(a) Cfr. WILLIAM A. BREND, *Health and the State*, Londra 1917; FRANCO SAVORGNAN, *Demografia di guerra ed altri saggi*, pag. 72 e segg. - Edizione Zanichelli, Bologna. - Vedasi anche: L. DE BERARDINIS, *Alcune caratteristiche della natimortalità e della mortalità infantile* - Appendice al *Compendio Statistico italiano, per l'anno 1932-XI, dell'Istituto Centrale di Statistica* - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1932-XI, pag. 323.

**Mortalità media annua nel biennio 1931-32 dei bambini d'ambo i sessi, nel primo anno di vita.**

(Cifre proporzionali a 10 000 nati vivi).

## PROSPETTO XLIX.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	LEGITTIMI (b)	ILLEGITTIMI ED ESPOSTI
	<b>Complesso . . .</b>	<b>1100.1</b>	<b>1428.1</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie . . . . .</b>	<b>81.4</b>	<b>141.6</b>
I, 2	Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi . . . . .	0.4	0.3
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	..	0.1
7	Morbillo . . . . .	6.4	9.7
8	Scarlattina . . . . .	1.0	0.6
9	Tosse convulsa . . . . .	15.4	16.7
10	Difterite . . . . .	2.9	3.8
11	Influenza . . . . .	19.2	18.9
13	Dissenteria . . . . .	1.0	2.0
23	Tuberc. dell'app. respir. (compr. i gangli tracheo-bronchiali)	2.6	3.4
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi . . . . .	8.6	9.6
34	S'filide . . . . .	4.5	39.9
36	Infezione purulenta e setticemia, non puerperali . . . . .	5.1	17.9
38	Malaria . . . . .	3.5	2.8
dal 39 al 42	Malattie dovute a protozoi od elminti . . . . .	0.7	0.7
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	10.1	15.2
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni . . . . .	0.2	0.3
54, 55	Tumori non maligni (o il cui carattere maligno non è specificato) . . . . .	0.1	0.1
	<b>III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, delle ghiandole endo- crine e altre malattie generali . . . . .</b>	<b>8.3</b>	<b>13.9</b>
55	Reumatismo articolare acuto . . . . .	0.2	—
59	Diabete mellito . . . . .	..	—
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	2.9	5.2
66	Mal. della ghiandola tiroide e delle ghiandole paratiroidi.	1.5	2.0
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	3.7	6.7
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .</b>	<b>2.8</b>	<b>3.1</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	1.4	1.6
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .	1.4	1.4
	<b>VI. - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi. . . . .</b>	<b>52.5</b>	<b>53.8</b>
79	Meningite semplice . . . . .	6.9	6.3
82	Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale . . . . .	0.5	1.7
85	Epilessia . . . . .	0.2	0.5
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	43.8	43.0
88, 89	Malattie dell'occhio, dell'orecchio e dei loro annessi . . . . .	1.1	2.3
	<b>VII. - Malattie dell'apparato circolatorio . . . . .</b>	<b>2.0</b>	<b>2.6</b>
90	Pericardite . . . . .	..	—
91	Endocardite acuta . . . . .	0.1	0.1
92	Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari . . . . .	0.6	0.3
93	Malattie del miocardio . . . . .	0.2	—
95	Altre malattie del cuore . . . . .	0.6	0.7
95	Aneurisma, escluso l'aneurisma del cuore . . . . .	..	—

(a) In questo Elenco non sono citate quelle malattie che nel biennio 1931-32 non furono causa di morte di bambini nel primo anno di vita.

(b) Sono compresi nei legittimi, i morti nel primo anno di vita di filiazione non indicata.

*Segue: Mortalità media annua nel biennio 1931-32 dei bambini d'ambo i sessi, nel primo anno di vita.*

(Cifre proporzionali a 10 000 nati vivi).

*Segue: PROSPETTO XLIX.*

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	LEGITTIMI (b)	ILLEGITTIMI ED ESPOSTI
97, 98	Arteriosclerosi (eccettuate le malattie delle arterie coronarie) e cangrena . . . . .	0.1	0.2
dal 99 al 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	0.4	1.3
	<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .</b>	<b>226.9</b>	<b>267.4</b>
106	Bronchiti . . . . .	45.0	42.9
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	177.6	219.5
110	Pleuriti . . . . .	1.2	1.7
104, 105, dal III al 114	Altre mal. dell'apparato respiratorio, esclusa la tubercolosi	3.0	3.3
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente . . . . .</b>	<b>404.6</b>	<b>440.6</b>
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . . . . .	..	—
119	Enteriti . . . . .	391.6	426.9
121	Appendicite . . . . .	0.1	—
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	2.1	2.7
124	Cirrosi del fegato . . . . .	0.1	0.1
125, 126, 127	Altre mal. del fegato e delle vie biliari, comp. i calcoli biliari	1.1	0.8
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente . . . . .	9.5	10.2
	<b>X. - Malattie dell'apparato urinario e genitale . . . . .</b>	<b>6.6</b>	<b>8.7</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	5.7	6.7
133	Altre malattie dei reni, dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). . . . .	0.3	1.0
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	..	0.1
135	Malattie della vescica, esclusi i tumori . . . . .	0.3	0.7
136	Malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. . . . .	0.1	0.1
137	Malattie della prostata . . . . .	..	—
138, 139	Malattie degli organi genitali . . . . .	0.1	0.2
	<b>XII. - Malattie della pelle e del tessuto cellulare. . . . .</b>	<b>3.1</b>	<b>5.8</b>
151, 152, 153	Malattie della pelle e del tessuto cellulare . . . . .	3.1	5.8
	<b>XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione . . . . .</b>	<b>0.5</b>	<b>1.2</b>
154, 155, 156	Malattie delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo) . . . . .	0.5	1.2
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti . . . . .</b>	<b>22.1</b>	<b>21.6</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (esclusi i nati morti) . . . . .	22.1	21.6
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia. . . . .</b>	<b>283.0</b>	<b>452.7</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	142.0	176.2
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti) . . . . .	91.7	204.5
160	Conseguenze del parto . . . . .	5.8	7.0
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	43.5	65.0
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali . . . . .</b>	<b>2.7</b>	<b>10.7</b>
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	0.2	6.9
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	2.5	3.6
195	Altre morti violente di cui la natura (omicidio, accidente) è sconosciuta . . . . .	—	0.1
	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate. . . . .</b>	<b>3.3</b>	<b>4.1</b>
199, 200	Morte improvvisa e cause non specificate o mal definite	3.3	4.1

(a) Vedi la nota (a) a pag. precedente.

(b) Vedi la nota (b) a pag. precedente.



alla *sifilide* (40 illegittimi, contro 5 legittimi) e alle *enteriti* (427 dei primi, 392 dei secondi).

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni per susseguente matrimonio dei genitori, e i bambini morti dopo essere stati legittimati sono segnati nella scheda di morte come legittimi, mentre nella statistica dei nati vennero iscritti fra gli illegittimi.

#### § 4. — Individui che morirono, negli anni 1931 e 1932, nel Comune ove avevano dimora stabile, distinti secondo le cause di morte.

Dal 1929 è stata redatta una tavola in cui i morti sono classificati secondo le cause e la dimora in cui avvenne la morte.

È noto come alcune malattie, specialmente ad andamento cronico o di spettanza prettamente chirurgica, spostano gli ammalati dai loro abituali luoghi di residenza e li concentrano in altri luoghi, in cui possono essere praticate speciali cure mediche e chirurgiche. È d'uopo, quindi, nel considerare i diversi quozienti di mortalità, di tener conto di questo fenomeno, che potrebbe simulare in un determinato luogo un aumento notevole della mortalità per una data malattia, dovuto invece al concentrarsi in quel dato posto degli affetti da questi morbi: citiamo, per esempio, la *tubercolosi polmonare* e la *tubercolosi* in genere, le *malattie mentali*, la *pellagra*, le *malattie chirurgiche* in genere, ecc.

Nel prospetto L sono date, per il Regno, le cifre proporzionali a 1000 morti, per ciascuna causa, degli individui che morirono nel Comune ove avevano dimora stabile, negli anni 1931 e 1932. Da questo prospetto risulta che di 1000 individui morti nel 1931, per qualsiasi causa, 933 avevano dimora stabile nel Comune ove avvenne il decesso e 67 vi avevano dimora occasionale; e, nel 1932, rispettivamente, 932 e 68. In ordine progressivo decrescente, hanno dato un maggior numero di morti nella dimora occasionale (complemento a 1000 delle cifre del prospetto suddetto), nel 1931, la *demenza precoce* ed *altre psicosi*, la *paralisi progressiva degli alienati*, le *morti per causa violenta* di cui la natura (*suicidio*, *omicidio*, *accidente*) è sconosciuta, l'*alcoolismo acuto e cronico*, gli *accidenti della gravidanza*, le altre *malattie puerperali*, ecc.; nel 1932, la *demenza precoce* ed *altre psicosi*, la *paralisi progressiva degli alienati*, le *morti accidentali*, le *malattie delle ossa e degli organi della locomozione*, l'*appendicite*, gli *accidenti della gravidanza*, le altre *malattie puerperali*, ecc.

Come si vede, in generale, le massime percentuali dei morti in Comuni in cui l'ammalato aveva dimora occasionale sono date dalle *malattie mentali*, e dalle *malattie della gravidanza e del puerperio*, morbi che hanno bisogno di luoghi speciali di cura o di speciali metodi di terapia.

Per i singoli Compartimenti, i morti, secondo la dimora, non sono studiati per ogni singola causa, ma soltanto alcune cause sono state sintetizzate in 11 voci, seguendo questo criterio:

1) *Malattie infettive e parassitarie* (esclusa la *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*), considerando che questo gruppo di morbi, per il loro decorso acuto

e per i comuni metodi terapeutici, non ha, in genere, bisogno di ricovero in speciali luoghi di cura, e contrapponendole, per il confronto, alle seguenti altre voci:

- 2) *Tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*
- 3) *Cancro ed altri tumori maligni*
- 4) *Malattie del sistema nervoso e mentali*
- 5) *Ulcera dello stomaco e del duodeno*
- 6) *Appendicite*
- 7) *Ernia, occlusione intestinale*
- 8) *Cirrosi del fegato ed altre malattie del fegato e delle vie biliari, compresi i calcoli biliari*
- 9) *Malattie dell'apparato urinario e della prostata (escluse le nefriti)*
- 10) *Malattie degli organi genitali, non indicate come veneree*
- 11) *Malattie della gravidanza, parto e puerperio.*

Le ultime dieci malattie o gruppi di malattie, per le ragioni predette, danno luogo ad un concentrazione degli ammalati verso quei Comuni, dove, in speciali luoghi di cura, sono maggiori le possibilità di praticare appropriata terapia.

Le maggiori percentuali di persone decedute con dimora occasionale, sia nel 1931 che nel 1932, si hanno, in generale, nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale e Centrale, a confronto dell'Italia Meridionale ed Insulare; fatto che collima con i risultati ottenuti dall'ultima indagine statistica, eseguita dall'Istituto Centrale di Statistica, sugli Ospedali e sugli Istituti pubblici e privati di assistenza sanitaria ospitaliera, esistenti alla fine dell'anno 1932 (a), che stabiliscono, in generale, che l'assistenza sanitaria ospitaliera è più diffusa nell'Italia Settentrionale e Centrale, in confronto al Mezzogiorno e alle Isole.

In particolare, le massime percentuali di morti in dimora occasionale si hanno, in genere, nel 1931 e nel 1932, nel Lazio, nel Veneto, nella Venezia Tridentina, nella Lombardia, nell'Emilia, nel Piemonte e nella Toscana; e le minime nelle Calabrie, nella Lucania, nella Sicilia, nelle Puglie e negli Abruzzi e Molise.

Considerando il numero dei morti secondo le cause, prese in esame nel prospetto LI, e la dimora in cui avvenne la morte, si nota che nel Regno, nel 1931, hanno dato la massima percentuale di morti in dimora occasionale (complemento a 1000 delle cifre del prospetto suddetto), le *malattie del sistema nervoso e mentale*, che, come si sa, esigono spesso il ricovero degli ammalati in appositi luoghi di cura.

Dopo dette malattie, seguono, in ordine decrescente, l'*appendicite*; le *malattie degli organi genitali*, non indicate come *veneree*; le *malattie della gravidanza, parto e puerperio*; l'*ulcera dello stomaco e del duodeno*; la *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*; l'*ernia e occlusione intestinale*; le *malattie dell'apparato urinario e della prostata (escluse le nefriti)*; il *cancro ed altri tumori maligni*; le *malattie infettive e parassitarie*; la *cirrosi del fegato e le altre malattie del fegato e delle vie biliari*.

Nell'anno 1932 si ha un comportamento quasi analogo a quello ora detto per il 1931.

Nei singoli Compartimenti, sia per il 1931 sia per il 1932, si nota, all'incirca, lo stesso andamento.

(a) Cfr.: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Statistica degli Ospedali e degli altri Istituti pubblici e privati di assistenza ospitaliera nell'anno 1932-XI* - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII.

**Individui che morirono, negli anni 1931 e 1932, nel Comune ove avevano dimora stabile,  
distinti secondo le cause di morte (a).**

(Cifre proporzionali a 1000 morti per ciascuna causa)

PROSPETTO L.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		CAUSE DI MORTE	1931	1932	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		CAUSE DI MORTE	1931	1932
		<b>Complesso . . . . .</b>	<b>933</b>	<b>932</b>			<b>V. - Avvelenamenti cronici e intossicazioni . . . . .</b>	<b>736</b>	<b>812</b>
		<b>I. - Malattie infettive e parassitarie . . . . .</b>	<b>886</b>	<b>879</b>					
1, 2		Febbre tifoidea (tifo adominale) e paratifi. . . . .	882	874	75		Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	720	805
3		Tifo petecchiale . . . . .	1000	750	76, 77		Avvelenamenti cronici . . . . .	909	889
6		Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	1000	1000			<b>VI. - Malat. del sistema nervoso e degli organi dei sensi. . . . .</b>	<b>942</b>	<b>941</b>
7		Morbillo. . . . .	963	959					
8		Scarlattina . . . . .	964	962					
9		Tosse convulsa . . . . .	967	969					
10		Difterite . . . . .	855	855	79		Meningite semplice. . . . .	925	916
11		Influenza . . . . .	961	961	80		Atassia locomotrice progressiva. . . . .	950	952
13		Dissenteria . . . . .	949	956	82		Emorragia, embolia e trombosi cerebrale . . . . .	959	960
23		Tuberc. dell'app. respiratorio, compresi i gangli tracheo-bronchiali . . . . .	826	816	83		Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	619	591
dal 24 al 32		Ogni altra forma di tubercolosi . . . . .	897	889	84		Demenza precoce ed altre psicosi. . . . .	425	462
34		Sifilide . . . . .	907	915	85		Epilessia . . . . .	777	811
36		Infezione purulenta e setticemia, non puerperali . . . . .	882	875	78, 81, 86, 87		Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	956	955
38		Malaria . . . . .	952	934	88, 89		Malattie dell'occhio, orecchio e annessi . . . . .	832	835
dal 39 al 42		Malattie dovute a protozoi od elminti . . . . .	925	930			<b>VII. - Malattie dell'apparato circolatorio . . . . .</b>	<b>954</b>	<b>955</b>
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44)		Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	889	885					
		<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>917</b>	<b>923</b>					
dal 45 al 53		Cancri ed altri tumori maligni . . . . .	921	929	90		Pericardite . . . . .	895	956
54, 55		Tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato. . . . .	769	834	91		Endocardite acuta . . . . .	910	927
		<b>III. - Malat. reumatiche, della nutriz., delle ghiandole endocrine e altre malattie generali . . . . .</b>	<b>933</b>	<b>936</b>	92		Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari. . . . .	963	963
56		Reumat. articolare acuto . . . . .	937	934	93		Malattie del miocardio . . . . .	952	952
57, 58		Reumat. cronico e gotta . . . . .	964	955	94		Malattie arterie coronarie e angina pectoris. . . . .	946	952
59		Diabete mellito . . . . .	932	936	95		Altre malatt. del cuore. . . . .	952	957
dal 60 al 64		Avitaminosi . . . . .	948	935	96		Aneurisma, escluso quello del cuore . . . . .	938	914
66		Malat. ghiandola tiroide e ghiandole paratiroidi . . . . .	890	891	97, 98		Arteriosclerosi, eccettuate le malattie delle arterie coronarie, e cangrena . . . . .	949	954
65, 67, 68, 69		Altre malattie generali . . . . .	924	946	dal 99 al 103		Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	918	920
		<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .</b>	<b>916</b>	<b>916</b>			<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .</b>	<b>955</b>	<b>954</b>
71		Anemie perniciose ed altre . . . . .	933	928	106				
70, 72, 73, 74		Leucemie, aleucemie ed altre malat. del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .	903	907	107, 108, 109		Bronchiti . . . . .	972	971
					110		Polmoniti . . . . .	954	954
					104, 105, dal 111 al 114)		Fleuretiti . . . . .	889	860
							Altre malat. appar. resp., esclusa la tubercolosi. . . . .	930	931

(a) Esclusa la dimora non indicata

**Individui che morirono, negli anni 1931 e 1932, nel Comune ove avevano dimora stabile, distinti secondo le cause di morte (c).**

(Cifre proporzionali a 1000 morti per ciascuna causa)

Segue : PROSPETTO L.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	1931	1932	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	1931	1932	
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente . . . . .</b>	<b>945</b>	<b>940</b>		<b>XII. - Malat. della pelle e del tessuto cellulare . . .</b>	<b>863</b>	<b>849</b>	
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . . . . .	833	840	151, 152, 153	Malattie della pelle e del tessuto cellulare . . .	863	849	
119	Enteriti al di sotto di due anni . . . . .	971	968		<b>XIII. - Malattie delle ossa e organi della locomoz.</b>	<b>820</b>	<b>776</b>	
120	Enteriti e ulcera intestinale (due anni e oltre)	946	943	154, 155, 156	Malattie delle ossa e organi della locomozione, esclusa la tubercolosi ed il reumatismo. . .	820	776	
121	Appendicite . . . . .	764	776		<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti . . . . .</b>	<b>962</b>	<b>957</b>	
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	846	836		157	Vizi di conformaz. congeniti, esclusi i rati morti	962	957
124	Cirrosi del fegato . . .	951	950		<b>XV. - Malattie dell'infanzia.</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	
125, 126, 127	Altre malat. del fegato e vie biliari, compresi i calcoli biliari . . . .	898	888	158	Debolezza congenita . .	975	976	
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente . . . . .	906	897	159	Nascita prematura, non compresi i nati morti.	940	940	
	<b>X. - Malattie dell'apparato urinario e genitale . .</b>	<b>934</b>	<b>938</b>	160	Conseguenza del parto .	902	913	
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	947	951	161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	954	956	
133	Altre malattie dei reni, dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza) . . . . .	877	912		<b>XVI. - Senilità . . . . .</b>	<b>967</b>	<b>969</b>	
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	874	861	162	Senilità . . . . .	967	969	
135	Malattie della vescica, esclusi i tumori . . . .	939	940		<b>XVII. - Morti violente e accidentali . . . . .</b>	<b>793</b>	<b>791</b>	
136	Malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. .	890	902	dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	845	843	
137	Malattie della prostata .	888	891	dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	800	806	
138, 139	Malattie degli org. genit., non indicate come veneree . . . . .	782	810	dal 176 al 194	Morti accidentali. . . .	777	775	
	<b>XI. - Malat. della gravidanza, parto e puerperlo .</b>	<b>797</b>	<b>798</b>	195	Altre morti violente di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta . . . . .	718	806	
141, 142, 143	Accid. della gravidanza.	731	787	196, 197	Ferite di guerra, compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti. . .	—	—	
144	Emorragia puerperale .	811	816	198	Esecuzione giudiziaria .	—	—	
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali . . . . .	818	797		<b>XVIII. - Cause di morte non determinate . . . . .</b>	<b>919</b>	<b>925</b>	
146, 147	Tossiemia della gravidanza, albuminuria e eclampsia . . . . .	803	801	199, 200	Morte improvvisa e cause non specific. e mal defin.	919	925	
148, 149, 150	Altre malattie puerperali	751	778					

(a) Esclusa la dimora non indicata.

PROSPETTO LI. — Individui che morirono, per qualsiasi causa e per le cause sottoindicate, negli  
(Cifre proporzionali a 1000)

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA	
		1931	1932	1931	1932	1931	1932	1931	1932
	<b>Complesso delle cause . . .</b>	<b>912</b>	<b>908</b>	<b>919</b>	<b>918</b>	<b>903</b>	<b>901</b>	<b>896</b>	<b>882</b>
dall'1 al 13, dal 15 al 22, dal 33 al 44	Malattie infettive e parassitarie (esclusa la tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi).	918	897	910	894	885	877	914	881
dal 23 al 32	Tubercolosi in tutte le forme e sedi.	823	803	859	865	793	789	747	698
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni. . .	912	923	936	925	916	922	921	928
80, dall'83 all'85	Malattie del sistema nerv. e mentali.	510	478	750	692	547	626	778	649
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno.	819	808	847	908	834	861	652	517
121	Appendicite . . . . .	735	766	821	792	797	825	582	500
122	Ernia, occlusione intestinale . . . .	804	815	805	845	840	818	707	711
dal 124 al 127	Cirrosi del fegato ed altre malattie del fegato e delle vie biliari, compresi i calcoli biliari . . . . .	942	917	940	946	925	919	925	886
dal 133 al 137	Malattie dell'apparato urinario e della prostata (escluse le nefriti). . . . .	900	879	890	921	881	868	859	944
138, 139	Malattie degli organi genitali, non indicate come veneree. . . . .	738	861	842	1000	704	766	778	700
dal 140 al 150	Malat. della gravid., parto e puerperio	773	770	875	838	663	723	922	824

Segue: PROSPETTO LI. — Individui che morirono, per qualsiasi causa e per le cause sottoindicate, negli  
(Cifre proporzionali a 1000)

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA	
		1931	1932	1931	1932	1931	1932
	<b>Complesso delle cause . . .</b>	<b>877</b>	<b>885</b>	<b>972</b>	<b>971</b>	<b>967</b>	<b>967</b>
dall'1 al 13, dal 15 al 22, dal 33 al 44	Malattie infettive e parassitarie (esclusa la tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi).	883	885	979	976	971	976
dal 23 al 32	Tubercolosi in tutte le forme e sedi.	750	776	969	943	929	915
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni. . .	830	861	964	971	963	967
80, dall'83 all'85	Malattie del sistema nerv. e mentali.	725	711	759	782	664	664
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno.	747	779	864	929	941	955
121	Appendicite . . . . .	704	719	726	792	932	909
122	Ernia, occlusione intestinale . . . .	773	762	879	905	925	933
dal 124 al 127	Cirrosi del fegato ed altre malattie del fegato e delle vie biliari, compresi i calcoli biliari . . . . .	858	878	952	981	955	969
dal 133 al 137	Malattie dell'apparato urinario e della prostata (escluse le nefriti). . . . .	826	854	962	955	950	958
138, 139	Malattie degli organi genitali, non indicate come veneree. . . . .	789	714	750	783	897	907
dal 140 al 150	Malat. della gravid., parto e puerperio	751	748	890	883	875	878

(\*) Esclusa la dimora non indicata.

anni 1931 e 1932, nel Comune ove avevano dimora stabile, in ciascun Compartimento e nel Regno (\*).  
morti per ciascuna causa)

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENETO		VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA	
	1931	1932	1931	1932	1931	1932	1931	1932	1931	1932	1931	1932
	<b>890</b>	<b>886</b>	<b>914</b>	<b>913</b>	<b>903</b>	<b>912</b>	<b>906</b>	<b>913</b>	<b>950</b>	<b>953</b>	<b>943</b>	<b>944</b>
dall'1 al 13, dal 15 al 22, dal 33 al 44	856	840	846	874	874	882	888	905	945	942	939	922
dal 23 al 32	766	747	879	866	815	816	814	830	865	851	880	857
dal 45 al 53	890	891	905	918	908	929	936	943	954	972	953	952
80, dall'83 all'85	627	630	691	849	536	630	662	580	750	757	673	603
117	712	682	742	739	756	821	827	849	833	871	920	771
121	581	580	760	746	724	715	721	847	750	742	729	830
122	688	641	839	763	771	797	824	801	874	825	820	857
dal 124 al 127	848	846	874	891	916	911	914	926	957	951	982	931
dal 133 al 137	835	790	822	869	859	902	860	928	963	946	894	932
138, 139	519	634	545	600	709	829	667	808	889	625	1000	727
dal 140 al 150	552	596	692	806	694	699	733	725	857	787	820	868

anni 1931 e 1932, nel Comune ove avevano dimora stabile, in ciascun Compartimento e nel Regno (\*).  
morti per ciascuna causa)

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	PUGLIE		LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO	
	1931	1932	1931	1932	1931	1932	1931	1932	1931	1932	1931	1932
	<b>976</b>	<b>973</b>	<b>978</b>	<b>975</b>	<b>978</b>	<b>977</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>959</b>	<b>954</b>	<b>933</b>	<b>932</b>
dall'1 al 13, dal 15 al 22, dal 33 al 44	973	972	979	958	978	977	966	969	968	955	926	922
dal 23 al 32	934	916	988	956	957	939	935	930	930	913	844	835
dal 45 al 53	970	967	982	969	971	977	968	977	936	907	921	929
80, dall'83 all'85	831	739	974	966	1000	973	854	911	745	809	664	674
117	905	950	964	875	983	957	952	971	1000	880	833	840
121	940	917	1000	923	945	907	920	925	818	900	764	776
122	938	938	966	864	946	953	932	935	862	836	846	836
dal 124 al 127	967	967	981	976	970	963	977	975	946	912	930	927
dal 133 al 137	959	958	951	1000	981	961	975	968	898	933	903	908
138, 139	889	950	1000	500	955	1000	974	909	889	923	782	810
dal 140 al 150	940	911	922	926	949	938	922	918	849	866	797	798

### § 5. — Morti dopo atto operatorio, negli anni 1931 e 1932.

Dall'anno 1931 è stata redatta una tavola in cui i morti sono classificati secondo le cause, con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno. Nel prospetto LII sono calcolate, per il Regno, le cifre proporzionali dei morti dopo atti operatori, su 1000 morti per ciascuna causa. Con questi rapporti non si vuol naturalmente misurare la letalità per atti operatori, ma piuttosto ottenere un indice della frequenza degli atti operatori nelle varie malattie.

Nel 1931 e 1932 hanno dato notevole percentuale di morti dopo atto operatorio sul totale dei morti, i *tumori non maligni* (333,8 e 203,4 su 1000 morti, rispettivamente, nel 1931 e 1932), *gli accidenti della gravidanza* (298,5 e 346,0), *l'appendicite* (280,5 e 313,1), *le altre malattie puerperali* (272,3 e 291,8), *le malattie degli organi genitali, non indicate come veneree* (243,1 e 266,4), *la calcolosi delle vie urinarie* (202,6 e 190,3), *l'ernia e l'occlusione intestinale* (192,9 e 218,1), *l'ulcera dello stomaco e del duodeno* (188,2 e 220,3), *le malattie dell'occhio, orecchio e annessi* (181,7 e 204,7), *le malattie delle ossa e organi della locomozione* (162,5 e 187,9), *le malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc.* (156,0 e 107,1), *l'emorragia puerperale* (139,2 e 159,7), *le malattie della pelle e del tessuto cellulare* (114,2 e 120,1), *le pleuriti* (105,9 e 122,2) e *le altre malattie del fegato e delle vie biliari* (95,7 e 104,0).

La percentuale dei morti dopo atto operatorio sul totale dei morti è notevole nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale e Centrale, mentre diminuisce nettamente nei Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare (vedi prospetto LIII) e ciò concorda con la constatazione, già citata in questo volume (a), della più vasta organizzazione ospedaliera esistente nell'Italia Settentrionale e Centrale dove affluisce un maggior numero di ammalati per sottoporsi ad intervento chirurgico. Sia nel 1931 che nel 1932, la massima percentuale di morti dopo atto operatorio si è avuta nella Venezia Giulia e Zara (22,7 e 21,8 su 1000 morti, rispettivamente); la minima, nel 1931, nella Lucania (2,5) e nel 1932 nelle Calabrie (2,9).

Sia nel 1931 che nel 1932, le più elevate percentuali di morti dopo atto operatorio si osservano nel Regno ed in genere in tutti i Compartimenti, per i tre gruppi di cause costituite dalle *malattie delle ossa e degli organi della locomozione*, dalle *malattie della gravidanza, parto e puerperio* e dalle *malattie della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo*.

(a) Si veggia la nota (a) a pagina 77\*.

**Morti nel Regno per le cause sottoindicate, dopo atto operatorio, negli anni 1931 e 1932.**

(Cifre proporzionali a 1000 morti per ciascuna causa).

## PROSPETTO LII.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (*)	1931	1932
	<b>Complesso . . .</b>	<b>11.1</b>	<b>12.4</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie . . . . .</b>	<b>4.3</b>	<b>5.1</b>
1, 2	Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi . . . . .	2.8	4.9
7	Morbillo . . . . .	0.3	0.7
8	Scarlattina . . . . .	2.6	—
10	Difterite . . . . .	29.5	32.6
11	Influenza . . . . .	0.2	0.3
13	Dissenteria . . . . .	2.0	4.0
23	Tubercolosi dell'apparato respiratorio (a) . . . . .	0.6	0.9
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi . . . . .	12.5	15.3
34	Sifilide . . . . .	3.0	1.5
36	Infezione purulenta e setticemia, non puerperali . . . . .	9.7	8.0
38	Malaria . . . . .	0.6	0.9
dal 39 al 42	Malattie dovute a protozoi od elminti . . . . .	49.2	63.3
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	4.0	4.1
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>48.5</b>	<b>49.4</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni . . . . .	41.3	39.7
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	333.8	203.4
	<b>III. - Malattie reumatiche (c) . . . . .</b>	<b>7.2</b>	<b>6.5</b>
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	—	0.7
59	Diabete mellito . . . . .	10.9	7.9
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	2.6	1.1
66	Malattie ghiandola tiroide e ghiandole paratiroidi . . . . .	47.1	58.0
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	—	1.8
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .</b>	<b>6.0</b>	<b>5.9</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	1.5	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie ed altre malattie del sangue (d) . . . . .	9.7	10.4
	<b>VI. - Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi. . . . .</b>	<b>2.6</b>	<b>3.0</b>
79	Meningite semplice. . . . .	0.3	1.1
85	Epilessia . . . . .	—	0.6
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	1.2	2.4
88, 89	Malattie dell'occhio, dell'orecchio e dei loro annessi . . . . .	181.7	204.7
	<b>VII. - Malattie dell'apparato circolatorio . . . . .</b>	<b>1.0</b>	<b>1.3</b>
90	Pericardite . . . . .	5.2	5.5
92	Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari . . . . .	—	0.1
95	Altre malattie del cuore . . . . .	—	0.1
96	Aneurisma, escluso l'aneurisma del cuore . . . . .	2.4	2.4
97, 98	Arteriosclerosi (e) e cangrena . . . . .	8.9	6.0
dal 99 al 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	9.6	16.0

(\*) Non sono state indicate quelle cause per le quali, negli anni 1931 e 1932, non si verificarono casi di morte dopo atto operatorio.

(a) (compresi i gangli tracheo-bronchiali). (b) (o il cui carattere maligno non è specificato). (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) (eccettuate le malattie delle arterie coronarie).

**Morti nel Regno per le cause sottoindicate, dopo atto operatorio, negli anni 1931 e 1932.**

(Cifre proporzionali a 1000 morti per ciascuna causa).

Segue: PROSPETTO LII.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (*)	1931	1932
	<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .</b>	<b>3.5</b>	<b>3.9</b>
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	0.1	..
110	Pleuriti . . . . .	105.9	122.2
104, 105, dal 111 al 114	Altre malattie dell'apparato respiratorio, esclusa la tbc.	19.5	15.8
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente . . . . .</b>	<b>27.2</b>	<b>34.3</b>
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . . . . .	188.2	220.3
120	Enteriti e ulcera intestinale (2 anni ed oltre). . . . .	0.6	2.5
121	Appendicite . . . . .	280.5	313.1
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	192.9	218.1
124	Cirrosi del fegato . . . . .	1.6	2.3
125, 126, 127	Altre malattie del fegato e delle vie biliari, (a) . . . . .	95.7	104.0
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente . . . . .	40.9	52.5
	<b>X. - Malattie dell'apparato urinario e genitale . . . . .</b>	<b>22.8</b>	<b>23.3</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	0.6	0.4
133	Altre malattie dei reni, (b) . . . . .	86.4	68.1
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	202.6	190.3
135	Malattie della vescica, esclusi i tumori. . . . .	12.9	17.3
136	Malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. . . . .	156.0	107.1
137	Malattie della prostata . . . . .	90.8	87.0
138, 139	Malattie degli organi genitali, (c) . . . . .	243.1	266.4
	<b>XI. - Malattie della gravidanza, parto e puerperio . . . . .</b>	<b>123.0</b>	<b>131.5</b>
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . . .	298.5	346.0
144	Emorragia puerperale . . . . .	139.2	159.7
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali . . . . .	46.2	56.7
146, 147	Tossiemia della gravidanza (albuminuria e eclampsia). . . . .	81.9	66.7
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	272.3	291.8
	<b>XII. - Malattie della pelle e dei tessuto cellulare . . . . .</b>	<b>114.2</b>	<b>120.1</b>
151, 152, 153	Malattie della pelle e del tessuto cellulare . . . . .	114.2	120.1
	<b>XIII. - Malattie delle ossa e organi della locomozione . . . . .</b>	<b>162.5</b>	<b>187.9</b>
154, 155 156	Malattie delle ossa e degli organi della locomozione (d)	162.5	187.9
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti . . . . .</b>	<b>10.6</b>	<b>12.4</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (esclusi i nati morti) . . . . .	10.6	12.4
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia . . . . .</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>
160	Conseguenze del parto . . . . .	17.7	9.5
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	1.8	0.6
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali . . . . .</b>	<b>18.7</b>	<b>22.4</b>
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	5.6	7.4
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	51.1	71.0
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	20.2	23.1
195	Altre morti violente (e) . . . . .	7.6	25.0

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 83\*.

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.



PROSPETTO LIII

**Morti dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno,  
negli anni 1931 e 1932.**

(Cifre proporzionali a 1000 morti in ciascuna classe di cause).



## CAPO III.

NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE  
E SULLE MORTI CAUSATE DA AVVELENAMENTI CRONICI,  
ACCIDENTALI O PROFESSIONALI.

**§ 1. — Morti per causa violenta, ripartiti per sesso,  
durante il periodo 1887-1932.**

Diamo, nel seguente prospetto, il numero dei morti nel Regno per *causa violenta accidentale*, per *omicidio* e *infanticidio* e per *suicidio*, divisi per sesso, nei decenni dal 1887 al 1916, nei settenni dal 1917 al 1930 e nei singoli anni 1931 e 1932.

**Morti per causa violenta, negli anni dal 1887 al 1932, distinti secondo il sesso.**

## PROSPETTO LIV.

PERIODI	CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE			OMICIDIO E INFANTICIDIO (a)			SUICIDIO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
1887-96 (media annuale)	6 749	3 398	10 147	1 295	199	1 494	1 365	327	1 692
1897-906 »	7 104	3 634	10 738	1 192	202	1 394	1 638	443	2 081
1907-16 »	13 328	8 981	(b) 22 309	1 021	215	1 236	2 112	752	2 864
1917-23 »	8 544	3 154	11 698	1 630	234	1 914	2 005	782	2 787
1924-30 »	9 929	3 527	(c) 13 456	1 010	276	1 286	2 870	985	3 855
1931 . . . . .	10 425	3 510	(d) 13 935	799	278	1 077	3 142	999	4 141
1932 . . . . .	10 456	3 596	(d) 14 052	779	263	1 042	3 035	1 023	4 058

(a) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e avvenuti in duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente, i quali, a termini dell'art. 49 del Codice penale, possono essere non punibili.

(b) La media annuale dei morti nel periodo 1907-16 tiene conto delle vittime dei terremoti avvenuti il 28 dicembre 1908 (77283) e il 13 gennaio 1915 (30476).

(c) La media annuale dei morti nel periodo 1924-30 tiene conto delle vittime dei terremoti avvenuti il 23 luglio e il 30 ottobre 1930 (1427).

(d) Per gli anni 1931 e 1932, come per tutti gli anni precedenti indicati nel prospetto, sono compresi i decessi per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

**§ 2. — Morti per causa violenta accidentale, classificati per Compartimenti, sesso, età, specie dell'infortunio e per professioni.**

*Regno.* — Nel prospetto seguente è data la mortalità nel Regno per *causa violenta accidentale*, durante il periodo d'anni corso dal 1887 al 1932. In tale prospetto, sono stati calcolati anche i numeri indici di detta mortalità, facendo uguale a 100 quella del quinquennio 1887-91. L'andamento di tali numeri indici mette

in evidenza come, fatta astrazione delle vittime causate dai terremoti avvenuti negli anni 1908, 1915 e 1930, la mortalità, per tutti gli anni del periodo preso in esame, ad eccezione del 1909 e del 1918, si è mantenuta ad un livello inferiore a quello del periodo base, toccando i minimi negli anni 1921-23, nei quali il numero indice discese a 86 nel 1921, a 87 nel 1922 e a 86 nel 1923.

### Morti per causa violenta accidentale negli anni dal 1887 al 1932.

#### PROSPETTO LV.

PERIODI	MORTI PER CAUSA VIOLENTE ACCIDENTALE	PER 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (mortalità del quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (Media annuale) . . . . .	10 581	353	100
1892-96 » . . . . .	9 713	313	89
1897-901 » . . . . .	10 310	321	91
1902-06 » . . . . .	11 165	338	96
1907 . . . . .	11 442	341	97
1908 } compresi i morti nel terremoto . . . . .	89 170	2 636	747
1908 } esclusi i morti nel terremoto . . . . .	11 887	351	99
1909 . . . . .	12 943	380	108
1910 . . . . .	11 006	320	91
1911 . . . . .	11 088	320	91
1912 . . . . .	10 979	313	89
1913 . . . . .	11 244	317	90
1914 . . . . .	11 456	319	90
1915 } compresi i morti nel terremoto . . . . .	42 178	1 159	328
1915 } esclusi i morti nel terremoto . . . . .	11 702	322	91
1916 . . . . .	11 581	315	89
1917 . . . . .	12 357	348	99
1918 . . . . .	12 921	365	103
1919 . . . . .	11 622	322	91
1920 . . . . .	11 318	311	88
1921 . . . . .	11 247	305	86
1922 . . . . .	11 172	306	87
1923 . . . . .	11 252	305	86
1924 . . . . .	12 827	331	94
1925 . . . . .	13 463	344	97
1926 . . . . .	12 659	321	91
1927 . . . . .	12 925	325	92
1928 . . . . .	13 513	336	95
1929 . . . . .	13 672	337	95
1930 } compresi i morti nel terremoto . . . . .	15 137	370	105
1930 } esclusi i morti nel terremoto . . . . .	13 710	335	95
1931 . . . . .	(a) 13 935	338	96
1932 . . . . .	(a) 14 052	338	96

(a) Vedi la nota (a) a pagina precedente.

*Distribuzione territoriale.* — La mortalità per causa violenta accidentale, in ciascun Compartimento e nel Regno, durante i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22 e 1930-32, in analogia a quanto è stato fatto per le principali cause di morte, è data nei due prospetti seguenti.

## Mortalità per causa violenta accidentale (per 100 000 abitanti).

## PROSPETTO LVI-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32 (*)
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	36.1	33.0	34.9	37.3
Liguria . . . . .	35.1	31.6	35.6	32.8
Lombardia . . . . .	32.6	34.2	32.5	38.0
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	50.0
Veneto . . . . .	29.1	30.3	33.2	32.0
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	42.2
Emilia . . . . .	29.8	31.0	31.4	34.8
Toscana . . . . .	28.4	27.5	29.7	30.4
Marche . . . . .	33.1	33.4	32.7	36.4
Umbria . . . . .	36.9	36.9	33.5	37.6
Lazio . . . . .	34.5	32.8	32.1	35.8
Abruzzi e Molise . . . . .	35.7	33.7	30.2	33.6
Campania . . . . .	34.6	36.1	30.2	31.6
Puglie . . . . .	29.7	29.4	25.4	27.6
Lucania . . . . .	46.5	42.1	36.8	40.7
Calabrie . . . . .	34.3	34.5	27.6	32.3
Sicilia . . . . .	28.7	26.4	20.9	26.5
Sardegna . . . . .	29.5	27.2	25.0	33.2
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>32.3</b>	<b>31.8</b>	<b>30.3</b>	<b>33.8</b>

## Numeri indici della mortalità per causa violenta accidentale (b).

## PROSPETTO LVI-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	91	97	103	112	104	115	111
Liguria . . . . .	90	102	93	109	99	118	97
Lombardia . . . . .	105	100	117	101	108	107	113
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	148
Veneto . . . . .	104	114	110	90	95	110	95
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	125
Emilia . . . . .	104	105	117	92	97	104	103
Toscana . . . . .	97	105	107	88	87	98	90
Marche . . . . .	101	99	110	103	105	108	108
Umbria . . . . .	100	91	102	114	116	111	111
Lazio . . . . .	95	93	104	107	103	106	106
Abruzzi e Molise . . . . .	94	84	94	111	106	100	100
Campania . . . . .	104	87	91	107	114	100	94
Puglie . . . . .	99	86	93	92	92	84	82
Lucania . . . . .	91	79	88	144	132	121	121
Calabrie . . . . .	101	80	94	106	109	91	96
Sicilia . . . . .	92	73	92	89	83	69	78
Sardegna . . . . .	92	85	113	91	86	83	98
<b>REGNO</b> { vecchi confini (c) . . . . .	<b>99</b>	<b>94</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(\*) Esclusi i morti nei terremoti avvenuti il 23 luglio e il 30 ottobre 1930.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

Dall'esame del prospetto LVI-B, risulta che per il Regno, nei vecchi confini, il numero indice della mortalità per *causa violenta accidentale* è sceso da 100 (triennio 1900-02) a 99 nel 1910-12 e a 94 nel 1920-22, mentre nel triennio 1930-32 è salito a 103, pure escludendo le vittime dei terremoti avvenuti in luglio e in ottobre del 1930.

Nei singoli Compartimenti si nota, nel triennio 1930-32 a confronto del triennio base 1900-02, un aumento di detta mortalità per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, la Toscana, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna; e una diminuzione per i restanti Compartimenti.

Nello stesso prospetto in cui è fatta uguale a 100 la mortalità media del Regno, si rileva che nei Compartimenti del Piemonte, della Lombardia, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi e Molise e della Lucania, la mortalità per *causa violenta accidentale* è stata, in tutti i periodi considerati, superiore o uguale a quella del Regno (a questi Compartimenti si aggiungano, nel 1930-32, quelli della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia e Zara), mentre nella Toscana, nelle Puglie, nella Sicilia e nella Sardegna, ne è stata inferiore.

*Età e sesso.* — Esaminando i quozienti specifici di mortalità per età e sesso (prospetto LVII) si nota che la mortalità complessiva per *causa violenta accidentale*, nei trienni considerati, è superiore nei maschi: nei singoli gruppi di età avviene lo stesso fatto, anzi la prevalenza dei maschi sulle femmine appare molto più accentuata nei gruppi di età da 15 a 59 anni in confronto agli altri gruppi, e ciò può essere messo in relazione al fatto che nell'età da 15 a 59 anni, i maschi esplicano la loro attività lavorativa che li espone a maggiori rischi, mentre le femmine attendono, generalmente, ad una attività in casa che le espone a rischi molto più limitati.

La mortalità è, in genere, più elevata, sia nei maschi che nelle femmine, nei bambini da 1 a 4 anni e nelle età avanzate: è anche considerevole nei bambini nel primo anno di vita.

#### Quozienti specifici di mortalità per causa violenta accidentale.

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

##### PROSPETTO LVII.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32 (a)		
	medie annuali											
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
fino a 1 anno . . .	3.35	3.18	3.27	3.20	3.04	3.12	2.46	2.28	2.37	2.74	2.54	2.64
1-4 anni . . .	7.37	6.99	7.18	8.17	6.96	7.58	6.83	5.38	6.12	6.56	5.36	5.97
5-14 » . . .	2.47	1.73	2.11	2.56	1.58	2.08	2.62	1.15	1.90	2.62	1.11	1.88
15-29 » . . .	2.88	0.70	1.77	3.28	0.58	1.87	3.86	0.60	2.18	4.21	0.55	2.37
30-39 » . . .	3.13	0.72	1.90	3.33	0.60	1.90	3.78	0.63	2.11	4.58	0.62	2.45
40-49 » . . .	3.84	0.95	2.38	3.96	0.91	2.39	4.36	0.87	2.58	5.31	0.87	2.92
50-59 » . . .	5.15	1.56	3.32	5.04	1.30	3.14	5.52	1.33	3.41	6.87	1.42	4.05
60-69 » . . .	7.40	3.07	5.20	7.52	2.41	4.93	7.58	2.46	4.99	8.74	2.71	5.63
70-∞ . . . .	13.84	10.75	12.28	12.19	8.57	10.35	11.69	7.67	9.64	13.40	7.92	10.51
<b>Totale . . .</b>	<b>4.25</b>	<b>2.20</b>	<b>3.22</b>	<b>4.45</b>	<b>1.97</b>	<b>3.19</b>	<b>4.49</b>	<b>1.58</b>	<b>3.02</b>	<b>5.13</b>	<b>1.69</b>	<b>3.37</b>

(a) Esclusi i morti nei terremoti avvenuti il 23 luglio e il 30 ottobre 1930.

(b) Esclusa l'età ignota.

La mortalità complessiva dei maschi, dal periodo 1900-02, rispetto a quella degli altri trienni considerati, è aumentata progressivamente, mentre nelle femmine si è verificato il fatto opposto, fatta eccezione per il periodo 1930-32 in cui la mortalità è leggermente superiore a quella del periodo 1920-22. Nei singoli gruppi di età, sia dei maschi che delle femmine, e salvo eccezioni, si ha un andamento analogo a quello sopra detto.

*Cause.* — Fra le cause più frequenti delle *morti accidentali* avvenute sia nei maschi sia nelle femmine, durante gli anni 1931 e 1932, si notarono le lesioni da caduta o schiacciamento, gli annegamenti e le ustioni.

**Morti per causa violenta accidentale,  
negli anni 1931 e 1932, classificati secondo il sesso e la specie dell'infortunio.**

PROSPETTO LVIII.

CAUSE DELLE MORTE ACCIDENTALI (a)	MORTI PER CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE (b)				CIFRE PROPORZIONALI A 1 000 MORTE PER QUALSIASI CAUSA ACCIDENTALE			
	1931		1932		1931		1932	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .	9	2	8	7	0.9	0.6	0.8	1.9
Avvelenamento da alimenti guasti . . . . .	27	18	31	41	2.6	5.2	3.0	11.4
Assorbimento di gas tossici . . . . .	126	36	107	37	12.2	10.4	10.3	10.3
Altri avvelenamenti acuti, eccettuati quelli da gas . . . . .	81	62	79	57	7.8	17.8	7.6	15.9
Per incendio . . . . .	52	40	59	59	5.0	11.5	5.7	16.4
Per ustioni (diverse da quelle per in- cendio) . . . . .	921	1 106	901	1 055	89.2	318.0	86.5	293.9
Per soffocazione meccanica . . . . .	39	25	46	31	3.8	7.2	4.4	8.6
Per annegamento . . . . .	1 326	336	1 362	395	128.4	96.6	130.7	110.0
Per trauma da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra) . . . . .	220	23	223	30	21.3	6.6	21.9	8.4
Per trauma da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra) . . . . .	28	6	41	8	2.7	1.7	3.9	2.2
Per lesioni da caduta, schiacciamento, frana . . . . .	6 241	1 588	6 604	1 701	604.5	456.6	633.7	473.8
Per violenze di animali . . . . .	182	31	214	26	17.6	8.9	20.5	7.2
Per freddo eccessivo . . . . .	140	35	159	22	13.6	10.1	15.3	6.1
Per caldo eccessivo . . . . .	357	73	69	12	34.6	21.0	6.6	3.3
Per fulmine . . . . .	66	13	92	37	6.4	3.7	8.8	10.3
Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . . .	210	15	177	18	20.3	4.3	17.0	5.0
Per altri accidenti:								
a) corpi estranei . . . . .	70	41	39	26	6.8	11.8	3.7	7.2
b) altri . . . . .	230	28	206	28	22.3	8.1	19.8	7.8
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>10 325</b>	<b>3 478</b>	<b>10 422</b>	<b>3 590</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>

(a) Delle morti accidentali in istato d'ubbrichezza, che nelle statistiche a tutto l'anno 1923 venivano classificate in una sola voce, a partire dal 1924 se n'è fatta la distinzione di quelle avvenute per avvelenamento acuto da alcool, da quelle per infortunio causato dall'ubbrichezza. Le prime sono state messe nella voce «*alcoolismo acuto*» (n. 180 dell'Elenco nosologico adottato dal 1924 al 1930), e nella voce «*alcoolismo acuto e cronico*» (n. 75 del nuovo Elenco nosologico adottato dal 1931), non facendo così più parte del gruppo delle *morti violente accidentali*; le seconde sono state classificate nei rispettivi infortuni, come è indicato qui appresso:

**Morti per infortunio causato dall'ubbrichezza.**  
(Compresi nelle cifre rispettive del prospetto soprastante)

SPECIE DELL'INFORTUNIO	1931		1932	
	M	F	M	F
Annegamento . . . . .	3	—	2	—
Freddo . . . . .	11	2	7	—
Caduta . . . . .	33	3	—	—
Schiacciamento . . . . .	1	—	28	—
Ustioni, escluse le morti per incendio . . . . .	1	—	—	2

(b) Esclusi i decessi per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

*Infortuni sul lavoro.* — A cominciare dall'anno 1926, si è fatto lo spoglio dei casi di morte per *causa violenta accidentale*, indicata come avvenuta per *infortunio sul lavoro*.

Tale notizia non era stata richiesta nelle schede di morte, però, essendosi notato che in alcune schede essa era aggiunta, si ritenne opportuno, per gli anni dal 1926 al 1930, di esaminare a parte tali schede, pur riconoscendo che esse non rappresentavano che una piccola parte delle morti che possono essere considerate come dipendenti da *infortuni sul lavoro*; ed infatti, dallo spoglio delle schede di morte negli anni 1931 e 1932, sulle quali venne esplicitamente richiesta la suddetta notizia, si sono ottenuti i dati riportati nel seguente prospetto, che sono di gran lunga superiori a quelli degli anni antecedenti. Su 10 325 morti nel 1931 per *causa violenta accidentale* nei maschi, 2322 furono dichiarate come avvenute per *infortunio sul lavoro*, e cioè il 23 %: nel 1932 tale proporzione salì a 25 %. Nelle femmine, come è ovvio, la proporzione è molto più bassa; essa, in entrambi gli anni, rappresenta soltanto il 5 %.

Le cause più frequenti delle morti per *infortuni sul lavoro*, per i maschi, sono, in genere, le cadute o gli schiacciamenti, gli accidenti dovuti a corrente elettrica, il caldo eccessivo, le violenze di animali, l'annegamento e le ustioni.

**Morti per causa violenta accidentale,  
indicate come dipendenti da infortunio sul lavoro, negli anni 1931 e 1932.**

PROSPETTO LIX.

SPECIE DELL'INFORTUNIO	1931		1932	
	M	F	M	F
Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .	—	—	1	—
Assorbimento di gas tossici . . . . .	53	1	42	1
Altri avvelenamenti acuti, eccettuati quelli da gas .	—	1	2	1
Per incendio . . . . .	6	1	2	1
Per ustioni (diverse da quelle per incendio) . . . .	38	5	63	7
Per soffocazione meccanica . . . . .	4	—	4	—
Per annegamento . . . . .	58	13	99	15
Per trauma da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra) . . . . .	8	—	22	1
Per trauma da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra) . . . . .	10	—	21	3
Per lesioni da caduta, schiacciamento, frana . . .	1 702	118	2 006	123
Per violenze di animali . . . . .	85	8	97	7
Per freddo eccessivo . . . . .	5	—	3	—
Per caldo eccessivo . . . . .	93	12	9	—
Per fulmine . . . . .	30	—	26	5
Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . .	111	2	95	—
Per altri accidenti:				
a) corpi estranei . . . . .	—	—	3	—
b) altri . . . . .	119	3	119	6
<b>In complesso . . .</b>	<b>2 322</b>	<b>164</b>	<b>2 614</b>	<b>170</b>

*Infortuni causati da mezzi di trasporto.* — Con l'anno 1911 furono incominciate le ricerche circa il numero dei morti per infortuni dovuti ad automobili e biciclette, e, negli anni successivi, tali ricerche furono estese a tutti i mezzi meccanici di trasporto.



Raccogliamo, nel seguente prospetto, i dati riguardanti le morti per schiacciamento o per caduta o per annegamento o per ustioni, causate dai detti mezzi di trasporto, per gli anni dal 1919 al 1932.

**Morti per infortunio causato da mezzi meccanici di trasporto, negli anni dal 1919 al 1932.**

PROSPETTO LX.

MEZZI DI TRASPORTO	1919		1920		1921		1922		1923		1924		1925	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Automobile . . . . .	249	57	204	51	150	40	169	34	159	57	280	83	283	105
Bicicletta . . . . .	16	5	12	9	18	9	6	6	11	8	59	15	64	8
Motocicletta . . . . .	16	3	12	3	18	4	13	3	13	5	65	8	75	13
Ferrovia . . . . .	385	33	272	57	265	50	225	49	172	43	296	57	242	53
Tramvia . . . . .	144	27	173	39	146	29	91	20	88	8	110	26	84	29
Autocarro . . . . .	175	20	108	14	69	17	39	17	52	7	55	5	69	10
Ascensore . . . . .	1	1	3	1	1	—	—	—	2	—	3	—	5	2
Velivolo . . . . .	50	—	13	—	20	2	24	—	14	—	40	1	53	1
di cui per precipitazioni . . . . .	48	—	13	—	14	1	23	—	13	—	38	1	51	—
Teleferica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Funicolare . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motoscafo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>976</b>	<b>146</b>	<b>797</b>	<b>174</b>	<b>687</b>	<b>151</b>	<b>567</b>	<b>129</b>	<b>511</b>	<b>128</b>	<b>908</b>	<b>195</b>	<b>878</b>	<b>221</b>
	<b>1122</b>		<b>971</b>		<b>838</b>		<b>696</b>		<b>639</b>		<b>1103</b>		<b>1099</b>	
Numeri indici (1919 = 100) . . . . .	100		87		75		62		57		98		98	
Cifre proporzionali a 1.000.000 di abitanti . . . . .	31,11		26,70		22,72		19,03		17,33		28,44		28,10	
Numeri indici (proporzione dei morti ad un milione di abitanti nel 1919 = 100) . . . . .	100		86		73		61		56		91		90	

**Morti per infortunio causato da mezzi meccanici di trasporto, negli anni dal 1919 al 1932.**

Segue: PROSPETTO LX.

MEZZI DI TRASPORTO	1926		1927		1928		1929		1930		1931		1932	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Automobile . . . . .	448	107	547	150	707	183	762	204	962	252	1091	233	1164	287
Bicicletta . . . . .	81	20	144	19	140	21	137	19	181	29	219	35	258	38
Motocicletta . . . . .	125	16	185	13	195	36	176	13	236	39	220	40	282	42
Ferrovia . . . . .	312	61	345	67	383	48	351	55	378	91	328	75	351	59
Tramvia . . . . .	151	34	170	42	134	34	142	53	154	37	134	29	133	31
Autocarro . . . . .	108	13	124	9	147	22	182	26	193	37	193	31	276	39
Ascensore . . . . .	2	1	5	1	6	2	3	1	7	—	2	—	3	—
Velivolo . . . . .	38	—	68	—	48	—	59	1	74	3	76	1	92	3
di cui per precipitazioni . . . . .	36	—	64	—	48	—	57	—	72	1	71	—	79	3
Teleferica . . . . .	1	2	8	—	8	—	8	—	10	1	5	—	4	1
Funicolare . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Motoscafo . . . . .	—	—	—	—	11	2	—	—	1	—	—	—	—	—
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>1267</b>	<b>254</b>	<b>1596</b>	<b>301</b>	<b>1779</b>	<b>348</b>	<b>1820</b>	<b>372</b>	<b>2196</b>	<b>490</b>	<b>2269</b>	<b>444</b>	<b>2563</b>	<b>500</b>
	<b>1521</b>		<b>1897</b>		<b>2127</b>		<b>2192</b>		<b>2686</b>		<b>2713</b>		<b>3063</b>	
Numeri indici (1919 = 100) . . . . .	136		169		190		195		239		242		273	
Cifre proporzionali a 1.000.000 di abitanti . . . . .	38,54		47,65		52,91		54,06		65,69		65,89		73,59	
Numeri indici (proporzione dei morti ad un milione di abitanti nel 1919 = 100) . . . . .	124		133		170		174		211		212		—	

Gli infortuni derivati da mezzi meccanici di trasporto, che erano andati diminuendo dal 1919 al 1923 (da 31, 11 morti per ogni milione di abitanti nel 1919 a 17,33 nel 1923), risalarono sensibilmente nel 1924 e nel 1925 (28,44 per ogni milione di abitanti nel 1924 e 28,10 nel 1925), e più ancora dal 1926 al 1932, tantochè, in questo ultimo anno, essi raggiunsero la proporzione di 74, circa, per ogni milione

di abitanti. In questi ultimi sette anni si nota un forte aumento nelle morti causate dall'uso delle automobili, biciclette e motociclette, in confronto agli anni precedenti presi in esame.

*Natura del veleno nei casi di avvelenamento.* Per le morti dovute ad avvelenamento acuto accidentale, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze venefiche che produssero la morte. Nel prospetto seguente sono riferiti i casi avvenuti negli anni 1930, 1931 e 1932.

**Morti per avvelenamento acuto accidentale,  
negli anni 1930, 1931 e 1932, classificati per sesso e secondo la natura del veleno.**

**PROSPETTO LXI.**

NATURA DEI VELENI (a)	1930		1931		1932		NATURA DEI VELENI (a)	1930		1931		1932	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Aceto aromatico . . . . .	—	I	—	—	—	—	Metano . . . . .	I	—	—	—	—	—
Acido acetico . . . . .	I	I	I	I	—	—	Mirbana . . . . .	—	—	I	—	I	—
Acido cianidrico:							Morfina . . . . .	—	—	I	—	—	I
<i>acido cianidrico o cianuri</i>							Muscarina . . . . .	—	I	—	—	—	—
<i>(senza altra indicazione)</i>							Nicotina . . . . .	I	—	I	—	—	—
<i>ingestione di mandorle amare</i>							Opio . . . . .	—	—	—	—	I	—
<i>o semi di pesche . . . . .</i>			2	I	I	—	Ossido di carbonio:						
Acido cloridrico . . . . .	5	I	4	—	4	I	<i>ossido di carbonio (senza</i>						
Acido fenico . . . . .	2	I	I	—	—	—	<i>altra indicazione) . . . . .</i>	32	I3	52	I3	60	I9
Acido nitrico . . . . .	I	I	—	—	I	I	<i>bruciato di carbone e com-</i>						
Acido ossalico . . . . .	—	I	—	—	—	—	<i>bustibile di legna . . . . .</i>					I	—
Acido solfidrico:							<i>stufa guasta . . . . .</i>	2	—	—	2	—	—
<i>acido solfidrico (senza altra</i>							<i>gas illuminante . . . . .</i>	IO	I	I4	IO	I3	6
<i>indicazione) . . . . .</i>	I	—	4	—	—	—	<i>fermentazione di mosto . . . . .</i>	4	—	I	—	4	—
<i>in pozzi o fogne . . . . .</i>	6	—	—	—	7	—	Petrolio . . . . .	I	—	—	I	—	—
Acido solforico . . . . .	12	8	5	7	12	6	Rame:						
Acidi non specificati . . . . .	—	—	—	I	—	—	<i>solfato . . . . .</i>	2	2	3	3	2	I
Aconito . . . . .	—	—	—	I	—	—	<i>sali non specificati . . . . .</i>	3	I	I	—	—	I
Alcool denaturato . . . . .	—	—	I	—	—	—	Ricino (semi e ricinina) . . . . .	I	—	I	3	—	—
Ammoniaca . . . . .	I	—	3	I	3	I	Soda e potassa . . . . .	5	2	7	2	8	6
Anidride solforosa . . . . .	2	I	2	—	—	—	Solfato di sodio . . . . .	—	—	—	—	—	I
Arsenico e suoi preparati . . . . .	2	I	I	I	2	I	Solfuro di carbonio . . . . .	2	—	4	—	4	I
Belladonna e atropina . . . . .	2	I	—	—	3	—	Somnifen « Roche » . . . . .	—	I	—	—	—	—
Benzina . . . . .	5	—	I	—	—	—	Sostanze alimentari:						
Bismuto . . . . .	—	—	—	—	—	I	<i>funghi velenosi . . . . .</i>	23	24	18	14	22	31
Chinina (sali di) . . . . .	21	19	18	14	18	14	<i>carne insaccata . . . . .</i>	9	4	2	2	5	6
Cicuta . . . . .	I	I	I	2	3	I	<i>altre sostanze alimentari al-</i>						
Clorato di potassio . . . . .	—	I	—	—	—	—	<i>terate . . . . .</i>	—	I	7	2	4	4
Cloro . . . . .	—	—	I	—	—	—	Sostanze ipnotiche non speci-						
Clorofornio . . . . .	I	—	I	—	—	—	<i>ficato . . . . .</i>	I	I	2	4	—	—
Cloruro di bario . . . . .	I	—	—	—	—	—	Stramonio . . . . .	—	I	—	—	—	—
Cloruro di calcio . . . . .	—	I	—	—	—	—	Stricnina . . . . .	I	I	I	3	I	—
Concime chimico . . . . .	I	—	—	—	—	—	Strofantio . . . . .	—	—	—	—	I	—
Creolina . . . . .	2	—	2	—	2	—	Trementina . . . . .	—	—	—	I	—	—
Dial . . . . .	—	—	I	—	—	—	Varecchina . . . . .	—	2	—	—	—	—
Digitale . . . . .	—	—	I	—	I	—	Veronal . . . . .	—	I	4	—	I	2
Dinal . . . . .	—	I	—	—	—	—	Zinco:						
Eroina . . . . .	2	—	—	—	—	—	<i>cloruro di zinco . . . . .</i>	2	—	I	—	—	—
Fernet . . . . .	I	—	—	—	—	—	<i>solfato di zinco . . . . .</i>	—	I	—	—	—	—
Formolo . . . . .	—	I	—	—	—	—	Medicamenti non chiaramente						
Fosforo . . . . .	I	—	—	—	—	—	<i>indicati . . . . .</i>	2	—	—	—	—	—
Gas irrespirabili o tossici (non							Veleni non specificati:						
<i>specificati):</i>							<i>preparati e sostanze varie</i>						
<i>gas irrespirabili o tossici</i>							<i>non ben precisati . . . . .</i>	3	4	2	6	6	4
<i>(non specificati) . . . . .</i>	48	21	49	2	15	10	<i>sostanze non indicate . . . . .</i>	—	2	4	10	3	4
<i>di miniera . . . . .</i>	—	—	—	—	I	—	Morsi o punture di animali ve-						
<i>da scoppio di granata . . . . .</i>	—	—	—	—	—	I	<i>lenosi:</i>						
Infuso di foglie di oleandro . . . . .	—	—	—	—	—	I	<i>api . . . . .</i>	—	—	—	—	I	—
Ingestione di più sost. velenose	2	I	—	—	—	—	<i>scorpione . . . . .</i>	—	—	I	—	—	—
Iodio . . . . .	—	—	I	—	—	—	<i>tarantola . . . . .</i>	—	—	I	—	—	—
Kalmine . . . . .	—	—	—	—	—	I	<i>vespe . . . . .</i>	—	—	I	—	I	I
Lisolo . . . . .	I	—	—	—	I	—	<i>viperi o serpenti velenosi</i>						
Mercurio:							<i>non specificati . . . . .</i>	2	6	5	2	4	4
<i>sublimato corrosivo . . . . .</i>	2	12	5	7	3	7	<i>non specificati . . . . .</i>	4	I	I	—	2	2
<i>altri sali e preparati non</i>													
<i>specificati . . . . .</i>	I	I	I	—	—	2	<b>In complesso . . . . .</b>	<b>237</b>	<b>156</b>	<b>243</b>	<b>118</b>	<b>225</b>	<b>142</b>

(a) Sono stati indicati tutti i veleni che erano specificati nelle schede di morte.

Poichè è di comune constatazione che alcuni avvelenamenti accidentali, quali, ad esempio, quelli per ossido di carbonio, per acido solfidrico, ecc., possono verificarsi in circostanze diverse, si è tenuto conto, a cominciare dall'anno 1928, negli spogli delle schede di morte, delle notizie che a tale riguardo figuravano nelle schede stesse. E per quanto tali circostanze siano state annotate solo raramente, tuttavia risulta che, nel complesso del triennio 1930-32, nel quale si verificarono 9 casi di avvelenamento per acido cianidrico, per 4 di essi venne indicato, sulle schede, che la morte fu dovuta a ingestione di mandorle amare o semi di pesche; sopra 18 avvelenamenti per acido solfidrico, durante il suddetto triennio, 13 avvennero in fogne o pozzi e per 5 non venne data alcuna notizia; sopra 267 avvelenamenti per ossido di carbonio, le circostanze diverse in cui essi si verificarono vennero specificate soltanto per 78 casi, e cioè: 1 per gas esalato da braciere di carbone o da combustione di legna, 64 per fughe di gas illuminante, 9 per fermentazione di mosto e 4 per stufe guaste; su 178 avvelenamenti per sostanze alimentari, soltanto 28 furono dovuti a botulismo, 132 a ingestioni di funghi velenosi e 18 ad altre sostanze alimentari alterate.

È da notare la frequenza, in tutti e tre gli anni, delle morti per gas irrespirabili o tossici non specificati, per ossido di carbonio, per avvelenamento da alimenti guasti e da funghi, da sostanze medicinali, quali i sali di chinina, i sali o preparati di mercurio e di rame; e quella da sostanze largamente adoperate per uso domestico, come l'acido cloridrico, la benzina, il petrolio, la soda e la potassa. Le sostanze e i preparati medicinali ad azione ipnotica (morfina, oppio, somnifen « Roche », ecc.) non danno, invece, un numero elevato di morti *accidentali per avvelenamento*.

*Professioni.* — Le tavole XXI e XVI danno, rispettivamente, per gli anni 1931 e 1932 il numero dei morti per *causa violenta accidentale*, in età da 15 anni in poi, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio ed il sesso.

Per calcolare correttamente i quozienti di mortalità per ciascuna categoria professionale delle tavole ora dette, si dovrebbe mettere in rapporto il numero totale dei morti, distinti secondo la professione, al numero totale dei viventi della stessa categoria professionale, ma, dati i criteri diversi coi quali sono classificati secondo le singole professioni tanto i viventi censiti quanto i morti in ciascun anno, non è possibile istituire tale rapporto in occasione dei censimenti.

In mancanza di tali quozienti, e con ogni riserva nei riguardi del diverso grado di esposizione al rischio degli appartenenti alle varie categorie professionali, si può avere un'idea delle pericolosità di una data professione, in maniera molto meno corretta, cercando di conoscere quanti morti per *cause violente accidentali* vi siano in una data categoria professionale su 1000 morti, per ogni causa, della stessa categoria professionale.

Nel prospetto seguente sono riportate le dette proporzioni per i maschi, in età da 15 anni in poi, morti nel Regno per *causa violenta accidentale*, dalle quali appare che gli infortuni mortali sono stati, nel 1931 e nel 1932, come negli anni precedenti, molto frequenti nei minatori, cavatori e solfatai, nei sottufficiali e soldati di terra, di mare e d'aria, compresa la Regia Guardia di Finanza e le varie Milizie, nei tramvieri e ferrovieri, negli Ufficiali di terra, di mare

e d'aria, negli operai chimici in genere, nei cocchieri e carrettieri, nei metallurgici e meccanici, negli operai non specificati, nei muratori, manovali, lastricatori, stucatori, imbianchini, pittori di stanze, scalpellini, marmisti e segatori di pietre.

**Maschi, in età da 15 anni in poi, morti per causa violenta accidentale, classificati per professione o condizione, negli anni 1931 e 1932.**

PROSPETTO LXII.

CLASSE (a)	CATEGORIA (a)	SOTTOCATEGORIA (a)	PROFESSIONE O CONDIZIONE	MORTI PER CAUSA VIOLENTE ACCIDENTALE (b)		CIFRE PROPORZIONALI A 1000 MASCHI MORTI DA 15 ANNI IN POI DELLA STESSA PROFESSIONE (c)	
				1931	1932	1931	1932
1	1	1 c 2	Agricoltori di ogni specie . . . . .	3 298	3 432	34.0	32.7
2	1	0	Industriali, commercianti . . . . .	178	180	28.7	29.3
3	1	0	Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate . . . . .	104	113	29.5	30.7
3	2	0	Esercenti . . . . .	34	24	28.3	19.9
3	3	q	Commissionari, rappresentanti . . . . .	55	53	29.5	29.9
4	1	0	Minatori, cavatori, ecc. . . . .	148	133	132.6	117.9
4	2	0	Falegnami, verniciatori, ecc. . . . .	201	235	34.1	39.4
4	3	1 2 3 4	Addetti alla macellazione e conservazione delle carni, ai forni, ai pastifici, alla lavorazione del latte e alle industrie alimentari . . . . .	115	133	44.1	48.8
4	4	1 c 2	Conciatori, pellai, calzolai, guantai, ecc. . . . .	115	109	24.5	23.0
4	5	1 e 2	Metallurgici, meccanici, elettricisti, ecc. . . . .	495	473	76.0	73.5
4	6	1 e 0	Argentieri, orifici, ecc. . . . .	14	14	31.3	32.0
4	7	1 e 2	Asfaltisti, fornaciai, ceramisti, vetrai, ecc. . . . .	39	36	49.4	45.5
4	8	1 e 2	Muratori, imbianchini, manovali, braccianti, ecc. . . . .	926	899	65.0	61.8
4	9	1 c 2	Addetti all'industria tessile e a manifatture tessili . . . . .	44	41	37.0	35.6
4	10	1 e 2	Addetti all'industria del vestiario e all'arredamento . . . . .	51	44	23.4	21.1
4	11	1 e 2	Addetti alle industrie chimiche e manifattura tabacchi (d) . . . . .	18	13	109.8	84.4
4	12	1 c 2	Addetti alle industrie poligrafiche e della carta . . . . .	23	32	31.2	41.5
4	13	0	Operai non specificati . . . . .	255	276	80.4	73.6
5	1	0	Cocchieri, carrettieri, ecc. . . . .	260	269	83.9	87.4
5	2	0	Ferrovieri, tramvieri, conduttori di automobili, addetti ai trasporti aerei . . . . .	212	249	105.5	126.1
5	3	0	Marinai, barcaioi, pescatori, ecc. . . . .	56	96	33.1	54.6
6	1	1 c 2	Addetti alla cura e alla acconciatura della persona . . . . .	29	28	22.8	22.7
6	2 e 3	0	Addetti ai servizi domestici, garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici . . . . .	152	137	48.6	45.8
6	4	1	Facchini, spazzini, cantonieri . . . . .	116	104	53.8	48.2
6	4	2	Venditori ambulanti, saltimbanchi, venturieri . . . . .	69	54	43.9	34.1
7	1	0	Personale subalterno dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . .	34	35	42.7	39.4
8	1 e 2	0	Esercito, marina, aeronautica, guardie di finanza e milizia (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	152	167	159.5	154.9
8	3	0	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici . . . . .	17	25	38.9	60.5
9	1	1 e 2	Culto cattolico e altri culti . . . . .	19	22	13.8	14.9
9	2	1	Insegnanti . . . . .	19	14	29.5	24.0
9	2 e 4	2	Professioni liberali e arti belle . . . . .	66	69	25.8	26.6
9	3	0	Arti sanitarie . . . . .	25	26	26.2	26.7
10	1 2 3	1 e 2	Ufficiali di terra, di mare e d'aria . . . . .	40	30	152.7	112.4
10	4	0	Impiegati pubblici e privati . . . . .	143	190	26.6	34.7
10	5	0	Pensionati . . . . .	98	125	10.3	11.9
11	1	0	Proprietari e benestanti . . . . .	142	149	15.4	16.4
12	1	0	Studenti . . . . .	65	87	58.4	80.0
12 e 0	3 e 4	1 a 5	Disoccupati, invalidi, ricoverati, mendicanti, professione ignota . . . . .	137	152	22.8	21.6
			<b>In complesso . . . . .</b>	<b>7 964</b>	<b>8 068</b>	<b>38.3</b>	<b>38.0</b>

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: «*Nomenclatura professionale*» — Roma, Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, 1928-VII.

(b) Esclusi i decessi per *causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente)* è sconosciuta.

(c) Escluse le morti per *cause non determinate* (classe XVIII) del nuovo Elenco nosologico adottato dal 1931.

(d) Nell'anno 1931 non si è verificato nessun caso di morte per *causa violenta accidentale* fra gli addetti alle manifatture dei tabacchi.

A complemento delle notizie già date, circa la mortalità per *causa violenta accidentale*, aggiungiamo che essa, nel 1931 e nel 1932, è stata, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, superiore a quella degli altri Comuni.

### § 3. — Morti causate da avvelenamenti cronici e intossicazione.

Giova ricordare che tra le morti per malattie ordinarie sono comprese, a partire dall'anno 1924, anche quelle causate da *avvelenamento cronico* da *sostanze minerali* e da *sostanze organiche* (escluso l'*alcolismo cronico*).

Per l'importanza che può avere una conoscenza più profonda della frequenza degli *avvelenamenti cronici* e delle caratteristiche che li accompagnano, si è ritenuto opportuno approfondirne l'esame, ed, a cominciare dall'anno 1926, essi sono stati classificati anche secondo le età e la professione o condizione dei morti e la natura della sostanza tossica.

Dal prospetto seguente risulta la frequenza degli *avvelenamenti cronici*, per gli anni dal 1930 al 1932.

#### Morti per avvelenamento cronico e intossicazione, negli anni dal 1930 al 1932.

PROSPETTO LXIII.

NUMERI DELLELENCO NOSOLOGICO	AVVELENAMENTO CRONICO	1930		1931		1932	
		M	F	M	F	M	F
76	da sostanze organiche ( <i>escluso l'alcolismo cronico</i> ) . . . . .	10	4	5	9	21	3
77	da sostanze minerali . . . . .	28	2	29	1	30	—

Gli *avvelenamenti cronici* da sostanze *minerali*, che furono in numero di 45 nel 1926, discesero a 34 nel 1927 ed a 28 nel 1928, risalirono a 37 nel 1929, ridiscendendo a 30 in ciascuno degli anni dal 1930 al 1932. Il numero dei morti per *avvelenamento cronico* da *sostanze organiche* si mantenne pressochè costante nel sessennio 1926-31, mentre è sensibilmente aumentato nel 1932.

Dai due prospetti seguenti risultano le sostanze venefiche, l'età e il sesso dei morti per *avvelenamenti cronici*, durante gli anni 1930, 1931 e 1932.

Nel primo di essi, che dà pure, per ogni gruppo di età, la distinzione dei morti negli anni 1931 e 1932 per *avvelenamento cronico* da *sostanze minerali* a causa professionale, appare costante, nel triennio 1930-32, la maggior frequenza assoluta di tali morti nei gruppi di età al di sopra dei 39 anni, il che è facilmente spiegabile con la natura delle lesioni determinate dagli avvelenamenti per piombo, che sono compatibili con la vita; quando esse si siano limitate ad organi non vitali e cessi l'esposizione all'avvelenamento. È da notare, però, che anche al di sotto dei 40 anni si trovano casi di morte per la causa in esame. Prevalentemente il piombo risulta come causa determinante di *avvelenamenti cronici* mortali per le *sostanze minerali*.

Per le sostanze organiche (prospetto LXV) risultano, con un maggior numero assoluto di morti, la morfina (11 casi nel 1930 e 1931, e 14 nel 1932) cui seguono, la nicotina, gli stupefacenti senza altra indicazione, l'oppio, l'eroina e la paramorfina: non si sono verificati, nel triennio 1930-32, morti per *avvelenamento cronico* da cocaina.

In genere, questi avvelenamenti sono più frequenti nel sesso maschile, e in quanto all'età, gli *avvelenamenti da sostanze organiche* sono più frequenti da 40 anni in poi; e ciò è in rapporto, sia alla lentezza con cui queste sostanze determinano nell'organismo umano alterazioni tali da condurre a morte, sia alla maggior frequenza con la quale nelle età avanzate si verificano malattie a lungo decorso, che inducono gli ammalati all'uso dell'oppio e dei suoi derivati.

**Morti per avvelenamento cronico da sostanze minerali, negli anni 1930, 1931 e 1932, classificati secondo l'età alla morte, la natura del veleno ed il sesso (a).**

PROSPETTO LXIV.

ETÀ ALLA MORTE		NATURA DEL VELENO										
		Piombo						Mercurio		Ossido di rame		
		1930		1931		1932		1932		1932		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Da 15 a 19 anni	<b>Totale</b> . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 20 a 24 »	<b>Totale</b> . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
» 25 a 29 »	<b>Totale</b> . . . . .	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	?	?	1	—	1	—	—	—	—	—	—
» 30 a 39 »	<b>Totale</b> . . . . .	3	—	3	—	3	—	—	—	1	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	?	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—
» 40 a 49 »	<b>Totale</b> . . . . .	6	—	9	—	5	—	1	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	?	—	8	—	4	—	1	—	—	—	—
» 50 a 59 »	<b>Totale</b> . . . . .	8	1	6	1	7	—	—	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	?	?	5	—	7	—	—	—	—	—	—
» 60 a 69 »	<b>Totale</b> . . . . .	8	—	6	—	10	—	—	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	?	—	3	—	9	—	—	—	—	—	—
» 70-»	<b>Totale</b> . . . . .	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	?	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
<b>In complesso</b>	<b>Totale</b> . . . . .	28	2	29	1	27	—	2	—	1	—	—
	di cui indicati come professionali . . . . .	?	?	22	—	25	—	1	—	1	—	—

(a) Negli anni 1930 e 1931 non si verificarono decessi per avvelenamento cronico da mercurio e da ossido di rame.

**Morti per avvelenamento cronico da sostanze organiche, negli anni 1930, 1931 e 1932 (a), classificati secondo l'età alla morte, la natura del veleno ed il sesso.**

**PROSPETTO LXV.**

ETÀ ALLA MORTE (b)	NATURA DEL VELENO											IN COMPLESSO				
	Oppio senza altra indicazione		Morfina		Paramorfina		Eroina		Nicotina		Stupefacente senza altra indicazione					
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
<b>Anno 1930</b>																
Da 25 a 29 anni . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
» 30 » 39 » . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 40 » 49 » . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
» 50 » 59 » . . .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
» 60 » 69 » . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
» 70 - ω . . .	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	2
<b>In complesso . . .</b>	—	—	<b>7</b>	<b>4</b>	—	—	—	—	—	<b>3</b>	—	—	—	—	<b>10</b>	<b>4</b>
<b>Anno 1931</b>																
Da 30 a 39 anni . . .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
» 40 » 49 » . . .	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	6
» 50 » 59 » . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
» 60 » 69 » . . .	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
» 70 - ω . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>In complesso . . .</b>	—	—	<b>5</b>	<b>6</b>	—	<b>1</b>	—	—	—	—	<b>1</b>	—	—	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
<b>Anno 1932</b>																
Da 30 a 39 anni . . .	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—
» 40 » 49 » . . .	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
» 50 » 59 » . . .	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1
» 60 » 69 » . . .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	1
» 70 - ω . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	5	—
<b>In complesso . . .</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	—	—	<b>1</b>	—	—	<b>4</b>	—	<b>3</b>	—	—	<b>21</b>	<b>3</b>

(a) Negli anni 1931 e 1932 non si sono verificati casi di morte per avvelenamento cronico da sostanze organiche a causa professionale; per il 1930, non si conosce tale distinzione.

(b) Nei gruppi di età che non sono indicati, non si verificò alcun caso di morte.

I seguenti prospetti (LXVI e LVII) danno, rispettivamente, la professione o condizione dei morti per *avvelenamento cronico* da *sostanze minerali* e da *sostanze organiche*, durante gli anni 1930, 1931 e 1932.

È caratteristica la distribuzione professionale dei due generi di *avvelenamento cronico*. L'uno, in cui prevale il saturnismo, è raro nel sesso femminile ed è l'avvelenamento professionale classico degli operai e specie di alcune categorie (verniciatori, pittori di stanze, decoratori, tipografi); l'altro, in cui prevale il morfinismo, a confronto del precedente, risulta con maggiore frequenza nel sesso femminile.

**Morti per avvelenamento cronico da sostanze minerali, negli anni 1930, 1931 e 1932, classificati secondo il sesso e la professione o condizione.**

PROSPETTO LXVI.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	1930		1931		1932		PROFESSIONE O CONDIZIONE	1930		1931		1932	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Contadini . . . . .	3	—	2	—	2	—	Possidenti . . . . .	—	—	1	—	—	—
Commercianti . . . . .	—	—	1	—	—	—	Pittori di stanze e de- coratori . . . . .	2	—	1	—	1	—
Lattonieri . . . . .	1	—	1	—	4	—	Piombisti . . . . .	1	—	—	—	—	—
Braccianti . . . . .	—	—	2	—	—	—	Meccanici . . . . .	—	—	—	—	1	—
Verniciatori . . . . .	5	—	10	—	5	—	Magazzinieri . . . . .	1	—	—	—	—	—
Fonditori . . . . .	2	—	—	—	—	—	Operai idraulici . . . . .	1	—	—	—	—	—
Fattorini . . . . .	—	—	1	—	—	—	Pittori . . . . .	2	—	3	—	1	—
Cappellai . . . . .	—	—	—	—	1	—	Insegnanti . . . . .	—	—	—	—	1	—
Carradori . . . . .	—	—	—	—	1	—	Pensionati . . . . .	2	—	—	—	1	—
Falegnami . . . . .	—	—	—	—	1	—	Casalinghe . . . . .	—	—	—	1	—	—
Calzolai . . . . .	—	—	—	—	1	—	Inabili, ricoverati . . . . .	—	1	—	—	2	—
Fornaciai . . . . .	—	—	1	—	—	—	Operai non specificati	—	1	1	—	—	—
Vasai, ceramisti e sto- vigliai . . . . .	1	—	1	—	2	—	Professioni non indic.	—	—	1	—	—	—
Imbianchini . . . . .	1	—	—	—	1	—							
Tipografi . . . . .	6	—	3	—	5	—	<b>In complesso . . . . .</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	—

**Morti per avvelenamento cronico da sostanze organiche, negli anni 1930, 1931 e 1932, classificati secondo il sesso e la professione o condizione.**

PROSPETTO LXVII.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	1930		1931		1932		PROFESSIONE O CONDIZIONE	1930		1931		1932	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Contadini . . . . .	—	—	—	1	6	—	Geometri . . . . .	—	—	—	—	1	—
Fittavoli . . . . .	1	—	—	—	—	—	Sellai . . . . .	—	—	—	—	1	—
Giornalieri di campa- gna . . . . .	—	—	—	—	—	—	Medici . . . . .	1	—	—	—	2	—
Braccianti . . . . .	—	—	1	—	—	—	Meccanici . . . . .	—	—	—	—	1	—
Autisti . . . . .	—	—	1	—	1	—	MUSICISTI . . . . .	1	—	—	—	—	—
Beccai . . . . .	1	—	—	—	—	—	Impiegati . . . . .	1	—	—	—	2	1
Industriali e commer- cianti . . . . .	1	—	2	—	1	—	Insegnanti . . . . .	—	—	—	—	1	—
Periti tecnici . . . . .	—	—	—	—	1	—	Proprietari e benestan- ti . . . . .	—	—	—	1	1	—
Muratori . . . . .	1	—	—	—	—	—	Pensionati . . . . .	—	—	—	—	2	—
Operai non specificati	—	—	—	—	—	1	Attendenti a casa . . . . .	—	4	—	7	—	1
Giornalisti . . . . .	—	—	—	—	1	—	Ricoverati . . . . .	2	—	—	—	—	—
Ingegneri . . . . .	—	—	1	—	—	—	<b>In complesso . . . . .</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>3</b>



### § 4. — Omicidi e infanticidi.

Nel seguente prospetto è data la mortalità, nel Regno, per *omicidio* e *infanticidio*, durante il periodo d'anni corso dal 1887 al 1932.

In tale prospetto sono stati calcolati anche i numeri indici di detta mortalità, facendo uguale a 100 quella del quinquennio 1887-91; da essi si scorge che la mortalità, per tutti gli anni del periodo preso in esame, ad eccezione del quadriennio 1920-23, si è mantenuta uguale o al disotto del numero indice base, toccando i minimi nel 1916, nel 1918, e dal 1927 al 1932, nei quali anni il numero indice ha oscillato fra 59 e 49. Nel quadriennio 1920-23 il numero indice salì: a 149 nel 1920, a 153 nel 1921, a 137 nel 1922 e a 102 nel 1923, diminuendo sensibilmente negli anni successivi.

#### Morti per omicidio e infanticidio dal 1887 al 1932.

PROSPETTO LXVIII.

A N N I	MORTI PER OMICIDIO E INFANTICIDIO	PER 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (mortalità del quinquennio 1887-91 = 100)	A N N I	MORTI PER OMICIDIO E INFANTICIDIO	PER 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (mortalità del quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (*) . . .	1 473	49	100	1918 . . . . .	983	28	57
1892-96 (*) . . .	1 515	49	100	1919 . . . . .	1 633	45	92
1897-901 (*) . . .	1 446	45	92	1920 . . . . .	2 661	73	149
1902-06 (*) . . .	1 342	41	84	1921 . . . . .	2 750	75	153
1907 . . . . .	1 283	38	78	1922 . . . . .	2 459	67	137
1908 . . . . .	1 528	45	92	1923 . . . . .	1 851	50	102
1909 . . . . .	1 375	40	82	1924 . . . . .	1 786	46	94
1910 . . . . .	1 158	34	69	1925 . . . . .	1 767	45	92
1911 . . . . .	1 090	31	63	1926 . . . . .	1 252	32	65
1912 . . . . .	1 113	32	65	1927 . . . . .	1 141	29	59
1913 . . . . .	1 215	34	69	1928 . . . . .	989	25	51
1914 . . . . .	1 360	38	78	1929 . . . . .	967	24	49
1915 . . . . .	1 290	35	71	1930 . . . . .	1 099	27	55
1916 . . . . .	947	26	53	1931 . . . . .	1 077	26	53
1917 . . . . .	1 060	30	61	1932 . . . . .	1 042	25	51

(\*) Media annuale.

Nei seguenti due prospetti, in analogia a quanto è stato fatto per le altre principali cause di morte, è data la mortalità per *omicidio* e *infanticidio* in ciascun Compartimento e nel Regno, durante i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22 e 1930-32.

Fatta uguale a 100 la mortalità per *omicidio* e *infanticidio* nei singoli Compartimenti e nel Regno, nei vecchi confini, nel triennio 1900-02 (prospetto LXIX-B), si nota, per il Regno, una diminuzione della medesima nel triennio 1910-12 e una diminuzione ancora più accentuata nel 1930-32. Invece, nel triennio 1920-22 detta mortalità segna un aumento notevole, tantochè essa raggiunge i massimi in tutti i Compartimenti, ad eccezione degli Abruzzi e Molise e della Sardegna.

**Mortalità per omicidio e infanticidio (per 100 000 abitanti).**

PROSPETTO LXIX-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	2.7	1.8	4.2	1.8
Liguria . . . . .	2.2	2.6	5.1	1.6
Lombardia . . . . .	1.4	1.3	4.2	1.4
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	1.2
Veneto . . . . .	1.1	1.0	3.3	1.2
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	3.0
Emilia . . . . .	1.9	1.6	6.6	1.7
Toscana . . . . .	2.4	1.7	5.7	1.5
Marche . . . . .	3.2	1.5	4.6	1.7
Umbria . . . . .	2.8	2.5	4.8	2.1
Lazio . . . . .	6.5	4.9	8.1	2.8
Abruzzi e Molise . . . . .	5.5	3.5	4.9	3.8
Campania . . . . .	7.0	5.1	7.3	4.3
Puglie . . . . .	5.3	3.5	6.4	2.7
Lucania . . . . .	5.6	5.3	7.5	6.1
Calabrie . . . . .	8.0	6.7	10.6	7.3
Sicilia . . . . .	7.8	7.9	19.6	3.7
Sardegna . . . . .	4.8	4.7	4.4	5.1
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>4.0</b>	<b>3.2</b>	<b>7.1</b>	<b>2.6</b>

**Numeri indici della mortalità per omicidio e infanticidio (b).**

PROSPETTO LXIX-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	65	153	68	68	55	59	71
Liguria . . . . .	118	233	74	55	80	73	62
Lombardia . . . . .	91	296	102	36	40	60	56
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	46
Veneto . . . . .	95	299	110	28	32	47	46
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	116
Emilia . . . . .	84	352	90	47	49	93	64
Toscana . . . . .	72	242	64	59	52	80	57
Marche . . . . .	45	143	52	81	45	66	65
Umbria . . . . .	88	169	73	71	78	68	79
Lazio . . . . .	76	125	42	162	153	115	105
Abruzzi e Molise . . . . .	64	88	70	138	109	69	148
Campania . . . . .	73	104	61	175	158	103	163
Puglie . . . . .	67	121	51	132	110	90	103
Lucania . . . . .	95	132	108	141	165	106	234
Calabrie . . . . .	84	133	92	200	207	150	281
Sicilia . . . . .	102	251	47	195	245	277	140
Sardegna . . . . .	97	92	105	121	145	63	195
<b>REGNO</b> { <b>vecchi confini (c)</b> . . . . .	<b>81</b>	<b>177</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ <b>attuali confini</b> . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

Mettendo in confronto i numeri indici del triennio 1930-32 con quelli del periodo base, si nota che essi, soltanto nella Lombardia, nel Veneto, nella Lucania e nella Sardegna, sono superiori, in misura non molto accentuata, a quelli del periodo base.

Nello stesso prospetto, in cui sono calcolati i numeri indici della mortalità per *omicidio e infanticidio* nei singoli Compartimenti, fatta uguale a 100 la mortalità media del Regno, in ciascuno dei periodi considerati, si nota un addensamento maggiore di detta mortalità nei Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare e nel Lazio, cui si aggiunge, nel 1930-32, la Venezia Giulia e Zara.

I massimi sono dati dalle Calabrie, per i trienni 1900-02 e 1930-32, e dalla Sicilia, per i trienni 1910-12 e 1920-22; i minimi dal Veneto, per tutti e quattro i periodi considerati, e dalla Venezia Tridentina, per il triennio 1930-32.

Nel prospetto seguente diamo, per gli anni 1930, 1931 e 1932, il numero dei morti per *omicidio e infanticidio*, classificati secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione.

**Morti per omicidio e infanticidio, negli anni 1930, 1931 e 1932,  
classificati secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione (\*).**

PROSPETTO LXX.

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	1930			1931			1932		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
Arma da fuoco . . . . .	(a) 411	127	538	(b) 383	108	491	(c) 371	85	456
Arma da punta e da taglio . .	236	75	311	238	80	318	207	89	296
Arma o corpo contundente . .	81	27	108	136	27	163	136	37	173
Ustioni . . . . .	3	—	3	—	1	1	—	1	1
Strappamento o mancata legatura del cordone ombelicale	1	2	3	1	1	2	2	1	3
Abbandono sulla pubbl. strada	—	—	—	—	2	2	3	7	10
Annegamento . . . . .	6	5	11	4	7	11	12	3	15
Precipitazione o caduta . . .	5	5	10	12	3	15	15	5	20
Schiacciamento . . . . .	3	1	4	1	1	2	2	—	2
Avvelenamento . . . . .	(d) 4	(e) 4	8	—	(f) 3	3	(g) 3	(h) 3	6
Strangolamento . . . . .	14	14	28	15	23	38	6	18	24
Impiccamento . . . . .	3	1	4	1	1	2	6	1	7
Soffocamento meccanico . . .	4	3	7	—	—	—	—	—	—
Soffocamento (senza specificazione).	10	6	16	7	21	28	7	10	17
Asfissia (senza specificazione) .	1	3	4	—	—	—	—	—	—
Altri mezzi . . . . .	16	6	22	1	—	1	5	2	7
Mezzo non indicato . . . . .	17	5	22	—	—	—	4	1	5
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>815</b>	<b>284</b>	<b>1 099</b>	<b>799</b>	<b>278</b>	<b>1 077</b>	<b>779</b>	<b>263</b>	<b>1 042</b>

(\*) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano o no dolosi. Soltanto l'Autorità giudiziaria, spesso, dopo lunghe e accurate ricerche è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Si spiega pertanto come i risultati delle due statistiche differiscano specialmente nel numero degli infanticidi e degli omicidi per avvelenamento, per i quali occorrono indagini che occupano molto tempo per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

(a) Compresi 5 omicidi avvenuti in conflitto con la forza pubblica.

(b) Compresi 8 omicidi avvenuti in conflitto con la forza pubblica.

(c) Compresi 4 omicidi avvenuti in conflitto con la forza pubblica.

(d) Di cui, uno avvelenato con sostanze caustiche, due con fosforo di zinco e uno con sublimato corrosivo.

(e) Di cui, una avvelenata con sostanze caustiche, una con fosforo di zinco, una con stricnina ed una con arsenico.

(f) Di cui, una avvelenata con sublimato corrosivo, e due con veleno non accertato.

(g) Di cui, uno avvelenato con ossido di carbonio, uno con arsenico e uno con fosforo di zinco.

(h) Di cui, due avvelenate con stricnina ed una con fosforo di zinco.

Nell'anno 1932, fra i 1042 individui uccisi, 779 erano maschi e 263 femmine, e cioè, per ogni 100 omicidi si contarono 75 maschi e 25 femmine; nel 1931 e 1930 la proporzione per sesso risulta di 74 maschi e 26 femmine.

Le armi da fuoco, da punta o da taglio e quelle contundenti sono i mezzi più frequenti coi quali, sia nei maschi sia nelle femmine, fu procurata la morte dei colpiti, durante il suddetto triennio.

Gli *infanticidi*, durante il triennio 1930-32, già compresi nel prospetto precedente, sono stati classificati, separatamente dagli *omicidi*, secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione, come è indicato nel prospetto seguente.

**Morti per infanticidio negli anni 1930, 1931 e 1932,  
classificati secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione.**

PROSPETTO LXXI.

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	1930			1931			1932		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
Arma da fuoco . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Arma da punta o da taglio . .	—	1	1	2	5	7	1	—	1
Arma o corpo contundente . .	—	1	1	4	4	8	—	1	1
Strappamento o mancata legatura del cordone ombelicale.	1	2	3	1	1	2	2	1	3
Abbandono sulla pubbl. strada.	—	—	—	1	2	3	3	7	10
Annegamento . . . . .	2	3	5	3	3	6	4	3	7
Precipitazione . . . . .	2	—	2	—	1	1	—	—	—
Schiacciamento . . . . .	2	1	3	1	1	2	—	—	—
Strangolamento . . . . .	4	1	5	7	5	12	1	3	4
Soffocamento (senza specificazione)	9	5	14	6	10	16	6	6	12
Asfissia (senza specificazione).	1	2	3	—	—	—	—	—	—
Altri mezzi . . . . .	1	—	1	—	—	—	2	1	3
Mezzo non indicato . . . . .	4	3	7	—	—	—	4	1	5
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>

Aggiungiamo, infine, che la mortalità per *omicidio* e *infanticidio*, nel 1931, è stata, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, quasi uguale a quella degli altri Comuni, mentre nel 1932 n'è stata leggermente superiore.

**§ 5. — Morti per suicidio classificati per Compartimenti, sesso, stato civile, età, mezzi o modi di uccisione, mesi e professioni.**

*Regno.* — Nel prospetto seguente è data la mortalità nel Regno per *suicidio*, durante il periodo d'anni corso dal 1887 al 1932.

In tale prospetto, sono stati calcolati anche i numeri indici di detta mortalità, facendo uguale a 100 quella del quinquennio 1887-91; da essi si scorge che le morti per *suicidio* sono venute crescendo dal 1887. Infatti, il numero indice, da 100 nel periodo base, salì costantemente, salvo lievi oscillazioni, a 171 nel 1914. Nel periodo bellico e nel quinquennio dopo guerra, dette morti diminuirono sensibilmente rispetto all'anno 1914, e la diminuzione maggiore si osserva nei due anni 1916 e 1917,

nei quali il numero indice discese a 133; ma esse risalirono notevolmente negli anni dal 1924 al 1927, nel quale ultimo anno il numero indice è il più alto fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi. Dal 1928 al 1932 notasi nel comportamento della mortalità per *suicidio* un andamento oscillante, segnando in questi cinque ultimi anni, rispettivamente, i seguenti numeri indici: 187, 173, 185, 194 e 187.

## Morti per suicidio dal 1887 al 1932.

## PROSPETTO LXXII.

A N N I	MORTI PER SUICIDIO	PER 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (mortalità del quinquennio 1887-91 = 100)	A N N I	MORTI PER SUICIDIO	PER 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (mortalità del quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (*)	1 570	52	100	1918	2 642	75	144
1892-96 (*)	1 813	58	112	1919	2 630	73	140
1897-901 (*)	2 005	62	119	1920	2 664	73	140
1902-06 (*)	2 157	65	125	1921	2 885	78	150
1907	2 445	73	140	1922	3 030	83	160
1908	2 693	80	154	1923	3 222	87	167
1909	2 969	87	167	1924	3 778	97	187
1910	2 830	84	162	1925	3 674	94	181
1911	2 754	79	152	1926	3 871	98	188
1912	2 986	85	163	1927	4 210	106	204
1913	3 107	88	169	1928	3 903	97	187
1914	3 185	89	171	1929	3 636	90	173
1915	3 092	85	163	1930	3 915	96	185
1916	2 531	69	133	1931	4 141	101	194
1917	2 439	69	133	1932	4 058	97	187

(\*) Media annuale.

*Distribuzione territoriale.* — Nei seguenti due prospetti, in analogia a quanto è stato fatto per le altre principali cause di morte, è data la mortalità per *suicidio*, in ciascun Compartimento e nel Regno, durante i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22 e 1930-32.

L'andamento, nel tempo, della mortalità per *suicidio*, nei periodi indicati nel prospetto LXXIII-B, risulta crescente, sia nel Regno (salvo una diminuzione nel triennio 1920-22, in confronto al triennio 1910-12), sia nei singoli Compartimenti, tranne rare eccezioni in cui i numeri indici risultano inferiori al triennio base, 1900-02.

Nel Regno, nei vecchi confini, il massimo della mortalità si riscontra nel triennio 1930-32, e altrettanto si nota per i singoli Compartimenti, se si eccettuano la Liguria e il Lazio che hanno toccato il massimo nel 1910-12.

Nello stesso prospetto, in cui la mortalità dei singoli Compartimenti è messa a confronto con quella media del Regno, si nota un maggiore addensamento della mortalità per *suicidio* nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale e Centrale, a confronto dell'Italia Meridionale ed Insulare.

I numeri indici più alti sono dati dall'Emilia e dal Lazio per il periodo 1900-1902; dalla Liguria per i periodi 1910-12 e 1920-22; dalla Venezia Giulia e Zara e dall'Emilia per il periodo 1930-32.

I minimi sono dati, nei quattro periodi considerati, dalle Calabrie.

## Mortalità per suicidio (per 100 000 abitanti).

## PROSPETTO LXXIII-A.

COMPARTIMENTI E REGNO	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali			
Piemonte . . . . .	9.3	12.3	11.3	14.5
Liguria . . . . .	8.9	16.0	13.3	14.9
Lombardia . . . . .	6.5	9.3	8.4	10.4
Venezia Tridentina (a) . . . . .	—	—	—	12.1
Veneto . . . . .	6.6	8.4	7.6	8.9
Venezia Giulia e Zara (a) . . . . .	—	—	—	19.6
Emilia . . . . .	9.6	10.9	11.2	15.3
Toscana . . . . .	7.7	9.4	8.7	10.1
Marche . . . . .	7.0	7.3	7.9	9.2
Umbria . . . . .	7.5	8.0	7.1	11.2
Lazio . . . . .	9.7	12.2	10.9	8.5
Abruzzi e Molise . . . . .	4.0	4.6	4.3	7.0
Campania . . . . .	3.9	6.0	6.4	6.6
Puglie . . . . .	3.7	4.1	4.4	5.8
Lucania . . . . .	3.0	4.6	5.1	6.1
Calabrie . . . . .	2.1	2.3	2.5	3.7
Sicilia . . . . .	3.6	5.9	4.9	7.0
Sardegna . . . . .	4.8	6.1	4.5	8.4
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>6.2</b>	<b>8.3</b>	<b>7.7</b>	<b>9.8</b>

## Numeri indici della mortalità per suicidio (b).

## PROSPETTO LXXIII-B.

COMPARTIMENTI E REGNO	triennio 1900-02 = 100			mortalità del Regno = 100			
	1910-12	1920-22	1930-32	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32
	medie annuali						
Piemonte . . . . .	132	121	156	150	149	146	148
Liguria . . . . .	180	149	167	143	193	172	152
Lombardia . . . . .	143	129	160	104	112	108	106
Venezia Tridentina . . . . .	—	—	—	—	—	—	124
Veneto . . . . .	127	115	135	106	101	99	91
Venezia Giulia e Zara . . . . .	—	—	—	—	—	—	200
Emilia . . . . .	114	116	159	155	132	145	156
Toscana . . . . .	122	112	131	124	114	113	103
Marche . . . . .	104	113	131	113	88	103	94
Umbria . . . . .	106	95	149	121	97	93	115
Lazio . . . . .	126	113	88	155	147	142	86
Abruzzi e Molise . . . . .	115	108	175	64	55	56	71
Campania . . . . .	156	166	169	62	73	84	67
Puglie . . . . .	113	119	158	59	50	57	59
Lucania . . . . .	153	171	204	48	55	66	62
Calabrie . . . . .	107	119	172	34	27	33	37
Sicilia . . . . .	167	137	196	57	72	63	71
Sardegna . . . . .	129	95	176	77	74	59	85
<b>REGNO</b> { vecchi confini (c) . . . . .	<b>133</b>	<b>124</b>	<b>153</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
{ attuali confini . . . . .							<b>100</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 12\*.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 13\*.

(c) Veggasi la nota (b) a pag. 13\*.

*Età e sesso.* — Esaminando i quozienti specifici di mortalità per età e sesso (prospetto LXXIV) si rileva che la mortalità complessiva per *suicidio*, nei quattro periodi considerati, è molto più grande nei maschi che nelle femmine; e ciò si verifica, in genere, in tutti i gruppi di età.

I quozienti di mortalità nei maschi si può dire che crescano col crescere delle età. È da osservare, però, che, generalmente, nei trienni considerati, la mortalità nel gruppo 20-29 è superiore a quella del gruppo immediatamente successivo. Nelle femmine non si può dire che si abbia un aumento della mortalità col crescere dell'età: si nota soltanto che, nel gruppo di età 20-29, il quoziente è molto alto.

L'andamento, nel tempo, della mortalità complessiva per *suicidio*, nei periodi considerati, sia nei maschi che nelle femmine, risulta crescente (salvo una diminuzione nel triennio 1920-22 in confronto al triennio 1910-12), in modo, però, più accentuato per le femmine. Nei singoli gruppi di età, tanto nei maschi quanto nelle femmine, e salvo eccezioni, si osserva un comportamento analogo a quello ora detto.

#### Quozienti specifici di mortalità per suicidio in età da 15 anni in poi.

(Cifre proporzionali a 10 000 abitanti censiti della stessa età e sesso).

PROSPETTO LXXIV.

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
15-19 anni . . .	0,68	0,29	0,48	0,80	0,77	0,79	0,64	0,65	0,65	0,63	0,59	0,61
20-29 » . . .	1,45	0,41	0,92	1,95	0,85	1,37	1,70	0,83	1,25	1,44	0,72	1,08
30-39 » . . .	1,19	0,36	0,76	1,63	0,54	1,06	1,37	0,52	0,92	1,70	0,55	1,08
40-49 » . . .	1,67	0,37	1,01	1,85	0,53	1,17	1,60	0,47	1,03	2,67	0,65	1,58
50-59 » . . .	1,98	0,42	1,19	2,45	0,58	1,50	2,20	0,52	1,36	3,78	0,74	2,21
60-69 » . . .	2,19	0,43	1,29	2,46	0,54	1,49	2,31	0,49	1,38	3,58	0,67	2,08
70-79 » . . .	2,08	0,58	1,32	2,66	0,53	1,58	2,52	0,53	1,51	3,65	0,76	2,14
80-∞ . . . . .	1,89	0,13	0,98	2,87	0,54	1,66	2,98	0,43	1,62	3,83	1,03	2,30
<b>Totale (a) . . .</b>	<b>1,51</b>	<b>0,39</b>	<b>0,94</b>	<b>1,88</b>	<b>0,65</b>	<b>1,24</b>	<b>1,65</b>	<b>0,60</b>	<b>1,11</b>	<b>2,18</b>	<b>0,66</b>	<b>1,39</b>

(a) Compresa l'età ignota.

*Sesso e stato civile.* — Dal prospetto LXXV si rileva che la mortalità complessiva per *suicidio* è venuta crescendo, dal triennio 1900-02 al 1930-32, in misura maggiore nelle femmine, 69% a confronto dei maschi 44%. Tale andamento, ancora più accentuato, si osserva nelle nubili, la cui mortalità, nel tempo, è aumentata del 76%, a confronto dei celibi, per i quali l'aumento è stato soltanto del 14%. Invece, i coniugati e i vedovi mostrano un aumento maggiore negli uomini a confronto delle donne, e cioè il 77% nei coniugati e il 67% nelle coniugate; il 99% nei vedovi e il 90% nelle vedove.

La mortalità dei maschi, nei quattro periodi considerati, è più elevata nei vedovi, ai quali seguono, generalmente, i celibi.

La mortalità delle femmine, nei trienni 1910-12 e 1920-22, è più elevata nelle nubili; alle quali seguono le vedove e le coniugate, mentre nei trienni 1900-02 e 1930-32 si trovano al primo posto le vedove, seguite dalle nubili e dalle coniugate.

**Quozienti specifici di mortalità per suicidio in età da 15 anni in poi.**

(Cifre proporzionali a 1000 censiti della stessa età, dello stesso sesso e stato civile).

**PROSPETTO LXXV.**

STATO CIVILE	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32		
	medie annuali											
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Celibi e nubili . . . . .	1,68	0,46	1,13	2,16	0,98	1,59	1,76	0,83	1,31	1,91	0,81	1,38
Coniugati . . . . .	1,15	0,30	0,72	1,41	0,44	0,91	1,21	0,41	0,81	2,03	0,50	1,25
Vedovi . . . . .	2,76	0,48	1,18	3,55	0,64	1,52	3,53	0,62	1,49	5,48	0,91	2,16
<b>Totale (a) . . . . .</b>	<b>1,51</b>	<b>0,39</b>	<b>0,94</b>	<b>1,88</b>	<b>0,65</b>	<b>1,24</b>	<b>1,65</b>	<b>0,60</b>	<b>1,11</b>	<b>2,18</b>	<b>0,66</b>	<b>1,39</b>

(a) Compresi lo stato civile ignoto e l'età ignota.

*Mezzi o modi di suicidio.* — Rispetto ai mezzi o modi adoperati per togliersi la vita, distinguiamo i *suicidi* in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono date le cifre degli anni 1930, 1931 e 1932.

**Suicidi negli anni 1930, 1931 e 1932, classificati secondo i mezzi o modi adoperati e il sesso.****PROSPETTO LXXVI.**

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	MORTI PER SUICIDIO (*)									% SUICIDI IN TOTALE					
	1930			1931			1932			1930		1931		1932	
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	M	F	M	F
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	192	230	422	204	238	442	194	234	428	65,4	237,2	64,9	238,2	63,9	228,7
Per assorbimento di gas tossici . . . . .	65	31	96	70	41	111	79	44	123	22,1	31,7	22,3	41,0	26,0	43,0
Per impiccamento o strangolamento . . . . .	776	180	956	828	192	1020	851	219	1070	264,2	184,0	263,5	192,2	280,4	214,1
Per annegamento . . . . .	448	243	691	485	248	733	447	243	690	152,5	248,5	154,4	248,2	147,3	237,5
Con arma da fuoco . . . . .	885	60	945	873	54	927	829	45	874	301,3	61,3	277,8	54,1	273,1	44,0
Con arma da punta o da taglio . . . . .	128	30	158	150	39	189	152	34	186	43,6	30,7	47,7	39,0	50,1	33,2
Per precipitazione dall'alto . . . . .	241	161	402	278	141	419	228	148	376	82,1	164,6	88,5	141,1	75,1	144,7
Per schiacciamento . . . . .	189	35	224	238	38	276	235	46	281	64,4	35,8	75,7	38,0	77,4	45,0
Con altri mezzi o con mezzi non determinati . . . . .	13	8	21	16	8	24	20	10	30	4,4	8,2	5,1	8,0	6,6	9,8
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>2937</b>	<b>978</b>	<b>3915</b>	<b>3142</b>	<b>999</b>	<b>4141</b>	<b>3035</b>	<b>1923</b>	<b>4053</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>1000,0</b>

(\*) Fra i suicidi degli anni 1930, 1931 e 1932 ne sono compresi, rispettivamente, 73 (maschi 51 e femmine 22), 49 (maschi 34 e femmine 15) e 35 (maschi 23 e femmine 12), compiuti in istato di malattia per *psicopatia* e *sindromi nevralgiche*.

Si nota che, in tutti e tre gli anni presi in esame, per i maschi, predominano i *suicidi* con arma da fuoco o per impiccamento, e per le femmine, invece, predominano i *suicidi* per ingestione di veleni e per annegamento.

*Natura del veleno nei casi di avvelenamento.* — Anche per le morti dovute ad *avvelenamento acuto* volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze venefiche che produssero la morte.



Dal prospetto LXXVII, nel quale sono riferiti i casi avvenuti negli anni 1930, 1931 e 1932, si rileva che le morti per *avvelenamento acuto* volontario, sia nei maschi che nelle femmine, sono aumentate dal 1930 al 1931, mentre nel 1932 si mantennero quasi allo stesso livello di quelle dell'anno antecedente.

Circa la natura della sostanza adoperata per le morti dovute ad *avvelenamento acuto* volontario, risulta che i veleni maggiormente usati, nel 1931, sono, in ordine decrescente: il sublimato corrosivo, l'ossido di carbonio, la soda e la potassa, il veronal, l'acido solforico, l'acido cloridrico, il solfato di rame, ecc.; nel 1932 si nota, all'incirca, lo stesso andamento.

Ciò, probabilmente, è in rapporto con la maggiore facilità con la quale tali mezzi si possono avere a disposizione.

**Suicidi per avvelenamento acuto, negli anni 1930, 1931 e 1932,  
classificati per sesso e secondo la natura del veleno.**

PROSPETTO LXXVII.

NATURA DEI VELENI (a)	1930		1931		1932		NATURA DEI VELENI (a)	1930		1931		1932	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Acido acetico . . . . .	—	1	—	4	—	1	Laudano . . . . .	1	1	1	—	—	1
» cianidrico . . . . .	9	—	12	2	6	1	Lisolo . . . . .	—	1	1	—	1	—
» cloridrico . . . . .	14	14	15	12	13	15	Lysoformio . . . . .	—	2	—	—	—	1
» fenico . . . . .	11	9	5	5	9	10	Luminal . . . . .	2	1	1	—	—	1
» nitrico . . . . .	2	1	5	1	2	1	Mercurio:						
» ossalico . . . . .	1	1	—	—	—	—	<i>sublimato corrosivo</i> . . . . .	40	64	53	71	32	62
» solforico . . . . .	15	24	14	20	17	20	<i>altri sali</i> . . . . .	1	2	2	1	—	—
Acidi non specificati . . . . .	3	—	—	—	—	—	Morfina . . . . .	3	—	—	—	—	1
Aconitina . . . . .	—	—	—	—	1	—	Nicotina . . . . .	—	1	—	1	—	—
Acqua regia . . . . .	1	—	—	—	—	—	Oppio . . . . .	2	—	—	—	1	—
Ammoniaca . . . . .	—	1	—	1	1	1	Ossido di carbonio:						
Anilina . . . . .	—	—	—	—	1	—	<i>ossido di carbonio (senza</i>						
Arsenico e suoi preparati . . . . .	6	1	5	3	8	4	<i>altra indicazione)</i> . . . . .	34	18	42	22	45	19
Alcool denaturato . . . . .	—	—	2	—	—	—	<i>braciare di carbone</i> . . . . .	2	2	—	—	—	—
Belladonna . . . . .	1	—	—	—	—	—	<i>gas illuminante</i> . . . . .	22	9	26	18	32	22
Bicromato di potassio . . . . .	1	—	1	—	1	1	Permanganato di potassio . . . . .	—	1	1	1	—	—
Chinina (sali di) . . . . .	—	2	—	4	1	4	Piombo . . . . .	—	1	—	—	—	1
Clorato di potassio . . . . .	—	—	1	—	—	—	Sedival . . . . .	—	—	1	—	—	—
Cloro . . . . .	—	—	—	1	—	—	Soda e potassa . . . . .	14	39	12	45	18	48
Cloroformio . . . . .	—	—	—	—	—	1	Solfato di rame . . . . .	6	9	10	12	13	11
Cocaina . . . . .	1	—	—	—	—	—	Solfuro di carbonio . . . . .	—	—	—	—	1	—
Creolina . . . . .	1	1	—	—	2	—	Somnifen « Roche » . . . . .	—	—	—	1	—	—
Dial . . . . .	—	3	1	1	—	—	Stricnina . . . . .	9	6	8	7	15	5
Fernet . . . . .	—	1	—	—	1	—	Varecchina . . . . .	—	1	—	—	—	—
Fosforo . . . . .	—	1	1	2	—	—	Veronal . . . . .	24	18	31	23	27	22
Gas irrespirabili o tossici (non specificati) . . . . .	7	2	—	—	—	—	Zinco:						
Infuso di foglie di oleandro . . . . .	—	—	—	—	—	1	<i>fosforo di zinco</i> . . . . .	2	—	—	3	—	1
Ingestione di più sostanze venenose . . . . .	3	4	1	1	—	—	<i>altri sali</i> . . . . .	1	—	—	—	2	—
Iodio . . . . .	2	4	3	3	3	2	Veleni non specificati:						
Ipnotici barbiturici . . . . .	1	—	—	—	1	1	<i>sostanze varie non ben pre-</i>						
Ipnotici non specificati . . . . .	4	6	4	4	4	3	<i>cisate</i> . . . . .	—	—	8	4	2	7
							<i>sostanze non indicate</i> . . . . .	11	9	7	6	13	10
							<b>In complesso . . . . .</b>	<b>257</b>	<b>261</b>	<b>274</b>	<b>279</b>	<b>273</b>	<b>278</b>

(a) Sono stati indicati tutti i veleni che erano specificati nelle schede di morte.

È da notare che mentre, come si è visto, sono piuttosto rare le *morti accidentali* dovute ad avvelenamento per sostanze o preparati medicinali ad azione ipnotica, sono molto frequenti le morti per *suicidio* dovute a tali sostanze, il che farebbe supporre che in molti casi può trattarsi di individui ammalati, i quali, in un momento di sconforto, hanno voluto porre termine alle loro sofferenze.

*Mesi in cui avvennero i suicidi.* — Dal prospetto seguente si rileva che il maggior numero dei *suicidi* si nota, di solito, nella primavera e nella estate, il minore, nell'autunno e nell'inverno.

**Suicidi negli anni 1930, 1931 e 1932, classificati secondo il mese in cui avvennero.**

PROSPETTO LXXVIII.

M E S I	MORTI PER SUICIDIO			MEDIA GIORNA- LIERA	NUMERI INDICI	MEDIA GIORNA- LIERA	NUMERI INDICI	MEDIA GIORNA- LIERA	NUMERI INDICI
	1930	1931	1932	1930		1931		1932	
	Gennaio . . . . .	267	295	280	8,61	80	9,52	84	9,03
Febbraio . . . . .	257	278	282	9,18	86	9,93	87	9,72	88
Marzo . . . . .	379	370	320	12,23	114	11,94	105	10,32	93
Aprile . . . . .	364	350	377	12,13	113	11,67	103	12,57	113
Maggio . . . . .	423	453	453	13,65	127	14,61	129	14,61	132
Giugno . . . . .	399	474	420	13,30	124	15,80	139	14,00	126
Luglio . . . . .	383	433	430	12,35	115	13,97	123	13,87	125
Agosto . . . . .	309	341	378	9,97	93	11,00	97	12,19	110
Settembre . . . . .	305	282	298	10,17	95	9,40	83	9,93	90
Ottobre . . . . .	280	304	287	9,03	84	9,81	86	9,26	83
Novembre . . . . .	282	306	267	9,40	88	10,20	90	8,90	80
Dicembre . . . . .	267	255	266	8,61	80	8,23	73	8,58	77
<b>Anno . . . . .</b>	<b>3 915</b>	<b>4 141</b>	<b>4 058</b>	<b>10,73</b>	<b>100</b>	<b>11,35</b>	<b>100</b>	<b>11,09</b>	<b>100</b>

*Professioni.* — Le cifre del prospetto LXXIX, non possono dare un corretto criterio per giudicare sulla influenza della professione nella frequenza dei *suicidi*. Come è stato già detto, a proposito della mortalità per *cause accidentali*, i quozienti di mortalità per ciascuna categoria professionale, si dovrebbero calcolare mettendo in rapporto il numero totale dei morti, distinti secondo la professione, al totale dei viventi della stessa categoria professionale, ma, dati i criteri diversi coi quali sono classificati secondo le singole professioni tanto i viventi censiti quanto i morti in ciascun anno, non è possibile istituire tale rapporto in occasione dei censimenti.

Pertanto, in mancanza degli elementi necessari per il calcolo, si espone, nel suddetto prospetto, il per mille che i morti per *suicidio*, di una data classe professionale, rappresentano sul totale dei morti per ogni causa della stessa classe professionale.

Infine, a complemento delle notizie già date circa la mortalità per *suicidio*, aggiungiamo che essa, sia nel 1931 che nel 1932, è sensibilmente maggiore nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia in confronto a quella del complesso degli altri Comuni; e che fra i Comuni aventi una popolazione presente superiore a

**Maschi morti per suicidio in età da 15 anni in poi,  
negli anni 1931 e 1932, classificati secondo la professione o condizione.**

PROSPETTO LXXIX.

CLASSE (a)	CATEGORIA (a)	SOTTOCATEGORIA (a)	PROFESSIONE O CONDIZIONE	MORTI PER SUICIDIO		CIFRE PROPORZIONALI A 1000 MASCHI MORTI DA 15 ANNI IN POI E DELLA STESSA PROFESSIONE (b)	
				1931	1932	1931	1932
1	1	1 e 2	Agricoltori di ogni specie . . . . .	1 030	1 015	10,6	10,3
2	1	0	Industriali, commercianti . . . . .	227	175	36,5	28,5
3	1	0	Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate . . . . .	61	84	17,3	22,8
3	2	0	Esercenti . . . . .	24	26	20,0	21,5
3	3	0	Commissionari, rappresentanti . . . . .	66	64	35,4	36,1
4	1	0	Minatori e cavoratori . . . . .	11	15	9,9	13,3
4	2	0	Falegnami, verniciatori, ecc. . . . .	94	106	16,0	17,7
4	3	1 2-3-4	Addetti alla macellazione e conservazione delle carni, ai forni, ai pastifici, alla lavorazione del latte e alle industrie alimentari .	56	47	21,5	17,3
4	4	1 e 2	Conciatori, pellai, calzolari, guantai, ecc. . .	76	69	16,2	14,5
4	5	1 e 2	Metallurgici, meccanici, elettricisti, ecc. . .	136	113	20,9	17,6
4	6	0	Argentieri, orefici, ecc. . . . .	16	24	35,7	54,8
4	7	1 e 2	Asfaltisti, fornai, ceramisti, vetrai, ecc. . .	8	14	10,1	16,9
4	8	1 e 2	Muratori, imbianchini, manovali, braccianti, ecc. . . . .	238	250	16,7	17,2
4	9	1 e 2	Addetti all'industria tessile e a manifatture tessili . . . . .	11	16	9,3	13,9
4	10	1 e 2	Addetti all'industria del vestiario e all'arredamento . . . . .	38	36	17,4	17,3
4	11	1	Addetti alle industrie chimiche . . . . .	2	3	13,2	20,0
4	11	2	Addetti alla manifattura tabacchi . . . . .	1	—	83,3	—
4	12	1 e 2	Addetti alle industrie poligrafiche e della carta . . . . .	10	19	15,3	27,0
4	13	0	Operai non specificati . . . . .	56	67	17,7	17,9
5	1	0	Cocchieri, carrettieri, ecc. . . . .	41	44	13,2	14,3
5	2	0	Ferrovieri, tramvieri, conduttori di automobili, addetti a trasporti aerei . . . . .	37	49	18,4	24,8
5	3	0	Marinai, barcaiuoli, pescatori, ecc. . . . .	10	15	5,9	8,5
6	1	1 e 2	Addetti alla cura e alla acconciatura della persona . . . . .	22	27	17,3	21,9
6	2 e 3	0	Addetti ai servizi domestici, garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici . . . . .	69	60	22,1	20,0
6	4	1	Facchini, spazzini, cantonieri . . . . .	33	46	15,3	21,3
6	4	2	Venditori ambulanti, saltimbanchi, venturieri . . . . .	42	25	26,7	15,8
7	1	0	Personale subalterno dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . .	16	19	20,1	21,4
8	1 e 2	0	Esercito, marina, aeronautica, guardie di finanza e milizia (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	60	57	63,0	52,9
8	3	0	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici . . . . .	10	18	22,9	43,6
9	1	1 e 2	Culto cattolico e altri culti . . . . .	3	6	2,0	4,1
9	2	1	Insegnanti . . . . .	9	6	14,0	10,3
9	2 e 4	2	Professioni liberali e arti belle . . . . .	96	73	37,5	28,4
9	3	0	Arti sanitarie . . . . .	19	23	19,9	23,6
10	1-2-3	1 e 2	Ufficiali di terra, di mare e d'aria . . . . .	12	11	41,8	41,2
10	4	0	Impiegati pubblici e privati . . . . .	180	159	33,5	29,0
10	5	0	Pensionati . . . . .	82	59	8,6	5,6
11	1	0	Proprietari e benestanti . . . . .	130	106	14,1	11,7
12	1	0	Studenti . . . . .	40	31	35,9	28,5
12 e o	3 e 4	1 a 5	Disoccupati, invalidi, ricoverati, mendicanti, professione ignota . . . . .	50	51	8,3	7,2
			<b>In complesso . . . . .</b>	<b>3 122</b>	<b>3 028</b>	<b>15,0</b>	<b>14,3</b>

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: « Nomenclatura professionale » — Roma, Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, 1928-VII.

(b) Escluse le morti per cause non determinate (classe XVIII) del nuovo Elenco nosologico adottato dal 1931.

100 000 abitanti al censimento del 21 aprile 1931, i massimi di detta mortalità, nel biennio 1931-32 complessivamente, si ebbero in Trieste (3,4 su 1000 abitanti), Bologna (2,6), Firenze e Torino (1,9), Milano (1,8), Genova, Cagliari e Livorno (1,7); i minimi, in Bari (0,5), Taranto, Messina e Reggio di Calabria (0,6).

# APPENDICE

---

NATIMORTALITÀ NEL BIENNIO 1931-32



## LE CAUSE DI NATIMORTALITÀ, NEL BIENNIO 1931-32.

Per la prima volta, nelle schede di nascita fu richiesto, a datare dal 1931, di indicare le cause di natimortalità secondo la nomenclatura stabilita dalla IV Conferenza internazionale per la revisione decennale della nomenclatura nosologica per la statistica delle cause di morte. È ovvia l'importanza dello studio delle cause di natimortalità dal punto di vista sociale, essendo alcune di esse favorevolmente influenzabili da provvedimenti assistenziali.

Il sesso, la legittimità dei nati, il genere del parto (semplice o plurimo), l'ordine di generazione e l'età delle madri, sono circostanze che influiscono sulla frequenza della natimortalità.

Nei riguardi del sesso, le cause di natimortalità agiscono tutte con maggiore intensità nei maschi: fanno eccezione le *malformazioni incompatibili con la vita*, che danno un quoziente di natimortalità lievemente superiore nelle femmine, e la *espulsione prematura per sifilide* che dà un quoziente di natimortalità uguale nei due sessi.

In quanto alla filiazione, i quozienti di natimortalità sono superiori negli illegittimi, per quasi tutte le cause e principalmente per quelle del primo gruppo che determinano la morte del feto nel corso della gestazione. Fra queste, particolarmente alti appaiono, in confronto dei legittimi, i quozienti per *sifilide* ed altre *affezioni croniche*, mentre per le rimanenti cause la differenza è molto minore.

Nel secondo gruppo, i quozienti di natimortalità per *strapazzo materno*, per *inserzione viziosa* e per *infezioni acute*, sono leggermente più alti nei legittimi, mentre le *infezioni croniche* e in particolare la *sifilide* danno quozienti di natimortalità negli illegittimi molto più grandi di quelli dei legittimi.

Fra le cause del terzo gruppo, se si eccettua la natimortalità per altre cause, i quozienti negli illegittimi sono leggermente superiori a quelli dei legittimi.

Nei riguardi del genere del parto, la natimortalità nei parti semplici è molto inferiore a quella dei parti multipli, sia nel complesso, sia nei singoli gruppi di cause, sia ancora nelle singole cause di ciascun gruppo.

La differenza più accentuata si riscontra per il complesso delle morti avvenute per *espulsione prematura*.

Circa l'ordine di generazione nei legittimi, la natimortalità dei primogeniti, nei parti semplici, è superiore a quella dei non primogeniti in ciascun gruppo di cause, specialmente per quelle che determinano la morte del feto nel corso del parto, e fra queste, principalmente, per *l'ostacolo all'espulsione del feto*. Per quanto concerne i parti multipli, pure essendo nei primogeniti la natimortalità superiore a quella dei non primogeniti, non si nota per le cause che determinano la morte del feto nel corso del parto per *ostacolo all'espulsione del feto*, quella prevalenza che si è notata precedentemente per i parti semplici.

Nei riguardi dell'età della madre, non tenendo conto dell'ordine di generazione, si nota che nei parti semplici, la natimortalità è minima nella classe di età 21-29 e cresce coll'aumentare delle età. Sembra, dall'esame dei quozienti di natimortalità secondo le cause, che questo aumento sia principalmente dovuto alle cause che agiscono nel corso del parto, cosa del resto concordante con le comuni conoscenze circa le difficoltà che si verificano nella espulsione del feto nelle donne, che hanno superato un certo limite di età, per la poca elasticità del canale da parto.

## Nati morti secondo le cause, la specie del parto,

(Cifre proporzionali)

PROSPETTO I:

CAUSE DI NATIMORTALITÀ	NATI MORTI DA PARTI SEMPLICI									NATI MORTI DA		
	legittimi			illegittimi			Totale			legittimi		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
<b>Complesso . . .</b>	<b>344.1</b>	<b>293.4</b>	<b>319.4</b>	<b>440.1</b>	<b>387.0</b>	<b>414.2</b>	<b>349.1</b>	<b>298.3</b>	<b>324.4</b>	<b>1037.1</b>	<b>855.1</b>	<b>947.0</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . .</b>	<b>75.6</b>	<b>74.3</b>	<b>75.0</b>	<b>113.6</b>	<b>109.3</b>	<b>111.5</b>	<b>77.6</b>	<b>76.2</b>	<b>76.9</b>	<b>218.1</b>	<b>187.8</b>	<b>203.1</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche . . . . .	20.6	19.3	20.0	43.5	39.7	41.6	21.8	20.4	21.1	35.7	35.3	35.5
di cui per sifilide . . . . .	16.5	15.3	15.9	38.2	34.9	36.6	17.6	16.3	17.0	24.2	25.8	25.0
2 Tossiemie gravidiche . . . . .	16.9	15.7	16.3	18.0	18.3	18.1	16.9	15.9	16.4	45.4	45.9	45.6
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	20.6	23.4	21.9	24.6	27.9	26.2	20.8	23.6	22.2	59.2	44.8	52.0
4 Altre cause . . . . .	11.2	10.7	11.0	18.9	15.0	17.0	11.6	11.0	11.3	61.0	44.0	52.6
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	6.4	5.2	5.8	8.6	8.3	8.5	6.5	5.3	5.9	16.7	17.8	17.3
<b>II. - Per espulsione prematura . . .</b>	<b>98.2</b>	<b>87.5</b>	<b>93.0</b>	<b>122.8</b>	<b>113.7</b>	<b>118.4</b>	<b>99.5</b>	<b>88.8</b>	<b>94.3</b>	<b>415.3</b>	<b>318.7</b>	<b>367.4</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	43.1	39.4	41.3	41.7	36.2	39.0	43.0	39.2	41.2	152.9	114.2	133.7
6 Traumatismo determinante il parto prematuro . . .	6.7	5.7	6.2	7.2	5.6	6.4	6.7	5.7	6.3	18.6	13.7	16.2
7 Inserzione viziosa . . . . .	7.8	6.2	7.0	6.6	6.2	6.4	7.7	6.2	7.0	25.7	21.2	23.5
8 Infezioni acute . . . . .	5.9	5.3	5.6	5.0	5.6	5.3	5.9	5.4	5.6	20.8	16.7	18.8
9 Infezioni croniche, in particolare sifilide . . . . .	7.4	6.5	6.9	13.9	17.0	15.4	7.7	7.1	7.4	22.3	17.1	19.7
di cui per sifilide . . . . .	2.8	2.7	2.8	10.1	11.8	10.9	3.2	3.2	3.2	8.9	4.9	7.0
10 Altre cause . . . . .	8.0	7.2	7.6	10.8	13.3	12.0	8.1	7.5	7.8	40.2	27.7	34.0
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	19.4	17.1	18.3	37.6	29.9	33.8	20.4	17.8	19.1	134.7	108.1	121.5
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>167.5</b>	<b>128.8</b>	<b>148.6</b>	<b>192.5</b>	<b>155.2</b>	<b>174.3</b>	<b>168.8</b>	<b>130.1</b>	<b>150.0</b>	<b>382.5</b>	<b>328.9</b>	<b>356.0</b>
11 Presentazione viziosa e pro-cidenza del cordone . . .	79.9	62.1	71.2	79.3	67.8	73.7	79.8	62.4	71.4	187.9	166.5	177.3
12 Ostacoli all'espulsione del feto	38.2	27.9	33.2	40.4	31.4	36.0	38.3	28.1	33.3	75.9	60.7	68.4
13 Altre cause . . . . .	47.5	37.0	42.4	70.3	53.8	62.2	48.7	37.9	43.4	112.0	97.5	104.8
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	1.9	1.7	1.8	2.6	2.1	2.4	2.0	1.8	1.9	6.7	4.2	5.4
<b>Cause non indicate . . . . .</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>11.2</b>	<b>8.9</b>	<b>10.1</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>21.2</b>	<b>19.7</b>	<b>20.5</b>

(a) Nati vivi e nati morti.

## la filiazione ed il sesso, nel biennio 1931-32.

a 10 000 nascite) (a).

CAUSE DI NATIMORTALITÀ	PARTI MULTIPLI						IN COMPLESSO								
	illegittimi			Totale			legittimi			illegittimi			Totale		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
<b>Complesso . . .</b>	<b>1316.6</b>	<b>1129.4</b>	<b>1223.0</b>	<b>1049.7</b>	<b>867.7</b>	<b>959.6</b>	<b>362.4</b>	<b>308.8</b>	<b>336.3</b>	<b>460.2</b>	<b>404.8</b>	<b>433.2</b>	<b>367.5</b>	<b>313.8</b>	<b>341.4</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . .</b>	<b>282.1</b>	<b>243.1</b>	<b>262.6</b>	<b>221.0</b>	<b>190.3</b>	<b>205.8</b>	<b>79.4</b>	<b>77.4</b>	<b>78.4</b>	<b>117.5</b>	<b>112.5</b>	<b>115.0</b>	<b>81.4</b>	<b>79.3</b>	<b>80.3</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche . . . . .	39.2	86.3	62.7	35.9	37.6	36.7	21.0	19.7	20.4	43.4	40.8	42.1	22.2	20.8	21.5
di cui per sifilide . . . . .	39.2	70.6	54.9	24.9	27.9	26.4	16.7	15.6	16.2	38.2	35.7	37.0	17.8	16.7	17.3
2 Tossiemie gravidiche . . . . .	31.3	47.1	39.2	44.8	46.0	45.4	17.6	16.6	17.1	18.3	19.0	18.6	17.7	16.7	17.2
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	78.4	31.4	54.9	60.0	44.1	52.2	21.6	24.0	22.7	25.8	28.0	26.9	21.8	24.2	23.0
4 Altre cause . . . . .	109.7	70.6	90.2	63.2	45.2	54.3	12.5	11.7	12.1	21.0	16.4	18.7	13.0	11.9	12.5
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	23.5	7.8	15.7	17.1	17.4	17.2	6.6	5.5	6.1	9.0	8.3	8.6	6.8	5.7	6.2
<b>II. - Per espulsione prematura . . .</b>	<b>572.1</b>	<b>509.8</b>	<b>541.0</b>	<b>422.4</b>	<b>327.5</b>	<b>375.4</b>	<b>106.6</b>	<b>93.8</b>	<b>100.4</b>	<b>133.1</b>	<b>123.2</b>	<b>128.3</b>	<b>108.0</b>	<b>95.3</b>	<b>101.8</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	195.9	149.0	172.5	154.9	115.8	135.5	46.0	41.4	43.8	45.2	38.9	42.1	45.9	41.3	43.7
6 Traumatismo determinante il parto prematuro . . .	39.2	15.7	27.4	19.5	13.8	16.7	7.0	6.0	6.5	7.9	5.8	6.9	7.1	5.9	6.5
7 Inserzione viziosa . . . . .	70.5	15.7	43.1	27.7	21.0	24.4	8.2	6.6	7.5	8.1	6.4	7.3	8.2	6.6	7.4
8 Infezioni acute . . . . .	31.3	23.5	27.4	21.3	17.0	19.2	6.3	5.7	6.0	5.6	6.0	5.8	6.3	5.7	6.0
9 Infezioni croniche, in particolare sifilide . . . . .	47.0	31.4	39.2	23.4	17.7	20.6	7.8	6.8	7.3	14.7	17.3	16.0	8.1	7.3	7.7
di cui per sifilide . . . . .	7.8	31.4	19.6	8.9	6.2	7.5	3.0	2.8	2.9	10.0	12.2	11.1	3.3	3.3	3.3
10 Altre cause . . . . .	31.3	39.2	35.3	39.8	28.2	34.1	8.8	7.7	8.3	11.3	13.9	12.6	8.9	8.1	8.5
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	156.7	235.3	196.0	135.7	114.0	124.9	22.5	19.6	21.1	40.4	34.8	37.6	23.4	20.4	21.9
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>423.2</b>	<b>352.9</b>	<b>388.1</b>	<b>384.4</b>	<b>330.0</b>	<b>357.4</b>	<b>173.1</b>	<b>134.2</b>	<b>154.2</b>	<b>197.8</b>	<b>159.9</b>	<b>179.3</b>	<b>174.4</b>	<b>135.6</b>	<b>155.5</b>
11 Presentazione viziosa e pro-cidenza del cordone . . .	242.9	188.2	215.6	190.4	167.5	179.1	82.7	65.0	74.1	83.0	70.7	77.0	82.7	65.3	74.2
12 Ostacoli all'espulsione del feto	54.9	39.2	47.0	75.0	59.7	67.4	39.2	28.8	34.1	40.7	31.6	36.3	39.2	28.9	34.2
13 Altre cause . . . . .	125.4	117.6	121.5	112.6	98.4	105.6	49.2	38.7	44.1	71.6	55.3	63.6	50.4	39.6	45.1
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	—	7.8	3.9	6.4	4.3	5.4	2.0	1.8	1.9	2.5	2.3	2.4	2.1	1.8	2.0
<b>Cause non indicate . . . . .</b>	<b>39.2</b>	<b>23.5</b>	<b>31.4</b>	<b>22.0</b>	<b>19.9</b>	<b>21.0</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>11.8</b>	<b>9.2</b>	<b>10.6</b>	<b>3.7</b>	<b>3.6</b>	<b>3.7</b>

Nati morti legittimi nel biennio 1931-32, secondo le cause, l'età della madre al parto e l'ordine di generazione (Cifre proporzionali)  
PROSPETTO II.

CAUSE DI NATIMORTALITÀ	NATI MORTI DA								
	ETÀ DELLA MADRE								
	— 21			21-29			30-39		
	Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale	Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale	Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale
<b>Complesso . . .</b>	<b>328.8</b>	<b>227.9</b>	<b>306.7</b>	<b>365.4</b>	<b>216.7</b>	<b>268.9</b>	<b>714.9</b>	<b>314.0</b>	<b>341.7</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . . . .</b>	<b>74.4</b>	<b>63.1</b>	<b>71.9</b>	<b>77.7</b>	<b>51.8</b>	<b>60.9</b>	<b>148.7</b>	<b>75.8</b>	<b>80.8</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche di cui per sifilide . . . . .	14.4	22.1	16.1	18.0	14.3	15.6	42.8	20.9	22.4
2 Tossiemie gravidiche . . . . .	17.2	8.2	15.3	17.9	10.0	12.8	39.3	16.3	17.9
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	25.5	16.4	23.5	23.9	15.9	18.7	36.9	22.1	23.2
4 Altre cause . . . . .	11.7	11.9	11.8	10.4	7.6	8.6	16.1	11.1	11.4
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	5.5	4.5	5.3	7.6	4.0	5.3	13.6	5.4	6.0
<b>II. - Per espulsione prematura . . . . .</b>	<b>108.2</b>	<b>92.6</b>	<b>104.8</b>	<b>95.6</b>	<b>71.7</b>	<b>80.1</b>	<b>151.6</b>	<b>93.4</b>	<b>97.4</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	50.2	40.6	48.1	42.2	31.6	35.3	58.3	41.4	42.6
6 Traumatismo determinante il parto prematuro . . . . .	9.1	6.1	8.4	6.5	4.8	5.4	10.7	6.4	6.7
7 Inserzione viziosa . . . . .	6.4	3.3	5.7	6.9	5.8	6.2	12.4	7.4	7.8
8 Infezioni acute . . . . .	7.2	6.6	7.1	6.0	4.1	4.7	11.3	5.4	5.8
9 Infezioni croniche, in particolare sifilide . . . . .	6.3	6.6	6.4	5.5	5.7	5.6	11.3	7.4	7.7
di cui per sifilide . . . . .	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	4.5	2.8	2.9
10 Altre cause . . . . .	6.6	5.7	6.4	7.8	5.3	6.2	14.8	8.1	8.5
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	22.3	23.8	22.6	20.8	14.4	16.7	32.7	17.4	18.4
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>143.6</b>	<b>68.8</b>	<b>127.2</b>	<b>189.1</b>	<b>91.2</b>	<b>125.6</b>	<b>410.5</b>	<b>142.4</b>	<b>160.9</b>
11 Presentazioni viziose e procidenza del cordone . . . . .	67.0	36.5	60.3	84.6	46.8	60.0	160.0	70.6	76.8
12 Ostacoli all'espulsione del feto . .	32.3	13.1	28.1	47.6	18.5	28.7	117.0	28.8	34.9
13 Altre cause . . . . .	43.1	18.9	37.8	55.1	24.8	35.4	129.1	41.1	47.2
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	1.1	0.4	1.0	1.9	1.2	1.4	4.3	1.8	2.0
<b>Cause non indicate . . . . .</b>	<b>2.8</b>	<b>3.3</b>	<b>2.9</b>	<b>2.9</b>	<b>2.0</b>	<b>2.3</b>	<b>4.1</b>	<b>2.5</b>	<b>2.6</b>

(a) Nati vivi e nati morti.

dine di generazione (da genitori che presumibilmente non ebbero figli prima dell'attuale matrimonio).  
a 10000 nascite) (a).

CAUSE DI NATIMORTALITÀ	PARTI SEMPLICI						NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI			IN COMPLESSO		
	DUE AL PARTO						Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale	Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale
	40-49			Totale								
	Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale	Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale	Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale	Primo-geniti	Non primo-geniti	Totale
<b>Complesso . . .</b>	<b>1244.5</b>	<b>501.1</b>	<b>516.6</b>	<b>400.7</b>	<b>288.5</b>	<b>316.2</b>	<b>1437.9</b>	<b>841.1</b>	<b>945.7</b>	<b>420.5</b>	<b>304.6</b>	<b>333.0</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . . . .</b>	<b>313.9</b>	<b>126.5</b>	<b>130.4</b>	<b>86.0</b>	<b>70.1</b>	<b>74.0</b>	<b>303.3</b>	<b>178.2</b>	<b>200.1</b>	<b>90.1</b>	<b>73.2</b>	<b>77.4</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche di cui per sifilide . . . . .	113.1	35.8	37.4	20.5	19.5	19.7	47.2	34.4	36.6	21.0	19.9	20.2
2 Tossiemie gravidiche . . . . .	98.5	28.2	29.7	16.9	15.4	15.8	40.4	22.9	26.0	17.4	15.6	16.0
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	80.3	30.8	31.9	20.4	14.8	16.2	89.9	33.2	43.1	21.8	15.4	16.9
4 Altre cause . . . . .	58.4	32.5	33.0	25.8	20.4	21.7	69.6	48.7	52.4	26.6	21.2	22.5
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	36.5	18.5	18.9	11.4	10.3	10.6	68.5	47.3	51.0	12.5	11.4	11.7
<b>II. - Per espulsione prematura . . . . .</b>	<b>251.8</b>	<b>141.5</b>	<b>143.8</b>	<b>104.9</b>	<b>88.6</b>	<b>92.6</b>	<b>603.2</b>	<b>318.4</b>	<b>368.4</b>	<b>114.3</b>	<b>95.3</b>	<b>100.0</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	109.5	66.5	67.4	45.8	39.5	41.1	230.3	113.2	133.8	49.4	41.7	43.6
6 Traumatismo determinante il parto prematuro . . . . .	10.9	9.2	9.2	7.4	6.0	6.3	27.0	14.1	16.3	7.8	6.2	6.6
7 Inserzione viziosa . . . . .	18.2	9.3	9.5	7.5	6.8	7.0	32.6	21.3	23.2	7.9	7.2	7.4
8 Infezioni acute . . . . .	14.6	8.1	8.2	6.8	5.1	5.5	27.0	17.2	18.9	7.2	5.4	5.9
9 Infezioni croniche, in particolare sifilide . . . . .	14.6	11.4	11.4	6.3	7.1	6.9	21.3	19.1	19.5	6.6	7.4	7.2
di cui per sifilide . . . . .	10.9	4.1	4.3	2.7	2.7	2.7	7.9	6.2	6.5	2.8	2.8	2.8
10 Altre cause . . . . .	25.5	13.0	13.3	8.4	7.3	7.6	53.9	30.1	34.3	9.3	8.0	8.3
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	58.4	24.0	24.7	22.5	16.8	18.2	211.2	103.4	122.3	26.1	19.4	21.0
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>660.6</b>	<b>229.5</b>	<b>238.5</b>	<b>206.7</b>	<b>127.4</b>	<b>147.0</b>	<b>499.9</b>	<b>326.1</b>	<b>356.5</b>	<b>212.3</b>	<b>133.2</b>	<b>152.6</b>
11 Presentazioni viziose e procidenza del cordone . . . . .	240.9	110.5	113.2	90.2	63.6	70.2	231.4	163.9	175.7	92.9	66.5	73.0
12 Ostacoli all'espulsione del feto . .	186.1	50.0	52.8	52.9	26.1	32.7	109.0	59.7	68.4	54.0	27.1	33.6
13 Altre cause . . . . .	219.0	64.6	67.9	61.6	36.0	42.3	155.0	96.7	107.0	63.4	37.8	44.0
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	14.6	4.4	4.7	2.1	1.8	1.8	4.5	5.7	5.5	2.1	1.9	1.9
<b>Cause non indicate . . . . .</b>	<b>18.2</b>	<b>3.6</b>	<b>3.9</b>	<b>3.1</b>	<b>2.4</b>	<b>2.6</b>	<b>31.5</b>	<b>18.4</b>	<b>20.7</b>	<b>3.6</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>





TAVOLE SUPPLEMENTARI  
PER LE CAUSE DI NATIMORTALITÀ

TAVOLA I. — Nati morti distinti secondo le cause, la

CAUSE DI NATIMORTALITÀ	NATI MORTI DA PARTI SEM							
	CAPILUOGHI DI PROVINCIA				ALTRI COMUNI			
	Totale		di cui illegittimi		Totale		di cui illegittimi	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>8 305</b>	<b>3 582</b>	<b>987</b>	<b>444</b>	<b>25 269</b>	<b>11 248</b>	<b>1 322</b>	<b>604</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . . . .</b>	<b>2 023</b>	<b>935</b>	<b>274</b>	<b>125</b>	<b>6 654</b>	<b>3 179</b>	<b>431</b>	<b>205</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche . .	740	330	127	55	1 528	717	105	47
di cui per sifilide . . . . .	690	307	120	53	1 110	519	81	36
2 Tossiemie gravidiche . . . . .	376	181	41	22	1 359	623	67	39
3 Malformazioni incompatibili con la vita	376	194	34	18	2 012	1 027	126	60
4 Altre cause . . . . .	298	136	38	17	1 293	596	110	45
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	233	94	34	13	462	216	23	14
<b>II. - Per espulsione prematura . . . . .</b>	<b>1 950</b>	<b>867</b>	<b>230</b>	<b>108</b>	<b>7 046</b>	<b>3 156</b>	<b>328</b>	<b>153</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	409	169	30	12	3 354	1 505	126	55
6 Traumatismo determinante il parto prematuro . . . . .	90	36	12	5	499	223	21	11
7 Inserzione viziosa . . . . .	138	59	8	2	451	204	16	9
8 Infezioni acute . . . . .	112	41	5	3	430	208	23	12
9 Infez. croniche, in particolare sifilide . .	248	119	43	22	580	246	46	26
di cui per sifilide . . . . .	144	76	35	19	194	85	28	16
10 Altre cause . . . . .	247	128	37	20	559	250	22	14
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	706	315	95	44	1 173	520	74	26
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>4 175</b>	<b>1 713</b>	<b>443</b>	<b>193</b>	<b>11 251</b>	<b>4 754</b>	<b>519</b>	<b>228</b>
11 Presentazioni viziose e procidenza del cordone . . . . .	1 327	532	120	59	5 904	2 499	259	112
12 Ostacoli all'espulsione del feto . . . .	907	372	93	39	3 029	1 227	146	64
13 Altre cause . . . . .	1 862	778	225	94	2 163	956	104	47
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	79	31	5	1	155	72	10	5
<b>Cause non indicate . . . . .</b>	<b>157</b>	<b>67</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>318</b>	<b>159</b>	<b>44</b>	<b>18</b>

specie del parto, la filiazione ed il sesso, nell'anno 1931.

PL I C I				NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI				IN COMPLESSO			
REGNO				Totale		di cui illegittimi		Totale		di cui illegittimi	
Totale		di cui illegittimi		MF		F		MF		F	
MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
<b>33 574</b>	<b>14 830</b>	<b>2 309</b>	<b>1 048</b>	<b>2 837</b>	<b>1 230</b>	<b>173</b>	<b>83</b>	<b>36 411</b>	<b>16 110</b>	<b>2 482</b>	<b>1 131</b>
8 677	4 114	705	330	683	321	43	21	9 360	4 435	748	351
2 268	1 047	232	102	104	58	7	6	2 372	1 105	239	108
1 800	826	201	89	67	41	6	5	1 867	867	207	94
1 735	804	108	61	136	70	4	3	1 871	874	112	64
2 388	1 221	160	78	164	75	9	3	2 552	1 296	169	81
1 591	732	148	62	209	84	20	9	1 800	816	168	71
695	310	57	27	70	34	3	—	765	344	60	27
8 996	4 023	558	261	1 033	447	72	38	10 029	4 470	630	299
3 763	1 674	156	67	338	134	23	10	4 101	1 808	179	77
589	259	33	16	37	12	5	1	626	271	38	17
589	263	24	11	61	27	2	—	650	290	26	11
542	249	28	15	48	24	2	1	590	273	30	16
828	365	89	48	69	29	7	4	897	394	96	52
338	161	63	35	20	8	4	4	358	169	67	39
806	378	59	34	96	46	5	3	902	424	64	37
1 879	835	169	70	384	175	28	19	2 263	1 010	197	89
15 426	6 467	962	421	1 041	479	53	23	16 467	6 946	1 015	444
7 231	3 031	379	171	499	234	31	12	7 730	3 265	410	183
3 936	1 599	239	103	238	106	3	2	4 174	1 705	242	105
4 025	1 734	329	141	285	130	18	8	4 310	1 864	347	149
234	103	15	6	19	9	1	1	253	112	16	7
475	226	84	26	80	33	5	1	555	259	89	37

TAVOLA II. — Nati morti legittimi nell'anno 1931, distinti secondo  
(Nati da genitori che presumibilmente non

CAUSE DI NATIMORTALITÀ	NATI MORTI DA											
	ETÀ DELLA											
	- 21				21-29				30-39			
	Primo- geniti	Non primo- geniti	Ordine non indicato	Totale	Primo- geniti	Non primo- geniti	Ordine non indicato	Totale	Primo- geniti	Non primo- geniti	Ordine non indicato	Totale
<b>Complesso . . .</b>	<b>1 488</b>	<b>282</b>	<b>1</b>	<b>1 771</b>	<b>5 956</b>	<b>6 414</b>	<b>14</b>	<b>12 384</b>	<b>1 759</b>	<b>10 385</b>	<b>6</b>	<b>12 150</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione. . .</b>	<b>366</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>456</b>	<b>1 346</b>	<b>1 665</b>	<b>1</b>	<b>3 012</b>	<b>392</b>	<b>2 736</b>	<b>1</b>	<b>3 129</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche . . . . .	67	26	—	93	304	453	1	758	110	724	—	834
di cui per sifilide . . . . .	53	19	—	72	253	355	—	608	89	559	—	648
2 Tossiemie gravidiche . . . . .	77	8	—	85	282	301	—	583	98	562	—	660
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	120	24	—	144	405	484	—	889	94	761	—	855
4 Altre cause . . . . .	68	22	1	91	213	294	—	507	49	497	1	547
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	34	9	—	43	142	133	—	275	41	192	—	233
<b>II. - Per espulsione prematura . . .</b>	<b>466</b>	<b>107</b>	<b>—</b>	<b>573</b>	<b>1 437</b>	<b>1 950</b>	<b>6</b>	<b>3 393</b>	<b>368</b>	<b>2 874</b>	<b>2</b>	<b>3 244</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	200	43	—	243	611	812	2	1 425	132	1 255	—	1 387
6 Traumatismo determin. il parto prematuro . . . . .	37	7	—	44	101	136	1	238	26	187	—	213
7 Inserzione viziosa . . . . .	27	—	—	27	87	143	—	230	26	205	—	231
8 Infezioni acute . . . . .	32	8	—	40	100	101	—	201	30	168	—	198
9 Infez. croniche, in partico- colare sifilide . . . . .	37	13	—	50	94	187	1	282	29	258	1	288
di cui per sifilide . . . . .	15	5	—	20	34	74	—	108	12	90	1	103
10 Altre cause . . . . .	32	6	—	38	115	160	1	276	37	277	—	314
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	101	30	—	131	329	411	1	741	88	524	1	613
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>638</b>	<b>79</b>	<b>—</b>	<b>717</b>	<b>3 101</b>	<b>2 720</b>	<b>7</b>	<b>5 828</b>	<b>988</b>	<b>4 656</b>	<b>1</b>	<b>5 645</b>
11 Presentazioni viziose e procidenza del cordone . . . . .	294	41	—	335	1 354	1 355	3	2 712	371	2 306	1	2 678
12 Ostacoli all'espulsione del feto . . . . .	171	18	—	189	914	634	2	1 550	316	1 072	—	1 388
13 Altre cause . . . . .	168	20	—	188	802	687	2	1 491	288	1 205	—	1 493
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	5	—	—	5	31	44	—	75	13	73	—	86
<b>Cause non indicate . . . . .</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>25</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>—</b>	<b>151</b>	<b>11</b>	<b>119</b>	<b>2</b>	<b>132</b>

le cause, l'età della madre al parto e l'ordine di generazione.  
ebbero figli prima dell'attuale matrimonio)

PARTI SEMPLICI														NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI			
MADRE AL PARTO														Primo- geniti	Non primo- geniti	Ordine non indicato	Totale
40-00				non indicata				Totale									
Primo- geniti	Non primo- geniti	Ordine non indicato	Totale	Primo- geniti	Non primo- geniti	Ordine non indicato	Totale	Primo- geniti	Non primo- geniti	Ordine non indicato	Totale						
<b>193</b>	<b>3 335</b>	<b>—</b>	<b>3 528</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>9 402</b>	<b>20 432</b>	<b>45</b>	<b>29 879</b>	<b>670</b>	<b>1 852</b>	<b>1</b>	<b>2 523</b>		
50	903	—	953	1	6	—	7	2 155	5 399	3	7 557	152	445	1	598		
18	235	—	253	1	2	—	3	500	1 440	1	1 941	15	81	—	96		
17	180	—	197	1	2	—	3	413	1 115	—	1 528	14	47	—	61		
16	205	—	221	—	1	—	1	473	1 077	—	1 550	46	68	—	114		
4	231	—	235	—	1	—	1	623	1 501	—	2 124	35	115	—	150		
8	165	—	173	—	2	—	2	338	980	2	1 320	38	137	1	176		
4	67	—	71	—	—	—	—	221	401	—	622	18	44	—	62		
41	898	—	939	1	2	—	3	2 313	5 831	8	8 152	279	633	—	912		
15	406	—	421	1	—	—	1	959	2 516	2	3 477	105	197	—	302		
2	56	—	58	—	—	—	—	166	386	1	553	11	19	—	30		
3	56	—	59	—	—	—	—	143	404	—	547	17	38	—	55		
3	52	—	55	—	1	—	1	165	330	—	495	9	35	—	44		
3	77	—	80	—	—	—	—	163	535	2	700	10	50	—	60		
2	23	—	25	—	—	—	—	63	192	1	256	4	10	—	14		
4	92	—	96	—	—	—	—	188	535	1	724	17	70	—	87		
11	159	—	170	—	1	—	1	529	1 125	2	1 656	110	224	—	334		
97	1 500	—	1 597	2	5	—	7	4 826	8 960	8	13 794	222	719	—	941		
33	737	—	770	—	3	—	3	2 052	4 442	4	6 498	89	358	—	447		
27	369	—	396	1	1	—	2	1 429	2 094	2	3 525	65	155	—	220		
34	353	—	387	1	1	—	2	1 293	2 266	2	3 561	65	192	—	257		
3	41	—	44	—	—	—	—	52	158	—	210	3	14	—	17		
5	34	—	39	2	3	24	29	108	242	26	376	17	55	—	72		

TAVOLA III. — Nati morti distinti secondo le cause,

CAUSE DI NATIMORTALITÀ	NATI MORTI DA PARTI SEM							
	CAPILUOGHI DI PROVINCIA				ALTRI COMUNI			
	Totale		di cui illegittimi		Totale		di cui illegittimi	
	M F	F	M F	F	M F	F	M F	F
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>7 928</b>	<b>3 568</b>	<b>873</b>	<b>415</b>	<b>24 437</b>	<b>11 079</b>	<b>1 224</b>	<b>545</b>
<b>I. — Nel corso della gestazione . . . . .</b>	<b>1 816</b>	<b>882</b>	<b>229</b>	<b>122</b>	<b>5 139</b>	<b>2 531</b>	<b>252</b>	<b>115</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche . . . . .	769	370	127	69	1 251	595	84	35
di cui per sifilide . . . . .	720	343	119	64	936	446	69	28
2 Tossiemie gravidiche . . . . .	393	187	29	11	1 210	578	56	23
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	356	194	45	29	1 760	920	74	38
4 Altre cause . . . . .	129	66	9	5	578	286	24	11
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	169	65	19	8	340	152	14	8
<b>II. — Per espulsione prematura . . . . .</b>	<b>1 912</b>	<b>882</b>	<b>227</b>	<b>106</b>	<b>8 262</b>	<b>3 873</b>	<b>474</b>	<b>223</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	374	169	27	13	4 228	2 032	232	108
6 Traumatismo determinante il parto prematuro . . . . .	81	39	8	3	601	268	27	10
7 Inserzione viziosa . . . . .	195	83	14	8	635	269	30	13
8 Infezioni acute . . . . .	89	43	3	1	513	237	25	13
9 Infez. croniche, in particolare sifilide . . . . .	188	97	34	18	486	235	41	22
di cui per sifilide . . . . .	116	59	30	15	195	95	23	11
10 Altre cause . . . . .	252	118	38	19	529	244	31	16
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	733	333	103	44	1 270	588	88	41
<b>III. — Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>4 150</b>	<b>1 780</b>	<b>404</b>	<b>180</b>	<b>10 912</b>	<b>4 613</b>	<b>488</b>	<b>204</b>
11 Presentazioni viziose e procidenza del cordone . . . . .	1 293	590	122	63	5 982	2 545	283	118
12 Ostacoli all'espulsione del feto . . . . .	687	285	65	33	2 150	890	79	27
13 Altre cause . . . . .	2 138	891	217	84	2 668	1 121	116	54
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . . . .	32	14	—	—	112	57	10	5
<b>Cause non indicate . . . . .</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>124</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

la specie del parto, la filiazione ed il sesso, nell'anno 1932.

PLICI				NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI				IN COMPLESSO			
REGNO				Totale		di cui illegittimi		Totale		di cui illegittimi	
Totale		di cui illegittimi		M F	F	M F	F	M F	F	M F	F
M F	F	M F	F	M F	F	M F	F	M F	F	M F	F
<b>32 365</b>	<b>14 647</b>	<b>2 097</b>	<b>960</b>	<b>2 516</b>	<b>1 118</b>	<b>139</b>	<b>61</b>	<b>34 881</b>	<b>15 765</b>	<b>2 236</b>	<b>1 021</b>
6 955	3 413	481	237	465	205	24	10	7 420	3 618	505	247
2 020	965	211	104	101	46	9	5	2 121	1 011	220	109
1 656	789	188	92	80	36	8	4	1 736	825	196	96
1 603	765	85	34	117	57	6	3	1 720	822	91	37
2 116	1 114	119	67	127	47	5	1	2 243	1 161	124	68
707	352	33	16	94	41	3	—	801	393	36	16
509	217	33	16	26	14	1	1	535	231	34	17
10 174	4 755	701	329	1 061	458	66	27	11 235	5 213	767	356
4 602	2 201	259	121	418	186	21	9	5 020	2 387	280	130
682	307	35	13	56	26	2	1	738	333	37	14
830	352	44	21	75	31	9	2	905	383	53	23
602	280	28	14	59	23	5	2	661	303	33	16
674	332	75	40	46	20	3	—	720	352	78	40
311	154	53	26	22	9	1	—	333	163	54	26
781	362	69	35	94	32	4	2	875	394	73	37
2 003	921	191	85	313	140	22	11	2 316	1 061	213	96
15 062	6 393	892	384	953	433	46	22	16 015	6 826	938	406
7 275	3 135	405	181	500	229	24	12	7 775	3 364	429	193
2 837	1 175	144	60	138	59	9	3	2 975	1 234	153	63
4 806	2 012	333	138	304	142	13	7	5 110	2 154	346	145
144	71	10	5	11	3	—	—	155	74	10	5
174	86	23	10	37	22	3	2	211	108	26	12






## ALLEGATI

- I. - **Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931.**
- II. - **Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.**





**ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).**

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
<b>I.</b>						
<b>Malattie infettive e parassitar.</b>						
<b>Vaiolo (6)</b>						
a) vaiolo . . . . .	6 <sup>a</sup>	Vaiolo . . . . .	10 in p.	1	—	1
b) vaioloide, alastrim . .	6 <sup>b</sup>	Vaioloide . . . . .	10 in p.	—	2	2
c) non specificato . . . .	6 <sup>c</sup>	Alastrim . . . . .	34 in p.	—	—	—
		Non specificato «Vaiolo» .	10 in p.	—	1	1
<b>Dissenteria (13)</b>						
c) non specificata o dovuta ad altre cause . . . . .	13 <sup>c</sup>	Dissenteria non specificata o dovuta ad altre cause «escl. la dissenteria mal.»	26 <sup>c</sup> in p.	166	144	310
<b>Peste (14)</b>						
a) bubbonica . . . . .	14 <sup>a</sup>	Peste bubbonica «escluso il bubbone climatico» . . .	27 <sup>a</sup> in p.	—	—	—
<b>Tubercolosi dell'apparato respiratorio (compresi i gangli tracheobronchiali) . .</b>						
	23	Tubercolosi dei gangli tracheobronchiali . . . . .	45 in p.	1	2	3
		Tuberc. dell' app. respirat.	43	15927	17131	33058
<b>Tubercolosi del sistema linfatico (eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali) . . . .</b>						
	29	Tubercolosi del sistema linfatico «eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali» .	45 in p.	100	94	194
<b>Altre localizzaz. della tuber.</b>						
	31	Tubercolosi degli altri organi ed organi non specificati . . . . .	49 <sup>b</sup>	10	10	20
		Tubercolosi delle ghiandole surrenali . . . . .	69 in p.	3	1	4
<b>Tubercolosi disseminata (32)</b>						
a) acuta . . . . .	32 <sup>a</sup>	Tubercolosi dissem. acuta	41 <sup>a</sup> in p.	301	381	682
b) cronica . . . . .	32 <sup>b</sup>	Tubercolosi dissem. cronica	41 <sup>b</sup> in p.	103	128	231
c) non specificata . . . .	32 <sup>c</sup>	Tuberc. dissem. non specif.	41 <sup>a</sup> in p.	39	39	78
			41 <sup>b</sup> in p.	346	330	676
<b>Sifilide (34)</b>						
a) congenita . . . . .	34 <sup>a</sup>	Sifilide congenita . . . . .	50 in p.	363	330	693
b) acquisita . . . . .	34 <sup>b</sup>	Sifilide acquisita . . . . .	50 in p.	2	9	11
c) non specificata . . . .	34 <sup>c</sup>	Sifilide non specificata . .	50 in p.	431	216	647
<b>Infezione gonococcica ed altre malattie veneree . .</b>						
	35	Ulcera molle . . . . .	51	—	1	1
		Infezione gonococcica . .	52	23	18	41
<b>Infezione purulenta e setticemia, non puerperali (36)</b>						
a) setticemia . . . . .	36 <sup>a</sup>	Setticemia «infezione purulenta e setticemia, non puerperali» . . . . .	35 in p.	2032	2097	4129
b) piemia . . . . .	36 <sup>b</sup>	Piemia «infezione purulenta e setticemia, non puerperali» . . . . .	35 in p.	93	103	196
c) cangrena gassosa . . .	36 <sup>c</sup>	Cangrena gassosa «infezione purulenta e setticemia, non puerperali» . . . . .	35 in p.	14	9	23
		Pneumococcemia . . . . .	107 <sup>a</sup> in p.	—	—	—
<b>Malaria (38)</b>						
a) febbre malarica . . . .	38 <sup>a</sup>	Febbre malarica . . . . .	23 <sup>a</sup>	1524	1193	2717
		Dissenteria malarica . . .	26 <sup>c</sup> in p.	—	—	—

(\*). Per le voci comparabili, veggansi le tavole IV-A, IV-B e V; VI-A, VI-B e X per l'anno 1931 (Parte II - Tavole). Cfr. Anche quanto è detto nel secondo capoverso e seguenti di pag. 9\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931				
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale		
Altre malattie dovute a protozoi parassiti . . . . .	39	Morbo di Weil « spirochetosi ittero-emorragica » . . . . .	29	15	3	18		
		Tripanosomiasi . . . . .	53 in p.	—	1	1		
		Coccidiosi . . . . .	139 <sup>d</sup>	—	—	—		
		Spirochetosi broncopolmon.	112 in p.	—	1	1		
		Altre malattie dovute a protozoi parassiti . . . . .	34 in p.	68	76	144		
		Micosi . . . . .	43	Micosi . . . . .	40	185	120	305
				Tigne . . . . .	169 in p.	—	—	—
				Varicella . . . . .	34 in p.	18	21	39
				Infezione vaccinica . . . . .	35 in p.	6	9	15
				Bubbone climatico . . . . .	27 <sup>a</sup> in p.	—	—	—
Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	53 in p.	107	134	241		
		Febbre miliare . . . . .	18	1	1	2		
		Orecchioni . . . . .	31	44	25	69		
		Altri parassiti . . . . .	139 <sup>e</sup>	—	—	—		
II.								
<b>Tumori (neoplasie).</b>								
Tumori maligni della cavità boccale e della faringe . . . . .	45	Cancro della cavità boccale.	74	944	183	1127		
		Tumori maligni della faringe.	75 in p.	120	35	155		
Tumori maligni del tubo digerente e del peritoneo (46)								
a) esofago . . . . .	46 <sup>a</sup>	Tumori maligni dell'esofago .	75 in p.	565	208	773		
b) stomaco e duodeno . . . . .	46 <sup>b</sup>	Tumori maligni dello stomaco.	75 in p.	5679	4280	9959		
c) retto . . . . .	46 <sup>c</sup>	Tumori maligni del duodeno.	76 in p.	45	42	87		
d) fegato e vie biliari . . . . .	46 <sup>d</sup>	Tumori maligni del retto . . . . .	76 in p.	422	352	774		
		Tumori maligni del fegato e vie biliari . . . . .	75 in p.	1314	1504	2818		
e) pancreas . . . . .	46 <sup>e</sup>	Tumori maligni del pancreas.	80 in p.	239	160	399		
f) peritoneo . . . . .	46 <sup>f</sup>	Tumori maligni del peritoneo.	76 in p.	84	155	239		
		Tumori maligni degli altri org.	80 in p.	5	—	5		
g) altri organi . . . . .	46 <sup>g</sup>	Cancro del colon, dell'intestino « escl. retto e duodeno »	76 in p.	561	591	1152		
Tumori maligni dell'apparato respiratorio . . . . .	47	Tumori maligni dell'apparato respiratorio . . . . .	80 in p.	599	287	886		
Tumori maligni dell'utero . . . . .	48	Tumori maligni dell'utero . . . . .	71 in p.	—	2677	2677		
Tumori maligni degli altri organi genitali della donna . . . . .	49	Tumori maligni degli altri organi genitali della donna . . . . .	71 in p.	—	393	393		
Tumori maligni degli organi genito-urinari dell'uomo . . . . .	51	Tumori maligni degli organi genito-urinari dell'uomo . . . . .	73 in p.	958	—	958		
		Tumori maligni dello scroto.	79 in p.	—	—	—		
		Cancro rene dell'uomo . . . . .	80 in p.	116	—	116		
Tumori maligni della pelle . . . . .	52	Tumori maligni della pelle . . . . .	79 in p.	509	344	853		
		Tumori maligni sarcomatosi.	70	192	234	426		
		Tumori maligni della vescica della donna . . . . .	73 in p.	—	168	168		
Tumori maligni di altri organi o di organi non specific.	53	Tumori maligni delle ossa e articolazioni . . . . .	77	192	144	336		
		Tumori maligni dei centri nervosi e organi dei sensi.	78	417	387	804		
		Tumori maligni di altri organi o di organi non specific.	80 in p.	1465	1880	3345		

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Tumori non maligni (54)						
a) org. genit. della donna.	54 <sup>a</sup>	Tumori non maligni degli organi genitali della donna . . . . .	81 in p.	—	6	6
		Cisti ed altri tumori non maligni dell'ovaia . . . . .	151	—	188	188
		Tumore uterino non canceroso . . . . .	153 <sup>a</sup>	—	423	423
		Tumori non maligni degli altri organi « esclusi gli organi genitali della donna ».	81 in p.	57	56	113
		Tumori cerebrali e spinali non maligni . . . . .	90	9	5	14
b) altri organi . . . . .	54 <sup>b</sup>	Tumori intestinali e addominali non maligni . . . . .	136	5	16	21
		Tumori non maligni dell'orecchio . . . . .	101 in p.	—	—	—
		Tumori non maligni delle fosse nasali e del laringe.	102 <sup>a</sup> in p.	—	—	—
		Tumori non maligni della ghiandola pituitaria . . . . .	65 in p.	—	1	1
		Tumori non maligni degli organi della vista . . . . .	100 in p.	—	—	—
Tumori di cui il carattere maligno non è specificato. (55)						
a) organi genitali della donna . . . . .	55 <sup>a</sup>	Tumori degli organi genitali della donna di cui non è specificato il carattere maligno o non maligno . . . . .	81 in p.	—	—	—
		Tumori degli altri organi « esclusi gli organi genitali della donna » . . . . .	81 in p.	1	1	2
b) altri organi . . . . .	55 <sup>b</sup>	Tumori degli organi della vista il cui carattere maligno non è specificato . . . . .	100 in p.	—	—	—
		Tumori della ghiandola pituitaria il cui carattere maligno non è specificato.	65 in p.	—	—	—
		Tumori della milza il cui carattere maligno non è specificato . . . . .	69 <sup>bis</sup> in p.	2	3	5
<b>III.</b>						
<b>Malattie reumatiche, della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali.</b>						
Scorbuto (60)						
a) scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . . . .	60 <sup>a</sup>	Scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . . . .	57 in p.	16	13	29
b) scorbuto . . . . .	60 <sup>b</sup>	Scorbuto . . . . .	57 in p.	18	24	42
Rachitismo . . . . .	63	Rachitismo . . . . .	54 in p.	303	289	592
Osteomalacia . . . . .	64	Osteomalacia . . . . .	54 in p.	13	32	45
Malattie della ghiandola pituitaria (ipofisi) . . . . .	65	Malattie della ghiandola pituitaria « ipofisi » . . . . .	65 in p.	6	4	10

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Malattie della ghiandola tiroide e delle ghiandole paratiroidi (66)						
a) gozzo semplice . . . . .	66 <sup>a</sup>	Gozzo semplice . . . . .	66 <sup>b</sup> in p.	26	61	87
c) mixedema e cretinismo . . . . .	66 <sup>c</sup>	Mixedema e cretinismo « cachessia pachidermica, tiroceale » . . . . .	66 <sup>b</sup> in p.	17	20	37
e) altre . . . . .	66 <sup>e</sup>	Altre mal. della ghiandola tiroide . . . . .	66 <sup>b</sup> in p.	6	11	17
Malattie delle ghiandole o capsule surrenali (malattia d'Addison) non indicate come tubercolari . . . . .	68	Malattie delle ghiandole o capsule surrenali « malattia d'Addison » non indicate come tubercolari . . . . .	69 in p.	116	118	234
		Emorragie delle ghiandole surrenali . . . . .	121 in p.	—	2	2
		Altre malattie generali . . . . .	82 in p.	698	660	1358
		Degenerazione amiloide o grassa del fegato . . . . .	132 in p.	1	1	2
Altre malattie generali . . . . .	69	Degenerazione amiloide o grassa del rene . . . . .	146 <sup>b</sup> in p.	1	1	2
		Degenerazione amiloide o grassa delle arterie . . . . .	113 <sup>b</sup> in p.	13	1	14
<b>IV.</b>						
<b>Malattie del sangue e degli organi ematopoietici.</b>						
Anemie (71)						
b) altre . . . . .	71 <sup>b</sup>	Altre anemie . . . . .	63 <sup>b</sup> in p.	247	330	577
Leucemie e aleucemie (72)						
b) aleucemie . . . . .	72 <sup>b</sup>	Aleucemie . . . . .	64 <sup>b</sup> in p.	217	141	358
		Morbo di Hodgkin . . . . .	64 <sup>b</sup> in p.	2	19	21
		Morbo di Banti . . . . .	63 <sup>b</sup> in p.	51	38	89
Malattie della milza . . . . .	73	Malattie della milza . . . . .	69 <sup>bis</sup> in p.	21	18	39
Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici.	74	Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici.	63 <sup>b</sup> in p.	3	5	8
<b>V.</b>						
<b>Avvelenamenti cronici e intossicazioni.</b>						
Alcoolismo acuto e cronico.	75	Alcoolismo acuto . . . . .	180	47	5	52
		Alcoolismo cronico da alcool etilico . . . . .	177 in p.	361	52	413
Avvelenamenti cronici da sostanze organiche (76)						
a) professionali . . . . .	76 <sup>a</sup>	Avvelenamenti cronici da sostanze organiche « professionali » . . . . .	179 in p.	—	—	—
		Avvelenamenti cronici da sostanze organiche «altri». . . . .	179 in p.	5	9	14
b) altri . . . . .	76 <sup>b</sup>	Alcoolismo cronico da alcool metilico . . . . .	177 in p.	—	—	—

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Avvelenamenti cronici da sostanze minerali (77)						
a) professionali . . . . .	77 <sup>a</sup>	Avvelenamenti cronici da sostanze minerali « professionali » . . . . .	178 in p.	22	—	22
b) altri . . . . .	77 <sup>b</sup>	Avvelenamenti cronici da sostanze minerali « altri » . . . . .	178 in p.	7	1	8
VI.						
<b>Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi.</b>						
Encefalite (non epidemica) (78)						
a) ascesso del cervello . . . . .	78 <sup>a</sup>	Ascesso del cervello . . . . .	86 in p.	39	23	62
b) altre . . . . .	78 <sup>b</sup>	Altre encefaliti non epidemiche . . . . .	86 in p.	257	218	475
Demenza precoce e altre psicosi (84)						
a) demenza precoce . . . . .	84 <sup>a</sup>	Demenza precoce . . . . .	93 in p.	57	58	115
b) altre psicosi . . . . .	84 <sup>b</sup>	Altre psicosi . . . . .	93 in p.	425	411	836
Altre malattie del sistema nervoso (87)						
c) paralisi agitante . . . . .	87 <sup>c</sup>	Paralisi agitante . . . . .	99 in p.	298	212	510
d) sclerosi a placche . . . . .	87 <sup>d</sup>	Sclerosi a placche . . . . .	99 in p.	88	91	179
e) altre . . . . .	87 <sup>e</sup>	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	99 in p.	562	453	1015
		Eclampsia non puerperale . . . . .	97	73	85	158
Malattie degli organi della vista . . . . .	88	Malattie degli organi della vista . . . . .	100 in p.	6	3	9
Malattie dell'orecchio e del seno mastoideo (89)						
a) otite . . . . .	89 <sup>a</sup>	Otite . . . . .	101 in p.	406	274	680
b) altre . . . . .	89 <sup>b</sup>	Altre malattie dell'orecchio e del seno mastoideo . . . . .	101 in p.	167	140	307
VII.						
<b>Malattie dell'appar. circolatorio</b>						
Endocardite acuta . . . . .	91	Endocardite acuta . . . . .	117 <sup>a</sup> in p.	194	250	444
Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari.	92	Endocardite non specificata fino a 45 anni . . . . .	117 <sup>a</sup> in p.	309	378	687
		Endocardite cronica, compresi i vizi valvolari, endocardite senza qualifica dopo i 45 anni . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.	9558	14206	23764
Malattie del miocardio (93)						
a) miocardite acuta . . . . .	93 <sup>a</sup>	Miocardite acuta . . . . .	117 <sup>a</sup> in p.	111	123	234
b) miocardite cronica e degeneraz. del miocardio . . . . .	93 <sup>b</sup>	Miocardite cronica, degenerazione del miocardio, aneurisma del cuore . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.	4476	5564	10040
c) non specificate . . . . .	93 <sup>c</sup>	Miocardite non specificata fino a 45 anni . . . . .	117 <sup>a</sup> in p.	162	226	388
		Miocardite non specificata dopo i 45 anni . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.	4950	6489	11439

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Malattie delle arterie coronarie e angina pectoris . . . . .	94	Malattie delle arterie coronarie . . . . .	113 <sup>e</sup> in p.	18	13	31
		Angina pectoris . . . . .	119	1793	848	2641
Altre malattie del cuore (95)		Morbo di Adams-Stokes . . . . .	113 <sup>c</sup> in p.	10	14	24
a) malattie funzionali del cuore . . . . .	95 <sup>a</sup>	Malattie funzionali del cuore . . . . .	122 in p.	15	26	41
b) altre e non specificate . . . . .	95 <sup>b</sup>	Altre malattie del cuore e non specificate: asma cardiaco, pancardite, cardiopatia, cardiectasia, lesione cardiaca, cardiostenosi, insufficienza cardiaca, rottura cuore, idropsia, anasarca, ascite, edema generalizzato, cianosi, collasso, edema estremità . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.	7990	10263	18253
Arteriosclerosi, eccettuate le malattie delle arterie coronarie . . . . .	97	Arteriosclerosi, eccettuate le mal. delle arterie coronarie . . . . .	113 <sup>b</sup> in p.	3199	2649	5848
Cangrena (98)		Cangrena senile . . . . .	166 in p.	210	168	378
a) senile . . . . .	98 <sup>a</sup>	Altre cangrene . . . . .	166 in p.	419	354	773
b) altre . . . . .	98 <sup>b</sup>	Altre malattie delle arterie	113 <sup>e</sup> in p.	474	218	692
Altre malattie delle arterie . . . . .	99	Embolia e trombosi non puerperali . . . . .	114 in p.	95	133	228
Malattie delle vene: varici, emorroidi, flebite, ecc. . . . .	100	Phlegmasia alba dolens non puerperale . . . . .	114 in p.	—	—	—
Anomalie idiopatiche della pressione sanguigna . . . . .	102	Malattie delle vene . . . . .	115	172	223	395
Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	103	Anomalie idiopatiche della pressione sanguigna . . . . .	122 in p.	5	1	6
		Epistassi, emorragia (senza altra indicazione), emorragia interna . . . . .	121 in p.	54	35	89
		Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	122 in p.	3	1	4
		Disturbi cardiaci, senza altra indicazione . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.	10	5	15
VIII.						
<b>Malattie dell'appar. respiratorio</b>						
Malattie delle fosse nasali e annessi . . . . .	104	Malattie delle fosse nasali e annessi « esclusi i tumori non maligni » . . . . .	102 <sup>a</sup> in p.	36	18	54
Bronchite (106)		Bronchite acuta . . . . .	103 in p.	1444	1483	2927
a) acuta . . . . .	106 <sup>a</sup>	Bronchite cronica . . . . .	104 in p.	3172	3425	6597
b) cronica . . . . .	106 <sup>b</sup>	Bronchite non specificata « prima di 60 anni » . . . . .	103 in p.	2832	2547	5379
c) non specificata . . . . .	106 <sup>c</sup>	Bronchite non specificata « dopo i 60 anni » . . . . .	104 in p.	1865	2227	4092
Polmonite lobare . . . . .	108	Polmonite crupale . . . . .	107 <sup>a</sup> in p.	14222	11000	25222
Pleuriti . . . . .	110	Pleuriti « escluso emotorace » . . . . .	105 in p.	1542	1111	2653

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Congestione, edema, embolia, infarto emorragico e trombosi del polmone . . .	III	Catarro soffocante . . . . .	104 in p.	1	6	7
		Congestione, edema, embolia, infarto emorragico e trombosi del polmone . . .	106	541	434	975
Asma . . . . .	II2	Asma da fieno . . . . .	II2 in p.	8	5	13
		Asma bronchiale . . . . .	II0 <sup>a</sup>	1029	838	1867
Altre malattie dell'apparato respiratorio, eccettuata la tubercolosi (II4)						
b) altre, compresa la cancrena del polmone . . .	II4 <sup>b</sup>	Altre malattie dell'apparato respiratorio «eccettuata la tubercolosi» . . . . .	II2 in p.	43	30	73
		Ascesso polmonare . . . . .	II2 in p.	396	98	494
		Malattie del mediastino . . .	III	13	10	23
		Cancrena polmonare . . . . .	IO9 <sup>b</sup>	199	51	250
		Emotorace . . . . .	IO5 in p.	1	1	2
<b>IX.</b>						
<b>Malattie dell'appar. digerente.</b>						
Malattie della cavità boccale, dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi . . . . .	II5	Malattie della cavità boccale e degli organi annessi .	123 in p.	205	170	375
		Malattie delle tonsille e della faringe «comprese le forme adenoidiche» . . . . .	124 <sup>a</sup>	450	450	900
Ulcera dello stomaco e del duodeno (II7)	II7 <sup>a</sup>	Perforazione non traumatica dello stomaco . . . . .	126 in p.	26	1	27
		Ulcera dello stomaco . . . . .	125 <sup>a</sup>	1186	569	1755
Altre malattie dello stomaco (cancro eccettuato) . . .	II8	Altre malattie dello stomaco, escluso il cancro . . . . .	126 in p.	1026	975	2001
		Altre malattie dello stomaco, escluso il cancro . . . . .	145 in p.	—	—	—
Enteriti (al di sotto di 2 anni)	II9	Enteriti coleriformi al di sotto di 2 anni . . . . .	25 in p.	—	—	—
		Enteriti al di sotto di 2 anni	134 <sup>a</sup>	29125	27465	56590
Enteriti e ulcera intestinale (da due anni e oltre) (120)	II0 <sup>a</sup>	Enterocoliti pseudomembranose sotto i 2 anni . . . . .	142 in p.	—	—	—
		Enterocolite pseudomembranosa sopra i 2 anni . . .	142 in p.	—	—	—
a) enteriti . . . . .	II0 <sup>a</sup>	Enteriti coleriformi ed ulcera intestinale da 2 anni e oltre . . . . .	25 in p.	—	—	—
b) ulcera intestinale . . .	II0 <sup>b</sup>	Enteriti al di sopra di 2 anni	134 <sup>b</sup>	6083	6506	12589
		Ulcera intestinale «enterite» ed ulcera intestinale da 2 anni e oltre . . . . .	142 in p.	28	18	46

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.



Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Ernia, occlusione intestinale (122)						
b) occlusione intestinale.	122 <sup>b</sup>	Volvolo od occlusione intestinale . . . . .	135	1159	954	2113
		Paralisi o paresi intestinale	142 in p.	67	66	133
		Altre malattie dell'intestino « enteroptosi, costipazione, colibacillosi, ecc. » . . .	142 in p.	394	389	783
Altre malattie dell'intestino	123	Altre malattie dell'intestino, escluso il cancro . . . . .	145 in p.	—	—	—
		Altre malattie del fegato « compresa l'atrofia gialla »	132 in p.	735	577	1312
Altre malattie del fegato (compresa l'atrofia gialla)	125	Atrofia gialla acuta del fegato . . . . .	128	46	44	90
		Ittero grave . . . . .	130	120	96	216
Altre malattie della vescichetta e delle vie biliari	127	Altre malattie della vescichetta e delle vie biliari	132 in p.	255	426	681
X.						
<b>Malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale.</b>						
Nefrite acuta . . . . .	130	Nefrite acuta . . . . .	146 <sup>a</sup> in p.	1708	1812	3520
Nefrite cronica . . . . .	131	Nefrite cronica. . . . .	146 <sup>b</sup> in p.	3054	3511	6565
Nefrite non specificata. . .	132	Nefrite non specificata. . .	146 <sup>a</sup> in p.	47	29	76
			146 <sup>b</sup> in p.	2707	3019	5726
Altre malattie dei reni, dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza) (133)						
a) pielite . . . . .	133 <sup>a</sup>	Pielite « malattie dei reni, dei bacineti e degli ureteri, non comprese le malattie dei reni da gravidanza » e pielonefrite . . . . .	146 <sup>d</sup> in p.	81	113	194
b) altre . . . . .	133 <sup>b</sup>	Altre « malattie dei reni, dei bacineti e degli ureteri, non comprese le malattie dei reni da gravidanza »	146 <sup>d</sup> in p.	237	159	396
Calcolosi vie urinarie (134)						
a) calcolosi dei reni e delle vie urinarie superiori	134 <sup>a</sup>	Calcolosi dei reni e delle vie urinarie superiori . . . . .	148 in p.	169	109	278
b) calcolosi della vescica	134 <sup>b</sup>	Calcolosi della vescica « calcolosi delle vie urinarie ».	148 in p.	147	12	159
c) calcolosi senza altra indicazione . . . . .	134 <sup>c</sup>	Calcolosi senza altra indicaz. « calcolosi vie urinarie » . . . . .	148 in p.	15	2	17
Malattie della vescica, esclusi i tumori (135)						
a) cistite . . . . .	135 <sup>a</sup>	Cistite . . . . .	147 in p.	1209	315	1524
b) altre . . . . .	135 <sup>b</sup>	Altre malattie della vescica	147 in p.	88	11	99
		Fistola retto-vescicale . . . . .	149 <sup>b</sup> in p.	2	7	9
Malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. (136)						
b) altre . . . . .	136 <sup>b</sup>	Altre malattie dell'uretra . . . . .	149 <sup>b</sup> in p.	100	1	101

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Malattie degli organi genitali della donna, non indicate come veneree (139)						
a) ovaie, trombe e parametri . . . . .	139 <sup>a</sup>	Ovaie, trombe e parametri « malattie degli organi genitali della donna, non designate come veneree » . . . . .	154 in p.	—	2	2
		Salpingite o ascesso del bacino della donna . . . . .	152	—	216	216
b) utero . . . . .	139 <sup>b</sup>	Malattie dell'utero « malattie degli organi genitali della donna, non designate come veneree » . . . . .	154 in p.	—	119	119
		Emorragia uterina non puerperale . . . . .	153 <sup>b</sup>	—	40	40
c) mammelle . . . . .	139 <sup>c</sup>	Malattie delle mammelle . . . . .	155 in p.	—	9	9
d) altre . . . . .	139 <sup>d</sup>	Altre malattie degli organi genitali della donna, non designate come veneree . . . . .	154 in p.	—	11	11
<b>XI.</b>						
<b>Malattie della gravidanza, parto e puerperio.</b>						
Aborto con condizioni settiche . . . . .	140	Setticemia da aborto, aborto con condizioni settiche . . . . .	160 in p.	—	141	141
Aborto, senza indicazione di condizioni settiche, ma comprese le emorragie . . . . .	141	Aborto senza indicazione di condizioni settiche, ma comprese le emorragie . . . . .	156 <sup>a</sup>	—	27	27
		Emorragia antepartum « emorragia gravidica » . . . . .	156 <sup>e</sup> in p.	—	5	5
		Emorragia dopo aborto . . . . .	157 in p.	—	26	26
Altri accidenti della gravidanza (non comprese le emorragie) . . . . .	143	Altre anomalie della gravidanza . . . . .	156 <sup>e</sup> in p.	—	3	3
Emorragia puerperale (144)						
a) da placenta previa . . . . .	144 <sup>a</sup>	Emorragia puerperale da placenta previa . . . . .	157 in p.	—	226	226
b) altre emorragie . . . . .	144 <sup>b</sup>	Altre emorragie puerperali . . . . .	157 in p.	—	320	320
Setticemia e infezioni puerperali (non specificate come conseguenza d'aborto) (145)						
a) setticemia e piemia puerperali . . . . .	145 <sup>a</sup>	Setticemia e piemia puerperali « non specificate come conseguenza d'aborto » . . . . .	160 in p.	—	771	771
		Pelvi e metropertitonite puerperali . . . . .	161	—	164	164
b) tetano puerperale . . . . .	145 <sup>b</sup>	Tetano puerperale « non specificato come conseguenza d'aborto » . . . . .	160 in p.	—	7	7
Altre forme di tossiemia della gravidanza . . . . .	147	Altre forme di tossiemia della gravidanza « vomiti incoercibili, corea gravidica » . . . . .	156 <sup>e</sup> in p.	—	2	2

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Phlegmasia alba dolens, embolia o morte improvvisa puerperale (non specificata come settica) (148)						
a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . .	148 <sup>a</sup>	Phlegmasia alba dolens e trombosi « non specificata come settica » puerperali	162 in p.	—	15	15
b) embolia o morte improvvisa . . . . .	148 <sup>b</sup>	Embolia o morte improvvisa « non specificata come settica » puerperali . . . . .	162 in p.	—	148	148
Altre malattie non definite o condizioni non specificate del puerperio. . . . .	150	Conseguenze del parto . . . . .	163	—	5	5
		Mastite puerperale . . . . .	164	—	12	12
<b>XII.</b>						
<b>Malattie della pelle e del tessuto cellulare.</b>						
Flemmone, ascesso caldo . . . . .	152	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	165	872	623	1495
Altre malattie della pelle, dei suoi annessi e del tessuto cellulare . . . . .	153	Mastite . . . . .	155 in p.	4	7	11
		Alopecie e scabbia . . . . .	169 in p.	4	—	4
		Penfigo, eczema . . . . .	168	82	63	145
		Altre malattie della pelle e dei suoi annessi . . . . .	170	73	49	122
<b>XIII.</b>						
<b>Malattie delle ossa e degli organi della locomozione.</b>						
Osteomielite infettiva acuta . . . . .	154	Osteomielite infettiva acuta	171 in p.	377	213	590
Altre malattie delle ossa, eccettuata la tubercolosi . . . . .	155	Altre malattie delle ossa, eccettuata la tubercolosi e la osteomielite infettiva acuta . . . . .	171 in p.	107	86	193
Malattie delle articolazioni e degli altri organi della locomozione (156)		Osteoartropatie ipertrofiche . . . . .	171 in p.	1	—	1
b) altri organi della locomozione . . . . .	156 <sup>b</sup>	Psoite . . . . .	175	2	1	3
		Altre malattie delle ossa e degli organi della locomozione . . . . .	176	4	4	8
<b>XIV.</b>						
<b>Vizi di conformazione congeniti.</b>						
Vizi di conformazione congeniti (non compresi i nati morti) (157)						
a) idrocefalia . . . . .	157 <sup>a</sup>	Idrocefalia. . . . .	2 in p.	176	115	291
b) spina bifida e meningocele . . . . .	157 <sup>b</sup>	Spina bifida e meningocele	2 in p.	320	387	707

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	157 <sup>c</sup>	Malformazioni congenite del cuore « vizi di conformazione congeniti, non compresi i nati morti » . . . . .	3 in p.	479	386	865
d) mostruosità . . . . .	157 <sup>d</sup>	Mostruosità, anencefalia . . . . .	2 in p.	24	33	57
e) altri . . . . .	157 <sup>e</sup>	Vizi di conformazione congeniti « non compresi i nati morti » . . . . .	2 in p.	115	100	215
		Atresia delle narici, esofago, ano, ecc. . . . .	4	99	47	146
		Labbro leporino complicato	5	155	118	273
		Macroglossia, staffiloplastia, ecc. . . . .	123 in p.	—	—	—
<b>XV.</b>						
<b>Malattie dell'infanzia.</b>						
Debolezza congenita . . . . .	158	Debolezza congenita e atrofia . . . . .	6 in p.	8002	6917	14919
Nascita prematura (non compresi i nati morti) . . . . .	159	Nascita prematura « non compresi i nati morti » . . . . .	7 in p.	5294	4417	9711
Conseguenza del parto (non compresi i nati morti) (160)						
a) con indicazione di operazione cesarea . . . . .	160 <sup>a</sup>	Apoplessia e emorragia cerebrale, con indicazione di operazione cesarea . . . . .	1 in p.	1	4	5
		Conseguenza del parto « non compresi i nati morti », con indicazione di operazione cesarea . . . . .	7 in p.	15	9	24
b) senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	160 <sup>b</sup>	Apoplessia e emorragia cerebrale, senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	1 in p.	23	12	35
		Conseguenza del parto « non compresi i nati morti », senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	7 in p.	233	154	387
Altre malattie speciali della infanzia (161)						
a) atelectasia . . . . .	161 <sup>a</sup>	Atelectasia « altre malattie speciali dell'infanzia » . . . . .	8 in p.	225	139	364
b) ittero dei neonati . . . . .	161 <sup>b</sup>	Ittero dei neonati « malattie speciali dell'infanzia » . . . . .	6 in p.	512	283	795
		Asfissia dei neonati . . . . .	1 in p.	954	738	1692
		Cianosi. . . . .	3 in p.	32	22	54
c) sclerema e altre . . . . .	161 <sup>c</sup>	Sclerema, atrepsia. . . . .	6 in p.	251	192	443
		Emorragia ombelicale, onfalite e pemfigo . . . . .	8 in p.	308	272	580
<b>XVI.</b>						
<b>Senilità.</b>						
Senilità (162)						
a) con demenza senile . . . . .	162 <sup>a</sup>	Senilità con demenza senile	62 in p.	448	338	786
b) senza demenza senile . . . . .	162 <sup>b</sup>	Senilità senza demenza senile . . . . .	62 in p.	18185	22264	40449

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I. — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA MOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
<b>XVII.</b>						
<b>Morti violente e accidentali.</b>						
Infanticidio (fanciulli al di sotto d'un anno) (172)						
a) subito dopo la nascita	172 <sup>a</sup>	Infanticidio subito dopo la nascita « al di sotto di 1 anno » . . . . .	201 in p.	19	24	43
b) altri, prima d'un anno.	172 <sup>b</sup>	Altri infanticidi prima di 1 anno . . . . .	201 in p.	6	8	14
Omicidi con altri mezzi su persone di un anno e più.	175	Omicidi con altri mezzi . . . . .	200 <sup>c</sup>	155	63	218
		Duello . . . . .	202	—	—	—
Avvelenamenti da alimenti guasti . . . . .	177	Morti in conflitto con la forza pubblica . . . . .	204	8	—	8
		Intossicazione da ptomaine	82 in p.	—	2	2
		Avvelenamento con sostanze alimentari guaste . . . . .	197	27	16	43
Assorbimento di gas tossici	178	Assorbimento di gas tossici	195	126	36	162
		Assorbimento acid. di gas tossici derivanti da macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.	—	—	—
Altri avvelenam. accidentali acuti, eccett. quelli da gas.	179	Anafilassi, accidenti da siero, colera stibiato . . . . .	82 in p.	—	1	1
		Altri avvelenamenti acuti	198	81	61	142
Per ustioni accidentali (diverse da quelle per incendio)	181	Per ustioni accident. « diverse da quelle per incendio » . . . . .	192	920	1106	2026
		Per ustioni accidentali « escluse le morti negli incendi » derivanti da macchine agricole o industriali	189 in p.	1	—	1
Per trauma accidentale da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra)	184	Per trauma accidentale da arma da fuoco « escluse le ferite di guerra » . . . . .	187 in p.	220	23	243
		Per trauma accidentale da arma da punta o da taglio « escluse le ferite di guerra »	188	27	6	33
Per trauma accidentale da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra).	185	Ferite accidentali con arma da punta o da taglio, causate da macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.	1	—	1
		Morti violente accidentali per schiacciamento. . . . .	190	2991	613	3604
Per lesioni accidentali da caduta, schiacciamento, frana . . . . .	186	Morti violente accidentali per caduta . . . . .	186	3197	969	4166
		Traumatismi accidentali; per caduta, schiacciamento dovuto a macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.	53	6	59
Per cataclisma (tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura) . . . . .	187	Per cataclisma « tutte le morti attribuite a un cataclisma, qualunque sia la sua natura » . . . . .	199 in p.	—	—	—
		Terremoto . . . . .	220	—	—	—

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

Segue: ALLEGATO I — Voci della nuova nomenclatura non comparabili con quelle della vecchia nomenclatura e cifre assolute dei morti nel 1931 (\*).

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA		MORTI NEL 1931		
Voci	Numeri	Voci	Numeri	M	F	Totale
Per fame o sete . . . . .	189	Inanizione dei neonati . . . . .	6 <sup>a</sup>	—	—	—
		Per fame o sete . . . . .	183	—	—	—
Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . . .	193	Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . . .	185 <sup>b</sup>	210	15	225
Per altri accidenti (194)		Altri accidenti dovuti a correnti elettriche, derivanti da macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.	—	—	—
		Mancanza di assistenza « neonati » . . . . .	9	—	—	—
		Fratture senz'altre indicazioni . . . . .	207	4	3	7
b) altri . . . . .	194 <sup>b</sup>	Per cause diverse . . . . .	199 in p.	49	13	62
		Per mine e scoppi di esplosivi . . . . .	187 in p.	138	8	146
		Altre cause accidentali dovute a macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.	39	4	43
Morte violenta, di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta . . . . .	195	Morte violenta, di cui la natura « accidente, omicidio, suicidio » è sconosciuta.	209	57	19	76
		Per cause non determinate	199 in p.	43	13	56
		Morti violente dovute a macchine agricole o industriali, la cui causa « accidentale, omicidio, suicidio » è sconosciuta . . . . .	189 in p.	—	—	—
XVIII.						
<b>Cause di morte non determinate</b>						
Cause non specificate o maldefinite . . . . .	200	Febbre « senz'altra indicazione », piressia, iperpiressia, febbre algida, febbre astenica, febbre catarrale, febbre colliquativa . . . . .	53 in p.	—	1	1
		Cachessia, esaurimento, debolezza, astenia, adinamia degli adulti . . . . .	82 in p.	5	4	9
		Imbarazzo gastrico, febbre gastrica . . . . .	126 in p.	10	6	16
		Cause non specificate o maldefinite . . . . .	0	289	283	572

(\*) Veggasi la nota (\*) a pag. 133\*.

**ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura  
e quelle della vecchia nomenclatura.**

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
<b>I.</b>			
<b>Malattie infettive e parassitarie.</b>			
Febbre tifoidea (tifo addominale) . . . . .	1	Febbre tifoidea (tifo addominale) . . . . .	14 <sup>a</sup>
Paratifo . . . . .	2	Paratifo . . . . .	14 <sup>b</sup>
Tifo petecchiale . . . . .	3	Tifo petecchiale . . . . .	15
Febbre ricorrente . . . . .	4	Febbre ricorrente . . . . .	16
Febbre ondulante . . . . .	5	Febbre ondulante . . . . .	17
Vaiolo (6)			
a) vaiolo . . . . .	6 <sup>a</sup>	Vaiolo . . . . .	10 in p.
b) vaioloide, alastrim . . . . .	6 <sup>b</sup>	Vaioloide . . . . .	10 in p.
c) non specificato . . . . .	6 <sup>c</sup>	Alastrim . . . . .	34 in p.
Morbillo . . . . .	7	Non specificato « Vaiolo » . . . . .	10 in p.
Scarlattina . . . . .	8	Morbillo . . . . .	11
Tosse convulsa . . . . .	9	Scarlattina . . . . .	12
Difterite . . . . .	10	Tosse convulsa . . . . .	21
		Difterite . . . . .	20
Influenza (11)			
a) con complicazioni respiratorie indicate . . . . .	11 <sup>a</sup>	Influenza con complicazioni respiratorie indicate . . . . .	22 <sup>a</sup>
b) senza complicazioni respiratorie indicate . . . . .	11 <sup>b</sup>	Influenza senza complicazioni respiratorie indicate . . . . .	22 <sup>b</sup>
Colera . . . . .	12	Colera . . . . .	24
Dissenteria (13)			
a) amebica . . . . .	13 <sup>a</sup>	Dissenteria amebica . . . . .	26 <sup>a</sup>
b) bacillare . . . . .	13 <sup>b</sup>	Dissenteria bacillare . . . . .	26 <sup>b</sup>
c) non specificata o dovuta ad altre cause . . . . .	13 <sup>c</sup>	Dissenteria non specificata o dovuta ad altre cause « esclusa la dissenteria malarica » . . . . .	26 <sup>c</sup> in p.
Peste (14)			
a) bubbonica . . . . .	14 <sup>a</sup>	Peste bubbonica « escluso il bubbone climatico » . . . . .	27 <sup>a</sup> in p.
b) polmonare . . . . .	14 <sup>b</sup>	Peste polmonare . . . . .	27 <sup>b</sup>
c) setticemica . . . . .	14 <sup>c</sup>	Peste setticemica . . . . .	27 <sup>c</sup>
d) non specificata . . . . .	14 <sup>d</sup>	Peste non specificata . . . . .	27 <sup>d</sup>
Risipola . . . . .	15	Risipola . . . . .	13
Poliomielite anteriore acuta e polioencefalite acuta . . . . .	16	Poliomielite anteriore acuta e polioencefalite acuta . . . . .	32
Encefalite letargica o epidemica . . . . .	17	Encefalite letargica o epidemica . . . . .	33
Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	18	Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	19
Morva e farcino . . . . .	19	Morva e farcino . . . . .	37
Pustola maligna e carbonchio « bacillus anthracis » . . . . .	20	Pustola maligna e carbonchio « bacillus anthracis » . . . . .	36
Rabbia . . . . .	21	Rabbia . . . . .	38
Tetano . . . . .	22	Tetano . . . . .	39
Tubercolosi apparato respirat. (compresi i gangli tracheobronchiali) . . . . .	23	Tubercolosi dei gangli tracheobronchiali . . . . .	45 in p.
Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale . . . . .	24	Tubercolosi dell'apparato respiratorio . . . . .	43
		Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale . . . . .	42

Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Tubercolosi degli intestini e del peritoneo (compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali) . . . . .	25	Tubercolosi degli intestini e del peritoneo « compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali » . . . . .	44
Tubercolosi della colonna vertebrale.	26	Tubercolosi della colonna vertebrale.	49
Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni (colonna vertebr. eccettuata) . . . . .	27	Tubercolosi articolare . . . . .	47
		Tubercolosi delle ossa, esclusa la colonna vertebrale. . . . .	48
Tubercolosi della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo . . . . .	28	Tubercolosi della pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo . . . . .	46
Tubercolosi del sistema linfatico (eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali) . . . . .	29	Tubercolosi del sistema linfatico « eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali » . . . . .	45 in p.
Tubercolosi dell'apparato genito-urin.	30	Tubercolosi dell'apparato genito-urin.	49 <sup>a</sup>
Altre localizzazioni della tubercolosi.	31	Tubercolosi degli altri organi ed organi non specificati . . . . .	49 <sup>b</sup>
		Tubercolosi delle ghiandole surrenali.	69 in p.
Tubercolosi disseminata (32)			
a) acuta . . . . .	32 <sup>a</sup>	Tubercolosi disseminata acuta . . . . .	41 <sup>a</sup> in p.
b) cronica . . . . .	32 <sup>b</sup>	Tubercolosi disseminata cronica . . . . .	41 <sup>b</sup> in p.
c) non specificata . . . . .	32 <sup>c</sup>	Tubercolosi disseminata non specific.	41 <sup>a</sup> e <sup>b</sup> in p.
Lebbra . . . . .	33	Lebbra . . . . .	30
Sifilide (34)			
a) congenita . . . . .	34 <sup>a</sup>	Sifilide congenita . . . . .	50 in p.
b) acquisita . . . . .	34 <sup>b</sup>	Sifilide acquisita . . . . .	50 in p.
c) non specificata . . . . .	34 <sup>c</sup>	Sifilide non specificata . . . . .	50 in p.
Infezione gonococcica ed altre malattie veneree . . . . .	35	Ulcera molle . . . . .	51
		Infezione gonococcica . . . . .	52
Infezione purulenta e setticemia, non puerperali (36)			
a) setticemia . . . . .	36 <sup>a</sup>	Setticemia « infezione purulenta e setticemia, non puerperali » . . . . .	35 in p.
b) piemia . . . . .	36 <sup>b</sup>	Piemia « infezione purulenta e setticemia, non puerperali » . . . . .	35 in p.
c) cangrena gassosa . . . . .	36 <sup>c</sup>	Cangrena gassosa « infezione purulenta e setticemia, non puerperali » . . . . .	35 in p.
Febbre gialla . . . . .	37	Pneumococcemia . . . . .	107 <sup>a</sup> in p.
		Febbre gialla . . . . .	28
Malaria (38)			
a) febbre malarica . . . . .	38 <sup>a</sup>	Febbre malarica . . . . .	23 <sup>a</sup>
b) cachessia palustre . . . . .	38 <sup>b</sup>	Dissenteria malarica . . . . .	26 <sup>c</sup> in p.
		Cachessia palustre . . . . .	23 <sup>b</sup>
		Morbo di Weil « spirochetosi ittero-emorragica » . . . . .	29
Altre malattie dovute a protozoi parassiti. . . . .	39	Tripanosomiasi . . . . .	53 in p.
		Coccidiosi . . . . .	139 <sup>d</sup>
		Spirochetosi broncopulmonare . . . . .	112 in p.
		Altre mal. dovute a protozoi parassiti	34 in p.
Anchilostomiasi . . . . .	40	Anchilostomiasi . . . . .	140
Cisti idatica (41)			
a) del fegato . . . . .	41 <sup>a</sup>	Cisti idatica del fegato . . . . .	131
b) altre localizzazioni . . . . .	41 <sup>b</sup>	Cisti idatica « altre localizzazioni » . . . . .	138



Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Altre malattie dovute a elminti . . .	42	Cestodi, escluso l'echinococco . . . . .	139 <sup>a</sup>
		Trematodi . . . . .	139 <sup>b</sup>
		Nematodi, escluso l'anchilostoma . . . . .	139 <sup>c</sup>
		Parassita non specificato . . . . .	139 <sup>f</sup>
		Chiluria « ematuria dei paesi caldi bilharziosi » . . . . .	146 <sup>e</sup>
		Elefantiasi degli Arabi . . . . .	166 <sup>a</sup>
Micosi . . . . .	43	Micosi . . . . .	40
		Tigne . . . . .	169 in p.
		Varicella . . . . .	34 in p.
Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	44	Infezione vaccinica . . . . .	35 in p.
		Bubbone climatico . . . . .	27 <sup>a</sup> in p.
		Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	53 in p.
		Febbre miliare . . . . .	18
		Orecchioni . . . . .	31
		Altri parassiti . . . . .	139 <sup>e</sup>
II.			
<b>Tumori (neoplasie).</b>			
Tumori maligni della cavità boccale e della faringe . . . . .	45	Cancro della cavità boccale . . . . .	74
		Tumori maligni della faringe . . . . .	75 in p.
Tumori maligni del tubo digerente e del peritoneo (46)			
a) esofago . . . . .	46 <sup>a</sup>	Tumori maligni dell'esofago . . . . .	75 in p.
b) stomaco e duodeno . . . . .	46 <sup>b</sup>	Tumori maligni dello stomaco . . . . .	75 in p.
c) retto . . . . .	46 <sup>c</sup>	Tumori maligni del duodeno . . . . .	76 in p.
d) fegato e vie biliari . . . . .	46 <sup>d</sup>	Tumori maligni del retto . . . . .	76 in p.
e) pancreas . . . . .	46 <sup>e</sup>	Tumori maligni del fegato e vie biliari . . . . .	75 in p.
f) peritoneo . . . . .	46 <sup>f</sup>	Tumori maligni del pancreas . . . . .	80 in p.
g) altri organi . . . . .	46 <sup>g</sup>	Tumori maligni del peritoneo . . . . .	76 in p.
		Tumori maligni degli altri organi . . . . .	80 in p.
Tumori maligni dell'apparato respiratorio . . . . .	47	Cancro del colon, dell'intestino « escluso retto e duodeno » . . . . .	76 in p.
		Tumori maligni dell'apparato respiratorio . . . . .	80 in p.
Tumori maligni dell'utero . . . . .	48	Tumori maligni dell'utero . . . . .	71 in p.
Tumori maligni degli altri organi genitali della donna . . . . .	49	Tumori maligni degli altri organi genitali della donna . . . . .	71 in p.
Tumori maligni delle mammelle . . . . .	50	Tumori maligni delle mammelle . . . . .	72
Tumori maligni degli organi genito-urinari dell'uomo . . . . .	51	Tumori maligni degli organi genito-urinari dell'uomo . . . . .	73 in p.
		Tumori maligni dello scroto . . . . .	79 in p.
		Cancro rene dell'uomo . . . . .	80 in p.
Tumori maligni della pelle . . . . .	52	Tumori maligni della pelle . . . . .	79 in p.
		Tumori maligni sarcomatosi . . . . .	70
		Tumori maligni della vescica della donna . . . . .	73 in p.
Tumori maligni di altri organi o di organi non specificati . . . . .	53	Tumori maligni delle ossa e articolazioni . . . . .	77
		Tumori maligni dei centri nervosi e organi dei sensi . . . . .	78
		Tumori maligni di altri organi o di organi non specificati . . . . .	80 in p.

Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Tumori non maligni (54)		Tumori non maligni degli organi genitali della donna . . . . .	81 in p.
a) organi genitali della donna . . . . .	54 <sup>a</sup>	Cisti ed altri tumori non maligni dell'ovaia . . . . .	151
		Tumore uterino non canceroso. . . . .	153 <sup>a</sup>
		Tumori non maligni degli altri organi « esclusi gli organi genitali della donna » . . . . .	81 in p.
		Tumori cerebrali e spinali non maligni . . . . .	90
b) altri organi . . . . .	54 <sup>b</sup>	Tumori intestinali e addominali non maligni . . . . .	136
		Tumori non maligni dell'orecchio . . . . .	101 in p.
		Tumori non maligni delle fosse nasali e del laringe . . . . .	102 <sup>a</sup> in p.
		Tumori non maligni della ghiandola pituitaria . . . . .	65 in p.
		Tumori non maligni degli organi della vista . . . . .	100 in p.
Tumori di cui il carattere maligno non è specificato (55)			
a) organi genitali della donna . . . . .	55 <sup>a</sup>	Tumori degli organi genitali della donna di cui non è specificato il carattere maligno o non maligno . . . . .	81 in p.
		Tumori degli altri organi « esclusi gli organi genitali della donna » . . . . .	81 in p.
b) altri organi . . . . .	55 <sup>b</sup>	Tumori degli organi della vista il cui carattere maligno non è specificato . . . . .	100 in p.
		Tumori della ghiandola pituitaria il cui carattere maligno non è specificato . . . . .	65 in p.
		Tumori della milza il cui carattere maligno non è specificato . . . . .	69 <sup>bis</sup> in p.
III.			
<b>Malattie reumatiche, della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali.</b>			
Reumatismo articolare acuto . . . . .	56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	172
Reumatismo cronico, osteo-artrite . . . . .	57	Reumatismo cronico, osteo-artrite . . . . .	173
Gotta . . . . .	58	Gotta . . . . .	60
Diabete mellito . . . . .	59	Diabete mellito . . . . .	61
Scorbuto (60)			
a) scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . . . .	60 <sup>a</sup>	Scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . . . .	57 in p.
b) scorbuto . . . . .	60 <sup>b</sup>	Scorbuto . . . . .	57 in p.
Berberi . . . . .	61	Berberi . . . . .	56
Pellagra . . . . .	62	Pellagra . . . . .	55
Rachitismo . . . . .	63	Rachitismo . . . . .	54 in p.
Osteomalacia . . . . .	64	Osteomalacia . . . . .	54 in p.
Malattie della ghiandola pituitaria (ipofisi) . . . . .	65	Malattie della ghiandola pituitaria « ipofisi ». . . . .	65 in p.
Malattie della ghiandola tiroide e delle ghiandole paratiroidei (66)			
a) gozzo semplice . . . . .	66 <sup>a</sup>	Gozzo semplice . . . . .	66 <sup>b</sup> in p.
b) gozzo esoftalmico . . . . .	66 <sup>b</sup>	Gozzo esoftalmico « Morbo di Flaiani Basedow » . . . . .	66 <sup>a</sup>

*Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura  
e quelle della vecchia nomenclatura.*

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
c) mixedema e cretinismo . . . . .	66 <sup>c</sup>	Mixedema e cretinismo «cachessia pachidermica, tireocele» . . . . .	66 <sup>b</sup> in p.
d) tetania . . . . .	66 <sup>d</sup>	Tetania «malattie delle ghiandole paratiroidi» . . . . .	67
e) altre . . . . .	66 <sup>e</sup>	Altre malattie della ghiandola tiroide . . . . .	66 <sup>b</sup> in p.
Malattie del timo . . . . .	67	Malattie del timo . . . . .	68
Malattie delle ghiandole o capsule surrenali (malattia d'Addison) non indicate come tubercolari . . . . .	68	Malattie delle ghiandole o capsule surrenali «malattia d'Addison» non indicate come tubercolari . . . . .	69 in p.
		Emorragie delle ghiandole surrenali . . . . .	121 in p.
		Altre malattie generali . . . . .	82 in p.
Altre malattie generali . . . . .	69	Degenerazione amiloide o grassa del fegato . . . . .	132 in p.
		Degenerazione amiloide o grassa del rene . . . . .	146 <sup>b</sup> in p.
		Degenerazione amiloide o grassa delle arterie . . . . .	113 <sup>b</sup> in p.
IV.			
<b>Malattie del sangue e degli organi ematopoietici.</b>			
Stati emorragipari (70)			
a) porpora primitiva . . . . .	70 <sup>a</sup>	Porpora primitiva . . . . .	58
b) emofilia . . . . .	70 <sup>b</sup>	Emofilia . . . . .	59
Anemie (71)			
a) anemia perniciosa progressiva . . . . .	71 <sup>a</sup>	Anemia perniciosa progressiva . . . . .	63 <sup>a</sup>
b) altre . . . . .	71 <sup>b</sup>	Altre anemie . . . . .	63 <sup>b</sup> in p.
Leucemie e aleucemie (72)			
a) leucemie vere . . . . .	72 <sup>a</sup>	Leucemie vere . . . . .	64 <sup>a</sup>
b) aleucemie . . . . .	72 <sup>b</sup>	Aleucemie . . . . .	64 <sup>b</sup> in p.
Malattie della milza . . . . .	73	Morbo di Hodgkin . . . . .	64 <sup>b</sup> in p.
		Morbo di Banti . . . . .	63 <sup>b</sup> in p.
Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .	74	Malattie della milza . . . . .	69 <sup>bis</sup> in p.
		Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .	63 <sup>b</sup> in p.
V.			
<b>Avvelenamenti cronici e intossicazioni.</b>			
Alcoolismo acuto e cronico. . . . .	75	Alcoolismo acuto . . . . .	180
		Alcoolismo cronico da alcool etilico. . . . .	177 in p.
Avvelenamenti cronici da sostanze organiche (76)			
a) professionali . . . . .	76 <sup>a</sup>	Avvelenamenti cronici da sostanze organiche «professionali» . . . . .	179 in p.
b) altri . . . . .	76 <sup>b</sup>	Avvelenamenti cronici da sostanze organiche «altri» . . . . .	179 in p.
		Alcoolismo cronico da alcool metilico . . . . .	177 in p.

Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Avvelenamenti cronici da sostanze minerali (77)			
a) professionali . . . . .	77 <sup>a</sup>	Avvelenamenti cronici da sostanze minerali « professionali » . . . . .	178 in p.
b) altri . . . . .	77 <sup>b</sup>	Avvelenamenti cronici da sostanze minerali « altri » . . . . .	178 in p.
VI.			
<b>Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi.</b>			
Encefalite (non epidemica) (78)			
a) ascesso del cervello . . . . .	78 <sup>a</sup>	Ascesso del cervello . . . . .	86 in p.
b) altre . . . . .	78 <sup>b</sup>	Altre encefaliti non epidemiche . . . . .	86 in p.
Meningite semplice . . . . .	79	Meningite semplice . . . . .	83
Atassia locomotrice progressiva . . . . .	80	Atassia locomotrice progressiva « Tabes dorsale ». . . . .	84
Altre malattie del midollo spinale . . . . .	81	Atrofia muscolare progressiva . . . . .	84 <sup>a</sup>
Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale (82)		Altre malattie del midollo spinale . . . . .	85
a) emorragia cerebrale . . . . .	82 <sup>a</sup>	Emorragia cerebrale . . . . .	87
b) embolia e trombosi cerebrale . . . . .	82 <sup>b</sup>	Embolia e trombosi cerebrale . . . . .	88
c) emiplegia ed altre paralisi senza indicazione della causa . . . . .	82 <sup>c</sup>	Rammollimento cerebrale . . . . .	91
Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	83	Emiplegia . . . . .	89 <sup>a</sup>
Demenza precoce e altre psicosi (84)		Altre paralisi . . . . .	89 <sup>b</sup>
a) demenza precoce . . . . .	84 <sup>a</sup>	Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	92
b) altre psicosi . . . . .	84 <sup>b</sup>	Demenza precoce . . . . .	93 in p.
Epilessia . . . . .	85	Altre psicosi . . . . .	93 in p.
Convulsioni nei bambini (a meno di 5 anni). . . . .	86	Epilessia . . . . .	94
Altre malattie del sistema nervoso (87)		Convulsioni nei bambini (a meno di 5 anni) . . . . .	98
a) corea . . . . .	87 <sup>a</sup>	Corea . . . . .	95
b) nevrite . . . . .	87 <sup>b</sup>	Nevrite . . . . .	96
c) paralisi agitante . . . . .	87 <sup>c</sup>	Paralisi agitante . . . . .	99 in p.
d) sclerosi a placche . . . . .	87 <sup>d</sup>	Sclerosi a placche . . . . .	99 in p.
e) altre . . . . .	87 <sup>e</sup>	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	99 in p.
Malattie degli organi della vista . . . . .	88	Eclampsia non puerperale . . . . .	97
Malattie dell'orecchio e del seno mastoideo (89)		Malattie degli organi della vista . . . . .	100 in p.
a) otite . . . . .	89 <sup>a</sup>	Otite . . . . .	101 in p.
b) altre . . . . .	89 <sup>b</sup>	Altre malattie dell'orecchio e del seno mastoideo . . . . .	101 in p.
VII.			
<b>Malattie dell'apparato circolatorio.</b>			
Pericardite . . . . .	90	Pericardite . . . . .	118
Endocardite acuta . . . . .	91	Endocardite acuta . . . . .	117 <sup>a</sup> in p.

Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari . . . . .	92	Endocardite non specificata fino a 45 anni . . . . .	117 <sup>a</sup> in p.
Malattie del miocardio (93)		Endocardite cronica, compresi i vizi valvolari, endocardite senza qualifica dopo i 45 anni . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.
a) miocardite acuta . . . . .	93 <sup>a</sup>	Miocardite acuta . . . . .	117 <sup>a</sup> in p.
b) miocardite cronica e degenerazione del miocardio . . . . .	93 <sup>b</sup>	Miocardite cronica, degenerazione del miocardio, aneurisma del cuore . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.
c) non specificate . . . . .	93 <sup>c</sup>	Miocardite non specificata fino a 45 anni . . . . .	117 <sup>a</sup> in p.
Malattie delle arterie coronarie e angina pectoris . . . . .	94	Miocardite non specificata dopo i 45 anni . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.
Altre malattie del cuore (95)		Malattie delle arterie coronarie . . . . .	113 <sup>e</sup> in p.
a) malattie funzionali del cuore . . . . .	95 <sup>a</sup>	Angina pectoris . . . . .	119
b) altre e non specificate . . . . .	95 <sup>b</sup>	Morbo di Adams - Stokes . . . . .	113 <sup>e</sup> in p.
Aneurisma, eccettuato l'aneurisma del cuore . . . . .	96	Malattie funzionali del cuore . . . . .	122 in p.
Arteriosclerosi, eccettuate le malattie delle arterie coronarie . . . . .	97	Altre malattie del cuore e non specificate: asma cardiaco, pancardite, cardiopatia, cardiectasia, lesione cardiaca, cardiostenosi, insufficienza cardiaca, rottura cuore, idropsia, anasarca, ascite, edema generalizzato, cianosi, collasso, edema estremità . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.
Cangrena (98)		Aneurisma, eccettuato l'aneurisma del cuore . . . . .	113 <sup>a</sup>
a) senile . . . . .	98 <sup>a</sup>	Arteriosclerosi, eccettuate le malattie delle arterie coronarie . . . . .	113 <sup>b</sup> in p.
b) altre . . . . .	98 <sup>b</sup>	Cangrena senile . . . . .	166 in p.
Altre malattie delle arterie . . . . .	99	Altre cangrene . . . . .	166 in p.
Malattie delle vene: varici, emorroidi, flebite, ecc. . . . .	100	Altre malattie delle arterie . . . . .	113 <sup>e</sup> in p.
Malattie del sistema linfatico, linfangioite, ecc. . . . .	101	Embolia e trombosi non puerperali . . . . .	114 in p.
Anomalie idiopatiche della pressione sanguigna . . . . .	102	Phlegmasia alba dolens non puerperale . . . . .	114 in p.
Altre malattie dell'appar. circolatorio.	103	Malattie delle vene . . . . .	115
		Malattie del sistema linfatico, linfangioite, ecc. . . . .	116
		Anomalie idiopatiche della pressione sanguigna . . . . .	122 in p.
		Epistassi, emorragia (senza altra indicazione), emorragia interna . . . . .	121 in p.
		Altre malattie apparato circolatorio	122 in p.
		Disturbi cardiaci, senza altra indicazione . . . . .	117 <sup>b</sup> in p.
		Malattie delle fosse nasali e annessi « esclusi i tumori non maligni » . . . . .	102 <sup>a</sup> in p.
		Malattie della laringe . . . . .	102 <sup>b</sup>
		Bronchite acuta . . . . .	103 in p.
		Bronchite cronica . . . . .	104 in p.

## VIII.

## Malattie dell'apparato respiratorio.

Malattie delle fosse nasali e annessi.

Malattie della laringe . . . . .

Bronchite (106)

a) acuta . . . . .

b) cronica . . . . .

Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
c) non specificata . . . . .	106 <sup>c</sup>	Bronchite non specificata « prima di 60 anni » . . . . .	103 in p.
Broncopolmonite, compresa la bronchite capillare . . . . .	107	Bronchite non specificata « dopo i 60 anni » . . . . .	104 in p.
Polmonite lobare . . . . .	108	Broncopolmonite, compresa la bronchite capillare . . . . .	108
Polmonite non specificata . . . . .	109	Polmonite crupale . . . . .	107 <sup>a</sup> in p.
Pleuriti . . . . .	110	Polmonite senza altre indicazioni . . . . .	107 <sup>b</sup>
Congestione, edema, embolia, infarto emorragico e trombosi del polmone.	111	Pleuriti « escluso emotorace » . . . . .	105 in p.
Asma . . . . .	112	Catarro soffocante . . . . .	104 in p.
Enfisema polmonare . . . . .	113	Congestione, edema, embolia, infarto emorragico e trombosi del polmone . . . . .	106
Altre malattie dell'apparato respiratorio, eccettuata la tubercolosi (114)		Asma da fieno . . . . .	112 in p.
a) polmonite interstiziale cronica, comprese le malattie professionali dell'apparato respiratorio. . . . .	114 <sup>a</sup>	Asma bronchiale . . . . .	110 <sup>a</sup>
b) altre, compresa la cangrena del polmone . . . . .	114 <sup>b</sup>	Enfisema polmonare . . . . .	110 <sup>b</sup>
		Polmonite interstiziale cronica, comprese le malattie professionali dell'apparato respiratorio. . . . .	109 <sup>a</sup>
		Altre malattie dell'apparato respiratorio « eccettuata la tubercolosi » . . . . .	112 in p.
		Ascesso polmonare . . . . .	112 in p.
		Malattie del mediastino . . . . .	111
		Cangrena polmonare . . . . .	109 <sup>b</sup>
		Emotorace . . . . .	105 in p.
IX.			
<b>Malattie dell'apparato digerente.</b>			
Malattie della cavità boccale, dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi . . . . .	115	Malattie della cavità boccale e degli organi annessi . . . . .	123 in p.
Malattie dell'esofago . . . . .	116	Malattie delle tonsille e della faringe « comprese le forme adenoidee » . . . . .	124 <sup>a</sup>
Ulcera dello stomaco e del duodeno (117)		Malattie dell'esofago . . . . .	124 <sup>b</sup>
a) stomaco. . . . .	117 <sup>a</sup>	Perforazione non traumatica dello stomaco . . . . .	126 in p.
b) duodeno . . . . .	117 <sup>b</sup>	Ulcera dello stomaco . . . . .	125 <sup>a</sup>
Altre malattie dello stomaco (cancro eccettuato) . . . . .	118	Ulcera del duodeno . . . . .	125 <sup>b</sup>
Enteriti (al di sotto di 2 anni) . . . . .	119	Altre malattie dello stomaco, escluso il cancro . . . . .	126 in p.
		Altre malattie dello stomaco, escluso il cancro . . . . .	145 in p.
		Enteriti coleriformi al di sotto di 2 anni . . . . .	25 in p.
		Enteriti al di sotto di 2 anni. . . . .	134 <sup>a</sup>
		Enterocoliti pseudomembranose sotto i 2 anni . . . . .	142 in p.

*Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura  
e quelle della vecchia nomenclatura.*

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Enteriti e ulcera intestinale (da due anni e oltre) (120)		Enterocolite pseudomembranosa sopra i 2 anni . . . . .	142 in p.
a) enteriti . . . . .	120 <sup>a</sup>	Enteriti coleriformi ed ulcera intestinale da 2 anni e oltre . . . . .	25 in p.
b) ulcera intestinale . . . . .	120 <sup>b</sup>	Enteriti al di sopra di 2 anni . . . . .	134 <sup>b</sup>
Appendicite . . . . .	121	Ulcera intestinale « enterite » ed ulcera intestinale da 2 anni e oltre.	142 in p.
Ernia, occlusione intestinale (122)		Appendicite . . . . .	141
a) ernia . . . . .	122 <sup>a</sup>	Ernia . . . . .	137
b) occlusione intestinale . . . . .	122 <sup>b</sup>	Volvolo od occlusione intestinale . . . . .	135
Altre malattie dell'intestino. . . . .	123	Paralisi o paresi intestinale . . . . .	142 in p.
Cirrosi del fegato (124)		Altre malattie dell'intestino « enterop- tosi, costipazione, colibacillosi, ecc. »	142 in p.
a) alcoolica . . . . .	124 <sup>a</sup>	Altre malattie dell'intestino, escluso il cancro . . . . .	145 in p.
b) non indicata come alcoolica. . . . .	124 <sup>b</sup>	Cirrosi del fegato alcoolica . . . . .	127 <sup>a</sup>
Altre malattie del fegato (compresa l'atrofia gialla) . . . . .	125	Cirrosi del fegato non indicata come alcoolica . . . . .	127 <sup>b</sup>
Calcolosi biliare . . . . .	126	Altre malattie del fegato « compresa l'atrofia gialla » . . . . .	132 in p.
Altre malattie della vescichetta e delle vie biliari. . . . .	127	Atrofia gialla acuta del fegato . . . . .	128
Malattie del pancreas . . . . .	128	Ittero grave . . . . .	130
Peritonite senza causa indicata . . . . .	129	Calcoli biliari . . . . .	129
		Altre malattie della vescichetta e delle vie biliari. . . . .	132 in p.
		Malattie del pancreas . . . . .	133
		Peritonite senza causa indicata . . . . .	143
X.			
Malattie dell'apparato urinario e dell'apparato genitale.			
Nefrite acuta . . . . .	130	Nefrite acuta . . . . .	146 <sup>a</sup> in p.
Nefrite cronica . . . . .	131	Nefrite cronica . . . . .	146 <sup>b</sup> in p.
Nefrite non specificata . . . . .	132	Nefrite non specificata . . . . .	146 <sup>a-b</sup> in p.
Altre malattie dei reni, dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza) (133)			
a) pielite . . . . .	133 <sup>a</sup>	Pielite « malattie dei reni, dei bacineti e degli ureteri, non comprese le malattie dei reni da gravidanza » e pielonefrite . . . . .	146 <sup>d</sup> in p.
b) altre . . . . .	133 <sup>b</sup>	Altre « malattie dei reni, dei bacineti e degli ureteri, non comprese le malattie dei reni da gravidanza ». . . . .	146 <sup>d</sup> in p.
Calcolosi delle vie urinarie (134)			
a) calcolosi dei reni e delle vie urinarie superiori . . . . .	134 <sup>a</sup>	Calcolosi dei reni e delle vie urinarie superiori . . . . .	148 in p.
b) calcolosi della vescica . . . . .	134 <sup>b</sup>	Calcolosi della vescica « calcolosi delle vie urinarie » . . . . .	148 in p.
c) calcolosi senza altra indicazione.	134 <sup>c</sup>	Calcolosi senza altra indicazione « calcolosi delle vie urinarie » . . . . .	148 in p.

Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Malattie della vescica, esclusi i tumori (135)			
a) cistite . . . . .	135 <sup>a</sup>	Cistite . . . . .	147 in p.
b) altre . . . . .	135 <sup>b</sup>	Altre malattie della vescica . . . . .	147 in p.
		Fistola retto-vescicale . . . . .	149 <sup>b</sup> in p.
Malattie dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. (136)			
a) stenosi uretrale . . . . .	136 <sup>a</sup>	Stenosi uretrale . . . . .	149 <sup>a</sup>
b) altre . . . . .	136 <sup>b</sup>	Altre malattie dell'uretra. . . . .	149 <sup>b</sup> in p.
Malattie della prostata . . . . .	137	Malattie della prostata . . . . .	149 <sup>c</sup>
Malattie degli organi genitali dell'uomo, non indicate come veneree . . . . .	138	Malattie degli organi genitali maschili « escluse le forme veneree, tubercolari e neoplastiche maligne » . . . . .	150
Malattie degli organi genitali della donna, non indicate come veneree (139)			
a) ovaie, trombe e parametri . . . . .	139 <sup>a</sup>	Ovaie, trombe e parametri « malattie degli organi genitali della donna, non designate come veneree ». . . . .	154 in p.
		Salpingite o ascesso del bacino della donna . . . . .	152
b) utero . . . . .	139 <sup>b</sup>	Malattie dell'utero « malattie degli organi genitali della donna, non designate come veneree » . . . . .	154 in p.
		Emorragia uterina non puerperale . . . . .	153 <sup>b</sup>
c) mammelle . . . . .	139 <sup>c</sup>	Malattie delle mammelle . . . . .	155 in p.
d) altre . . . . .	139 <sup>d</sup>	Altre malattie degli organi genitali della donna, non designate come veneree . . . . .	154 in p.
XI.			
<b>Malattie della gravidanza, parto e puerperio.</b>			
Aborto con condizioni settiche . . . . .	140	Setticemia da aborto, aborto con condizioni settiche . . . . .	160 in p.
Aborto, senza indicazione di condizioni settiche, ma comprese le emorragie . . . . .	141	Aborto senza indicazione di condizioni settiche, ma comprese le emorragie . . . . .	156 <sup>a</sup>
		Emorragia antepartum « emorragia gravidica » . . . . .	156 <sup>c</sup> in p.
Gestazione ectopica . . . . .	142	Emorragia dopo aborto . . . . .	157 in p.
Altri accidenti della gravidanza (non comprese le emorragie) . . . . .	143	Gestazione ectopica . . . . .	156 <sup>b</sup>
Emorragia puerperale (144)		Altre anomalie della gravidanza . . . . .	156 <sup>c</sup> in p.
a) da placenta previa. . . . .	144 <sup>a</sup>	Emorragia puerperale da placenta previa . . . . .	157 in p.
b) altre emorragie . . . . .	144 <sup>b</sup>	Altre emorragie puerperali . . . . .	157 in p.
Setticemia e infezioni puerperali (non specificate come conseguenza d'aborto) (145)			
a) setticemia e piemia puerperali. . . . .	145 <sup>a</sup>	Setticemia e piemia puerperali « non specificate come conseguenza di aborto » . . . . .	160 in p.
		Pelvi e metroperitonite puerperali . . . . .	161



Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
b) tetano puerperale . . . . .	145 <sup>b</sup>	Tetano puerperale « non specificato come conseguenza d'aborto » . . .	160 in p.
Albuminuria e eclampsia puerperali.	146	Albuminuria ed acampsia puerperali.	159
Altre forme di tossiemia della gravidanza. . . . .	147	Altre forme di tossiemia della gravidanza « vomiti incoercibili, corea gravidica » . . . . .	156 <sup>c</sup> in p.
Phlegmasia alba dolens, embolia o morte improvvisa puerperale (non specificata come settica) (148)			
a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . .	148 <sup>a</sup>	Phlegmasia alba dolens e trombosi « non specificata come settica » puerperali . . . . .	162 in p.
b) embolia o morte improvvisa . . . . .	148 <sup>b</sup>	Embolia o morte improvvisa « non specificata come settica » puerperali . . . . .	162 in p.
Altri accidenti del parto . . . . .	149	Altri accidenti del parto . . . . .	158
Altre malattie non definite o condizioni non specificate del puerperio.	150	Conseguenze del parto . . . . .	163
		Mastite puerperale . . . . .	164
XII.			
<b>Malattie della pelle e del tessuto cellulare.</b>			
Foruncoli . . . . .	151	Foruncoli . . . . .	167
Flemmone, ascesso caldo . . . . .	152	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	165
		Mastite . . . . .	155 in p.
Altre malattie della pelle, dei suoi annessi e del tessuto cellulare . . . . .	153	Alopecie e scabbia . . . . .	169 in p.
		Penfigo, eczema . . . . .	168
		Altre malattie della pelle e dei suoi annessi . . . . .	170
XIII.			
<b>Malattie delle ossa e degli organi della locomozione.</b>			
Osteomielite infettiva acuta. . . . .	154	Osteomielite infettiva acuta . . . . .	171 in p.
Altre malattie delle ossa, eccettuata la tubercolosi . . . . .	155	Altre malattie delle ossa, eccettuata la tubercolosi e la osteomielite infettiva acuta . . . . .	171 in p.
		Osteoartropatie ipertrofiche. . . . .	171 in p.
Malattie delle articolazioni e degli altri organi della locomozione (156)			
a) articolazioni, eccettuata la tubercolosi e il reumatismo . . . . .	156 <sup>a</sup>	Malattie delle articolazioni, eccettuata la tubercolosi e il reumatismo . . . . .	174
		Psoite . . . . .	175
b) altri organi della locomozione . . . . .	156 <sup>b</sup>	Altre malattie delle ossa e degli organi della locomozione. . . . .	176
XIV.			
<b>Vizi di conformazione congeniti.</b>			
Vizi di conformazione congeniti (non compresi i nati morti) (157)			
a) idrocefalia . . . . .	157 <sup>a</sup>	Idrocefalia . . . . .	2 in p.
b) spina bifida e meningocele . . . . .	157 <sup>b</sup>	Spina bifida e meningocele. . . . .	2 in p.

Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura  
e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	157 <sup>c</sup>	Malformazioni congenite del cuore « vizi di conformazione congeniti, non compresi i nati morti » . . .	3 in p.
d) mostruosità . . . . .	157 <sup>d</sup>	Mostruosità, anencefalia . . . . .	2 in p.
e) altri . . . . .	157 <sup>e</sup>	Vizi di conformazione congeniti « non compresi i nati morti » . . . . .	2 in p.
		Atresia delle narici, esofago, ano, ecc.	4
		Labbro leporino complicato . . . . .	5
		Macroglossia, staffiloplastia, ecc. . .	123 in p.
<b>XV.</b>			
<b>Malattie dell'infanzia.</b>			
Debolezza congenita . . . . .	158	Debolezza congenita e atrofia . . .	6 in p.
Nascita prematura (non compresi i nati morti) . . . . .	159	Nascita prematura « non compresi i nati morti » . . . . .	7 in p.
Conseguenza del parto (non compresi i nati morti) (160)			
a) con indicazione di operazione cesarea . . . . .	160 <sup>a</sup>	Apoplessia e emorragia cerebrale, con indicazione di operazione cesarea .	1 in p.
		Conseguenza del parto « non compresi i nati morti », con indicazione di operazione cesarea . . . . .	7 in p.
b) senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	160 <sup>b</sup>	Apoplessia e emorragia cerebrale, senza indicazione di operazione cesarea	1 in p.
		Conseguenza del parto « non compresi i nati morti », senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	7 in p.
Altre malattie speciali della infanzia (161)			
a) atelectasia . . . . .	161 <sup>a</sup>	Atelectasia « altre malattie speciali dell'infanzia » . . . . .	8 in p.
b) ittero dei neonati . . . . .	161 <sup>b</sup>	Ittero dei neonati « malattie speciali dell'infanzia » . . . . .	6 in p.
		Asfissia dei neonati . . . . .	1 in p.
		Cianosi . . . . .	3 in p.
c) sclerema e altre . . . . .	161 <sup>c</sup>	Sclerema, atrepsia . . . . .	6 in p.
		Emorragia ombelicale, onfalite e pemfigo . . . . .	8 in p.
<b>XVI.</b>			
<b>Senilità.</b>			
Senilità (162)			
a) con demenza senile . . . . .	162 <sup>a</sup>	Senilità con demenza senile . . . . .	62 in p.
b) senza demenza senile. . . . .	162 <sup>b</sup>	Senilità senza demenza senile . . . . .	62 in p.
<b>XVII.</b>			
<b>Morti violente e accidentali.</b>			
Suicidio per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	163	Suicidio per ingestione di veleni solidi e liquidi . . . . .	216
		Suicidio per ingestione di sostanze corrosive . . . . .	217

*Segue: ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura  
e quelle della vecchia nomenclatura.*

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Suicidio da gas tossici . . . . .	164	Suicidio da gas tossici . . . . .	218
Suicidio per impiccamento o strangolamento . . . . .	165	Suicidio per impiccamento o strangolamento . . . . .	213
Suicidio per annegamento. . . . .	166	Suicidio per annegamento . . . . .	210
Suicidio con arma da fuoco . . . . .	167	Suicidio con arma da fuoco . . . . .	211
Suicidio con arma da punta o da taglio	168	Suicidio con arma da punta o taglio	212
Suicidio per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	169	Suicidio per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	214
Suicidio per schiacciamento . . . . .	170	Suicidio per schiacciamento . . . . .	215
Suicidi con altri mezzi . . . . .	171	Suicidi con altri mezzi . . . . .	219
Infanticidio (fanciulli al di sotto d'un anno) (172)			
<i>a)</i> subito dopo la nascita . . . . .	172 <sup>a</sup>	Infanticidio subito dopo la nascita « al di sotto di 1 anno » . . . . .	201 in p.
<i>b)</i> altri, prima d'un anno . . . . .	172 <sup>b</sup>	Altri infanticidi prima di 1 anno.	201 in p.
Omicidi con arma da fuoco (persona di un anno e più) . . . . .	173	Omicidi con arma da fuoco « persona di un anno e più » . . . . .	200 <sup>a</sup>
Omicidi con arma da taglio o da punta (persona di un anno e più) . . . . .	174	Omicidi con arma da taglio o da punta « da 1 anno e più » . . . . .	200 <sup>b</sup>
Omicidi con altri mezzi su persone di un anno e più . . . . .	175	Omicidi con altri mezzi . . . . .	200 <sup>c</sup>
Morsi o punture d'animali velenosi	176	Duello . . . . .	202
Avvelenamenti da alimenti guasti . . . . .	177	Morti in conflitto con la forza pubblica	204
Assorbimento di gas tossici . . . . .	178	Morsi o punture d'animali velenosi.	196
Altri avvelenamenti accidentali acuti, eccettuati quelli da gas . . . . .	179	Intossicazione da ptomaine . . . . .	82 in p.
Per incendio . . . . .	180	Avvelenamento con sostanze alimentari guaste . . . . .	197
Per ustioni accidentali (diverse da quelle per incendio) . . . . .	181	Assorbimento di gas tossici . . . . .	195
Per soffocazione meccanica accidentale	182	Assorbimento accidentale di gas tossici derivanti da macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.
Per annegamento accidentale . . . . .	183	Anafilassi, accidenti da siero, colera stibiato . . . . .	82 in p.
Per trauma accidentale da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra)	184	Altri avvelenamenti acuti . . . . .	198
Per trauma accidentale da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra) . . . . .	185	Per incendio . . . . .	193
		Per ustioni accidentali « diverse da quelle per incendio » . . . . .	192
		Per ustioni accidentali « escluse le morti negli incendi » derivanti da macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.
		Per soffocazione meccanica accidentale	194
		Per annegamento accidentale . . . . .	181
		Per trauma accidentale da arma da fuoco « escluse le ferite di guerra » . . . . .	187 in p.
		Per trauma accidentale da arma da punta o da taglio « escluse le ferite di guerra » . . . . .	188
		Ferite accidentali con arma da punta o da taglio, causate da macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.

*Segue:* ALLEGATO II. — Confronto fra le voci della nuova nomenclatura e quelle della vecchia nomenclatura.

NUOVA NOMENCLATURA		VECCHIA NOMENCLATURA	
Voci	Numeri	Voci	Numeri
Per lesioni accidentali da caduta, schiacciamento, frana . . . . .	186	Morti violente accidentali per schiacciamento . . . . .	190
		Morti violente accidentali per caduta.	186
Per cataclisma (tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura) . . . . .	187	Traumatismi accidentali; per caduta, schiacciamento dovuto a macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.
		Per cataclisma « tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura » . . . . .	199 in p.
Per violenze di animali . . . . .	188	Terremoto . . . . .	220
Per fame o sete . . . . .	189	Per violenze di animali . . . . .	191
Per freddo eccessivo . . . . .	190	Inanizione dei neonati . . . . .	6 <sup>a</sup>
Per caldo eccessivo . . . . .	191	Per fame o sete . . . . .	183
Per fulmine . . . . .	192	Per freddo eccessivo . . . . .	182
		Per caldo eccessivo . . . . .	184
Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . . .	193	Per fulmine . . . . .	185 <sup>a</sup>
		Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . . .	185 <sup>b</sup>
Per altri accidenti (194)		Altri accidenti dovuti a correnti elettriche, derivanti da macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.
a) corpi estranei . . . . .	194 <sup>a</sup>		
		Altre violenze esterne . . . . .	208
b) altri . . . . .	194 <sup>b</sup>	Mancanza di assistenza «neonati» . . . . .	9
		Fratture senz'altre indicazioni . . . . .	207
Morte violenta, di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta. . . . .	195	Per cause diverse . . . . .	199 in p.
		Per mine e scoppi di esplosivi . . . . .	187 in p.
		Altre cause accidentali dovute a macchine agricole o industriali . . . . .	189 in p.
Per ferite di guerra . . . . .	196	Morte violenta, di cui la natura « accidente, omicidio, suicidio » è sconosciuta . . . . .	209
Per esecuzione di civili da parte di armate belligeranti . . . . .	197	Per cause non determinate . . . . .	199 in p.
Per esecuzione giudiziaria . . . . .	198	Morti violente dovute a macchine agricole o industriali, la cui causa « accidentale, omicidio, suicidio », è sconosciuta . . . . .	189 in p.
		Per ferite di guerra . . . . .	203
		Per esecuzione di civili da parte di armate belligeranti . . . . .	206
		Per esecuzione giudiziaria. . . . .	205
<b>XVIII.</b>			
<b>Cause di morte non determinate.</b>			
Morte improvvisa . . . . .	199	Morte improvvisa « sincope » . . . . .	120
Cause non specificate o mal definite.	200	Febbre « senz'altra indicazione », pirolessia, iperpiressia, febbre algida, febbre astenica, febbre catarrale, febbre colliquativa . . . . .	53 in p.
		Cachessia, esaurimento, debolezza, astenia, adinamia degli adulti . . . . .	82 in p.
		Imbarazzo gastrico, febbre gastrica	126 in p.
		Cause non specificate o mal definite.	0

MOD. **B** (Ediz. 1932).  
(recto)

# SCHEDA DI MORTE

## per maschio (\*)

AVVERTENZE. - La presente scheda deve corrispondere all'atto di morte formato nel Comune o ricevuto in originale a mente dell'art. 296 C. C.

Comune di .....

Provincia di .....

Numero d'ordine del Registro degli atti di morte ..... Parte ..... Serie .....

dell'Ufficio di .....

Numero d'ordine del Registro degli atti di nascita ( per i bambini nati vivi, ma morti )  
prima della denuncia di nascita ) ..... Parte .....

dell'Ufficio di .....

Data del decesso: anno ..... mese ..... giorno .....

Bollo

Firma dell'Ufficiale di stato civile

### NOTE:

- (\*) La scheda per le femmine, modello *B-bis*, è analoga a quella dei maschi ed è stampata in inchiostro rosso.
- (a) Rispondere *sì* o *no* a seconda del caso.
- (b) Si indichi chiaramente il *mezzo* o *modo* con cui fu procurata la morte violenta, ad es.: *arma da fuoco, caduta, investimento da treno, impiccamento, avvelenamento da....* ecc.
- In caso di avvelenamento, indicare il veleno usato, es.: *per avvelenamento da sublimato corrosivo, da acido fenico*, ecc.
- (c) Indicare chiaramente la *professione* o la *condizione*, servendosi delle voci contenute nella « Nomenclatura professionale ».
- (d) Aggiungere il numero corrispondente della « Nomenclatura professionale », tenendo presente che la stessa voce deve essere indicata con un numero diverso a seconda della diversa posizione occupata nella professione, per esempio: *Macellaio* (venditore di carni macellate) = 3/01/0/01; *Macellaio* (operaio addetto alla mattazione) = 4/03/1/01; *Fornaio* (venditore di pane) = 3/01/0/01; *Fornaio* (operaio addetto alla fabbricazione del pane) = 4/03/3/03; *Cappellaio* (venditore di cappelli) = 3/01/0/10; *Cappellaio* (operaio addetto alla fabbricazione dei cappelli) = 4/09/2/02; ecc.

**N.B.** - Si avverte che fra la presente scheda e quella del 1931, non vi sono sostanziali modificazioni.

NOTA. - I quadratini  o i numeri che li seggono debbono essere lasciati scoperti da scrittura; essi servono solo per le elaborazioni che l'Istituto Centrale di Statistica compie sulle schede.

Notizie fornite dal Medico.

<b>Cognome e nome</b>	.....			
<b>Luogo dove avvenne il decesso</b>	<input type="checkbox"/> 1 a domicilio, Via ..... N.			
	<input type="checkbox"/> 2 all'ospedale o Istituto di cura (denominazione) .....			
	<input type="checkbox"/> 3 in altro luogo (indicare quale) .....			
<b>Dichiaro che la causa della morte del soprannominato, secondo la mia scienza e coscienza, fu la sottoindicata:</b>				
<b>Cause della morte e circostanze in cui essa avvenne</b>	<input type="checkbox"/> 1	Morte naturale	malattia iniziale .....	
			successioni morbose o complicanze .....	
			malattia terminale .....	
	<input type="checkbox"/> 2	Morte da causa violenta	Specie della morte	accidentale (a) .....
	<input type="checkbox"/> 3			suicidio (a) .....
	<input type="checkbox"/> 4			omicidio (a) .....
	<input type="checkbox"/> 5	Morte da causa violenta	mezzo o modo col quale la morte fu procurata o avvenne	(b) .....
<input type="checkbox"/> 6	Relazione fra infortunio e professione		Se la morte violenta è avvenuta per infortunio, dire se questo può considerarsi come avvenuto sul lavoro (a) .....	
<input type="checkbox"/> 7	Morte sopravvenuta dopo atto operativo	Malattia o lesione che ha causato l'intervento chirurgico .....		
		operazione praticata .....		
<b>Allattamento (per i bambini morti in età inferiore a 1 anno)</b>	<input type="checkbox"/> 1	Notizie sull'allattamento	fu allattato al seno? (a) .....	
	<input type="checkbox"/> 2		per quanto tempo? mesi ..... giorni .....	
	<input type="checkbox"/> 3		l'allattamento al seno fu materno? (a) .....	
	<input type="checkbox"/> 4		l'allattamento fu fatto esclusivamente al seno? (a) .....	
	<input type="checkbox"/> 5		In caso di allattamento in parte artificiale, a quale età cominciò l'allattamento artificiale? mesi .....	
	<input type="checkbox"/> 6		giorni .....	
<b>Firma e qualifica del Medico</b> .....				

NOTA. - I quadratini  e i numeri che li seguono debbono essere lasciati scoperti da scrittura: essi servono solo per le elaborazioni che l'Istituto Centrale di Statistica compie sulle schede.

Notizie fornite dall'Ufficiale di stato civile.

<b>Luogo di nascita</b>	Comune di .....	
	Provincia di .....	
<b>Data di nascita</b>	<input type="checkbox"/> 1	{ Anno ..... mese ..... giorno .....
	<input type="checkbox"/> 2	
<b>Età</b>	giorni compiuti ..... per bambini che non superano un mese.	
	mesi compiuti ..... per bambini che non superano i 12 mesi.	
	anni compiuti ..... per tutti gli altri (da 90 anni in su, allegare il Mod. V).	
<b>Filiazione per i bambini morti fino a 5 anni compiuti</b>	<input type="checkbox"/> 1	Legittimo (a) .....
	<input type="checkbox"/> 2	Illegittimo riconosciuto (a) .....
	<input type="checkbox"/> 3	Illegittimo non riconosciuto (a) .....
<b>Stato civile</b>	<input type="checkbox"/> 1	Celibe (a) .....
	<input type="checkbox"/> 2	Coniugato (a) .....
	<input type="checkbox"/> 3	Vedovo (a) ..... { aveva figli legittimi, legittimati o riconosciuti minorenni (a) .....
	<input type="checkbox"/> 4	
<b>Professione o condizione del defunto o del Capo famiglia</b>	Il defunto era Capo famiglia? (a) .....	
	Ultima professione esercitata dal defunto (c) .....	
	Numero della nomenclatura professionale (d) .....	
	Professione del Capo famiglia (se il defunto non era il Capo) (c) .....	
	Numero della nomenclatura professionale (d) .....	
<b>Dimora del defunto</b>	<input type="checkbox"/> 1	Aveva dimora stabile nel Comune? (a) .....
	<input type="checkbox"/> 2	Aveva dimora occasionale? (a) .....

(Vedi note nel recto)



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA

---

STATISTICA  
DELLE CAUSE DI MORTE  
NEGLI ANNI 1931 E 1932

PARTE II — TAVOLE



ROMA  
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA  
Via Emilio Morosini, 17

1934 - Anno XIII





# Statistica delle "Cause di Morte",

## Notizie non pubblicate ed esistenti presso l'Istituto Centrale di Statistica (\*)

*Le notizie non pubblicate sono elencate nel prospetto in carattere neretto.*  
*Nella colonna 3 sono indicate le Circostrizioni territoriali alle quali i dati si riferiscono. Per rendere più agevole la ricerca delle Circostrizioni territoriali, queste sono state contraddistinte con un numero progressivo secondo l'ordine indicato qui di seguito.*  
*Il numero delle Circostrizioni territoriali per le quali non sono state pubblicate le notizie disponibili, è stampato in neretto.*

### Numero d'ordine delle Circostrizioni territoriali

- |  |  |
|--|--|
| <p>1 — Singoli Comuni.<br/>                 2 — Capiluoghi di Provincia.<br/>                 3 — Complesso dei Comuni della Provincia (escluso il Capoluogo di Provincia).<br/>                 4 — Complesso dei Comuni della Provincia esclusi i Capiluoghi di Provincia, gli ex Capiluoghi di Circondario e Comuni non Capiluoghi con oltre 30.000 ab. al censimento 1931.<br/>                 5 — Provincia.<br/>                 6 — Complesso dei Capiluoghi di Provincia del Compartimento.<br/>                 7 — Complesso dei Comuni del Compartimento esclusi i Capiluoghi di Provincia.<br/>                 8 — Singoli Comuni ex Capiluoghi di Circondario.<br/>                 9 — Singoli Comuni non Capiluoghi con oltre 30.000 ab. al censimento 1931.<br/>                 10 — Complesso dei Comuni Capiluoghi di Prov. ex Capiluoghi di Circ. e Comuni non Capiluoghi con oltre 30.000 ab. al censimento 1931.</p> | <p>11 — Complesso dei Comuni del Compartimento (esclusi i Comuni indicati al N. 10).<br/>                 12 — Compartimento.<br/>                 13 — Complesso dei 92 Comuni Capiluoghi di Provincia.<br/>                 14 — Complesso di tutti i Comuni ex Capiluoghi di Circondario.<br/>                 15 — Complesso di tutti i Comuni non Capiluoghi con oltre 30.000 ab. al censimento 1931.<br/>                 16 — Complesso di tutti i Comuni Capiluoghi di Provincia, ex Capiluoghi di Circondario e Comuni non Capiluoghi con oltre 30.000 abitanti al censimento 1931.<br/>                 17 — Complesso dei Comuni del Regno (esclusi i Comuni indicati al N. 16).<br/>                 18 — Complesso dei Comuni del Regno (esclusi i Capiluoghi di Provincia).<br/>                 19 — Regno.<br/>                 20 — Singoli Comuni con oltre 100.000 abitanti.<br/>                 21 — Ripartizione geografica.</p> |
|--|--|

**AVVERTENZA** — Le notizie pubblicate si riferiscono a tutti i dati contenuti nelle tavole.

1		2	3	
N. Tavole		TAVOLE	Circostrizioni pubblicate e non pubblicate	
1931	1932	Notizie disponibili non pubblicate		
IV	—	<b>A - Morti durante l'anno 1931, classificati secondo 264 cause di morte con distinzione di sesso</b>	5	
		<b>B - Morti durante l'anno 1931, classificati secondo 264 cause di morte con distinzione di sesso</b>	12	19
V	—	Morti durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso (nom. intermedia)	12	19
VI	I	<b>A - Morti durante l'anno 1931 (1932), distinti secondo 200 cause di morte con distinzione di sesso</b>	5	
VII	II	Individui che morirono nel 1931 (1932), nel Comune ove avevano dimora stabile od occasionale, distinti per cause (nom. intermedia) in ciascun Compartimento e nel Regno	12	19
		<b>con distinzione di sesso</b>	2 4 5	8 9
VIII	III	Morti nell'anno 1931 (1932), classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia) nel complesso dei Comuni Capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno	6 7	13 13
		<b>con distinzione di sesso</b>	6	13
IX	IV	Morti durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo alcune cause di morte (26 voci) e il mese in cui avvenne il decesso nei Compartimenti e nel Regno	12	19
		<b>con distinzione di sesso (nom. intermedia)</b>	12	19
X	V	Morti durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo le cause di morte, (nom. intermedia), l'età e il sesso	12	19
XI	VI	Bambini morti nel 1° anno di vita, durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia), l'età e la filiazione	12	19
		<b>con distinzione di sesso</b>	12	19
XII	VII	Bambini morti nella 1ª settimana di vita, durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia), l'età ed il sesso	12	19
XIII	VIII	Morti durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia) con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno	12	19
		<b>con distinzione di sesso</b>	12	19
XIV	IX	Morti durante l'anno 1931 (1932), in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia), la professione o condizione e il sesso	12	19

(\*) **AVVERTENZA** — L'Istituto Centrale di Statistica fornisce, dietro richiesta, le notizie non pubblicate contro il semplice rimborso delle spese vive: di copiatura, di collazionatura, di eventuale elaborazione e di posta.

I		2		
N. Tavole		T A V O L E		Circoscrizioni pubblicate e non pubblicate
1931	1932	Notizie disponibili non pubblicate		
XV	X	Nubili morte durante l'anno 1931 (1932), in età da 15 a 39 anni, non aventi una condizione o professione specificata, classificate secondo le cause di morte (nom. intermedia) e la professione o condizione del capo famiglia . . . . .	12	19
XVI	XI	Morti a meno di 15 anni, durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione del capo famiglia ed il sesso . . . . .	12	19
XVII	XII	Morti durante l'anno 1931 (1932), in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia), lo Stato Civile ed il sesso . . . . .	12	19
XVIII	XIII	A - Morti durante l'anno 1931 (1932), nei Comuni Capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia) . . . . .	2	13
		con distinzione di sesso . . . . .	2	
XIX	XIV	Morti durante l'anno 1931 (1932), per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, l'età ed il sesso . . . . .	12	19
XX	XV	Morti durante l'anno 1931 (1932), per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, il mese in cui avvenne la morte ed il sesso . . . . .	12	19
XXI	XVI	Morti durante l'anno 1931 (1932), per causa accidentale, in età da 15 anni in poi, classificati secondo la professione o condizione, la specie dell'infortunio ed il sesso . . . . .	12	19
XXIII	XVIII	Morti per suicidio, durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo l'età, i mezzi o modi di uccisione ed il sesso . . . . .	12	19
XXIV	XIX	Morti per suicidio, durante l'anno 1931 (1932), classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo Stato Civile ed il sesso . . . . .	12	19
		per le singole specie dell'infortunio e per stato civile . . . . .	12	
XXV	XX	Morti durante l'anno 1931 (1932), in età da 15 anni in poi, per suicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso . . . . .	12	19
XXVI	XXI	Morti durante l'anno 1931 (1932), in età da 15 anni in poi, per omicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso . . . . .	12	19

# ERRATA-CORRIGE

Pag.				
19	- Provincia di Massa e Carrara - Tubercolosi dell'intestino e peritoneo . . . . .	invece di :	26	leggesi :
20	- Provincia di Modena - Marasma senile . . . . .	"	201	"
20	- Provincia di Parma - Tumori degli org. genitali della donna . . . . .	"	30	"
37	- Provincia di Cagliari - Morti viol. accid. per caduta . . . . .	"	3	"
40	- Nota (d) - 2 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	varici	ovarici
45	- Regno maschi - Altre mal. org. genit. femmin. . . . .	"	4	—
45	- Regno maschi - Malattie non puerp. delle mammelle . . . . .	"	—	4
59	- Provincia di Vicenza - Malaria . . . . .	"	"	—
59	- Numeri dell'elenco nosologico (Tumori maligni dell'app. respiratorio) . . . . .	"	49	47
59	- Num. dell'elenco nosologico (Tum. degli altri org. genitali della donna) . . . . .	"	47	49
62-76-90	- Numeri dell'elenco nosologico (Polm., tutte le forme) . . . . .	"	107 a } 109	107 a } 109
64-78-92	- Numeri dell'elenco nosologico (Nefrite) . . . . .	"	130 a } 132	130 a } 132
75	- Numeri dell'elenco nosologico - 7 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	7	67
91	- Provincia di Sassari - Mal. art. coron. e angina pectoris . . . . .	"	1	15
95	- Provincia di Palermo - Gruppo XV . . . . .	"	660	669
117	- Numeri dell'elenco nosologico (Peritonite senza causa indicata) . . . . .	"	229	129
117	- Regno maschi - Nefrite cronica . . . . .	"	30 4	3054
170	- Cause di morte - Gruppo III. Malattie reumatiche, ecc. . . . .	"	(e)	(e)
191	- Pensionati e veterani in totale - Cancri ed altri tumori maligni . . . . .	"	161	1061
192	- Cause di morte - Mal. delle ossa e org. della locom. . . . .	"	(h)	(f)
195	- Professioni ignote - penultima riga . . . . .	"	38	28
196	- Agricoltori di ogni specie - Gruppo X . . . . .	"	122	121
196	- Cause di morte - Altre malattie dei reni, ecc. . . . .	"	(e)	(e)
196	- Agricoltori di ogni specie - Altre mal. dei reni, ecc. . . . .	"	6	5
197	- Condizioni non professionali - 6 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	79	78
197	- Condizioni non professionali - 7 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	6	5
198	- Venditori di derrate aliment., ecc. - Totale - 1 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	086	4086
213	- Comune di Bologna - 1 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	602	612
213	- Comune di Bologna - 4 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	11	21
217	- Comune di Macerata - Omicidio . . . . .	"	14	4
276	- Provincia di Forlì - Tumori a carattere maligno non specif., di altri org. . . . .	"	"	9
280	- Prov. di Piacenza - 5 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	685	635
295	- Prov. di Reggio di Calabria - Pleuriti . . . . .	"	20	29
307	- Totale Emilia - sestultima riga . . . . .	"	207	297
319	- Totale Lucania - Endocardite cronica . . . . .	"	428	429
321	- Totale Lucania - Polmon. lobare . . . . .	"	306	366
323	- Sicilia di cui F. - Gruppo XIV . . . . .	"	12	126
324	- Abruzzi e Molise di cui F. - 1 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	10	12
325	- Regno M F - penultima riga . . . . .	"	4593	4503
326	- Totale Liguria - quartultima riga . . . . .	"	1429	1497
333	- Titolo della Tavola . . . . .	"	bile	stabile
393	- Totale vendit. ambulanti, ecc. - Gruppo XI . . . . .	"	3	4
393	- " " " - Sett. e inf. puerp. . . . .	"	1	2
393	- " " " - Gruppo XVIII . . . . .	"	32	31
393	- " " " - Ultima riga . . . . .	"	32	31
393	- Totale culto cattolico - Gruppo XI . . . . .	"	1	—
393	- " " " - Sett. e inf. puerp. . . . .	"	1	—
393	- " " " - Gruppo XVIII . . . . .	"	28	29
393	- " " " - Ultima riga . . . . .	"	28	29
400	- Cause di morte - N° 140,145 dell'elenco nosol. . . . .	"	Setticemia	Setticemia
401	- Nota (e) . . . . .	"	dei reni	reni
403	- Morti a meno di 15 anni, femm. - 1 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	37330	87330
414	- Comune di Padova - Gruppo V . . . . .	"	"	7
435	- Comune di Montepulciano - Alcolismo acuto e cronico . . . . .	"	"	—
443	- Titolo della Tavola - 1 <sup>a</sup> riga . . . . .	"	1931 (a).	1931,
449	- Morti nei riman. altri Comuni del Regno - Gruppo XVI. . . . .	"	2950	29507



# INDICE

Anno 1931.

TAV.	I. — Popolazione presente censita al 21 aprile 1931 e calcolata alla metà dell'anno 1932, nelle Provincie, nei Compartimenti, nel Regno e nei Comuni capiluoghi di Provincia. . . . .	Pag.	3
»	II. — Popolazione presente censita al 21 aprile 1931 e calcolata alla metà dell'anno 1932, nei singoli Compartimenti e nel Regno, distinta per Comuni capiluoghi di Provincia ed altri Comuni . . . . .	»	4
»	III. — Popolazione presente censita al 21 aprile 1931 e calcolata alla metà dell'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario e nei Comuni non capiluoghi con almeno 30000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931 . . . . .	»	5
»	IV. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo 264 cause di morte: A) — Per Provincie . . . . .	»	8
	B) — Per Compartimenti e Regno . . . . .	»	38
»	V. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso. . . . .	»	48
»	VI. — A) Morti, durante l'anno 1931, distinti secondo 200 cause di morte, per Provincie . . . . .	»	56
	B) Morti, durante l'anno 1931, distinti secondo 200 cause di morte e il sesso, per Compartimenti e Regno . . . . .	»	98
»	VII. — Individui che morirono, nel 1931, nel Comune ove avevano dimora stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno . . . . .	»	122
»	VIII. — Morti, nell'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno . . . . .	»	134
»	IX. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno . . . . .	»	142
»	X. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso. . . . .	»	156
»	XI. — Bambini, morti nel 1° anno di vita, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione . . . . .	»	164
»	XII. — Bambini morti nella prima settimana di vita, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso . . . . .	»	168
»	XIII. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno . . . . .	»	170

TAV.	XIV. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.	Pag. 178
»	XV. — Nubili morte, durante l'anno 1931, in età da 15 a 39 anni, non aventi una condizione o professione specificata, classificate secondo le cause di morte e la professione o condizione del Capo famiglia . . . . .	» 194
»	XVI. — Morti, a meno di 15 anni, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione del Capo famiglia ed il sesso . . . . .	» 198
»	XVII. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, lo stato civile ed il sesso. . . . .	» 202
»	XVIII. — A) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte . . . . .	» 206
	B) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, classificati secondo le cause di morte . . . . .	» 222
»	XIX. — Morti, durante l'anno 1931, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, l'età ed il sesso . . . . .	» 246
»	XX. — Morti, durante l'anno 1931, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, il mese in cui avvenne la morte ed il sesso . . . . .	» 248
»	XXI. — Morti, durante l'anno 1931, per causa accidentale, in età da 15 anni in poi, classificati secondo la professione o condizione, la specie dell'infortunio ed il sesso . . . . .	» 250
»	XXII. — Morti per suicidio, durante l'anno 1931, distinti per Compartimenti, secondo il mese in cui avvenne la morte ed il sesso . . . . .	» 254
»	XXIII. — Morti per suicidio, durante l'anno 1931, classificati secondo l'età, i mezzi o modi di uccisione ed il sesso . . . . .	» 255
»	XXIV. — Morti per suicidio, durante l'anno 1931, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso. . . . .	» 256
»	XXV. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in poi, per suicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso. . . . .	» 257
»	XXVI. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in poi, per omicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso. . . . .	» 258

**Anno 1932.**

TAV.	I. — A) Morti, durante l'anno 1932, distinti secondo 200 cause di morte, per Province . . . . .	Pag. 260
	B) Morti, durante l'anno 1932, distinti secondo 200 cause di morte e il sesso, per Compartimenti e Regno . . . . .	» 302
»	II. — Individui che morirono, nel 1932, nel Comune <sup>ove</sup> avevano dimora stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno . . . . .	» 326
»	III. — Morti, nell'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno . . . . .	» 338

TAV.	IV. — Morti, durante l'anno 1932, classificati secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno . . . . .	Pag. 346
»	V. — Morti, durante l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso. . . . .	» 360
»	VI. — Bambini, morti nel 1° anno di vita, durante l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione . . . . .	» 368
»	VII. — Bambini morti nella prima settimana di vita, durante l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso . . . . .	» 372
»	VIII. — Morti, durante l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno . . . . .	» 374
»	IX. — Morti, durante l'anno 1932, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso . . . . .	» 382
»	X. — Nubili morte, durante l'anno 1932, in età da 15 a 39 anni, non aventi una condizione o professione specificata, classificate secondo le cause di morte e la professione o condizione del Capo famiglia . . . . .	» 398
»	XI. — Morti, a meno di 15 anni, durante l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione del Capo famiglia ed il sesso . . . . .	» 402
»	XII. — Morti, durante l'anno 1932, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, lo stato civile ed il sesso . . . . .	» 406
»	XIII. — A) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte. . . . .	» 410
	B) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, classificati secondo le cause di morte . . . . .	» 426
»	XIV. — Morti, durante l'anno 1932, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, l'età ed il sesso . . . . .	» 450
»	XV. — Morti, durante l'anno 1932, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, il mese in cui avvenne la morte ed il sesso . . . . .	» 452
»	XVI. — Morti, durante l'anno 1932, per causa accidentale, in età da 15 anni in poi, classificati secondo la professione o condizione, la specie dell'infortunio ed il sesso . . . . .	» 454
»	XVII. — Morti per suicidio, durante l'anno 1932, distinti per Compartimenti, secondo il mese in cui avvenne la morte ed il sesso . . . . .	» 458
»	XVIII. — Morti per suicidio, durante l'anno 1932, classificati secondo l'età, i mezzi o modi di uccisione ed il sesso . . . . .	» 459
»	XIX. — Morti per suicidio, durante l'anno 1932, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso . . . . .	» 460
»	XX. — Morti, durante l'anno 1932, in età da 15 anni in poi, per suicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso. . . . .	» 461
»	XXI. — Morti, durante l'anno 1932, in età da 15 anni in poi, per omicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso. . . . .	» 462







## AVVERTENZE

---


1) In conformità alle decisioni della IV Conferenza Internazionale per la revisione decennale delle nomenclature nosologiche per le statistiche delle cause di morte, tenuta a Parigi nell'ottobre 1929 (\*), i decessi avvenuti nell'anno 1931 sono stati classificati secondo le nomenclature nosologiche adottate in Italia dall'anno 1924 al 1930 (Tavole IV e V) e secondo le nuove nomenclature nosologiche approvate da detta Conferenza, nelle restanti tavole.

2) In tutte le tavole i numeri dell'elenco nosologico si riferiscono sempre alla nomenclatura dettagliata.

3) Nelle tavole sono omesse le voci per le quali non si verificarono casi di morte e le voci omesse sono elencate in nota alla tavola IV-A e VI-A per l'anno 1931, e tavola I-A per l'anno 1932.

---

(\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte e dizionario delle malattie* — 4<sup>a</sup> edizione — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1933-XI, pag. 55 e seguenti.



# TAVOLE

Anno 1931. (\*)

(\*) Le Tavole I, II e III riguardano anche l'anno 1932.



TAVOLA I. — Popolazione presente censita al 21 aprile 1931 e calcolata alla metà dell'anno 1932, nelle Province, nei Compartimenti, nel Regno e nei Comuni capiluoghi di Provincia.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE				PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE			
	CENSITA AL 21 APRILE 1931		CALCOLATA ALLA METÀ DELL'ANNO 1932 (a)			CENSITA AL 21 APRILE 1931		CALCOLATA ALLA METÀ DELL'ANNO 1932 (a)	
	Province	capiluoghi di Provincia	Province	capiluoghi di Provincia		Province	capiluoghi di Provincia	Province	capiluoghi di Provincia
Alessandria .....	756 068	82 567	755 467	82 904	Ancona .....	356 879	84 390	361 925	85 542
Aosta .....	226 107	20 731	225 568	20 237	Ascoli Piceno .....	288 811	36 965	291 576	36 781
Cuneo .....	619 598	36 150	618 286	35 085	Macerata .....	277 696	26 422	279 930	26 164
Novara .....	389 352	63 211	391 789	61 615	Pesaro e Urb. ....	294 360	42 549	297 789	42 814
Torino .....	1 147 149	597 260	1 154 154	605 081	<b>Marche .....</b>	<b>1 217 746</b>	<b>190 326</b>	<b>1 231 220</b>	<b>191 301</b>
Vercelli .....	359 525	39 546	361 463	38 382	Perugia .....	514 996	79 270	518 701	79 968
<b>Piemonte...</b>	<b>3 497 799</b>	<b>839 465</b>	<b>3 506 727</b>	<b>843 304</b>	Terni .....	179 078	62 741	180 806	63 396
Genova .....	831 651	608 096	838 632	615 065	<b>Umbria .....</b>	<b>694 074</b>	<b>142 011</b>	<b>699 507</b>	<b>143 364</b>
Imperia .....	162 383	28 727	165 300	29 095	Frosinone .....	413 766	16 475	420 866	16 691
La Spezia .....	221 921	107 958	225 622	112 639	Rieti .....	163 985	32 152	164 830	32 860
Savona .....	221 003	60 621	222 367	59 890	Roma .....	1 577 115	1 008 083	1 618 425	1 032 401
<b>Liguria...</b>	<b>1 436 958</b>	<b>805 402</b>	<b>1 451 921</b>	<b>816 689</b>	Viterbo .....	230 186	37 059	231 690	36 633
Bergamo .....	584 881	82 134	586 965	82 502	<b>Lazio .....</b>	<b>2 385 052</b>	<b>1 093 769</b>	<b>2 435 811</b>	<b>1 118 585</b>
Brescia .....	710 642	118 839	716 000	119 979	Aquila Abr. ....	344 466	52 457	347 385	52 039
Como .....	487 277	54 138	491 454	53 527	Campobasso .....	375 675	27 402	380 863	28 079
Cremona .....	364 842	64 002	367 764	63 498	Chieti .....	358 953	34 085	364 354	33 610
Mantova .....	397 686	42 939	401 109	41 967	Pescara .....	193 051	43 952	196 779	45 260
Milano .....	2 001 875	992 036	2 028 164	1 004 402	Teramo .....	226 414	30 667	229 908	31 094
Pavia .....	481 884	50 325	482 888	50 402	<b>Abruzzi e M. ....</b>	<b>1 498 559</b>	<b>188 563</b>	<b>1 519 289</b>	<b>190 082</b>
Sondrio .....	133 758	10 830	134 359	11 049	Avellino .....	420 843	27 445	428 871	28 305
Varese .....	382 462	42 645	384 586	43 342	Benevento .....	330 950	36 920	336 957	37 464
<b>Lombardia...</b>	<b>5 545 307</b>	<b>1 457 888</b>	<b>5 593 289</b>	<b>1 470 668</b>	Napoli .....	2 084 960	839 390	2 114 302	846 396
Bolzano .....	269 610	40 759	275 003	40 546	Salerno .....	657 973	63 084	671 570	65 636
Trento .....	390 527	56 760	389 925	56 069	<b>Campània .....</b>	<b>3 494 726</b>	<b>966 839</b>	<b>3 551 760</b>	<b>977 801</b>
<b>Venezia T. ....</b>	<b>660 137</b>	<b>97 519</b>	<b>664 928</b>	<b>96 615</b>	Bari .....	948 821	171 810	966 162	178 499
Belluno .....	210 355	25 425	211 396	24 881	Brindisi .....	242 215	39 658	245 773	40 471
Padova .....	632 160	131 066	640 180	133 327	Foggia .....	505 586	57 232	512 129	58 588
Rovigo .....	315 868	37 355	320 589	37 884	Lecce .....	487 138	46 782	496 167	46 375
Treviso .....	560 809	53 952	563 507	53 968	Taranto .....	302 833	105 946	309 382	108 134
Udine .....	718 245	66 488	717 556	63 589	<b>Puglie .....</b>	<b>2 486 593</b>	<b>421 428</b>	<b>2 529 613</b>	<b>432 067</b>
Venezia .....	594 415	260 247	604 237	262 128	Matera .....	157 022	20 243	158 798	20 637
Verona .....	503 159	153 923	507 019	152 092	Potenza .....	350 728	25 433	355 795	25 651
Vicenza .....	528 256	65 177	533 123	66 111	<b>Lucania .....</b>	<b>507 750</b>	<b>45 676</b>	<b>514 593</b>	<b>46 288</b>
<b>Veneto...</b>	<b>4 123 267</b>	<b>793 633</b>	<b>4 157 607</b>	<b>793 980</b>	Catanzaro .....	572 625	41 888	584 482	42 714
Fiume .....	106 775	52 928	108 329	52 318	Cosenza .....	545 749	36 113	556 577	36 840
Gorizia .....	205 823	49 239	206 450	49 197	Règgio di Calab. ....	550 580	122 728	560 565	124 456
Pola .....	297 520	55 559	299 438	52 440	<b>Calàbria .....</b>	<b>1 668 954</b>	<b>200 729</b>	<b>1 701 624</b>	<b>204 010</b>
Trieste .....	348 494	249 574	349 762	245 456	Agrigento .....	398 886	30 032	403 668	30 764
Zara .....	20 324	18 614	20 875	18 808	Callanissetta .....	245 575	44 067	250 231	45 636
<b>Ven. G. e Z. ....</b>	<b>978 942</b>	<b>425 914</b>	<b>984 854</b>	<b>418 219</b>	Catania .....	685 785	227 765	693 675	230 994
Bologna .....	683 032	246 280	689 413	249 453	Enna .....	225 987	22 946	226 784	23 181
Ferrara .....	366 611	115 883	370 312	116 090	Messina .....	600 092	182 508	607 569	182 004
Forlì .....	422 831	60 824	427 067	62 123	Palermo .....	843 742	389 699	854 196	392 725
Modena .....	448 429	92 757	451 633	92 977	Ragusa .....	237 910	49 694	238 451	49 984
Parma .....	373 095	71 282	375 484	71 197	Siracusa .....	284 369	50 096	287 132	51 229
Piacenza .....	290 445	65 750	292 415	64 383	Trapani .....	374 520	60 001	376 486	60 102
Ravenna .....	272 500	78 143	273 326	78 441	<b>Sicilia .....</b>	<b>3 896 866</b>	<b>1 056 808</b>	<b>3 938 192</b>	<b>1 067 219</b>
Règgio Emilia .....	360 909	91 040	362 171	90 434	Capigliari .....	476 232	101 878	485 246	104 750
<b>Emilia...</b>	<b>3 218 452</b>	<b>821 959</b>	<b>3 241 821</b>	<b>825 698</b>	Nuoro .....	207 283	9 302	210 485	9 756
Arezzo .....	301 147	56 976	302 705	57 434	Sassari .....	289 610	53 565	294 056	53 607
Firenze .....	840 287	316 286	845 976	316 799	<b>Sardegna .....</b>	<b>973 125</b>	<b>164 745</b>	<b>989 787</b>	<b>168 173</b>
Grosseto .....	176 991	23 997	179 605	25 068	<b>REGNO...</b>	<b>41 176 671</b>	<b>10 547 098</b>	<b>41 623 873</b>	<b>10 639 049</b>
Livorno .....	245 787	124 391	247 391	123 363	Cagliari .....	476 232	101 878	485 246	104 750
Lucca .....	339 091	81 807	341 998	81 703	Nuoro .....	207 283	9 302	210 485	9 756
Massa e Carrara .....	189 678	39 841	190 472	40 403	Sassari .....	289 610	53 565	294 056	53 607
Pisa .....	335 187	73 041	337 208	72 377	<b>Sardegna .....</b>	<b>973 125</b>	<b>164 745</b>	<b>989 787</b>	<b>168 173</b>
Pistoia .....	202 405	70 397	203 931	70 399	<b>REGNO...</b>	<b>41 176 671</b>	<b>10 547 098</b>	<b>41 623 873</b>	<b>10 639 049</b>
Siena .....	260 891	47 688	262 104	47 440					
<b>Toscana...</b>	<b>2 892 364</b>	<b>834 424</b>	<b>2 911 390</b>	<b>834 986</b>					

(a) Nella circoscrizione territoriale, quale era al 31 dicembre 1932, secondo le variazioni effettuate fino alla detta data.

TAVOLA II. — Popolazione presente censita al 21 aprile 1931 e calcolata alla metà dell'anno 1932, nei singoli Compartimenti e nel Regno, distinta per Comuni capiluoghi di Provincia ed altri Comuni.

COMPARTIMENTI E REGNO	POPOLAZIONE PRESENTE					
	CENSITA AL 21 APRILE 1931			CALCOLATA ALLA METÀ DELL'ANNO 1932 (a)		
	Comuni capiluoghi di Provincia	altri Comuni	in complesso	Comuni capiluoghi di Provincia	altri Comuni	in complesso
Piemonte . . . . .	839 465	2 658 334	3 497 799	843 304	2 663 423	3 506 727
Liguria . . . . .	805 402	631 556	1 436 958	816 689	635 232	1 451 921
Lombardia . . . . .	1 457 888	4 087 419	5 545 307	1 470 668	4 122 621	5 593 289
Venezia Tridentina . .	97 519	562 618	660 137	96 615	568 313	664 928
Veneto . . . . .	793 633	3 329 634	4 123 267	793 980	3 363 627	4 157 607
Venezia Giulia e Zara .	425 914	553 028	978 942	418 219	566 635	984 854
Emilia . . . . .	821 959	2 396 493	3 218 452	825 698	2 416 123	3 241 821
Toscana . . . . .	834 424	2 057 940	2 892 364	834 986	2 076 404	2 911 390
Marche . . . . .	190 326	1 027 420	1 217 746	191 301	1 039 919	1 231 220
Umbria . . . . .	142 011	552 063	694 074	143 364	556 143	699 507
Lazio . . . . .	1 093 769	1 291 283	2 385 052	1 118 585	1 317 226	2 435 811
Abruzzi e Molise . . .	188 563	1 309 996	1 498 559	190 082	1 329 207	1 519 289
Campania . . . . .	966 839	2 527 887	3 494 726	977 801	2 573 899	3 551 700
Puglie . . . . .	421 428	2 065 165	2 486 593	432 067	2 097 546	2 529 613
Lucania . . . . .	45 676	462 074	507 750	46 288	468 305	514 593
Calàbria . . . . .	200 729	1 468 225	1 668 954	204 010	1 497 614	1 701 624
Sicilia . . . . .	1 056 808	2 840 058	3 896 866	1 067 219	2 870 973	3 938 192
Sardegna . . . . .	164 745	808 380	973 125	168 173	821 614	989 787
<b>REGNO . . .</b>	<b>10 547 098</b>	<b>30 629 573</b>	<b>41 176 671</b>	<b>10 639 049</b>	<b>30 984 824</b>	<b>41 623 873</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 3.

TAVOLA III. — Popolazione presente censita al 21 aprile 1931 e calcolata alla metà dell'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario e nei Comuni non capiluoghi con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931.

C O M U N I (a)	PROVINCIE DI APPARTENENZA	POPOLAZIONE PRESENTE		C O M U N I (a)	PROVINCIE DI APPARTENENZA	POPOLAZIONE PRESENTE	
		Censita al 21-4-1931	Calcolata alla metà dell'anno 1932 (b)			Censita al 21-4-1931	Calcolata alla metà dell'anno 1932 (b)
<b>Piemonte</b>				Tolmezzo .....	Segue: Udine	6 738	6 531
Àcqui .....	Alessàndria	18 975	18 669	Chioggia .....	Venèzia	38 917	39 361
Asti .....	"	49 062	48 963	Asiago .....	Vicenza	5 874	6 014
Casale Monferrato ..	"	37 703	36 862	<b>Venèzia Giulia</b>			
Novi Ligure .....	"	21 569	21 436	Abbazia (c) .....	Fiume	9 947	9 628
Tortona .....	"	21 813	21 469	Gradisca d'Isonzo ..	Gorizia	5 209	4 810
Ivrea .....	Aosta	15 402	15 117	Idria .....	"	10 629	10 657
Alba .....	Cùneo	18 352	17 828	Capodistria .....	Pola	13 555	13 483
Mondovì .....	"	20 899	20 560	Lussinpiccolo .....	"	6 886	6 928
Saluzzo .....	"	17 690	16 982	Parenzo .....	"	12 607	12 161
Domodossola .....	Novara	10 335	10 610	Pisino .....	"	19 146	18 885
Pallanza .....	"	8 707	8 691	Postùmia .....	Trieste	6 692	6 516
Pinerolo .....	Torino	22 890	21 733	<b>Emilia</b>			
Susa .....	"	5 212	5 016	Ìmola .....	Bologna	40 030	40 245
Biella .....	Vercelli	28 210	28 993	Vergato .....	"	6 981	6 931
Varallo .....	"	8 340	8 362	Cento .....	Ferrara	22 192	22 032
<b>Ligùria</b>				Comacchio .....	"	12 609	12 830
Cbiàvari .....	Gènova	17 586	17 826	Cesena .....	Forlì	59 689	59 333
San Remo .....	Impèria	31 607	32 758	Rimini .....	"	62 638	63 699
Albenga .....	Savona	11 221	10 841	Rocca San Casciano ..	"	4 890	4 914
<b>Lombardia</b>				*Carpi .....	Mòdena	33 376	33 612
Clusone .....	Bèrgamo	5 765	5 851	Miràndola .....	"	20 863	21 303
Treviglio .....	"	19 615	19 363	Pavullo nel Frignano ..	"	15 176	15 268
Breno .....	Brèscia	5 770	5 821	Borgo Val di Tarò ..	Parma	14 723	14 897
Chiari .....	"	13 555	13 890	Fidenza .....	"	17 154	17 145
Salò .....	"	6 493	6 537	Bòbbio .....	Piacenza	6 678	6 795
Verolanuova .....	"	11 035	11 080	Faenza .....	Ravenna	47 260	46 813
Lecco .....	Como	33 827	34 418	Lugo .....	"	29 880	29 767
Casalmaggiore .....	Cremona	15 012	15 032	Guastalla .....	Règgio nell'Emil.	13 244	13 342
Crema .....	"	23 772	24 187	<b>Toscana</b>			
Abbiategrosso .....	Milano	15 845	16 066	*Cortona .....	Arezzo	30 222	30 417
Lodi .....	"	31 092	30 967	Èmpoli .....	Firenze	25 278	25 463
Monza .....	"	60 938	61 549	Prato .....	"	67 781	68 512
*Sesto S. Giovanni ..	"	31 044	32 772	Piombino .....	Livorno	26 238	26 028
Mortara .....	Pavia	10 930	10 915	Portoferràio .....	"	11 076	11 014
*Vigèvano .....	"	33 719	34 208	*Capannori .....	Lucca	39 527	39 732
Voghera .....	"	30 422	29 981	Castelnuovo di Gar-	"	5 888	5 816
*Busto Arsizio .....	Varese	39 778	40 824	fagnana .....	"	32 564	33 129
Gallarate .....	"	23 677	23 738	*Viareggio .....	Massa e Carrara	58 511	58 965
<b>Venèzia Trid.</b>				Pontremoli .....	"	14 317	14 329
Bressanone .....	Bolzano	10 576	10 375	San Miniato .....	Pisa	21 110	21 220
Merano .....	"	30 792	31 899	Volterra .....	"	19 054	19 116
Borgo .....	Trento	9 774	9 751	Montepulciano .....	Siena	16 590	16 724
Cavalese .....	"	4 486	4 463	<b>Marche</b>			
Cles .....	"	3 479	3 548	Fermo .....	Àscoli Piceno	24 754	25 006
Riva .....	"	12 926	12 202	Camerino .....	Macerata	11 834	11 995
Rovereto .....	"	20 568	20 578	*Fano .....	Pèsaro e Urbino	30 871	30 989
Tione di Trento .....	"	3 124	3 146	Urbino .....	"	20 371	20 734
<b>Vèneto</b>							
Feltre .....	Belluno	18 021	17 464				
Pieve di Cadore .....	"	3 335	3 421				
Àdria .....	Rovigo	31 025	31 323				
Cividale del Friuli ..	Ùdine	11 411	11 389				
Pordenone .....	"	22 506	22 105				

(a) I 177 Comuni considerati in questa tavola, comprendono 150 Comuni ex capiluoghi di Circondario e 27 Comuni non capiluoghi, contrassegnati con asterisco, con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931. (b) Veggasi la nota (a) a pag. 3. (c) Con R.D. 13 novembre 1931, N. 1470, i Comuni di *Volosca Abbazia* (ex capoluogo di Circondario fino a tutto il 1930), di *Apriano* e parti di territorio staccate dal Comune di *Mattuglie* sono stati riuniti in un solo Comune con la denominazione di *Abbazia*. Agli effetti della comparazione con gli anni precedenti, si è creduto opportuno di considerare fra gli ex capiluoghi di Circondario anche il suddetto Comune di *Abbazia*, poichè esso, costituito per circa 2/3 della popolazione di *Volosca Abbazia*, viene a trovarsi nelle stesse condizioni di quegli ex capiluoghi di Circondario che hanno avuto numerose variazioni nella loro circoscrizione territoriale.



Segue: TAVOLA III. — Popolazione presente censita al 21 aprile 1931 e calcolata alla metà dell'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario e nei Comuni non capiluoghi con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931.

C O M U N I (a)	PROVINCIE DI APPARTENENZA	POPOLAZIONE PRESENTE		C O M U N I (a)	PROVINCIE DI APPARTENENZA	POPOLAZIONE PRESENTE	
		Censita al 21-4-1931	Calcolata alla metà dell'anno 1932 (b)			Censita al 21-4-1931	Calcolata alla metà dell'anno 1932 (b)
<b>Umbria</b>							
*Città di Castello...	Perùgia	30 945	31 274	Gallipoli .....	Lecce	12 212	12 329
*Poligno .....	"	37 993	37 542	*Martina Franca ...	Taranto	38 202	38 598
*Gubbio .....	"	30 836	31 283	<b>Lucania</b>			
*Spoleto .....	"	32 595	32 692	Lagonegro .....	Potenza	4 788	4 912
Orvieto .....	Terni	20 352	20 424	Melfi .....	"	14 290	14 514
<b>Lazio</b>							
Sora .....	Frosinone	19 439	19 818	<b>Calàbrie</b>			
Cittaducale .....	Rieti	4 291	4 409	Crotone .....	Catanzaro	18 622	19 621
Civitavecchia .....	Roma	34 382	34 469	Nicastro .....	"	24 869	25 202
Gaeta .....	"	22 882	22 418	Vibo Valentia .....	"	15 651	15 501
Velletri .....	"	30 145	30 360	Castrovillari .....	Cosenza	11 712	11 886
<b>Abruzzi e Molise</b>							
Avezzano .....	Aquila degli Abr.	15 610	15 942	Pàola .....	"	13 623	13 543
Sulmona .....	"	21 076	21 017	Rossano .....	"	14 745	14 943
Isèrnia .....	Campobasso	16 437	16 631	Gerace Marina .....	Règgio di Calàbria	9 133	9 444
Larino .....	"	7 089	6 960	Palni .....	"	18 048	18 129
Lanciano .....	Chieti	22 439	22 829	<b>Sicilia</b>			
Vasto .....	"	16 923	17 218	Bivona .....	Agrigento	5 008	5 031
Penne .....	Pescara	11 764	11 932	Sciaccia .....	"	21 086	21 355
<b>Campania</b>							
Ariano Irpino .....	Avellino	22 855	23 350	Gela .....	Caltanissetta	30 008	30 570
Sant'Angelo de' Lom- bardi .....	"	6 499	6 590	Acireale .....	Catània	38 168	38 665
Cerreto Sannita .....	Benevento	5 103	5 163	Caltagirone .....	"	38 178	38 547
Piedimonte d'Alife .....	"	7 058	7 254	*Paternò .....	"	31 090	31 612
San Bartolomeo in Galdo .....	"	9 786	9 884	Nicosia .....	Enna	20 533	20 291
*Aversa .....	Nàpoli	35 003	35 433	Piazza Armerina .....	"	28 420	28 678
Caserta (c) .....	"	51 423	50 154	Castroreale .....	Messina	11 361	11 502
Casòria .....	"	18 278	18 646	Mistretta .....	"	10 849	10 848
Castellammare di Stà- bia .....	"	43 713	43 818	Patti .....	"	11 476	11 725
Nola .....	"	20 253	19 591	Cefalù .....	Palermo	10 610	10 520
Pozzuoli .....	"	27 144	27 673	Corleone .....	"	13 794	14 000
*Santa Maria Capua Vètere .....	"	36 637	37 149	Tèrmini Imerese .....	"	19 064	19 567
*Torre Annunziata .....	"	65 715	66 952	Mòdica .....	Ragusa	43 326	43 312
*Torre del Greco .....	"	47 947	48 939	*Vittòria .....	"	38 628	39 150
Campagna .....	Salerno	10 095	10 335	Noto .....	Siracusa	31 837	32 024
*Cava de' Tirreni .....	"	30 508	31 177	Alcamo .....	Tràpani	51 194	51 357
Sala Consilina .....	"	8 271	8 474	*Marsala .....	"	57 151	56 534
Vallo della Lucània .....	"	10 206	10 312	Mazara del Vallo .....	"	24 245	24 629
<b>Puglie</b>							
Altamura .....	Bari	28 996	29 521	*Monte San Giuliano .....	"	30 761	30 709
*Andria .....	"	53 882	55 050	<b>Sardegna</b>			
Barletta .....	"	48 335	48 659	Iglèsias .....	Càgliari	23 564	22 905
*Biscèglie .....	"	31 477	31 930	Oriстано .....	"	14 151	14 625
*Corato .....	"	44 139	44 222	Lausèi .....	Nuoro	3 935	4 034
*Molfetta .....	"	47 440	48 238	Alghero .....	Sàssari	13 781	14 150
*Trani .....	"	30 551	30 709	Ozieri .....	"	10 541	10 194
Bovino .....	Fòggia	7 858	7 932	Tèmpio Pausània .....	"	15 156	15 374
*Cerignola .....	"	38 522	38 484	<b>Complesso:</b>			
San Severo .....	"	36 259	36 882	<b>degli ex Comuni capiluoghi di Circondario .....</b>		<b>2 953 249</b>	<b>2 962 756</b>
						<b>dei Comuni non capiluoghi con almeno 30 000 abitanti presenti al 21-4-1931 .....</b>	
						<b>1 049 053</b>	<b>1 062 091</b>

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 5.

(b) Veggasi la nota (a) a pag. 3.

(c) Il Comune di Caserta, oltre ad essere ex capoluogo di Circondario, fu, fino al 31 dicembre 1926, capoluogo di Provincia.

## TAVOLA IV.

**Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo 264 cause di morte.**

*A* — Per Province.

*B* — Per Compartimenti e Regno.

TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces of Piemonte (Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli) and Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona). Rows include various medical conditions like Asfissia e apoplezia nel parto, Vizi congeniti di formazione, etc.

classificati secondo 264 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces of Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese), Venezia Tridentina (Bolzano, Trento), and Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza). Rows correspond to the same medical conditions as the first table.

(a) Durante l'anno 1931 non si verificarono nel Regno casi di morte per: inanizione dei neonati (N. 6-a dell'Elenco nosologico), mancanza di assistenza setticemica (N. 27-c), peste senza qualifica (N. 27-d), febbre gialla (N. 28), beriberi (N. 56), coccidi (N. 139-d), altri parassiti (N. 139-e), altre malattie mortali per ferite riportate in duello (N. 202), condanna alla pena capitale (N. 205), esecuzione di civili da parte di eserciti belligeranti (N. 206), mesenteriche e retroperitoneali.

(N. 9), febbre ricorrente (N. 16), colera asiatico (N. 24), enterite coleriforme (N. 25), peste bubbonica (N. 27-a), peste polmonare (N. 27-b), peste dell'apparato digerente, esclusi i tumori maligni e la tubercolosi, (N. 145), chiluria (N. 146-e), morti violente accidentali per fame o sete (N. 183), morti per terremoto (N. 220). (b) esclusi i casi ai N. 3, 4 e 5. (c) ittero e sclerema dei neonati. (d) atelectasia polmonare. (e) escluse le ghiandole



Segue: TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1931, A — Per

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE) and regions (PIEMONTE, LIGURIA) with sub-columns for provinces (Alessandria, Acosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona).

classificati secondo 264 cause di morte. Provincie.

Table with columns for cause of death and regions (LOMBARDIA, VENETIA TRIDENTINA, VENEZIO) with sub-columns for provinces (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 8. (b) compresa la bronchite capillare. (c) incluse le malattie professionali dell'apparato respiratorio. (d) esclusa

a tubercolosi. (e) flebiti, varici, trombosi, emorroidi. (f) linfangioite, adenite, ecc. (g) comprese le forme adenoidee.

Segue: TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1931, A — Per

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces of Piedmont (PIEMONTE) and Liguria (LIGURIA). Rows include various medical conditions like Cirrosi epatica, Calcoli biliari, etc.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 8. (b) esclusi i tumori maligni. (c) escluso l'echinococco del fegato. (d) comprese le nefriti senza qualifica, al disotto veneree (50, 51 e 52), tubercolari (49-a) e neoplastiche maligne (73). (h) ascesso urinoso e malattie della prostata. (i) non puerperali. (l) escluse le morti improvvise puerperali. (n) senza altra indicazione.

classificati secondo 264 cause di morte. Provincie.

Table with columns for provinces (LOMBARDIA, VENEZIA TRIDENTINA, VENEETO) and nosological numbers (NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO). Rows correspond to the same medical conditions as in the first table.

di dieci anni. (e) comprese le nefriti senza qualifica da dieci anni e più. (f) escluse le malattie dei reni da gravidanza. (g) escluse le forme veneree (50, 51 e 52), tubercolari (49-a), neoplastiche maligne (71), i tumori non maligni dell'utero (153-a) e dell'ovaia (151). (m) embolia e













Segue: TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA). Rows include various medical conditions like Pemfigo, Tigne, and Accidents (Morti viol. accidentali).

classificati secondo 264 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO) and causes of death. Rows include various medical conditions and accidents, continuing from the previous table.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 8. (b) in questa rubrica sono comprese: periostite, periostosi, osteite, osteo-periostite, osteo-mielite, carie, necrosi. Sono esclusi la tubercolosi (48 e 49) e i tumori maligni (77). (c) esclusi la tubercolosi (47), i tumori maligni (77) e il reumatismo acuto e cronico. (f) da caduta di alberi o di altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere, sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari. (g) escluse le

sequestro, perforazione della volta palatina, necrosi del mascellare (non fosforica o senza indicazione), esostosi (senza qualifica), osteoma, callo deforme. (172 e 173). (d) accidentale o professionale, da sostanze inorganiche. (e) accidentale o professionale, da sostanze organiche (escluso l'alcoolismo morti per incendio. (h) uccisione di bambini al disotto di un anno. (i) sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.

Segue: TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1931, A — Per

Table with columns for regions (ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE) and various causes of death (e.g., Asfissia e apoplezia nel parto, Vizi congeniti di formazione, etc.).

classificati secondo 264 cause di morte. Provincie.

Table with columns for provinces (LUCANIA, CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA) and various causes of death (e.g., Asfissia e apoplezia nel parto, Vizi congeniti di formazione, etc.).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 8. (b) esclusi i casi ai N. 3, 4 e 5. (c) ittero e sclerema dei neonati. (d) atelectasia polmonare. (e) escluse le

ghiandole mesenteriche e retroperitoneali.











Segue: TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1931, B — Per Compar

Table with columns for Cause di Morte (a) and regional breakdown (Piemonte, Liguria, Lombardia, etc.). Rows include various medical conditions like Astissia e apoplezia nel parto, Vizi congeniti di formazione, etc.

classificati secondo 264 cause di morte. timenti e Regno.

Table with columns for Morti nel 1931, Classificati secondo 264 Cause di Morte, and regional breakdown (Marche, Umbria, Lazio, etc.). Rows include various medical conditions, continuing from the previous table.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 8. (b) esclusi i casi ai N. 3, 4 e 5. (c) ittero e sclerema dei neonati. (d) atelectasia polmonare. (e) escluse le ghiandole

mesenteriche e retroperitoneali.



Segue: TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1931, B — Per Compar

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE) and regions (PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENEZIA TRIDENTINA, VENETO, VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA, TOSCANA). Rows include various diseases like Tumori cerebrali e spinali, Rammollimento cerebrale, etc.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 8. (b) compresa la bronchite capillare. (c) incluse le malattie professionali dell'apparato respiratorio. (d) esclusa

classificati secondo 264 cause di morte. fimenti e Regno.

Table with columns for regions (MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE, LUCANIA, CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA) and REGNO (Maschi, Femmine, TOTALE). Rows continue with the same diseases as the left table.

la tubercolosi. (c) flebiti, varici, trombosi, emorroidi. (f) linfangioite, adenite, ecc. (g) comprese le forme adenoidee.



Segue: TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1931,

B — Per Compar

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and regions (PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETIA TRIDENTINA, VENETO, VENETIA GIULIA E ZARA, EMILIA, TOSCANA). Rows list various medical conditions and accidents.

classificati secondo 264 cause di morte.

timenti e Regno.

Table with columns for regions (MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE, LUCANIA, CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA) and a summary section (REGNO) for Maschi, Femmine, and TOTALE. Rows list the same causes of death as Table IV.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 8. (b) in questa rubrica sono comprese: peristoste, peristosi, osteite, osteo-peristoste, osteo-mielite, carie, necrosi, deforme. Sono esclusi la tubercolosi (48 e 49) e i tumori maligni (77). (c) esclusi la tubercolosi (47), i tumori maligni (77) e il reumatismo acuto e smo cronico. (f) da caduta di alberi o di altri corpi, da frane, valanghe, entro miniere, sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari. (g) escluse

sequestro, perforazione della volta palatina, necrosi del mascellare (non fosforica o senza indicazione), esostosi (senza qualifica), osteoma, callo cronico (172 e 173). (d) accidentale o professionale, da sostanze inorganiche. (e) accidentale o professionale da sostanze organiche (escluso l'alcolico le morti per incendio. (h) uccisione di bambini al disotto di un anno. (i) sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.

TAVOLA V. — Morti, durante l'anno 1931, classi

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and columns for duration (MENO DI 1 MESE, DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO, DI 1 ANNO, DI 2 ANNI) with sub-columns M and F.

(a) e malattie speciali dei neonati. (b) e del sistema nervoso centrale. (c) e della colonna vertebrale. (d) e del peritoneo, dell'apparato genito-urinario,

ficati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, and columns for age groups (DI 3 ANNI, DI 4 ANNI, DA 5 A 9 ANNI, DA 10 A 14 ANNI, DA 15 A 19 ANNI, DA 20 A 24 ANNI, DA 25 A 29 ANNI, DA 30 A 34 ANNI, DA 35 A 39 ANNI) with sub-columns M and F.

di altri organi e di organi non specificati. (e) Morbo di Addison. (f) trombosi e rammollimento cerebrale. (g) o demenza paralitica.

Segue: TAVOLA V. — Morti, durante l'anno 1931, clas

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, MENO DI I MESE (M, F), DA I MESE A MENO DI I ANNO (M, F), DI I ANNO (M, F), DI 2 ANNI (M, F). Rows include various medical conditions like Bronchite acuta, Malattie della pleura, etc.

(a) compresa la bronchite capillare. (b) esclusa la tubercolosi. (c) ittero grave ed altre malattie del fegato (escluso l'echinococco). (d) escluso

sificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns: Di 3 ANNI, Di 4 ANNI, DA 5 A 9 ANNI, DA 10 A 14 ANNI, DA 15 A 19 ANNI, DA 20 A 24 ANNI, DA 25 A 29 ANNI, DA 30 A 34 ANNI, DA 35 A 39 ANNI, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows correspond to the categories in the first table, showing age and sex distribution.

l'echinococco e l'anchilostoma. (e) e della prostata. (f) degli organi genitali femminili. (g) psioite ed altre malattie degli organi della locomozione.





Segue: TAVOLA V. — Morti, durante l'anno 1931, clas

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and age groups (DA 40 A 44 ANNI, DA 45 A 49 ANNI, DA 50 A 54 ANNI, DA 55 A 59 ANNI, DA 60 A 64 ANNI) with sub-columns M and F.

sificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns: age groups (DA 65 A 69 ANNI, DA 70 A 74 ANNI, DA 75 A 79 ANNI, DA 80 A 84 ANNI, DA 85 A 89 ANNI, DA 90 - 94 ANNI), ETÀ IGNOTA, TOTALE (M, F, MF), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO.

(a) compresa la bronchite capillare. (b) esclusa la tubercolosi. (c) ittero grave ed altre malattie del fegato (escluso l'echinococco). (d) escluso

l'echinococco e l'anchilostoma. (e) e della prostata. (f) degli organi genitali femminili. (g) psioite ed altre malattie degli organi della locomozione.









Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

Table showing mortality data for Piemonte and Liguria regions, categorized by cause of death (IX - Malattie dell'apparato digerente, X - Malattie dell'apparato urinario, ecc.). Columns include provinces: Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (c) e apparato genitale.

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table showing mortality data for Lombard, Venetia, and Veneto provinces, categorized by cause of death. Columns include provinces: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

(d) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (e) non indicate come veneree.

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Main data table with columns for provinces (Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezia Tridentina, Veneto) and rows for various causes of death (e.g., Malattie gravidanza, Malattie della pelle, Malattie delle ossa, Vizi di conformazione congeniti, Malattie dell'infanzia).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) ma comprese le emorragie. (c) non comprese le emorragie. (d) non specificate come conseguenza d'aborto. del tessuto cellulare. (n) eccettuata la tubercolosi. (i) e degli altri organi della locomozione. (l) non compresi i nati morti.

(e) embolia o morte improvvisa puerperale (non specificata come settica). (f) condizioni non specificate del puerperio. (g) dei suoi annessi e





Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

Table with columns for causes of death (VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA) and rows for various diseases like 'Complesso', 'Malattie infettive e parassitarie', 'Tubercolosi', etc.

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO) and rows for various diseases, similar to the first table but with regional breakdowns.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna

vertebrale eccettuata. (e) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali.



Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

Table with columns for causes of death (e.g., Mal. ghiand. tiroide e paratiroidei) and provinces in Veneto Giulia e Zara and Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna).

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (Reggio nell'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio) and corresponding mortality counts for various causes.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari). (c) e degli organi dei sensi. (d) senza indica

zione della causa.







Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and regions (VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA). Rows include categories like XVI. - Senilità, XVII. - Morti violente e accidentali, and XVIII. - Cause di morte non determinate.

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO) and specific provinces within each region. Rows correspond to the same cause categories as the left table.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (c) su persone di un anno e più. (d) eccet

tuati quelli da gas. (e) diverse da quelle per incendio. (f) escluse le ferite di guerra. (g) schiacciamento, frana. (h) di cui la natura





Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

Table with columns for provinces (Abruzzi e Molise, Campania, Puglia) and rows for causes of death (Infez. purulenta e setticemia, Malaria, etc.).

distinti secondo 200 cause di morte.

Provincie.

Table with columns for provinces (Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna) and rows for causes of death (Infez. purulenta e setticemia, Malaria, etc.).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) non puerperali. (c) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali.

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931, A — Per

distinti secondo 200 cause di morte. Provincie.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ABRUZZI E MOLISE					CAMPANIA				PUGLIE		
		Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Pescara	Teramo	Avellino	Benevento	Napoli	Salerno	Bari	Brindisi	Foggia
66	Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi	4	7	4	—	3	4	5	11	5	8	3	4
	a) gozzo semplice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) gozzo esoftalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) mixedema e cretinismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) tetania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e) altre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Malattie del timo	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Mal. delle ghiand. o capsule surren. (b)	5	4	4	—	—	—	8	—	—	—	—	—
69	Altre malattie generali	7	16	3	6	4	20	28	105	46	60	10	42
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>136</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
70	Stati emorragici	5	6	5	3	5	6	4	31	5	15	—	8
	a) porpora primitiva	4	4	3	2	4	5	1	11	—	11	—	6
	b) emofilia	1	2	2	1	1	1	3	20	4	—	—	2
71	Anemie	7	17	17	5	11	21	9	61	21	30	11	31
	a) anemia perniciosa progressiva	6	8	8	1	7	7	4	24	10	15	5	11
	b) altre	1	9	9	4	4	14	5	37	11	15	6	20
72	Leucemie e aleucemie	12	11	6	5	9	7	5	38	12	15	12	6
	a) leucemie vere	9	10	2	3	5	7	4	16	7	9	8	2
	b) aleucemie	3	1	4	2	4	—	1	22	5	6	4	4
73	Malattie della milza	—	1	3	1	1	1	1	6	3	2	1	1
74	Altre mal. sangue e org. ematopoietici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>V. - Avvelenamenti cronici e intossicazioni.</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
75	Alcoolismo acuto e cronico	2	4	1	1	7	1	2	19	8	1	—	1
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
77	Avvelenam. cronici da sost. minerali.	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	<b>VI. - Malattie del sistema nervoso, ecc. (c).</b>	<b>742</b>	<b>1048</b>	<b>920</b>	<b>472</b>	<b>644</b>	<b>843</b>	<b>814</b>	<b>4485</b>	<b>1343</b>	<b>2076</b>	<b>437</b>	<b>1033</b>
78	Encefalite (non epidemica)	2	10	2	1	1	4	2	15	12	9	5	5
	a) ascesso del cervello	—	2	1	—	—	—	—	3	2	1	—	—
	b) altre	2	8	1	1	1	4	2	12	10	8	4	5
79	Menigitte semplice	25	45	18	5	15	42	32	109	37	49	16	76
80	Atassia locomotrice progressiva	6	3	3	1	1	5	3	22	3	16	2	4
81	Altre malattie del midollo spinale	7	17	12	4	8	17	15	43	15	17	4	7
82	Emorragia, embolia o trombos. cereb.	574	840	719	373	466	581	566	2973	874	1449	365	708
	a) emorragia cerebrale	454	626	600	290	351	407	409	1672	601	1193	290	592
	b) embolia o trombos. cerebrale	68	174	62	51	93	148	126	1162	240	170	52	83
	c) emiplegia ed altre paralisi (d)	52	40	57	32	22	26	31	139	33	86	23	33
83	Paralisi progressiva degli alienati	3	5	2	1	5	—	—	96	21	10	3	3
84	Demenza precoce e altre psicosi	24	4	5	1	24	3	2	71	79	4	2	1
	a) demenza precoce	7	—	—	—	4	—	—	9	19	1	—	—
	b) altre psicosi	17	4	5	1	20	3	—	62	60	3	2	1
85	Epilessia.	21	19	12	7	27	13	12	102	61	26	1	12
86	Convulsioni (bambini --- 5 anni).	62	77	128	70	83	152	160	894	188	428	30	177
87	Altre malattie del sistema nervoso	12	24	12	6	11	20	17	103	42	44	6	28
	a) corea	—	2	2	—	—	3	—	4	3	—	—	—
	b) nevrite	1	1	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—
	c) paralisi agitante	4	7	3	2	3	5	5	26	14	19	3	5
	d) sclerosi a placche	1	—	1	—	—	1	2	3	2	2	—	—
	e) altre	6	14	5	2	7	11	9	66	21	18	—	20

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari). (c) e degli organi dei sensi. (d) senza indicazione della causa.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	LECCO	TARANTO	LUCANIA		CALABRIE			SICILIA								SARDEGNA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
			Matera	Potenza	Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	Cagliari	Nuoro		Sassari
66	2	3	7	6	5	6	6	4	4	7	—	8	13	—	1	1	7	2	3	66
a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a)
b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b)
c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c)
d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d)
e)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e)
67	7	3	—	4	1	4	4	1	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	3	67
68	2	2	—	4	2	3	2	2	1	—	—	—	7	—	—	—	5	4	4	68
69	42	14	20	13	27	18	57	30	21	32	13	53	140	12	30	12	89	21	15	69
	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>24</b>	<b>89</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>88</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	
70	9	2	2	9	7	2	9	7	4	6	6	5	19	4	7	6	11	6	6	70
a)	6	—	—	6	5	2	7	3	4	2	2	4	9	3	3	6	2	2	6	a)
b)	3	2	—	3	2	—	2	4	1	4	4	1	10	1	3	5	4	—	—	b)
71	32	9	16	16	21	27	27	34	11	55	15	32	47	20	22	24	33	9	25	71
a)	15	5	7	5	9	18	15	14	2	27	7	18	25	7	8	5	20	7	15	a)
b)	17	4	9	11	12	9	12	20	9	28	8	14	22	13	14	19	13	2	11	b)
72	11	8	4	5	6	17	13	13	7	25	2	14	20	6	4	12	13	4	1	72
a)	7	4	2	3	4	11	9	10	6	19	2	8	16	4	2	9	13	3	—	a)
b)	4	4	2	2	3	6	4	3	1	6	—	6	4	2	2	3	—	—	—	b)
73	—	2	—	2	1	2	6	2	2	3	2	4	2	2	1	1	3	—	—	73
74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
75	4	—	2	2	5	3	5	2	—	3	—	4	7	2	—	2	1	3	4	75
76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a)
b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b)
77	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a)
b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b)
	<b>877</b>	<b>538</b>	<b>362</b>	<b>805</b>	<b>1123</b>	<b>1154</b>	<b>815</b>	<b>652</b>	<b>371</b>	<b>1071</b>	<b>351</b>	<b>1037</b>	<b>1360</b>	<b>348</b>	<b>501</b>	<b>658</b>	<b>592</b>	<b>169</b>	<b>295</b>	
78	7	4	2	2	8	10	6	2	2	6	1	9	10	1	3	5	6	1	4	78
a)	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a)
b)	4	4	2	2	7	10														

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE (a)', 'ABRUZZI E MOLISE', 'CAMPANIA', 'PUGLIA', and 'NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO'. Rows include various medical conditions like 'Malattie degli organi della vista', 'Malattie dell'apparato circolatorio', and 'Malattie dell'apparato respiratorio'.

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for 'LUCANIA', 'CALABRIE', 'SICILIA', 'SARDEGNA', and 'NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO'. Rows correspond to the same medical conditions as the left table, broken down by province.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) embolia, infarto emorragico e trombosi. (d) eccet

tuata la tubercolosi. (e) comprese le malattie professionali dell'apparato respiratorio.

## Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ABRUZZI E MOLISE					CAMPANIA				PUGLIE		
		Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Pescara	Teramo	Avellino	Benevento	Napoli	Salerno	Bari	Brindisi	Foggia
	<b>IX. — Malattie dell'apparato digerente . . .</b>	<b>1128</b>	<b>1697</b>	<b>858</b>	<b>513</b>	<b>532</b>	<b>1375</b>	<b>871</b>	<b>5802</b>	<b>2098</b>	<b>2914</b>	<b>917</b>	<b>2543</b>
115	Malattie della cavità boccale, ecc. (b) . . .	20	21	18	9	7	13	14	49	28	35	14	29
116	Malattie dell'esofago . . .	—	1	—	2	—	—	—	6	1	—	—	—
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . . .	21	34	14	5	7	14	15	134	25	32	9	13
	a) stomaco . . .	16	31	11	2	4	8	13	92	17	22	9	12
	b) duodeno . . .	5	3	3	3	3	6	2	42	8	10	—	1
118	Altre mal. dello stom. (cancro eccett.) . . .	29	29	8	8	6	33	23	115	49	116	12	28
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . .	746	1162	565	330	345	936	547	3843	1477	2008	630	1752
120	Enteriti e ulcera intest. (2 anni e più) . . .	190	270	132	89	89	215	145	693	289	356	140	460
	a) enterite . . .	189	270	132	88	89	214	145	692	289	356	140	460
	b) ulcera intestinale . . .	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
121	Appendicite . . .	18	19	18	6	13	10	13	117	22	36	8	29
122	Ernia, occlusione intestinale . . .	31	36	33	23	18	50	32	274	71	107	24	72
	a) ernia . . .	17	13	13	10	7	22	16	140	36	68	14	35
	b) occlusione intestinale . . .	14	23	20	13	11	28	16	134	35	39	10	37
123	Altre malattie dell'intestino . . .	5	22	7	3	4	15	7	46	13	21	17	17
124	Cirrosi del fegato . . .	28	56	30	22	23	37	26	255	55	86	26	63
	a) alcolica . . .	1	2	1	—	—	5	—	6	2	—	—	—
	b) non indicata come alcolica . . .	27	54	29	22	22	32	26	249	53	85	26	62
125	Altre mal. fegato (comp. atrofia gialla) . . .	15	14	14	6	6	23	15	104	24	51	19	29
126	Calcolosi biliare . . .	6	5	5	1	5	3	2	46	7	15	6	5
127	Altre mal. della vescichetta e vie biliari . . .	8	—	3	1	1	3	3	34	6	9	6	5
128	Malattie del pancreas . . .	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1
129	Peritonite senza causa indicata . . .	10	28	10	8	8	23	29	84	31	42	6	40
	<b>X. — Malattie dell'apparato urinario, ecc. (c)</b>	<b>222</b>	<b>237</b>	<b>233</b>	<b>113</b>	<b>109</b>	<b>241</b>	<b>157</b>	<b>1724</b>	<b>414</b>	<b>766</b>	<b>166</b>	<b>309</b>
130 a	Nefrite . . .	182	190	182	93	89	194	124	1436	340	672	141	249
132	Nefrite acuta . . .	34	58	40	19	23	50	39	256	77	312	65	81
131	— cronica . . .	99	79	112	44	51	105	38	544	125	195	38	94
132	— non specificata . . .	49	53	30	30	15	39	47	636	138	165	38	74
133	Altre malattie dei reni, ecc. (d) . . .	1	5	10	5	7	4	4	36	8	10	6	7
	a) pielite . . .	1	1	1	2	3	3	1	17	2	6	3	—
	b) altre . . .	—	4	9	3	4	1	3	19	6	4	3	7
134	Calcolosi delle vie urinarie . . .	7	7	4	2	1	2	3	21	5	10	5	2
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori . . .	2	6	3	1	1	2	14	3	5	5	2	—
	b) calcolosi della vescica . . .	5	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	c) calcolosi senza altre indicazioni . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori . . .	7	14	14	7	5	25	16	124	37	31	5	25
	a) cistite . . .	7	13	13	6	5	23	15	115	35	29	5	23
	b) altre . . .	—	1	1	—	—	2	1	9	2	—	—	—
136	Mal. dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. . .	1	3	2	—	—	2	1	24	1	6	—	6
	a) stenosi uretrale . . .	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—
	b) altre . . .	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—
137	Malattie della prostata . . .	17	10	17	5	7	9	6	59	16	32	7	14
138	Mal. organi genitali dell'uomo (e) . . .	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
139	Mal. organi genitali della donna (e) . . .	6	8	4	1	—	4	2	23	7	5	2	6
	a) ovaie, trombe e parametri . . .	2	2	3	—	—	—	—	10	5	2	—	—
	b) utero . . .	4	6	—	—	—	3	—	13	—	—	—	—
	c) mammelle . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) altre . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56.

(b) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi.

(c) e apparato genitale.

## distinti secondo 200 cause di morte.

Provincie.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Lecce	Taranto	LUCANIA		CALABRIE			SICILIA										SARDEGNA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
				Matera	Potenza	Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	Cagliari	Nuoro	Sassari		
	<b>IX. — Malattie dell'apparato digerente . . .</b>	<b>1594</b>	<b>983</b>	<b>1933</b>	<b>1762</b>	<b>1990</b>	<b>1726</b>	<b>1707</b>	<b>2020</b>	<b>1321</b>	<b>3303</b>	<b>1229</b>	<b>1426</b>	<b>2715</b>	<b>1002</b>	<b>1180</b>	<b>1073</b>	<b>1556</b>	<b>700</b>	<b>806</b>		
115	Malattie della cavità boccale, ecc. (b) . . .	14	9	21	22	36	21	27	27	7	24	5	15	31	—	—	12	41	10	15		
116	Malattie dell'esofago . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . . .	27	14	7	21	43	34	43	10	7	67	10	33	29	12	5	14	15	7	13		
	a) stomaco . . .	23	12	4	15	37	25	33	8	6	61	9	27	22	8	3	14	14	5	11		
	b) duodeno . . .	4	2	3	6	6	9	10	2	1	6	1	2	7	4	2	—	1	2	2		
118	Altre mal. dello stom. (cancro eccett.) . . .	24	10	4	37	34	40	29	29	36	59	16	18	45	31	8	18	19	25	10		
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . .	1091	691	733	1256	1304	1132	1098	1425	995	2300	904	853	1726	668	873	702	886	427	495		
120	Enteriti e ulcera intest. (2 anni e più) . . .	207	145	180	270	339	278	308	370	185	462	200	270	486	166	185	201	348	134	135		
	a) enterite . . .	206	145	180	269	338	277	308	369	185	461	200	270	484	166	184	200	347	134	135		
	b) ulcera intestinale . . .	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—		
121	Appendicite . . .	14	13	7	8	17	20	18	12	8	51	14	19	36	14	11	10	16	6	11		
122	Ernia, occlusione intestinale . . .	66	38	19	39	70	58	58	42	22	84	27	68	100	40	18	39	58	28	38		
	a) ernia . . .	36	20	11	18	27	29	29	21	12	49	17	24	45	26	13	25	37	16	23		
	b) occlusione intestinale . . .	30	18	8	21	43	29	29	21	10	35	10	44	55	14	5	14	21	12	15		
123	Altre malattie dell'intestino . . .	26	7	7	18	22	20	12	8	9	21	9	17	12	7	2	6	16	1	6		
124	Cirrosi del fegato . . .	69	22	26	30	58	57	52	42	23	97	22	54	76	29	40	37	89	35	35		
	a) alcolica . . .	5	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	b) non indicata come alcolica . . .	64	22	25	29	56	56	48	42	22	94	22	53	76	29	39	35	84	35	34		
125	Altre mal. fegato (comp. atrofia gialla) . . .	19	13	6	24	24	18	24	20	13	50	3	23	59	10	13	23	32	9	19		
126	Calcolosi biliare . . .	2	7	3	7	4	9	4	5	2	9	2	9	19	—	4	2	2	2	4		
127	Altre mal. della vescichetta e vie biliari . . .	7	1	7	5	7	5	4	6	2	25	2	15	7	4	6	1	6	4	4		
128	Malattie del pancreas . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
129	Peritonite senza causa indicata . . .	28	12	13	24	31	33	30	24	11	53	15	32	89	10	11	8	26	12	20		
	<b>X. — Malattie dell'apparato urinario, ecc. (c)</b>	<b>222</b>	<b>214</b>	<b>135</b>	<b>311</b>	<b>375</b>	<b>357</b>	<b>361</b>	<b>279</b>	<b>165</b>	<b>510</b>	<b>151</b>	<b>459</b>	<b>653</b>	<b>184</b>	<b>227</b>	<b>279</b>	<b>237</b>	<b>96</b>	<b>184</b>		
130 a	Nefrite . . .	178	174	117	264	318	287	305	230	124	392	122	359	504	147	175	210	201	76	132		
132	Nefrite acuta . . .	45	44	44	105	107	86	126	66	35	103	27	87	147	32	42	57	64	11	32		
131	— cronica . . .	74	67	41	99	108	124	97	64	32	130	47	134	132	71	56	59	66	31	56		
132	— non specific																					

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ABRUZZI E MOLISE					CAMPANIA				PUGLIE		
		Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Pescara	Teramo	Avellino	Benevento	Napoli	Salerno	Bari	Brindisi	Foggia
	<b>XI. - Malattie gravidanza, parto e puerperio</b>	36	32	37	22	20	33	33	195	62	75	15	48
140	Aborto con condizioni settiche . . . . .	—	—	—	—	1	2	2	8	1	2	1	1
141	Aborto, senza ind. di cond. settiche (b) . . . . .	2	—	1	1	—	1	1	3	—	2	2	2
142	Gestazione ectopica . . . . .	1	—	—	1	—	1	1	11	1	3	—	—
143	Altri accidenti della gravidanza (c) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
144	Emorragia puerperale . . . . .	7	8	8	7	7	8	4	29	13	21	2	10
	a) da placenta previa . . . . .	2	5	3	4	2	4	2	15	3	10	1	3
	b) altre emorragie . . . . .	5	3	5	3	5	4	2	14	10	11	1	7
145	Setticemia e infezioni puerperali (d) . . . . .	9	7	12	4	4	16	12	60	29	21	6	14
	a) setticemia e piemia puerperali . . . . .	9	7	12	4	4	16	12	60	29	21	6	14
	b) tetano puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerperale . . . . .	10	8	9	6	4	5	8	63	12	16	3	13
147	Altre forme di tossiemia della grav. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens (e) . . . . .	2	3	2	3	—	3	4	7	1	4	1	2
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . .	2	3	2	2	—	3	3	6	1	4	1	2
	b) embolia o morte improvvisa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Altri accidenti del parto . . . . .	5	6	5	—	4	3	—	13	4	4	—	4
150	Altre malattie non definite, ecc. (f) . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1
	<b>XII. - Malattie della pelle e del tessuto cellulare</b>	20	19	27	11	9	20	12	155	38	61	24	37
151	Foruncoli . . . . .	2	1	2	1	—	1	—	14	3	4	1	1
152	Flemmione, ascesso caldo . . . . .	17	14	23	10	7	15	10	135	29	53	21	30
153	Altre malattie della pelle, ecc. (g) . . . . .	1	4	2	—	2	4	2	6	6	4	2	6
	<b>XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione</b>	8	8	3	6	6	13	5	46	12	22	9	17
154	Osteomielite infettiva acuta . . . . .	2	1	1	5	4	10	1	29	6	15	6	8
155	Altre malattie delle ossa (h) . . . . .	1	2	1	—	1	2	4	8	3	5	2	5
156	Mal. articolazioni, ecc. (i) . . . . .	5	5	1	1	1	1	—	9	3	2	1	4
	a) articolazioni (eccett. la tbc. e il reumatismo) . . . . .	5	5	1	1	1	1	—	9	3	2	1	4
	b) altri organi della locomozione . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b>	34	31	38	14	20	40	33	181	78	45	3	43
157	Vizi di conformazione congeniti (l) . . . . .	34	31	38	14	20	40	33	181	78	45	3	43
	a) idrocefalia . . . . .	3	3	3	3	1	4	8	11	9	7	—	5
	b) spina bifida e meningocele . . . . .	13	5	17	6	7	13	11	50	21	21	—	10
	c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	5	15	6	4	6	14	7	49	29	10	1	13
	d) mostrosità . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
	e) altri . . . . .	12	8	12	1	6	9	7	48	19	7	2	15
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia</b>	334	399	310	160	206	379	341	1088	477	1122	255	606
158	Debolezza congenita . . . . .	160	220	145	69	107	221	229	623	294	866	199	408
159	Nascita prematura (l) . . . . .	126	124	129	69	75	85	66	273	106	151	29	124
160	Conseguenza del parto (l) . . . . .	2	5	3	6	1	3	2	17	3	3	—	2
	a) con indicazione di operazione cesarea . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	b) senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	1	4	3	6	1	3	2	16	2	2	—	2
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	46	50	33	16	23	70	44	173	74	102	27	72
	a) atelectasia . . . . .	13	9	2	2	3	6	8	17	12	11	3	5
	b) ittero dei neonati . . . . .	5	8	9	4	4	23	10	39	13	13	7	19
	c) sclerema e altre . . . . .	28	33	22	10	16	41	26	117	44	78	17	48

a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) ma comprese le emorragie. (c) non comprese le emorragie. (d) non specificate come conseguenza d'aborto. (e) embolia o morte improvvisa puerperale (non specificata come settica). (f) condizioni non specificate del puerperio. (g) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (h) eccettuata la tubercolosi. (i) e degli altri organi della locomozione. (l) non compresi i nati morti.

distinti secondo 200 cause di morte.

Provincie.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	LUCANIA		CALABRIE			SICILIA										SARDEGNA				
		Lecce	Taranto	Matera	Potenza	Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	Cagliari	Nuoro	Sassari	
	<b>XI. - Malattie gravidanza, parto e puerperio</b>	39	25	11	40	53	48	35	31	24	46	19	53	55	14	25	26	38	27	21	
	Aborto con condizioni settiche . . . . .	1	2	—	1	1	—	1	1	1	4	3	3	2	1	2	1	1	—	1	140
	Aborto, senza ind. di cond. settiche (b) . . . . .	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	141	
	Gestazione ectopica . . . . .	2	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1	3	5	—	—	—	—	—	142	
	Altri accidenti della gravidanza (c) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	
	Emorragia puerperale . . . . .	11	6	3	9	13	9	7	10	5	13	3	16	12	4	4	4	4	7	3	
	a) da placenta previa . . . . .	4	2	2	4	4	2	2	4	1	1	1	6	8	1	1	1	2	3	144	
	b) altre emorragie . . . . .	7	4	1	5	9	7	5	6	4	2	2	10	4	3	3	3	2	4	2	
	Setticemia e infezioni puerperali (d) . . . . .	9	6	2	21	23	19	14	10	7	11	4	11	13	4	9	11	15	12	9	
	a) setticemia e piemia puerperali . . . . .	9	6	2	21	22	19	14	10	7	11	4	11	13	4	9	11	15	12	9	
	b) tetano puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145	
	Albuminuria e eclampsia puerperale . . . . .	5	7	1	6	8	13	5	6	4	7	6	12	9	1	7	3	12	2	4	
	Altre forme di tossiemia della grav. . . . .	3	1	2	—	2	—	—	1	1	2	1	2	4	2	2	5	1	2	1	
	Phlegmasia alba dolens (e) . . . . .	3	1	2	—	2	—	—	1	1	2	1	2	4	2	2	5	1	2	1	
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . .	3	1	2	—	2	—	—	1	1	2	1	2	4	2	2	5	1	2	1	
	b) embolia o morte improvvisa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	
	Altri accidenti del parto . . . . .	6	1	2	2	5	3	5	2	4	5	1	4	7	1	—	4	3	1	148	
	Altre malattie non definite, ecc. (f) . . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	149	
	<b>XII. - Malattie della pelle e del tessuto cellulare</b>	47	23	9	17	59	33	46	26	21	39	15	26	42	14	17	23	36	12	22	
	Foruncoli . . . . .	8	3	—	1	7	3	1	4	3	2	1	5	2	1	6	2	4	2	1	
	Flemmione, ascesso caldo . . . . .	38	16	8	14	46	27	42	17	16	31	12	19	32	7	9	21	26	8	20	
	Altre malattie della pelle, ecc. (g) . . . . .	1	1	1	2	6	3	3	5	2	6	2	2	8	6	2	—	6	2	1	
	<b>XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione</b>	21	2	2	9	15	13	9	7	7	13	3	12	17	3	3	11	6	5	2	
	Osteomielite infettiva acuta . . . . .	15	—	—	4	9	7	6	4	3	9	2	5	8	3	2	7	3	2	2	
	Altre malattie delle ossa (h) . . . . .	6	2	—	3	3	2	1	2	2	2	—	3	8	—	3	1	1	1	154	
	Mal. articolazioni, ecc. (i) . . . . .	—	—	—	2	3	4	2	1	2	2	1	4	1	—	1	1	2	1	—	
	a) articolazioni (eccett. la tbc. e il reumatismo) . . . . .	—	—	—	2	3	4	2	1	2	2	1	4	1	—	1	1	2	1	—	
	b) altri organi della locomozione . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b>	51	14	17	20	35	35	33	30	22	39	28	41	73	14	15	26	45	31	16	
	Vizi di conformazione congeniti (l) . . . . .	51	14	17	20	35	35	33	30	22	39	28	41	73	14	15	26	45	31	16	
	a) idrocefalia . . . . .	5	1	1	6	6	6	6	5	4	6	2	4	10	1	3	5	5	8	5	
	b) spina bifida e meningocele . . . . .	10	6	7	8	5	7	11	21	9	13	12	15	39	3	7	11	8	10	2	
	c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	21	3	2	3	7	10	12	1	2	13	5	12	11	6	—	4	20	9	4	
	d) mostrosità . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	e) altri . . . . .	15	4	6	3	17	12	10	3	7	6	8	3	11	4	5	6	12	3	5	
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia</b>	399	392	193	412	433	388	375	407	230	442	163	360	660	132	171	220	392	162	210	
	Debolezza congenita . . . . .	297	236	148	240	285	229	256	343	181	306	121	217	520	93	136	158	174	79	115	
	Nascita prematura (l) . . . . .	58	29	18	109	92	106	76	38	30	100	34	83	110	23	21	52	173	65	61	
	Conseguenza del parto (l) . . . . .	5	—	3	1	6	5	5	2	1	2	2	4	4	1	—	1	5	1	4	
	a) con indicazione di operazione cesarea . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b) senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	4	—	3	1	6	5	5	2												

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

A — Per

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna) and rows for causes of death (XVI - Senilità, XVII - Morti violente e accidentali, XVIII - Cause di morte non determinate).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (c) su persone di un anno e più. (d) eccet-

tuati quelli da gas. (e) diverse da quelle per incendio. (f) escluse le ferite di guerra. (g) schiacciamento, frana. (h) di cui la natura (acci-

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

B. — Per Compar

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENÈZIA TRIDENTINA	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
	<b>Complesso . . .</b>	<b>49 302</b>	<b>24 050</b>	<b>17 701</b>	<b>8 400</b>	<b>82 201</b>	<b>39 361</b>	<b>9 867</b>	<b>4 821</b>
	<b>I. — Malattie infettive e parassitarie. . .</b>	<b>7003</b>	<b>3572</b>	<b>2 808</b>	<b>1 269</b>	<b>13 059</b>	<b>6 746</b>	<b>1 653</b>	<b>830</b>
I e 2	Febbre tifoide e paratifi . . . . .	376	195	193	82	1 093	606	64	36
I	Febbre tifoidea (tifo addominale) . . .	352	181	178	75	1 054	585	61	34
2	Paratifo . . . . .	24	14	15	7	39	21	3	2
3	Tifo petecchiale . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—
5	Febbre ondulante . . . . .	12	5	2	1	1	1	1	—
6	Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—
	a) vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—
	c) non specificato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	78	47	26	13	322	159	20	7
8	Scarlattina . . . . .	18	12	10	5	36	17	21	10
9	Tosse convulsa . . . . .	178	93	70	36	698	392	71	41
10	Difterite . . . . .	157	73	64	33	497	233	70	29
11	Influenza . . . . .	1 603	854	360	161	2 107	1 049	224	116
	a) con complicazioni respiratorie indicate . . .	1 302	685	303	133	1 671	811	158	74
	b) senza complicazioni respiratorie indicate . . .	301	169	57	28	436	238	66	42
13	Dissenteria . . . . .	11	6	3	2	47	23	19	9
	a) amebica . . . . .	—	—	—	—	3	2	—	—
	b) bacillare . . . . .	3	2	2	2	7	2	11	5
	c) non specificata o dovuta ad altre cause . . . . .	8	4	1	—	37	19	8	4
15	Risipola . . . . .	123	51	34	14	215	104	24	7
16	Poliomielite a., polioencefalite acuta . . .	18	8	7	2	44	21	3	2
17	Encefalite letargica o epidemica . . . . .	24	12	2	2	65	26	17	7
18	Meningite cerebro-spinale epidemica . . .	7	2	1	—	11	2	1	1
19	Morva e farcino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pustola maligna e carbonchio . . . . .	22	2	8	—	3	—	—	—
21	Rabbia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tetano . . . . .	79	26	26	8	95	25	12	4
23 a 32	<b>Tubercolosi . . . . .</b>	<b>3 881</b>	<b>1 977</b>	<b>1 789</b>	<b>821</b>	<b>6 846</b>	<b>3 610</b>	<b>1 017</b>	<b>517</b>
23	— dell'apparato respiratorio (b) . . . . .	3 110	1 597	1 455	662	5 233	2 751	805	414
24	— delle meningi e sist. nervoso centr. . . . .	312	146	143	72	710	375	76	37
25	— degli intestini e del peritoneo (c) . . . . .	122	69	51	28	303	182	35	22
26	— della colonna vertebrale . . . . .	69	38	28	15	101	47	9	5
27	— delle ossa e delle articolazioni (d) . . . . .	108	48	49	21	175	85	32	14
28	— della pelle e sottocutaneo . . . . .	3	2	2	1	2	1	3	2
29	— del sistema linfatico (e) . . . . .	11	8	4	2	24	12	5	3
30	— dell'apparato genito-urinario . . . . .	27	10	18	3	57	30	10	4
31	Altre localizzazioni della tubercolosi . . . . .	1	1	—	—	3	1	1	—
32	Tubercolosi disseminata . . . . .	118	58	39	17	238	125	41	16
	a) acuta . . . . .	58	32	19	10	96	53	16	7
	b) cronica . . . . .	16	9	—	—	11	7	5	1
	c) non specificata . . . . .	44	17	20	7	131	65	20	8
33	Lebbra . . . . .	—	—	—	—	2	1	—	—
34	Sifilide . . . . .	61	29	35	13	138	57	11	7
	a) congenita . . . . .	28	16	15	7	71	30	6	5
	b) acquisita . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata . . . . .	33	13	20	6	67	27	5	2
35	Infez. gonococcica e altre m. veneree . . . . .	3	—	1	—	2	—	1	—
36	Infez. purulenta e setticemia (f) . . . . .	283	151	145	61	649	335	61	32
	a) setticemia . . . . .	267	145	140	61	620	323	54	29
	b) piemia . . . . .	15	6	5	—	26	11	6	2
	c) gangrena gassosa . . . . .	1	—	—	—	3	1	1	1
38	Malaria . . . . .	9	—	10	4	29	9	2	—
	a) febbre malarica . . . . .	7	—	9	3	27	9	2	—
	b) cachessia palustre . . . . .	2	—	1	1	2	—	—	—
39	Altre mal. dovute a protozoi paras. . . . .	—	—	2	—	2	—	—	—

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F		
	<b>51 559</b>	<b>25 051</b>	<b>13 413</b>	<b>6 323</b>	<b>41 943</b>	<b>19 643</b>	<b>35 845</b>	<b>16 913</b>	<b>16 343</b>	<b>7 906</b>	<b>9 030</b>	<b>4 214</b>
	<b>8 706</b>	<b>4 384</b>	<b>2 372</b>	<b>1 117</b>	<b>6 252</b>	<b>3 202</b>	<b>5 775</b>	<b>2 889</b>	<b>2 268</b>	<b>1 125</b>	<b>1 288</b>	<b>635</b>
I e 2	578	317	77	39	430	224	285	155	183	106	118	63
I	530	284	73	38	416	217	256	143	171	99	110	57
2	48	33	4	1	14	7	29	12	12	7	8	6
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
5	1	1	—	—	7	2	24	9	1	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	186	83	36	15	333	154	64	31	63	29	14	4
8	43	24	25	13	21	11	19	12	17	8	9	4
9	425	249	25	13	222	128	179	107	79	40	76	44
10	369	170	102	40	240	105	162	74	137	63	62	32
11	981	492	163	79	752	388	713	341	309	155	208	93
	781	385	145	67	601	317	580	274	254	126	175	79
	200	107	18	12	151	71	133	67	55	29	33	14
13	27	9	17	9	17	7	11	5	7	3	10	5
	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	7	2	8	5	7	2	2	2	3	1	—	—
	19	7	9	4	9	4	9	3	3	1	9	5
15	123	60	26	12	130	56	108	64	34	12	23	9
16	32	14	5	4	28	11	21	9	58	28	13	8
17	50	28	6	—	41	24	37	20	14	10	7	4
18	9	3	13	3	7	2	8	3	2	2	—	—
19	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	3	1	4	2	13	6	21	8	2	1	3	—
21	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
22	131	38	23	8	41	7	39	11	29	11	8	1
23 a 32	<b>5 035</b>	<b>2 538</b>	<b>1 701</b>	<b>807</b>	<b>3 412</b>	<b>1 811</b>	<b>3 601</b>	<b>1 813</b>	<b>1 155</b>	<b>569</b>	<b>664</b>	<b>333</b>
23	3 488	1 721	1 374	633	2 452	1 291	2 765	1 355	805	390	468	232
24	716	365	141	72	400	223	296	155	142	68	60	29
25	260	160	43	29	153	98	170	98	70	43	52	26
26	112	54	20	11	63	37	80	42	19	7	11	6
27	151	75	38	22	100	48	105	63	25	12	22	14
28	5	4	1	1	8	4	3	1	4	3	1	—
29	21	13	9	3	13	4	12	5	3	2	2	1
30	69	28	8	5	22	7	26	17	19	5	6	3
31	1	1	—	—	8	7	5	—	—	—	—	—
32	212	117	67	31	193	92	139	77	68	39	42	22
	99	62	30	14	73	36	48	31	26	15	13	7
	37	15	10	6	41	24	24	15	15	10	1	—
	76	40	27	11	79	32	67	31	27	14	28	15
33	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	79	27	31	12	52	20	39	15	24	10	9	4
	41	13	7	3	24	13	13	5	12	6	2	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	14	24	9	28	7	26	10	12	4	7	4
35	6	5	1	—	3	2	1	—	3	2	—	—
36	456	244	88	43	368	191	341	172	113	65	43	21
	437	231	84	40	355	183	335	165	107	61	41	19
	17	12	3	2	12	8	6	5	6	4	2	—
	2	1	1	1	1	1						



Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,  
B. — Per Compar

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
40	Anchilostomiasi . . . . .	1	1	2	1	2	1	—	—
41	Cisti idatica . . . . .	2	1	—	—	1	—	—	—
	a) del fegato . . . . .	2	1	—	—	1	—	—	—
	b) altre localizzazioni . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Altre malattie dovute a elminti . . . . .	20	10	4	4	44	25	4	3
43	Micosi . . . . .	20	7	7	2	70	27	8	1
44	Altre mal. infettive e parassitarie . . . . .	16	8	7	4	38	22	2	1
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>3 454</b>	<b>1 977</b>	<b>1 418</b>	<b>762</b>	<b>5 546</b>	<b>2 775</b>	<b>833</b>	<b>452</b>
45 a 53	<i>Cancro e altri tumori maligni. . . . .</i>	<i>3 333</i>	<i>1 858</i>	<i>1 371</i>	<i>718</i>	<i>5 418</i>	<i>2 656</i>	<i>823</i>	<i>442</i>
45	Tumori maligni della bocca e faringe . . . . .	138	25	78	9	182	25	31	11
46	Tumori maligni tubo dig. e peritoneo . . . . .	1 844	906	686	316	3 216	1 334	493	227
	a) esofago . . . . .	53	9	30	6	178	44	59	9
	b) stomaco e duodeno . . . . .	1 064	486	397	167	2 186	864	305	150
	c) retto . . . . .	117	53	49	16	131	62	17	6
	d) fegato e vie biliari . . . . .	379	230	147	90	436	223	52	28
	e) pancreas . . . . .	29	13	19	10	82	29	11	7
	f) peritoneo . . . . .	23	16	4	2	42	28	8	5
	g) altri organi . . . . .	179	99	40	25	161	84	41	22
47	Tumori maligni dell'app. respiratorio . . . . .	82	28	43	17	146	42	26	8
48	— dell'utero . . . . .	283	283	126	126	371	371	64	64
49	— degli altri org. genitali della donna . . . . .	57	57	21	21	53	58	11	11
50	— delle mammelle . . . . .	239	235	84	84	312	310	48	48
51	— degli org. genito-urinari dell'uomo . . . . .	114	—	67	—	178	—	19	—
52	— della pelle . . . . .	77	36	41	11	101	33	14	8
53	— di altri organi o di org. non spec. . . . .	499	288	225	134	854	483	117	65
54	Tumori non maligni . . . . .	128	117	47	44	127	118	10	10
	a) organi genitali della donna . . . . .	107	107	43	43	98	98	8	8
	b) altri organi . . . . .	21	10	4	1	29	20	2	2
55	Tumori a carattere maligno non sp. . . . .	3	2	—	—	1	1	—	—
	a) organi genitali della donna . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri organi . . . . .	3	2	—	—	1	1	—	—
	<b>III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b) . . . . .</b>	<b>832</b>	<b>458</b>	<b>359</b>	<b>196</b>	<b>1 047</b>	<b>537</b>	<b>121</b>	<b>54</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	188	115	44	25	213	104	24	12
57	Reumatismo cronico, osteo-artrite . . . . .	74	52	18	12	58	44	11	8
58	Gotta . . . . .	15	5	8	2	15	7	—	—
59	Diabete mellito . . . . .	350	169	228	125	425	205	43	20
60	Scorbuto . . . . .	5	4	1	—	11	6	2	—
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . . . .	1	—	—	—	5	2	1	—
	b) scorbuto . . . . .	4	4	1	—	6	4	1	—
62	Pellagra . . . . .	1	1	—	—	17	7	1	—
63	Rachitismo . . . . .	12	8	5	1	57	26	16	4
64	Osteomalacia . . . . .	2	2	1	1	7	7	—	—
65	Mal. della ghiand. pituitaria (ipofisi) . . . . .	—	—	1	—	5	2	—	—
66	Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi . . . . .	93	66	17	11	93	77	13	7
	a) gozzo semplice . . . . .	23	16	2	1	18	11	2	2
	b) gozzo esoftalmico . . . . .	46	40	7	7	54	49	4	3
	c) mixedema e cretinismo . . . . .	7	5	3	1	3	1	1	—
	d) tetania . . . . .	17	5	5	2	16	12	6	2
	e) altre . . . . .	—	—	—	—	7	4	—	—
67	Malattie del timo . . . . .	20	6	7	2	53	22	3	—
68	Mal. delle ghiand. o capsule surren. (c) . . . . .	27	13	9	6	17	5	2	1
69	Altre malattie generali . . . . .	45	17	20	10	66	30	6	2
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .</b>	<b>225</b>	<b>104</b>	<b>92</b>	<b>44</b>	<b>355</b>	<b>167</b>	<b>57</b>	<b>34</b>
70	Stati emorragipari . . . . .	20	9	12	8	43	15	7	4
	a) porpora primitiva . . . . .	7	5	4	3	20	8	5	3
	b) emofilia . . . . .	13	4	8	5	23	7	2	1

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.  
timenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENETO		VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	
40	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	40
41	—	—	7	6	13	5	20	11	4	2	2	1	41
	—	—	4	3	10	6	11	6	2	1	—	—	a
	—	—	3	3	3	2	9	5	2	1	—	—	b
42	53	33	11	8	59	27	16	9	10	3	5	3	42
43	20	7	4	1	15	6	8	4	8	1	3	2	43
44	18	8	2	1	34	12	18	7	6	2	5	2	44
	<b>3 321</b>	<b>1 692</b>	<b>863</b>	<b>464</b>	<b>3 421</b>	<b>1 720</b>	<b>3 371</b>	<b>1 631</b>	<b>883</b>	<b>439</b>	<b>436</b>	<b>218</b>	
45 a 53	<i>3 249</i>	<i>1 626</i>	<i>851</i>	<i>456</i>	<i>3 362</i>	<i>1 662</i>	<i>3 320</i>	<i>1 586</i>	<i>865</i>	<i>421</i>	<i>426</i>	<i>209</i>	<i>45 a 53</i>
45	166	29	32	8	132	27	121	23	31	4	25	4	45
46	1 747	765	390	194	2 086	900	2 133	922	529	231	218	93	46
	159	39	46	24	66	15	79	15	20	6	6	—	a
	993	423	223	108	1 434	608	1 509	629	353	153	133	59	b
	75	32	22	9	81	39	80	29	19	12	11	5	c
	281	145	49	20	309	150	247	137	88	42	56	23	d
	88	40	16	9	43	14	30	10	15	3	2	—	e
	30	22	7	5	24	17	14	11	7	—	—	—	f
	121	64	27	19	120	57	171	88	23	8	10	6	g
47	126	46	65	9	85	25	24	24	9	10	4	4	47
48	241	241	92	92	239	239	183	183	54	54	33	33	48
49	39	39	22	22	42	42	23	23	6	6	5	5	49
50	213	207	49	48	157	153	140	137	42	40	27	27	50
51	115	—	39	—	93	—	108	—	35	—	24	—	51
52	76	26	24	12	52	13	72	26	27	17	20	10	52
53	526	273	133	71	476	250	462	248	114	60	64	33	53
54	71	65	12	8	59	58	50	45	18	18	10	9	54
	56	56	7	7	52	52	39	39	15	15	6	6	a
	15	9	5	1	7	6	11	6	3	3	4	3	b
55	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	<b>912</b>	<b>475</b>	<b>217</b>	<b>126</b>	<b>750</b>	<b>383</b>	<b>550</b>	<b>263</b>	<b>285</b>	<b>131</b>	<b>153</b>	<b>70</b>	
56	208	113	37	18	210	96	140	59	58	28	35	18	56
57	59	42	25	12	52	30	39	29	17	11	11	5	57
58	14	7	1	—	6	2	6	2	6	2	2	—	58
59	292	149	84	55	277	131	269	114	112	52	66	30	59
60	13	5	1	1	9	3	1	1	—	—	2	1	60
	9	4	1	—	8	1	1	1	—	—	—	—	a
	4	4	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	b
62	27	18	—	—	7	1	2	2	3	—	—	—	62
63	91	41	12	6	51	24	10	6	23	9	7	2	63
64	3	2	—	—	2	1	—	—	2	2	2	1	64
65	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	65
66	77	44	20	13	44	33	29	22	20	12	8	5	66
	12	8	2	1	2	3	3	4	4	4	4	1	a
	22	21	4	3	24	22	14	13	4	4	2	2	b
	4	1	—	—	1	1	3	1	3	1	1	—	c
	39	14	14	9	16	8	9	5	8	3	4	2	d
	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	e
67	44	18	12	7	22	9	13	3	8	1	4	2	67
68	10	3	5	1	29	16	20	12	5	2	6	1	68
69	74	33	20	12	39	14	21	13	26	12	10	5	69
	<b>212</b>												

Segue: TAVOLA VI. — Morti durante l'anno 1931,

B. — Per Compar

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENÈZIA TRIDENTINA		VENEZIO		VENÈZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	
71	Anemie . . . . .	100	47	32	19	154	83	36	25	65	29	17	13	90	54	63	33	21	14	14	8	71
	a) anemia perniciososa progressiva . . . . .	85	38	22	14	100	57	29	20	34	16	10	7	63	41	50	27	13	9	7	5	a
	b) altre . . . . .	15	9	10	5	54	26	7	5	31	13	7	6	27	13	13	6	8	5	7	3	b
72	Leucemie e aleucemie . . . . .	99	45	45	17	152	61	14	5	103	43	26	11	107	46	80	41	33	17	23	9	72
	a) leucemie vere . . . . .	73	34	22	10	99	37	6	2	65	28	16	7	71	32	55	30	19	10	18	5	a
	b) aleucemie . . . . .	26	11	23	7	53	24	8	3	38	15	10	4	36	14	25	11	14	7	10	4	b
73	Malattie della milza . . . . .	5	3	3	—	14	6	—	—	11	5	4	1	18	9	9	5	6	1	1	1	73
74	Altre mal. sangue e org. ematopoietici	1	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	74
	<b>V. — Avvelenamenti cronici e intossicaz.</b>	<b>71</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>91</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	
75	Alcolismo acuto e cronico . . . . .	66	6	13	1	78	5	13	5	53	8	8	2	39	3	34	5	22	6	16	1	75
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	76
	a) professionali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) altri . . . . .	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	b
77	Avvelenam. cronici da sost. minerali.	3	—	2	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	77
	a) professionali . . . . .	2	—	2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	a
	b) altri . . . . .	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	b
	<b>VI. — Malattie del sistema nervoso, ecc. (b)</b>	<b>6 092</b>	<b>2 758</b>	<b>2 060</b>	<b>976</b>	<b>9 300</b>	<b>4 328</b>	<b>1 036</b>	<b>499</b>	<b>6 060</b>	<b>2 894</b>	<b>1 143</b>	<b>546</b>	<b>5 973</b>	<b>2 665</b>	<b>5 173</b>	<b>2 233</b>	<b>2 930</b>	<b>1 379</b>	<b>1 578</b>	<b>695</b>	
78	Encefalite (non epidemica) . . . . .	65	37	21	10	77	32	11	3	63	22	12	6	43	20	36	17	14	5	6	3	78
	a) ascesso del cervello . . . . .	6	2	2	1	9	2	2	—	7	3	2	2	2	5	1	—	—	—	2	1	a
	b) altre . . . . .	59	35	19	9	68	30	9	3	56	19	8	4	41	18	31	16	14	5	4	2	b
79	Meningite semplice . . . . .	224	119	91	37	583	254	31	13	285	134	54	23	221	103	150	64	61	30	27	15	79
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	55	17	19	7	51	17	10	6	31	8	4	1	20	6	24	4	7	3	3	2	80
81	Altre malattie del midollo spinale . . . . .	83	35	36	16	132	62	22	11	96	43	16	8	63	28	61	35	18	23	13	13	81
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebr.	4 882	2 232	1 625	795	7 375	3 514	812	407	4 722	2 331	715	349	4 932	2 228	4 289	1 842	2 403	1 159	1 359	594	82
	a) emorragia cerebrale . . . . .	3 846	1 702	1 233	600	5 684	2 692	674	338	3 575	1 753	573	285	3 449	1 561	3 316	1 394	1 648	805	1 044	459	a
	b) embolia o trombosi cerebrale . . . . .	655	360	243	123	629	305	82	41	629	333	91	43	1 013	451	529	242	438	211	159	74	b
	c) emiplegia ed altre paralisi (c) . . . . .	381	170	149	72	714	317	56	28	518	245	51	21	520	216	444	206	317	143	156	61	c
83	Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	80	17	38	3	130	27	5	1	44	11	28	7	39	9	53	11	22	8	9	2	83
84	Demenza precoce e altre psicosi . . . . .	175	73	42	30	131	62	16	9	89	41	11	5	63	38	58	42	20	12	12	7	84
	a) demenza precoce . . . . .	9	3	3	3	13	6	2	2	10	2	—	—	5	4	17	3	1	—	—	—	a
	b) altre psicosi . . . . .	166	70	39	27	118	56	14	7	79	39	11	5	58	34	51	27	17	11	12	7	b
85	Epilessia . . . . .	125	59	34	18	164	69	23	8	103	36	25	10	90	32	118	57	31	6	23	11	85
86	Convulsioni (bambini — 5 anni) . . . . .	123	48	56	18	270	113	57	21	239	133	197	96	190	87	140	60	241	103	74	31	86
87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	203	94	62	31	227	112	30	11	211	84	38	22	145	65	173	76	67	25	29	13	87
	a) corea . . . . .	4	3	—	—	12	7	2	—	6	6	2	2	10	8	3	1	1	—	—	—	a
	b) nevrile . . . . .	5	2	4	3	11	6	1	1	6	5	1	1	2	1	2	1	1	—	—	—	b
	c) paralisi agitante . . . . .	64	26	14	5	55	29	10	4	38	14	7	3	28	11	42	16	17	9	6	2	c
	d) sclerosi a placche . . . . .	25	12	8	5	21	9	4	2	16	9	4	2	14	8	15	7	8	4	5	3	d
	e) altre . . . . .	105	51	36	18	128	61	13	4	145	50	24	14	91	37	110	50	39	10	17	7	e
88	Malattie degli organi della vista . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	88
89	Mal. dell'orecchio e del seno mastoid.	77	27	36	11	159	66	19	9	123	50	42	19	108	49	60	24	29	10	8	4	89
	a) otite . . . . .	63	22	24	4	92	38	15	7	82	27	39	19	63	28	36	14	17	5	6	3	a
	b) altre . . . . .	14	5	12	7	67	28	4	2	41	23	3	—	45	21	24	10	12	5	2	1	b
	<b>VII. — Malattie dell'apparato circolatorio.</b>	<b>8 777</b>	<b>4 885</b>	<b>3 116</b>	<b>1 670</b>	<b>11 159</b>	<b>6 146</b>	<b>1 578</b>	<b>886</b>	<b>7 278</b>	<b>4 016</b>	<b>1 512</b>	<b>799</b>	<b>5 735</b>	<b>2 961</b>	<b>5 024</b>	<b>2 699</b>	<b>2 006</b>	<b>1 127</b>	<b>1 188</b>	<b>657</b>	
90a 95	<i>Malattie del cuore . . . . .</i>	<i>7 941</i>	<i>4 525</i>	<i>2 834</i>	<i>1 559</i>	<i>9 971</i>	<i>5 634</i>	<i>1 422</i>	<i>811</i>	<i>6 210</i>	<i>3 520</i>	<i>1 255</i>	<i>696</i>	<i>4 888</i>	<i>2 597</i>	<i>4 386</i>	<i>2 426</i>	<i>1 749</i>	<i>1 020</i>	<i>1 056</i>	<i>611</i>	90a 95
90	Pericardite . . . . .	19	12	—	—	23	11	6	2	16	8	12	5	15	6	7	2	3	2	5	1	90
91	Endocardite acuta . . . . .	49	27	10	4	66	31	3	2	35	23	13	8	22	11	31	18	9	6	12	10	91
92	Endocardite cr., comp. le aff. valvol.	2 581	1 526	606	341	3 201	1 877	421	271	1 662	1 010	439	257	1 579	924	1 662	973	755	449	461	280	92
93	Malattie del miocardio . . . . .	3 174	1 806	1 338	750	3 526	1 991	622	343	2 652	1 509	514	279	1 854	962	1 355	751	401	234	250	126	93
	a) miocardite acuta . . . . .	35	17	7	3	32	15	3	2	25	12	10	6	17	11	21	12	6	2	2	2	a
	b) miocardite cron. e degeneraz. del miocardio . . . . .	1 291	716	798	431	1 327	757	337	190	1 268	728	245	130	806	411	705	387	197	120	158	79	b
	c) non specificate . . . . .	1 848	1 073	533	316	2 167	1 219	282	151	1 359	769	143	103	1 031	540	629	352	198	112	90	45	c
94	Mal. arterie coronarie e angina pect.	197	62	68	21	317	109	38	13	232	80	60	20	214	62	200	55	43	19	30	9	94
95	Altre malattie del cuore . . . . .	1 921	1 032	812	443	2 833	1 615	332	180	1 613	896	217	127	1 204	632	1 131	627	538	310	293	185	95
	a) malattie funzionali del cuore . . . . .	9	5	4	4	4	3	—	—	8	6	3	2	4	2	5	3	1	—	—	—	a
	b) altre e non specificate . . . . .	1 912	1 027	808	439	2 829	1 612	332	180	1 605	890	214	125	1 200	630	1 126	624	537	310	296	183	b
96	Aneurisma, eccet. l'aneur. del cuore.	113	39	56	13	163	54	9	4	41	16	20	3	87								

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,  
B. — Per Compar

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENÈZIA TRIDENTINA	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
98	Cangrena . . . . .	136	65	48	26	172	69	29	13
	a) senile . . . . .	58	29	23	12	70	27	14	5
	b) altre . . . . .	78	36	25	14	102	42	15	8
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	121	41	35	10	123	45	21	14
100	Mal. vene: varici, emorr., flebite, ecc.	46	23	19	10	70	45	7	5
101	Mal. sist. linfatico, linfangioite, ecc.	11	5	3	1	19	6	1	1
102	Anomalia idiopatiche press. sanguig.	1	—	—	—	2	1	—	—
103	Altre mal. dell'apparato circolatorio	9	4	3	1	23	12	4	2
	<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio</b>	<b>8 629</b>	<b>4 108</b>	<b>3 264</b>	<b>1 578</b>	<b>14 555</b>	<b>6 781</b>	<b>1 436</b>	<b>672</b>
104	Malattie delle fosse nasali e annessi.	6	1	2	2	8	2	—	—
105	Malattie della laringe . . . . .	23	10	8	4	56	24	9	2
106	Bronchite . . . . .	1 438	733	450	240	2 261	1 135	218	100
	a) acuta . . . . .	151	66	80	47	256	121	22	11
	b) cronica . . . . .	656	342	165	86	691	343	69	29
	c) non specificata . . . . .	631	325	205	107	1 314	671	127	60
107 a	Polmonite, tutte le forme . . . . .	6 597	3 168	2 529	1 218	11 209	5 219	1 055	521
107	Broncopolm., compr. la bronch. capil.	4 395	2 204	1 885	936	7 769	3 792	483	239
108	Polmonite lobare . . . . .	2 202	964	644	282	3 440	1 427	572	282
110	Pleuriti . . . . .	216	85	105	50	447	177	33	13
111	Congestione, edema, ecc. del polm.(b).	97	38	61	22	142	72	23	17
112	Asma . . . . .	121	47	67	31	169	70	32	12
113	Enfisema polmonare . . . . .	49	13	10	2	81	47	14	5
114	Altre mal. app. respiratorio (c) . . . . .	82	13	32	9	182	35	16	2
	a) polmonite interstiziale cronica (d) . . . . .	12	3	—	—	9	4	6	—
	b) altre, compresa cangrena polmonare . . . . .	70	12	29	9	173	31	10	2
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente . . . . .</b>	<b>5 096</b>	<b>2 203</b>	<b>1 618</b>	<b>691</b>	<b>13 116</b>	<b>5 949</b>	<b>1 114</b>	<b>486</b>
115	Malattie della cavità boccale, ecc.(e) . . . . .	74	41	37	21	155	71	18	7
116	Malattie dell'esofago . . . . .	9	4	6	—	13	5	—	—
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . . . . .	216	58	87	19	271	64	66	20
	a) stomaco . . . . .	164	47	65	12	207	49	54	16
	b) duodeno . . . . .	52	11	22	7	64	15	12	4
118	Altre mal. dello stom. (cancro eccett.)	170	75	61	30	334	147	14	10
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . . . .	2 102	925	485	221	8 708	4 103	564	236
120	Enteriti e ulcera intest. (2 anni e più)	679	338	241	123	1 187	595	93	49
	a) enterite . . . . .	674	337	240	128	1 185	594	91	48
	b) ulcera intestinale . . . . .	5	1	1	—	2	1	—	—
121	Appendicite . . . . .	251	114	84	30	390	151	67	23
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	456	211	164	68	456	196	82	31
	a) ernia . . . . .	230	92	79	33	483	69	32	16
	b) occlusione intestinale . . . . .	226	119	85	35	273	127	50	15
123	Altre malattie dell'intestino . . . . .	46	23	23	11	92	49	10	5
124	Cirrosi del fegato . . . . .	667	171	222	51	781	183	103	44
	a) alcoolica . . . . .	87	8	9	1	49	13	9	4
	b) non indicata come alcoolica . . . . .	573	163	213	53	732	176	100	40
125	Altre m. fegato (comp. atrofia gialla)	146	69	76	29	214	84	14	6
126	Calcolosi biliare . . . . .	63	49	35	26	86	65	24	20
127	Altre m. della vescichetta e vie biliari	66	47	31	22	79	50	14	12
128	Malattie del pancreas . . . . .	1	—	—	—	9	5	—	—
129	Peritonite senza causa indicata . . . . .	157	78	66	31	341	172	38	23
	<b>X. - Malattie dell'apparato urinario, ecc.(f)</b>	<b>1 588</b>	<b>658</b>	<b>575</b>	<b>220</b>	<b>2 228</b>	<b>977</b>	<b>254</b>	<b>107</b>
130 a	Nefrite . . . . .	1 076	556	383	175	1 595	814	167	86
130	Nefrite acuta . . . . .	95	49	32	13	245	116	18	11
131	— cronica . . . . .	534	281	194	92	712	363	85	48
132	— non specificata . . . . .	447	226	157	70	638	329	64	27

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie pro

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.  
timenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENETO		VENÈZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	
98	125	59	30	12	145	58	75	33	30	14	16	5	98
	42	18	8	5	43	20	12	4	9	5	3	—	a
	84	41	22	7	102	38	63	29	21	9	13	5	b
99	68	29	30	10	59	27	72	31	15	9	9	3	99
100	39	22	9	3	42	25	35	21	7	4	6	1	100
101	9	3	1	—	10	5	6	1	2	1	2	1	101
102	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	102
103	6	2	—	—	10	2	5	—	2	1	1	—	103
	<b>7 985</b>	<b>3 749</b>	<b>2 239</b>	<b>1 017</b>	<b>7 225</b>	<b>3 370</b>	<b>5 806</b>	<b>2 768</b>	<b>2 407</b>	<b>1 147</b>	<b>1 474</b>	<b>660</b>	
104	4	1	—	—	5	2	2	1	3	1	—	—	104
105	40	27	14	9	31	13	12	5	20	6	6	4	105
106	1 368	642	326	166	1 221	625	1 042	553	521	292	319	162	106
	213	106	64	36	217	108	119	65	80	43	51	23	a
	535	240	142	67	444	249	404	213	213	114	121	56	b
	620	296	120	63	500	268	519	275	231	125	147	83	c
107 a	5 921	2 841	1 619	747	5 519	2 543	4 316	2 040	1 686	779	1 074	464	107 a
107	4 290	2 104	998	474	3 925	1 856	2 982	1 448	1 210	578	772	330	107
108	1 631	737	621	273	1 591	637	1 334	592	476	201	302	131	108
110	232	84	61	17	168	74	163	64	56	25	29	8	110
111	81	40	36	14	71	30	93	38	20	7	8	3	111
112	165	72	71	33	122	56	108	46	71	36	24	14	112
113	51	18	73	24	28	12	20	9	13	5	4	1	113
114	117	24	31	7	60	15	50	12	14	6	10	4	114
	6	3	1	1	1	1	2	—	—	—	3	1	a
	111	21	30	6	59	14	48	12	14	6	7	3	b
	<b>6 369</b>	<b>2 950</b>	<b>1 234</b>	<b>503</b>	<b>3 855</b>	<b>1 691</b>	<b>3 186</b>	<b>1 438</b>	<b>1 574</b>	<b>696</b>	<b>957</b>	<b>432</b>	
115	92	47	28	11	77	40	59	33	29	11	23	11	115
116	4	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	116
117	259	78	120	23	177	54	196	63	66	24	50	18	117
	177	64	91	22	121	42	138	51	44	21	42	14	a
	82	14	29	1	56	12	58	12	22	3	8	4	b
118	125	63	26	7	107	51	85	34	42	14	20	9	118
119	3 740	1 775	603	281	1 709	795	1 094	511	829	389	477	228	119
120	635	332	118	59	467	234	493	261	166	77	115	58	120
	627	331	115	57	463	233	490	259	165	77	114	58	a
	8	1	3	2	4	1	3	2	1	—	—	—	b
121	285	128	50	12	249	105	190	86	63	32	59	24	121
122	321	128	93	38	280	105	324	127	87	35	61	17	122
	113	32	43	15	122	37	133	38	35	14	26	4	a
	208	96	50	23	158	69	191	89	52	22	35	13	b
123	50	21	10	2	43	13	45	19	11	11	13	6	123
124	367	95	73	16	347	62	318	72	142	35	85	33	124
	48	7	6	2	27	1	18	1	18	3	12	3	a
	319	88	72	14	320	61	300	71	124	32	73	30	b
125	125	49	16	8	88	29	71	32	29	16	15	6	125
126	84	67	32	25	73	63	92	74	16	12	8	7	126
127	82	57	17	10	76	47	51	33	22	11	3	2	127
128	10	5	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	128
129	190	104	34	10	157	85	163	91	56	27	28	13	129
	<b>1 508</b>	<b></b>											

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

B. — Per Compar

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b) . . . . .	42	23	20	8	70	45	6	4
	a) pielite . . . . .	10	7	3	2	38	26	2	1
	b) altre . . . . .	32	16	17	6	32	19	4	3
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	31	12	13	5	59	18	3	1
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori . . . . .	21	9	5	3	33	15	2	1
	b) calcolosi della vescica . . . . .	10	3	—	—	26	3	1	—
	c) calcolosi senza altre indicazioni . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori. . . . .	136	26	47	15	207	50	25	7
	a) cistite . . . . .	121	25	45	15	187	47	23	7
	b) altre . . . . .	15	1	2	—	20	3	2	—
136	Mal. dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. . . . .	12	—	11	—	25	—	—	—
	a) stenosi uretrale . . . . .	6	—	7	—	16	—	—	—
	b) altre . . . . .	6	—	4	—	9	—	—	—
137	Malattie della prostata . . . . .	249	—	82	—	218	—	44	—
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c) . . . . .	2	—	2	—	4	—	—	—
139	Mal. organi genitali della donna (c) . . . . .	41	41	17	17	50	50	9	9
	a) ovaie, trombe e parametri . . . . .	30	30	9	9	26	26	7	7
	b) utero . . . . .	9	9	6	6	21	21	2	2
	c) mammelle . . . . .	1	1	2	2	—	—	—	—
	d) altre . . . . .	1	1	—	—	3	3	—	—
	<b>XI. — Malattie gravidanza, parto e puerp.</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
140	Aborto con condizioni settiche . . . . .	15	15	2	2	20	20	3	3
141	Aborto, senza ind. di cond. settiche (d) . . . . .	1	—	—	—	2	2	3	3
142	Gestazione ectopica . . . . .	19	19	6	6	27	27	3	3
143	Altri accidenti della gravidanza (e) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale . . . . .	37	37	9	9	60	60	11	11
	a) da placenta previa . . . . .	15	15	3	3	25	25	2	2
	b) altre emorragie . . . . .	22	22	6	6	35	35	9	9
145	Setticemia e infezioni puerperali (f) . . . . .	67	67	22	22	106	106	22	22
	a) setticemia e piemia puerperali . . . . .	66	66	22	22	105	105	21	21
	b) tetano puerperale . . . . .	1	1	—	—	1	1	1	1
146	Albuminuria e eclampsia puerperale . . . . .	25	25	13	13	58	58	8	8
147	Altre forme di tossiemia della grav. . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g) . . . . .	14	14	9	9	16	16	4	4
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . .	3	3	1	1	1	1	—	—
	b) embolia o morte improvvisa . . . . .	11	11	8	8	15	15	4	4
149	Altri accidenti del parto . . . . .	6	6	11	11	33	33	9	9
150	Altre malattie non definite (h) . . . . .	1	1	—	—	1	1	—	—
	<b>XII. — Malattie della pelle e del tessuto cellulare . . . . .</b>	<b>86</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>219</b>	<b>92</b>	<b>20</b>	<b>6</b>
151	Foruncoli . . . . .	4	1	1	—	30	9	3	—
152	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	63	28	34	12	152	66	13	5
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i) . . . . .	14	2	5	3	37	17	4	1
	<b>XIII. — Malattie delle ossa e degli organi della locomozione . . . . .</b>	<b>68</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>154</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
154	Osteomielite infettiva acuta . . . . .	31	13	25	6	74	20	8	1
155	Altre malattie delle ossa (l) . . . . .	13	9	7	3	32	15	2	1
156	Mal. articolazioni, ecc. (m) . . . . .	24	14	6	1	48	19	5	2
	a) articolazioni (eccett. la tbc. e il reumatismo) . . . . .	23	14	6	1	47	19	5	2
	b) altri organi della locomozione . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—
	<b>XIV. — Vizi di conformazione congeniti . . . . .</b>	<b>150</b>	<b>79</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>315</b>	<b>147</b>	<b>40</b>	<b>14</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (n) . . . . .	150	79	48	23	315	147	40	14
	a) idrocefalia . . . . .	11	3	4	3	24	11	5	2
	b) spina bifida e meningocoele . . . . .	25	21	10	7	73	44	7	2
	c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	78	39	17	5	127	55	18	7
	d) mostruosità . . . . .	2	—	—	—	9	5	3	2
	e) altri . . . . .	34	14	17	8	82	32	7	1

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) dei bacinietti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come improvvisa puerperale (non specificata come settica). (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare.

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENEZIA		VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA	
	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
133	54	21	9	3	42	16	34	14	19	10	4	—
	15	7	3	—	11	7	6	2	9	4	—	—
	39	14	6	3	31	9	28	12	10	6	4	—
134	16	7	10	2	30	9	32	9	15	5	10	2
	11	5	7	2	20	8	20	9	13	5	5	2
	4	2	3	—	8	1	12	—	1	—	5	—
	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
135	112	23	17	8	114	30	130	34	49	8	24	1
	106	23	15	7	111	29	127	34	45	8	22	—
	6	—	2	1	3	—	3	—	4	—	2	—
	10	—	5	—	9	—	16	—	8	—	1	—
	6	—	2	—	5	—	8	—	4	—	1	—
	4	—	3	—	4	—	8	—	4	—	1	—
136	234	—	32	—	174	—	116	—	43	—	26	—
	4	—	2	—	3	—	3	—	—	—	1	—
	26	26	9	9	53	53	21	21	9	9	6	6
	11	11	7	7	35	35	17	17	3	3	3	3
	15	15	2	2	16	16	4	4	4	4	2	2
	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1	1
	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	252	252	52	52	206	206	135	135	70	70	50	50
140	8	8	4	4	13	13	9	9	4	4	3	3
141	5	5	3	3	2	2	3	3	2	2	—	—
142	12	12	1	1	16	16	6	6	2	2	2	2
143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	52	52	6	6	27	27	23	23	14	14	9	9
	30	30	4	4	13	13	11	11	7	7	4	4
	22	22	2	2	14	14	12	12	7	7	5	5
145	75	75	18	18	66	66	50	50	26	26	13	13
	73	73	18	18	65	65	50	50	26	26	13	13
	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
146	64	64	7	7	54	54	27	27	11	11	15	15
147	15	15	8	8	11	11	6	6	3	3	2	2
	1	1	1	1	2	2	—	—	1	1	—	—
	14	14	7	7	9	9	6	6	2	2	2	2
148	19	19	4	4	16	16	10	10	7	7	6	6
149	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	164	63	47	25	129	44	126	43	42	14	21	8
151	28	6	4	1	14	6	8	2	4	—	2	1
152	107	46	34	20	93	32	100	36	26	10	14	5
153	29	11	9	4	22	6	18	5	12	4	5	2
	107	45	30	12	88	34	103	33	36	13	16	6
154	62	21	18	4	52	18	62	17	19	7	14	6
155	23	9	5	3	9	2	17	5	3	3	1	—
156	22	15	7	5	27	14	24	11	14	3	1	—
	20	13	7	5	27	14	23	11	14	3	1	—
	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	216	99	44	17	162	76	149	61	84	43	49	23
157	216	99	44	17	162	76	149	61	84	43	49	23
	36	12	5	3	18	9	19	7	9	3	4	—
	52	30	9	4	31	20	38	19	28	18	13	8
	58	26	19	7	65	27	65	24	29	15	17	8
	11	6	1	—	6	4	7	3	2	1	1	—
	59	25	10	3	42	16	20	8	16	6	14	6

veneree. (d) ma comprese le emorragie. (e) non comprese le emorragie. (f) non specificate come conseguenza d'aborto. (g) embolia o morte (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli altri organi della locomozione. (n) non compresi i nati morti.



Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

B. — Per Compar

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	LÀZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE		LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	M F			
	<b>Complesso . . .</b>	<b>31 484</b>	<b>14 926</b>	<b>26 112</b>	<b>13 030</b>	<b>58 995</b>	<b>29 340</b>	<b>45 381</b>	<b>22 648</b>	<b>11 614</b>	<b>5 985</b>	<b>27 720</b>	<b>14 228</b>	<b>65 385</b>	<b>32 630</b>	<b>15 510</b>	<b>7 479</b>	<b>312 457</b>	<b>296 948</b>	<b>609 405</b>	
I e 2	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie. . .</b>	<b>5 270</b>	<b>2 591</b>	<b>3 094</b>	<b>1 602</b>	<b>6 802</b>	<b>3 387</b>	<b>6 705</b>	<b>3 498</b>	<b>1 753</b>	<b>906</b>	<b>3 922</b>	<b>1 998</b>	<b>7 713</b>	<b>3 874</b>	<b>3 392</b>	<b>1 816</b>	<b>44 394</b>	<b>45 441</b>	<b>89 835</b>	I e 2
	<i>Febbre tifoide e paratifi . . . . .</i>	<i>277</i>	<i>146</i>	<i>345</i>	<i>186</i>	<i>561</i>	<i>308</i>	<i>437</i>	<i>257</i>	<i>104</i>	<i>66</i>	<i>275</i>	<i>153</i>	<i>624</i>	<i>322</i>	<i>140</i>	<i>77</i>	<i>2 822</i>	<i>3 338</i>	<i>6 160</i>	I e 2
1	Febbre tifoidea (tifo addominale) . . . . .	260	135	313	171	485	267	385	228	82	50	239	134	570	289	110	62	2 596	3 049	5 645	1
2	Paratifo . . . . .	17	11	32	15	76	41	52	29	22	16	36	19	54	33	30	15	226	289	515	2
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
5	Febbre ondulante . . . . .	3	1	1	—	17	10	15	5	5	4	5	3	90	53	7	6	91	101	192	5
6	Vaiolo . . . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	a) vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	b) vaioloide, alastrim . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	c) non specificato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
7	Morbillo . . . . .	353	160	258	94	361	181	322	156	164	75	202	102	552	252	106	54	1 794	1 616	3 410	7
8	Scarlattina . . . . .	310	173	45	24	81	40	84	42	141	75	508	249	276	125	209	108	951	952	1 903	8
9	Tosse convulsa . . . . .	126	78	95	52	230	129	102	49	31	18	139	73	91	45	135	70	1 315	1 657	2 972	9
10	Difterite . . . . .	263	133	163	68	282	128	90	40	34	16	149	65	251	108	85	36	1 736	1 446	3 182	10
11	Influenza . . . . .	531	315	540	270	1 357	701	1 545	767	318	156	534	295	742	356	237	117	6 582	6 705	13 287	11
	a) con complicazioni respiratorie indicate . . . . .	474	251	402	193	1 039	524	1 166	571	268	97	344	185	479	223	189	88	5 186	5 083	10 269	a
	b) senza complicazioni respiratorie indicate . . . . .	120	64	138	77	318	177	379	196	110	59	192	110	263	133	48	29	1 396	1 622	3 018	b
13	Dissenteria . . . . .	7	1	34	16	42	23	15	5	26	10	35	13	139	73	44	14	278	233	511	13
	a) amebica . . . . .	—	—	2	1	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) bacillare . . . . .	3	—	12	7	13	7	4	1	8	2	8	3	20	10	5	1	44	34	78	b
	c) non specificata o dovuta ad altre cause . . . . .	4	—	20	8	24	14	9	2	18	8	25	9	62	40	36	12	166	144	310	c
15	Risipola . . . . .	130	59	63	30	129	66	114	52	26	14	70	36	85	38	39	15	797	699	1 496	15
16	Poliomielite a., polioencefalite acuta . . . . .	20	8	17	8	29	18	38	18	7	4	30	16	34	21	9	2	211	204	415	16
17	Encefalite letargica o epidemica . . . . .	19	14	9	3	10	6	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18	Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	13	3	2	—	10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
19	Morva e farcino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
20	Pustola maligna e carbonchio . . . . .	9	3	8	5	13	7	20	7	16	6	13	10	26	7	12	6	125	71	196	20
21	Rabbia . . . . .	—	—	—	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	21
22	Tetano . . . . .	14	1	15	3	64	26	34	9	8	3	22	7	47	17	14	4	492	209	701	22
23 a 32	<b>Tubercolosi . . . . .</b>	<b>2 421</b>	<b>1 182</b>	<b>1 216</b>	<b>677</b>	<b>2 724</b>	<b>1 335</b>	<b>2 684</b>	<b>1 536</b>	<b>321</b>	<b>178</b>	<b>1 178</b>	<b>612</b>	<b>3 157</b>	<b>1 737</b>	<b>1 738</b>	<b>1 019</b>	<b>21 468</b>	<b>23 072</b>	<b>44 540</b>	23 a 32
23	— dell'apparato respiratorio (b) . . . . .	1 767	882	800	449	1 979	964	1 880	1 131	199	111	807	427	2 404	1 346	1 270	777	15 928	17 133	33 061	23
24	— delle meningi e sist. nervoso centr. . . . .	335	150	155	75	260	119	352	172	32	18	105	40	297	147	196	101	2 364	2 364	4 728	24
25	— degli intestini e del peritoneo (c) . . . . .	91	46	107	68	255	151	231	129	34	18	109	63	190	112	85	46	973	1 388	2 361	25
26	— della colonna vertebrale . . . . .	49	15	29	12	61	23	35	18	15	6	26	14	70	30	23	9	431	389	820	26
27	— delle ossa e delle articolazioni (d) . . . . .	56	25	48	31	82	38	66	24	21	8	50	24	77	28	59	36	647	617	1 264	27
28	— della pelle e sottocutaneo . . . . .	1	1	4	1	5	4	6	4	2	2	6	4	5	2	1	—	25	37	62	28
29	— del sistema linfatico (e) . . . . .	5	2	3	1	15	7	18	8	5	4	11	6	15	7	18	6	100	94	194	29
30	— dell'apparato genito-urinario . . . . .	30	16	13	7	6	2	16	3	—	—	9	6	17	10	6	5	198	161	359	30
31	Altre localizzazioni della tubercolosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	13	11	24	31
32	Tubercolosi disseminata . . . . .	87	45	57	33	59	27	80	47	12	10	55	28	81	55	79	39	789	878	1 667	32
	a) acuta . . . . .	49	28	27	14	16	10	27	14	4	4	18	8	24	19	39	17	301	381	682	a
	b) cronica . . . . .	12	3	—	—	2	—	19	13	—	—	8	5	17	13	7	—	103	128	231	b
	c) non specificata . . . . .	26	14	30	19	41	16	34	20	8	6	29	15	40	24	27	15	385	369	754	c
33	Lebbra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Sifilide . . . . .	140	52	50	23	292	115	104	46	27	14	71	28	164	68	24	10	796	555	1 351	34
	a) congenita . . . . .	74	36	28	17	170	75	51	25	18	9	38	16	85	47	10	7	363	330	693	a
	b) acquisita . . . . .	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	c) non specificata . . . . .	63	14	22	11	121	40	53	21	9	5	27	6	78	20	14	3	431	216	647	c
35	Infesz. gonococcica e altre m. veneree . . . . .	2	—	—	—	7	4	4	4	—	—	2	1	3	1	—	—	23	19	42	35
36	Infesz. purulenta e setticemia (f) . . . . .	257	132	111	69	249	134	217	111	47	26	158	84	639	298	110	40	2 139	2 209	4 348	36
	a) setticemia . . . . .	255	125	107	66	227	120	191	102	43	25	141	73	619	289	106	40	2 032	2 097	4 129	a
	b) piemia . . . . .	11	7	4	3	22	14	24	9	4	—	17	11	17	6	—	—	93	103	196	b
	c) cangrena gassosa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
38	Malaria . . . . .	191	85	100	39	188	74	736	331	407	202	396	179	473	188	425	208	1 733	1 368	3 101	38
	a) febbre malarica . . . . .	161	71	86	35	161	65	673	393	354	173	343	156	420	163	358	174	1 524	1 193	2 717	a
	b) cachessia palustre . . . . .	30	14	14	4	27	9	63	38	53	29	53	23	53	25	67	34	209	175	384	b
39	Altre mal. dovute a protozoi paras. . . . .	2	—	5	—	17	9	4	2	1	1	12	10	107	55	4	3	(g) 83	(h) 81	164	39

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna em

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

B. — Per Compar

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
40	Anchilostomiasi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Cisti idatica . . . . .	21	10	5	4	9	4	15	3
	a) del fegato . . . . .	13	5	5	4	5	3	11	3
	b) altre localizzazioni . . . . .	8	5	—	—	4	1	4	—
42	Altre malattie dovute a elminti . .	20	10	30	12	63	34	66	35
43	Micosi . . . . .	17	12	9	6	29	13	11	1
44	Altre mal. infettive e parassitarie . .	19	11	16	8	30	16	23	13
	<b>II. — Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>1 720</b>	<b>929</b>	<b>730</b>	<b>408</b>	<b>1 324</b>	<b>829</b>	<b>933</b>	<b>584</b>
45 a 53	Cancro e altri tumori maligni . . . .	1 676	889	714	395	1 279	788	891	546
45	Tumori maligni della bocca e faringe . .	62	3	47	5	76	14	44	11
46	Tumori maligni tubo dig. e peritoneo . .	793	373	304	152	397	203	285	142
	a) esofago . . . . .	20	8	11	4	13	10	1	—
	b) stomaco e duodeno . . . . .	450	197	150	76	159	79	107	48
	c) retto . . . . .	51	25	21	13	26	13	19	10
	d) fegato e vie biliari . . . . .	171	92	60	38	139	79	94	51
	e) pancreas . . . . .	26	10	6	1	8	2	9	3
	f) peritoneo . . . . .	14	10	23	4	10	6	8	6
	g) altri organi . . . . .	61	28	33	16	42	19	47	24
47	Tumori maligni dell'app. respiratorio . .	72	28	20	8	32	10	13	6
48	— dell'utero . . . . .	167	167	77	77	206	206	149	149
49	— degli altri org. genitali della donna . .	34	34	5	5	13	13	18	18
50	— delle mammelle . . . . .	102	101	62	62	130	130	72	72
51	— degli org. genito-urinari dell'uomo . .	82	—	31	—	42	—	39	—
52	— della pelle . . . . .	43	17	34	14	64	27	58	33
53	— di altri organi o di org. non spec. . . .	321	169	134	72	319	180	213	115
54	Tumori non maligni . . . . .	44	40	16	13	45	41	42	38
	a) organi genitali della donna . . . . .	37	37	11	11	41	41	35	35
	b) altri organi . . . . .	7	3	5	2	4	—	7	3
55	Tumori a carattere maligno non sp. . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) organi genitali della donna . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri organi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>III. — Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b) . . . . .</b>	<b>560</b>	<b>280</b>	<b>346</b>	<b>166</b>	<b>896</b>	<b>468</b>	<b>583</b>	<b>288</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	76	39	72	33	157	81	103	54
57	Reumatismo cronico, osteo-artrite . . . .	38	22	40	19	77	51	36	23
58	Gotta . . . . .	12	3	13	1	29	2	18	1
59	Diabete mellito . . . . .	307	151	101	48	336	185	161	59
60	Scorbuto . . . . .	2	1	1	1	8	5	4	2
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow) . .	2	1	—	—	3	2	—	—
	b) scorbuto . . . . .	—	—	1	1	5	3	4	2
62	Pellagra . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—
63	Rachitismo . . . . .	19	13	33	17	45	21	45	25
64	Osteomalacia . . . . .	2	2	7	4	6	3	1	—
65	Mal. della ghiand. pituitaria (ipofisi) . .	2	2	—	—	—	—	—	—
66	Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi . . . .	11	7	18	14	25	17	20	14
	a) gozzo semplice . . . . .	—	—	2	2	—	—	1	—
	b) gozzo esoftalmico . . . . .	5	4	6	6	11	8	6	4
	c) mixedema e cretinismo . . . . .	1	1	—	—	3	2	3	2
	d) tetania . . . . .	4	1	7	4	10	6	9	8
	e) altre . . . . .	1	1	2	2	1	1	1	—
67	Malattie del timo . . . . .	22	7	12	6	2	1	12	5
68	Mal. delle ghiand. o capsulesurren. (c) . .	26	14	13	6	12	8	14	9
69	Altre malattie generali . . . . .	43	19	36	17	199	94	168	96
	<b>IV. — Malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .</b>	<b>155</b>	<b>82</b>	<b>130</b>	<b>61</b>	<b>231</b>	<b>122</b>	<b>205</b>	<b>103</b>
70	Stati emorragipari . . . . .	22	11	24	13	46	21	34	16
	a) porpora primitiva . . . . .	15	8	17	9	21	13	23	12
	b) emofilia . . . . .	7	3	7	4	25	8	11	4

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari). lumbricoides, 1 per tenia, 1 per trichinosi e 3 per elefantiasi. (f) di cui 105 morti per tossinfezioni, 44 per parotite epidemica e sue complicazioni, 25 per parotite epidemica e sue complicazioni, 1 per morbo di Brill, 1 per infezione di Bang, 1 per febbre miliare, 21 per varicella e 9 per infezione

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	M F	
	—	—	2	2	1	—	—	—	4	5	9	40
	4	1	3	3	19	8	—	—	75	64	139	41
	2	—	1	1	10	5	14	5	46	38	84	a
	2	—	2	2	9	3	7	2	29	26	55	b
	40	28	41	20	46	26	9	6	(d) 244	(e) 237	541	42
	2	—	34	12	37	18	3	—	185	120	305	43
	15	3	32	18	66	43	14	11	(f) 175	(g) 190	366	44
	<b>156</b>	<b>111</b>	<b>606</b>	<b>372</b>	<b>1 659</b>	<b>988</b>	<b>421</b>	<b>238</b>	<b>14 526</b>	<b>16 589</b>	<b>31 115</b>	
45 a 53	<b>163</b>	<b>108</b>	<b>590</b>	<b>360</b>	<b>1 605</b>	<b>945</b>	<b>406</b>	<b>225</b>	<b>14 452</b>	<b>15 890</b>	<b>30 342</b>	45 a 53
45	6	1	24	5	63	11	24	3	1 064	218	1 282	45
46	67	35	237	118	595	295	186	84	8 911	7 292	16 205	46
	—	—	3	2	27	16	2	1	565	208	773	a
	40	23	144	68	293	140	106	44	5 724	4 322	10 046	b
	3	—	11	4	36	22	5	2	422	352	774	c
	20	11	54	32	182	88	54	25	1 314	1 504	2 818	d
	1	—	5	2	6	4	4	3	239	160	399	e
	3	—	16	7	42	19	11	6	84	155	239	f
	2	1	12	5	37	10	13	4	599	287	886	g
48	30	30	98	93	228	228	36	36	—	2 677	2 677	47
49	1	1	8	8	24	24	6	6	—	393	393	48
50	12	12	42	42	130	127	31	31	26	1 856	1 892	49
51	4	—	16	—	61	—	7	—	1 074	—	1 074	50
52	10	5	28	17	94	32	18	7	599	344	943	51
53	31	23	125	67	376	218	85	54	2 256	2 813	5 079	52
54	3	3	16	12	53	43	15	13	71	695	766	53
	3	3	9	9	40	40	10	10	—	617	617	54
	—	—	7	3	13	3	5	3	71	78	149	a
	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	7	b
	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	7	a
	<b>133</b>	<b>66</b>	<b>414</b>	<b>216</b>	<b>1 087</b>	<b>542</b>	<b>334</b>	<b>144</b>	<b>4 719</b>	<b>4 840</b>	<b>9 559</b>	
56	24	14	83	45	106	63	30	16	880	933	1 813	56
57	10	6	42	21	42	26	21	19	238	432	670	57
58	6	—	10	1	20	4	4	2	144	41	185	58
59	29	9	95	47	405	185	78	31	1 896	1 762	3 658	59
60	—	—	3	2	7	5	1	—	34	37	71	60
	—	—	2	1	3	2	—	—	16	13	29	a
	—	—	1	1	4	3	—	—	18	24	42	b
62	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	62
63	10	4	45	23	67	42	39	17	303	289	592	63
64	—	—	2	2	5	3	2	2	13	32	45	64
65	13	10	17	13	38	25	12	6	177	396	573	65
	4	3	9	7	9	7	—	—	26	61	87	a
	2	1	6	5	7	5	3	2	28	199	227	b
	1	1	2	2	1	1	—	—	17	20	37	c
	6	5	7	5	19	10	9	4	100	105	205	d
	—	—	—	—	2	2	—	—	6	11	17	e
67	4	3	9	2	14	3	9	5	168	102	270	67
68	4	3	6	5	19	10	12	5	116	120	236	68
69	33	17	102	55	343	176	125	41	713	653	1 375	69
	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>138</b>	<b>80</b>	<b>447</b>	<b>231</b>	<b>112</b>	<b>68</b>	<b>1 507</b>	<b>1 513</b>	<b>3 020</b>	
	11	1	18	11	64	31	23	14	235	198	433	70
	8	1	14	10	33	15	14	8	124	129	253	a
	3	—	4	1	31	16	9	6	111	69	180	b

(d) di cui 239 morti per ascariis lumbricoides, 2 per tenia, 1 per botriocefalo, 1 per tricocefalo ed 1 per distomiasi. (e) di cui 2

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931, B. — Per Compar

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE), regions (Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia), and sex (Totale, di cui F). Rows list various medical conditions like Anemie, Leucemie, Malattie della milza, etc.

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso. timenti e Regno.

Table with columns for regions (Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Regno), sex (M, F, M F), and cause of death. Rows list various medical conditions like Anemie, Leucemie, Malattie della milza, etc.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) e degli organi dei seni. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.



Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

B. — Per Compar

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
98	Cangrena . . . . .	48	24	23	7	72	42	66	38
	a) senile . . . . .	13	6	5	2	21	12	16	7
	b) altre . . . . .	35	18	18	5	51	30	50	31
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	63	21	14	8	78	25	49	13
100	Mal. vene: varici, emorr., fiebite, ecc.	31	19	14	6	25	18	14	7
101	Mal. sist. linfatico, linfangioite, ecc..	5	3	6	5	5	2	10	5
102	Anomalie idiopatiche press. sanguig.	1	—	—	—	—	—	—	—
103	Altre mal. dell'apparato circolatorio.	7	2	1	—	4	2	6	5
	<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio</b>	<b>5 167</b>	<b>2 388</b>	<b>4 221</b>	<b>2 045</b>	<b>13 018</b>	<b>6 313</b>	<b>9 315</b>	<b>4 226</b>
104	Malattie delle fosse nasali e annessi.	5	—	2	—	7	4	6	1
105	Malattie della laringe . . . . .	17	7	42	16	52	23	62	23
106	Bronchite . . . . .	726	349	912	473	2 198	1 124	1 807	937
	a) acuta . . . . .	121	67	194	95	322	157	359	184
	b) cronica . . . . .	331	152	346	189	679	363	652	353
	c) non specificata . . . . .	274	130	372	189	1 197	604	796	400
107 al	Polmonite, tutte le forme . . . . .	4 039	1 884	2 991	1 427	10 128	4 882	7 017	3 081
107	Broncopolm., compr. la bronch. capil.	2 711	1 338	2 030	996	7 109	3 489	4 852	2 163
108	Polmonite lobare . . . . .	1 328	546	961	431	3 019	1 393	2 165	913
110	Pleuriti . . . . .	152	55	75	40	275	125	161	75
111	Congestione, edema, ecc. del polm.(b).	63	30	23	8	72	40	52	26
112	Asma . . . . .	88	38	135	63	170	78	128	60
113	Enfisema polmonare . . . . .	27	12	21	15	36	15	36	17
114	Altre mal. app. respiratorio (c) . . . . .	50	13	20	3	80	22	46	6
	a) polmonite interstiziale cronica (d) . . . . .	6	3	4	1	3	1	1	1
	b) altre, compresa cangrena polmonare . . . . .	44	10	16	2	77	21	45	5
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente . .</b>	<b>4 105</b>	<b>1 902</b>	<b>4 728</b>	<b>2 248</b>	<b>10 146</b>	<b>4 939</b>	<b>8 951</b>	<b>4 465</b>
115	Malattie della cavità boccale, ecc. (e).	74	35	75	34	104	56	101	47
116	Malattie dell'esofago . . . . .	2	—	3	1	7	3	1	—
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno.	170	31	81	25	188	65	95	30
	a) stomaco . . . . .	105	20	64	24	130	50	78	27
	b) duodeno . . . . .	65	11	17	1	58	15	17	3
118	Altre mal. dello stom. (cancro eccett.)	68	30	80	41	220	109	190	101
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . . . .	2 374	1 157	3 148	1 525	6 803	3 333	6 172	3 034
120	Enteriti e ulcera intest. (2 anni e più)	504	264	770	382	1 312	684	1 308	704
	a) enterite . . . . .	503	264	768	381	1 310	682	1 307	704
	b) ulcera intestinale . . . . .	1	—	2	1	2	2	1	—
121	Appendicite . . . . .	142	60	74	32	162	67	100	43
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	203	81	141	53	427	190	307	140
	a) ernia . . . . .	99	34	60	19	214	91	173	72
	b) occlusione intestinale . . . . .	104	47	81	34	213	99	134	68
123	Altre malattie dell'intestino . . . . .	30	13	41	22	81	49	88	42
124	Cirrosi del fegato . . . . .	255	73	159	44	373	131	266	90
	a) alcoolica . . . . .	12	1	5	1	13	1	7	2
	b) non indicata come alcoolica . . . . .	243	72	154	43	360	130	259	88
125	Altre m. fegato (comp. atrofia gialla)	102	51	55	29	166	85	131	59
126	Calcolosi biliare . . . . .	38	25	22	14	58	41	35	26
127	Altre m. della vescichetta e vie biliari	43	21	13	7	46	26	28	16
128	Malattie del pancreas . . . . .	5	2	2	1	2	1	1	1
129	Peritonite senza causa indicata . . . . .	95	59	64	38	167	99	128	72
	<b>X. - Malattie dell'apparato urinario, ecc. (f)</b>	<b>1 314</b>	<b>587</b>	<b>914</b>	<b>459</b>	<b>2 536</b>	<b>1 211</b>	<b>1 677</b>	<b>829</b>
130 al	Nefrite . . . . .	1 001	520	736	415	2 094	1 117	1 414	763
132	Nefrite acuta . . . . .	188	93	174	93	422	212	547	303
131	— cronica . . . . .	555	304	385	215	812	448	468	249
132	— non specificata . . . . .	253	118	177	107	860	457	399	211

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO				
				TOTALE	M	F					
11	7	32	17	68	26	24	7	629	522	1 151	98
3	1	13	7	19	7	6	1	210	168	378	a
8	6	19	20	49	19	18	6	419	354	773	b
6	3	38	21	104	33	10	4	569	351	920	99
1	1	7	3	18	10	5	—	172	223	395	100
6	3	10	5	19	13	3	—	67	61	128	101
—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	102
2	1	9	2	16	5	—	—	67	41	108	103
2 111	1 001	5 133	2 506	11 161	5 143	2 565	1 118	57 091	50 590	107 681	
—	—	—	—	2	1	2	2	36	18	54	104
15	6	45	17	42	19	14	5	294	220	514	105
593	318	1 172	641	2 052	1 011	368	191	9 313	9 682	18 995	106
119	68	162	88	323	160	74	38	1 444	1 483	2 927	a
194	104	234	142	573	307	148	76	3 172	3 425	6 597	b
280	146	776	411	1 156	544	146	77	4 697	4 774	9 471	c
1 403	625	3 622	1 718	8 397	3 818	2 036	867	43 316	37 842	81 158	107 a
1 040	474	2 462	1 174	5 709	2 629	1 314	613	29 034	26 842	55 936	107
363	151	1 160	541	2 688	1 189	722	254	14 222	11 000	25 222	108
31	15	97	40	294	139	58	25	1 542	1 111	2 653	110
14	8	39	14	71	23	10	5	542	440	982	111
33	20	121	63	206	94	41	10	1 037	843	1 880	112
16	7	16	7	23	8	17	7	311	224	535	113
6	2	21	6	74	25	19	6	700	210	910	114
—	—	—	—	2	—	5	2	48	20	68	a
6	2	17	5	72	25	14	4	652	190	842	b
2 795	1 408	5 423	2 700	15 269	7 626	3 062	1 419	48 852	43 746	92 598	
43	22	84	39	136	59	66	35	655	620	1 275	115
—	—	1	—	1	—	2	1	38	17	55	116
28	11	120	53	187	58	35	15	1 793	700	2 412	117
19	7	95	42	158	49	30	13	1 212	570	1 782	a
9	4	25	11	29	9	5	2	491	139	630	b
41	16	103	63	260	147	54	23	1 026	975	2 001	118
1 989	978	3 534	1 785	10 446	5 274	1 808	854	29 125	27 465	56 590	119
450	270	925	474	2 525	1 303	617	311	6 111	6 524	12 635	120
449	269	923	472	2 519	1 301	616	311	6 083	6 506	12 589	a
1	1	2	2	6	2	1	—	28	18	46	b
15	8	55	25	175	73	33	12	1 421	1 028	2 449	121
58	23	186	69	440	174	124	43	2 471	1 736	4 210	122
29	8	85	26	232	89	76	27	1 248	716	1 964	a
29	15	101	43	208	85	48	21	1 226	1 020	2 246	b
25	14	54	24	91	45	23	14	394	389	783	123
56	19	167	56	420	167	159	46	3 567	1 337	4 964	124
2	—	7	1	8	3	6	2	289	54	343	a
54	19	160	55	412	164	153	44	3 278	1 343	4 621	b
30	9	66	32	214	102	60	22	901	717	1 618	125
10	9	17	15	52	34	8	2	179	574	753	126
12	8	16	9	68	44	14	4	255	426	681	127
1	—	1	—	1	—	1	—	28	18	46	128
37	21	94	56	253	145	58	27	975	1 151	2 126	129
446	240	1 093	523	2 907	1 376	517	224	11 540	9 501	21 041	
381	227	910	482	2 263	1 246	409	207	7 516	8 371	15 887	130 a
149	99	319	153	596	305	107	54	1 798	1 812	3 520	130
110	79	329	184	725	416	153	75	3 074	3 511	6 555	131
92	49	262	145	912	525	149	78	2 754	3 013	5 802	132

## Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

B. — Per Compar

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b) . . .	42	22	28	12	52	20	32	21
	a) pielite . . . . .	15	8	7	4	23	14	12	8
	b) altre . . . . .	27	14	21	8	29	6	20	13
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	22	5	21	6	31	7	25	8
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori . . .	17	5	13	5	20	6	19	7
	b) calcolosi della vescica . . . . .	4	—	6	1	10	1	3	—
	c) calcolosi senza altre indicazioni . . . . .	1	—	2	—	1	—	3	1
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori . . . . .	75	25	47	7	202	31	103	15
	a) cistite . . . . .	69	21	44	7	188	29	94	13
	b) altre . . . . .	6	4	3	—	14	2	9	2
136	Mal. dell'uretra, ascesso urinoso, ecc. . . . .	27	—	6	—	28	—	16	4
	a) stenosi uretrale . . . . .	19	—	1	—	16	—	9	3
	b) altre . . . . .	8	—	5	—	12	—	7	1
137	Malattie della prostata . . . . .	128	—	56	—	90	—	69	—
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c) . . . . .	4	—	1	—	3	—	—	—
139	Mal. organi genitali della donna (c) . . . . .	15	15	19	19	36	36	18	18
	a) ovaie, trombe e parametri . . . . .	8	8	8	8	17	17	5	5
	b) utero . . . . .	7	7	11	11	18	18	10	10
	c) mammelle . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	2
	d) altre . . . . .	—	—	—	—	1	1	1	1
	<b>XI. — Malattie gravidanza, parto e puerp.</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
140	Aborto con condizioni settiche . . . . .	16	16	1	1	13	13	7	7
141	Aborto, senza ind. di cond. settiche (d) . . . . .	3	3	4	4	4	4	6	6
142	Gestazione ectopica . . . . .	11	11	2	2	14	14	6	6
143	Altri accidenti della gravidanza (e) . . . . .	1	1	—	—	—	—	1	1
144	Emorragia puerperale . . . . .	31	31	37	37	54	54	50	50
	a) da placenta previa . . . . .	9	9	16	16	24	24	20	20
	b) altre emorragie . . . . .	22	22	21	21	30	30	30	30
145	Setticemia e infezioni puerperali (f) . . . . .	73	73	36	36	117	117	56	56
	a) setticemia e piemia puerperali . . . . .	73	73	36	36	117	117	56	56
	b) tetano puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerperale . . . . .	39	39	37	37	88	88	44	44
147	Altre forme di tossiemia della grav. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g) . . . . .	9	9	10	10	15	15	11	11
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . .	—	—	1	1	2	2	1	1
	b) embolia o morte improvvisa . . . . .	9	9	9	9	13	13	10	10
149	Altri accidenti del parto . . . . .	18	18	20	20	20	20	17	17
150	Altre malattie non definite (h) . . . . .	—	—	—	—	3	3	4	4
	<b>XII. — Malattie della pelle e del tessuto cellulare . . . . .</b>	<b>128</b>	<b>58</b>	<b>86</b>	<b>42</b>	<b>225</b>	<b>99</b>	<b>189</b>	<b>68</b>
151	Foruncoli . . . . .	18	8	6	2	18	5	17	2
152	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	92	44	71	33	189	83	158	61
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i) . . . . .	18	6	9	7	18	11	14	5
	<b>XIII. — Malattie delle ossa e degli organi della locomozione . . . . .</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>71</b>	<b>37</b>
154	Osteomielite infettiva acuta . . . . .	46	16	13	9	46	24	44	20
155	Altre malattie delle ossa (l) . . . . .	8	4	5	2	17	5	20	13
156	Mal. articolazioni, ecc. (m) . . . . .	10	6	13	3	13	6	7	4
	a) articolazioni (eccet. la tbc. e il reumatismo) . . .	9	5	13	3	12	5	5	3
	b) altri organi della locomozione . . . . .	1	1	—	—	1	1	2	1
	<b>XIV. — Vizi di conformazione congeniti . . . . .</b>	<b>172</b>	<b>70</b>	<b>137</b>	<b>56</b>	<b>312</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>79</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (n) . . . . .	172	70	137	56	312	153	156	79
	a) idrocefalia . . . . .	16	5	13	5	32	13	18	10
	b) spina bifida e meningocele . . . . .	43	20	48	17	95	48	47	23
	c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	67	27	36	16	99	52	48	26
	d) mostruosità . . . . .	3	2	1	1	3	3	—	—
	e) altri . . . . .	43	16	39	17	83	39	43	20

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come improvvisa puerperale (non specificata come settica). (d) condizioni non specificate del puerperio. (e) dei suoi annessi e del tessuto cellulare.

## distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	M F	
133	12	6	20	6	95	38	9	3	318	272	590	133
	2	2	7	3	27	12	4	3	81	113	194	a
	10	4	13	3	68	26	5	—	237	159	396	b
134	11	4	13	4	104	19	8	—	331	123	454	134
	6	4	6	4	53	17	3	—	169	109	278	a
	4	—	6	—	48	1	4	—	147	12	159	b
	1	—	1	—	3	1	1	—	15	2	17	c
135	24	1	65	11	231	37	24	4	1 299	333	1 632	135
	24	1	63	11	219	35	21	3	1 209	315	1 524	a
	—	—	2	—	12	2	3	1	90	18	108	b
136	2	—	10	—	19	—	12	—	213	5	218	136
	2	—	5	—	5	—	5	—	113	4	117	a
	—	—	5	—	14	—	7	—	100	1	101	b
137	13	—	53	—	156	—	45	—	1 823	—	1 828	137
138	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	35	138
139	2	2	20	20	36	36	10	10	—	397	397	139
	1	1	11	11	18	18	2	2	—	218	218	a
	1	1	9	9	15	15	7	7	—	159	159	b
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	c
	—	—	—	—	3	3	1	1	—	11	11	d
140	51	51	136	136	293	293	86	86	—	2 854	2 854	140
141	1	1	2	2	18	18	2	2	—	141	141	141
142	2	2	5	5	11	11	2	2	—	53	53	142
143	—	—	1	1	12	12	—	—	—	140	140	143
144	12	12	29	29	71	71	14	14	—	3	3	144
	5	5	7	7	25	25	6	6	—	546	546	a
	7	7	22	22	46	46	8	8	—	226	226	b
145	23	23	56	56	80	80	36	36	—	942	942	145
	23	23	55	55	80	80	36	36	—	935	935	a
	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7	7	b
146	7	7	26	26	55	55	18	18	—	596	596	146
147	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	147
148	2	2	4	4	20	20	4	4	—	163	163	148
	2	2	4	4	1	1	4	4	—	15	15	a
	—	—	—	—	19	19	4	4	—	148	148	b
149	4	4	13	13	25	25	8	8	—	246	246	149
150	—	—	—	—	1	1	1	1	—	17	17	150
151	26	12	138	71	223	80	70	30	1 178	801	1 979	151
152	1	—	11	3	26	10	7	3	143	59	202	152
153	22	11	115	59	164	56	54	23	876	630	1 506	153
	3	1	12	9	33	14	9	4	159	112	271	154
154	11	8	37	19	76	20	13	7	621	413	1 034	154
155	4	4	22	13	43	10	7	4	377	213	590	155
156	3	1	6	3	20	7	3	1	108	86	194	156
	4	3	9	3	13	3	3	2	136	114	250	a
	3	3	9	3	12	3	3	2	130	109	239	b
	1	—	—	—	1	—	—	—	6	5	11	c
157	37	20	103	49	288	139	92	36	1 368	1 186	2 554	157
	37	20	103	49	288	139	92	36	1 368	1 186	2 554	a
	7	4	12	6	40	16	18	3	176	115	291	b
	15	8	23	17	130	71	20	10	320	387	707	c
	5	2	29	10	55	28	33	12	479	386	865	d
	1	1	—	—	6	1	1	1	24	33	57	e
	9	5	39	16	57	23	20	10	369	265	634	f

veneree. (d) ma comprese le emorragie. (e) non comprese le emorragie. (f) non specificate come conseguenza d'aborto. (g) embolia o morte (h) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli altri organi della locomozione. (n) non compresi i nati morti.

Segue: TAVOLA VI. — Morti, durante l'anno 1931,

B. — Per Compar

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

tinenti e Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia . . . . .</b>	<b>1 595</b>	<b>706</b>	<b>1 409</b>	<b>688</b>	<b>2 283</b>	<b>1 081</b>	<b>2 684</b>	<b>1 270</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	561	258	701	344	1 367	679	2 006	955
159	Nascita prematura (b) . . . . .	745	322	523	256	530	248	391	191
160	Conseguenza del parto (b) . . . . .	37	13	17	10	25	8	10	3
	a) con indicazione di operazione cesarea . . . . .	1	1	1	1	1	—	2	—
	b) senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	36	12	16	9	24	8	8	3
161	Altre malattie speciali dell'infanzia.	252	113	168	68	361	146	277	121
	a) ateletasia . . . . .	15	5	29	9	43	22	24	9
	b) ittero dei neonati . . . . .	53	20	30	10	90	23	53	22
	c) sclerema e altre . . . . .	184	88	109	49	228	101	200	90
	<b>XVI. - Senilità . . . . .</b>	<b>1 596</b>	<b>848</b>	<b>2 262</b>	<b>1 254</b>	<b>4 080</b>	<b>2 286</b>	<b>3 351</b>	<b>1 863</b>
162	Senilità . . . . .	1 596	848	2 262	1 254	4 080	2 286	3 351	1 863
	a) con demenza senile . . . . .	31	21	28	16	71	36	15	9
	b) senza demenza senile . . . . .	1 565	827	2 234	1 238	4 009	2 250	3 336	1 854
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali . . . . .</b>	<b>1 077</b>	<b>252</b>	<b>652</b>	<b>205</b>	<b>1 507</b>	<b>492</b>	<b>956</b>	<b>268</b>
163	Suicidi . . . . .	201	43	89	27	265	98	152	45
171	Suicidio per ingestione di veleni (c)	22	10	13	8	87	56	19	14
164	— da gas tossici . . . . .	1	—	—	—	2	—	—	—
165	— per impiccamento o strangolam.	46	8	29	7	27	5	18	2
166	— per annegamento . . . . .	28	8	15	7	27	14	78	21
167	— con arma da fuoco . . . . .	62	4	17	1	65	4	25	2
168	— con arma da punta e da taglio.	8	2	8	2	7	2	—	—
169	— per precipitazione da luogo elev.	30	10	6	2	44	15	8	5
170	— per schiacciamento . . . . .	2	—	1	—	3	1	3	1
171	Suicidi con altri mezzi . . . . .	2	1	—	—	3	1	—	—
172	Omicidi . . . . .	53	13	57	19	151	35	83	21
175	Infanticidio (— un anno) . . . . .	4	3	4	2	2	1	2	1
172	a) subito dopo la nascita . . . . .	3	2	3	2	1	—	2	1
	b) altri, prima d'un anno . . . . .	1	1	1	—	1	—	—	—
173	Omicidi con arma da fuoco (d) . . . . .	17	3	16	3	74	19	33	6
174	Omicidi arma da taglio e da punta (d)	18	4	29	5	47	6	32	9
175	Omicidi con altri mezzi (d) . . . . .	14	3	17	9	28	9	16	5
176	Morti accidentali . . . . .	811	193	500	159	1 081	357	713	200
194	Morsi o punture d'animali velenosi.	—	—	1	—	2	—	—	—
176	Avvelenamenti da alimenti guasti.	6	1	—	—	1	1	2	2
177	Assorbimento di gas tossici . . . . .	14	6	6	2	13	2	6	—
178	Altri avvelenam. accident. acuti (e).	7	1	5	3	16	8	7	1
179	Per incendio . . . . .	9	3	3	1	22	11	2	2
180	Per ustioni accidentali (f) . . . . .	123	63	130	72	277	144	136	84
181	Per soffocazione meccanica accid. . . . .	4	1	4	2	2	—	2	1
182	Per annegamento accidentale . . . . .	79	14	43	9	88	27	62	12
183	Per trauma accid. d'arma da fuoco (g)	14	2	10	—	20	2	13	1
184	Per trauma acc. arma punta o taglio (g)	1	—	—	—	2	—	2	—
185	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h)	484	93	230	57	552	143	361	77
186	Per violenze di animali . . . . .	12	2	12	2	17	3	15	1
188	Per freddo eccessivo . . . . .	6	1	10	3	14	2	15	4
190	Per caldo eccessivo . . . . .	7	—	24	4	18	6	48	9
191	Per fulmine . . . . .	4	1	5	1	2	1	7	1
192	Per accidenti dovuti a corrente elettr.	19	2	5	—	18	1	10	1
193	Per altri accidenti . . . . .	22	3	12	3	17	6	25	4
194	a) corpi estranei . . . . .	5	3	2	1	7	3	5	1
	b) altri . . . . .	17	—	10	2	10	3	20	3
195	Morte violenta, ecc. (i) . . . . .	12	3	6	—	10	2	8	2
196	Per ferite di guerra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate.</b>	<b>326</b>	<b>124</b>	<b>220</b>	<b>99</b>	<b>385</b>	<b>137</b>	<b>175</b>	<b>67</b>
199	Morte improvvisa . . . . .	236	105	157	61	347	116	147	52
200	Cause non specificate o mal definite.	30	19	63	38	38	21	28	15

LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	M F	
685	286	1 196	614	2 794	1 318	764	340	15 850	13 159	29 009	
388	180	770	397	2 075	979	368	171	8 002	6 917	14 919	158
127	53	274	147	491	235	299	132	5 294	4 417	9 711	159
4	1	16	3	17	11	10	4	272	179	451	160
—	—	2	—	1	—	—	—	16	13	29	a
4	1	14	3	16	11	10	4	256	166	422	b
86	46	135	67	211	93	87	33	2 282	1 646	3 928	161
6	3	11	6	11	4	17	7	225	139	364	a
22	11	31	16	44	13	17	7	512	283	795	b
58	32	94	45	156	76	53	19	1 545	1 224	2 769	c
821	479	2 367	1 342	6 671	3 666	1 102	607	18 633	22 602	41 235	
821	479	2 367	1 342	6 671	3 666	1 102	607	18 633	22 602	41 235	162
4	2	17	12	15	8	3	1	448	338	786	a
817	477	2 350	1 330	6 656	3 658	1 099	606	18 185	22 264	40 449	b
315	84	735	245	1 538	409	451	102	14 367	4 787	19 154	
33	9	54	15	289	85	92	14	3 142	999	4 141	163 a
1	—	8	5	32	16	5	2	204	238	442	171
11	1	14	2	74	26	31	3	70	41	111	163
6	3	4	1	54	21	14	6	828	192	1 020	164
5	—	21	2	85	8	23	—	485	248	733	165
3	1	3	2	8	—	7	1	873	54	927	166
4	3	3	2	17	10	6	2	150	39	189	167
3	1	1	1	9	—	3	—	278	141	419	168
—	—	—	—	4	2	—	—	238	38	276	169
—	—	—	—	—	—	—	—	16	8	24	170
31	6	110	25	141	30	47	6	799	278	1 077	171 a
2	—	5	3	2	1	—	—	25	32	57	172
1	—	3	1	—	—	—	—	19	24	43	a
1	—	2	—	—	—	—	—	6	8	14	b
10	3	56	8	84	9	29	2	375	108	483	173
11	—	38	13	31	12	8	3	236	75	311	174
8	3	11	1	24	8	10	1	163	63	226	175
251	69	564	203	1 084	286	311	82	10 325	3 478	13 803	176 a
—	—	2	—	—	—	—	—	9	2	11	176
1	—	8	1	2	1	—	—	27	18	45	177
2	1	4	1	13	3	7	—	126	36	162	178
5	2	1	1	10	2	5	2	81	62	143	179
1	1	9	3	5	3	3	1	52	40	92	180
53	31	164	96	175	110	60	34	921	1 106	2 027	181
2	1	—	—	2	—	1	1	39	25	64	182
24	6	34	7	67	9	40	5	1 326	336	1 662	183
6	—	19	1	26	4	1	—	220	23	243	184
1	1	1	—	2	1	—	—	28	6	34	185
87	15	240	74	580	129	151	31	6 241	1 588	7 829	186
5	—	7	2	28	—	2	—	182	31	213	188
4	—	10	4	24	3	9	2	140	35	175	190
53	6	42	8	101	14	13	4	357	73	430	191
4	1	5	1	9	2	1	—	66	13	79	192
2	1	11	2	15	—	8	1	210	15	225	193
1	—	7	2	25	4	9	1	300	69	369	194
—	—	3	2	8	4	5	1	70	41	111	a
1	—	4	—	17	—	4	—	230	28	258	b
—	—	7	2	24	8	1	—	100	32	132	195
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	196
62	26	216	103	575	251	290	131	3 214	2 085	5 299	
53	24	173	83	503	212	138	59	2 910	1 791	4 701	199
9	2	43	20	72	39	152	72	304	294	598	200

TAVOLA VII. — Individui che morirono, nel 1931, nel Comune ove avevano dimora

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, PIEMONTE (stabile, occasionale, non indicata, TOTALE), LIGURIA (stabile, occasionale, non indicata, TOTALE). Rows include categories like 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', etc.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno.

Table with columns: LOMBARDIA, VENÈZIA TRIDENTINA, VENEZIA, VENÈZIA GIULIA E ZARA, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows correspond to the same categories as the first table, with numerical data for each region.

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA VII. — Individui che morirono, nel 1931, nel Comune ove avevano dimora

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA			
		stabile	occasionale	non indicata	TOTALE	stabile	occasionale	non indicata	TOTALE
97, 93	Arteriosclerosi (a) e cangrena . . .	503	27	—	535	162	4	—	166
dal 99 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio . . .	179	9	—	188	54	6	—	60
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio.</b>	8093	516	15	8629	3065	192	7	3264
106	Bronchiti . . . . .	1380	56	2	1438	430	20	—	450
107, 108, 139	Polmoniti . . . . .	6182	402	13	6597	2378	145	6	2529
110	Pleuriti . . . . .	189	27	—	216	93	12	—	105
104, 105,	Altre mal. app. resp. escl. la tbc. . .	347	31	—	378	164	15	1	180
dal 111 al 114	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	4579	504	13	5096	1458	155	5	1618
117	Ulcera dello stom. e del duodeno . . .	177	39	—	216	72	13	2	87
119	Enteriti al disotto di due anni . . .	1938	158	6	2102	453	31	1	485
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre). .	630	48	1	679	222	17	2	241
121	Appendicite . . . . .	183	66	2	251	69	15	—	84
122	Ernia, occlusione intestinale . . . .	366	89	1	456	132	32	—	164
124	Cirrosi del fegato . . . . .	629	30	1	660	216	6	—	222
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (b). . .	251	24	—	275	126	16	—	142
115, 116, 118,	Altre mal. dell'apparato digerente. . .	405	50	2	457	168	25	—	193
123, 123, 129	<b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale . .</b>	1462	126	1	1589	519	54	2	575
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	1008	68	—	1076	349	32	2	383
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c). . . .	35	7	—	42	16	4	—	20
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	27	4	—	31	11	2	—	13
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori. . .	128	8	—	136	42	5	—	47
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. . . .	11	1	—	12	10	1	—	11
137	Malattie della prostata . . . . .	222	27	—	249	75	7	—	82
138, 139	Malattie degli organi genitali (d). . . .	31	11	1	43	16	3	—	19
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	143	42	1	186	63	9	—	72
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . . .	14	6	—	20	5	1	—	6
144	Emorragia puerperale . . . . .	30	7	—	37	7	2	—	9
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali . . . .	65	16	1	82	22	2	—	24
146, 147	Tossiemia della gravidanza, ecc. (e) . . .	19	7	—	26	12	1	—	13
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	15	6	—	21	17	3	—	20
	<b>XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	73	13	—	86	30	9	1	40
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul. . .	73	13	—	86	30	9	1	40
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	58	10	—	68	28	10	—	38
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f) . . .	58	10	—	68	28	10	—	38
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti.</b>	137	13	—	150	47	1	—	48
157	Vizi di conformazione congeniti (g) . . .	137	13	—	150	47	1	—	48
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia . . . . .</b>	1311	87	6	1404	468	26	3	497
158	Debolezza congenita . . . . .	448	20	1	469	135	8	1	144
159	Nascita prematura (h) . . . . .	530	51	3	584	216	13	1	230
160	Conseguenze del parto . . . . .	25	3	—	28	23	1	—	24
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . .	308	13	2	323	94	4	1	99
	<b>XVI. - Senilità . . . . .</b>	2904	118	4	3026	743	32	2	777
162	Senilità . . . . .	2904	118	4	3026	743	32	2	777
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali. . . .</b>	1405	456	26	1887	548	162	13	728
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	434	90	5	529	173	43	9	225
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	57	14	1	72	23	5	3	31
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	910	349	20	1279	351	113	5	469
195	Altre morti violente (i) . . . . .	4	2	—	6	1	1	—	3
196, 197	Ferite di guerra (l) . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—
	<b>XVIII. - Cause di morte non determin. .</b>	643	69	5	717	163	11	2	176
199, 200	Cause non specific. o mal definite . . . .	643	69	5	717	163	11	2	176

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione di civili da parte di

stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	LOMBARDIA				VENEZIA TRIDENTINA				VENEZIA GIULIA E ZARA				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO				
	stabile	occasionale	non indicata	TOTALE	stabile	occasionale	non indicata	TOTALE	stabile	occasionale	non indicata	TOTALE					
97, 98	727	55	1	783	109	5	—	114	836	65	4	905	187	10	—	197	97, 98
dal 99 al 103	226	16	—	242	30	3	—	33	108	14	—	122	32	8	—	40	dal 99 al 103
	13502	1043	10	14555	1316	89	1	1406	7436	536	13	7985	2100	137	2	2239	
106	2149	111	1	2261	210	8	—	218	1322	44	2	1368	322	4	—	326	106
107, 108, 109	10420	782	7	11209	984	71	—	1055	5531	382	8	5921	1504	113	2	1619	107, 108, 109
110	377	68	2	447	30	3	—	33	171	58	3	232	52	9	—	61	110
104, 105,	556	82	—	638	92	7	1	100	412	52	—	464	222	11	—	233	104, 105,
dal 111 al 114	12194	911	11	13116	977	136	1	1114	5682	681	6	6369	1113	120	1	1234	dal 111 al 114
117	226	45	—	271	43	23	—	66	183	74	2	259	89	31	—	120	117
119	8307	395	6	8708	535	28	1	564	3609	129	2	3740	596	11	1	608	119
120	1068	114	5	1187	84	9	—	93	553	82	—	635	108	10	—	118	120
121	311	79	—	390	39	28	—	67	165	119	1	285	38	12	—	50	121
122	383	73	—	456	58	24	—	82	221	100	—	321	78	15	—	93	122
124	726	55	—	781	105	4	—	109	330	37	—	367	71	7	—	78	124
125, 126, 127	347	32	—	379	44	8	—	52	227	63	1	291	54	11	—	65	125, 126, 127
115, 116, 118,	826	118	—	944	69	12	—	81	394	77	—	471	79	23	—	102	115, 116, 118,
123, 123, 129	1985	241	2	2228	227	27	—	254	1302	193	13	1508	303	38	—	341	123, 128, 129
130, 131, 132	1438	156	1	1595	153	14	—	167	935	110	7	1052	237	20	—	257	130, 131, 132
133	60	10	—	70	6	—	—	6	39	12	3	54	7	2	—	9	133
134	47	12	—	59	2	1	—	3	15	1	—	16	7	3	—	10	134
135	189	18	—	207	24	1	—	25	99	13	—	112	15	2	—	17	135
136	20	5	—	25	—	—	—	—	8	2	—	10	5	—	—	5	136
137	193	24	1	218	35	9	—	44	192	42	—	234	26	6	—	32	137
138, 139	38	16	—	54	7	2	—	9	14	13	3	30	6	5	—	11	138, 139
	214	109	—	323	59	5	—	64	139	113	—	252	36	16	—	52	
141, 142, 143	19	10	—	29	4	3	—	7	8	9	—	17	3	1	—	4	141, 142, 143
144	37	23	—	60	11	—	—	11	30	22	—	52	5	1	—	6	144
140, 145	89	37	—	126	25	—	—	25	44	39	—	83	15	7	—	22	140, 145
146, 147	38	20	—	58	8	—	—	8	38	26	—	64	5	2	—	7	146, 147
148, 149, 150	31	19	—	50	11	2	—	13	19	17	—	36	8	5	—	13	148, 149, 150
	181	38	—	219	15	5	—	20	132	60	2	164	35	11	1	47	
151, 152, 153	181	38	—	219	15	5	—	20	102	60	2	164	35	11	1	47	151, 152, 153
	126	28	—	154	9	6	—	15	72	35	—	107	27	3	—	30	
154, 155, 156	126	28	—	154	9	6	—	15	72	35	—	107	27	3	—	30	154, 155, 156
	295	19	1	315	38	2	—	40	206	9	1	216	41	2	1	44	
157	295	19	1	315	38	2	—	40	206	9	1	216	41	2	1	44	157
	3465	255	30	3750	470	39	1	510	2874	164	11	3049	865	32	1	898	
158	1235	47	6	1288	195	13	—	208	1466	48	5	1519	570	14	1	585	158
159	1583	155	17	1755	166	18	—	184	995	76	4	1075	216	13	—	229	159
160	55	20	1	76	10	2	—	12	38	4	—	42	8	1	—	9	160
161	592	33	6	631	99	6											

Segue: TAVOLA VII. — Individui che morirono, nel 1931, nel Comune ove avevano dimora

stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	EMILIA				TOSCANA				MARCHE				UMBRIA				LAZIO				ABRUZZI E MOLISE				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	
	<b>Complesso . . .</b>	<b>37798</b>	<b>4054</b>	<b>91</b>	<b>41943</b>	<b>32468</b>	<b>3358</b>	<b>19</b>	<b>35845</b>	<b>15512</b>	<b>808</b>	<b>23</b>	<b>16343</b>	<b>8504</b>	<b>514</b>	<b>12</b>	<b>9030</b>	<b>27593</b>	<b>3856</b>	<b>35</b>	<b>31484</b>	<b>25344</b>	<b>721</b>	<b>47</b>	<b>26112</b>	
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie .</b>	<b>5250</b>	<b>936</b>	<b>16</b>	<b>6252</b>	<b>4861</b>	<b>911</b>	<b>3</b>	<b>5775</b>	<b>2050</b>	<b>217</b>	<b>1</b>	<b>2268</b>	<b>1170</b>	<b>118</b>	<b>—</b>	<b>1288</b>	<b>4331</b>	<b>939</b>	<b>—</b>	<b>5270</b>	<b>3010</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>3094</b>	
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	342	88	—	430	239	46	—	285	168	15	—	183	108	10	—	118	226	51	—	277	329	15	1	345	1, 2
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
6	Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	Morbillo . . . . .	311	22	—	333	59	5	—	64	62	1	—	63	12	2	—	14	327	26	—	353	205	3	—	208	7
8	Scarlattina . . . . .	19	2	—	21	18	1	—	19	16	1	—	17	8	1	—	9	309	31	—	340	45	—	—	45	8
9	Tosse convulsa . . . . .	212	9	1	222	172	7	—	179	77	2	—	79	74	2	—	76	119	7	—	126	93	1	—	95	9
10	Difterite . . . . .	172	67	1	240	133	29	—	162	129	8	—	137	59	3	—	62	224	39	—	263	165	2	1	168	10
11	Influenza . . . . .	715	37	—	752	675	38	—	713	301	8	—	309	201	7	—	208	551	43	—	594	534	5	1	540	11
13	Dissenteria . . . . .	15	2	—	17	9	2	—	11	6	—	1	7	9	1	—	10	6	1	—	7	34	—	—	34	13
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1938	503	11	2452	2199	563	3	2765	677	128	—	805	412	56	—	468	1290	477	—	1767	773	26	—	800	23
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	833	126	1	960	731	105	—	836	322	28	—	350	172	24	—	196	526	128	—	654	404	12	—	416	dal 24 al 32
34	Sifilide . . . . .	38	14	—	52	35	4	—	39	19	5	—	24	7	2	—	9	123	17	—	140	49	1	—	50	34
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	314	54	—	368	286	58	—	344	100	13	—	113	38	5	—	43	223	44	—	267	107	4	—	111	36
38	Malaria . . . . .	9	3	—	12	29	3	—	32	8	1	—	9	3	—	—	3	173	18	—	191	94	6	—	100	38
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	66	7	1	74	31	8	—	39	14	1	—	15	6	1	—	7	33	10	—	43	39	1	—	40	dal 39 al 42
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	266	52	1	319	245	42	—	287	151	6	—	157	60	4	—	64	199	47	—	246	139	2	1	142	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>3388</b>	<b>328</b>	<b>5</b>	<b>3421</b>	<b>3149</b>	<b>221</b>	<b>1</b>	<b>3371</b>	<b>840</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>883</b>	<b>414</b>	<b>22</b>	<b>—</b>	<b>436</b>	<b>1417</b>	<b>301</b>	<b>2</b>	<b>1720</b>	<b>703</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>730</b>	
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni .	3047	310	5	3362	3108	211	1	3320	824	40	1	865	406	20	—	426	1390	284	2	1676	687	26	1	714	dal 45 al 53
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	41	18	—	59	41	10	—	51	16	2	—	18	8	—	—	10	27	17	—	44	16	—	—	16	54, 55
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . . . . .</b>	<b>685</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>750</b>	<b>532</b>	<b>48</b>	<b>—</b>	<b>550</b>	<b>279</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>285</b>	<b>143</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>153</b>	<b>497</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>560</b>	<b>338</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>346</b>	
56	Reumatismo articolare acuto . . .	198	12	—	210	124	16	—	140	58	—	—	58	33	2	—	35	70	6	—	76	71	—	—	72	56
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . .	56	2	—	58	42	3	—	45	22	1	—	23	13	—	—	13	45	5	—	50	53	—	—	53	57, 58
59	Diabete mellito . . . . .	245	31	1	277	254	15	—	269	108	4	—	112	61	5	—	66	268	39	—	307	97	4	—	101	59
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	65	4	—	69	12	1	—	13	33	—	—	33	11	—	—	11	22	—	1	23	41	—	—	41	dal 60 al 64
66	Mal. ghiand. tiroide e ghian. parat.	41	3	—	44	25	4	—	29	20	—	—	20	8	—	—	8	8	3	—	11	17	1	—	18	66
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	80	12	—	92	45	9	—	54	38	1	—	39	17	3	—	20	84	9	—	93	59	2	—	61	65, 67, 68, 69
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . . . . .</b>	<b>220</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>250</b>	<b>153</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	<b>172</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>74</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>48</b>	<b>134</b>	<b>21</b>	<b>—</b>	<b>155</b>	<b>127</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>133</b>	
71	Anemie perniciose ed altre . . .	83	6	1	90	55	8	—	63	21	—	—	21	14	—	—	14	47	9	—	56	56	1	—	57	71
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . . .	137	23	—	160	98	11	—	109	48	5	—	53	32	2	—	34	87	12	—	99	71	2	—	73	70, 72, 73, 74
	<b>V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>16</b>	
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . .	21	18	—	39	21	13	—	34	18	4	—	22	15	1	—	16	21	6	—	27	13	2	—	15	75
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	2	1	—	3	4	—	—	4	2	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	1	76, 77
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f) . . . . .</b>	<b>5505</b>	<b>460</b>	<b>8</b>	<b>5973</b>	<b>4806</b>	<b>367</b>	<b>—</b>	<b>5173</b>	<b>2821</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>2930</b>	<b>1503</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>1578</b>	<b>3680</b>	<b>394</b>	<b>2</b>	<b>4076</b>	<b>3714</b>	<b>105</b>	<b>7</b>	<b>3826</b>	
79	Meningite semplice . . . . .	193	28	—	221	137	13	—	150	53	8	—	61	25	2	—	27	127	20	—	147	105	3	—	108	79
80	Atassia locomotrice progressiva .	28	1	—	29	22	2	—	24	7	—	—	7	2	1	—	3	15	3	—	18	13	1	—	14	80
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	4712	264	6	4982	4071	218	—	4289	2337	64	2	2403	1310	46	3	1359	2819	267	—	3086	2922	45	5	2972	82
83	Paralisi progressiva degli alienati.	21	18	—	39	22	31	—	53	15	7	—	22	5	4	—	9	30	15	—	45	15	1	—	16	83
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	18	44	1	63	36	32	—	68	12	8	—	20	6	6	—	12	24	22	—	46	28	30	—	58	84
85	Epilessia . . . . .	51	39	—	90	94	24	—	118	26	5	—	31	22	6	—	28	52	6	—	58	76	10	—	86	85
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	400	41	—	441	370	40	—	410	346	10	1	357	126	6	—	132	563	44	2	609	535	12	2	549	78, 81, 86, 87
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi.	82	25	1	108	54	7	—	61	25	4	—	29	7	1	—	8	50	17	—	67	20	3	—	23	88, 89
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio . . . . .</b>	<b>5330</b>	<b>348</b>	<b>7</b>	<b>5735</b>	<b>4691</b>	<b>333</b>	<b>—</b>	<b>5024</b>	<b>1965</b>	<b>41</b>	<b>—</b>	<b>2006</b>	<b>1134</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>1188</b>	<b>3564</b>	<b>358</b>	<b>7</b>	<b>3929</b>	<b>3116</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>3163</b>	
90	Pericardite . . . . .	12	3	—	15	6	1	—	7	3	—	—	3	3	2	—	5	4	2	—	6	9	—	—	9	90
91	Endocardite acuta . . . . .	19	3	—	22	30	1	—	31	8	1	—	9	10	2	—	12	34	9	—	43	20	—	—	20	91
92	Endocardite cr. compr. le aff. valv.	1510	64	5	1579	1566	96	—	1662	739	16	—	755	445	15	1	461	1159								

Segue: TAVOLA VII. — Individui che morirono, nel 1931, nel Comune ove avevano dimora

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	EMILIA				TOSCANA			
		stabile	occasione	non indicata	TOTALE	stabile	occasione	non indicata	TOTALE
97, 98 dal 99 al 103	Arteriosclerosi (a) e cangrena . .	590	47	—	637	442	32	—	474
	Altre mal. dell'appar. circolatorio	110	13	—	123	100	18	—	118
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio .</b>	<b>6747</b>	<b>462</b>	<b>16</b>	<b>7225</b>	<b>5384</b>	<b>417</b>	<b>5</b>	<b>5906</b>
106	Bronchiti . . . . .	1173	48	—	1221	998	43	1	1042
107, 108, 109, 110	Polmoniti . . . . .	5137	367	15	5519	3986	326	4	4316
	Pleuriti . . . . .	144	24	—	168	137	26	—	163
104, 105 dal 111 al 114	Altre mal. app. resp. escl. la tbc. . .	293	23	1	317	263	22	—	235
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	<b>3411</b>	<b>436</b>	<b>8</b>	<b>3855</b>	<b>2830</b>	<b>354</b>	<b>2</b>	<b>3186</b>
117	Ulcera dello stom. e del duodeno	133	43	1	177	162	34	—	196
119	Enteriti al disotto di due anni . .	1639	68	2	1709	1047	46	1	1094
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre)	379	86	2	467	419	74	—	493
121	Appendicite . . . . .	178	68	3	249	137	53	—	190
122	Ernia, occlusione intestinale . . .	216	64	—	280	267	57	—	324
124	Cirrosi del fegato . . . . .	337	10	—	347	298	20	—	318
125, 125, 127, 115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente	198	39	—	237	188	26	—	214
	<b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	<b>1107</b>	<b>146</b>	<b>3</b>	<b>1256</b>	<b>1016</b>	<b>117</b>	<b>—</b>	<b>1133</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	752	78	1	831	718	63	—	781
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c) . .	33	8	1	42	28	6	—	34
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . .	25	5	—	30	26	6	—	32
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	104	10	—	114	119	11	—	130
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc .	7	2	—	9	10	6	—	16
137	Malattie della prostata . . . . .	147	27	—	174	99	17	—	116
138, 139	Malattie degli organi genitali (d) .	39	16	1	56	16	8	—	24
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	<b>143</b>	<b>63</b>	<b>—</b>	<b>206</b>	<b>99</b>	<b>36</b>	<b>—</b>	<b>135</b>
141, 142, 143, 144	Accidenti della gravidanza . . . .	11	7	—	18	6	3	—	9
	Emorragia puerperale . . . . .	21	6	—	27	16	7	—	23
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali .	57	22	—	79	47	12	—	59
146, 147	Tossimia della gravidanza, ecc. (e)	37	17	—	54	17	10	—	27
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	17	11	—	28	13	4	—	17
	<b>XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	<b>98</b>	<b>31</b>	<b>—</b>	<b>129</b>	<b>111</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>126</b>
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	98	31	—	129	111	14	1	126
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>—</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>103</b>
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f)	68	20	—	88	87	16	—	103
	<b>XIV. Vizi di conformazione congeniti .</b>	<b>152</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>162</b>	<b>141</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>149</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (g)	152	10	—	162	141	8	—	149
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia . . . . .</b>	<b>2324</b>	<b>143</b>	<b>9</b>	<b>2476</b>	<b>1423</b>	<b>87</b>	<b>—</b>	<b>1515</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	1091	44	3	1138	534	27	—	561
159	Nascita prematura (h) . . . . .	865	74	4	943	687	46	—	733
160	Conseguenze del parto . . . . .	43	6	—	49	39	2	—	41
161	Altre mal. speciali dell'infanzia . .	325	19	2	346	168	12	—	180
	<b>XVI. - Senilità . . . . .</b>	<b>2019</b>	<b>131</b>	<b>5</b>	<b>2155</b>	<b>1970</b>	<b>147</b>	<b>2</b>	<b>2119</b>
162	Senilità . . . . .	2019	131	5	2155	1970	147	2	2119
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali .</b>	<b>1323</b>	<b>355</b>	<b>9</b>	<b>1687</b>	<b>969</b>	<b>215</b>	<b>4</b>	<b>1188</b>
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	464	69	1	534	252	33	1	286
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	36	12	2	50	36	7	1	44
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	811	273	6	1090	680	175	2	857
195	Altre morti violente (i) . . . . .	12	1	—	13	1	—	—	1
196, 197	Ferite di guerra (l) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVIII. - Cause di morte non determin.</b>	<b>255</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>281</b>	<b>246</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>232</b>
199, 200	Cause non specific. o mal definite.	255	23	3	281	246	35	1	232

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacini e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti. (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione di civili da

stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	MARCHE				UMBRIA				LAZIO				ABRUZZI E MOLISE				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	stabile	occasione	non indicata	TOTALE	stabile	occasione	non indicata	TOTALE	stabile	occasione	non indicata	TOTALE	stabile	occasione	non indicata	TOTALE	
97, 98 dal 99 al 103	201	3	—	204	94	4	1	99	359	55	1	415	217	3	—	220	97, 98 dal 99 al 103
	24	2	—	26	16	2	—	18	83	23	1	107	34	1	—	35	
	<b>2326</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>2407</b>	<b>1420</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>1474</b>	<b>4652</b>	<b>510</b>	<b>5</b>	<b>5167</b>	<b>4145</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>4221</b>	
106	508	16	—	524	310	9	—	319	673	49	4	726	902	8	2	912	106
107, 108, 109, 110	1634	50	2	1686	1033	40	1	1074	3636	402	1	4039	2932	55	4	2991	107, 108, 109, 110
	53	3	—	56	27	2	—	29	134	18	—	152	72	3	—	75	
104, 105 dal 111 al 114	131	10	—	141	50	2	—	52	209	41	—	250	239	4	—	243	104, 105, dal 111 al 114
	<b>1476</b>	<b>95</b>	<b>3</b>	<b>1574</b>	<b>897</b>	<b>60</b>	<b>—</b>	<b>957</b>	<b>3827</b>	<b>471</b>	<b>7</b>	<b>4305</b>	<b>4559</b>	<b>163</b>	<b>6</b>	<b>4728</b>	
117	55	11	—	66	46	4	—	50	127	43	—	170	70	11	—	81	117
119	804	22	3	829	464	13	—	477	2176	193	5	2374	3082	62	4	3148	119
120	157	9	—	166	106	9	—	115	468	36	—	504	746	23	1	770	120
121	51	17	—	68	43	16	—	59	100	42	—	142	53	20	1	74	121
122	76	11	—	87	50	11	—	61	157	46	—	203	124	17	—	141	122
124	138	4	—	142	84	1	—	85	230	25	—	255	155	4	—	159	124
125, 125, 127, 115, 116, 118, 123, 128, 129	62	5	—	67	25	1	—	26	146	37	—	183	82	8	—	90	125, 126, 127, 115, 116, 118, 123, 128, 129
	<b>133</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>149</b>	<b>79</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>84</b>	<b>223</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>274</b>	<b>247</b>	<b>18</b>	<b>—</b>	<b>265</b>	
	<b>474</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>502</b>	<b>234</b>	<b>17</b>	<b>—</b>	<b>251</b>	<b>1158</b>	<b>154</b>	<b>2</b>	<b>1314</b>	<b>887</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>914</b>	
130, 131, 132	337	21	1	359	168	10	—	178	901	99	1	1001	720	15	1	736	130, 131, 132
133	18	1	—	19	3	1	—	4	37	5	—	42	27	1	—	28	133
134	13	2	—	15	9	1	—	10	16	6	—	22	19	2	—	21	134
135	49	—	—	49	21	3	—	24	62	12	1	75	46	1	—	47	135
136	8	—	—	8	2	—	—	2	24	3	—	27	5	1	—	6	136
137	41	2	—	43	24	2	—	26	103	25	—	128	55	1	—	56	137
138, 139	8	1	—	9	7	—	—	7	15	4	—	19	15	5	—	20	138, 139
	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>70</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>50</b>	<b>151</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>201</b>	<b>130</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>147</b>	
141, 142, 143, 144	4	—	—	4	2	—	—	2	10	5	—	15	5	1	—	6	141, 142, 143, 144
	12	2	—	14	8	1	—	9	26	5	—	31	31	6	—	37	144
140, 145	27	3	—	30	14	2	—	16	68	21	—	89	34	3	—	37	140, 145
146, 147	9	2	—	11	12	3	—	15	30	9	—	39	35	2	—	37	146, 147
148, 149, 150	8	3	—	11	5	3	—	8	17	10	—	27	25	4	1	30	148, 149, 150
	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>21</b>	<b>96</b>	<b>32</b>	<b>—</b>	<b>128</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>86</b>	
151, 152, 153	40	2	—	42	18	3	—	21	96	32	—	128	78	8	—	86	151, 152, 153
	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>31</b>	
154, 155, 156	29	7	—	36	11	5	—	16	49	15	—	64	27	4	—	31	154, 155, 156
	<b>84</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>49</b>	<b>159</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>172</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>137</b>	
157	84	—	—	84	47</												

Segue: TAVOLA VII. — Individui che morirono, nel 1931, nel Comune ove avevano dimora

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA				PUGLIE				LUCANIA			
		stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE
	<b>Complesso . . .</b>	<b>56948</b>	<b>1962</b>	<b>85</b>	<b>58995</b>	<b>44255</b>	<b>1089</b>	<b>37</b>	<b>45381</b>	<b>11334</b>	<b>253</b>	<b>27</b>	<b>11614</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie . . .</b>	<b>6483</b>	<b>311</b>	<b>8</b>	<b>6802</b>	<b>6415</b>	<b>286</b>	<b>4</b>	<b>6705</b>	<b>1717</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>1753</b>
1,2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	537	24	—	561	418	19	—	437	101	3	—	104
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	359	2	—	361	319	3	—	322	162	2	—	164
8	Scarlattina . . . . .	81	—	—	81	81	2	1	84	141	—	—	141
9	Tosse convulsa . . . . .	230	—	—	230	100	2	—	102	30	1	—	31
10	Difterite . . . . .	276	4	2	282	86	3	1	90	33	1	—	34
11	Influenza . . . . .	1322	33	2	1357	1528	17	—	1545	313	4	1	318
13	Dissenteria . . . . .	42	—	—	42	15	—	—	15	26	—	—	26
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1828	150	1	1979	1723	157	—	1880	197	2	—	199
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	701	43	1	745	782	21	1	804	120	2	—	122
34	Sifilide . . . . .	279	12	1	292	97	7	—	104	25	2	—	27
36	Infesz. purulenta e settic. non puer.	238	10	1	249	206	11	—	217	46	1	—	47
38	Malaria . . . . .	175	13	—	188	706	29	1	736	394	12	1	407
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti.	86	3	—	89	82	3	—	85	43	2	—	45
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie.	329	17	—	346	271	12	—	283	86	2	—	88
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>1269</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>1324</b>	<b>897</b>	<b>36</b>	<b>—</b>	<b>933</b>	<b>163</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>166</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni . . . .	1231	47	1	1279	864	27	—	891	160	3	—	163
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	38	7	—	45	33	9	—	42	3	—	—	3
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . .</b>	<b>857</b>	<b>39</b>	<b>—</b>	<b>896</b>	<b>568</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>583</b>	<b>129</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>133</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	150	7	—	157	101	2	—	103	24	—	—	24
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . .	104	2	—	106	54	—	—	54	15	1	—	16
59	Diabete mellito . . . . .	326	10	—	336	154	7	—	161	28	1	—	29
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	57	2	—	59	50	—	1	51	10	—	—	10
65, 67, 68, 69	Mal. ghiand. tiroide e ghian. parat.	25	—	—	25	20	—	—	20	13	—	—	13
	Altre malattie generali . . . . .	195	18	—	213	189	5	—	194	39	2	—	41
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . .</b>	<b>218</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>231</b>	<b>199</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>205</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>54</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	107	4	1	112	111	2	—	113	30	2	—	32
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . . . .	111	8	—	119	88	4	—	92	21	1	—	22
	<b>V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	21	9	—	30	6	—	—	6	4	—	—	4
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	6	—	—	6	2	—	—	2	—	—	—	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f) .</b>	<b>7171</b>	<b>305</b>	<b>9</b>	<b>7485</b>	<b>4856</b>	<b>102</b>	<b>3</b>	<b>4961</b>	<b>1155</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1167</b>
79	Meningite semplice . . . . .	216	4	—	220	226	3	—	229	38	2	—	40
80	Atassia locomotrice progressiva . . .	33	—	—	33	26	—	—	26	5	—	—	5
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	4897	92	5	4994	3468	56	—	3524	745	4	—	749
83	Paralisi progressiva degli alienati.	97	20	—	117	26	6	—	32	4	—	—	4
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	61	92	2	155	11	9	—	20	3	—	—	3
85	Epilessia . . . . .	135	53	—	188	60	10	—	70	25	1	—	26
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	1664	33	2	1699	983	17	3	1003	331	3	2	336
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi	68	11	—	79	56	1	—	57	4	—	—	4
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio .</b>	<b>7165</b>	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>7325</b>	<b>4190</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>4259</b>	<b>1041</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1057</b>
90	Pericardite . . . . .	17	—	1	18	10	—	—	10	3	—	—	3
91	Endocardite acuta . . . . .	25	—	—	25	25	1	—	26	2	—	—	2
92	Endocardite cr. compr. le aff. valv.	2423	37	2	2462	1737	23	—	1760	500	7	2	509
93	Malattie del miocardio . . . . .	2269	50	1	2320	924	14	—	938	205	1	—	206
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	407	10	1	418	138	4	—	142	39	1	—	40
95	Altre malattie del cuore . . . . .	1246	33	1	1280	893	14	1	908	178	1	—	179
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	71	2	1	74	34	1	—	35	2	—	—	2

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e

stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CALABRIE				SICILIA				SARDEGNA				REGNO				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	stabile	occa- sionale	non indicata	TOTALE	
	<b>27083</b>	<b>608</b>	<b>29</b>	<b>27720</b>	<b>63599</b>	<b>1608</b>	<b>178</b>	<b>65385</b>	<b>14848</b>	<b>629</b>	<b>33</b>	<b>15510</b>	<b>567339</b>	<b>41039</b>	<b>1027</b>	<b>609405</b>	
	3805	111	6	3922	7329	360	24	7713	3213	174	5	3392	79457	10259	119	89835	
	270	5	—	275	582	40	2	624	138	2	—	140	5427	729	4	6160	1,2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	3
	199	3	—	202	536	10	6	552	99	6	1	106	3274	127	9	3410	4
	501	7	—	508	268	8	—	276	207	2	—	209	1833	69	1	1903	7
	138	1	—	139	88	3	—	91	134	1	—	135	2873	97	2	2972	8
	146	2	1	149	239	11	1	251	82	3	—	85	2715	459	8	3182	9
	528	6	—	534	728	12	2	742	232	5	—	237	12755	517	15	13287	10
	35	—	—	35	130	8	1	139	44	—	—	44	483	26	2	511	11
	764	40	3	807	2221	178	5	2404	1168	100	2	1270	27284	5739	38	33061	12
	359	10	2	371	723	26	4	753	446	21	1	468	10281	1178	20	11479	13
	67	4	—	71	154	10	—	164	21	3	—	24	1224	126	1	1351	14
	149	9	—	158	619	19	1	639	105	5	—	110	3830	512	6	4348	15
	377	19	—	396	461	11	1	473	410	14	1	425	2947	148	6	3101	16
	58	—	—	58	166	7	—	173	24	3	—	27	788	64	1	853	17
	214	5	—	219	414	17	1	432	103	9	—	112	3735	468	6	4209	18
	586	20	—	606	1602	56	1	1659	392	29	—	421	28511	2575	29	31115	19
	573	17	—	590	1553	51	1	1605	380	26	—	406	27917	2397	28	30342	20
	13	3	—	16	49	5	—	54	12	3	—	15	594	178	1	773	21
	403	11	—	414	1020	37	10	1067	326	8	—	334	8902	639	18	9559	22
	82	1	—	83	102	3	1	106	30	—	—	30	1696	114	3	1813	23
	52	—	—	52	60	1	1	62	25	—	—	25	823	31	1	855	24
	92	3	—	95	394	11	—	405	75	3	—	78	3408	247	3	3658	25
	50	—	—	50	79	1	—	80	42	1	—	43	726	40	2	768	26
	16	1	—	17	37	1	—	38	12	—	—	12	510	63	—	573	27
	111	6	—	117	348	20	8	376	142	4	—	146	1739	144	9	1892	28
	131	7	—	138	432	14	1	447	106	6	—	112	2764	253	3	3020	29
	72	3	—	75	255	5	—	260	64	4	—	68	1271	92	2	1365	30
	59	4	—	63</													



Segue: TAVOLA VII. — Individui che morirono, nel 1931, nel Comune ove avevano dimora

Table with columns for NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and regional sub-totals for CAMPANIA, PUGLIA, and LUCANIA.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei nati morti. (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione di civili

stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno.

Large table with columns for CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA, REGNO, and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, detailing mortality statistics by region and cause.

reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi da parte di armate belligeranti.

TAVOLA VIII. — Morti, nell'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei Comuni

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA	
		capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni
	<b>Complesso</b>	12046	37236	9990	7711	19992	62209	1250	8617
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie</b>	2254	4749	1857	951	3649	9410	251	1402
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	74	302	154	39	229	864	9	55
3	Tifo petecchiale	—	1	—	—	—	1	—	—
6	Vaiolo	—	—	—	—	—	1	—	—
7	Morbillo	43	35	17	9	89	233	10	10
8	Scarlattina	7	11	4	6	22	14	2	19
9	Tosse convulsa	37	141	53	17	79	619	5	66
10	Difterite	40	117	30	34	186	311	10	60
11	Influenza	295	1308	125	235	424	1683	32	192
13	Dissenteria	2	9	2	1	5	42	1	18
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1243	1867	1065	390	1602	3631	131	674
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	270	501	207	127	475	1138	34	178
34	Sifilide	33	28	30	5	68	70	1	10
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	108	175	105	40	290	359	9	52
38	Malaria	2	7	6	4	5	24	1	1
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	4	19	5	3	4	45	—	4
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	96	228	54	41	171	375	6	63
	<b>II. - Tumori (neoplasie)</b>	1137	2327	957	461	1854	3632	135	698
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni	1063	2270	924	447	1805	3613	134	689
54, 55	Tumori non maligni (b)	74	57	33	14	49	79	1	9
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c)</b>	247	535	200	159	301	746	14	107
56	Reumatismo articolare acuto	43	145	24	20	52	166	4	20
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	21	68	11	15	16	57	2	9
59	Diabete mellito	121	229	139	89	163	262	6	37
dal 60 al 64	Avitaminosi	6	14	3	4	11	81	—	19
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat.	34	59	6	11	30	68	1	12
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali	22	70	17	20	29	112	1	10
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d)</b>	76	149	55	37	133	232	7	50
71	Anemie perniciose ed altre	36	64	20	12	48	106	4	32
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e)	40	85	35	25	85	126	3	18
	<b>V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni</b>	16	55	5	10	30	61	1	13
75	Alcoolismo acuto e cronico	15	51	3	10	22	56	1	12
76, 77	Avvelenamenti cronici	1	4	2	—	8	5	—	1
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f)</b>	1378	4714	1149	911	2158	7142	118	918
79	Meningite semplice	47	177	53	38	141	442	5	26
80	Atassia locomotrice progressiva	13	42	16	3	22	29	—	10
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	1027	3855	897	728	1661	5714	99	713
83	Paralisi progressiva degli alienati.	33	47	17	21	44	86	—	5
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	65	110	26	16	47	84	—	16
85	Epilessia	37	88	19	15	52	112	—	23
78, 81, 86, 87, 88, 89	Altre malattie del sistema nervoso	124	350	93	82	137	569	10	110
	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi.	32	45	28	8	54	106	4	15
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio</b>	1760	7017	1651	1465	2834	8325	157	1421
90	Pericardite	5	14	—	—	7	21	1	5
91	Endocardite acuta	10	39	6	4	31	35	—	3
92	Endocardite cr. compr. le aff. valv.	398	2183	259	347	486	2715	17	404
93	Malattie del miocardio	644	2530	690	648	1073	2453	58	564
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	68	129	42	26	131	186	5	33
95	Altre malattie del cuore	448	1473	495	317	756	2077	55	277
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	29	84	42	14	45	118	3	6

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e

capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni		
	11339	40220	5783	7625	12094	29849	11647	24198	2563	13780	1911	7119
	2292	6414	1233	1139	2125	4127	2278	3497	483	1785	302	986
	131	447	45	32	136	294	90	195	35	148	13	105
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	149	17	19	79	254	19	45	28	35	5	9
	10	33	15	10	6	15	6	13	4	13	—	9
	83	342	3	22	47	175	48	131	8	71	20	56
	75	294	42	60	73	167	48	114	16	121	13	49
	180	801	66	97	192	560	202	511	29	280	36	172
	3	24	5	12	3	14	7	4	—	7	—	10
	1081	2407	740	634	1003	1449	1292	1473	216	589	136	332
	386	1161	159	168	294	666	283	553	83	267	46	150
	41	38	22	9	38	14	23	16	7	17	5	4
	158	298	60	28	136	232	138	206	36	77	8	35
	11	64	3	1	4	8	8	24	—	9	—	3
	2	53	6	13	11	63	13	26	3	12	1	6
	94	302	50	34	103	216	101	186	18	139	19	45
	974	2347	522	341	1175	2248	1158	2213	182	701	106	330
	953	2296	517	334	1140	2222	1139	2181	176	689	102	324
	21	51	5	7	35	24	19	32	6	12	4	6
	184	728	96	121	222	528	170	380	37	248	38	115
	38	170	11	26	54	156	35	105	8	50	9	26
	17	56	6	20	16	42	9	36	2	21	2	11
	75	217	58	26	101	176	96	173	24	88	23	43
	15	119	3	10	7	62	6	7	1	32	1	10
	17	60	4	16	16	28	8	21	—	20	—	8
	22	106	14	23	28	64	16	38	2	37	3	17
	63	149	37	16	80	170	68	104	13	61	18	30
	21	44	10	7	21	69	30	33	3	18	4	10
	42	105	27	9	59	101	38	71	10	43	14	20
	20	33	1	8	20	22	18	20	5	19	3	13
	20	33	—	8	18	21	17	17	5	17	3	13
	—	—	1	—	2	1	1	3	—	2	—	—
	1273	4787	559	584	1627	4346	1441	3732	415	2515	331	1217
	68	217	27	27	86	135	47	103	12	49	7	20
	11	23	3	1	14	15	12	12	—	7	—	3
	893	3829	378	337	1259	3723	1124	3165	345	2058	277	1082
	35	9	27	1	20	19	33	20	16	6	6	3
	56	33	10	1	39	24	36	30	7	13	6	6
	21	82	9	16	40	50	32	86	8	23	6	22
	137	522	76	187	124	317	134	276	24	333	26	106
	52	72	29	14	45	63	23	38	3	26	3	5
	1475	5803	771	741	1554	4181	1694	3330	232	1724	250	538
	3	13	5	7	6	9	3	4	—	3	—	5
	9	26	7	6	10	12	16	15	2	7	3	9
	281	1381	170	269	294	1285	439	1223	99	656	125	336
	541	2111	267	247	565	1289	528	827	57	344	30	220
	79	153	43	17	85	129	94	106	8	35	10	20
	267	1346	115	102	306	898	370	761	81	457	54	244
	10	31	12	8	31	56	13	33	8	19	6	9

altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA VIII. — Morti, nell'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA	
		capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni
97, 98 dal 99 al 103	Arteriosclerosi (a) e cangrena . . . Altre mal. dell'app. circolatorio . .	96 62	439 126	73 44	93 16	197 108	586 134	11 7	103 26
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio.</b>	<b>1972</b>	<b>6657</b>	<b>1680</b>	<b>1534</b>	<b>3526</b>	<b>11029</b>	<b>162</b>	<b>1244</b>
106	Bronchiti . . . . .	230	1208	177	273	373	1888	18	200
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	1596	5001	1345	1184	2834	8375	134	921
110	Pleuriti . . . . .	72	144	61	44	160	287	2	31
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. app. resp. escl. la tbc . .	74	304	97	83	159	479	8	92
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	<b>1237</b>	<b>3859</b>	<b>859</b>	<b>759</b>	<b>2093</b>	<b>11023</b>	<b>167</b>	<b>947</b>
117	Ulcera dello stom. e del duodeno . .	75	141	50	37	109	162	28	38
119	Enteriti al disotto di due anni . . .	442	1660	221	264	851	7857	53	511
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre) .	138	541	100	141	236	951	5	88
121	Appendicite . . . . .	97	154	56	28	159	231	16	51
122	Ernia, occlusione intestinale . . . .	140	316	114	50	141	315	23	59
124	Cirrosi del fegato . . . . .	146	514	114	108	240	541	16	93
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (b) . .	97	178	96	46	138	241	13	39
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente . .	102	355	108	85	219	725	13	68
	<b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	<b>478</b>	<b>1111</b>	<b>348</b>	<b>227</b>	<b>768</b>	<b>1460</b>	<b>35</b>	<b>219</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	315	761	233	150	542	1053	17	150
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c) . . .	12	30	11	9	31	39	1	5
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	11	20	12	1	30	29	1	2
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori . .	31	105	22	25	60	147	3	22
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. . .	2	10	9	2	18	7	—	—
137	Malattie della prostata . . . . .	86	163	47	35	66	152	8	36
138, 139	Malattie degli organi genitali (d) . .	21	22	14	5	21	33	5	4
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	<b>60</b>	<b>126</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>103</b>	<b>220</b>	<b>5</b>	<b>59</b>
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . . .	10	10	4	2	10	19	—	7
144	Emorragia puerperale . . . . .	13	24	4	5	16	44	—	11
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali . . .	23	59	16	8	42	84	4	21
146, 147	Tossiemia della gravidanza, ecc. (e) . .	9	17	8	5	16	42	1	7
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	5	16	11	9	19	31	—	13
	<b>XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>133</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul. .	27	59	27	13	86	133	4	16
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>66</b>	<b>88</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f) . .	22	46	29	9	66	88	5	10
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b>	<b>41</b>	<b>109</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>255</b>	<b>8</b>	<b>32</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (g) . .	41	109	26	22	60	255	8	32
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia . . . . .</b>	<b>293</b>	<b>1111</b>	<b>275</b>	<b>222</b>	<b>732</b>	<b>3018</b>	<b>49</b>	<b>461</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	38	431	60	84	83	1205	18	190
159	Nascita prematura (h) . . . . .	195	389	156	74	556	1199	24	160
160	Conseguenze del parto . . . . .	3	25	13	11	10	66	1	11
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . .	57	266	46	53	83	548	6	100
	<b>XVI. - Senilità . . . . .</b>	<b>388</b>	<b>2638</b>	<b>318</b>	<b>459</b>	<b>482</b>	<b>2987</b>	<b>55</b>	<b>577</b>
162	Senilità . . . . .	388	2638	318	459	482	2987	55	577
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali . . .</b>	<b>490</b>	<b>1397</b>	<b>416</b>	<b>312</b>	<b>851</b>	<b>1815</b>	<b>61</b>	<b>378</b>
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	169	360	142	83	234	322	15	73
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	22	50	15	16	25	55	—	7
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	297	982	256	213	584	1423	46	296
195	Altre morti violente (i) . . . . .	1	5	3	—	8	15	—	2
196, 197	Ferite di guerra (l) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate</b>	<b>170</b>	<b>547</b>	<b>95</b>	<b>81</b>	<b>266</b>	<b>573</b>	<b>16</b>	<b>65</b>
199, 200	Cause non specific. o mal definite . . .	170	547	95	81	266	573	16	65

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacini e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti. (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione di

Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni			
97, 98 dal 99 al 103	239	666	120	77	206	431	167	307	20	184	17	82	97, 98 dal 99 al 103
	46	76	32	8	51	72	64	54	7	19	5	13	
	<b>1727</b>	<b>6258</b>	<b>928</b>	<b>1311</b>	<b>2039</b>	<b>5186</b>	<b>1970</b>	<b>3835</b>	<b>365</b>	<b>2042</b>	<b>281</b>	<b>1193</b>	
106	188	1180	81	245	277	944	291	751	72	452	43	276	106
107, 108, 109	1349	4572	716	903	1594	3925	1499	2817	264	1422	223	851	107, 108, 109
110	78	154	38	23	62	106	64	99	9	47	6	23	110
104, 105, dal 111 al 114	112	352	93	140	106	211	116	169	20	121	9	43	104, 105, dal 111 al 114
	<b>1209</b>	<b>5160</b>	<b>474</b>	<b>760</b>	<b>1116</b>	<b>2739</b>	<b>983</b>	<b>2198</b>	<b>271</b>	<b>1303</b>	<b>196</b>	<b>761</b>	
117	94	165	57	63	88	89	61	135	15	51	12	38	117
119	500	3240	160	448	303	1406	274	820	130	699	67	410	119
120	113	522	43	75	139	328	156	337	19	147	25	90	120
121	102	183	41	9	135	114	76	114	27	41	27	32	121
122	91	230	43	50	134	146	121	203	21	66	14	47	122
124	89	278	41	37	86	261	106	212	17	125	20	65	124
125, 126, 127	111	180	44	21	110	127	81	133	15	52	11	15	125, 126, 127
115, 116, 118, 123, 128, 129	109	362	45	57	121	268	113	244	27	122	20	64	115, 116, 118, 123, 128, 129
	<b>447</b>	<b>1361</b>	<b>193</b>	<b>148</b>	<b>431</b>	<b>772</b>	<b>468</b>	<b>665</b>	<b>73</b>	<b>429</b>	<b>68</b>	<b>183</b>	
130, 131, 132	301	751	132	125	312	519	316	465	50	309	49	129	130, 131, 132
133	17	37	6	3	21	21	13	21	1	18	—	4	133
134	8	8	7	3	11	19	15	17	3	12	—	10	134
135	32	80	11	6	45	69	56	74	8	41	7	17	135
136	5	5	4	1	3	6	11	5	4	4	1	1	136
137	70	164	23	9	69	105	40	76	4	39	11	15	137
138, 139	14	16	10	1	23	33	17	7	3	6	—	7	138, 139
	<b>58</b>	<b>194</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>90</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>91</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	
141, 142, 143	8	9	2	2	10	8	4	5	1	3	1	1	141, 142, 143
144	9	43	2	4	7	20	9	14	1	13	3	6	144
140, 145	26	57	12	10	34	45	16	43	5	25	2	14	140, 145
146, 147	10	54	5	2	22	32	8	19	—	11	4	11	146, 147
148, 149, 150	5	31	6	7	17	11	7	10	6	5	2	6	148, 149, 150
	<b>68</b>	<b>96</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>43</b>	<b>83</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	
151, 152, 153	68	96	31	16	63	66	43	83	7	35	4	17	151, 152, 153
	<b>35</b>	<b>72</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	
154, 155, 156	35	72	19	11	28	60	44	59	9	27	5	11	154, 155, 156
	<b>35</b>	<b>181</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>117</b>	<b>37</b>	<b>112</b>	<b>11</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	
157	35	181	21	23	45	117	37	112	11	73	3	46	157
	<b>444</b>	<b>2605</b>	<b>240</b>	<b>658</b>	<b>454</b>	<b>2022</b>	<b>348</b>	<b>1167</b>	<b>72</b>	<b>964</b>	<b>104</b>	<b>440</b>	
158	136	1383	100	485	114	1024	104	457	40	521	38	172	158
159	231	844	118	111	257	686	182	551	24	301	51	222	159
160	4	38	2	7	9	40	7	34	—	21	3	10	160
161	73	340	20	55	74	272	55	125	8	121	12	36	161
	<b>454</b>	<b>2707</b>	<b>314</b>	<b>1350</b>	<b>370</b>	<b>1785</b>	<b>353</b>	<b>1766</b>	<b>195</b>	<b>1221</b>	<b>90</b> </		

Segue: TAVOLA VIII. — Morti, nell'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE	
		capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>13763</b>	<b>17721</b>	<b>3028</b>	<b>23084</b>	<b>16392</b>	<b>42603</b>	<b>6704</b>	<b>38677</b>
	<b>I. — Malattie infettive e parassitarie . . . . .</b>	<b>2864</b>	<b>2306</b>	<b>411</b>	<b>2683</b>	<b>2331</b>	<b>4471</b>	<b>1351</b>	<b>5354</b>
1,2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	105	172	54	291	109	452	104	333
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	1
7	Morbillo . . . . .	214	139	28	180	70	291	13	309
8	Scarlattina . . . . .	133	207	3	42	10	71	13	71
9	Tosse convulsa . . . . .	44	82	20	75	81	149	20	82
10	Difterite . . . . .	144	119	14	154	124	158	13	77
11	Influenza . . . . .	320	274	63	477	448	909	440	1105
13	Dissenteria . . . . .	1	6	—	34	2	40	1	14
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1207	560	111	689	850	1129	364	1516
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	372	282	75	341	273	472	161	643
34	Sifilide . . . . .	111	29	3	47	159	133	31	73
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	151	116	16	95	84	165	36	181
38	Malattia . . . . .	19	172	4	96	14	174	98	638
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	22	21	1	39	9	80	13	72
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	121	125	19	123	98	248	44	239
	<b>II. — Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>1115</b>	<b>605</b>	<b>87</b>	<b>643</b>	<b>583</b>	<b>741</b>	<b>156</b>	<b>777</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni . . . . .	1084	592	86	628	553	726	142	749
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	31	13	1	15	30	15	14	28
	<b>III. — Malattie reumatiche. ecc. (c) . . . . .</b>	<b>290</b>	<b>270</b>	<b>45</b>	<b>301</b>	<b>289</b>	<b>607</b>	<b>77</b>	<b>506</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	25	51	9	63	39	118	16	87
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	13	37	4	49	20	86	10	44
59	Diabete mellito . . . . .	200	107	21	80	163	173	29	132
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	7	16	3	38	10	49	3	48
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat.	6	5	—	18	8	17	3	17
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	39	54	8	53	49	164	16	178
	<b>IV. — Malattie del sangue, ecc. (d) . . . . .</b>	<b>85</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>82</b>	<b>169</b>	<b>25</b>	<b>180</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	27	29	4	53	30	82	5	108
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . . . . .	58	41	6	67	32	87	20	72
	<b>V. — Avvelenam. cron. e intossicazioni . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
75	Alcolismo acuto e cronico . . . . .	14	13	6	9	2	28	—	6
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	1	1	—	1	3	3	1	1
	<b>VI. — Malattie del sist. nervoso, ecc. (f) . . . . .</b>	<b>1519</b>	<b>2557</b>	<b>449</b>	<b>3377</b>	<b>2137</b>	<b>5348</b>	<b>578</b>	<b>4383</b>
79	Meningite semplice . . . . .	62	85	13	95	54	166	28	201
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	13	5	1	13	12	21	2	24
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	1122	1064	300	2672	1463	3531	396	3128
83	Paralisi progressiva degli alienati.	34	11	6	10	81	36	19	13
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	36	10	41	17	34	121	11	9
85	Epilessia . . . . .	23	35	26	60	49	139	19	51
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	179	430	54	495	399	1300	83	920
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi.	50	17	8	15	45	34	20	37
	<b>VII. — Malattie dell'app. circolatorio . . . . .</b>	<b>1592</b>	<b>2337</b>	<b>352</b>	<b>2811</b>	<b>2047</b>	<b>5278</b>	<b>702</b>	<b>3557</b>
90	Pericardite . . . . .	5	1	1	8	4	14	2	8
91	Endocardite acuta . . . . .	28	15	3	17	6	19	3	23
92	Endocardite cr. compr. le aff. valv.	372	858	165	1300	536	1926	230	1530
93	Malattie del miocardio . . . . .	321	524	63	504	639	1681	220	718
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	121	53	22	79	191	227	34	108
95	Altre malattie del cuore . . . . .	477	587	77	644	379	901	128	780
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	38	7	2	23	26	48	12	23

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	TOTALE	
	324	10790	3037	24683	17994	47391	2422	13088	152784	456621	609405	
	112	1641	377	3545	2734	4979	586	2796	27600	62235	89835	
1,2	11	93	35	240	199	425	24	116	1557	4603	6160	1,2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	6
7	4	160	6	196	161	391	3	103	843	2567	3410	7
8	8	133	3	505	54	222	82	127	382	1521	1903	8
9	1	30	5	134	22	69	8	127	584	2388	2972	9
10	3	31	17	132	102	149	10	75	960	2222	3182	10
11	23	295	46	488	170	572	28	209	3119	10168	13287	11
13	3	23	1	34	65	74	1	43	102	409	511	13
23	15	184	135	672	1096	1308	267	1003	12554	20507	33061	23
dal 24 al 32	10	112	34	337	272	481	83	385	3517	7962	11479	dal 24 al 32
34	4	23	17	54	56	108	13	11	662	689	1351	34
36	9	38	23	135	307	332	29	81	1703	2645	4348	36
38	9	398	29	367	41	432	28	397	282	2819	3101	38
dal 39 al 42	2	43	6	52	50	123	7	20	159	694	853	dal 39 al 42
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	10	78	20	199	139	293	13	99	1176	3033	4209	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
	25	141	101	505	501	1158	113	308	10881	20234	31115	
dal 45 al 53	23	140	99	491	485	1120	107	299	10532	19810	30342	dal 45 al 53
54, 55	2	1	2	14	16	38	6	9	349	424	773	54, 55
	6	127	56	358	369	698	47	287	2688	6871	9559	
56	2	22	10	73	24	82	2	28	405	1408	1813	56
57, 58	1	15	3	49	10	52	2	23	165	690	855	57, 58
59	3	26	21	74	165	240	19	59	1427	2231	3658	59
dal 60 al 64	—	10	5	45	11	69	2	41	94	674	768	dal 60 al 64
66	—	13	3	14	10	28	3	9	149	424	573	66
65, 67, 68, 69	—	41	14	103	149	227	19	127	448	1444	1892	65, 67, 68, 69
	4	50	18	120	94	353	20	92	858	2152	3020	
71	2	30	9	66	45	215	12	56	331	1034	1365	71
70, 72, 73, 74	2	20	9	54	49	138	8	36	537	1118	1655	70, 72, 73, 74
	—	4	—	14	5	16	2	6	153	358	509	
75	—	4	—	13	4	16	2	6	132	333	465	75
76, 77	—	—	—	1	1	—	—	—	21	23	44	76, 77
	63	1104	337	2755	1606	4743	207	849	17345	56012	73357	
79	1	39	7	105	87	117	20	73	765	2115	2880	79
80	—	5	—	8	13	20	2	5	134	246	380	80
82	43	706	231	1799	1192	3959	145	620	12852	43583	56435	82
83	—	4	2	14	27	17	6	6	406	328	734	83
84	—	3	1	13	15	11	1	1	431	520	951	84
85	2	24	6	44	37	67	8	18	394	955	1349	85
78, 81, 86, 87	17	319	88	746	212	522	19	112	1936	7696	9632	78, 81, 86, 87
88, 89	—	4	2	26	23	30	6	14	427	569	996	88, 89
	86	971	327	2630	1821	4513	200	975	19555	58017	77572	
90	—	3	—	7	4	18	—	5	46	145	191	90
91	—	2	—	28	10	20	6	14	150	294	444	91
92	35	474	130	1089	360	1585	73	421	4469	19982	24451	92
93	20	186	53	495	281	491	36	183	6086	16015	22101	93
94	5	35	24	95	83	160	10	26	1055	1617	2672	94
95	14	165	73	640	722	1589	41	202	4858	13460	18318	95
96	—	2	4	19	16	22	6	14	303			

Segue: TAVOLA VIII. — Morti, nell'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE	
		capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni
97, 98 dal 99 al 103	Arteriosclerosi (a) e cangrena . . . Altre mal. dell'app. circolatorio.	159 71	256 36	11 8	209 27	218 48	398 64	55 18	306 61
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio.</b>	<b>2241</b>	<b>2926</b>	<b>504</b>	<b>3717</b>	<b>3225</b>	<b>9793</b>	<b>1126</b>	<b>8189</b>
106 107, 108, 109 110	Bronchiti . . . . . Polmoniti . . . . . Pleuriti . . . . .	187 1831 96	539 2208 56	74 386 12	838 2505 63	506 2497 99	1692 7631 176	169 867 23	1638 6150 138
104, 105, dal III al III4	Altre mal. app. resp. escl. la tbc .	127	123	32	211	123	234	67	263
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	<b>1448</b>	<b>2657</b>	<b>467</b>	<b>4261</b>	<b>2349</b>	<b>7797</b>	<b>1282</b>	<b>7669</b>
117 119 120 121 122 124	Ulcera dello stom. e del duodeno. Enteriti al disotto di due anni. Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre). Appendicite . . . . . Ernia, occlusione intestinale . . . Cirrosi del fegato . . . . .	114 633 125 102 113 120	56 1741 379 40 90 135	11 292 60 16 20 17	70 2856 710 58 121 142	74 1455 253 77 164 115	114 5348 1089 85 263 258	26 852 151 31 57 35	69 5320 1157 69 250 231
125, 126, 127 115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. fegato e vie biliari (b). Altre mal. dell'apparato digerente.	107 134	76 140	13 38	77 227	85 126	185 455	56 74	138 435
	<b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	<b>639</b>	<b>675</b>	<b>124</b>	<b>790</b>	<b>969</b>	<b>1587</b>	<b>262</b>	<b>1415</b>
130, 131, 132 133 134 135 136 137 138, 139	Nefriti . . . . . Altre malattie dei reni, ecc. (c) . . Calcolosi delle vie urinarie . . . Mal. della vescica, esclusi i tumori . Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. Malattie della prostata . . . . . Malattie degli organi genitali (d).	448 26 15 34 24 79 13	553 16 7 41 3 49 6	98 2 1 6 2 10 5	638 26 20 41 4 46 17	780 30 15 139 11 46 22	1314 22 10 21 4 44 7	198 6 15 82 12 53 11	1216 26 15 82 12 53 11
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	<b>113</b>	<b>88</b>	<b>26</b>	<b>121</b>	<b>141</b>	<b>137</b>	<b>47</b>	<b>155</b>
141, 142, 143 144 140, 145 146, 147 148, 149, 150	Accidenti della gravidanza . . . . Emorragia puerperale . . . . . Setticemia e infezioni puerperali. Tossicemia della gravidanza, ecc. (e) Altre malattie puerperali . . . . .	8 15 60 17 13	7 16 29 22 14	1 5 9 5 6	5 32 28 47 24	11 21 51 11 21	7 33 79 33 5	6 8 17 11 5	7 42 46 33 27
	<b>XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>96</b>	<b>129</b>	<b>28</b>	<b>161</b>
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	54	74	18	68	96	129	28	161
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>57</b>
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f)	43	21	6	25	35	41	14	57
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b>	<b>57</b>	<b>115</b>	<b>9</b>	<b>123</b>	<b>63</b>	<b>249</b>	<b>23</b>	<b>133</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (g)	57	115	9	123	63	249	23	133
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia</b>	<b>590</b>	<b>1005</b>	<b>122</b>	<b>1237</b>	<b>477</b>	<b>1806</b>	<b>474</b>	<b>2210</b>
158 159 160 161	Debolezza congenita . . . . . Nascita prematura (h) . . . . . Conseguenze del parto . . . . . Altre malattie speciali dell'infanzia	130 327 16 117	431 418 21 135	59 50 3 10	642 473 14 158	215 154 10 98	1152 376 15 263	341 85 1 47	1665 306 9 230
	<b>XVI. - Senilità</b>	<b>321</b>	<b>1275</b>	<b>248</b>	<b>2014</b>	<b>908</b>	<b>3172</b>	<b>324</b>	<b>3027</b>
162	Senilità . . . . .	321	1275	248	2014	908	3172	324	3027
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali</b>	<b>537</b>	<b>540</b>	<b>111</b>	<b>541</b>	<b>517</b>	<b>990</b>	<b>186</b>	<b>770</b>
dal 163 al 171 dal 172 al 175 dal 176 al 194 195 196, 197	Suicidio . . . . . Omicidio . . . . . Morti accidentali . . . . . Altre morti violente (i) . . . . . Ferite di guerra (l) . . . . .	125 21 385 6 —	76 32 426 6 —	21 12 78 — —	68 45 422 6 —	143 102 320 5 —	122 10 761 5 —	26 10 145 5 —	125 73 568 3 —
199, 200	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate</b> Cause non specific. o mal definite .	<b>140</b> 140	<b>186</b> 186	<b>33</b> 33	<b>187</b> 187	<b>158</b> 158	<b>227</b> 227	<b>48</b> 48	<b>127</b> 127

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati di armate belligeranti. (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione di civili da parte

Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
				capiluog. di Provinc.	altri Comuni	TOTALE	
11 1 157 38 107 5 7 209 5 133 22 1 5 4 13 26 35 28 1 3 1 2 — 1 2 — 44 23 15 — 6 39 39 33 3 1 — 2 2	90 14 1954 555 1296 26 77 2588 23 1856 428 14 53 39 121 411 353 11 8 11 22 7 5 — 37 561 365 112 4 782 782 282 30 30 — 60 60	31 12 556 86 426 21 23 619 10 407 108 16 20 8 304 92 102 2 3 10 2 4 — 103 72 18 — 252 252 82 12 22 — 32 32	279 66 4577 1086 3196 76 131 3568 62 2472 432 73 102 166 130 103 119 177 791 624 1639 8 23 58 173 8 7 7 17 71 222 24 8 14 20 16 13 71 59 59 229 694 471 152 2 69 123 2115 1756 4915 101 1001 5782 13372 439 1099 103 318 26 66 27 114 5 42 278 3859 9944 13803 52 80 1 — 252 252	25 15 2225 34 334 274 23 94 410 2652 18962 902 1580 62 555 14 19 23 101 132 132 14 68 31 173 108 409 37 322 1 8 — 7 17 3 7 62 2 10 12 5 3 10 4 9 6 86 95 669 2071 339 251 2643 87 364 809 3119 101 1001 6968 34267 5782 13372 103 318 26 66 5 42 240 240 240 — — 1539 3760 5299 1539 3760	6999 1557 81750 18995 81158 1699 3562 92598 2412 56590 12635 10448 1066 1383 2836 4964 3052 4770 14820 21041 11255 15887 590 284 454 1632 218 136 1828 432 895 1959 2854 85 410 730 1083 416 426 1308 1979 627 1034 2046 2554 29009 12848 7068 364 451 3928 41235 19154 4141 1077 13803 132 1 5299 3760 5299	97, 98 dal 99 al 103 106 107, 108, 109 110 104, 105, dal III al III4 117 119 120 121 122 124 125, 126, 127 115, 116, 118, 123, 128, 129 130, 131, 132 133 134 135 136 137 138, 139 141, 142, 143 144 140, 145 146, 147 148, 149, 150 151, 152, 153 154, 155, 156 157 158 159 160 161 162 dal 163 al 171 dal 172 al 175 dal 176 al 194 195 196, 197 199, 200	

reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati di armate belligeranti.

TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo alcune cause

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENEZIA TRI-DENTINA	VENEZIA	VENEZIA GIULIA E ZARA	EMILIA
	<b>Complesso</b>	<b>49 302</b>	<b>17 701</b>	<b>82 201</b>	<b>9 867</b>	<b>51 559</b>	<b>13 413</b>	<b>41 943</b>
	Gennaio	5 219	1 873	8 568	1 006	5 250	1 460	4 286
	Febbraio	5 838	2 268	8 601	1 035	4 758	1 331	4 065
	Marzo	5 078	1 829	7 297	955	5 008	1 319	4 180
	Aprile	3 955	1 363	6 319	771	4 400	1 155	3 545
	Maggio	3 801	1 329	5 827	778	4 038	993	3 387
	Giugno	3 500	1 110	6 242	742	4 035	867	3 178
	Luglio	3 724	1 276	7 733	813	4 329	966	3 116
	Agosto	3 590	1 244	7 211	851	3 977	987	3 069
	Settembre	3 226	1 183	5 920	747	3 462	970	2 867
	Ottobre	3 435	1 209	6 012	673	3 670	959	3 085
	Novembre	3 485	1 288	5 736	702	3 835	1 059	3 207
	Dicembre	4 451	1 729	6 735	794	4 797	1 347	4 008
I e 2	<i>Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi</i>	376	193	1 093	64	578	77	430
	Gennaio	18	8	47	3	19	4	29
	Febbraio	10	3	23	1	19	5	9
	Marzo	3	4	30	—	18	4	12
	Aprile	12	5	28	2	26	2	14
	Maggio	13	8	25	—	23	3	13
	Giugno	20	10	31	1	27	8	26
	Luglio	41	31	97	2	70	8	41
	Agosto	64	34	172	21	98	6	54
	Settembre	81	33	269	14	97	15	66
	Ottobre	56	34	178	15	84	12	75
	Novembre	35	9	108	3	60	4	50
	Dicembre	23	14	80	2	37	6	41
6	<i>Vaiolo</i>	—	—	1	—	—	—	—
	Gennaio	—	—	—	—	—	—	—
	Febbraio	—	—	—	—	—	—	—
	Marzo	—	—	—	—	—	—	—
	Aprile	—	—	—	—	—	—	—
	Maggio	—	—	—	—	—	—	—
	Giugno	—	—	1	—	—	—	—
	Luglio	—	—	—	—	—	—	—
	Agosto	—	—	—	—	—	—	—
	Settembre	—	—	—	—	—	—	—
	Ottobre	—	—	—	—	—	—	—
	Novembre	—	—	—	—	—	—	—
	Dicembre	—	—	—	—	—	—	—
7	<i>Morbillo</i>	78	26	322	20	186	36	333
	Gennaio	3	1	42	—	34	5	35
	Febbraio	3	—	45	1	27	2	38
	Marzo	9	—	61	—	25	4	41
	Aprile	17	1	45	4	19	1	26
	Maggio	6	8	29	9	20	4	55
	Giugno	4	4	33	4	17	2	41
	Luglio	5	3	22	—	9	4	14
	Agosto	3	—	20	—	9	1	13
	Settembre	4	2	7	—	4	—	6
	Ottobre	4	—	1	1	3	3	13
	Novembre	7	3	10	—	4	4	22
	Dicembre	13	4	7	1	15	6	29

di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.

TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO
<b>35 845</b>	<b>16 343</b>	<b>9 030</b>	<b>31 484</b>	<b>26 112</b>	<b>58 995</b>	<b>45 381</b>	<b>11 614</b>	<b>27 720</b>	<b>65 385</b>	<b>15 510</b>	<b>609 405</b>
3 686	1 603	840	3 042	2 412	5 131	4 001	966	2 322	5 430	1 481	58 576
3 436	1 582	950	3 015	2 394	5 143	4 075	860	2 112	5 519	1 455	58 437
3 296	1 789	932	2 782	2 285	4 802	4 191	860	2 312	5 385	1 309	55 609
3 073	1 546	774	2 479	2 092	4 522	3 367	775	2 265	4 720	1 143	48 264
2 808	1 260	667	2 306	1 773	4 163	3 178	673	1 991	4 508	1 097	44 577
2 478	1 076	603	2 275	1 659	5 123	4 073	897	2 052	6 256	1 052	47 218
2 643	1 190	725	2 963	2 609	6 256	4 911	1 409	2 922	7 035	1 264	55 884
2 697	1 275	706	2 622	2 598	5 314	3 879	1 404	3 054	6 077	1 353	51 848
2 545	1 105	667	2 170	2 105	4 107	3 080	1 156	2 231	4 730	1 282	43 553
2 828	1 120	651	2 263	1 899	4 313	3 259	921	2 229	4 942	1 364	44 842
2 595	1 194	679	2 337	1 835	4 279	3 203	808	1 953	4 933	1 337	44 465
3 760	1 603	836	3 230	2 451	5 842	4 164	885	2 277	5 850	1 373	55 132
285	183	118	277	345	561	437	104	275	624	140	6 160
28	11	7	16	23	42	24	2	19	38	6	344
11	9	7	13	17	29	21	8	9	21	3	223
9	8	4	10	10	20	22	1	10	38	4	207
6	4	6	7	8	20	18	2	13	26	10	209
11	10	—	9	7	15	26	1	11	20	11	206
12	7	3	6	19	25	37	8	10	34	11	295
29	17	10	27	37	62	74	13	34	76	11	680
45	30	17	52	53	74	54	22	59	106	16	977
40	38	17	44	66	59	56	12	37	76	14	1 034
41	20	18	33	48	88	45	18	29	65	19	878
31	16	18	28	29	60	28	9	26	58	15	587
22	13	11	32	28	67	32	8	18	66	20	520
—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	4
64	63	14	353	208	361	322	164	202	552	106	3 470
5	7	3	23	9	51	50	15	8	119	10	420
3	5	1	28	13	53	42	11	5	104	6	387
5	17	5	51	9	54	23	12	5	60	5	386
8	2	—	51	9	28	23	11	9	40	6	300
10	6	1	34	11	14	16	9	7	55	4	298
5	6	—	60	12	41	43	33	25	54	4	388
8	1	—	51	28	21	58	37	47	55	20	383
4	2	—	13	29	16	22	14	57	28	10	241
3	1	—	9	12	8	3	3	13	4	7	86
2	—	—	4	16	1	5	5	14	8	9	93
2	4	—	12	28	23	15	5	6	13	16	174
9	12	4	17	32	43	26	9	6	12	9	254

## Segue: TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo alcune cause

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — M E S I	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENEZIA TRI- DENTINA	VENEZIA	VENEZIA GIULIA E ZARA	EMILIA	di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.											
									TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO
8	Scarlattina . . . . .	18	10	36	21	43	25	21	19	17	9	340	45	81	84	141	508	276	209	1 903
	Gennaio . . . . .	—	1	5	7	2	7	1	1	1	—	28	8	5	11	8	48	28	15	176
	Febbraio . . . . .	3	2	3	1	4	5	2	—	3	1	28	—	1	7	3	25	33	14	135
	Marzo . . . . .	3	—	5	3	1	1	1	1	1	1	50	3	4	10	2	25	24	10	145
	Aprile . . . . .	2	1	8	2	—	3	1	—	—	—	20	4	5	—	2	12	18	8	86
	Maggio . . . . .	1	—	2	2	5	—	2	1	2	3	30	6	5	5	3	20	25	18	130
	Giugno . . . . .	2	1	1	—	5	1	4	5	2	—	15	9	9	3	2	35	23	26	143
	Luglio . . . . .	—	1	1	3	1	1	1	3	1	—	14	5	8	7	16	69	30	29	190
	Agosto . . . . .	—	—	—	—	3	1	1	2	2	1	25	3	5	11	30	73	14	15	186
	Settembre . . . . .	3	—	2	2	3	—	—	—	—	1	29	2	2	9	20	65	21	18	177
	Ottobre . . . . .	1	1	2	1	5	1	2	2	1	—	48	1	10	11	25	55	18	19	203
	Novembre . . . . .	1	1	4	—	10	1	2	1	3	1	28	1	19	3	22	45	19	21	183
	Dicembre . . . . .	2	2	3	—	4	4	4	3	1	1	25	3	8	7	8	35	23	16	149
9	Tosse convulsa . . . . .	178	70	698	71	425	25	222	179	79	76	126	95	230	102	31	139	91	135	2 972
	Gennaio . . . . .	9	1	46	6	28	3	19	13	1	5	19	4	7	8	3	22	7	14	215
	Febbraio . . . . .	16	7	76	10	40	3	13	13	8	6	18	10	21	6	2	26	7	18	300
	Marzo . . . . .	18	3	71	10	50	3	21	31	8	12	18	6	21	7	1	20	9	25	334
	Aprile . . . . .	13	6	66	10	67	5	33	26	10	13	16	15	29	13	—	17	17	19	375
	Maggio . . . . .	14	7	56	8	30	1	29	15	13	7	9	13	17	10	2	9	18	16	274
	Giugno . . . . .	19	14	68	9	38	3	18	9	10	6	4	12	24	11	4	8	11	11	279
	Luglio . . . . .	35	11	90	2	41	1	25	19	4	9	15	6	42	15	2	15	5	12	349
	Agosto . . . . .	16	8	84	4	41	2	26	16	11	6	7	13	36	6	8	9	4	6	303
	Settembre . . . . .	17	7	50	6	23	1	16	18	8	5	6	6	10	9	2	5	7	3	199
	Ottobre . . . . .	10	2	28	2	19	2	5	4	1	1	4	2	5	8	1	2	3	6	105
	Novembre . . . . .	3	3	21	3	16	1	4	2	3	3	4	5	7	3	2	3	1	2	86
	Dicembre . . . . .	8	1	42	1	32	—	13	13	2	3	6	3	11	6	4	3	2	3	153
10	Difterite . . . . .	157	64	497	70	369	102	240	162	137	62	263	168	282	90	34	149	251	85	3 182
	Gennaio . . . . .	22	8	83	10	65	10	41	20	15	11	47	20	32	10	6	14	34	9	457
	Febbraio . . . . .	27	4	71	6	45	18	28	20	18	7	36	19	25	10	4	7	31	5	381
	Marzo . . . . .	16	12	72	9	45	11	25	9	16	10	25	12	22	6	2	13	16	7	328
	Aprile . . . . .	7	4	42	5	30	10	16	9	8	3	17	9	13	7	4	13	22	6	225
	Maggio . . . . .	12	4	25	3	16	6	4	14	2	4	20	10	12	11	5	8	17	11	184
	Giugno . . . . .	3	5	14	2	10	1	7	6	8	2	19	11	19	5	—	7	15	6	140
	Luglio . . . . .	6	3	16	1	14	5	8	7	3	1	12	12	22	2	4	12	13	4	145
	Agosto . . . . .	6	2	22	6	10	3	14	8	8	5	17	11	31	7	3	12	12	3	180
	Settembre . . . . .	8	3	22	4	20	3	14	15	10	2	17	10	33	4	1	14	13	6	199
	Ottobre . . . . .	5	3	32	6	37	5	27	19	16	7	11	13	17	4	2	19	24	11	258
	Novembre . . . . .	21	6	48	10	33	12	27	11	13	3	20	21	26	13	1	17	29	2	313
	Dicembre . . . . .	24	10	50	8	44	18	29	24	20	7	22	20	30	11	2	13	25	15	372
11	Influenza . . . . .	1 603	360	2 107	224	981	163	752	713	309	208	594	540	1 357	1 545	318	534	742	237	13 287
	Gennaio . . . . .	210	48	456	51	169	40	114	107	31	20	69	73	135	151	44	71	105	50	1 944
	Febbraio . . . . .	617	182	772	87	209	43	214	138	60	41	125	97	215	202	54	74	126	65	3 321
	Marzo . . . . .	402	85	363	47	221	33	150	180	77	48	130	112	200	299	65	102	142	47	2 703
	Aprile . . . . .	113	15	150	12	138	12	77	94	67	32	74	83	159	174	46	100	80	21	1 447
	Maggio . . . . .	57	4	65	9	64	6	49	56	21	13	35	44	100	111	17	39	63	15	768
	Giugno . . . . .	15	1	32	2	23	1	15	15	5	3	21	17	62	98	8	19	32	6	375
	Luglio . . . . .	10	2	27	1	14	—	11	17	7	7	16	8	60	97	6	16	15	—	314
	Agosto . . . . .	4	3	18	1	7	2	12	4	5	6	12	25	77	77	15	24	37	3	332
	Settembre . . . . .	6	2	12	2	11	3	11	11	1	5	7	20	53	60	27	11	20	2	264
	Ottobre . . . . .	21	4	34	—	23	1	18	26	3	6	7	17	67	65	12	21	24	4	353
	Novembre . . . . .	37	1	60	3	29	6	22	22	10	10	22	18	72	72	12	26	32	8	462
	Dicembre . . . . .	111	13	118	9	73	16	59	43	22	17	76	26	157	139	12	31	66	16	1 004

## di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.

TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO
19	17	9	340	45	81	84	141	508	276	209	1 903
1	1	—	28	8	5	11	8	48	28	15	176
—	3	1	28	—	1	7	3	25	33	14	135
1	1	1	50	3	4	10	2	25	24	10	145
—	—	—	20	4	5	—	2	12	18	8	86
1	2	3	30	6	5	5	3	20	25	18	130
5	2	—	15	9	9	3	2	35	23	26	143
3	1	—	14	5	8	7	16	69	30	29	190
2	2	1	25	3	5	11	30	73	14	15	186
—	—	1	29	2	2	9	20	65	21	18	177
2	1	—	48	1	10	11	25	55	18	19	203
1	3	1	28	1	19	3	22	45	19	21	183
3	1	1	25	3	8	7	8	35	23	16	149
179	79	76	126	95	230	102	31	139	91	135	2 972
13	1	5	19	4	7	8	3	22	7	14	215
13	8	6	18	10	21	6	2	26	7	18	300
31	8	12	18	6	21	7	1	20	9	25	334
26	10	13	16	15	29	13	—	17	17	19	375
15	13	7	9	13	17	10	2	9	18	16	274
9	10	6	4	12	24	11	4	8	11	11	279
19	4	9	15	6	42	15	2	15	5	12	349
16	11	6	7	13	36	6	8	9	4	6	303
18	8	5	6	6	10	9	2	5	7	3	199
4	1	1	4	2	5	8	1	2	3	6	105
2	3	3	4	5	7	3	2	3	1	2	86
13	2	3	6	3	11	6	4	3	2	3	153
162	137	62	263	168	282						

*Segue: TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo alcune cause*

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — M E S I	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENEZIA TRI-DENTINA	VENEZIA GIULIA E ZARA	EMILIA																
								13	<i>Dissenteria . . . . .</i>	11	3	47	19	27	17	17							
	Gennaio . . . . .	1	—	—	—	1	—	—															
	Febbraio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—															
	Marzo . . . . .	—	—	—	—	—	—	1															
	Aprile . . . . .	—	—	2	—	3	—	—															
	Maggio . . . . .	1	—	—	—	—	—	1															
	Giugno . . . . .	—	—	1	—	4	—	—															
	Luglio . . . . .	2	1	16	13	2	1	5															
	Agosto . . . . .	5	2	20	1	7	5	4															
	Settembre . . . . .	1	—	6	3	7	9	2															
	Ottobre . . . . .	1	—	1	2	2	1	3															
	Novembre . . . . .	—	—	—	—	1	—	—															
	Dicembre . . . . .	—	—	1	—	—	—	2															
23	<i>Tubercolosi dell'apparato respiratorio (compresi i gangli tracheo-bronchiali . . . . .</i>	3 110	1 455	5 233	805	3 488	1 374	2 452															
	Gennaio . . . . .	260	131	434	75	301	132	203															
	Febbraio . . . . .	262	115	494	57	308	133	198															
	Marzo . . . . .	295	143	503	69	334	143	242															
	Aprile . . . . .	306	138	501	82	333	150	235															
	Maggio . . . . .	268	127	467	83	313	125	200															
	Giugno . . . . .	251	97	418	80	329	106	207															
	Luglio . . . . .	268	135	441	69	303	107	227															
	Agosto . . . . .	258	103	402	51	244	90	207															
	Settembre . . . . .	223	122	402	52	253	89	191															
	Ottobre . . . . .	256	116	397	65	239	85	190															
	Novembre . . . . .	214	107	364	51	250	87	177															
	Dicembre . . . . .	249	121	410	71	281	127	175															
dal 24 al 32	<i>Ogni altra forma di tubercolosi.</i>	771	334	1 613	212	1 547	327	960															
	Gennaio . . . . .	58	27	140	15	109	23	70															
	Febbraio . . . . .	58	31	139	19	119	23	74															
	Marzo . . . . .	77	36	159	16	155	42	72															
	Aprile . . . . .	87	28	148	18	146	35	97															
	Maggio . . . . .	91	30	151	18	167	28	101															
	Giugno . . . . .	78	36	172	17	160	36	90															
	Luglio . . . . .	49	37	150	21	143	35	96															
	Agosto . . . . .	67	18	138	27	139	21	77															
	Settembre . . . . .	57	18	110	16	99	22	69															
	Ottobre . . . . .	32	26	119	12	103	17	65															
	Novembre . . . . .	57	20	88	16	100	24	66															
	Dicembre . . . . .	60	27	99	17	107	21	83															
38	<i>Malaria . . . . .</i>	9	10	29	2	75	4	12															
	Gennaio . . . . .	—	2	2	—	4	—	1															
	Febbraio . . . . .	—	1	1	—	4	1	—															
	Marzo . . . . .	2	—	—	1	2	—	2															
	Aprile . . . . .	—	1	1	—	6	—	—															
	Maggio . . . . .	1	1	4	—	5	—	2															
	Giugno . . . . .	—	2	—	—	8	1	—															
	Luglio . . . . .	3	1	4	—	10	1	—															
	Agosto . . . . .	1	—	5	—	12	—	3															
	Settembre . . . . .	2	1	6	1	6	1	1															
	Ottobre . . . . .	—	—	2	—	11	—	1															
	Novembre . . . . .	—	—	1	—	5	—	1															
	Dicembre . . . . .	—	1	3	—	2	—	1															

*di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.*

	TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO
	11	7	10	7	34	42	15	26	35	139	44	511
	—	—	1	1	—	—	1	2	—	5	1	13
	—	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	5
	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	6
	—	—	—	—	3	2	—	—	2	5	1	18
	1	1	—	—	1	1	1	1	1	6	2	17
	—	—	1	—	1	3	4	1	3	19	—	37
	1	—	2	3	7	10	4	3	8	29	4	111
	5	2	2	2	4	15	2	8	5	27	8	124
	3	—	2	—	6	4	2	2	8	12	3	70
	—	2	2	—	2	4	—	4	4	13	5	46
	—	—	—	—	3	1	1	3	2	10	15	36
	1	1	—	1	3	1	—	2	2	9	5	28
	2 765	805	468	1 767	800	1 979	1 880	199	807	2 404	1 270	33 061
	243	61	37	159	69	162	158	24	71	204	97	2 821
	216	65	56	146	66	160	135	17	65	200	97	2 790
	234	99	44	145	69	155	167	12	66	205	93	3 018
	233	89	54	137	84	180	165	16	77	220	134	3 134
	243	67	44	157	76	172	182	13	78	222	104	2 941
	207	60	32	132	59	180	172	14	65	205	97	2 711
	257	73	36	161	68	199	143	24	70	201	103	2 885
	228	64	30	139	59	162	177	16	75	215	130	2 650
	230	64	42	150	71	145	126	15	70	155	102	2 502
	230	41	30	140	51	163	157	12	50	175	109	2 506
	200	49	30	149	55	155	133	15	56	195	98	2 385
	244	73	33	152	73	146	165	21	64	207	106	2 718
	836	350	196	654	416	745	804	122	371	753	468	11 479
	72	18	9	53	37	43	56	9	23	59	26	847
	55	29	17	57	30	41	46	8	28	47	36	857
	64	40	25	58	37	67	67	8	27	56	50	1 056
	70	26	20	77	35	60	78	9	24	81	37	1 076
	80	46	20	57	41	72	74	9	34	62	43	1 124
	91	31	17	66	40	92	68	12	35	81	51	1 173



## Segue: TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo alcune cause

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — M E S I	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENÈZIA TRI- DENTINA	VENEZIO	VENÈZIA GIULIA E ZARA	EMILIA	di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.												
									TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO	
dal 45 al 53	<i>Cancro e altri tumori maligni . . . . .</i>	3 333	1 371	5 418	823	3 249	851	3 362	3 320	865	426	1 676	714	1 279	891	163	590	1 605	406	30 342	
	Gennaio . . . . .	286	98	449	76	263	70	271	266	64	39	138	56	111	87	12	54	119	42	2 501	
	Febbraio . . . . .	251	76	357	67	241	61	250	255	61	28	125	52	90	65	9	41	119	46	2 194	
	Marzo . . . . .	284	135	431	59	280	75	293	235	81	25	135	52	74	66	10	39	122	37	2 433	
	Aprile . . . . .	243	96	427	65	238	61	291	266	71	31	119	50	88	54	19	54	126	27	2 326	
	Maggio . . . . .	247	114	476	78	300	72	264	292	73	40	150	55	108	65	16	46	140	31	2 567	
	Giugno . . . . .	291	109	481	53	271	61	250	280	75	47	142	60	103	80	14	52	164	34	2 567	
	Luglio . . . . .	321	120	488	88	295	78	283	283	91	35	152	68	121	70	23	56	136	28	2 736	
	Agosto . . . . .	300	126	499	82	272	67	316	318	66	38	152	50	123	81	14	45	149	31	2 729	
	Settembre . . . . .	271	127	452	78	283	82	286	276	70	37	135	69	92	68	19	51	143	32	2 571	
	Ottobre . . . . .	284	127	456	58	259	73	285	270	69	30	141	47	118	77	11	55	130	31	2 521	
	Novembre . . . . .	278	116	429	65	284	85	273	263	72	38	126	73	124	81	6	42	116	34	2 505	
	Dicembre . . . . .	277	127	473	54	263	66	300	316	72	38	161	82	127	97	10	55	141	33	2 692	
56	<i>Reumatismo articolare acuto. . . . .</i>	188	44	218	24	208	37	210	140	58	35	76	72	157	103	24	83	106	30	1 813	
	Gennaio . . . . .	26	8	25	1	20	2	31	18	3	3	12	4	13	11	4	13	11	2	207	
	Febbraio . . . . .	14	3	16	2	9	3	18	9	9	3	6	7	12	4	—	5	10	3	133	
	Marzo . . . . .	15	3	18	1	18	1	20	9	4	3	4	8	15	8	3	5	10	3	148	
	Aprile . . . . .	14	5	22	—	17	3	12	6	4	3	4	9	11	9	3	7	8	2	139	
	Maggio . . . . .	15	5	20	—	14	6	22	13	3	3	6	4	17	8	2	7	9	—	154	
	Giugno . . . . .	19	2	20	—	18	5	15	9	—	—	4	4	8	8	1	4	7	1	132	
	Luglio . . . . .	12	2	14	2	13	3	14	13	1	3	5	3	16	8	—	5	5	5	5	124
	Agosto . . . . .	8	1	17	3	13	6	11	7	5	3	4	4	9	8	1	7	4	2	113	
	Settembre . . . . .	11	3	11	3	16	—	10	12	6	7	5	7	17	8	1	5	8	1	131	
	Ottobre . . . . .	16	2	14	1	14	3	19	14	6	1	9	9	11	10	1	8	11	4	153	
	Novembre . . . . .	14	6	20	2	17	2	17	18	11	3	7	10	14	12	5	7	9	4	178	
	Dicembre . . . . .	24	4	21	4	39	3	21	12	6	1	10	3	14	9	3	10	14	3	201	
79	<i>Meningite semplice. . . . .</i>	224	91	583	31	285	54	221	150	61	27	147	108	220	229	40	112	204	93	2 880	
	Gennaio . . . . .	18	9	50	1	31	5	19	19	2	1	21	14	14	22	4	5	11	9	255	
	Febbraio . . . . .	23	10	43	5	20	4	13	11	6	2	17	4	19	13	2	6	14	7	219	
	Marzo . . . . .	28	6	58	3	26	5	18	10	5	3	9	9	15	16	1	10	20	6	248	
	Aprile . . . . .	22	8	54	2	22	6	21	13	8	3	11	12	16	15	3	8	25	7	256	
	Maggio . . . . .	20	5	59	4	30	9	20	17	10	2	12	9	12	18	5	10	24	11	277	
	Giugno . . . . .	18	10	50	7	26	6	18	8	4	2	11	5	24	29	2	11	25	14	270	
	Luglio . . . . .	17	8	49	2	29	2	13	15	6	3	15	8	35	20	5	6	15	8	256	
	Agosto . . . . .	15	7	51	3	22	4	16	18	2	2	7	7	24	23	5	13	19	13	251	
	Settembre . . . . .	13	6	41	—	21	2	12	12	5	—	13	5	14	17	4	14	14	—	193	
	Ottobre . . . . .	24	8	35	1	20	7	21	9	9	2	6	11	17	17	2	12	11	3	211	
	Novembre . . . . .	16	6	49	2	14	4	30	5	1	4	11	8	14	17	4	9	15	11	224	
	Dicembre . . . . .	10	8	44	1	24	—	20	13	3	3	14	16	16	22	3	8	11	4	220	
82	<i>Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale . . . . .</i>	4 882	1 625	7 375	812	4 722	715	4 982	4 289	2 403	1 359	3 086	2 972	4 994	3 524	749	2 030	5 151	765	56 435	
	Gennaio . . . . .	525	170	754	89	512	69	531	444	264	153	302	294	507	391	78	214	538	87	5 922	
	Febbraio . . . . .	518	186	778	89	444	65	424	437	199	141	300	274	498	353	67	190	557	90	5 610	
	Marzo . . . . .	473	173	683	75	480	70	514	407	232	123	271	272	462	346	65	208	507	71	5 432	
	Aprile . . . . .	401	114	590	60	391	67	424	413	214	109	255	272	418	278	61	204	404	69	4 744	
	Maggio . . . . .	391	116	581	51	390	50	398	333	214	102	250	229	387	258	60	199	359	45	4 413	
	Giugno . . . . .	351	103	598	61	346	50	402	291	166	85	202	187	351	227	57	133	368	44	4 022	
	Luglio . . . . .	352	116	496	64	324	49	357	271	153	99	236	223	345	258	69	130	332	48	3 922	
	Agosto . . . . .	328	109	487	65	301	46	327	287	173	90	209	186	340	234	63	150	391	40	3 826	
	Settembre . . . . .	341	119	513	59	360	40	306	259	140	82	203	208	324	213	59	139	326	49	3 740	
	Ottobre . . . . .	337	118	581	66	338	55	369	317	168	103	220	266	386	264	56	147	408	72	4 271	
	Novembre . . . . .	402	138	631	59	363	67	410	367	216	124	268	225	393	304	52	120	385	62	4 586	
	Dicembre . . . . .	463	163	683	74	473	87	520	463	264	148	370	336	583	398	62	196	576	88	5 947	

Segue: TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo alcune cause

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	REGIONI						
		PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENEZIA TRI-DENTINA	VENEZIA	VENEZIA GIULIA E ZARA	EMILIA
92	<i>Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari . . . . .</i>	2 581	606	3 201	421	1 662	439	1 579
	Gennaio . . . . .	361	73	375	53	187	53	169
	Febbraio . . . . .	353	66	355	35	149	47	137
	Marzo . . . . .	307	54	353	36	136	41	156
	Aprile . . . . .	177	52	251	36	130	32	116
	Maggio . . . . .	193	27	233	34	133	32	142
	Giugno . . . . .	139	37	214	34	113	38	106
	Luglio . . . . .	176	35	219	23	127	27	121
	Agosto . . . . .	158	44	187	26	137	42	97
	Settembre . . . . .	173	55	232	31	103	27	115
	Ottobre . . . . .	145	54	241	32	127	26	123
	Novembre . . . . .	171	46	224	37	145	35	130
	Dicembre . . . . .	228	63	317	44	175	39	167
106	<i>Bronchiti . . . . .</i>	1 438	450	2 261	218	1 368	326	1 221
	Gennaio . . . . .	230	75	424	38	217	61	196
	Febbraio . . . . .	292	107	391	35	201	52	184
	Marzo . . . . .	197	65	269	33	193	33	168
	Aprile . . . . .	127	19	192	17	127	32	111
	Maggio . . . . .	93	24	125	21	96	18	91
	Giugno . . . . .	60	18	107	12	75	8	61
	Luglio . . . . .	49	14	103	8	44	9	46
	Agosto . . . . .	56	14	61	5	37	10	42
	Settembre . . . . .	65	16	85	7	47	17	45
	Ottobre . . . . .	54	18	120	5	69	28	59
	Novembre . . . . .	69	30	153	15	88	22	87
	Dicembre . . . . .	146	50	231	22	174	36	131
107, 108, 109	<i>Polmoniti . . . . .</i>	6 597	2 529	11 209	1 055	5 921	1 619	5 519
	Gennaio . . . . .	1 005	356	1 977	149	796	245	759
	Febbraio . . . . .	1 310	564	1 769	168	724	210	829
	Marzo . . . . .	903	329	1 239	146	736	197	677
	Aprile . . . . .	497	191	992	97	682	151	532
	Maggio . . . . .	434	174	743	69	485	114	424
	Giugno . . . . .	243	78	525	53	304	68	323
	Luglio . . . . .	224	95	499	36	274	62	242
	Agosto . . . . .	255	88	456	41	239	58	211
	Settembre . . . . .	208	75	441	42	225	60	230
	Ottobre . . . . .	378	116	743	61	378	94	363
	Novembre . . . . .	446	167	740	83	424	146	345
	Dicembre . . . . .	694	296	1 065	110	654	214	584
110	<i>Pleuriti . . . . .</i>	216	105	447	33	232	61	168
	Gennaio . . . . .	20	10	47	4	20	8	20
	Febbraio . . . . .	17	14	38	3	20	7	16
	Marzo . . . . .	15	8	43	2	25	10	21
	Aprile . . . . .	26	9	56	5	25	8	14
	Maggio . . . . .	19	4	40	4	24	3	12
	Giugno . . . . .	18	10	36	4	22	4	17
	Luglio . . . . .	14	10	30	1	18	3	9
	Agosto . . . . .	24	1	26	1	16	5	6
	Settembre . . . . .	19	8	33	2	19	4	16
	Ottobre . . . . .	17	15	28	2	9	4	11
	Novembre . . . . .	13	5	29	3	16	3	11
	Dicembre . . . . .	14	11	41	2	18	2	15

di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.

REGIONI	REGIONI											REGNO
	TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	
92	1 662	755	461	1 230	1 465	2 462	1 760	509	1 219	1 945	494	24 451
	188	100	43	132	138	252	201	60	106	216	59	2 766
	160	80	57	134	140	266	206	39	120	195	62	2 601
	150	78	37	100	144	227	196	43	123	196	48	2 425
	149	89	37	112	124	231	141	53	114	162	42	2 048
	122	50	39	98	109	180	120	37	123	151	46	1 869
	122	41	27	94	119	165	91	40	90	120	29	1 619
	109	48	33	92	104	161	140	42	85	128	28	1 698
	104	59	37	84	126	134	121	39	76	135	21	1 627
	126	40	35	65	91	173	124	40	85	131	42	1 688
	118	45	37	93	113	204	116	39	93	140	27	1 773
	128	55	33	98	99	181	121	38	93	157	32	1 823
	186	70	46	128	158	288	183	39	111	214	58	2 514
106	1 042	524	319	726	912	2 198	1 807	593	1 172	2 052	368	18 995
	173	72	37	113	115	268	205	88	144	241	60	2 757
	130	77	60	90	130	266	261	75	138	283	63	2 835
	116	85	56	100	115	224	246	60	139	281	50	2 430
	122	77	24	61	105	228	173	52	125	216	36	1 844
	83	30	27	53	61	133	104	38	103	154	13	1 267
	45	21	18	33	47	139	116	37	62	116	18	993
	46	10	11	28	45	155	129	28	58	101	13	897
	33	20	12	35	41	117	99	24	81	108	13	808
	43	26	9	36	42	96	89	41	76	99	23	862
	74	25	17	44	53	153	101	62	69	122	19	1 092
	46	27	18	41	53	159	115	44	70	125	27	1 189
	131	54	30	92	105	260	169	44	107	206	33	2 021
107, 108, 109	4 316	1 686	1 074	4 039	2 991	10 128	7 017	1 403	3 622	8 397	2 036	81 158
	568	184	118	489	364	948	748	176	354	907	263	10 406
	563	217	147	553	374	1 104	856	156	323	967	279	11 113
	461	264	144	430	381	1 057	856	154	409	1 060	236	9 699
	417	222	126	370	322	950	629	113	411	848	184	7 734
	343	132	92	294	223	777	494	86	305	728	159	6 076
	232	88	59	228	144	713	507	73	250	607	120	4 615
	177	67	49	223	178	780	499	91	244	565	86	4 391
	195	46	40	237	169	708	414	81	261	465	104	4 068
	197	59	56	183	184	522	374	114	228	412	115	3 725
	324	117	85	260	196	714	480	99	281	510	146	5 345
	290	112	62	283	175	749	477	108	248	541	157	5 553
	549	178	96	489	281	1 106	683	152	308	787	187	8 433
110	163	56	29	152	75	275	161	31	97	294	58	2 653
	15	4	4	15	7	28	13	3	7	22	5	252
	15	3	1	19	9	33	15	1	4	24	3	242
	18	5	4	17	6	22	12	5	5	30	6	254
	10	10	1	15	4	17	11	3	7	26	7	254
	18	6	1	13	5	30	12	—	7	23	4	225
	17	5	1	16	8	22	14	5	9	38	5	251
	13	5	4	6	7	24	14	3	11	17	5	194
	19	3	3	4	6	13	12	1	6	25	5	176
	7	3	2	14	6	25	10	1	12	20	3	204
	10	4	2	8	9	14	21	2	8	17	4	185
	9	5	2	7	2	23	14	3	11	31	9	196
	12	3	4	18	6	24	13	4	10	21	2	220

Segue: TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo alcune cause

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — M E S I	CAUSE DI MORTE						
		PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENÈZIA TRI- DENTINA	VÈNETO	VENÈZIA GIULIA E ZARA	EMILIA
119	<i>Enteriti al disotto di 2 anni. . . . .</i>	2 102	485	8 708	564	3 740	608	1 709
	Gennaio . . . . .	93	24	226	17	173	22	101
	Febbraio . . . . .	71	24	214	22	143	15	94
	Marzo . . . . .	95	18	211	22	143	25	92
	Aprile . . . . .	82	20	215	18	127	19	68
	Maggio . . . . .	95	30	292	15	164	17	110
	Giugno . . . . .	281	52	1 019	42	434	19	160
	Luglio . . . . .	404	113	2 427	138	863	95	215
	Agosto . . . . .	420	90	2 116	154	697	153	269
	Settembre . . . . .	206	44	963	74	378	126	234
	Ottobre . . . . .	161	22	571	29	279	58	173
	Novembre . . . . .	101	28	255	23	188	40	108
	Dicembre . . . . .	93	20	199	10	151	19	85
120	<i>Enteriti e ulcere intestinali (2 anni e oltre). . . . .</i>	679	241	1 187	93	635	118	467
	Gennaio . . . . .	54	14	75	6	40	8	24
	Febbraio . . . . .	40	21	71	6	29	5	27
	Marzo . . . . .	48	20	67	4	38	2	34
	Aprile . . . . .	45	24	70	7	38	7	40
	Maggio . . . . .	42	14	77	7	50	9	21
	Giugno . . . . .	50	12	103	6	46	7	46
	Luglio . . . . .	102	32	189	13	102	18	43
	Agosto . . . . .	99	40	176	23	115	18	75
	Settembre . . . . .	68	11	112	6	43	22	44
	Ottobre . . . . .	56	19	104	7	48	12	40
	Novembre . . . . .	29	18	79	3	40	8	40
	Dicembre . . . . .	46	16	64	5	46	2	33
130, 131, 132	<i>Neftiti . . . . .</i>	1 076	383	1 595	167	1 052	257	831
	Gennaio . . . . .	122	40	147	12	112	22	84
	Febbraio . . . . .	111	35	148	22	85	26	78
	Marzo . . . . .	97	40	110	16	93	20	81
	Aprile . . . . .	96	29	141	15	79	21	64
	Maggio . . . . .	90	41	135	11	91	23	56
	Giugno . . . . .	74	22	114	13	77	12	73
	Luglio . . . . .	81	25	123	14	83	18	58
	Agosto . . . . .	77	23	109	11	69	22	61
	Settembre . . . . .	74	32	134	11	72	14	59
	Ottobre . . . . .	92	24	116	11	80	23	71
	Novembre . . . . .	72	32	161	20	99	30	73
	Dicembre . . . . .	90	40	157	11	112	26	73
dal 163 al 171	<i>Suicidi . . . . .</i>	529	225	556	88	372	180	534
	Gennaio . . . . .	39	29	40	5	27	12	31
	Febbraio . . . . .	33	17	40	4	30	19	30
	Marzo . . . . .	43	16	56	4	30	19	58
	Aprile . . . . .	40	24	48	7	37	15	49
	Maggio . . . . .	54	29	56	11	32	21	69
	Giugno . . . . .	62	16	62	9	52	11	59
	Luglio . . . . .	62	13	51	11	31	23	57
	Agosto . . . . .	42	13	40	5	26	13	40
	Settembre . . . . .	43	15	40	8	28	11	33
	Ottobre . . . . .	47	19	39	11	29	13	35
	Novembre . . . . .	30	19	53	6	29	14	35
	Dicembre . . . . .	34	15	31	7	21	9	38

di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.

		TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO
		1 094	829	477	2 374	3 148	6 803	6 172	1 989	3 534	10 446	1 808	56 590
	Gennaio . . . . .	57	40	22	83	108	182	245	57	122	281	66	1 919
	Febbraio . . . . .	52	49	25	67	100	169	231	47	93	233	51	1 700
	Marzo . . . . .	41	53	19	65	84	142	221	41	106	206	43	1 627
	Aprile . . . . .	38	56	14	73	96	165	217	47	86	262	42	1 645
	Maggio . . . . .	48	42	19	66	92	330	430	71	99	455	50	2 425
	Giugno . . . . .	101	28	35	278	222	1 260	1 113	255	368	1 869	155	7 691
	Luglio . . . . .	225	126	106	693	804	1 945	1 440	531	928	2 492	266	13 811
	Agosto . . . . .	208	191	94	471	778	1 239	773	434	804	1 575	315	10 781
	Settembre . . . . .	132	121	57	251	384	637	446	208	371	982	250	5 864
	Ottobre . . . . .	80	58	44	121	182	294	378	118	247	782	237	3 834
	Novembre . . . . .	59	39	26	129	165	248	370	99	200	801	229	3 108
	Dicembre . . . . .	53	26	16	77	133	192	308	81	110	508	104	2 185
		493	166	115	504	770	1 342	1 308	450	925	2 525	617	12 635
	Gennaio . . . . .	38	9	7	26	40	68	73	16	39	136	47	720
	Febbraio . . . . .	31	10	6	18	32	69	64	18	32	114	28	621
	Marzo . . . . .	24	14	10	28	31	44	63	13	31	122	41	634
	Aprile . . . . .	21	10	4	20	28	47	68	14	35	109	24	611
	Maggio . . . . .	36	3	3	21	34	65	75	11	42	110	32	652
	Giugno . . . . .	28	8	8	50	33	126	147	33	61	226	33	1 023
	Luglio . . . . .	56	14	17	97	146	246	244	83	159	366	65	1 992
	Agosto . . . . .	69	42	21	90	129	229	173	103	179	339	60	1 980
	Settembre . . . . .	67	19	24	50	121	153	130	83	135	297	70	1 455
	Ottobre . . . . .	40	15	4	37	82	124	94	34	99	259	78	1 152
	Novembre . . . . .	36	11	7	24	51	74	70	28	69	235	76	898
	Dicembre . . . . .	47	11	4	43	43	97	107	14	44	212	63	897
		781	359	178	1 001	736	2 094	1 414	381	910	2 263	409	15 887
	Gennaio . . . . .	76	40	12	109	61	222	143	28	79	202	41	1 552
	Febbraio . . . . .	71	35	16	98	61	187	119	31	52	212	38	1 425
	Marzo . . . . .	77	33	24	84	69	182	131	33	76	193	40	1 399
	Aprile . . . . .	70	36	13	84	70	183	109	22	81	190	34	1 337
	Maggio . . . . .	46	23	8	82	62	152	121	30	58	181	33	1 243
	Giugno . . . . .	66	30	11	61	49	124	96	17	60	165	29	1 093
	Luglio . . . . .	42	23	9	62	51	131	106	32	53	185	33	1 129
	Agosto . . . . .	55	19	13	73	73	153	105	30	75	166	34	1 168
	Settembre . . . . .	50	17	14	61	46	175	105	43	84	173	31	1 195
	Ottobre . . . . .	75	22	20	80	56	182	127	40	107	199	32	1 357
	Novembre . . . . .	72	26	19	88	63	182	118	39	95	180	31	1 400
	Dicembre . . . . .	81	55	19	119	75	221	134	36	90	217	33	1 589
		286	124	72	201	89	265	152	33	54	289	92	4 141
	Gennaio . . . . .	21	9	2	12	4	21	5	3	6	16	13	295
	Febbraio . . . . .	19	8	6	13	3	23	5	3	5	11	9	278
	Marzo . . . . .	33	15	10	21	9	16	10	—	2	20	8	370
	Aprile . . . . .	18	7	9	13	8	21	13	1	10	24	6	350
	Maggio . . . . .	26	13	3	23	7	32	22	4	3	34	14	453
	Giugno . . . . .	35	10	14	31	12	26	21	8	5	35	6	474
	Luglio . . . . .	32	16	4	25	11	27	13	3	3	43	8	433
	Agosto . . . . .	30	11	5	16	14	26	20	1	5	26	8	341
	Settembre . . . . .	15	3	3	14	2	20	14	5	2	20	6	282
	Ottobre . . . . .	20	7	6	15	7	15	8	2	6	20	5	304
	Novembre . . . . .	20	14	5	11	8	20	13	1	4	18	6	306
	Dicembre . . . . .	17	11	5	7	4	18	8	2	3	22	3	255

Segue: TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo alcune cause

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	REGIONI						
		PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENEZIA TRI-DENTINA	VENETo	VENEZIA GIULIA E ZARA	EMILIA
dal 176 al 194	<i>Morti accidentali</i> . . . . .	1 279	469	2 007	342	1 320	423	1 090
	Gennaio . . . . .	108	24	129	22	83	33	62
	Febbraio . . . . .	81	35	145	23	78	29	50
	Marzo . . . . .	72	34	136	28	96	31	69
	Aprile . . . . .	90	38	133	20	99	24	76
	Maggio . . . . .	94	46	185	31	102	49	95
	Giugno . . . . .	141	39	249	34	168	41	147
	Luglio . . . . .	149	33	197	35	156	52	145
	Agosto . . . . .	159	51	196	39	137	31	139
	Settembre . . . . .	109	49	164	39	109	44	98
	Ottobre . . . . .	106	32	152	25	97	29	64
	Novembre . . . . .	73	30	157	29	87	20	76
	Dicembre . . . . .	97	58	164	17	108	40	69
	<i>Altre malattie</i> . . . . .	17 150	6 376	24 921	3 607	18 614	5 518	14 330
	Gennaio . . . . .	1 676	695	2 498	355	1 986	621	1 448
	Febbraio . . . . .	1 652	740	2 521	363	1 762	549	1 309
	Marzo . . . . .	1 599	629	2 271	361	1 804	542	1 371
	Aprile . . . . .	1 479	522	2 073	278	1 579	486	1 205
	Maggio . . . . .	1 482	494	1 913	305	1 453	392	1 185
	Giugno . . . . .	1 311	427	1 828	288	1 427	376	1 068
	Luglio . . . . .	1 296	424	1 928	262	1 334	363	1 071
	Agosto . . . . .	1 187	458	1 861	275	1 295	376	972
	Settembre . . . . .	1 180	426	1 758	283	1 218	374	987
	Ottobre . . . . .	1 284	436	1 948	257	1 370	404	1 044
	Novembre . . . . .	1 334	487	1 989	264	1 492	441	1 182
	Dicembre . . . . .	1 670	638	2 333	316	1 894	594	1 488
199, 200	<i>Morti per causa ignota o non dichiarata o male indicata</i> .	717	176	839	81	460	57	281
	Gennaio . . . . .	75	21	97	11	51	5	27
	Febbraio . . . . .	76	25	86	9	48	6	30
	Marzo . . . . .	77	16	68	10	59	7	41
	Aprile . . . . .	59	13	64	9	41	5	23
	Maggio . . . . .	68	17	68	5	31	4	23
	Giugno . . . . .	50	5	65	6	35	2	25
	Luglio . . . . .	46	11	56	4	29	1	14
	Agosto . . . . .	38	9	48	7	31	5	16
	Settembre . . . . .	43	9	55	4	17	4	16
	Ottobre . . . . .	48	13	70	3	27	3	19
	Novembre . . . . .	62	10	63	5	41	3	19
	Dicembre . . . . .	75	27	99	8	50	12	28

di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.

		TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO
		857	437	264	811	500	1 081	713	251	564	1 084	311	13 803
	Gennaio . . . . .	50	29	17	47	30	76	52	16	43	73	24	918
	Febbraio . . . . .	64	25	13	62	27	78	50	13	53	92	19	937
	Marzo . . . . .	63	30	14	45	35	75	45	32	40	77	23	945
	Aprile . . . . .	63	23	20	57	29	74	46	12	36	64	23	927
	Maggio . . . . .	71	50	17	74	35	74	45	16	41	76	30	1 131
	Giugno . . . . .	79	61	29	81	52	106	78	62	84	141	31	1 623
	Luglio . . . . .	84	36	31	90	63	97	86	22	48	127	28	1 479
	Agosto . . . . .	98	46	26	80	58	103	95	18	52	112	32	1 472
	Settembre . . . . .	78	45	24	74	47	95	56	19	37	91	24	1 202
	Ottobre . . . . .	65	39	25	67	35	95	54	14	48	80	25	1 052
	Novembre . . . . .	59	23	24	57	47	96	48	13	44	61	23	967
	Dicembre . . . . .	83	30	24	77	42	112	58	14	38	90	29	1 150
		11 904	5 949	2 985	10 561	8 589	19 486	13 939	3 390	9 176	22 144	4 614	203 253
	Gennaio . . . . .	1 241	626	286	1 089	902	1 808	1 285	297	828	1 986	477	20 194
	Febbraio . . . . .	1 128	595	302	1 016	898	1 745	1 335	278	783	2 054	459	19 489
	Marzo . . . . .	1 091	609	308	947	793	1 669	1 333	284	807	1 918	409	18 745
	Aprile . . . . .	995	507	246	851	696	1 524	1 081	273	782	1 683	346	16 606
	Maggio . . . . .	995	433	216	782	618	1 428	938	219	698	1 512	351	15 324
	Giugno . . . . .	798	403	197	700	518	1 458	1 047	196	611	1 785	286	14 724
	Luglio . . . . .	814	443	242	812	645	1 605	1 206	297	749	1 922	322	15 735
	Agosto . . . . .	840	428	233	783	699	1 540	1 131	379	851	1 883	354	15 545
	Settembre . . . . .	873	392	216	721	632	1 331	976	312	665	1 551	378	14 273
	Ottobre . . . . .	994	429	195	829	643	1 531	1 066	298	770	1 773	396	15 667
	Novembre . . . . .	884	450	232	851	635	1 539	1 061	237	692	1 782	379	15 931
	Dicembre . . . . .	1 341	634	312	1 180	910	2 218	1 480	320	940	2 295	457	21 020
		282	112	45	326	220	385	175	62	216	575	290	5 299
	Gennaio . . . . .	22	12	3	28	29	41	23	4	16	43	35	543
	Febbraio . . . . .	35	10	7	35	25	34	11	9	11	52	33	542
	Marzo . . . . .	27	12	3	35	16	28	24	7	25	58	27	540
	Aprile . . . . .	26	6	6	28	13	42	16	3	23	43	33	453
	Maggio . . . . .	21	9	3	24	16	23	9	7	26	42	32	428
	Giugno . . . . .	15	6	3	14	15	29	18	4	17	74	16	399
	Luglio . . . . .	22	14	3	22	12	25	13	4	17	41	20	354
	Agosto . . . . .	24	6	6	18	12	31	11	4	30	52	13	361
	Settembre . . . . .	14	9	4	20	18	26	11	2	13	33	21	319
	Ottobre . . . . .	26	5	2	22	15	29	8	1	12	36	15	354
	Novembre . . . . .	16	8	4	23	19	33	12	8	10	38	16	390
	Dicembre . . . . .	34	15	1	57	30	44	19	9	16	63	29	616

TAVOLA X. — Morti, durante l'anno 1931, classi

NUMERI DELL' ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	MENO DI I MESE		DA I MESE A MENO DI I ANNO		DI I ANNO		DI 2 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	<b>Complesso</b>	<b>39855</b>	<b>17767</b>	<b>76011</b>	<b>35507</b>	<b>36479</b>	<b>18015</b>	<b>11538</b>	<b>5660</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie .</b>	<b>1096</b>	<b>464</b>	<b>7828</b>	<b>3688</b>	<b>6567</b>	<b>3159</b>	<b>3250</b>	<b>1582</b>
I, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	—	—	40	22	96	50	150	77
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo . . . . .	—	—	2	2	2	1	—	—
7	Morbillo . . . . .	2	2	726	316	1341	618	576	274
8	Scarlattina . . . . .	—	—	102	38	326	146	338	171
9	Tosse convulsa . . . . .	62	26	1533	809	926	544	218	141
10	Difterite . . . . .	10	6	305	130	753	306	515	234
11	Influenza . . . . .	245	108	1827	817	1006	484	396	196
13	Dissenteria . . . . .	4	1	103	53	75	38	19	7
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	15	7	258	108	285	131	107	49
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	19	6	921	412	796	366	441	212
34	Sifilide . . . . .	282	121	353	178	66	34	28	7
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	108	50	486	232	218	110	86	38
38	Malaria . . . . .	20	10	344	172	304	140	167	83
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	8	2	70	34	150	78	111	59
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	321	125	758	345	223	113	98	34
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>18</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni .	3	2	26	9	26	10	41	15
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	1	—	7	6	2	1	5	3
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . . . . .</b>	<b>206</b>	<b>98</b>	<b>697</b>	<b>313</b>	<b>668</b>	<b>338</b>	<b>215</b>	<b>102</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	2	2	12	3	9	6	7	5
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Diabete mellito . . . . .	—	—	1	1	1	—	2	—
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	48	23	232	107	226	110	74	42
66	Mal. ghiand. tiroide e ghian. parat.	73	34	87	48	33	19	13	7
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	83	39	365	154	399	203	119	48
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . . . . .</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>293</b>	<b>143</b>	<b>238</b>	<b>126</b>	<b>84</b>	<b>42</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	—	—	167	78	150	86	40	23
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . . . . .	26	11	126	65	88	40	44	19
	<b>V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
75	Alcolismo acuto e cronico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f) . . . . .</b>	<b>1726</b>	<b>720</b>	<b>3823</b>	<b>1788</b>	<b>1468</b>	<b>702</b>	<b>612</b>	<b>300</b>
79	Meningite semplice . . . . .	47	19	696	312	358	167	188	87
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	33	17	32	14	14	7	8	2
83	Paralisi progressiva degli alienati.	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Epilessia . . . . .	3	—	16	4	13	8	14	6
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	1632	678	2970	1402	1016	491	372	188
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi.	11	6	109	56	67	29	30	17
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio . . . . .</b>	<b>112</b>	<b>56</b>	<b>117</b>	<b>49</b>	<b>98</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>36</b>
90	Pericardite . . . . .	—	—	3	2	2	1	4	3
91	Endocardite acuta . . . . .	1	—	6	2	9	5	10	5
92	Endocardite cr. compr. le aff. valv.	31	13	32	16	18	5	13	6
93	Malattie del miocardio . . . . .	5	1	6	3	5	1	6	4
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Altre malattie del cuore . . . . .	53	30	29	8	19	11	5	2
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	—	—	—	—	1	—	—	—

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine

ficati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

		DI 3 ANNI		DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI		NUMERI DELL' ELENCO NOSOLOGICO
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	
	<b>Complesso</b>	<b>6553</b>	<b>3208</b>	<b>4420</b>	<b>2137</b>	<b>11677</b>	<b>5691</b>	<b>6249</b>	<b>3082</b>	<b>12748</b>	<b>6393</b>	<b>16005</b>	<b>7919</b>	<b>14271</b>	<b>7377</b>	<b>13516</b>	<b>6928</b>	<b>13452</b>	<b>6855</b>	
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie .</b>	<b>2342</b>	<b>1145</b>	<b>1700</b>	<b>828</b>	<b>4695</b>	<b>2417</b>	<b>2638</b>	<b>1483</b>	<b>6756</b>	<b>3968</b>	<b>8645</b>	<b>4740</b>	<b>7235</b>	<b>3932</b>	<b>5731</b>	<b>3060</b>	<b>4636</b>	<b>2334</b>	
I, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	125	53	129	62	632	344	542	306	1060	539	911	459	668	357	380	245	262	188	I, 2
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	3
6	Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	Morbillo . . . . .	279	144	144	72	262	142	37	23	23	11	8	5	3	1	4	4	—	—	7
8	Scarlattina . . . . .	290	151	228	106	437	234	78	46	36	22	25	16	13	6	13	6	1	1	8
9	Tosse convulsa . . . . .	116	64	63	43	44	26	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10	Difterite . . . . .	476	213	347	164	609	294	87	46	25	15	18	13	11	8	4	4	3	2	10
11	Influenza . . . . .	213	112	129	73	303	167	162	83	342	166	337	152	296	144	293	174	325	154	11
13	Dissenteria . . . . .	12	7	10	3	40	15	12	2	14	5	8	3	10	3	2	7	4	4	13
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	75	32	61	26	314	187	542	394	3616	2380	5676	3256	4931	2731	3920	2007	3028	1448	23
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	385	178	350	163	1235	628	779	429	1151	612	1155	592	782	419	617	345	481	272	dal 24 al 32
34	Sifilide . . . . .	9	4	3	1	17	10	11	5	11	7	15	5	8	5	17	62	22	22	34
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	67	35	48	21	177	89	108	44	148	75	191	112	176	103	172	110	168	93	36
38	Malaria . . . . .	121	56	82	34	280	124	124	47	139	52	116	53	133	63	119	57	119	59	38
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	103	60	63	36	116	70	29	13	22	12	12	7	15	8	23	11	16	7	dal 39 al 42
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	71	36	43	24	229	87	123	42	169	72	172	67	158	80	131	78	163	84	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>122</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>33</b>	<b>152</b>	<b>67</b>	<b>218</b>	<b>87</b>	<b>289</b>	<b>155</b>	<b>504</b>	<b>320</b>	<b>877</b>	<b>587</b>	
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni .	43	14	27	12	115	42	71	29	145	64	202	75	262	130	460	277	814	525	dal 45 al 53
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	—	—	1	1	7	2	4	4	7	3	16	12	27	25	44	43	63	62	54, 55
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . . . . .</b>	<b>102</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>325</b>	<b>136</b>	<b>242</b>	<b>123</b>	<b>284</b>	<b>133</b>	<b>270</b>	<b>131</b>	<b>224</b>	<b>110</b>	<b>227</b>	<b>120</b>	<b>272</b>	<b>161</b>	
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	17	7	24	12	209	82	173	85	194	91	142	74	103	51	94	53	100	57	56
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	—	—	—	—	5	4	—	—	5	2	7	4	8	7	6	4	16	12	57, 58
59	Diabete mellito . . . . .	—	—	—	—	19	8	20	13	40	22	62	24	64	27	60	22	72	32	59
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	32	15	5	2	13	4	5	4	5	2	6	2	2	1	6	4	7	6	dal 60 al 64
66	Mal. ghiand. tiroide e ghian. parat.	4	2	4	2	4	2	5	3	9	4	16	13	15	11	20	15	23	20	66
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	49	25	20	9	75	36	39	18	31	12	37	14	32	13	41	22	54	34	65, 67, 68, 69
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . . . . .</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>188</b>	<b>75</b>	<b>99</b>	<b>45</b>	<b>127</b>	<b>60</b>	<b>152</b>	<b>78</b>	<b>133</b>	<b>74</b>	<b>147</b>	<b>89</b>	<b>118</b>	<b>70</b>	
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	21	9	24	11	55	24	21	13	46	33	51	39</							

Segue: TAVOLA X. — Morti, durante l'anno 1931, classi

ficati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI		DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F			
97, 98 dal 99 al 103	Arteriosclerosi (a) e cangrena . . . Altre mal. dell'app. circolatorio . . .	3 19	3 9	4 37	2 16	20 24	10 9	19 6	13 3	11 8	9 2	7 2	5 2	16 12	10 5	2 11	1 5	4 10	1 6	7 23	1 13	4 24	2 9	7 34	3 22	5 55	5 32	97, 98 dal 99 al 103		
106	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio.</b> Bronchiti . . . . .	4010	1697	18946	8392	11063	5234	3502	1720	1704	850	946	474	1965	986	723	374	1557	661	1861	748	1570	739	1741	788	1895	843	106		
107, 108, 109, 110	Polmoniti . . . . . Pleuriti . . . . .	1360 2551	579 1075	3427 15209	1581 6673	1279 9416	654 4433	375 2934	192 1452	141 1452	83 718	76 787	40 397	156 1623	84 805	39 602	22 314	60 1334	33 552	52 1589	30 638	53 1341	26 637	50 1472	28 678	71 1619	34 726	107, 108, 109, 110		
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. app. resp. escl. la tbc. <b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b> Ulcera dello stom. e del duodeno. Enteriti al disotto di due anni. Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre). Appendicite . . . . .	97 5432	43 2474	197 38499	97 18344	134 14671	52 7586	85 2544	34 1311	48 920	21 447	46 621	21 299	85 1507	43 785	29 633	12 308	49 777	24 332	65 969	25 421	63 991	24 454	103 1005	23 460	109 1164	37 543	104, 105, dal 111 al 114		
117, 119, 120, 121, 122, 124	Malattie della prostata . . . . . Malattie degli organi genitali (d). <b>XI. - Mal. della gravid. parto e puerp.</b> Accidenti della gravidanza . . . . . Emorragia puerperale . . . . . Setticemia e infezioni puerperali. Tossiemia della gravidanza, ecc. (e) Altre malattie puerperali . . . . .	5081	2324	37381	17821	14128	7320	2315	1208	726	360	403	200	743	400	199	111	176	95	182	93	164	88	155	79	174	112	120		
125, 126, 127, 115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente. <b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b> Nefriti . . . . . Altre malattie dei reni, ecc. (c) . . . . . Calcolosi delle vie urinarie . . . . . Mal. della vescica, esclusi i tumori. Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. Malattie della prostata . . . . . Malattie degli organi genitali (d). <b>XI. - Mal. della gravid. parto e puerp.</b> Accidenti della gravidanza . . . . . Emorragia puerperale . . . . . Setticemia e infezioni puerperali. Tossiemia della gravidanza, ecc. (e) Altre malattie puerperali . . . . .	257	118	867	433	420	216	169	79	139	67	141	64	424	241	179	99	232	109	265	149	263	163	219	126	213	126	123, 128, 129		
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139	Malattie della prostata . . . . . Malattie degli organi genitali (d). <b>XI. - Mal. della gravid. parto e puerp.</b> Accidenti della gravidanza . . . . . Emorragia puerperale . . . . . Setticemia e infezioni puerperali. Tossiemia della gravidanza, ecc. (e) Altre malattie puerperali . . . . .	67	29	546	256	578	303	401	181	302	147	220	101	581	297	200	103	317	170	338	207	380	224	443	260	520	323	130, 131, 132		
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	Altre mal. dell'apparato digerente. <b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b> Nefriti . . . . . Altre malattie dei reni, ecc. (c) . . . . . Calcolosi delle vie urinarie . . . . . Mal. della vescica, esclusi i tumori. Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. Malattie della prostata . . . . . Malattie degli organi genitali (d). <b>XI. - Mal. della gravid. parto e puerp.</b> Accidenti della gravidanza . . . . . Emorragia puerperale . . . . . Setticemia e infezioni puerperali. Tossiemia della gravidanza, ecc. (e) Altre malattie puerperali . . . . .	92	40	609	295	623	333	415	189	317	153	228	106	601	301	223	109	353	192	422	266	488	303	570	360	669	423	133, 134, 135, 136, 137, 138, 139		
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul. <b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b> Mal. delle ossa e org. della locom. (f) <b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b> Vizi di conformazione congeniti (g) <b>XV. - Malattie dell'infanzia</b> Debolezza congenita . . . . . Nascita prematura (h) . . . . . Conseguenze del parto . . . . . Altre malattie speciali dell'infanzia <b>XVI. - Senilità</b> Senilità . . . . .	77	36	285	131	125	66	46	29	29	15	18	6	60	27	42	14	66	20	68	30	48	19	52	25	64	28	151, 152, 153		
154, 155, 156	Mal. della pelle e del tessuto cellul. <b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b> Mal. delle ossa e org. della locom. (f) <b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b> Vizi di conformazione congeniti (g) <b>XV. - Malattie dell'infanzia</b> Debolezza congenita . . . . . Nascita prematura (h) . . . . . Conseguenze del parto . . . . . Altre malattie speciali dell'infanzia <b>XVI. - Senilità</b> Senilità . . . . .	77	36	285	131	125	66	46	29	29	15	18	6	60	27	42	14	66	20	68	30	48	19	52	25	64	28	154, 155, 156		
157	Mal. della pelle e del tessuto cellul. <b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b> Mal. delle ossa e org. della locom. (f) <b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b> Vizi di conformazione congeniti (g) <b>XV. - Malattie dell'infanzia</b> Debolezza congenita . . . . . Nascita prematura (h) . . . . . Conseguenze del parto . . . . . Altre malattie speciali dell'infanzia <b>XVI. - Senilità</b> Senilità . . . . .	3	2	47	18	25	11	35	16	37	18	19	10	167	64	139	54	101	30	27	8	27	11	41	14	29	10	157		
158, 159, 160, 161	Mal. della pelle e del tessuto cellul. <b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b> Mal. delle ossa e org. della locom. (f) <b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b> Vizi di conformazione congeniti (g) <b>XV. - Malattie dell'infanzia</b> Debolezza congenita . . . . . Nascita prematura (h) . . . . . Conseguenze del parto . . . . . Altre malattie speciali dell'infanzia <b>XVI. - Senilità</b> Senilità . . . . .	1502	672	763	370	120	66	34	11	19	3	18	11	53	31	45	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158, 159, 160, 161	
162	Mal. della pelle e del tessuto cellul. <b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b> Mal. delle ossa e org. della locom. (f) <b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b> Vizi di conformazione congeniti (g) <b>XV. - Malattie dell'infanzia</b> Debolezza congenita . . . . . Nascita prematura (h) . . . . . Conseguenze del parto . . . . . Altre malattie speciali dell'infanzia <b>XVI. - Senilità</b> Senilità . . . . .	25392	11408	3615	1750	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162	
dal 163 al 171, dal 172 al 175, dal 176 al 194, 195, 196, 197	Altre mal. app. resp. escl. la tbc. <b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b> Ulcera dello stom. e del duodeno. Enteriti al disotto di due anni. Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre). Appendicite . . . . . Ernia, occlusione intestinale . . . . . Cirrosi del fegato . . . . . Altre mal. fegato e vie biliari (b). Altre mal. dell'apparato digerente. <b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b> Nefriti . . . . . Altre malattie dei reni, ecc. (c) . . . . . Calcolosi delle vie urinarie . . . . . Mal. della vescica, esclusi i tumori. Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. Malattie della prostata . . . . . Malattie degli organi genitali (d). <b>XI. - Mal. della gravid. parto e puerp.</b> Accidenti della gravidanza . . . . . Emorragia puerperale . . . . . Setticemia e infezioni puerperali. Tossiemia della gravidanza, ecc. (e) Altre malattie puerperali . . . . .	97	43	197	97	134	52	85	34	5432	2474	38499	18344	14671	7586	2544	1311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	dal 163 al 171, dal 172 al 175, dal 176 al 194, 195, 196, 197
199, 200	Altre mal. app. resp. escl. la tbc. <b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b> Ulcera dello stom. e del duodeno. Enteriti al disotto di due anni. Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre). Appendicite . . . . . Ernia, occlusione intestinale . . . . . Cirrosi del fegato . . . . . Altre mal. fegato e vie biliari (b). Altre mal. dell'apparato digerente. <b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b> Nefriti . . . . . Altre malattie dei reni, ecc. (c) . . . . . Calcolosi delle vie urinarie . . . . . Mal. della vescica, esclusi i tumori. Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. Malattie della prostata . . . . . Malattie degli organi genitali (d). <b>XI. - Mal. della gravid. parto e puerp.</b> Accidenti della gravidanza . . . . . Emorragia puerperale . . . . . Setticemia e infezioni puerperali. Tossiemia della gravidanza, ecc. (e) Altre malattie puerperali . . . . .	103	46	211	111	74	38	26	9	103	46	211	111	74	38	26	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199, 200	

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti. (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti.

Segue: TAVOLA X. — Morti, durante l'anno 1931, clas

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and age groups (DA 40 A 44 ANNI, DA 45 A 49 ANNI, DA 50 A 54 ANNI, DA 55 A 59 ANNI, DA 60 A 64 ANNI). Rows include categories like Complesso, Malattie infettive e parassitarie, Tumori (neoplasie), Malattie reumatiche, ecc., Malattie del sangue, ecc., Avvelenam. cron. e intossicazioni, Malattie del sist. nervoso, ecc., and Malattie dell'app. circolatorio.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e

sificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns: age groups (DA 65 A 69 ANNI, DA 70 A 74 ANNI, DA 75 A 79 ANNI, DA 80 A 84 ANNI, DA 85 A 89 ANNI, DA 90-99), ETÀ IGNOTA, T O T A L E (M, F, M F), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows correspond to the same categories as the first table.

altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA X. — Morti, durante l'anno 1931, clas

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and age groups (DA 40 A 44 ANNI, DA 45 A 49 ANNI, DA 50 A 54 ANNI, DA 55 A 59 ANNI, DA 60 A 64 ANNI). Rows list various causes of death like Arteriosclerosi, Malattie dell'app. respiratorio, etc.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni morti. (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione di civili da parte

ificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns: age groups (DA 65 A 69 ANNI, DA 70 A 74 ANNI, DA 75 A 79 ANNI, DA 80 A 84 ANNI, DA 85 A 89 ANNI, DA 90 - 99), ETÀ IGNOTA, T O T A L E (M, F, MF), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows list various causes of death like Arteriosclerosi, Malattie dell'app. respiratorio, etc.

da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati di armate belligeranti.



TAVOLA XI. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno

Table with columns for cause of death, age groups, and total deaths. Rows include categories like 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', etc.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e (g) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

1931, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

Table with columns for cause of death, age groups, and total deaths. Rows include categories like 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', etc.

altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA XI. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	DA 0 A 6 GIORNI				DA 7 A 13 GIORNI			
		legit- tima	illegit- tima	non indicata	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	non indicata	TOTALE
	<b>VIII. — Malattie dell'app. respiratorio .</b>	777	36	4	817	977	67	7	1051
106	Bronchiti . . . . .	253	9	2	264	342	19	2	363
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	470	27	2	499	616	46	5	667
110	Pleuriti . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	1
104, 105, dal III al III 4	Altre mal. app. resp. escl. la tbc. .	53	—	—	53	19	2	—	21
	<b>IX. — Malattie dell'apparato digerente.</b>	920	48	2	970	1255	83	7	1345
117	Ulcera dello stom. e del duodeno	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Enteriti al disotto di due anni . .	831	47	2	880	1162	77	5	1244
121	Appendicite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Ernia, occlusione intestinale. . .	27	—	—	27	21	2	—	23
124	Cirrosi del fegato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (a).	13	1	—	14	4	—	—	4
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente	49	—	—	49	68	4	2	74
	<b>X. — Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	—	—	—	—	41	1	1	43
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	—	—	—	—	33	1	1	35
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b) .	—	—	—	—	6	—	—	6
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. .	—	—	—	—	1	—	—	1
137	Malattie della prostata . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
138, 139	Malattie degli organi genitali (c) .	—	—	—	—	1	—	—	1
	<b>XII. — Mal. della pelle e del tess. celiul.</b>	1	—	—	1	16	1	—	17
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	1	—	—	1	16	1	—	17
	<b>XIII. — Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (d)	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XIV. — Vizi di conformazione congeniti</b>	813	49	2	864	289	12	4	305
157	Vizi di conformazione congeniti (e).	813	49	2	864	289	12	4	305
	<b>XV. — Malattie dell'infanzia. . . . .</b>	15193	1195	82	16470	4234	387	13	4634
158	Debolezza congenita . . . . .	6319	395	36	6750	2507	162	8	2677
159	Nascita prematura (f) . . . . .	6082	643	29	6754	1200	167	4	1371
160	Conseguenze del parto . . . . .	385	20	1	406	22	2	—	24
161	Altre mal. speciali dell'infanzia .	2407	137	16	2560	505	56	1	562
	<b>XVII. — Morti violente e accidentali .</b>	16	38	5	59	7	1	—	8
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	6	37	5	48	—	1	—	1
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	10	—	—	10	7	—	—	7
195	Altre morti violente (g) . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—
	<b>XVIII. — Cause di morte non determinate</b>	43	4	—	47	29	2	—	31
199, 200	Cause non specific. o mal definite.	43	4	—	47	29	2	—	31

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (c) non indicate come omicidio, accidente) è sconosciuta.

l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 14 A 29 GIORNI				A MENO DI I MESE				DA I MESE A MENO DI I ANNO				NEL PRIMO ANNO DI VITA				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	legit- tima	illegit- tima	non indicata	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	non indicata	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	non indicata	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	non indicata	TOTALE	
	1983	149	10	2142	3737	252	21	4010	17698	1164	84	18946	21435	1416	105	22956	
106	695	34	4	733	1290	62	8	1360	3219	196	12	3427	4509	258	20	4787	106
107, 108, 109	1267	112	6	1385	2353	185	13	2551	14186	952	71	15209	16539	1137	84	17760	107, 108, 109
110	1	—	—	1	2	—	—	2	107	6	—	113	109	6	—	115	110
104, 105, dal III al III 4	20	3	—	23	92	5	—	97	186	10	1	197	278	15	1	294	104, 105, dal III al III 4
	2804	301	12	3117	4979	432	21	5432	36340	1991	168	38499	41319	2423	189	43831	
117	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	7	7	—	—	7	117
119	2655	291	11	2957	4648	415	18	5081	35294	1926	161	37381	39942	2341	179	42462	119
121	1	—	—	1	2	—	—	2	5	—	—	5	6	—	—	6	121
122	18	2	—	20	66	4	—	70	141	9	—	150	207	13	—	220	122
124	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7	6	1	—	7	124
125, 126, 127	4	—	—	4	21	1	—	22	77	4	1	82	98	5	1	104	125, 126, 127
115, 116, 118, 123, 128, 129	126	8	—	134	243	12	2	257	810	51	6	867	1053	63	8	1124	115, 116, 118, 123, 128, 129
	44	4	1	49	85	5	2	92	562	45	2	609	647	50	4	701	
130, 131, 132	27	4	1	32	60	5	2	67	507	37	2	546	567	42	4	613	130, 131, 132
133	3	—	—	3	9	—	—	9	19	5	—	24	28	5	—	33	133
135	5	—	—	5	5	—	—	5	33	3	—	36	38	3	—	41	135
136	2	—	—	2	3	—	—	3	1	—	—	1	4	—	—	4	136
137	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	137
138, 139	6	—	—	6	7	—	—	7	2	—	—	2	9	—	—	9	138, 139
	54	5	—	59	71	6	—	77	255	27	3	285	326	33	3	362	
151, 152, 153	54	5	—	59	71	6	—	77	255	27	3	285	326	33	3	362	151, 152, 153
	3	—	—	3	3	—	—	3	35	11	1	47	38	11	1	50	
154, 155, 156	3	—	—	3	3	—	—	3	35	11	1	47	38	11	1	50	154, 155, 156
	320	13	—	333	1422	74	6	1502	728	33	2	763	2150	107	8	2265	
157	320	13	—	333	1422	74	6	1502	728	33	2	763	2150	107	8	2265	157
	3864	402	22	4288	23201	1984	117	25392	3295	297	23	3615	26586	2281	140	28007	
158	2382	166	11	2559	11208	723	55	11986	2714	203	16	2933	13922	926	71	14919	158
159	1001	170	8	1179	8283	980	41	9304	343	59	5	407	8626	1039	46	9711	159
160	14	2	—	16	421	24	1	446	4	—	—	5	425	24	2	451	160
161	467	64	3	534	3379	257	20	3656	234	35	1	270	3613	292	21	3926	161
	7	—	—	7	30	39	5	74	231	14	—	245	261	53	5	319	
dal 172 al 175	2	—	—	2	8	38	5	51	5	1	—	6	13	39	5	57	dal 172 al 175
dal 176 al 194	5	—	—	5	22	—	—	22	226	13	—	239	248	13	—	261	dal 176 al 194
195	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	195
	22	2	1	25	94	8	1	103	198	13	—	211	292	21	1	314	
199, 200	22	2	1	25	94	8	1	103	198	13	—	211	292	21	1	314	199, 200

veneree. (d) esclusa a tubercolosi e il reumatismo. (e) esclusi i nati morti. (f) non compresi i nati morti. (g) di cui la natura (suicidio,

TAVOLA XII. — Bambini morti nella prima settimana di vita, durante

l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	MENO DI 1 GIORNO		1 GIORNO		2 GIORNI		3 GIORNI		4 GIORNI		5 GIORNI		6 GIORNI		MORTI NELLA PRIMA SETTIMANA DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	M F	
			<b>Complesso . . .</b>	<b>6640</b>	<b>2827</b>	<b>3344</b>	<b>1509</b>	<b>3122</b>	<b>1415</b>	<b>2409</b>	<b>1138</b>	<b>1685</b>	<b>733</b>	<b>1573</b>	<b>735</b>	<b>1363</b>	<b>606</b>	<b>11173</b>	
10	Difterite . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10
34	Siflide . . . . .	49	22	10	5	16	7	15	4	14	6	11	2	7	3	73	49	122	34
36	Infezione purulenta e setticemia, non puerperali	1	—	—	—	2	1	—	—	4	—	—	—	3	3	6	4	10	36
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre malattie infettive e parassitarie . . .	3	—	6	5	4	2	9	4	9	6	10	4	15	4	31	25	56	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	dal 45 al 53
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	2	1	3	2	5	1	1	—	2	1	3	1	—	—	10	6	16	dal 60 al 64
66	Mal. della ghiand. tiroide e delle ghiand. paratir.	—	—	—	—	7	3	3	1	3	2	6	4	10	3	16	13	29	66
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	4	1	3	1	5	4	4	2	—	—	8	4	3	2	13	14	27	65, 67, 68, 69
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie ed altre mal. del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .	—	—	2	1	1	—	3	2	—	—	—	—	2	1	4	4	8	70, 72, 73, 74
79	Meningite semplice . . . . .	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	6	79
82	Emorragia cerebr., embolia e trombosi cerebr.	3	3	4	2	3	1	1	1	3	1	2	1	—	—	7	9	16	82
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	62	27	99	31	109	41	98	42	75	33	90	40	78	23	374	237	611	78, 81, 86, 87
dal 99 al 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	4	—	4	dal 99 al 103
106	Bronchiti . . . . .	18	7	29	17	41	21	45	24	38	18	52	21	41	17	139	125	264	106
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	30	12	59	26	90	44	81	32	74	30	91	36	74	36	283	216	499	107, 108, 109
110	Pleuriti . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	110
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. dell'appar. respir., esclusa la tuberc.	11	7	11	2	5	5	10	5	7	4	6	4	3	1	25	28	53	104, 105, dal 111 al 114
119	Enteriti al disotto di due anni . . . . .	81	37	97	49	120	61	141	67	133	65	149	78	159	72	451	429	880	119
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	2	1	3	—	4	—	8	2	4	2	5	2	1	1	19	8	27	122
125, 126, 127	Altre mal. del fegato e vie biliari, compresi i calcoli biliari . . . . .	3	1	2	—	3	2	3	—	2	1	—	—	1	1	9	5	14	125, 126, 127
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente . . . .	4	2	1	—	4	3	8	3	10	5	12	2	10	3	31	18	49	115, 116, 118, 123, 128, 129
151, 152, 153	Malattie della pelle e del tessuto cellulare . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	151, 152, 153
157	Vizi di conformaz. congeniti (esclusi i nati morti)	217	104	160	77	138	60	124	54	81	30	82	41	62	31	467	397	864	157
158	Debolezza congenita . . . . .	1697	767	1198	532	1213	529	937	448	633	271	578	282	494	234	3687	3063	6750	158
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	2774	1128	1228	568	1044	501	675	350	441	210	337	154	255	124	3719	3035	6754	159
160	Conseguenze del parto . . . . .	253	89	46	19	49	26	26	11	12	2	10	6	10	3	250	156	406	160
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	1370	586	363	159	249	100	203	82	134	45	114	50	127	43	1495	1065	2560	161
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	33	18	8	6	1	—	3	1	1	1	1	—	1	1	21	27	48	dal 172 al 175
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	4	2	2	1	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	6	4	10	dal 176 al 194
195	Altre morti violente di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	195
199, 200	Cause non specificate o mal definite . . . . .	17	11	8	4	7	2	8	2	2	—	2	2	3	—	26	21	47	199, 200

TAVOLA XIII. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte con distin-

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA	
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
	<b>Complesso . . .</b>	<b>49302</b>	<b>724</b>	<b>17701</b>	<b>274</b>	<b>32201</b>	<b>1067</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie .</b>	<b>7003</b>	<b>36</b>	<b>2808</b>	<b>11</b>	<b>13059</b>	<b>57</b>
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	376	1	193	1	1093	2
3	Tifo petecchiale . . . . .	1	—	—	—	1	—
6	Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	1	—
7	Morbillo . . . . .	78	—	26	—	322	—
8	Scarlattina . . . . .	18	—	10	—	36	—
9	Tosse convulsa . . . . .	178	—	70	—	698	—
10	Difterite . . . . .	157	5	64	2	497	17
11	Influenza . . . . .	1603	1	360	—	2107	—
13	Dissenteria . . . . .	11	—	3	—	47	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	3110	2	1455	—	5233	5
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	771	15	334	6	1613	20
34	Sifilide . . . . .	61	—	35	1	138	—
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	283	6	145	—	649	12
38	Malaria . . . . .	9	—	10	—	29	—
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	23	2	8	—	49	—
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	324	4	95	1	546	1
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>3464</b>	<b>236</b>	<b>1418</b>	<b>68</b>	<b>5546</b>	<b>296</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni .	3333	186	1371	52	5418	245
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	131	50	47	16	128	51
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . .</b>	<b>832</b>	<b>14</b>	<b>359</b>	<b>3</b>	<b>1047</b>	<b>15</b>
56	Reumatismo articolare acuto . .	188	—	44	—	218	—
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . .	89	—	26	—	73	—
59	Diabete mellito . . . . .	350	4	228	2	425	5
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	20	—	7	—	92	2
66	Mal. ghiand. tiroide e ghian. parat.	93	10	17	1	98	8
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	92	—	37	—	141	—
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . .</b>	<b>225</b>	<b>—</b>	<b>92</b>	<b>—</b>	<b>365</b>	<b>3</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . .	100	—	32	—	154	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . .	125	—	60	—	211	3
	<b>V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni</b>	<b>71</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>91</b>	<b>—</b>
75	Alcoolismo acuto e cronico . . .	66	—	13	—	78	—
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	5	—	2	—	13	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f).</b>	<b>6092</b>	<b>22</b>	<b>2060</b>	<b>7</b>	<b>9300</b>	<b>27</b>
79	Meningite semplice . . . . .	224	—	91	—	583	—
80	Atassia locomotrice progressiva .	55	—	19	—	51	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	4882	—	1625	—	7375	—
83	Paralisi progressiva degli alienati.	80	—	38	—	130	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	175	—	42	—	131	—
85	Epilessia . . . . .	125	—	34	—	164	—
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	474	2	175	1	706	—
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi.	77	20	36	6	160	27
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio .</b>	<b>8777</b>	<b>8</b>	<b>3116</b>	<b>2</b>	<b>11159</b>	<b>8</b>
90	Pericardite . . . . .	19	—	—	—	28	—
91	Endocardite acuta . . . . .	49	—	10	—	66	—
92	Endocardite cr. compr. le aff. valv.	2581	—	606	—	3201	—
93	Malattie del miocardio . . . . .	3174	—	1338	—	3526	—
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	197	—	68	—	317	—
95	Altre malattie del cuore . . . . .	1921	—	812	—	2833	—
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	113	—	56	—	163	1

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

VENEZIA TRIDENTINA	VENETO		VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	
9867	172	51559	1003	13413	305	41943	795	35845	496	16343	192
1653	6	8706	63	2372	15	6252	57	5775	33	2268	11
64	—	578	2	77	1	430	3	285	1	183	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
20	—	186	—	36	—	333	—	64	1	63	—
21	—	43	—	25	—	21	—	19	1	17	—
71	—	425	—	25	—	222	—	179	—	79	—
70	—	369	22	102	4	240	20	162	9	137	3
224	—	981	—	163	—	752	1	713	—	309	10
19	—	27	—	17	—	17	—	11	—	7	11
805	—	3488	3	1374	2	2452	3	2765	3	805	13
212	6	1547	27	327	5	960	15	836	10	350	23
11	—	79	—	31	—	52	1	39	—	24	dal 24 al 32
61	—	456	6	88	—	368	5	344	1	113	34
2	—	75	—	4	—	12	1	32	—	9	36
4	—	55	—	19	2	74	5	39	5	15	38
69	—	396	3	84	—	319	3	287	2	157	dal 39 al 42
833	31	3321	234	863	75	3421	176	3371	103	883	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
823	28	3249	207	851	73	3362	145	3320	84	865	27
10	3	72	27	12	2	59	31	51	19	18	dal 45 al 53
121	1	912	6	217	3	750	6	550	3	285	4
24	—	208	—	37	—	210	—	140	—	58	56
11	—	73	—	26	—	58	—	45	—	23	57, 58
43	—	292	4	84	3	277	4	269	2	112	59
19	—	134	—	13	—	69	—	13	—	33	dal 60 al 64
13	1	77	2	20	—	44	2	29	1	20	66
11	—	128	—	37	—	92	—	54	—	39	65, 67, 68, 69
57	—	212	1	53	3	250	4	172	4	74	—
36	—	65	—	17	—	90	—	63	2	21	71
21	—	147	1	36	3	160	4	109	2	53	70, 72, 73, 74
14	—	53	—	9	—	42	—	38	—	24	—
13	—	53	—	8	—	39	—	34	—	22	75
1	—	—	—	1	—	3	—	4	—	2	76, 77
1036	3	6060	33	1143	13	5973	30	5173	16	2930	4
31	1	285	—	54	—	221	—	150	—	61	79
10	—	34	—	4	—	29	—	24	—	7	80
812	—	4722	—	715	—	4982	—	4289	—	2403	82
5	—	44	—	28	—	39	—	53	—	22	83
16	—	89	—	11	—	63	—	68	—	20	84
23	—	103	—	25	—	90	—	118	—	31	85
120	—	659	5	263	1	441	—	410	2	357	78, 81, 86, 87
19	2	124	28	43	12	108	30	61	14	29	88, 89
1578	1	7278	10	1512	10	5735	12	5024	5	2006	3
6	—	16	—	12	1	15	—	7	—	3	90
3	—	35	—	13	—	22	—	31	—	9	91
421	—	1662	—	439	—	1579	—	1662	—	755	92
622	—	2652	—	514	—	1854	—	1355	—	401	93
38	—	232	—	60	—	214	—	200	—	43	94
332	—	1613	—	217	—	1204	—	1131	—	538	95
9	—	41	—	20	—	87	1	46	—	27	96

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA XIII. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte con distin

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA	
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
97, 98 dal 99 al 103	Arteriosclerosi (a) e cangrena . .	535	7	166	2	783	7
	Altre mal. dell'app. circolatorio . .	183	1	60	—	242	—
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio .</b>	<b>8629</b>	<b>31</b>	<b>3264</b>	<b>17</b>	<b>14555</b>	<b>83</b>
106	Bronchiti . . . . .	1438	—	450	—	2261	—
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	6597	1	2529	—	11209	1
110	Pleuriti . . . . .	216	24	105	13	447	66
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. app. resp. escl. la tbc. . .	378	6	180	4	638	16
	<b>IX - Malattie dell'apparato digerente.</b>	<b>5096</b>	<b>238</b>	<b>1618</b>	<b>102</b>	<b>13116</b>	<b>349</b>
117	Ulcera dello stom. e del duodeno . .	216	36	87	17	271	54
119	Enteriti al disotto di due anni . . .	2102	—	485	—	8708	—
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre).	679	—	241	1	1187	—
121	Appendicite . . . . .	251	54	84	25	390	89
122	Ernia, occlusione intestinale . . . .	456	107	164	32	456	110
124	Cirrosi del fegato . . . . .	660	1	222	2	781	2
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (b).	275	20	142	13	379	33
115, 116, 119, 123, 123, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	457	20	193	12	944	61
	<b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	<b>1589</b>	<b>59</b>	<b>575</b>	<b>17</b>	<b>2228</b>	<b>70</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	1076	1	383	1	1595	3
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c) . . .	42	1	20	—	70	8
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	31	5	13	5	59	17
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori.	136	3	47	1	207	4
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	12	2	11	1	25	6
137	Malattie della prostata . . . . .	249	27	82	5	218	16
138, 139	Malattie degli organi genitali (d) . .	43	20	19	4	54	16
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	<b>186</b>	<b>22</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>323</b>	<b>48</b>
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . . .	20	10	6	2	29	16
144	Emorragia puerperale . . . . .	37	4	9	2	60	10
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	82	3	24	1	126	2
146, 147	Tossiemia della gravidanza, ecc. (e)	26	2	13	—	58	3
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	21	3	20	7	50	17
	<b>XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	<b>86</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>219</b>	<b>33</b>
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	86	11	40	6	219	33
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>154</b>	<b>21</b>
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f)	68	7	38	10	154	21
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b>	<b>150</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>—</b>	<b>315</b>	<b>6</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (g)	150	5	48	—	315	6
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia. . . . .</b>	<b>1404</b>	<b>—</b>	<b>497</b>	<b>1</b>	<b>3750</b>	<b>3</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	469	—	144	—	1288	—
159	Nascita prematura (h) . . . . .	584	—	230	—	1755	—
160	Conseguenze del parto . . . . .	28	—	24	—	76	3
161	Altre malattie speciali dell'infanzia	323	—	99	1	631	—
	<b>XVI. - Senilità. . . . .</b>	<b>3026</b>	<b>—</b>	<b>777</b>	<b>—</b>	<b>3469</b>	<b>—</b>
162	Senilità . . . . .	3026	—	777	—	3469	—
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali. .</b>	<b>1887</b>	<b>35</b>	<b>728</b>	<b>18</b>	<b>2666</b>	<b>48</b>
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	529	1	225	4	556	—
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	72	3	31	—	80	5
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	1279	31	469	14	2007	43
195	Altre morti violente (i) . . . . .	6	—	3	—	23	—
196, 197	Ferite di guerra (l) . . . . .	1	—	—	—	—	—
	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate</b>	<b>717</b>	<b>—</b>	<b>176</b>	<b>—</b>	<b>839</b>	<b>—</b>
199, 200	Cause non specific. o mal. definite.	717	—	176	—	839	—

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie i nati morti. (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione di

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENEZIA TRIDENTINA		VENEZIO		VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE	
	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
97, 98 dal 99 al 103	114	—	905	7	197	7	637	8	474	5	204	2
	33	1	122	3	40	2	123	3	118	—	26	1
	<b>1406</b>	<b>5</b>	<b>7985</b>	<b>53</b>	<b>2239</b>	<b>14</b>	<b>7225</b>	<b>47</b>	<b>5806</b>	<b>26</b>	<b>2407</b>	<b>5</b>
106	218	—	1368	—	326	—	1221	—	1042	—	524	—
107, 108, 109	1055	1	5921	1	1619	—	5519	—	4316	—	1686	—
110	33	3	232	36	61	14	168	34	163	20	56	3
104, 105, dal 111 al 114	100	1	464	16	233	—	317	13	285	6	141	2
	<b>1114</b>	<b>89</b>	<b>6369</b>	<b>414</b>	<b>1234</b>	<b>111</b>	<b>3855</b>	<b>292</b>	<b>3186</b>	<b>200</b>	<b>1574</b>	<b>86</b>
117	66	12	259	90	120	35	177	54	196	33	66	19
119	564	—	3740	—	608	—	1709	—	1094	—	829	—
120	93	—	635	—	118	3	467	1	493	—	166	—
121	67	25	285	127	50	29	249	94	190	55	68	33
122	82	33	321	90	93	25	280	71	324	67	87	17
124	109	—	367	1	78	—	347	—	318	1	142	—
125, 126, 127	52	9	291	68	65	15	237	39	214	23	67	8
115, 116, 119, 123, 123, 129	81	10	471	38	102	4	389	33	357	21	149	9
	<b>254</b>	<b>13</b>	<b>1508</b>	<b>57</b>	<b>341</b>	<b>22</b>	<b>1256</b>	<b>63</b>	<b>1133</b>	<b>32</b>	<b>502</b>	<b>14</b>
130, 131, 132	167	1	1052	2	257	1	831	1	781	—	359	—
133	6	1	54	7	9	2	42	5	34	3	19	1
134	3	1	16	5	10	4	30	6	32	9	15	3
135	25	—	112	—	17	1	114	2	130	2	49	1
136	—	—	10	1	5	3	9	2	16	3	8	1
137	44	7	234	28	32	7	174	30	116	11	43	2
138, 139	9	3	30	14	11	4	56	17	24	4	9	6
	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>252</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>206</b>	<b>37</b>	<b>135</b>	<b>19</b>	<b>70</b>	<b>12</b>
141, 142, 143	7	1	17	5	4	1	18	8	9	2	4	3
144	11	—	52	11	6	—	27	7	23	5	14	1
140, 145	25	1	83	6	22	2	79	—	59	5	30	1
146, 147	8	—	64	4	7	3	54	10	27	2	11	3
148, 149, 150	13	4	36	11	13	2	28	12	17	5	11	4
	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>164</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>129</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>6</b>
151, 152, 153	20	5	164	30	47	9	129	15	126	11	42	6
	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>107</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>23</b>	<b>103</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>6</b>
154, 155, 156	15	3	107	26	30	7	88	23	103	18	36	6
	<b>40</b>	<b>—</b>	<b>216</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>162</b>	<b>3</b>	<b>149</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>—</b>
157	40	—	216	3	44	1	162	3	149	1	84	—
	<b>510</b>	<b>—</b>	<b>3049</b>	<b>5</b>	<b>898</b>	<b>—</b>	<b>2476</b>	<b>1</b>	<b>1515</b>	<b>—</b>	<b>1036</b>	<b>2</b>
158	208	—	1519	—	585	—	1138	—	561	—	561	—
159	184	—	1075	—	229	—	943	—	733	—	325	—
160	12	—	42	2	9	—	49	—	41	—	21	1
161	106	—	413	3	75	—	346	1	180	—	129	1
	<b>632</b>	<b>—</b>	<b>3161</b>	<b>—</b>	<b>1664</b>	<b>—</b>	<b>2155</b>	<b>—</b>	<b>2119</b>	<b>—</b>	<b>1416</b>	<b>—</b>
dal 163 al 171	632	—	3161	—	1664	—	2155	—	2119	—	1416	—
dal 172 al 175	439	9	1746	31	638	14	1887	29	1188	25	594	15
dal 176 al 194	88	1	372	1	180	3	534	3	286	2	124	—
195	7	—	46	2	30	1	50	1	44	3	30	2
196, 197	342	8	1320	28	423	10	1090	25	857	20	437	13
199, 200	2	—	8	—	5	—	13	—	1	—	3	—
	<b>81</b>	<b>—</b>	<b>460</b>	<b>—</b>	<b>57</b>	<b>—</b>	<b>281</b>	<b>—</b>	<b>282</b>	<b>—</b>	<b>112</b>	<b>—</b>
	<b>81</b>	<b>—</b>	<b>460</b>	<b>—</b>	<b>57</b>	<b>—</b>	<b>281</b>	<b>—</b>	<b>282</b>	<b>—</b>	<b>112</b>	<b>—</b>

dei reni da gravidanza. (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi civili da parte di armate belligeranti.

Segue: TAVOLA XIII. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, con distin

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA	
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>9030</b>	<b>133</b>	<b>31484</b>	<b>428</b>	<b>26112</b>	<b>123</b>	<b>58995</b>	<b>352</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie . . . . .</b>	<b>1288</b>	<b>10</b>	<b>5278</b>	<b>27</b>	<b>3094</b>	<b>8</b>	<b>6802</b>	<b>23</b>
I, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	118	—	277	2	345	2	561	—
3	Tifo petecchiale . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo . . . . .	—	—	2	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	14	—	353	—	208	—	361	—
8	Scarlattina . . . . .	9	1	340	3	45	—	81	—
9	Tosse convulsa . . . . .	76	—	126	—	95	—	230	—
10	Difterite . . . . .	62	3	263	6	168	1	282	1
11	Influenza . . . . .	208	—	594	—	540	—	1357	—
13	Dissenteria . . . . .	10	—	7	—	34	—	42	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	468	—	1767	—	800	—	1979	1
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	196	4	654	7	416	3	745	8
34	Sifilide . . . . .	9	—	140	1	50	—	292	1
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	43	—	267	2	111	—	249	7
38	Malaria . . . . .	3	—	191	—	100	—	188	—
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	7	2	43	6	40	2	89	3
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	64	—	246	—	142	—	346	2
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>436</b>	<b>15</b>	<b>1720</b>	<b>83</b>	<b>730</b>	<b>13</b>	<b>1324</b>	<b>49</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni . . . . .	426	12	1676	71	714	12	1279	36
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	10	3	44	12	16	1	45	13
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . . . . .</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>560</b>	<b>1</b>	<b>346</b>	<b>1</b>	<b>896</b>	<b>6</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	35	—	76	—	72	—	157	—
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	13	—	50	—	53	—	106	—
59	Diabete mellito . . . . .	66	1	307	—	101	1	336	6
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	11	—	23	—	41	—	59	—
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat.	8	—	11	1	18	—	25	—
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	20	—	93	—	61	—	213	—
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . . . . .</b>	<b>48</b>	<b>—</b>	<b>155</b>	<b>—</b>	<b>130</b>	<b>1</b>	<b>231</b>	<b>—</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	14	—	56	—	57	—	112	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . . . . .	34	—	99	—	73	1	119	—
	<b>V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni . . . . .</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>29</b>	<b>—</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>36</b>	<b>—</b>
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	16	—	27	—	15	—	30	—
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	—	—	2	—	1	—	6	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f). . . . .</b>	<b>1578</b>	<b>2</b>	<b>4076</b>	<b>22</b>	<b>3826</b>	<b>2</b>	<b>7495</b>	<b>7</b>
79	Meningite semplice . . . . .	27	—	147	—	108	—	220	—
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	3	—	18	—	14	—	33	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb. . . . .	1359	—	3086	—	2972	—	4994	—
83	Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	9	—	45	—	16	—	117	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi . . . . .	12	—	46	—	58	—	155	—
85	Fpilessia . . . . .	28	—	58	—	86	—	188	—
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	132	—	609	1	549	—	1699	—
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi. . . . .	8	2	67	21	23	2	79	7
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio . . . . .</b>	<b>1188</b>	<b>—</b>	<b>3929</b>	<b>6</b>	<b>3163</b>	<b>1</b>	<b>7325</b>	<b>3</b>
90	Pericardite . . . . .	5	—	6	—	9	—	18	—
91	Endocardite acuta . . . . .	12	—	43	—	20	—	25	—
92	Endocardite cr. compr. le aff. valv. . . . .	461	—	1230	—	1465	—	2462	—
93	Malattie del miocardio . . . . .	250	—	845	—	567	—	2320	—
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris. . . . .	30	—	174	—	101	—	418	—
95	Altre malattie del cuore . . . . .	298	—	1064	—	721	—	1280	—
96	Aneurisma, escluso quello del cuore . . . . .	15	—	45	—	25	—	74	—

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	PUGLIE		LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	
	<b>45381</b>	<b>230</b>	<b>11614</b>	<b>29</b>	<b>27720</b>	<b>72</b>	<b>65385</b>	<b>321</b>	<b>15510</b>	<b>67</b>	<b>609405</b>	<b>6783</b>	
	<b>6765</b>	<b>15</b>	<b>1753</b>	<b>2</b>	<b>3922</b>	<b>3</b>	<b>7713</b>	<b>9</b>	<b>3392</b>	<b>4</b>	<b>89835</b>	<b>390</b>	
	437	2	104	—	275	—	624	—	140	—	6160	17	I, 2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6
	322	—	164	—	202	—	552	—	106	—	3410	1	7
	84	—	141	—	508	—	276	—	209	—	1903	5	8
	102	—	31	—	139	—	91	—	135	—	2972	—	9
	90	—	34	—	149	—	251	1	85	—	3182	94	10
	1545	—	318	—	534	—	742	—	237	—	13287	2	11
	15	—	26	—	35	—	139	—	44	—	511	1	13
	1880	—	199	—	807	—	2404	—	1270	—	33061	19	23
	804	5	122	—	371	3	753	3	468	1	11479	144	dal 24 al 32
	104	—	27	—	71	—	164	—	24	—	1351	4	34
	217	2	47	—	158	—	639	1	110	—	4348	42	36
	736	—	407	—	396	—	473	—	425	—	3101	2	38
	85	6	45	2	58	—	173	4	27	3	853	42	dal 39 al 42
	283	—	88	—	219	—	432	—	112	—	4209	17	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
	933	29	166	4	606	5	1659	57	421	9	31115	1510	
	891	19	163	4	590	4	1605	45	406	6	30342	1252	dal 45 al 53
	42	10	3	—	16	1	54	12	15	3	773	258	54, 55
	583	1	133	—	414	1	1067	6	334	—	9559	69	
	103	—	24	—	83	—	106	—	30	—	1813	—	56
	54	—	16	—	52	—	62	—	25	—	855	—	57, 58
	161	1	29	—	95	1	405	5	78	—	3658	40	59
	51	—	10	—	50	—	80	—	43	—	768	2	dal 60 al 64
	20	—	13	—	17	—	38	1	12	—	573	27	66
	194	—	41	—	117	—	376	—	146	—	1892	—	65, 67, 68, 69
	205	—	54	—	138	—	447	2	112	—	3020	18	
	113	—	32	—	75	—	260	—	68	—	1365	2	71
	92	—	22	—	63	—	187	2	44	—	1655	16	70, 72, 73, 74
	8	—	4	—	14	—	21	—	8	—	509	—	
	6	—	4	—	13	—	20	—	8	—	465	—	75
	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	44	—	76, 77
	4961	3	1167	—	3092	—	6349	2	1056	1	73357	194	
	229	—	40	—	112	—	204	—	93	—	2880	1	79
	26	—	5	—	8	—	33	—	7	—	380	—	80
	3524	—	749	—	2030	—	5151	—	765	—	56435	—	82
	32	—	4	—	16	—	44	—	12	—	734	—	83
	20	—	3	—	14	—	26	—	2	—	951	—	84
	70	—	26	—	50	—	104	—	26	—	1349	—	85
	1003	—	336	—	834	—	734	—	131	—	9632	12	78, 81, 86, 87
	57	3	4	—	28	—	53	2	20	1	996	181	88, 89
	4259	3	1057	—	2957	—	6334	5	1175	3	77572	80	
	10	—	3	—	7	—	22	—	5	—	191	1	90
	26	—	2	—	28	—	30	—	20	—	444	—	91
	1760	—	509	—	1219	—	1945	—	494	—	24451	—	92
	938	—	206	—	548	—	772	—	219	—	22101	—	93
	142	—	40	—	119	—	243	—	36	—	2672	—	94
	908	—	179	—	713	—	2311	—	243	—	18318	—	95
	35	—	2	—	23	—	38	—	20	—	839	2	96

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA XIII. — Morti, durante l'anno 1931, classificati secondo le cause di morte, con distin-

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA	
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
97, 98 dal 99 al 103	Arteriosclerosi (a) e cangrena . .	99	—	415	4	220	1	616	2
	Altre mal. dell'app. circolatorio . .	18	—	107	2	35	—	112	1
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio .</b>	<b>1474</b>	<b>8</b>	<b>5167</b>	<b>21</b>	<b>4221</b>	<b>1</b>	<b>13018</b>	<b>25</b>
106	Bronchiti . . . . .	319	—	726	—	912	—	2198	—
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	1074	—	4039	1	2991	—	10128	—
110	Pleuriti . . . . .	29	6	152	14	75	—	275	16
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. app. resp. escl. la tbc. . .	52	2	250	6	243	1	417	9
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	<b>957</b>	<b>61</b>	<b>4105</b>	<b>177</b>	<b>4728</b>	<b>44</b>	<b>10146</b>	<b>110</b>
117	Ulcera dello stom. e del duodeno . .	50	10	170	41	81	8	188	18
119	Enteriti al disotto di due anni . .	477	—	2374	—	3148	—	6803	—
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre).	115	1	504	—	770	—	1342	1
121	Appendicite . . . . .	59	24	142	51	74	14	162	24
122	Ernia, occlusione intestinale . . .	61	16	203	48	141	15	427	53
124	Cirrosi del fegato . . . . .	85	—	255	1	159	—	373	—
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (b).	26	7	183	20	90	6	270	10
115, 116, 118, 123, 123, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	84	3	274	16	265	1	581	4
	<b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	<b>251</b>	<b>8</b>	<b>1314</b>	<b>37</b>	<b>914</b>	<b>4</b>	<b>2536</b>	<b>21</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	178	—	1001	—	736	—	2094	—
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c) . .	4	1	42	3	28	—	52	5
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . .	10	2	22	3	21	—	31	6
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori.	24	1	75	3	47	—	202	1
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	2	—	27	6	6	—	28	3
137	Malattie della prostata . . . . .	26	1	128	18	56	2	90	2
138, 139	Malattie degli organi genitali (d) . .	7	3	19	4	20	2	39	4
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>201</b>	<b>16</b>	<b>147</b>	<b>20</b>	<b>328</b>	<b>24</b>
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . .	2	—	15	2	6	—	18	2
144	Emorragia puerperale . . . . .	9	4	31	4	37	3	54	8
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	16	1	89	2	37	3	130	6
146, 147	Tossiemia della gravidanza, ecc. (e)	15	1	39	3	37	5	88	2
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	8	6	27	5	30	9	38	6
	<b>XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>128</b>	<b>14</b>	<b>86</b>	<b>10</b>	<b>225</b>	<b>29</b>
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	21	2	128	14	86	10	225	29
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>76</b>	<b>9</b>
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f)	16	6	64	7	31	5	76	9
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b>	<b>49</b>	<b>—</b>	<b>172</b>	<b>1</b>	<b>137</b>	<b>—</b>	<b>312</b>	<b>4</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (g)	49	—	172	1	137	—	312	4
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia . . . . .</b>	<b>544</b>	<b>—</b>	<b>1595</b>	<b>1</b>	<b>1409</b>	<b>—</b>	<b>2283</b>	<b>1</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	210	—	561	—	701	—	1367	—
159	Nascita prematura (h) . . . . .	273	—	745	—	523	—	530	—
160	Conseguenze del parto . . . . .	13	—	37	1	17	—	25	—
161	Altre malattie special. dell'infanzia	48	—	252	—	168	—	361	1
	<b>XVI. - Senilità . . . . .</b>	<b>566</b>	<b>—</b>	<b>1596</b>	<b>—</b>	<b>2262</b>	<b>—</b>	<b>4080</b>	<b>—</b>
162	Senilità . . . . .	566	—	1596	—	2262	—	4080	—
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali. .</b>	<b>350</b>	<b>8</b>	<b>1077</b>	<b>15</b>	<b>652</b>	<b>13</b>	<b>1507</b>	<b>41</b>
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	72	2	201	1	89	—	265	1
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	14	2	53	1	57	4	151	12
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	264	4	811	13	500	9	1081	28
195	Altre morti violente (i) . . . . .	—	—	12	—	6	—	10	—
196, 197	Ferite di guerra (l) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate</b>	<b>45</b>	<b>—</b>	<b>326</b>	<b>—</b>	<b>220</b>	<b>—</b>	<b>385</b>	<b>—</b>
199, 200	Cause non specific. o mal. definite.	45	—	326	—	220	—	385	—

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti. (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (l) compresa l'esecuzione

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	PUGLIE		LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	
97, 98 dal 99 al 103	361	3	101	—	236	—	816	4	120	3	6999	62	97, 98 dal 99 al 103
	79	—	15	—	64	—	157	1	18	—	1557	15	
	<b>9315</b>	<b>11</b>	<b>2111</b>	<b>2</b>	<b>5133</b>	<b>7</b>	<b>11161</b>	<b>21</b>	<b>2565</b>	<b>4</b>	<b>107681</b>	<b>381</b>	
106	1807	—	593	—	1172	—	2052	—	368	—	18995	—	106
107, 108, 109	7017	—	1403	—	3622	—	8397	—	2036	—	81158	5	107, 108, 109
110	161	6	31	2	97	7	294	14	58	3	2653	281	110
104, 105, dal 111 al 114	330	5	84	—	242	—	418	7	103	1	4875	95	104, 105, dal 111 al 114
	<b>8951</b>	<b>84</b>	<b>2795</b>	<b>6</b>	<b>5423</b>	<b>18</b>	<b>15269</b>	<b>115</b>	<b>3062</b>	<b>21</b>	<b>92598</b>	<b>2517</b>	
117	95	8	28	2	120	1	187	16	35	—	2412	454	117
119	6172	—	1989	—	3534	—	10446	—	1808	—	56590	—	119
120	1308	—	450	—	925	—	2525	—	617	—	12635	7	120
121	100	11	15	—	55	3	175	26	33	3	2449	687	121
122	307	48	58	3	186	11	440	50	124	16	4210	812	122
124	266	—	56	—	167	—	420	—	159	—	4964	8	124
125, 126, 127	194	9	52	1	99	1	334	9	82	1	3052	292	125, 126, 127
115, 116, 118, 123, 123, 129	509	8	147	—	337	2	742	14	204	1	6286	257	115, 116, 118, 123, 128, 129
	<b>1677</b>	<b>13</b>	<b>446</b>	<b>3</b>	<b>1093</b>	<b>4</b>	<b>2907</b>	<b>36</b>	<b>517</b>	<b>6</b>	<b>21041</b>	<b>479</b>	
130, 131, 132	1414	—	381	—	910	—	2263	—	409	—	15887	10	130, 131, 132
133	32	4	12	—	20	1	95	8	9	1	590	51	133
134	25	2	11	2	13	2	104	18	8	2	454	92	134
135	103	2	24	—	65	—	231	—	24	—	1632	21	135
136	16	1	2	—	10	—	19	2	12	3	218	34	136
137	69	3	13	1	53	—	156	6	45	—	1828	166	137
138, 139	18	1	3	—	22	1	39	2	10	—	432	105	138, 139
	<b>202</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>136</b>	<b>9</b>	<b>293</b>	<b>28</b>	<b>86</b>	<b>7</b>	<b>2854</b>	<b>351</b>	
141, 142, 143	13	5	2	—	6	—	23	3	2	—	201	60	141, 142, 143
144	50	8	12	2	29	—	71	5	14	2	546	76	144
140, 145	63	5	24	2	58	2	98	6	38	2	1083	50	140, 145
146, 147	44	4	7	—	26	2	55	4	19	1	598	49	146, 147
148, 149, 150	32	7	6	1	17	5	46	10	13	2	426	116	148, 149, 150
	<b>189</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>138</b>	<b>10</b>	<b>223</b>	<b>11</b>	<b>70</b>	<b>9</b>	<b>1979</b>	<b>226</b>	
151, 152, 153	189	13	26	2	138	10	223	11	70	9	1979	226	151, 152, 153
	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>1034</b>	<b>168</b>	
154, 155, 156	71	5	11	1	37	2	76	12	13	—	1034	168	154, 155, 156
	<b>156</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>—</b>	<b>103</b>	<b>—</b>	<b>288</b>	<b>2</b>	<b>92</b>	<b>—</b>	<b>2554</b>	<b>27</b>	
157	156	1	37	—	103	—	288	2	92	—	2554	27	157
	<b>2684</b>	<b>1</b>	<b>605</b>	<b>—</b>	<b>1196</b>	<b>—</b>	<b>2794</b>	<b>—</b>	<b>764</b>	<b>—</b>	<b>29009</b>	<b>15</b>	
158	2006	—	388	—	770	—	2075	—	368	—	14919	—	158
159	391	—	127	—	274	—	491	—	299	—	9711	—	159
160	10	1	4	—	16	—	17	—	10	—	451	8	160
161	277	—	86	—	136	—	211	—	87	—	3928	7	161
	<b>3351</b>	<b>—</b>	<b>821</b>	<b>—</b>	<b>2367</b>	<b>—</b>	<b>6671</b>	<b>—</b>	<b>1102</b>	<b>—</b>	<b>41235</b>	<b>—</b>	
162	3351	—	821	—	2367	—	6671	—	1102	—	41235	—	162
	<b>956</b>	<b>22</b>	<b>315</b>										

TAVOLA XIV. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in poi,

Table with columns for cause of death, agricultural workers, industrial workers, vendors, exercisers, and commissionaries. Rows include categories like 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', etc.

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione.

Table with columns for professions/conditions: Minatori, Falegnami, Addetti alla macellazione, Addetti ai forni, Addetti alla lavorazione del latte, Conciatori, Calzolai, Metallurgici, Meccanici. Rows include numerical data for each category.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e

altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.



Segue: TAVOLA XIV. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in

Table with 12 columns: Cause di morte, Agricoltori, Industriali, Venditori di derrate alimentari, Esercenti, Commissionari, and sub-columns for Tot. and di cui M.

poi, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione.

Table with 26 columns: Professions (Minatori, Falegnami, etc.), Cause di morte, and Numeri dell'elenco nosologico, with sub-columns for Tot. and di cui M.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (h) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) di

Segue: TAVOLA XIV. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, ARGENTIERI, ASPALZISTI, CERAMISTI, MURATORI, MANOVALI. Rows include: Complesso, I. - Malattie infettive e parassitarie, II. - Tumori (neoplasie), III. - Malattie reumatiche, ecc., IV. - Malattie del sangue, ecc., V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni, VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc., VII. - Malattie dell'app. circolatorio.

poi, classificati secondo la causa di morte, la professione o condizione.

Table with columns: ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE, ADDETTI A MANIFATTURE TESSILI, ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL VESTIARIO, ADDETTI ALL'ARREDAMENTO, INDUSTRIE CHIMICHE, ADDETTI AI LABORATORI E MANIFAT. TABACCHI, ADDETTI ALLE INDUSTRIE POLI-GRAFICHE, ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA CARTA, OPERAI NON SPECIFICATI, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows correspond to the causes of death in the first table.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e

altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.



Segue: TAVOLA XIV. - Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, COCCHIERI, CARRETTIERI, ECC., FERROVIARI, TRAMVIARI, CONDUTTORI AUTOMOBILI, ADDETTI AI TRASP. AEREI, MARINAI, BARCAIUOLI, PESCATORI, ECC., ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA, ADDETTI ALLA ACCONCIATURA DELLA PERSONA.

poi, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione.

Table with columns: ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, GARZONI E CAMERIERI ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI, FACCHINI, SPAZZINI, CANTONIERI, VENDITORI AMBULANTI, SALTIMBANCHI, VENTURIERI, PERSONALE SUBALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBL., ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA (escl. gli Uff.), GUARDIE DI FINANZA E MILIZIA, ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI, CULTO CATTOLICO E ALTRI CULTI, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e

altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA XIV. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in

Table with 12 columns: CAUSE DI MORTE, COCCHIERI, FERROVIARI, MARINAI, ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA, ADDETTI ALLA ACCONGIATURA DELLA PERSONA, and two columns for Tot. and di cui M.

poi, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione.

Table with 22 columns: PROFESSIONI (ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, GARZONI, FACCHINI, VENDITORI, PERSONALE SUBALTERNO, ESERCITO, GUARDIE, ALTRI CORPI), CULTO CATTOLICO, and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (h) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) d





TAVOLA XV. — Nubili morte, durante l'anno 1931, in età da 15 a 39 anni, non aventi una condizione o

Table with 7 columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE, INDUSTRIALI, COM-MERCANTI, VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERCU VARIE, ESERCENTI, RAFF-PRESENTANTI, OPERAI, ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTI ED AFFINI. Rows include 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', 'III. - Malattie reumatiche, ecc. (c)', 'IV. - Malattie del sangue, ecc. (d)', 'V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni.', 'VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f)', 'VII. - Malattie dell'app. circolatorio'.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e

professione specificata, classificate secondo le cause di morte e la professione o condizione del Capo famiglia.

Table with 11 columns: PERSONE DI SERVIZIO E DI FATICA, PERSONALE SUBALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA ED ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI (escl. gli Uffici), CULTO, PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI, UFFICIALI, IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI, PENSIONATI, PROPRIETARI E BENESTANTI, CONDIZIONI NON PROFESSIONALI, PROFESSIONI IGNOTE, NUBILI MORTE IN ETÀ DA 15 A 39 ANNI, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', 'III. - Malattie reumatiche, ecc. (c)', 'IV. - Malattie del sangue, ecc. (d)', 'V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni.', 'VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f)', 'VII. - Malattie dell'app. circolatorio'.

altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.





TAVOLA XVI. — Morti, a meno di 15 anni, durante l'anno 1931, classificati

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE, INDUSTRIALI, COMMERCianti, VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, OPERAI, ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTI ED AFFINI. Rows include categories like I. - Malattie infettive e parassitarie, II. - Tumori (neoplasie), III. - Malattie reumatiche, ecc., IV. - Malattie del sangue, ecc., VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc., VII. Malattie dell'app. circolatorio.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine (g) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

secondo le cause di morte, la professione o condizione del Capo famiglia ed il sesso.

Table with columns: PERSONE DI SERVIZIO E DI FATICA, PERSONALE SUBALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ESERCITO, MARINA, AERONAUT. ED ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI (escl. gli Uff.), CULTO, PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI, UFFICIALI, IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI, PENSIONATI, PROPRIETARI E BENESTANTI, CONDIZIONI NON PROFESSIONALI, PROFESSIONI IGNOTE, MORTI A MENO DI 15 ANNI (M, F, M F), NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows correspond to the causes of death from the previous table.

e altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA XVI. - Morti, a meno di 15 anni, durante l'anno 1931, classificati

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE, INDUSTRIALI, COMMERCianti, VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERCIE VARIE, ESERCENTI, RAP-PRESENTANTI, OPERAI, ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTI ED AFFINI. Rows include categories like VIII. - Malattie dell'app. respiratorio, IX. - Malattie dell'apparato digerente, etc.

secondo le cause di morte, la professione o condizione del Capo famiglia ed il sesso.

Table with columns: PERSONE DI SERVIZIO E DI FATICA, PERSONALE SUBALTERNO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ESERCITO, MARINA, AERONAUT. ED ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI, CULTO, PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI, UFFICIALI, IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI, PENSIONATI, PROPRIETARI E BENESTANTI, CONDIZIONI NON PROFESSIONALI, PRO-FESSIONI IGNOTE, MORTI A MENO DI 15 ANNI (M, F, M F), NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows correspond to the categories in the first table.

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (c) non indicate come omicidio, accidente) è sconosciuta.

venere. (d) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (e) esclusi i nati morti. (f) non compresi i nati morti. (g) di cui la natura (suicidio





TAVOLA XVIII. — A) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni

Table with 10 columns: CAUSE DI MORTE, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia. Rows include 'Complesso' and various categories like 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', etc.

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with 15 columns: Provincia (URIA, LOMBARDIA, VENEZIA TRIDENTINA) and 10 sub-columns for each. Rows are identical to the first table, showing mortality data for specific provinces.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e (g) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

(d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.



Segue: TAVOLA XVIII. — A) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni

Table with columns for causes of death and provinces in Veneto (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza). Rows include categories like 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', etc.

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with columns for provinces in Venezia Giulia e Zara (Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara) and Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia). Rows correspond to the same categories as the first table.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e (g) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

altre malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.



Segue: TAVOLA XVIII. — A) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni

Table with columns for cause of death and regional breakdown (VENETO) including Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, and Vicenza. Rows list various medical conditions like respiratory diseases, digestive disorders, urinary issues, etc.

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with columns for cause of death and provincial breakdown (VENÈZIA GIULIA E ZARA, EMILIA) including provinces like Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, and Reggio nell'Emilia. Rows list various medical conditions.

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (c) non indicate come cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (i) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

veneree. (d) albuminuria e eclampsia. (e) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (f) esclusi i natimorti. (g) non compresi i nati morti. (h) di







Segue: TAVOLA XVIII. — A) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, PUGLIE (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto), LUCANIA (Matera, Potenza), CALABRIE (Catanzaro, Cosenza, Reggio di Calabria)

capilughi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with columns: SICILIA (Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani), SARDEGNA (Cagliari, Nuoro, Sassari), IN COMPLESSO, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (c) non indicate come veneree. cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (i) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

(d) albuminuria e eclampsia. (e) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (f) esclusi i nati morti. (g) non compresi i nati morti. (h) di



Segue: TAVOLA XVIII. — B) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931 (a).

Table with columns: CAUSE DI MORTE, PIEMONTE (Acqui, Asti, Casale Monferrato, etc.), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows list various medical conditions like Arteriosclerosi, Malattie dell'app. respiratorio, etc.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 222. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) compresi i calcoli biliari. (d) dei bacinetti e degli tubercolosi e il reumatismo. (e) esclusi i nati morti. (f) non compresi i nati morti. (g) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sco

Table with columns: LIGURIA (Susa, Biella, Varallo, Chiavari, San Remo, Albenga), LOMBARDIA (Clusone, Treviglio, Breno, Chiari, Salò, Verolanuova, etc.), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows list various medical conditions.

ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (e) non indicate come veneree. (f) albuminuria e eclampsia. (g) esclusa la nosciuta. (m) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

Segue: TAVOLA XVIII. — B) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, Segue LOMBARDIA (Monza, Sesto S. Giovanni, Mortara, Vigevano, Voghera, Busto Arsizio, Gallarate), VENÈZIA TRIDEN (Bressanone, Merano, Borgo, Cavalese, Cles).

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931 (a).

Table with columns: TINA (Riva, Rovereto, Tione di Trento, Feltre, Pieve di Cadore, Adria, Cliviale del Friuli, Portenone, Tolmezzo, Chioggia, Asiago), VENÈZIA GIULIA E ZARA (Abbazia (b), Gradisca d'Isonzo, Idria, Capodistria, Lussimpiccolo, Parenzo, Pisino, Postumia), NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 222. (b) Con R. D. 13 novembre 1931, N. 1470, i Comuni di Volosca Abbazia (ex capoluogo di Circondario fino a Abbazia. Agli effetti della comparazione con gli anni precedenti, si è creduto opportuno di considerare fra gli ex capiluoghi di Circondario anche di quegli ex capiluoghi di Circondario che hanno avuto numerose variazioni nella loro circoscrizione territoriale. (c) compresi i gangli tracheo- (f) e degli organi ematopoietici. (g) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (h) e degli organi dei sensi.

tutto il 1930), di Apriano e parti di territorio staccate dal Comune di Mattuglie sono stati riuniti in un solo Comune con la denominazione di il suddetto Comune di Abbazia, poichè esso, costituito per circa 2/3 della popolazione di Volosca Abbazia, viene a trovarsi nelle stesse condizioni bronchiali. (d) o il cui carattere maligno non è specificato. (e) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali.



Segue: TAVOLA XVIII. — B) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni

Table with columns: CAUSE DI MORTE, Segue LOMBARDIA (Monza, Sesto S. Giovanni, Mortara, Vigevano, Voghera, Busto Arsizio, Gallarate), VENÈZIA TRIDEN (Bressanone, Merano, Borge, Cavalese, Cles). Rows list various causes of death like Arteriosclerosi, Bronchiti, Pleuriti, etc.

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931 (a).

Table with columns: TINA (Riva, Rovereto, Tione di Trento), VÈNETO (Feltre, Pieve di Cadore, Adria, Cividale del Friuli, Portenone, Tolmezzo, Chioggia, Asiago), VENÈZIA GIULIA E ZARA (Abbazia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Capodistria, Lussimburgo, Parenzo, Pisino, Postumia). Rows list various causes of death like Arteriosclerosi, Bronchiti, etc.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 222. (b) veggasi la nota (b) a pag. 226. (c) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (d) compresi i minuria e eclampsia. (h) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (i) esclusi i nati morti. (l) non compresi i nati morti. (m) di cui la natura

calcoli biliari. (e) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (f) non indicate come veneree. (g) albu (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (n) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.













Segue: TAVOLA XVIII. - B) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni

Table with columns for CAUSE DI MORTE and SICILIA (listing provinces like Bivona, Sciacca, Gela, etc.). Rows include 'Complesso' and categories from I to VII (Malattie infettive, Tumori, Malattie reumatiche, etc.).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 222. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) o il cui carattere maligno non è specificato. (d) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (e) e degli organi ematopoietici. (f) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (g) e degli organi dei sensi.

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931 (a).

Table with columns for MORTI (NEI COMUNI and NEI RIMANENTI) and SARDEGNA (listing provinces like Modica, Vittoria, Noto, etc.). Rows correspond to the causes of death listed on page 242.

(a) e degli organi ematopoietici. (f) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici.



Segue: TAVOLA XVIII. — B) Morti, durante l'anno 1931, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and SICILIA (Bivona, Sciacca, Gela, Acireale, Callagrone, Paternò, Nicosia, Piazza Armerina, Castoreale, Mistretta, Patti, Cefalù, Corleone, Termini Imerese).

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931 (a).

Table with columns: SARDEGNA (Módica, Vittoria, Noto, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Monte S. Giuliano, Iglesias, Oristano, Lanusei, Alghero, Ozieri, Tempio Pausania) and MORTI (NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, NEI COMUNI, NEI RIMANENTI ALTRI COMUNI DEL REGNO, NEL REGNO).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 222. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) compresi i calcoli biliari. (d) dei bacinetti e degli tubercolosi e il reumatismo. (h) esclusi i nati morti. (i) non compresi i nati morti.

uretteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (e) non indicate come veneree. (f) albuminuria e eclampsia (g) esclusa la sconosciuta. (m) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.













TAVOLA XXIV. — Morti per suicidio, durante l'anno 1931, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso.

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	CELIBI E NUBILI	CONIUGATI	VEDOVI	DIVORZIATI	STATO CIVILE IGNOTO	TOTALE
<b>Maschi e Femmine</b>						
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>1 496</b>	<b>2 017</b>	<b>592</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>4 141</b>
Per ingestione di veleni, solidi o liquidi, o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	207	188	40	4	3	442
Per assorbimento di gas tossici . . . . .	47	37	27	—	—	111
Per impiccamento o strangolamento . . . . .	312	556	145	1	6	1 020
Per annegamento . . . . .	221	348	153	—	11	733
Con arma da fuoco . . . . .	395	447	81	—	4	927
Con arma da punta o da taglio . . . . .	50	110	29	—	—	189
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	130	203	83	—	3	419
Per schiacciamento . . . . .	122	119	31	—	4	276
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	12	9	3	—	—	24
<b>Maschi</b>						
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>1 088</b>	<b>1 621</b>	<b>406</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3 142</b>
Per ingestione di veleni, solidi o liquidi, o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	82	100	20	1	1	204
Per assorbimento di gas tossici . . . . .	26	23	21	—	—	70
Per impiccamento o strangolamento . . . . .	254	461	107	—	6	828
Per annegamento . . . . .	133	257	86	—	9	485
Con arma da fuoco . . . . .	362	431	76	—	4	873
Con arma da punta o da taglio . . . . .	40	89	21	—	—	150
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	82	146	48	—	2	278
Per schiacciamento . . . . .	102	107	25	—	4	238
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	7	7	2	—	—	16
<b>Femmine</b>						
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>408</b>	<b>396</b>	<b>186</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>999</b>
Per ingestione di veleni, solidi o liquidi, o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	125	88	20	3	2	238
Per assorbimento di gas tossici . . . . .	21	14	6	—	—	41
Per impiccamento o strangolamento . . . . .	58	95	38	1	—	192
Per annegamento . . . . .	88	91	67	—	2	248
Con arma da fuoco . . . . .	33	16	5	—	—	54
Con arma da punta o da taglio . . . . .	10	21	8	—	—	39
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	48	57	35	—	1	141
Per schiacciamento . . . . .	20	12	6	—	—	38
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	5	2	1	—	—	8



TAVOLA XXV. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in poi, per suicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE	di cui M	PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE	di cui M
<b>Complesso . . .</b>	<b>4 116</b>	<b>3 122</b>	Operai non specificati . . . .	70	56
Agricoltori di ogni specie . .	1 160	1 030	Cocchieri, carrettieri, ecc. . .	41	41
Industriali e commercianti. . .	230	227	Ferrovieri, tramvieri e condut- tori di automobili . . . . .	37	37
Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate.	66	61	Marinai, barcaioli, pescatori, ecc. . . . .	10	10
Esercenti . . . . .	24	24	Addetti alla cura della persona	5	2
Commissionari e rappresentanti	66	66	Addetti all'acconciatura della persona . . . . .	22	20
Minatori, cavatori, ecc. . . .	11	11	Addetti ai servizi domestici .	82	41
Falegnami, verniciatori, ecc. .	95	94	Garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici . . . . .	28	28
Addetti alla macellazione e con- servazione delle carni . . . .	5	5	Facchini, spazzini e cantonieri	34	33
Addetti ai forni e pastifici . .	48	47	Venditori ambulanti, saltim- banchi, venturieri. . . . .	44	42
Addetti alla lavorazione del latte e alle industrie alimentari . . . . .	4	4	Personale subalterno dello Sta- to e di altri Enti pubblici .	17	16
Pellai . . . . .	1	1	Esercito e Marina (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	55	55
Calzolai, guantai, ecc. . . . .	78	75	Guardie di finanza e milizia .	5	5
Metallurgici . . . . .	5	5	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici . . . . .	10	10
Meccanici, elettricisti, ecc. . .	131	131	Culto cattolico . . . . .	5	3
Orefici, ecc. . . . .	16	16	Insegnanti . . . . .	19	9
Fornaciai, ecc. . . . .	5	5	Professioni liberali . . . . .	71	71
Ceramisti, vetrai . . . . .	4	3	Arti sanitarie. . . . .	19	19
Muratori, imbianchini, ecc. . .	132	131	Arti belle . . . . .	29	25
Manovali, braccianti, ecc. . .	107	107	Ufficiali di terra e di mare .	12	12
Addetti all'industria tessile. .	24	10	Impiegati pubblici e privati .	197	180
Addetti a manifatture tessili.	2	1	Pensionati . . . . .	88	82
Addetti all'industria del ve- stuario . . . . .	62	35	Proprietari e benestanti . . .	150	130
Addetti all'arredamento . . .	3	3	Studenti . . . . .	44	40
Industrie chimiche . . . . .	2	2	Attendenti a casa . . . . .	669	—
Addetti ai laboratori e mani- fature tabacchi . . . . .	4	1	Disoccupati, invalidi, ricove- rati, ecc. . . . .	32	32
Addetti alle industrie poligra- fiche. . . . .	5	5	Professioni ignote . . . . .	26	18
Addetti alle industrie della carta . . . . .	5	5			

TAVOLA XXVI. — Morti, durante l'anno 1931, in età da 15 anni in poi, per omicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE	di cui M	PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE	di cui M
<b>Complesso . . .</b>	<b>955</b>	<b>729</b>	Marinai e pescatori . . . . .	6	6
Agricoltori di ogni specie . .	454	397	Addetti alla cura della persona	1	1
Industriali e commercianti. . .	18	18	Addetti all'acconciatura della persona . . . . .	7	7
Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate.	20	17	Addetti ai servizi domestici .	6	1
Esercenti . . . . .	6	6	Garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici . . . . .	6	6
Commissionari e rappresentanti	7	7	Facchini, spazzini e cantonieri	10	9
Minatori, cavaatori, ecc. . . .	3	3	Venditori ambulanti, ventu- rieri. . . . .	5	4
Falegnami, verniciatori, ecc. .	17	17	Personale subalterno dello Stato . . . . .	1	1
Addetti alla macellazione delle carni . . . . .	1	1	Esercito (esclusi gli Ufficiali) .	9	9
Addetti ai forni . . . . .	11	11	Guardie di finanza e milizia .	4	4
Conciatori e pellai . . . . .	2	2	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici . . . . .	10	10
Calzolai . . . . .	11	11	Culto cattolico . . . . .	1	1
Meccanici, elettricisti, ecc. . .	18	18	Insegnanti . . . . .	1	—
Fornaciai . . . . .	1	1	Professioni liberali . . . . .	5	5
Ceramisti, ecc. . . . .	2	2	Arti sanitarie. . . . .	7	4
Muratori, ecc. . . . .	18	18	Impiegati pubblici e privati .	20	17
Manovali, braccianti, ecc. . .	22	22	Pensionati . . . . .	5	5
Addetti all'industria tessile. .	4	3	Proprietari e benestanti . . .	39	34
Addetti all'industria del ve- stuario . . . . .	9	4	Studenti . . . . .	4	3
Addetti alle industrie poligra- fiche. . . . .	1	1	Attendenti a casa . . . . .	135	—
Addetti alle industrie della carta . . . . .	1	1	Disoccupati, ricoverati, mendi- canti . . . . .	4	4
Operai non specificati . . . .	15	12	Professioni ignote . . . . .	5	3
Cocchieri, carrettieri, ecc. . .	18	18			
Ferrovieri, tramvieri e condut- tori di automobili . . . . .	5	5			

# TAVOLE

Anno 1932

---

## TAVOLA I.

**Morti, durante l'anno 1932, distinti secondo 200 cause di morte.**

*A* — Per Province.

*B* — Per Compartimenti e Regno.

TAVOLA I. - Morti, durante l'anno 1932, A - Per

Table with columns for provinces (Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona) and rows for causes of death (Complexo, I. - Malattie infettive e parassitarie, etc.).

(a) Durante l'anno 1932, non si verificarono nel Regno casi di morte per: vaiolo (N. 6-a dell'Elenco nosologico), vaiolo non specificato (N. 6-e), berberi (N. 6r), avvelenamenti cronici professionali da sostanze organiche (N. 76-a), polmonite non specificata (N. 109), cataclisma (tutte le morti di armate belligeranti (N. 197). (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale

distinti secondo 200 cause di morte. Provincie.

Table with columns for provinces (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza) and rows for causes of death (Complexo, I. - Malattie infettive e parassitarie, etc.).

colera (N. 12), peste bubbonica (N. 14-a), peste polmonare (N. 14-b), peste setticemica (N. 14-c), peste non specificata (N. 14-d), febbre gialla (N. 37), attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura) (N. 187), fame o sete (N. 189), ferite di guerra (N. 196), esecuzione di civili da parte eccettuata. (e) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali.



Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932, A - Per

distinti secondo 200 cause di morte. Provincie.

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (PIEMONTE, LIGURIA) with sub-columns for specific provinces like Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Table with columns for cause of death (NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO) and provinces (LOMBARDIA, VENETIA TRIDENTINA, VENETO) with sub-columns for specific provinces like Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari). (c) e degli organi dei sensi. (d) senza indicazione

della causa.

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

A — Per

Table with columns for provinces (Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, VerCELLI, Genova, Imperia, La Spezia, Savona) and rows for various causes of death (e.g., Malattie degli organi della vista, Malattie del cuore, Malattie dell'apparato circolatorio).

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza) and rows for various causes of death (e.g., Malattie degli organi della vista, Malattie del cuore, Malattie dell'apparato circolatorio).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) embolia, infarto emorragico e trombosi. (d) eccet

tuata la tubercolosi. (e) comprese le malattie professionali dell'apparato respiratorio





Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

4 — Per

distinti secondo 200 cause di morte.

Provincie.

Table with columns for cause of death (e.g., Malattie gravidanza, parto e puerperio), provinces (e.g., Piemonte, Liguria, Lombardia, Venetia, Veneto), and numerical data for each category.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) ma comprese le emorragie. (c) non comprese le emorragie. (d) non specificate come conseguenza d'aborto. del tessuto cellulare. (h) eccettuata la tubercolosi. (i) e degli altri organi della locomozione. (l) non compresi i nati morti.

(e) embolia o morte improvvisa puerperale (non specificata come settica). (f) o condizioni non specificate del puerperio. (g) dei suoi annessi e



Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

A — Per

Table with columns for provinces (VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA) and various causes of death (Complexo, I. - Malattie infettive e parassitarie, Tubercolosi, etc.).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260 (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO) and various causes of death (Complexo, I. - Malattie infettive e parassitarie, Tubercolosi, etc.).

vertebrale eccettuata. (e) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali.





Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932, 4 — Per

distinti secondo 200 cause di morte. Provincie.

Table with multiple columns: Cause di morte, Venetia Giulia e Zara, Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna), Toscana (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Siena), Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino), Umbria (Perugia, Terni), Lazio (Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo), and Numero dell'elenco nosologico. Includes sub-headers for various medical conditions like Malattie degli organi della vista, Malattie dell'apparato circolatorio, Malattie dell'apparato respiratorio, etc.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) embolia, infarto emorragico e trombosi. (d) eccet

tuata la tubercolosi. (e) comprese le malattie professionali dell'apparato respiratorio.

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

A — Per

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE (a)), provinces (VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA), and numerical data. Rows include categories like IX. - Malattie dell'apparato digerente and X. - Malattie dell'apparato urinario.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (c) e apparato genitale.

Table with columns for provinces (TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO) and numerical data. Rows correspond to the categories in the left table, showing mortality counts for each province.

(d) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (e) non indicate come veneree.





Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

4 — Per

Table with columns for cause of death (e.g., Senilità, Morti violente e accidentali, Suicidi, Omicidi, Morti accidentali) and provinces (VENÈZIA GIULIA E ZARA, EMILIA).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (c) su persone di un anno e più. (d) eccet. (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (TOSCANA, MARCHE, ÛMBRIA, LAZIO) and 200 numbered causes of death, with numerical counts.

tuati quelli da gas. (e) diverse da quelle per incendio. (f) escluse le ferite di guerra. (g) schiacciamento, frana. (h) di cui la natura

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

A — Per

Table with columns for provinces (Abruzzi e Molise, Campania, Puglia) and rows for causes of death (Complexo, I. - Malattie infettive e parassitarie, Tubercolosi, etc.).

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces (Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna) and rows for causes of death (Complexo, I. - Malattie infettive e parassitarie, Tubercolosi, etc.).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna

vertebrale eccezzuata. (e) eccezzuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali.



Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

4 — Per

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE (a)', 'ABRUZZI E MOLISE', 'CAMPANIA', and 'PUGLIA'. Rows list various medical conditions like 'Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi' and 'Encefalite (non epidemica)' with corresponding counts.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari). (c) e degli organi dei sensi. (d) senza indica

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with columns for provinces: 'LUCANIA', 'CALABRIE', 'SICILIA', and 'SARDEGNA'. Rows list 200 causes of death with counts for each province and a 'NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO' column on the right.

zione della causa.



Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

A — Per

Table showing causes of death in 1932, categorized by region (Abruzzi e Molise, Campania, Puglia) and specific causes (IX - Malattie dell'apparato digerente, X - Malattie dell'apparato urinario, ecc. (c)).

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table showing causes of death in 1932, categorized by province (Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna) and specific causes (IX - Malattie dell'apparato digerente, X - Malattie dell'apparato urinario, ecc. (c)).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (c) e apparato genitale.

(d) dei bacini e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (e) non indicate come veneree.

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

A — Per

Table with 13 columns: CAUSE DI MORTE (a), ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE. Rows include categories like XI. - Malattie gravidanza, parto e puerperio; XII. - Malattie della pelle e del tessuto cellulare; XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione; XIV. - Vizi di conformazione congeniti; XV. - Malattie dell'infanzia.

a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) ma comprese le emorragie. (c) non comprese le emorragie. (d) non specificate come conseguenza d'aborto. del tessuto cellulare. (h) eccettuata la tubercolosi. (i) e degli altri organi della locomozione. (l) non compresi i nati morti.

distinti secondo 200 cause di morte.

Province.

Table with 22 columns: LUCANIA, CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA. Rows correspond to the same 200 causes of death as the left table. Includes sub-headers for provinces like Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio di Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.

(e) embolia o morte improvvisa puerperale (non specificata come settica). (f) o condizioni non specificate del puerperio. (g) dei suoi annessi e







Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

B. — Per Compar

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

Table with columns for regions (PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENÈZIA TRIDENTINA, VÈNETO, VENÈZIA GIULIA E ZARA, EMILIA, TOSCANA, MARCHE, ÙMBRIA) and rows for various causes of death (e.g., Anchilostomiasi, Cancro e altri tumori maligni, Reumatismo articolare acuto).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come

tubercolari).

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

B. — Per Compar

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.

timenti e Regno.

Table with multiple columns for regions (PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENÈZIA TRIDENTINA, VÈNETO, VENÈZIA GIULIA E ZARA, EMILIA, TOSCANA, MARCHE, ÙMBRIA) and rows for various causes of death (e.g., Anemie, Leucemie e aleucemie, Malattie della milza, etc.).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.













Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1932,

B. — Per Compar

Table with columns: CAUSE DI MORTE (a), LAZIO, ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE. Rows include various medical conditions like Anemie, Leucemie e aleucemie, Malattie della milza, etc.

distinti secondo 200 cause di morte e il sesso.  
timenti e Regno.

Table with columns: LUCANIA, CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA, REGNO. Rows continue from the previous table, showing mortality counts by region and sex (M, F, M F).

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 260. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.







TAVOLA II. — Individui che morirono, nel 1932, nel Comune ove avevano dimora

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, PIEMONTE (stable, occasionale, non indicata, TOTALE), LIGURIA (stable, occasionale, non indicata, TOTALE). Rows include 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', 'III. - Malattie reumatiche, ecc', 'IV. - Malattie del sangue, ecc', 'V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni', 'VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc', 'VII. - Malattie dell'app. circolatorio'.

stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno.

Table with columns: LOMBARDIA, VENEZIA TRIDENTINA, VENEZIA GIULIA E ZARA, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Each compartment (LOMBARDIA, VENEZIA TRIDENTINA, VENEZIA GIULIA E ZARA) has sub-columns: stabile, occasionale, non indicata, TOTALE. Rows include 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', 'II. - Tumori (neoplasie)', 'III. - Malattie reumatiche, ecc', 'IV. - Malattie del sangue, ecc', 'VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc', 'VII. - Malattie dell'app. circolatorio'.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.



Segue: TAVOLA II. — Individui che morirono, nel 1932, nel Comune ove avevano dimora

Table with 10 columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and columns for EMILIA, TOSCANA, and TOTALE.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

stabile od occasionale, distinti per cause, in ciascun Compartimento e nel Regno.

Table with 25 columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, and columns for MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZI E MOLISE, and TOTALE.

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.











Segue: TAVOLA III. — Morti, nell'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei

Table with columns for cause of death and regional breakdown (PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENEZIA TRIDENTINA) with sub-columns for provincial and communal counts.

Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

Table with columns for regional breakdown (VENETO, VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA) and communal counts, with a final column for total deaths.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti.

(h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.



Segue: TAVOLA III. — Morti, nell'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei

Table with 10 columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, LAZIO (capiluog. di Provinc., altri Comuni), ABRUZZI E MOLISE (capiluog. di Provinc., altri Comuni), CAMPANIA (capiluog. di Provinc., altri Comuni), PUGLIE (capiluog. di Provinc., altri Comuni). Rows include various medical conditions and their counts across regions.

Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

Table with 15 columns: LUCANIA (capiluog. di Provinc., altri Comuni), CALABRIE (capiluog. di Provinc., altri Comuni), SICILIA (capiluog. di Provinc., altri Comuni), SARDEGNA (capiluog. di Provinc., altri Comuni), REGNO (capiluog. di Provinc., altri Comuni, TOTALE), NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include various medical conditions and their counts across regions.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei (h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti.



Segue: TAVOLA IV. — Morti, durante l'anno 1932, classificati secondo alcune cause

di morte e il mese in cui avvenne il decesso, nei Compartimenti e nel Regno.

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE - MESI, and regional counts for PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENIZIA TRI-DENTINA, VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIE, LUCANIA, CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA, REGNO. Rows include Scarlattina, Tosse convulsa, Difterite, and Influenza.













TAVOLA V. — Morti, durante l'anno 1932, classi

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and mortality counts categorized by time period (MENO DI 1 MESE, DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO, DI 1 ANNO, DI 2 ANNI).

ficati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table showing mortality counts categorized by age group (Di 3 ANNI, Di 4 ANNI, DA 5 A 9 ANNI, DA 10 A 14 ANNI, DA 15 A 19 ANNI, DA 20 A 24 ANNI, DA 25 A 29 ANNI, DA 30 A 34 ANNI, DA 35 A 39 ANNI) and sex (Tot., di cui F.).

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.



Segue: TAVOLA V. — Morti, durante l'anno 1932, clas

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and age groups (DA 40 A 44 ANNI, DA 45 A 49 ANNI, DA 50 A 54 ANNI, DA 55 A 59 ANNI, DA 60 A 64 ANNI). Rows include categories like Complesso, I. - Malattie infettive e parassitarie, II. - Tumori (neoplasie), etc.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

sificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns: age groups (DA 65 A 69 ANNI, DA 70 A 74 ANNI, DA 75 A 79 ANNI, DA 80 A 84 ANNI, DA 85 A 89 ANNI, DA 90 - 99), ETÀ IGNOTA, TOTALE (M, F, M F), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include various causes of death with corresponding counts.

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.



Segue: TAVOLA V. — Morti, durante l'anno 1932, classi

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and age groups (DA 40 A 44 ANNI, DA 45 A 49 ANNI, DA 50 A 54 ANNI, DA 55 A 59 ANNI, DA 60 A 64 ANNI). Rows include various medical conditions like Arteriosclerosi, Bronchite acuta, and Malattie dell'apparato digerente.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti.

ficati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns: age groups (DA 65 A 69 ANNI, DA 70 A 74 ANNI, DA 75 A 79 ANNI, DA 80 A 84 ANNI, DA 85 A 89 ANNI, DA 90 - 99), ETÀ IGNOTA, T O T A L E (M, F, M F), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include various medical conditions like Arteriosclerosi, Bronchite acuta, and Malattie dell'apparato digerente.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti.





TAVOLA VII. — Bambini morti nella prima settimana di vita, durante

Table with 8 columns: Cause di morte, Meno di 1 giorno, 1 giorno, 2 giorni, etc. Includes rows for various diseases like Difterite, Tubercolosi, Sifilide, etc.

l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with 12 columns: 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, Morti nella prima settimana di vita, Numeri dell'elenco nosologico. Includes rows for various age groups and causes of death.



Segue: TAVOLA VIII. — Morti, durante l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, con distin

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, PIEMONTE (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), LIGURIA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), LOMBARDIA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.). Rows include: Arteriosclerosi (a) e cangrena, Altre mal. dell'app. circolatorio, VIII. - Malattie dell'app. respiratorio, IX. - Malattie dell'apparato digerente, X. - Mal. dell'app. urinario e genitale, XI. - Mal. della gravid., parto e puerp., XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul., XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom., XIV. - Vizi di conformazione congeniti, XV. - Malattie dell'infanzia, XVI. - Senilità, XVII. - Morti violente e accidentali, XVIII. - Cause di morte non determinate.

Table with columns: VENÈZIA TRIDENTINA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), VENETO (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), VENÈZIA GIULIA E ZARA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), EMILIA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), TOSCANA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), MARCHE (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include: Arteriosclerosi (a) e cangrena, Altre mal. dell'app. circolatorio, VIII. - Malattie dell'app. respiratorio, IX. - Malattie dell'apparato digerente, X. - Mal. dell'app. urinario e genitale, XI. - Mal. della gravid., parto e puerp., XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul., XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom., XIV. - Vizi di conformazione congeniti, XV. - Malattie dell'infanzia, XVI. - Senilità, XVII. - Morti violente e accidentali, XVIII. - Cause di morte non determinate.

(a) eccettuato le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti.

(h) non compresi i nati morti. (i) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

Segue: TAVOLA VIII. — Morti, durante l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, con distin-

Table with columns for causes of death (I-VII), regions (Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania), total deaths, and deaths after surgery.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

Table with columns for causes of death (I-VII), regions (Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Regno), total deaths, and deaths after surgery.

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA VIII — Morti, durante l'anno 1932, classificati secondo le cause di morte, con distin-

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, UMBRIA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), LAZIO (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), ABRUZZI E MOLISE (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), CAMPANIA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.). Rows include various medical conditions like Arteriosclerosi, Malattie dell'app. respiratorio, Malattie dell'apparato digerente, etc.

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

Table with columns: PUGLIE (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), LUCANIA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), CALABRIE (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), SICILIA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), SARDEGNA (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), REGNO (TOTALE, di cui la morte sopravv. dopo atto oper.), NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows continue the classification of deaths by region and cause.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinietti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinietti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) esclusi i nati morti.



TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1932, in età da 15 anni in poi, classi

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE, INDUSTRIALI, COMMERCianti, VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERCANTI VARIE E NON SPECIFICATE, ESERCENTI, COMMISSIONARI RAPPRESENTANTI. Rows include: Complesso, I. - Malattie infettive e parassitarie, II. - Tumori (neoplasie), III. - Malattie reumatiche, ecc., IV. - Malattie del sangue, ecc., V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni, VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc., VII. - Malattie dell'app. circolatorio.

ficati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns: MINATORI, CAVATORI, ECC., FALEGNAMI, VERNICIATORI, ECC., ADDETTI ALLA MACELLAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARNI, ADDETTI AI FORNI E PASTIFICI, ADDETTI ALLA LAVORAZ. DEL LATTE E ALL'INDUSTRI. ALIMENTARI, CONCIAIATORI, PELLAI, CALZOLAI, GUANTAI, ECC., METALLURGICI, MECCANICI, ELETTRICISTI, ECC., NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include: Complesso, I. - Malattie infettive e parassitarie, II. - Tumori (neoplasie), III. - Malattie reumatiche, ecc., IV. - Malattie del sangue, ecc., V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni, VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc., VII. - Malattie dell'app. circolatorio.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.





Segue: TAVOLA IX. — Morti, durante l'anno 1932, in età da 15 anni in poi,

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, ARGENTIERI, OREFICI, ECC., ASPALTI, FORNACIAI, ECC., CERAMISTI, VETRAI, ECC., MURATORI, IMBLANCHINI, ECC., MANOVALI, BRACCIANI, ECC. Rows include various causes of death like Mal. art. coronarie e ang. pectoris, Bronchiti, Polmoniti, etc.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns: ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE, ADDETTI A MANIFATTURE TESSILI, ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL VESTIARIO, ADDETTI ALL'ARREDAMENTO, INDUSTRIE CHIMICHE, ADDETTI AI LABORATORI E MANIFAT. TABACCHI, ADDETTI ALLE INDUSTRIE FOLIOGRAFICHE, ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA CARTA, OPERAI NON SPECIFICATI, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows list various professions and their corresponding death counts.

reni da gravidanza). d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) di













Segue: TAVOLA X. - Nubili morte, durante l'anno 1932, in età da 15 a 39 anni, non aventi una condizione o

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE, INDUSTRIALI, COM-MERCIANTI, VENDITORI DI DERMATE ALIMENTARI, MERCIE VARIE, ESERCENTI, RAP-PRESENTANTI, OPERAI, ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTI ED AFFINI. Rows list various causes of death like 'Mal. art. coronarie e ang. pectoris', 'VIII. - Malattie dell'app. respiratorio', etc.

professione specificata, classificate secondo le cause di morte e la professione o condizione del Capo famiglia.

Table with columns: PERSONE DI SERVIZIO E DI FATICA, PERSONALE SU-BALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA ED ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI (escl. gli Uffic.), CULTO, PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI, UFFICIALI, IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI, PENSIONATI, PROPRIETARI E BENESTANTI, CONDIZIONI NON PROFESSIONALI, PROFESSIONI IGNOTE, NUBILI MORTE IN ETÀ DA 15 A 39 ANNI, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows correspond to the causes of death listed in the left table.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei

dei reni da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo.

TAVOLA XI. — Morti, a meno di 15 anni, durante l'anno 1932, classificati

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE, INDUSTRIALI, COMMERCianti, VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, OPERAI, ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTI ED AFFINI. Rows include categories like I. - Malattie infettive e parassitarie, II. - Tumori (neoplasie), III. - Malattie reumatiche, ecc., IV. - Malattie del sangue, ecc., V. - Malattie del sist. nervoso, ecc., VII. - Malattie dell'app. circolatorio.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre (g) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

secondo le cause di morte, la professione o condizione del Capo famiglia ed il sesso.

Table with columns: PERSONE DI SERVIZIO E DI FATICA, PERSONALE SUBALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ESERCITO, MARINA, AERONAUT. ED ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI (escl. gli Uff.), CULTO, PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI, UFFICIALI, IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI E BENESTANTI, CONDIZIONI NON PROFESSIONALI, PRO-FESSIONI IGNOTE, MORTI A MENO DI 15 ANNI (M, F, M F), NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows correspond to the categories in the first table.

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.









Segue: TAVOLA XIII. — A) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and regional sub-columns for PIEMONTE (Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, VerCELLI) and LIG (Genova, Impèria).

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with columns: REGIONAL SUB-COLUMNS (URIA: La Spezia, Savona; LOMBARDIA: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese; VENEZIA TRIDENTINA: Bolzano, Trento) and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO.

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (c) non indicate come veneree. cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

(d) albuminuria e eclampsia. (e) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (f) esclusi i nati morti. (g) non compresi i nati morti. (h) di



Segue: TAVOLA XIII. — A) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and sub-columns for VENETO (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza).

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with columns: VENÈZIA GIÙLIA E ZARA (Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara) and EMILIA (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia), plus NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre (g) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi.

Segue: TAVOLA XIII. - A) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni

Table with columns for 'NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO', 'CAUSE DI MORTE', and provinces: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

capluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with columns for 'VENÈZIA GIULIA E ZARA' (Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara) and 'EMILIA' (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia), plus 'NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO'.

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (c) non indicate come cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

veneree. (d) albuminuria e eclampsia. (e) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (f) esclusi i nati morti. (g) non compresi i nati morti. (h) di

Segue: TAVOLA XIII. — A) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni

Table with columns for 'NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO', 'CAUSE DI MORTE', and 'TOSCANA' (sub-columns: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Siena). Rows include 'Complesso' and categories I-VII with specific diseases.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre (g) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with columns for 'MARCHES', 'UMBRIA', 'LAZIO', 'ABRUZZI E MOLISE', 'CAMPANIA', and 'NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO'. Rows include 'Complesso' and categories I-VII with specific diseases.

malattie generali. (d) e degli organi ematopoietici. (e) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (f) e degli organi dei sensi





Segue: TAVOLA XIII. — A) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, PUGLIE (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto), LUCANIA (Matera, Potenza), CALABRIE (Catanzaro, Cosenza, Reggio di Calabria). Rows include VIII. - Malattie dell'app. respiratorio, IX. - Malattie dell'apparato digerente, X. - Mal. dell'app. urinario e genitale, XI. - Mal. della gravid., parto e puerp., XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul., XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom., XIV. - Vizi di conformazione congeniti, XV. - Malattie dell'infanzia, XVI. - Senilità, XVII. - Morti violente e accidentali, XVIII. - Cause di morte non determinate.

(a) compresi i calcoli biliari. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (c) non indicate come veneree.

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le cause di morte.

Table with columns: SICILIA (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani), SARDEGNA (Cagliari, Nuoro, Sassari), IN COMPLESSO, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include VIII. - Malattie dell'app. respiratorio, IX. - Malattie dell'apparato digerente, X. - Mal. dell'app. urinario e genitale, XI. - Mal. della gravid., parto e puerp., XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul., XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom., XIV. - Vizi di conformazione congeniti, XV. - Malattie dell'infanzia, XVI. - Senilità, XVII. - Morti violente e accidentali, XVIII. - Cause di morte non determinate.

(d) albuminuria e eclampsia. (e) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (f) esclusi i nati morti. (g) non compresi i nati morti. (h) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

Segue: TAVOLA XIII. — B) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni classificati secondo

Table with 14 columns for causes of death in Piedmont and rows for various diseases such as 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', and 'II. - Tumori (neoplasie)'. Includes a 'Numeri dell'elenco nosologico' column.

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, le cause di morte (a).

Table with 19 columns for causes of death in Liguria and Lombardia and rows for various municipalities such as 'Susa', 'Biella', 'Varallo', etc. Includes a 'Numeri dell'elenco nosologico' column.

(a) I 177 Comuni considerati in questa tavola, tenuto conto delle variazioni di territorio e di nome avvenute a tutto il 31 dicembre 1932, con Questi ultimi sono contrassegnati con asterisco. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) o il cui carattere maligno non è specificato. organi ematopoietici. (g) e degli organi dei sensi.

prendono 150 Comuni ex capiluoghi di Circondario e 27 Comuni non capiluoghi con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931. (d) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (e) e degli organi ematopoietici. (f) ed altre malattie del sangue e degli





Segue: TAVOLA XIII. — B) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni classificati secondo

Table with columns for cause of death (I. - Malattie infettive e parassitarie, II. - Tumori (neoplasie), etc.) and rows for various municipalities in Lombardia and Venetia Tridentina.

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, le cause di morte (a).

Table with columns for cause of death and rows for various municipalities in TINA, VENETO, and VENETIA GIULIA E ZARA.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 426. (b) compresi i gangli tracheo bronchiali. (c) o il cui carattere maligno non è specificato. (d) della ematopoietici. (g) e degli organi dei sensi.

nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (e) e degli organi ematopoietici. (f) ed altre malattie del sangue e degli organi





Segue: TAVOLA XIII.—B) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni classificati secondo

Table with columns for NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and EMILIA (Imola, Vergato, Cento, Conacchio, Cesena, Rimini, Rocca San Casciano, Carpi, Mirandola, Pavullo nel Frignano, Borgo Val di Taro, Fidenza).

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, le cause di morte (a).

Table with columns for NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, TOSCANA (Bobbio, Faenza, Lugo, Guastalla, Cortona, Empoli, Prato, Piombino, Portoferrato, Capannori, Castelnuovo di Garfagnana, Viareggio, Carrara, Pontremoli, San Miniato, Volterra, Montepuciano), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 426. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) compresi i calcoli biliari. (d) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (e) non indicate come veneree. (f) albuminuria e eclampsia. (g) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (h) esclusi i nati morti. (i) non compresi i nati morti. (l) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 426. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) compresi i calcoli biliari. (d) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (e) non indicate come veneree. (f) albuminuria e eclampsia. (g) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (h) esclusi i nati morti. (i) non compresi i nati morti. (l) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.



Segue: TAVOLA XIII. — B) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni classificati secondo

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, le cause di morte (a).

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and regional sub-columns (MARCHE, UMBRIA, LAZIO).

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, regional sub-columns (ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA), and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 426. (b) Veggasi la nota (b) a pag. 438. (c) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (d) compresi i calcoli biliari. (e) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (f) esclusi i nati morti. (g) non compresi i nati morti. (h) di cui la natura (suicidio, omicidio, ...)

(e) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (f) non indicate come veneree. (g) albuminuria e eclampsia. (h) accidentale è sconosciuta.



Segue: TAVOLA XIII. — B) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni classificati secondo

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, and columns for various municipalities in Campania (Nola, Pozzuoli, S. Maria Capua Vetere, etc.). Rows list causes of death like Arteriosclerosi, Bronchiti, Polmoniti, etc.

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, le cause di morte (a).

Table with columns for regions: PUGLIE, LUCANIA, CALABRIE, and NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows list municipalities like Bisceglie, Corato, Molfetta, etc., and corresponding mortality counts.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 426. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) compresi i calcoli biliari. (d) dei bacinetti e degli tubercolosi e il reumatismo. (h) esclusi i nati morti. (i) non compresi i nati morti. (l) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (e) non indicate come veneree. (f) albuminuria e eclampsia. (g) esclusa la



Segue: TAVOLA XIII. — B) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni ex capoluoghi di Circondario (esclusi i Comuni classificati secondo

Table of causes of death in Sicily, 1931-32. Columns include causes of death, Bivona, Sciacca, Gela, Acireale, Caltagirone, Paternò, Nicosia, Piazza Armerina, Castoreale, Mistretta, Patti, Cefalù, Corleone, Termini Imerese.

(a) Veggasi la nota (e) a pag. 426. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) o il cui carattere maligno non è specificato. (d) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (e) e degli organi ematopoietici. (f) ed altre malattie del sangue e degli organi

capoluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, le cause di morte (a).

Table of causes of death in Sardinia, 1932. Columns include provinces (Modica, Vittoria, Noto, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Monte S. Giuliano, Iglesias, Oristano, Lanusei, Alghero, Ozieri, Tempio Pausania) and mortality statistics (capiluoghi di Provincia, ex capiluoghi di Circond., non capil. con almeno 30 000 abit., etc.).

(a) e degli organi ematopoietici. (f) ed altre malattie del sangue e degli organi

Segue: TAVOLA XIII. — B) Morti, durante l'anno 1932, nei Comuni ex capiluoghi di Circondario (esclusi i Comuni classificati secondo

Table with columns for cause of death, Sicily provinces (Bivona, Sciacca, Gela, etc.), and numerical data.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 426. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) compresi i calcoli biliari. (d) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (e) non indicate come veneree. (f) albuminuria e eclampsia. (g) esclusa la

capiluoghi di Provincia) e nei Comuni con almeno 30 000 abitanti presenti al censimento del 21 aprile 1931, le cause di morte (a).

Table with columns for Sardinia provinces (Módica, Vittoria, Noto, etc.), Mortality statistics (Nei Comuni, Nel Regno), and numerical data.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 426. (b) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (c) compresi i calcoli biliari. (d) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni da gravidanza). (e) non indicate come veneree. (f) albuminuria e eclampsia. (g) esclusa la



TAVOLA XV. — Morti, durante l'anno 1932, per causa accidentale, classificati

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO											
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F										
		<b>Complesso . . .</b>												<b>1007</b>	<b>318</b>	<b>1044</b>	<b>343</b>	<b>972</b>	<b>291</b>	<b>977</b>	<b>265</b>
176	Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	5	2										
177	Avvelenamenti da alimenti guasti . . . . .	1	1	—	—	2	1	—	—	3	1										
178	Assorbimento di gas tossici . . . . .	20	5	25	10	11	3	11	2	7	4										
179	Altri avvelenamenti accidentali acuti, eccettuati quelli da gas . . . . .	5	3	7	4	15	8	11	4	8	1										
180	Per incendio . . . . .	10	5	12	8	11	5	10	5	10	7										
181	Per ustioni accidentali (diverse da quelle per incendio) . . . . .	265	138	279	165	210	119	146	77	113	62										
182	Per soffocazione meccanica accidentale . . . . .	6	1	7	4	9	5	3	2	5	1										
183	Per annegamento accidentale. . . . .	67	17	63	13	83	24	108	29	190	48										
184	Per trauma accidentale da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra). . . . .	15	2	23	3	23	2	12	3	11	1										
185	Per trauma accidentale da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra) . . . . .	1	—	—	—	4	—	3	—	3	—										
186	Per lesioni accidentali da caduta, schiacciamento, frana . . . . .	526	129	520	122	548	116	609	132	689	143										
188	Per violenze di animali . . . . .	11	—	8	2	11	4	22	1	20	3										
190	Per freddo eccessivo. . . . .	43	7	71	7	23	2	3	1	3	—										
191	Per caldo eccessivo . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—										
192	Per fulmine . . . . .	—	—	—	—	1	1	2	1	6	2										
193	Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . . .	11	1	4	—	7	—	13	2	18	—										
194	Per altri accidenti:																				
	a) corpi estranei . . . . .	6	4	4	2	1	—	4	2	4	1										
	b) altri . . . . .	20	5	21	3	13	1	18	4	21	—										

secondo la specie dell'infortunio, il mese in cui avvenne la morte ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		TOTALE																		
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	M F																
	<b>1182</b>																		<b>250</b>	<b>1413</b>	<b>293</b>	<b>1655</b>	<b>350</b>	<b>1308</b>	<b>313</b>	<b>1140</b>	<b>283</b>	<b>1145</b>	<b>298</b>	<b>1050</b>	<b>310</b>	<b>10422</b>	<b>3590</b>
	3	3	1	—	2	1	1	—	1	—	1	1	—	—	8	7	15	176															
	—	—	—	—	7	5	7	3	19	10	25	14	8	6	31	41	72	177															
	4	—	1	—	6	1	12	1	16	1	14	4	17	6	107	37	144	178															
	9	—	20	11	15	8	11	5	19	7	8	3	8	3	79	57	136	179															
	6	5	14	5	11	3	3	1	9	5	9	3	13	7	59	59	118	180															
	80	39	120	63	138	55	118	59	117	69	173	89	197	120	901	1055	1956	181															
	7	1	12	2	10	6	6	2	3	2	4	3	5	2	46	31	77	182															
	199	47	291	61	383	58	146	46	82	22	74	12	71	18	1362	395	1757	183															
	30	3	17	—	28	8	26	4	26	—	23	3	24	1	228	30	258	184															
	5	1	4	—	4	2	8	—	7	3	6	1	4	1	41	8	49	185															
	743	136	793	132	899	181	842	172	765	152	743	153	628	133	6604	1701	8305	186															
	30	4	34	1	28	1	35	5	15	3	13	—	13	2	214	26	240	188															
	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	9	2	23	3	159	22	181	190															
	10	—	30	6	31	4	6	2	—	—	—	—	—	—	69	12	81	191															
	23	7	22	8	25	5	33	8	12	4	4	1	1	—	92	37	129	192															
	16	1	24	1	28	4	23	1	21	1	15	4	15	3	177	18	195	193															
	5	1	5	2	8	4	5	2	12	4	5	3	6	1	39	26	65	194 <sup>a</sup>															
	12	2	25	1	31	4	24	2	13	—	19	2	17	4	206	28	234	194 <sup>b</sup>															





TAVOLA XVII. — Morti per suicidio, durante l'anno 1932, distinti per Compartimenti, secondo il mese in cui avvenne la morte ed il sesso.

M E S I	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENEZIA TRIDENTINA	VENEZIA	VENEZIA GIULIA E ZARA	EMILIA	TOSCANA	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	LUCANIA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO
<b>Maschi e Femmine</b>																			
<b>Complesso . . .</b>	<b>486</b>	<b>209</b>	<b>614</b>	<b>82</b>	<b>371</b>	<b>186</b>	<b>485</b>	<b>319</b>	<b>103</b>	<b>79</b>	<b>203</b>	<b>123</b>	<b>218</b>	<b>139</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>278</b>	<b>75</b>	<b>4 058</b>
Gennaio . . . . .	29	11	59	3	21	12	33	21	8	6	14	7	14	11	3	5	16	7	280
Febbraio . . . . .	38	15	43	6	20	18	33	24	11	4	15	3	15	11	1	2	17	6	282
Marzo . . . . .	50	14	52	3	38	6	47	23	4	4	11	12	19	7	2	4	22	2	320
Aprile . . . . .	50	16	48	12	32	14	48	34	11	8	21	14	26	10	1	7	21	4	377
Maggio . . . . .	59	25	56	12	42	20	41	43	13	6	27	15	20	18	2	11	29	14	453
Giugno . . . . .	48	24	71	6	33	26	48	30	5	9	20	9	27	16	4	4	36	4	420
Luglio . . . . .	47	30	50	10	44	22	55	34	13	8	20	16	18	15	3	7	31	7	430
Agosto . . . . .	33	15	59	10	38	15	43	28	12	9	19	15	11	23	3	4	35	6	378
Settembre . . . . .	32	8	49	4	23	9	50	32	4	9	15	13	12	6	2	—	20	10	298
Ottobre . . . . .	30	19	45	7	25	16	30	18	8	4	18	7	21	7	2	3	21	6	287
Novembre . . . . .	40	18	44	4	30	14	23	14	5	9	13	5	15	8	3	7	12	3	267
Dicembre . . . . .	30	14	38	5	25	14	34	18	9	3	10	7	20	7	4	4	18	6	266
<b>Maschi</b>																			
<b>Complesso . . .</b>	<b>393</b>	<b>167</b>	<b>476</b>	<b>68</b>	<b>285</b>	<b>130</b>	<b>340</b>	<b>240</b>	<b>84</b>	<b>63</b>	<b>153</b>	<b>92</b>	<b>144</b>	<b>81</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>204</b>	<b>54</b>	<b>3 035</b>
Gennaio . . . . .	24	7	49	2	17	11	20	17	6	6	12	6	7	4	2	2	13	6	211
Febbraio . . . . .	32	11	29	4	14	10	25	22	6	2	9	2	12	6	1	2	14	5	206
Marzo . . . . .	40	13	40	2	27	4	25	18	4	4	7	10	15	6	2	3	16	2	238
Aprile . . . . .	42	13	39	10	25	13	41	23	10	7	17	11	22	8	1	5	14	4	305
Maggio . . . . .	49	21	47	10	32	11	28	36	12	4	21	10	15	10	1	8	25	9	349
Giugno . . . . .	36	18	53	4	27	15	40	23	3	7	16	9	15	10	2	2	26	1	307
Luglio . . . . .	35	24	43	8	33	15	40	26	13	7	15	14	9	8	2	5	25	7	329
Agosto . . . . .	27	13	47	8	30	15	28	18	12	6	15	12	6	13	2	4	26	3	285
Settembre . . . . .	26	6	31	4	20	8	33	22	1	8	10	8	11	4	2	—	13	6	213
Ottobre . . . . .	24	17	39	7	19	11	25	14	7	2	16	5	12	3	2	2	15	3	223
Novembre . . . . .	32	14	32	4	24	11	13	11	5	8	8	3	8	6	1	7	7	3	197
Dicembre . . . . .	26	10	27	5	17	6	22	10	5	2	7	2	12	3	2	1	10	5	172
<b>Femmine</b>																			
<b>Complesso . . .</b>	<b>93</b>	<b>42</b>	<b>138</b>	<b>14</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>145</b>	<b>79</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>74</b>	<b>58</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>21</b>	<b>1 023</b>
Gennaio . . . . .	5	4	10	1	4	1	13	4	2	—	2	1	7	7	1	3	3	1	69
Febbraio . . . . .	6	4	14	2	6	8	8	2	5	2	6	1	3	5	—	—	3	1	76
Marzo . . . . .	10	1	12	1	11	2	22	5	—	—	4	2	4	1	—	1	6	—	82
Aprile . . . . .	8	3	9	2	7	1	7	11	1	1	4	3	4	2	—	2	7	—	72
Maggio . . . . .	10	4	9	2	10	9	13	7	1	2	6	5	5	8	1	3	4	5	104
Giugno . . . . .	12	6	18	2	6	11	8	7	2	2	4	—	12	6	2	2	10	3	113
Luglio . . . . .	12	6	7	2	11	7	15	8	—	1	5	2	9	7	1	2	6	—	101
Agosto . . . . .	6	2	12	2	8	—	15	10	—	3	4	3	5	10	1	—	9	3	93
Settembre . . . . .	6	2	18	—	3	1	17	10	3	1	5	5	1	2	—	—	7	4	85
Ottobre . . . . .	6	2	6	—	6	5	5	4	1	2	2	2	9	4	—	1	6	3	64
Novembre . . . . .	8	4	12	—	6	3	10	3	—	1	5	2	7	2	2	—	5	—	70
Dicembre . . . . .	4	4	11	—	8	8	12	8	4	1	3	5	8	4	2	3	8	1	94

TAVOLA XVIII. — Morti per suicidio, durante l'anno 1932, classificati secondo l'età, i mezzi o modi di uccisione ed il sesso.

GRUPPI DI ETÀ	PER INGESTIONE DI VELENI SOLIDI O LIQUIDI OPER ASSOR- BIMENTO DI SOSTANZE CORROSIVE	PER ASSOR- BIMENTO DI GAS TOSSICI	PER IMPICCA- MENTO O STRAN- GOLA- MENTO	PER ANNEGA- MENTO	CON ARMA DA FUOCO	CON ARMA DA PUNTA E DA TAGLIO	PER PRECI- PITA- ZIONE DA UN LUOGO ELEVATO	PER SCHIAC- CIA- MENTO	CON ALTRO MEZZO O CON MEZZO NON DETER- MINATO	TOTALE
<b>Maschi e Femmine</b>										
<b>Complesso . . .</b>	<b>428</b>	<b>123</b>	<b>1 070</b>	<b>690</b>	<b>874</b>	<b>186</b>	<b>376</b>	<b>281</b>	<b>30</b>	<b>4 058</b>
Fino a 15 anni . . . . .	—	—	5	2	1	—	1	1	—	10
Da 15 a 19 anni . . . . .	41	6	55	32	59	8	17	33	2	253
» 20 » 24 » . . . . .	68	5	76	53	114	6	18	43	3	386
» 25 » 29 » . . . . .	58	6	64	38	95	12	31	38	1	343
» 30 » 34 » . . . . .	31	13	75	44	91	19	26	14	8	321
» 35 » 39 » . . . . .	36	13	67	49	65	15	28	13	2	288
» 40 » 44 » . . . . .	25	14	101	58	72	21	27	20	1	339
» 45 » 49 » . . . . .	23	16	105	51	78	15	27	24	4	343
» 50 » 54 » . . . . .	28	12	113	75	80	21	29	23	4	385
» 55 » 59 » . . . . .	38	12	105	81	64	21	42	24	2	389
» 60 » 64 » . . . . .	25	13	92	56	65	16	36	19	2	324
» 65 » 69 » . . . . .	21	3	79	55	39	16	24	18	1	256
» 70 » 74 » . . . . .	17	4	68	42	20	5	23	7	—	186
» 75 » 79 » . . . . .	9	5	45	35	23	8	29	3	—	157
» 80 — 00 » . . . . .	8	1	20	19	7	3	18	—	—	76
Età ignota . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
<b>Maschi</b>										
<b>Complesso . . .</b>	<b>194</b>	<b>79</b>	<b>851</b>	<b>447</b>	<b>829</b>	<b>152</b>	<b>228</b>	<b>235</b>	<b>20</b>	<b>3 035</b>
Fino a 15 anni . . . . .	—	—	4	1	1	—	—	—	—	6
Da 15 a 19 anni . . . . .	3	3	23	17	44	5	3	23	1	122
» 20 » 24 » . . . . .	18	2	54	26	100	5	7	27	1	240
» 25 » 29 » . . . . .	27	4	38	19	91	9	13	29	1	231
» 30 » 34 » . . . . .	12	6	56	26	89	16	17	14	6	242
» 35 » 39 » . . . . .	14	5	47	28	62	12	15	12	1	196
» 40 » 44 » . . . . .	13	13	76	31	71	15	16	17	1	253
» 45 » 49 » . . . . .	12	11	86	34	77	13	20	20	3	276
» 50 » 54 » . . . . .	18	7	97	57	79	17	19	21	2	317
» 55 » 59 » . . . . .	28	9	93	60	62	16	29	24	2	323
» 60 » 64 » . . . . .	12	12	81	39	64	16	26	19	1	270
» 65 » 69 » . . . . .	13	2	74	41	39	15	15	18	1	218
» 70 » 74 » . . . . .	12	2	60	30	20	3	16	7	—	150
» 75 » 79 » . . . . .	8	2	43	23	23	7	20	3	—	129
» 80 — 00 » . . . . .	4	1	19	15	7	3	12	—	—	61
Età ignota . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
<b>Femmine</b>										
<b>Complesso . . .</b>	<b>234</b>	<b>44</b>	<b>219</b>	<b>243</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>148</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>1 023</b>
Fino a 15 anni . . . . .	—	—	1	1	—	—	1	1	—	4
Da 15 a 19 anni . . . . .	38	3	32	15	15	3	14	10	1	131
» 20 » 24 » . . . . .	50	3	22	27	14	1	11	16	2	146
» 25 » 29 » . . . . .	31	2	26	19	4	3	18	9	—	112
» 30 » 34 » . . . . .	19	7	19	18	2	3	9	—	2	79
» 35 » 39 » . . . . .	22	8	20	21	3	3	13	1	1	92
» 40 » 44 » . . . . .	12	1	25	27	1	6	11	3	—	86
» 45 » 49 » . . . . .	11	5	19	17	1	2	7	4	1	67
» 50 » 54 » . . . . .	10	5	16	18	1	4	10	2	2	68
» 55 » 59 » . . . . .	10	3	12	21	2	5	13	—	—	66
» 60 » 64 » . . . . .	13	1	11	17	1	—	10	—	1	54
» 65 » 69 » . . . . .	8	1	5	14	—	1	9	—	—	38
» 70 » 74 » . . . . .	5	2	8	12	—	2	7	—	—	36
» 75 » 79 » . . . . .	1	3	2	12	—	1	9	—	—	28
» 80 — 00 » . . . . .	4	—	1	4	—	—	6	—	—	15
Età ignota . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1



TAVOLA XIX. — Morti per suicidio, durante l'anno 1932, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso.

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	CELIBI E NUBILI	CONIUGATI	VEDOVI	DIVORZIATI	STATO CIVILE IGNOTO	TOTALE
<b>Maschi e Femmine</b>						
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>1 455</b>	<b>2 002</b>	<b>582</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>4 058</b>
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	190	183	49	1	5	428
Per assorbimento di gas tossici . . . . .	33	60	30	—	—	123
Per impiccamento o strangolamento . . . . .	314	574	179	—	3	1 070
Per annegamento . . . . .	216	343	129	1	1	690
Con arma da fuoco . . . . .	370	429	71	1	3	874
Con arma da punta e da taglio . . . . .	45	113	28	—	—	186
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	193	169	74	—	—	376
Per schiacciamento . . . . .	141	115	21	—	4	281
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	13	16	1	—	—	30
<b>Maschi</b>						
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>1 029</b>	<b>1 590</b>	<b>412</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>3 035</b>
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	74	98	19	—	3	194
Per assorbimento di gas tossici . . . . .	21	41	17	—	—	79
Per impiccamento o strangolamento . . . . .	233	468	148	—	2	851
Per annegamento . . . . .	134	239	72	1	1	447
Con arma da fuoco . . . . .	338	417	71	1	2	829
Con arma da punta e da taglio . . . . .	37	93	22	—	—	152
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	75	110	43	—	—	228
Per schiacciamento . . . . .	108	104	19	—	4	235
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	9	10	1	—	—	20
<b>Femmine</b>						
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>426</b>	<b>422</b>	<b>170</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1023</b>
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	116	85	30	1	2	234
Per assorbimento di gas tossici . . . . .	12	19	13	—	—	44
Per impiccamento o strangolamento . . . . .	81	106	31	—	1	219
Per annegamento . . . . .	82	104	57	—	—	243
Con arma da fuoco . . . . .	32	12	—	—	1	45
Con arma da punta e da taglio . . . . .	8	20	6	—	—	34
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	58	59	31	—	—	148
Per schiacciamento . . . . .	33	11	2	—	—	46
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	4	6	—	—	—	10

TAVOLA XX. — Morti, durante l'anno 1932, in età da 15 anni in poi, per suicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE	di cui M	PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE	di cui M
<b>Complesso . . .</b>	<b>4 046</b>	<b>3 028</b>	Operai non specificati . . . . .	85	67
Agricoltori di ogni specie. . .	1 149	1 015	Cocchieri, carrettieri, ecc. . .	44	44
Industriali e commercianti . .	177	175	Ferrovieri, tramvieri e conducenti di automobili . . . . .	49	49
Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate.	88	84	Marinai, barcaioli, pescatori, ecc. . . . .	15	15
Esercenti . . . . .	26	26	Addetti alla cura della persona	14	7
Commissionari e rappresentanti	65	64	Addetti all'acconciatura della persona . . . . .	23	20
Minatori, cavaatori, ecc. . . .	15	15	Addetti ai servizi domestici. .	94	33
Falegnami, verniciatori, ecc. .	106	106	Garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici . . . . .	27	27
Addetti alla macellazione e conservazione delle carni . . .	7	7	Facchini, spazzini e cantonieri	50	46
Addetti ai forni e pastifici . .	36	36	Venditori ambulanti, saltimbanchi e venturieri . . . . .	26	25
Addetti alla lavorazione del latte e alle industrie alimentari . . . . .	4	4	Personale subalterno dello Stato e di altri Enti pubblici. . .	20	19
Conciatori . . . . .	6	6	Esercito e Marina (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	44	44
Calzolai, ecc. . . . .	63	63	Guardie di finanza e milizia .	13	13
Metallurgici. . . . .	7	7	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici . . . . .	18	18
Meccanici, elettricisti, ecc. . .	106	106	Culto cattolico. . . . .	6	6
Argentieri, orefici, ecc. . . . .	24	24	Insegnanti . . . . .	14	6
Asfaltisti, fornaciai, ecc. . . .	11	11	Professioni liberali . . . . .	48	47
Ceramisti e vetrai. . . . .	3	3	Arti sanitarie . . . . .	28	23
Muratori, imbianchini, ecc. . .	124	124	Arti belle . . . . .	27	26
Manovali, braccianti, ecc. . . .	126	126	Ufficiali di terra e di mare . .	11	11
Addetti all'industria tessile . .	23	15	Impiegati pubblici e privati .	172	159
Addetti a manifatture tessili .	5	1	Pensionati e veterani. . . . .	64	59
Addetti all'industria del vestiario . . . . .	56	30	Proprietari e benestanti . . .	125	106
Addetti all'arredamento . . . .	6	6	Studenti . . . . .	32	31
Industrie chimiche. . . . .	3	3	Attendenti a casa . . . . .	680	—
Addetti ai laboratori e manifattura tabacchi . . . . .	3	—	Disoccupati, invalidi, ricoverati, ecc. . . . .	47	41
Addetti alle industrie poligrafiche . . . . .	16	15	Professioni ignote . . . . .	11	10
Addetti alle industrie della carta . . . . .	4	4			

TAVOLA XXI. — Morti, durante l'anno 1932, in età da 15 anni in poi, per omicidio, classificati secondo la professione o condizione ed il sesso.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE	di cui M	PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE	di cui M
<b>Complesso . . . .</b>	<b>946</b>	<b>717</b>	Ferrovieri e conduttori di automobili . . . . .	3	3
Agricoltori di ogni specie. . .	450	397	Marinai, pescatori, ecc. . . .	4	4
Industriali e commercianti . .	34	34	Addetti alla cura della persona	1	—
Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate.	12	9	Addetti all'acconciatura della persona . . . . .	3	3
Esercenti . . . . .	4	4	Addetti ai servizi domestici . .	8	1
Commissionari e rappresentanti	7	7	Garzoni addetti ai servizi pub- blici . . . . .	5	5
Minatori, cavaatori, ecc. . . .	5	5	Facchini, spazzini e cantonieri.	5	5
Falegnami, verniciatori, ecc. .	14	13	Venditori ambulanti e saltim- banchi . . . . .	9	9
Addetti alla macellazione delle carni . . . . .	1	1	Personale subalterno di Enti pubblici . . . . .	1	1
Addetti ai forni e pastifici . .	4	4	Esercito e Marina (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	6	6
Addetti alla lavorazione del latte . . . . .	1	1	Guardie di finanza e milizia .	2	2
Calzolai, ecc. . . . .	10	10	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici . . . . .	4	4
Metallurgici . . . . .	2	2	Culto cattolico . . . . .	1	1
Meccanici, elettricisti, ecc. . .	19	19	Insegnanti . . . . .	8	5
Fornaciai, ecc. . . . .	2	2	Professioni liberali . . . . .	4	4
Ceramisti, vetrai, ecc. . . . .	3	3	Arti sanitarie . . . . .	8	6
Muratori, imbianchini, ecc. . .	20	20	Arti belle . . . . .	1	—
Manovali e braccianti . . . . .	25	25	Impiegati pubblici e privati .	15	13
Addetti all'industria tessile . .	4	1	Pensionati . . . . .	7	7
Addetti a manifatture tessili .	1	—	Proprietari e benestanti . . .	34	30
Addetti all'industria del ve- stuario . . . . .	7	4	<b>Studenti . . . . .</b>	1	1
Addetti all'arredamento . . .	1	1	Attendenti a casa . . . . .	142	—
Addetti ai laboratori e mani- fattura tabacchi . . . . .	1	—	Disoccupati, ecc. . . . .	4	4
Operai non specificati . . . . .	19	17	Professioni ignote . . . . .	5	5
Cocchieri, carrettieri, ecc. . .	19	19			

