

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

NELL'ANNO 1916



ROMA

TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI

—
1919

INDICE

INTRODUZIONE.

CAPO I. — Avvertenze preliminari.

§ 1. — Metodo e fonti	Pag.	III
§ 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell' Introduzione	»	V
§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità	»	VI

CAPO II. — Mortalità nel Regno.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1916 e confronto cogli anni precedenti	»	VIII
§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni dal 1887 al 1916	»	IX
§ 3. — Influenza delle stagioni sulla mortalità	»	XXXII
§ 4. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso	»	XXXII
§ 5. — Cause di morte predominanti nelle diverse età	»	XXXIII
§ 6. — Influenza della legittimità dei natali sulla mortalità dei bambini	»	XL
§ 7. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile	»	XLII

CAPO III. — Notizie particolari sulle morti violente.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1916	»	XLVI
§ 2. — Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1914-1916, classificati per sesso, età, specie dell'infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento	»	XLVII
§ 3. — Morti per omicidio, negli anni 1914-1916, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione	»	LII
§ 4. — Morti per suicidio, negli anni 1914-1916, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione	»	LII
Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte	»	LVIII

TAVOLE.

Tav.	I. — Morti, durante l'anno 1916, classificati secondo 168 cause di morte:	
	A. — Per provincie.	Pag. 2
	B. — Per compartimenti e per il complesso del Regno.	» 32
»	II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1916, classificati per sesso e per le principali cause di morte.	» 42
»	III. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916, classificati per età, sesso e per le principali cause di morte.	» 44
»	IV. — Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su, durante l'anno 1916, classificati per professioni o condizioni e per le principali cause di morte.	» 52
»	V. — A) Morti, durante l'anno 1916, nei 69 Comuni capiluoghi di provincia, classificati secondo le principali cause di morte	» 56
	B) Morti, durante l'anno 1916, nei 145 Comuni capiluoghi di circondario, classificati secondo le principali cause di morte.	» 62
	C) Morti, durante l'anno 1916, nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911, classificati secondo le principali cause di morte	» 72
»	VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, durante l'anno 1916, classificati per sesso e per le principali cause di morte	» 78
»	VII. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916, per causa violenta accidentale, classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio	» 79
»	VIII. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916, per causa violenta accidentale, classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio	» 80
»	IX. — Maschi morti nel Regno, durante l'anno 1916, per causa violenta accidentale, in età da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio	» 82
»	X. — Suicidi, nell'anno 1916, classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti	» 84
»	XI. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1916, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.	» 85
»	XII. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1916, classificati secondo lo stato civile, il sesso e i mezzi o modi di uccisione	» 86
»	XIII. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1916, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione	» 87
»	XIV. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916, per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione	» 88

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

nell'anno 1916

INTRODUZIONE

CAPO I.

AVVERTENZE PRELIMINARI.

§ 1. — Metodo e fonti.

Questa statistica (a) si fa per mezzo di una scheda nominativa per ogni persona defunta, nella quale scheda è dichiarata la malattia o l'accidente che causò la morte, con attestazione firmata dal medico curante, o, in mancanza di esso, dal medico necroscopo che ha dato il permesso di seppellimento; per bambini morti poco dopo il parto si accettano anche le dichiarazioni fatte dalle levatrici.

Le schede si spediscono dai Sindaci dei singoli Comuni all'Ufficio centrale di Statistica, dove vengono esaminate da un medico, il quale contrassegna ciascuna dichiarazione sulla causa della morte con un numero corrispondente alla voce analoga di una classificazione prestabilita. Non mancano, adunque, le guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza tecnica, sia in coloro che dichiarano le cause di morte, sia in quelli che ne fanno la classificazione per gli scopi statistici, poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie si traggono da documenti originali e non da copie.

I medici hanno sempre concorso volenterosamente a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza; poche, relativamente, sono state le lacune per mancate dichiarazioni, come vedremo in appresso; e queste non furono cagionate quasi mai da rifiuto dei medici a rilasciare il certificato, ma dal fatto che in parecchi Comuni molto appartati, specialmente di montagna, non di rado soccombono persone senza aver ricevuto assistenza sanitaria, e in tali casi riesce difficile al medico necroscopo di determinare la malattia che fu causa della morte, in modo che si possa poi classificare sotto una delle voci dell'elenco nosologico adottato.

Con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria, venne fatto obbligo tassativo ai medici di denunziare al Sindaco del rispettivo Comune, in ogni caso di morte, la malattia o l'accidente che ne fu la causa, cosicchè

(a) La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881, e fino a tutto il 1886 fu eseguita per i soli Comuni capiluoghi di provincia e di circondario o distretto. Dal principio del 1887 essa venne estesa a tutti i Comuni del Regno.

la raccolta delle notizie, dal 1889 in poi, non dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione dei medici (a), ma da un preciso obbligo di legge.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti, delle quali si è potuto accertare la causa, sono distribuite sotto 168 voci, secondo un elenco preparato nel 1881 da apposita Commissione medica, e leggermente ritoccato una prima volta nel 1883 ed una seconda volta nel 1899. Questi ritocchi consistono nell'aver separato in due o più rubriche i morti per talune malattie che prima erano raggruppati in una rubrica sola, al fine di rendere più analitica l'indagine circa le cause delle morti, e per meglio coordinare la nostra alle statistiche di altri Paesi, in omaggio, anche, ai voti espressi dall'Istituto internazionale di statistica e dalla Commissione internazionale per l'ordinamento delle statistiche sanitarie.

La presente statistica non potrebbe dare la specificazione delle morti per tutte le 168 voci e per ciascuno dei Comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di tal genere. Conviene conciliare le ragioni della spesa, aggravatasi specialmente, in questi anni di guerra per l'enorme costo della carta, con quelle della scienza che ama entrare nei particolari; e ciò facciamo coll'offrire, nel presente volume, la classificazione analitica completa, non per i singoli Comuni, ma per l'insieme dei Comuni di ciascuna provincia, di ciascun compartimento e per il complesso del Regno; limitandoci a dare le cifre dei morti per talune malattie, meritevoli di speciale considerazione sotto l'aspetto della sanità pubblica, in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, dei 145 capiluoghi di circondario o dei 75 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data dell'ultimo censimento eseguitosi il 10 giugno 1911 (b).

In fine della presente Introduzione è riportato l'elenco delle malattie, secondo il quale sono state fatte le classificazioni.

(a) Vedasi l'art. 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 luglio 1892, n. 448, sulla polizia mortuaria.

(b) Le circoscrizioni distrettuali del Veneto e della provincia di Mantova vennero soppresse in seguito alla pubblicazione del nuovo Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, e furono cumulativamente costituite in unico Circondario, per ciascuna provincia, con la denominazione e alla dipendenza del Comune capoluogo della medesima. Per conseguenza, a partire dall'anno 1915 non vennero più date le cifre dei morti per malattie più frequenti o più caratteristiche nei singoli capiluoghi di distretto, dei quali uno soltanto, e cioè il comune di Vittorio, avendo una popolazione presente censita al 10 giugno 1911 superiore a 20.000 abitanti, fu aggiunto ai Comuni non capiluoghi, considerati a parte.

E' da avvertire inoltre che nelle statistiche, per gli anni dal 1894 al 1901 i Comuni non capiluoghi, per i quali furono date separatamente le cifre dei morti per le malattie più importanti, erano quelli che al 1° gennaio 1882 (data del III censimento italiano) contavano più di 15.000 abitanti, e nelle statistiche dal 1902 al 1911, erano quelli che al 10 febbraio 1901 (data del IV censimento) avevano non meno di 20.000 abitanti, più altri 5, che quantunque nel 1901 non avessero raggiunto quel numero di abitanti, erano già stati considerati a parte nei volumi dal 1894 al 1901 perchè ne contavano allora oltre 15.000. Dall'anno 1912 non si ritenne più opportuno di seguire il movimento della mortalità di quei Comuni non capiluoghi che erano stati contemplati nelle statistiche degli anni antecedenti, ritenendosi sufficiente per essi un periodo d'osservazione che va dal 1894 al 1911; cosicchè nelle statistiche degli anni dal 1912 in poi si sono date le notizie soltanto per quei Comuni non capiluoghi, che alla data del censimento del 10 giugno 1911 avevano raggiunto una popolazione da 20.000 abitanti in su.

§ 2. — Distribuzione della materia nelle Tavole e nell'Introduzione.

La presente statistica si svolge in quattordici tavole.

La prima dà la classificazione dei morti, in ciascuna provincia, in ciascun compartimento e nel Regno, secondo l'elenco nosologico completo che consta, come si è detto, di 168 voci.

La seconda dà la classificazione dei morti nel complesso del Regno in ciascun trimestre dell'anno 1916, colla divisione per sesso e per le cause di morte più frequenti o più importanti per lo studio delle condizioni sanitarie del nostro Paese.

La terza dà la classificazione dei morti per sesso e per età, combinata con la notizia delle cause di morte più importanti, nel complesso del Regno.

La quarta dà la classificazione dei maschi morti nel Regno, in età da 15 anni in su, per professioni e secondo le cause più importanti che ne determinarono la morte.

La quinta dà la classificazione delle cause di morte più frequenti o più caratteristiche in ciascuno dei 69 Comuni capiluoghi di provincia, dei 145 capiluoghi di circondario e dei 75 Comuni non capiluoghi, che contavano non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del censimento del 10 giugno 1911.

La sesta classifica, secondo le principali cause di morte, i bambini illegittimi e gli esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età.

Le tavole dalla settima alla tredicesima danno la classificazione delle morti accidentali e dei suicidi per sesso, età, stato civile, professione, mesi e compartimenti, oltre alla indicazione della causa nei casi d'infortunio, e dei mezzi o modi di uccisione nei casi di suicidio.

L'ultima tavola classifica i morti per omicidio, in età da 15 anni in su, per sesso e secondo la professione.

In questa Introduzione sono riassunti e illustrati i dati esposti nelle tavole analitiche; inoltre le cifre del 1916 sono poste a confronto con quelle dei due anni precedenti e, per le notizie principali, anche con quelle di anni anteriori, risalendosi fino al 1887, e cioè all'anno nel quale la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i Comuni del Regno.

Questi dati sono esposti, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali alla popolazione calcolata col metodo indicato nel paragrafo seguente (a).

(a) Avvertiamo che non conoscendosi la popolazione presente alla metà dell'anno 1916 in ciascuna provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia, per le ragioni esposte nel paragrafo che segue, si è dovuto omettere nella presente Introduzione:

1° il calcolo dei quozienti di mortalità generale in ciascuna Provincia ed in ciascun Comune capoluogo di provincia;

2° il calcolo dei quozienti di mortalità per le principali malattie infettive, per pellagra e per alcoolismo, in ciascun compartimento;

3° il confronto, in cifre proporzionali alla popolazione, fra la mortalità dei Comuni urbani più importanti e quella degli altri Comuni;

4° la mortalità nelle Città più popolose secondo alcune cause più frequenti o notevoli.

§ 3. — Popolazione sulla quale sono stati calcolati i quozienti di mortalità.

I quozienti di mortalità esposti in questo volume si sono ottenuti dal confronto del numero dei morti colla popolazione presumibilmente presente alla metà di ciascuno degli anni del periodo preso in esame, ottenuta facendo la semisomma delle popolazioni calcolate al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno, poichè essa rappresenta con maggiore esattezza la popolazione media dell'anno e permette, quindi, di ottenere quozienti demografici più precisi.

Anche per l'anno 1916 non possiamo calcolare la *popolazione presente* alla fine del medesimo in ciascuna Provincia e in ciascun Comune capoluogo di Provincia, perchè la chiamata delle classi alle armi avvenuta nel 1915 e i continui mutamenti di sede, specialmente nella popolazione militare, in dipendenza dello stato di guerra, hanno modificato fortemente e instabilmente il numero degli abitanti di tutti i Comuni del Regno, con un prevalente spostamento di popolazione verso l'Italia settentrionale, dove si addensò la maggior parte dell'esercito, senza che si abbiano gli elementi necessari per calcolare le variazioni avvenute nella popolazione dei singoli Comuni, in seguito a tale anormale movimento. E' poi da osservare che, riferendosi i dati demografici forniti dai Comuni alla popolazione *presente* dei medesimi, e cioè, sia a quella con dimora fissa, sia a quella con dimora occasionale, per quanto riguarda i decessi, il loro numero dovrebbe comprendere tutti gli individui morti nel territorio del Comune per qualsiasi motivo e quindi anche in conseguenza delle operazioni di guerra, mentre non vi si possono includere quelli di cui l'atto di morte venne ricevuto nei registri dello stato civile tenuti dalle Autorità militari, secondo l'*Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita e ai testamenti in guerra*, approvata col decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109, anche se queste morti siano avvenute in Comuni italiani, situati nella zona delle operazioni.

Il calcolo pertanto della popolazione in ciascuna provincia che si basasse su queste perdite, oltrechè sugli altri elementi di variazione naturale e sociale della popolazione, non potrebbe non condurre che a risultati imperfetti, e perciò dobbiamo limitarlo, anche per l'anno 1916, al solo complesso del Regno.

La popolazione complessiva presente nel Regno al 31 dicembre 1916 è stata calcolata con lo stesso metodo adottato nelle statistiche degli anni precedenti, a partire dal 1905; e cioè: alla popolazione presente nel Regno rilevata con il censimento del 10 giugno 1911 (abitanti 34.671.377) si è aggiunto il numero dei nati nel tempo trascorso tra la data del censimento e il 31 dicembre 1916 e quello degli individui che, nello stesso periodo di tempo, trasferirono nel Regno la propria dimora, venendo dall'estero; e si è poi sottratto, sempre per il medesimo periodo, il numero dei morti e quello degli individui che fissarono la loro dimora all'estero.

Seguono i dati intorno a questi movimenti naturali e sociali della popolazione:

**Movimento della popolazione avvenuto nel Regno durante il periodo corso
dall' 11 giugno 1911 al 31 dicembre 1916.**

PR OSPETTO N. 4.

ANNI	NATI vivi	MORTI	INSCRITTI nei registri comunali di popolazione perchè immigrati dall' estero	CANCELLATI dai registri comunali di popolazione perchè emigrati per l' estero
Dall'11 giugno al 31 dicembre 1911	576 243	401 257	42 027	74 415
Anno 1912	1 133 985	635 788	61 112	134 287
» 1913	1 122 482	663 966	64 111	163 840
» 1914	1 114 091	643 355	126 272	(a) 74 674
» 1915	1 109 183	741 143	88 651	(a) 30 349
» 1916	881 626	721 847	35 527	(a) 25 535
TOTALE	5 937 610	3 807 356	417 700	503 100

Secondo il calcolo che abbiamo esposto, la popolazione nel complesso del Regno, al 31 dicembre 1916, è risultata di 36.716.231 abitanti. Da questo numero si dovrebbe sottrarre quello dei morti in guerra, dal 25 maggio 1915 al 31 dicembre 1916, fuori del territorio italiano, o anche nel medesimo e dei quali, però, non venne compilato l'atto di morte presso i Comuni; ma tale notizia non è ancora conosciuta.

Facendo la semisomma delle cifre della popolazione calcolata al principio e alla fine dell'anno 1916, si è determinata quella presumibilmente presente nel Regno alla metà di detto anno, in 36.631.345 abitanti.

(a) Durante il triennio 1914-16 l'emigrazione per l'estero è stata assai minore di quella osservata negli anni precedenti; e la causa di tale diminuzione è da ricercarsi nella guerra europea, la quale, come ebbe a manifestare i suoi effetti in tutti i rapporti internazionali, non poteva a meno d'influire anche sull'emigrazione. Per la stessa causa si osserva, specialmente nell'anno 1914 ed anche nel 1915, un forte aumento, rispetto agli anni precedenti, nel numero dei rimpatriati, mentre questi nel 1916 sarebbero discesi anche sotto la cifra normale degli individui rimpatriati nel periodo prebellico.

È però da credere, che pur essendosi ridotto nel 1916 il numero dei rimpatriati rispetto alle cifre dei due anni precedenti, in realtà questo numero sia stato maggiore di quello risultante dalle reinscrizioni nei registri comunali d'anagrafe, le quali si sono fatte anche più raramente del consueto durante gli anni di guerra.

CAPO II.

MORTALITÀ NEL REGNO.

§ 1. — Morti nel Regno durante il 1916 e confronto con gli anni precedenti.

In tutto il Regno, nell'anno 1916, morirono 721.847 individui (a); si ebbero cioè 19.71 morti per ogni 1000 abitanti. Si ricordi che, in quanto alle perdite di guerra, questa statistica non ha potuto registrare, come è stato già detto, che quelle dovute a morti avvenute in ospedali territoriali o di riserva nel Regno, sia per ferite riportate in combattimento, sia per malattie o per altra causa; poichè solo per tali perdite l'atto di morte venne compilato dagli Uffici comunali di stato civile. Nel computo dei morti mancano, perciò, tutte le altre perdite di guerra avvenute fuori del territorio del Regno o in ospedali da *campo* o sul *campo*, e per le quali l'atto di morte fu ricevuto nei registri dello stato civile tenuti dalle Autorità militari. Per conseguenza, i quozienti di mortalità nei primi due anni di guerra (1915 e 1916) dovranno ancora salire, quando si conoscerà esattamente il numero totale dei morti in guerra in quegli anni.

Nel 1915 il quoziente di mortalità nel Regno fu di 19.56 su 1000 abitanti (escluse le vittime del terremoto avvenuto in tale anno) e nel 1914 di 17.94.

La mortalità nel nostro Paese è diminuita di oltre un terzo dal 1862 ad oggi; ed infatti, nel 1862 si ebbero 31.06 morti per ogni 1000 abitanti; nel 1872 se ne ebbero 30.78; nel 1882, 27.56; nel 1892, 26.18; nel 1902, 22.24; nel 1912, 18.15 e nel 1916, 19.71, come si è già visto. Tali quozienti dimostrano all'evidenza quanto siano migliorate, nello spazio di mezzo secolo, le condizioni igienico-sanitarie del nostro Paese.

Diamo nel prospetto seguente il numero dei morti nel Regno, durante gli anni corsi dal 1887 al 1916, in cifre assolute e in cifre proporzionali a 1000 abitanti.

(a) Esclusi i bambini nati morti, ma compresi quelli che diedero segni di vita dopo l'atto del parto, quantunque morti prima che ne venisse dichiarata la nascita all'Ufficiale dello stato civile; vi figurano, pertanto, 496 bambini morti per *asfissia* e *apoplessia nel parto*, i quali vissero pochi minuti o, al massimo, qualche ora.

Morti nel Regno durante gli anni dal 1887 al 1916.

PROSPETTO N. 2.

A N N I	R E G N O			A N N I	R E G N O		
	Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	Morti			Popolazione presente calcolata alla metà di ciascun anno	Morti	
		cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)			cifre assolute	per ogni 1000 abitanti (a)
1887 . . .	29 614 430	828 992	27.99	1902 . . .	32 699 510	727 181	22.24
1888 . . .	29 825 022	820 431	27.51	1903 . . .	32 839 509	736 311	22.42
1889 . . .	30 035 038	768 068	25.57	1904 . . .	33 016 234	698 604	21.16
1890 . . .	30 245 054	795 911	26.32	1905 . . .	33 193 289	730 340	22.00
1891 . . .	30 455 070	795 327	26.11	1906 . . .	33 325 098	696 875	20.91
1892 . . .	30 665 662	802 779	26.18	1907 . . .	33 514 702	700 333	20.90
1893 . . .	30 875 678	776 713	25.16	1908 . . .	33 826 688	(b) 770 054	(c) 22.76
1894 . . .	31 085 694	776 372	24.98	1909 . . .	34 077 068	738 460	21.67
1895 . . .	31 295 710	783 813	25.05	1910 . . .	34 376 610	682 459	19.85
1896 . . .	31 506 302	758 129	24.06	1911 . . .	34 688 814	742 811	21.41
1897 . . .	31 716 318	695 602	21.93	1912 . . .	35 026 486	635 788	18.15
1898 . . .	31 926 334	732 265	22.94	1913 . . .	35 418 391	663 966	18.75
1899 . . .	32 136 350	703 393	21.89	1914 . . .	35 858 951	643 355	17.94
1900 . . .	32 346 366	768 917	23.77	1915 . . .	36 333 289	(d) 741 143	(e) 20.40
1901 . . .	32 533 337	715 036	21.98	1916 . . .	36 631 345	721 847	19.71

§ 2. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni dal 1887 al 1916.

Le cause delle morti avvenute nel 1916 furono specificate dai medici curanti o necroscopi, per 717.540 casi e restarono ignote per 4.307, cioè, in 6 casi su 1000, sia perchè il defunto non ricevette assistenza medica, sia perchè la causa della morte non venne designata con precisione sufficiente per poterla classificare in una delle voci dell'elenco.

I casi di persone morte senza assistenza medica, o per le quali non si potè determinare la causa del decesso, sono venuti scemando dal 1887 in poi; ed infatti, in detto anno essi furono nella proporzione di 26 su 1000 morti, nel 1888 di 22 e nel 1889 di 26; mentre nel quadriennio 1913-16 furono soltanto di 4. Detti casi sono più frequenti nelle regioni con popolazione poco densa, come la Sardegna, la Basilicata e le Calabrie, dove parecchi piccoli centri sono tuttora privi di sanitario o distano molto dal luogo dove questo risiede; o nelle regioni montuose del Piemonte e degli Abruzzi.

Nel prospetto n. 3 sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni corsi dal 1887 al 1916, classificate secondo le malattie che le causarono.

(a) A partire dal volume per l'anno 1911 vennero modificate, in base ai risultati del censimento del 10 giugno 1911, per gli anni dal 1901 al 1910, le cifre della popolazione nel Regno, e perciò i quozienti di mortalità dati in questo prospetto, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei volumi anteriori al 1911.

(b) Compresa le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) Il quoziente di mortalità nel Regno durante l'anno 1908, fatta astrazione delle vittime del terremoto, sarebbe stato di 20.48 per ogni mille abitanti.

(d) Compresa le vittime del terremoto del 13 gennaio 1915, in numero di 30,476.

(e) Il quoziente di mortalità nel Regno durante l'anno 1915, fatta astrazione delle vittime del terremoto, sarebbe stato di 19.56 per ogni mille abitanti.

Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	TRIENNI				A) Cifre			
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902
		(Somma delle cifre dei tre anni)							
1	Asfissia e apoplezia nel parto	9 660	6 481	5 958	3 314	1 031	1 007	848	864
2 a 5	Vizi congeniti	9 656	6 660	6 523	4 595	1 435	1 353	1 298	1 321
6	Atrofia congenita, immaturità	158 180	162 087	166 759	144 016	45 948	49 400	50 454	50 684
7	Vaiuolo	47 775	11 380	8 242	3 456	214	316	3 396	2 413
8	Morbillo	58 529	46 346	33 276	23 084	7 433	8 827	5 562	9 961
9	Scarlattina	30 125	22 528	14 921	11 633	4 887	1 483	1 185	1 338
10	Risipola	14 330	11 420	11 250	8 915	2 983	2 633	2 568	2 609
11	Febbre tifoidea	74 740	54 944	44 294	49 866	14 963	15 060	11 748	11 358
12	Tifo petecchiale	4 466	234	112	113	1	2	17	3
13	Meningite cerebro spinale epidemica	590	84	3 452	656	74	21	5	9
15	Difterite e laringite crupale	73 804	48 440	44 834	25 975	6 893	5 790	5 444	4 514
16	Ipertosse	31 048	29 667	23 786	22 018	7 886	6 565	6 916	7 202
17	Influenza	1 642	32 108	21 151	19 091	4 264	17 306	4 079	3 821
18	Febbri da malaria	53 214	49 407	47 061	37 348	8 605	12 815	10 552	7 319
19	Cachessia palustre					2 203	3 050	3 006	2 589
20	Dissenteria	17 097	2 304	384	1 101	131	52	66	52
21	Colera asiatico	8 150	..	3 060
22	Sifilide	5 884	6 543	7 056	6 759	2 354	2 117	1 965	2 009
23	Setticemia, pioemia	6 414	3 185	3 681	3 554	1 263	1 526	1 605	1 653
24	Pustola maligna, carbonchio	1 939	1 821	1 854	1 346	461	330	341	403
25	Moccio, cimurro	43	23	19	15	4	2	..	3
26	Lebbra	47	12	16	65	14	11	6	5
27	Rabbia	327	255	229	239	80	63	55	56
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	83	4 537	4 935	326	26	10	(b) 34	7
29	Tubercolosi disseminate	27 532	26 519	26 999	23 244	4 729	2 339	2 300	2 636
31	Tubercolosi polmonare, tisi	95 770	93 893	93 174	94 830	85 078	39 394	36 212	33 086
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	16 718	17 310	16 281	13 849	5 898	5 920	5 751	5 515
32	Tabes mesenterica	37 774	33 252	31 230	28 738	8 780	9 155	8 117	7 858
33	Scrofola disseminata	8 991	7 544	6 029	5 274	1 425	1 384	1 248	1 116
34	Lupus	224	299	259	291	118	128	102	96

dal 1887 al 1916, classificate secondo le cause.

NUMERO dell' Elenco nosologico	A N N I														NUMERO dell' Elenco nosologico
	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	
	assolute.														
1	679	811	976	711	759	833	734	799	731	727	625	717	661	496	1
2 a 5	1 354	1 388	1 716	1 777	1 909	1 907	1 871	1 806	1 765	1 744	1 616	1 512	1 500	1 290	2 a 5
6	47 057	46 345	45 293	41 441	42 049	43 307	43 632	40 331	39 279	37 250	34 793	33 653	34 261	26 236	6
7	6 049	3 093	482	169	451	559	758	413	4 828	3 336	150	45	19	16	7
8	7 283	5 332	6 738	9 726	8 184	11 740	11 043	9 897	8 573	7 278	10 340	6 378	8 230	11 214	8
9	1 991	1 611	1 689	2 724	2 940	3 464	2 703	2 903	2 515	2 964	5 513	3 637	1 859	2 694	9
10	3 149	2 885	2 479	2 334	2 581	2 904	2 862	2 342	2 008	2 126	2 418	2 289	1 831	1 812	10
11	11 671	12 239	10 896	9 424	8 614	9 287	9 741	8 948	9 537	7 743	7 964	6 954	9 467	10 831	11
12	2	9	38	35	39	25	39	32	24	47	27	11	26	46	12
13	3	80	288	91	92	16	12	2	2	7	9	14	903	2 255	13
15	4 064	4 519	4 255	4 253	5 634	5 921	5 781	4 828	3 682	3 642	3 482	4 038	4 270	4 381	14 e 15
16	6 521	5 958	5 767	6 165	6 142	5 545	5 218	5 416	6 833	6 721	4 882	3 820	5 701	7 689	16
17	7 132	3 794	6 870	4 309	8 043	4 450	5 719	2 780	5 660	3 141	4 272	3 359	4 174	5 919	17
18	6 414	6 357	5 696	3 782	3 251	2 714	2 760	2 870	3 537	2 371	2 003	1 539	3 220	4 274	18
19	2 103	2 106	2 149	1 089	980	764	773	751	883	790	661	506	615	786	19
20	34	14	197	15	6	4	1	13	5	2	3	2	..	4	20
21	805	6 145	41	235	11	21
22	1 919	1 849	1 986	1 814	1 757	1 692	1 553	1 730	1 861	1 706	1 754	1 894	1 802	1 818	22
23	1 807	1 921	1 550	1 684	1 946	2 522	2 597	2 713	3 080	2 887	3 162	3 325	3 272	3 444	23
24	396	355	306	305	314	355	322	260	235	223	219	231	221	220	24
25	2	3	2	2	1	..	2	3	4	3	1	2	25
26	11	12	12	10	10	9	14	20	19	17	15	17	19	14	26
27	58	45	47	60	56	71	50	65	52	58	49	52	60	81	27
28	11	26	234	1 068	139	86	51	29	42	70	32	55	29	33	28
29	3 662	3 666	5 979	6 840	6 172	5 747	5 602	5 092	5 490	4 394	4 747	4 471	4 709	5 340	29
31	33 262	35 486	34 370	34 059	35 796	35 840	36 496	35 359	36 791	33 224	32 854	33 261	36 302	37 908	31
30	5 471	5 465	5 683	5 679	5 864	5 971	6 010	5 898	6 720	5 691	6 009	5 644	6 498	7 557	30
32	7 251	7 291	7 277	6 187	5 865	5 502	5 684	5 609	6 965	5 574	5 641	5 052	5 952	6 303	32
33	1 122	1 039	1 122	1 052	989	826	884	773	894	537	665	646	732	735	33
34	115	106	101	101	125	108	91	85	88	93	95	82	105	95	34

(a) Per maggiori chiarimenti vedasi l'elenco più particolareggiato dato in fine della presente Introduzione.
(b) Compresi 6 morti per peste bubbonica.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				1899-1902				NUMERO dell' Elenco nosologico
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902	
		(Somma delle cifre dei tre anni)								
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott.	(a) 3 506	(a) 3 471	(a) 4 024	5 897	2 110	1 967	2 032	2 086	
38	Rachitide.	8 610	9 344	8 071	9 115	3 231	3 539	3 275	3 231	
39 e 40	Anemia e leucemia	29 561	24 989	23 332	28 759	9 376	9 795	9 364	9 782	
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia	1 603	1 523	1 472	1 353	476	508	433	459	
43	Scorbuto.	1 445	1 315	1 023	895	260	265	205	226	
44	Marasmo senile	86 127	97 232	106 449	115 808	41 870	47 760	46 367	46 398	
45	Pellagra	10 284	12 286	9 549	9 870	3 836	3 788	3 054	2 376	
46	Gotta	670	364	395	461	146	133	129	127	
47	Diabete	1 595	2 109	2 175	2 609	1 026	1 082	1 071	1 154	
48 a 58	Tumori maligni.	38 179	39 080	42 164	47 779	16 680	16 873	17 141	17 634	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	43 621	42 931	49 705	47 280	13 892	14 407	13 676	13 923	
	Mielite, tabe dorsale.					2 820	2 874	2 646	2 098	
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	12 050	14 632	14 028	9 886					
64	Apoplessia e congestione cerebrale.					31 440	32 166	32 711	32 563	
62	Paralisi infantile	97 527	93 315	93 652	89 511	199	280	243	268	
66	Rammollimento cerebrale					707	732	834	766	
65	Tumori cerebrali e spinali (b).					390	415	429	437	
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	4 439	6 165	6 180	13 421	3 548	3 196	2 834	2 801	
73	Successioni della pazzia					71	64	153	130	
63	Encefalite	7 249	5 080	3 764	3 657	1 066	1 208	1 077	1 014	
68 e 69	Epilessia e isterismo.	6 359	6 547	6 000	5 398	1 554	1 816	1 928	1 911	
70	Corea.	329	292	280	244	104	76	92	89	
71	Tetano e trisma	2 576	2 004	2 439	2 324	728	702	639	615	
72	Eclampsia infantile	71 022	66 066	60 883	56 009	16 817	17 754	16 483	17 004	
74	Malattie degli occhi (b)	144	276	1 437	1 623	123	55	25	43	
75	Malattie degli orecchi (b)	777	1 291			344	402	376	335	
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea e della laringe (b)	7 654	11 589	8 563	5 379	1 928	1 889	1 901	1 876	
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c)	198 658	238 550	227 912	199 741	51 537	58 029	53 652	56 910	
						7 047	8 275	8 555	7 587	

Segue A) Cifre

dal 1887 al 1916, classificate secondo le cause.

NUMERO dell' Elenco nosologico	ANNI																NUMERO dell' Elenco nosologico
	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916			
	assolute.																
35, 36 e 37	2 155	2 194	2 480	2 402	2 514	2 543	2 615	2 521	2 816	2 675	2 853	2 803	3 044	3 112	35, 36 e 37		
38	3 305	2 944	3 370	2 817	2 739	2 546	2 733	2 631	3 454	2 514	2 558	2 312	2 981	3 040	38		
39 e 40	10 138	8 911	9 315	14 651	11 346	9 073	9 645	9 027	13 266	9 848	11 371	11 048	13 711	13 159	39 e 40		
41 e 42	480	476	591	547	517	507	584	552	570	556	563	545	501	558	41 e 42		
43	214	160	217	193	164	129	159	138	207	141	129	135	134	123	43		
44	46 779	43 942	47 593	45 953	48 601	46 502	51 533	48 118	54 183	46 140	47 858	47 602	53 060	52 466	44		
45	2 647	2 363	2 357	2 024	1 635	1 334	1 420	1 312	1 222	985	1 030	730	811	793	45		
46	124	126	132	185	186	218	219	190	199	206	240	262	294	266	46		
47	1 139	1 242	1 322	1 394	1 535	1 503	1 551	1 608	1 714	1 658	1 818	1 838	1 942	1 827	47		
48 a 58	17 774	18 860	19 348	20 653	20 668	21 828	21 871	22 555	23 172	22 661	23 639	23 944	24 259	24 323	48 a 58		
59	14 655	14 049	13 026	13 057	11 734	11 792	12 476	11 958	13 184	10 799	11 077	10 074	8 266	7 949	59		
	2 734	2 616	2 773	2 427	2 529	2 279	2 610	2 328	2 621	2 303	2 234	2 265	2 341	2 291	60		
61	165	203	234	322	362	393	433	380	437	354	428	396	408	392	61		
64	33 775	32 991	34 263	33 112	33 270	34 658	36 686	35 964	37 321	35 351	36 063	39 419	42 717	40 538	64		
62	200	228	293	322	330	341	333	364	344	339	379	366	435	436	62		
66	822	841	1 031	836	877	791	949	861	931	887	857	883	865	769	66		
65	473	423	532	515	525	152	199	65	84	167	155	110	115	112	65		
67	2 934	3 135	4 215	4 304	4 440	4 392	4 898	4 735	4 982	4 461	4 613	3 076	2 007	1 796	67		
73	194	317	1 024	183	178	211	220	101	83	187	66	30	55	37	73		
63	1 079	1 029	1 250	1 186	969	1 085	1 045	1 134	1 174	957	1 113	966	1 061	1 591	63		
68 e 69	1 832	1 878	1 894	1 700	1 767	1 864	1 961	1 819	2 006	1 665	1 724	1 732	1 927	2 018	68 e 69		
70	105	92	108	72	97	85	102	94	101	88	100	96	96	81	70		
71	535	646	699	750	548	524	589	487	528	507	518	523	549	540	71		
72	15 847	15 423	16 191	14 960	14 714	14 611	15 114	14 397	17 675	14 698	14 294	14 236	15 727	15 311	72		
74	30	47	45	30	34	33	28	19	28	32	33	20	20	30	74		
75	368	335	495	446	489	522	499	397	479	440	453	455	523	554	75		
76	1 853	1 908	1 903	1 298	860	1 270	1 384	977	911	846	851	838	935	809	76		
77 e 78	53 721	49 112	46 556	46 998	47 869	42 003	45 154	41 536	49 731	41 462	38 738	37 603	42 952	46 061	77 e 78		
	1 687	8 289	10 066	7 611	7 933	7 704	8 341	7 504	9 076	8 133	8 009	7 873	8 704	8 248			

(a) Queste cifre, per gli anni dal 1887 al 1894, si riferiscono alla sola *sinovite fungosa* e non comprendono i morti per *tubercolosi delle ossa*.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Per gli anni 1899-1916 la voce: « *bronchite acuta e cronica* » comprende due numeri: nel primo si sono classificati i morti per *bronchite acuta*; nel secondo quelli per *bronchite cronica*.

negli anni anteriori al 1895, si sommarono con quelli per malattie delle ossa in genere.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				A N N I			
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902
		(Somma delle cifre dei tre anni)							
Segue A) <i>Omne</i>									
79	Malattie della pleura (a)	14 392	12 938	11 189	9 506	2 979	3 044	2 935	2 065
80	Congestione e apoplessia polmonare	7 912	5 220	2 982	1 018	839	714	664	736
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (b)	199 790	225 378	235 135	219 337	43 846	41 996	43 453	40 451
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	15 981	12 554	7 356	3 719	1 495	1 379	835	667
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	349	444	487	441	140	153	115	113
85	Morbo di Basedow	692	649	671	700	193	201	178	167
86	Asma, enfisema polmonare	12 129	11 174	8 774	8 835	3 089	3 393	2 826	2 570
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	12 391	16 300	18 411	18 908	7 183	7 575	7 519	7 681
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	692	649	671	700	193	201	178	167
89	Malattie dei vasi linfatici (liffangioite, adenite)	1 550	1 125	743	319	61	26	44	28
90, 91 e 93	Malattie del cuore, del pericardio, sincope	135 481	144 769	153 358	156 282	54 809	58 778	59 327	58 672
92	Angina pectoris	1 529	1 614	1 557	1 498	613	589	580	638
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	11 718	10 962	9 321	7 809	2 287	2 374	2 126	2 209
95	Orecchioni	725	662	621	463	138	126	108	118
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	6 549	3 925	3 383	2 722	1 127	1 097	1 019	976
97	Malattie dello stomaco, atresia (a)	19 084	19 069	20 733	22 469	7 421	8 123	7 340	8 384
98	Ulcera rotonda dello stomaco	1 972	1 700	1 738	1 683	490	556	516	520
99	Epatite, cirrosi epatica	17 944	17 205	16 614	15 970	5 184	5 344	5 092	5 389
100	Atrofia gialla acuta del fegato	377	359	354	329	109	90	80	112
101	Calcoli biliari	322	335	396	371	199	185	162	186
102	Ittero	3 026	3 555	3 895	4 172	1 298	1 294	1 396	1 447
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	1 148	682	530	393	26	28	26	37
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	279 614	308 056	319 055	319 729	94 970	115 138	98 551	111 518
105	Volvolo, occlusione intestinale	5 985	5 602	6 124	6 303	2 295	2 343	2 259	2 187
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (a): idrope ascite	12 871	10 551	8 093	6 298	1 903	1 989	1 701	1 663
107	Ernie intestinali e addominali	4 766	4 456	4 413	4 137	1 302	1 369	1 436	1 209
108	Malattie da echinococco	128	129	137	215	68	81	77	74
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	14 159	7 579	5 315	3 898	1 253	1 206	1 467	1 415

(a) Esclusi i tumori maligni.

(b) I morti per *polmonite* negli anni 1899-1916 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte

NUMERO dell' Elenco nosologico	A N N I														NUMERO dell' Elenco nosologico
	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	
	assolute.														
79	3 034	2 996	2 874	2 711	2 824	2 839	2 847	2 834	2 986	2 814	2 732	2 861	2 974	3 297	79
80	773	716	788	760	728	846	899	800	807	749	755	725	721	659	80
81 e 82	47 400	37 509	38 812	37 350	41 367	37 294	39 548	32 664	36 993	33 394	33 307	32 524	32 533	36 058	81 e 82
83	35 742	32 181	34 268	36 286	39 178	37 262	41 544	37 417	45 943	38 476	39 816	38 995	45 218	49 412	83
84	631	647	628	702	763	639	709	597	614	815	792	795	743	837	84
85	108	113	129	104	115	124	135	153	182	185	213	196	194	198	85
86	61	60	69	75	112	157	103	95	112	134	114	133	118	110	86
87	2 891	2 593	3 010	1 777	2 345	2 712	3 071	2 432	2 731	2 339	2 479	2 461	2 606	2 433	87
88	7 945	8 456	9 765	8 850	10 085	10 880	12 549	11 930	12 681	11 993	12 117	11 554	12 016	10 564	88
89	162	143	323	261	308	272	266	198	304	657	422	273	238	199	89
90, 91 e 93	34	26	143	151	313	299	259	256	277	291	325	237	271	328	90, 91 e 93
92	61 599	59 172	62 890	58 362	59 783	61 679	68 034	64 331	67 085	61 868	63 275	66 495	70 418	67 314	92
94	635	666	782	738	764	812	914	916	1 032	952	966	1 123	1 144	1 158	94
95	1 971	1 870	1 938	1 781	1 517	1 583	1 580	1 603	1 729	1 304	1 337	1 024	1 294	1 136	95
96	142	105	128	110	124	119	107	115	113	112	118	94	88	108	96
97	1 014	903	974	809	842	993	1 016	820	696	802	880	818	755	775	97
98	7 778	7 813	7 829	4 767	6 188	7 924	8 468	8 244	11 541	9 360	10 419	10 089	11 880	10 552	98
99	490	553	497	534	552	621	605	529	619	604	593	614	743	714	99
100	5 063	4 994	5 003	4 747	4 816	5 267	5 605	5 482	5 504	4 971	5 076	5 072	5 415	5 093	100
101	112	106	113	99	97	94	96	108	80	91	67	83	88	121	101
102	189	190	203	158	202	212	219	215	278	244	227	248	243	234	102
103	1 398	1 482	1 504	1 676	1 538	1 552	1 583	1 511	1 541	1 465	1 549	1 430	1 521	1 573	103
104	43	73	163	89	104	112	135	186	163	145	128	115	122	127	104
105	108 678	104 578	115 367	108 853	97 189	94 946	105 120	94 877	87 697	59 536	80 194	72 082	88 768	90 534	105
106 e 111	2 287	2 227	2 130	2 098	2 033	1 975	1 980	1 954	2 219	2 141	2 127	2 114	2 290	2 310	106 e 111
107	1 520	1 495	1 386	856	904	712	604	447	475	658	582	524	611	704	107
108	1 295	1 300	1 414	1 333	1 365	1 193	1 306	1 293	1 623	1 306	1 357	1 281	1 515	1 697	108
109	72	85	71	80	94	85	74	83	84	88	69	76	71	88	109
	1 283	1 203	1 085	1 149	1 146	1 076	1 115	1 043	1 362	1 136	1 027	970	1 179	1 354	109

per *pneumonia crupale* e nel secondo quelle per *bronco polmonite acuta*.

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue Prospetto N. 3.

Table with columns: NUMERO dell'Elenco nosologico, CAUSE DI MORTE, TRIENNI (1887-89, 1890-92, 1893-95, 1896-98), and years 1899-1902. Includes rows for various diseases like Appendicite e peritonite, Malattie dei reni, etc.

Segue A) Cifre

dal 1887 al 1916, classificate secondo le cause.

Table with columns: A N N I (1903-1916) and NUMERO dell'Elenco nosologico. Includes rows for absolute numbers of deaths for various causes, with sub-rows for violent deaths (Morte violenta).

(a) I morti per peritonite negli anni 1907-1916 sono stati classificati in due gruppi: nel primo si sono messe le dichiarazioni di morte... (b) Esclusi i tumori maligni. (c) Escluse le affezioni cancerose e puerperali. (d) Comprese le vittime del terremoto, avvenuto il 23 dicembre 1908, in numero di 77283. (e) Comprese le vittime del terremoto, avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 30476. (f) In questa voce sono compresi, per l'anno 1916, oltre i morti per ferite riportate in combattimenti o in altre operazioni di guerra...

per appendicite e nel secondo quelle per peritonite.

maschi 4350), anche gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 165 e femmine 81) e dei bombardamenti di città costiere (maschi 14 e femmine 10). Per l'anno 1913, veggasi il volume di detta annata.

Segue **Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi**

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				A N N I			
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902
		(media annuale)							
B) Cifre proporzionali									
1	Astissia e apoplessia nel parto	108	71	64	35	32	31	26	26
2 a 5	Vizi congeniti	108	73	70	48	45	42	40	40
6	Atrofia congenita, immaturità	1 768	1 774	1 788	1 514	1 430	1 527	1 551	1 550
7	Vaiuolo	534	125	88	36	7	10	104	74
8	Morbillo	655	507	357	243	231	273	171	305
9	Scarlattina	337	217	160	122	140	46	36	41
10	Risipola	160	125	121	94	93	81	79	80
11	Febbre tifoidea	835	601	475	519	466	466	361	347
12	Tifo petecchiale	50	3	1	1	1	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica	7	1	37	7	2	1
14 e 15	Difterite e laringite crupale	825	530	481	273	214	179	167	138
16	Ipertosse	347	325	255	231	245	203	213	220
17	Influenza	18	351	227	201	133	535	125	117
18	Febbri da malaria	595	541	505	393	268	396	324	221
19	Cachessia palustre	191	25	4	12	4	2	2	2
20	Dissenteria	91	..	33
21	Colera asiatico	66	72	76	71	73	65	60	61
22	Stitide	72	35	39	37	39	47	49	51
23	Setticemia, pioemia	22	20	20	14	14	10	10	12
24	Pustola maligna, carbonchio	1	50	53	3	1	..	1	..
28	Altre malattie infettive ed infezioni non determinate	307	290	290	244	147	72	71	81
29	Tubercolosi disseminata	1 070	1 028	999	997	1 092	1 218	1 113	1 012
31	Tubercolosi polmonare, tisi	187	189	175	146	184	183	177	169
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	422	364	335	302	273	283	249	240
32	Tabes mesenterica	103	86	67	58	48	47	41	37
33 e 34	Scrofola disseminata e lupus	(b) 39	(b) 38	(b) 43	62	66	61	62	64
35, 36 e 37	Sinovite e artrite fungosa, tubercolosi delle ossa e d'altri organi, morbo di Pott	96	102	87	96	101	109	101	99
38	Rachitide	331	274	250	302	292	303	288	299
39 e 40	Anemia e leucemia	18	17	16	14	15	16	13	14
41 e 42	Porpora emorragica, emofilia	962	1 064	1 141	1 217	1 303	1 477	1 425	1 419
44	Marasmo senile	115	134	102	104	119	117	94	73
45	Pellagra								

a) Non si sono fatte le proporzioni ad 1,000,000 di abitanti per quelle cause che hanno dato un numero di morti inferiore a 500, durante precedentemente calcolate, in seguito ai risultati del censimento del 10 giugno 1911; e perciò i quozienti di mortalità per le singole cause dati b) Veggasi la nota (a) a pag. XII

dal 1887 al 1916, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell' Elenco nosologico	A N N I													
	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916
	a 1,000,000 di abitanti.													
1	21	25	29	21	23	25	22	23	21	21	18	20	18	14
2 a 5	41	42	52	53	57	56	55	53	51	50	46	42	41	35
6	1 433	1 404	1 365	1 244	1 255	1 280	1 280	1 173	1 132	1 063	982	938	943	716
7	184	94	15	5	13	17	22	12	139	95	4	1	1	7
8	222	161	203	292	244	347	324	288	247	208	292	178	227	307
9	61	49	51	82	88	102	79	84	73	85	156	101	51	74
10	96	87	75	70	77	86	84	68	58	61	68	64	50	49
11	355	371	328	283	257	275	286	260	275	221	225	194	261	296
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	..	1	1
13	..	2	9	3	3	25	62
14 e 15	124	137	128	128	168	175	170	140	106	104	98	113	118	120
16	199	180	174	185	183	164	153	158	197	192	138	107	157	210
17	217	115	207	129	240	132	168	81	163	90	121	94	115	162
18	195	193	172	113	97	80	81	83	102	68	57	43	89	117
19	64	64	65	33	29	23	23	22	25	23	19	14	17	21
20	1	..	6
21	23	177	1	6	..
22	58	56	60	54	52	50	46	50	54	49	50	53	50	50
23	55	58	47	51	58	75	76	79	89	82	89	93	90	94
24	12	11	9	9	9	10	9	8	7	6	6	6	6	6
28	..	1	7	32	4	3	1	1	1	2	1	2	1	1
29	112	111	180	205	184	170	164	148	158	125	134	125	130	146
31	1 013	1 075	1 035	1 022	1 068	1 060	1 071	1 029	1 061	949	928	928	999	1 035
30	167	166	171	176	175	177	176	172	194	162	170	157	179	206
32	221	221	219	186	175	163	167	163	201	159	159	141	164	172
33 e 34	33	35	37	35	33	28	29	25	28	18	21	20	23	23
35, 36 e 37	66	66	75	72	75	75	77	73	81	76	81	78	84	85
38	101	89	102	85	82	75	80	77	100	72	72	64	82	83
39 e 40	309	270	281	440	339	268	283	263	382	231	321	308	377	359
41 e 42	15	14	18	16	15	18	17	16	16	16	16	15	14	15
44	1 424	1 331	1 434	1 379	1 450	1 375	1 512	1 400	1 562	1 317	1 351	1 327	1 460	1 432
45	81	72	71	61	49	39	42	38	35	28	29	20	22	22

il periodo di osservazione dal 1887 al 1916. Si avverte che per gli anni dal 1901 al 1910 vennero modificate le cifre della popolazione nel Regno, in questo prospetto, per gli anni suddetti, differiscono lievemente da quelli pubblicati nei corrispondenti volumi.

Segue. Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				A N N I			
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902
		(media annuale)							
<i>Segue B) Cifre proporzionali</i>									
47	Diabete	18	23	23	27	32	33	33	35
48 a 58	Tumori maligni.	427	428	452	502	519	522	527	539
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	488	470	533	497	432	445	420	426
60	Mielite, tabe dorsale.	135	160	150	104	88	89	81	83
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson					7	5	4	3
64	Apoplessia e congestione cerebrale.					978	994	1 005	996
62	Paralisi infantile					1 090	1 021	1 004	941
66	Rammollimento cerebrale					22	23	26	23
65	Tumori cerebrali e spinali (b).					12	13	13	13
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	50	67	66	141	110	99	87	86
73	Succezioni della pazzia.					2	2	5	4
63	Encefalite	81	56	40	38	33	37	33	31
68 e 69	Epilessia e isterismo.	71	72	64	57	48	56	59	58
71	Tetano e trisma	29	22	26	24	23	22	20	19
72	Eclampsia infantile	794	723	653	589	523	549	507	520
75	Malattie degli orecchi (b)	9	14	(e)	(e)	11	12	12	10
76	Malat. delle fosse nasali, della trachea, della laringe (b)	85	127	92	57	60	58	58	57
77 e 78	Bronchite acuta e cronica (c).	2 220	2 611	2 444	2 099	1 604	1 794	1 649	1 740
						219	256	263	232
79	Malattie della pleura (b).	161	142	120	100	93	94	90	91
80	Congestione e apoplezia polmonare.	88	57	31	11	26	22	20	23
81 e 82	Polmonite crupale e bronco polmonite acuta (d).	2 233	2 467	2 521	2 305	1 364	1 298	1 336	1 238
						881	1 054	955	1 027
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	179	137	79	39	47	43	26	20
86	Asma, enfisema polmonare.	136	122	94	93	96	105	87	79
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	138	178	197	199	224	234	231	235
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	17	12	8	3	2	1	1	1
90; 91 e 93	Malattie del cuore, del pericardio, sincope	1 514	1 584	1 644	1 642	1 706	1 817	1 824	1 794
92	Angina pectoris	17	18	17	16	19	18	18	20
94	Malattie della bocca e della lingua (b)	131	113	100	82	71	73	65	69
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (b)	73	43	36	29	35	34	31	30

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XVIII.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Veggasi la nota (c) a pagina XII.
 (d) Id. (b) id. XIV.
 (e) Per gli anni 1895-1898 le malattie degli orecchi furono classificate assieme a quelle degli occhi.

dal 1887 al 1916, classificate secondo le cause (a).

NUMERO dell' Elenco nosologico	A N N I														
	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	
	a 1,000,000 di abitanti.														
	35	38	40	42	46	44	46	47	49	47	51	51	53	50	47
	541	571	583	620	617	645	642	656	668	647	667	668	668	664	48 a 58
	446	426	392	392	350	349	366	348	380	308	313	281	228	217	59
	83	79	84	73	75	67	77	68	76	66	63	63	61	63	60
	5	6	7	10	11	12	13	11	13	10	12	11	11	11	61
	1 028	999	1 032	994	993	1 025	1 077	1 046	1 076	1 009	1 018	1 099	1 176	1 107	61
	6	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	12	12	62
	25	25	32	25	26	23	28	25	27	25	24	25	24	21	66
	14	13	16	15	16	4	6	2	2	5	4	3	3	3	65
	89	95	127	129	132	130	144	138	144	127	130	86	55	49	67
	6	10	31	5	5	6	6	3	2	5	2	1	2	1	73
	33	31	38	36	29	32	31	33	34	27	31	27	29	43	63
	56	57	57	51	53	55	58	53	58	48	49	48	53	55	68 e 69
	16	20	21	23	16	15	17	14	15	14	15	15	15	15	71
	483	467	488	449	439	432	444	419	510	420	404	397	433	419	72
	11	11	15	13	15	15	15	12	14	13	13	13	14	15	75
	56	58	57	39	26	38	41	28	26	24	24	23	26	22	76
	1 636	1 488	1 403	1 410	1 428	1 242	1 325	1 208	1 434	1 184	1 094	1 049	1 182	1 257	77 e 78
	265	251	303	228	237	228	245	218	262	232	226	220	240	225	
	92	91	87	81	84	84	84	82	86	80	77	86	82	90	79
	24	22	24	23	22	25	26	23	23	21	21	20	20	18	80
	1 443	1 136	1 169	1 121	1 234	1 103	1 161	950	1 066	953	940	907	895	984	81 e 82
	1 088	975	1 032	1 089	1 169	1 102	1 219	1 088	1 324	1 098	1 124	1 087	1 245	1 350	
	19	20	19	21	23	19	21	17	18	23	22	22	20	23	83
	88	79	91	53	70	80	90	71	79	67	70	69	72	66	86
	242	256	294	266	301	322	368	347	366	342	342	322	331	288	87
	1	1	4	5	9	9	8	7	8	8	9	7	7	9	89
	1 876	1 792	1 895	1 751	1 784	1 823	1 996	1 871	1 934	1 766	1 787	1 854	1 938	1 838	90, 91 e 93
	19	20	24	22	23	24	27	27	30	27	27	31	31	32	92
	60	57	58	53	45	47	46	47	50	37	38	29	36	31	94
	31	27	29	24	25	29	30	24	20	23	23	21	21	21	96

Segue Morti avvenute nel Regno, negli anni corsi

Segue PROSPETTO N. 3.

NUMERO dell' Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	TRIENNI				A N N I			
		1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899	1900	1901	1902
		(media annuale)							
<i>Segue B) Cifre proporzionali</i>									
97	Malattie dello stomaco, atresia (b)	214	209	222	236	231	251	226	256
98	Ulcera rotonda dello stomaco	22	19	19	18	15	17	16	16
99	Epatite, cirrosi epatica	201	188	178	168	161	165	157	163
102	Ittero	34	39	42	44	40	40	43	44
104	Diarrea, enterite, colera indig., ulcera intestinale, ecc.	3 125	3 372	3 421	3 360	2 955	3 560	3 029	3 410
105	Volvolo, occlusione intestinale	67	61	66	66	71	72	69	67
106 e 111	Tumori intestinali e addominali (b), idrope ascite	144	116	87	66	60	62	52	51
107	Ernie intestinali e addominali	53	49	47	43	41	42	44	39
109	Ascariidi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	158	83	57	41	39	37	45	43
110 e 110 a	Appendicite e peritonite	153	149	163	158	150	154	146	154
112	Malattie dei reni (b)	263	293	337	370	398	383	377	400
113 e 114	Malattie della vescica, calcoli renali e vescicali (b)	86	89	93	77	80	78	75	76
115	Malattie dell'uretra e prostata (b)	11	13	12	14	14	15	12	11
119	Malattie dell'utero e vagina (d)	35	52	50	28	19	19	17	16
124	Febbre puerperale	79	53	52	39	41	32	31	32
121, 122, 123, 125 e 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	144	81	70	68	71	62	54	54
127 e 128	Flemmone, ascesso (b), cangrena della pelle	102	108	96	80	79	71	68	66
131	Pemfigo, eczema, ectima	37	33	31	26	25	24	21	22
132	Sclerema	101	95	92	83	69	70	80	75
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (b)	53	46	33	34	33	32	32	36
134	Reumatismo articolare acuto	30	29	29	28	30	29	26	28
135	Reumatismo cronico	32	37	31	26	24	26	24	24
138	Alcoolismo cronico	14	17	19	17	17	16	13	12
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	367	331	309	315	318	315	331	321
157 e 158	Morte violenta per omicidio (compreso quello d'infante)	52	47	49	49	44	40	39	41
158 a	Morte violenta per ferite riportate in guerra (g)
160 a 168	Morte violenta per suicidio	50	56	57	63	63	63	62	61
	Totale dei morti per causa determinata	26 360	25 482	24 510	22 598	21 595	23 446	21 688	21 963
	Morti per causa ignota o non dichiarata	684	721	549	376	293	325	291	275
	Totale generale	27 024	26 203	25 059	22 974	21 888	23 771	21 979	22 238

dal 1887 al 1916, classificate secondo le cause (a).

A N N I																NUMERO dell' Elenco nosologico
1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916			
<i>a 1,000,000 di abitanti.</i>																
237	237	236	143	185	231	248	240	333	267	294	281	327	288	97		
15	17	15	16	16	18	18	15	18	17	17	17	20	19	98		
154	151	151	142	144	156	164	159	159	142	143	141	149	139	99		
43	45	45	50	46	46	46	44	44	42	44	40	42	43	102		
3 309	3 167	3 476	3 266	2 900	2 807	3 085	2 760	2 528	1 700	2 264	2 010	2 443	2 471	104		
70	67	64	63	61	58	58	57	64	61	60	59	62	63	105		
46	45	42	26	27	21	18	13	14	19	16	15	17	19	106 e 111		
39	39	43	40	41	35	38	38	47	37	38	36	42	46	107		
39	36	33	34	34	32	33	30	39	32	29	27	32	37	109		
160	148	146	122	19	18	20	18	22	18	20	19	21	20	110 e 110 a		
(c) 94	(c) 92	(c) 98	(c) 99	(c) 114	(c) 105	(c) 110	(c) 99	(c) 106	(c) 106	(c) 106	(c) 106	(c) 106	(c) 106			
409	398	394	405	397	418	461	459	481	449	460	457	473	468	112		
76	71	71	64	66	61	62	58	61	55	53	50	57	57	113 e 114		
14	16	18	17	20	18	18	17	18	17	20	19	21	22	115		
13	11	13	17	17	18	16	16	18	18	16	16	15	14	119		
34	33	29	31	31	37	36	29	27	26	29	29	24	23	124		
51	58	67	53	57	61	55	52	49	53	50	46	44	41	121, 122, 123, 125 e 126		
71	71	74	75	81	79	78	57	53	51	51	53	52	53	127 e 128		
19	18	19	16	16	17	17	14	15	15	16	16	17	16	131		
70	67	77	65	67	62	64	55	57	48	48	42	43	34	132		
35	36	35	27	30	28	30	28	30	28	26	24	26	26	133		
30	29	30	30	35	42	41	35	33	29	29	33	34	32	134		
25	26	33	27	33	28	29	25	26	27	24	24	26	24	135		
12	15	25	21	20	27	41	28	21	18	21	21	22	15	138		
314	335	396	325	341	(e) 2 636	380	320	320	313	317	319	(f) 1 161	316	140 a 156		
40	40	44	40	38	45	40	34	31	32	34	38	36	26	157 e 158		
..	67	(g) 126	158 a		
59	65	72	70	73	80	87	84	79	85	88	89	85	69	160 a 168		
22 143	20 924	21 803	20 777	20 776	22 625	21 511	19 752	21 309	18 078	18 673	17 873	(f) 20 312	19 588			
278	235	199	134	121	140	159	100	105	74	73	68	86	118			
22 421	21 159	22 002	20 911	20 896	22 765	21 670	19 852	21 414	18 152	18 746	17 941	(f) 20 398	19 706			

(a) Veggasi la nota (a) a pagina XVIII.
 (b) Esclusi i tumori maligni.
 (c) Veggasi la nota (a) a pagina XVI.
 (d) Escluse le affezioni cancerose e puerperali.
 (e) Comprese le vittime del terremoto avvenuto il 28 dicembre 1908.
 (f) 13 gennaio 1915.
 (g) Veggasi la nota (f) a pag. XVI.

Abbiamo già visto che la mortalità nei primi due anni di guerra (1915 e 1916) è stata alquanto più alta di quella del triennio precedente; tuttavia se si pensa alle condizioni eccezionali create dalla guerra per il grande agglomeramento di popolazione, specialmente nell'Italia settentrionale, e per i movimenti di truppe verificatisi in tutte le regioni, con frequenti trasporti di feriti e malati negli ospedali territoriali e di riserva istituiti nelle varie città, è da segnalare con soddisfazione il fatto che le condizioni igieniche del Paese si siano mantenute normali nei primi due anni di guerra.

Ciò detto, passiamo ad osservare la frequenza delle cause di morte più importanti o più caratteristiche nel Regno, durante il periodo dal 1887 al 1916.

Nelle malattie infettive, in generale, si è avuto un grande miglioramento dal 1887 al 1916, come ora vedremo, parlando delle singole malattie.

Vaiuolo. — La mortalità per *vaiuolo* ebbe i suoi massimi nel periodo dal 1887 al 1890, dopo il quale anno essa cominciò a discendere rapidamente, tantochè negli anni 1898-1900 si ebbero pochissime vittime per questo morbo (10 morti all'anno ogni milione di abitanti). Dall'anno 1901 al 1904 il *vaiuolo* assunse di nuovo una maggiore gravità, ed infatti esso causò 104 morti per ogni milione di abitanti nel 1901, 74 nel 1902, 184 nel 1903 e 94 nel 1904. Negli anni dal 1905 al 1910 il *vaiuolo* fu mite, mentre nei due anni seguenti inferì più gravemente, tantochè causò 139 decessi per ogni milione di abitanti nel 1911 e 95 nel 1912. Nel 1913, invece, i morti per *vaiuolo* si ridussero, in cifre assolute, soltanto a 150, nel 1914 a 45, nel 1915 a 19 e nel 1916 a 16, dando così, in questi ultimi anni, i più piccoli quozienti fra tutti quelli osservati nel periodo dal 1887 al 1916.

Morbillo. — La mortalità per *morbillo* discese dal quoziente 803 nel 1887, per ogni milione di abitanti, a 226 nella media del triennio 1912-14, e negli anni di guerra, 1915 e 1916, il quoziente di mortalità per detta infezione fu, rispettivamente, di 227 e 307, ogni milione di abitanti.

Scarlattina. — I morti per questa causa, che furono 14631 nel 1887 (494 ogni milione di abitanti), nella media del triennio 1912-14 si ridussero al quoziente di 114, nel 1915 a 51 e nel 1916 a 74, ogni milione di abitanti.

Febbre tifoidea. — Un grande miglioramento si è avuto nella mortalità per *febbre tifoidea*, la quale dal quoziente di 939 ogni milione di abitanti nel 1887 discese a 213 nel triennio 1912-14. Negli anni 1915 e 1916, a causa del notevole numero di militari morti per *febbre tifoidea*, il quoziente di mortalità per tale infezione salì, rispettivamente, a 261 e a 296, ogni milione di abitanti.

Tifo petecchiale. — Questa causa che aveva causato parecchie morti nei primi anni di questo periodo d'osservazione, in seguito è quasi scomparsa dalle tavole necrologiche.

Meningite cerebro spinale epidemica. — Negli anni 1915 e 1916, a causa del grande agglomeramento di popolazione, specialmente nell'Italia settentrionale, e dei movimenti di truppe verificatisi in tutte le regioni, si ebbero a lamentare 903 decessi per *meningite epidemica* nel 1915 e 2255 nel 1916, e cioè, 25 e 62 per ogni

milione di abitanti. Negli anni antecedenti al 1915 le morti per detta infezione si mantennero più basse, anzi nel settennio (1908-14) esse furono rarissime. Soltanto nel triennio 1893-95, il quoziente di mortalità per *meningite epidemica* fu di 37 per ogni milione di abitanti.

Difterite e laringite crupale. — Anche la mortalità per *difterite e laringite crupale* presenta un grande miglioramento; essa è diminuita da 952 nel 1887 a 105, per ogni milione di abitanti, nella media del triennio 1912-14, a 118 nel 1915 e a 120 nel 1916.

Ipertosse. — Dal quoziente di 376 morti per *ipertosse* ogni milione di abitanti nel 1887, si discende a quello di 146 nel triennio 1912-14, di 157 nel 1915 e di 210 nel 1916.

Febbre puerperale. — Le morti per tale infezione sono venute notevolmente scemando dal 1887, nel quale anno esse diedero un quoziente di 85 ogni milione di abitanti, mentre nel triennio 1912-14 si ridussero al quoziente di 28, nel 1915 a 24 e nel 1916 a 23.

Febbri da malaria e cachessia palustre. — Un forte miglioramento si è avuto nei morti per *malaria*, durante il periodo d'osservazione dal 1887 al 1916: ed infatti, mentre nel 1887 si verificarono nel Regno 21.033 decessi per *malaria*, pari a 710 ogni milione di abitanti, nella media del triennio 1912-14 morirono per detto morbo soltanto 2.623 persone, ciò che dà un quoziente di 74 ogni milione di abitanti. Il quoziente di mortalità per *malaria* nel 1915 e nel 1916 è stato peraltro alquanto più alto di quello verificatosi nel suddetto triennio (106 nel 1915 e 138 nel 1916 per ogni milione di abitanti), ma se si pensa alle condizioni eccezionali create dalla guerra, si può affermare che il servizio di profilassi della *malaria*, come delle altre malattie infettive, sia stato molto accurato, riuscendo a infrenare l'inevitabile aumento delle medesime.

Colera asiatico. — Il *colera asiatico*, che nel 1887 fu causa di morte per 8.150 individui, scomparve negli anni corsi dal 1888 al 1892; tornò poi a far sentire i suoi effetti nell'anno 1893, con 3.040 decessi, e cessò dopo il gennaio 1894, nel quale mese fu causa di 20 morti soltanto. Tale morbo, ricomparso in Italia nel 1910 causando la morte di 805 persone, nel 1911 si diffuse in 45 provincie del Regno, facendovi 6.145 vittime (177 per ogni milione di abitanti) e cessò nel 1912, nel quale anno fu causa di 41 morti nella provincia di Cagliari. Nel 1915 il *colera asiatico* tornò nuovamente nel Veneto, nell'Emilia e nella provincia di Sassari, causando, in complesso, la morte di 235 persone, e nel 1916 fu causa di 11 morti soltanto.

Influenza. — E' per altro aumentata la mortalità per *influenza*. Questa malattia che, nei tre anni 1887-1889, aveva determinato soltanto 18 morti per ogni milione di abitanti, nel 1890 gravò su la mortalità per 11.771 casi (389 per un milione di abitanti); fu gravissima nel 1892 (20.039 morti, cioè 653 ogni milione di abitanti) e sempre grave nel 1894 (14.668 morti, cioè 472 ogni milione di abitanti). Fra il 1895 e il 1899 la mortalità per *influenza* scemò grandemente, ma nel 1900 si ebbe una nuova recrudescenza con 17.306 morti, vale a dire 535 ogni milione di abitanti, che è il quoziente più alto, dopo quello dell'anno 1892; nell'anno 1901 essa discese al

quoziente di 125, nel 1902 a quello di 117; tornò ad aggravarsi nel 1903, dando un quoziente di 217 morti ogni milione di abitanti, per discendere nuovamente a quello di 115 nell'anno 1904 e risalire a 207 nel 1905 ed a 240 nel 1907. Nel 1908 il quoziente fu di 132, nel 1909 di 168, nel 1910 di 81, nel 1911 di 163, nel 1912 di 90, nel 1913 di 121, nel 1914 di 94, nel 1915 di 115 e nel 1916 di 162.

Sifilide. — La mortalità per *sifilide* aumentò di anno in anno dal 1887 al 1893; si mantenne stazionaria negli anni dal 1894 al 1899 e diminuì sensibilmente negli anni susseguenti, almeno per quanto concerne la mortalità infantile, giacchè quella che si verifica tra gli adulti sfugge in gran parte ad una esatta rilevazione. Negli anni di guerra, il quoziente di mortalità per *sifilide* si mantenne eguale a quello verificatosi nel triennio 1912-14.

Rabbia. — I morti per *rabbia*, che avevano superato il centinaio in ciascuno degli anni 1887, 1888 e 1889, ed erano scesi fino a 53 nel 1895 ed a 45 nel 1904, furono 47 nel 1905, 60 nel 1906, 56 nel 1907, 71 nel 1908, 50 nel 1909, 65 nel 1910, 52 nel 1911, 58 nel 1912, 49 nel 1913, 52 nel 1914, 60 nel 1915 e 81 nel 1916. La serie di queste cifre, quantunque irregolare nel suo andamento, accenna ad una diminuzione. Tale fatto può dipendere dall'efficacia dei mezzi adoperati per impedire che si sviluppi l'infezione (sistema Pasteur), o da una più accurata vigilanza esercitata dalle Amministrazioni municipali sui cani vaganti, oppure dalla circostanza che la *rabbia*, del pari che altre malattie infettive, può presentare da un anno all'altro forti oscillazioni nel suo grado di frequenza.

Pustola maligna. — Variò in modo irregolare, ma con tendenza a diminuire, la mortalità per *carbonchio* e *pustola maligna* (da 726 morti nel 1887 a 220 nel 1916, in cifre assolute).

Lebbra. — La *lebbra* causò, in cifre assolute, 22 morti nel 1887 e 14 nel 1916.

Tubercolosi (in tutte le sue varie forme e sedi) (a). — La mortalità per il complesso delle *malattie tubercolari*, durante il periodo di osservazione, accenna a una diminuzione abbastanza sensibile. Infatti, nel triennio 1887-1889, si ebbero in media 2.128 morti per ogni milione di abitanti, per le varie manifestazioni di *tubercolosi*; invece nel triennio 1912-1914 la proporzione fu solamente di 1.477, nell'anno 1915 di 1.579 e nel 1916 di 1667 morti (b). Come si scorge, il quoziente di mortalità per *tubercolosi* negli ultimi due anni è stato più grande di quello verificatosi nei tre anni precedenti, e ciò si deve attribuire all'influenza della guerra, la quale ha determinato indubbiamente un aggravamento delle condizioni sanitarie del nostro Paese, rispetto a questa malattia. Tenendo divisi i casi di morte, secondo le localizzazioni della *tubercolosi*, si hanno, per gli anni dal 1887 al 1916, le cifre seguenti :

(a) Veggasi: Notizie statistiche sulla « *Mortalità per tubercolosi* » negli anni dal 1887 al 1914, con confronti internazionali. — Roma, Tip. Cecchini, 1918.

(b) Nel formare i valori medii si sono compresi fra i morti per *tubercolosi*, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

**Morti per tubercolosi (in tutte le sue varie forme e sedi) nel Regno,
negli anni dal 1887 al 1916.**

PROSPETTO N. 4

MALATTIE tubercolari	TRIENNI					ANNI														
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916
	(Media annuale)																			

Per ogni 1,000,000 di abitanti.

Tubercolosi disseminata	307	290	290	244	97	81	112	111	180	295	184	170	164	148	158	125	134	125	130	146
Tubercolosi polmonare, tisi	1070	1028	999	997	1141	1012	1013	1075	1035	1022	1068	1060	1071	1029	1061	949	928	928	999	1035
Scrofola disseminata e lupus	103	86	67	58	45	37	38	35	37	35	33	28	29	25	28	18	21	20	23	23
Meningite tubercolare e idrocefalo acquisito	187	189	175	146	181	169	167	166	171	170	175	177	176	172	194	162	170	157	179	206
Tabe mesenterica e tubercolosi intestinale	422	361	335	302	268	240	221	221	219	186	175	163	167	163	201	159	159	141	164	172
Artriti e sinoviti fungose, tubercolosi delle ossa e morbo di Pott	(a) 39	(a) 38	(a) 43	62	63	64	66	66	75	72	75	75	77	73	81	76	81	78	84	85
TOTALE . . .	2128	1995	1909	1809	1795	1603	1617	1674	1717	1690	1710	1673	1684	1610	1723	1489	1493	1449	1579	1667

La diminuzione è stata più notevole nelle morti per *scrofola*, *tabe mesenterica* e *tubercolosi intestinale* che non in quelle per *tubercolosi polmonare* o *disseminata in più organi*, prese complessivamente.

Il numero dei morti per *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto n. 4, non essendovi compresi quei casi che, pur avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *diarrea*, di *bronchite cronica*, di *meningite*, o di *polmonite cronica*, senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari. Ma ove si consideri che i morti di *polmonite cronica*, per ogni milione di abitanti, erano stati dichiarati in numero di 227 nel 1887, di 180 nel 1888, e sono venuti gradatamente diminuendo negli anni susseguenti fino a 22, in media, nel triennio 1914-1916; che le dichiarazioni di morte per *bronchite cronica* non sono aumentate dal 1899 in poi (dal quale anno si cominciò a tenerle distinte da quelle per *bronchite capillare acuta*); e che il numero dei morti per *meningite acuta* e per *diarrea* presenta un sensibile miglioramento dal 1887 al 1916, si può legittimamente ritenere che la diminuzione riscontrata nel numero dei morti per *tubercolosi* sia effettiva e non dipenda dall'aver i medici, negli ultimi anni di osservazione, celata più spesso la diagnosi di tale malattia, sostituendovi dichiarazioni di morte per *polmonite cronica* o per *bronchite* o per *meningite semplice*.

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per malattie delle ossa in genere.

Malattie di gravidanza, parto e puerperio. — Se si paragona il numero delle madri morte per malattie di *gravidanza, parto e puerperio* (compresa la *febbre puerperale*) ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale dei parti avvenuti nel Regno, si trova che la mortalità per queste cause è venuta notevolmente scemando dal 1887 in poi.

Mortalità nel Regno delle gestanti e dei neonati in dipendenza del parto, durante gli anni dal 1887 al 1916

PROSPETTO N. 5.

A N N I	NUMERO dei parti semplici e multipli (a)	NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio	NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	OGNI 1000 parti morirono	
				gestanti	neonati
1887-89	1 169 631	6 643	3 220	5,7	2,8
1890-92	1 138 810	4 079	2 160	3,6	1,9
1893-95	1 139 714	3 815	1 986	3,3	1,7
1896-98	1 122 220	3 400	1 105	3,0	1,0
1899	1 121 084	3 572	1 031	3,2	0,9
1900	1 100 055	3 034	1 007	2,8	0,9
1901	1 090 907	2 767	848	2,5	0,8
1902	1 127 901	2 807	864	2,5	0,8
1903	1 075 851	2 771	679	2,6	0,6
1904	1 120 856	2 981	811	2,7	0,7
1905	1 120 631	3 198	976	2,9	0,9
1906	1 105 899	2 791	711	2,5	0,6
1907	1 097 223	3 074	759	2,8	0,7
1908	1 176 201	3 315	833	2,8	0,7
1909	1 152 735	3 127	734	2,7	0,6
1910	1 181 041	2 786	799	2,4	0,7
1911	1 128 057	2 612	731	2,3	0,6
1912	1 167 817	2 743	727	2,3	0,6
1913	1 155 908	2 811	625	2,4	0,5
1914	1 148 238	2 696	717	2,3	0,6
1915	1 143 279	2 477	661	2,2	0,6
1916	908 927	2 351	496	2,6	0,5

Pellagra. — La mortalità per *pellagra* variò in modo irregolare durante il periodo dal 1887 al 1900, ma dopo tale anno essa incominciò a diminuire notevolmente, tantochè nella media del triennio 1912-1914 si ebbero soltanto 26 morti per *pellagra*, ogni milione di abitanti, e tanto nell'anno 1915, quanto nel 1916 se ne ebbero 22, contro 115 registrati nel triennio 1887-89.

(a) Nel numero dei parti sono compresi anche quelli di nati morti.

(b) Medie annuali.

Diabete. — I morti per *diabete* furono, in cifre assolute, 490 nel 1887, 559 nel 1888 e 546 nel 1889, ed aumentarono fino a 1833 nel 1914, a 1942 nel 1915 e a 1827 nel 1916.

Scorbuto. — Si nota una diminuzione nel numero dei morti per *scorbuto*; da 532 nel 1887 a 123 nel 1916, in cifre assolute.

Gotta. — La mortalità per *gotta* è rimasta stazionaria durante il periodo d'osservazione dal 1887 al 1916 (231 morti nel 1887 e 266 nel 1916, in cifre assolute).

Atrofia congenita, immaturità. — La mortalità dei bambini per *atrofia congenita* si mantenne quasi invariata in ciascun anno del periodo 1887-95 (1.777 per ogni milione di abitanti nella media annuale di detto periodo), ma diminuì notevolmente negli anni susseguenti, fino a 994 nella media del triennio 1912-14, a 943 nel 1915 e a 716 nel 1916.

Marasmo senile. — Col prolungarsi della vita media, è venuto crescendo il numero dei morti per *marasmo senile*, i quali dal quoziente di 885 nel 1887, di 1.039 nel 1888 e di 963 nel 1889, per ogni milione di abitanti, salirono a 1.327 nel 1914, a 1.460 nel 1915 e a 1432 nel 1916.

Tumori maligni. — La mortalità per *tumori maligni* crebbe d'anno in anno (da 427 morti ogni milione d'abitanti, come media del triennio 1887-89, a 661 nella media del triennio 1912-14, a 668 nel 1915 e a 664 nel 1916).

Se si dividono i morti per *tumori maligni* secondo la sede del tumore, si ottengono i dati seguenti:

Morti nel Regno causate da tumori maligni localizzati o disseminati in più organi, negli anni dal 1887 al 1916

PROSPETTO N. 6.

SEDE	TRIENNI (media annuale)							ANNI									
	1887-89	1890-92	1893-95	1896-98	1899-1901	1902-04	1905-07	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	
dei tumori maligni																	
Tumori:	(Cifre assolute)																
disseminati in più organi o di sede non specificata	2 787	2 993	3 489	3 553	3 718	3 807	4 319	5 378	4 578	4 472	4 725	5 097	4 618	4 687	4 852	4 900	
dell'utero, vagina, ovaia	2 403	2 375	2 322	2 469	2 548	2 555	2 679	2 718	2 715	2 805	2 620	2 500	2 691	2 732	2 697	2 743	
delle mammelle	1 013	862	874	908	910	918	992	1 010	1 042	1 049	1 050	1 002	1 084	1 088	1 051	1 060	
della vescica, uretra, prostata, pene, testicoli, rene	308	285	259	306	304	355	422	430	466	485	512	501	524	655	576	592	
della bocca, labbra, lingua, palato, fauci, tirfide, laringe, trachea	437	415	555	858	1 100	1 148	954	981	957	1 067	1 070	949	1 030	1 136	1 129	1 281	
dello stomaco, esofago	3 341	3 739	4 021	4 510	4 697	5 154	6 154	6 806	6 855	6 876	7 112	6 943	7 471	7 470	7 798	7 522	
del fegato, milza, pancreas, intestino, peritoneo	2 122	2 235	2 380	2 998	3 317	3 627	4 196	3 723	4 419	4 944	5 229	4 942	5 296	5 274	5 239	5 354	
delle ossa ed articolazioni	254	79	81	202	211	437	341	286	261	234	239	251	330	282	303	265	
dei centri nervosi ed organi dei sensi	61	44	73	123	93	88	166	493	578	623	614	476	592	620	614	573	
TOTALE	12 726	13 027	14 054	15 927	16 898	18 069	20 223	21 828	21 871	22 555	23 172	22 641	23 639	23 944	24 259	24 323	

Una leggiera diminuzione si è osservata dal 1887 al 1916 nel numero dei morti per **epilessia**, per **epatite** e per **reumatismo cronico**; il contrario si è verificato per le malattie delle **arterie**, per i **vizi del cuore** e per le malattie dei **reni**. A determinare questi ultimi aumenti ha contribuito anche il fatto che i medici ora, meno spesso che in passato, rilasciano certificati di cause di morte colle dichiarazioni generiche di *asma* o *idrope ascite*.

Eclampsia infantile. — Sono scemate le dichiarazioni di morte per *eclampsia infantile*; da 805 per un milione di abitanti nel 1887 a 419 nel 1916. E' noto che le convulsioni nei bambini non sono molte volte che l'accidente terminale di altre malattie, specialmente di *meningiti* e di disturbi dell'apparato *digerente*; e perciò la diminuzione avvertita può dipendere in parte dall'aver i medici dato una maggiore importanza alla malattia primaria che non all'accidente terminale.

Bronchite acuta e cronica. — Un miglioramento sensibile si è osservato dal 1887 al 1916 nella mortalità per *bronchite acuta e cronica*, la quale diede un quoziente medio di 2416, ogni milione di abitanti, negli anni 1887-92; si mantenne intorno a questo numero fino all'anno 1895 e diminuì notevolmente negli anni seguenti, tantochè nel triennio 1912-1914 scese a 1.335. Negli anni 1915 e 1916 si è osservato un leggiero aumento, rispetto al triennio precedente, nel quoziente di mortalità per *bronchite* (1422 nel 1915 e 1482 nel 1916, per ogni milione di abitanti).

A partire dall'anno 1899 i morti per *bronchite* sono stati divisi in due gruppi, secondochè si trattava di una infiammazione acuta (per lo più di *bronchite capillare infantile*) oppure d'infiammazione cronica. Quest'ultima, che spesso si collega con neoformazioni tubercolari, è stata, nel 1916, dichiarata come causa di morte di 225 individui per ogni milione di abitanti e si è mantenuta quasi invariata nel periodo d'osservazione.

Polmonite crupale e bronco polmonite acuta. — Tali cause aggravarono la mortalità di 2.350 casi, in media, ogni milione di abitanti negli anni 1887-92, e più ancora nel periodo 1893-96 (2.514 ogni milione di abitanti); negli anni seguenti il quoziente di mortalità per queste cause scemò sensibilmente fino a 2.111 nel 1904, poi riprese a salire a 2.201 nel 1905, a 2.210 nel 1906 e a 2.403 nel 1907. Nel 1908 si ridusse a 2.205, nel 1909 risalì a 2.380 e nel 1910 si ebbe il quoziente di 2.038, ogni milione di abitanti, che è il più basso nel periodo fin qui considerato. Nel 1911 la mortalità per *polmonite* tornò nuovamente ad aggravarsi, dando un quoziente di 2.390 ogni milione di abitanti, ridiscese nel triennio successivo (a 2.051 nel 1912, a 2.064 nel 1913, a 1.994 nel 1914) e risalì a 2.140 nel 1915 e a 2.334 nel 1916. Anche per questa malattia si è fatta, a partire dal 1899, la distinzione dei morti per *polmonite crupale* da quelli per *bronco polmonite acuta*. Nell'anno 1916, i primi risultarono nella proporzione di 984 e i secondi di 1.350 per ogni milione di abitanti.

Malattie della pleura. — I morti per *malattie della pleura* discesero da 159 ogni milione di abitanti nel 1887 a 79 nella media del triennio 1912-14; e negli anni 1915 e 1916 il quoziente di mortalità per detta causa fu, rispettivamente, di 82 e 90 ogni milione di abitanti.

Diarrea, enterite, colera indigeno, colite, proctite ed ulcera intestinale. — La mortalità per tali cause presenta, nel periodo di tempo da noi considerato, un andamento irregolare. Nell'anno 1887 essa diede un quoziente di 3.147 morti ogni

milione di abitanti, attorno al quale si aggirò sino al 1890; negli anni susseguenti si aggravò, tantochè nel 1895 il quoziente salì a 3.650 (il più alto del periodo), nel 1897 scese a 3.141, per risalire subito nell'anno appresso a 3.511 e scendere di nuovo nel 1899 a 2.955. Nel 1900 la mortalità per le dette cause tornò ad aggravarsi fortemente, dando un altro massimo quoziente di 3.560 ogni milione di abitanti; dal 1901 al 1909 si aggirò tra un massimo di 3.476 ed un minimo di 2.807 e nel quinquennio 1910-14 presentò i quozienti più bassi, specialmente nei due anni 1912 e 1914, nel primo dei quali le morti per malattie del *tubo intestinale* si ridussero al quoziente di 1.700 per ogni milione di abitanti, e cioè a meno della metà di quelli osservati negli anni 1895, 1898 e 1900, e nel secondo furono 2.010. Nel 1915 e nel 1916, invece, le morti per dette cause presentarono un peggioramento rispetto al triennio precedente, dando un quoziente di 2.443 ogni milione di abitanti nel 1915 e di 2.471 nel 1916.

Elmintiasi. — I morti per *elmintiasi* sono stati 5.104 nel 1887, in cifre assolute, e sono diminuiti gradatamente negli anni susseguenti fino a 1.354 nel 1916. La diminuzione soltanto in parte è a ritenersi un fatto reale dipendente dall'essere in molti Comuni migliorata la qualità dell'acqua potabile; perchè in parte devesi attribuire ad una maggiore accuratezza dei medici nel fare la diagnosi delle malattie. Un tempo, i medici attribuivano parecchi casi di malattie dell'apparato *digerente* nei bambini alla presenza, effettiva o supposta, di vermi nell'intestino; posteriormente invece si è assegnata una importanza secondaria alla presenza dei vermi nell'intestino, considerando come causa principale della morte i processi di fermentazione sviluppatisi nel *canale digerente*. Probabilmente dipende da questo stesso motivo la grande diminuzione che si è verificata nel numero dei morti per *dissenteria*, i quali da 6.279 nel 1887, in cifre assolute, sono venuti rapidamente scemando, tanto che se ne osservarono pochissimi casi negli anni dal 1906 in poi, o nessuno, come nel 1915. Per i primi anni figuravano sotto questa rubrica molti casi di morte per *diarrea*, mentre negli ultimi vi furono iscritti i soli casi di *dissenteria cruenta*.

Alcoolismo cronico. — L'*alcoolismo cronico* nel 1887 causò 434 morti, in cifre assolute. Questo numero si mantenne pressochè invariato sino al 1891, ma nell'anno successivo salì improvvisamente a 625 e durante tutto il triennio 1892-94 si mantenne ugualmente alto, per ritornare a 473 nel 1895. Dal 1896 al 1900 il numero dei morti oscillò fra 504 e 557, scemò nei quattro anni susseguenti, ma poi risali a 837 nel 1905, a 702 nel 1906, a 663 nel 1907, a 901 nel 1908 e a 1.408 nel 1909. Dopo l'anno 1909 le morti per *alcoolismo cronico* scemarono notevolmente; esse furono 975 nel 1910, 740 nel 1911 e 615 nel 1912, mentre risalirono a 742 nel 1913, a 767 nel 1914 e a 800 nel 1915. Nel 1916 le morti per *alcoolismo cronico* tornarono a scendere a 541 e in quest'ultimo anno si verificarono, inoltre, 39 casi di morte per causa violenta accidentale in individui ubbriachi.

Delle morti *violente*, siano esse dovute a infortunio accidentale, a omicidio o a suicidio, ci occuperemo in modo particolare nel capo III della presente Introduzione.

§ 3. — Influenza delle stagioni sulla mortalità.

Nella tavola II le morti determinate da cause più frequenti o, più caratteristiche sono state classificate secondo i trimestri in cui sono avvenute.

Considerata nel suo complesso, la mortalità massima nel 1916 si verificò nel 1° trimestre, la minima nel 4°. Furono particolarmente frequenti nei mesi invernali le morti per malattie *fetali e vizi congeniti, atrofia congenita e immaturità, meningite cerebro spinale epidemica, ipertosse, influenza, difterite e laringite crupale, risipola, febbre puerperale*, le altre malattie di *gravidanza, parto e puerperio, marasmo senile, bronchite acuta e cronica, polmonite crupale e bronco polmonite acuta, pleurite*, malattie del *cuore*, malattie delle *arterie, eclampsia infantile, apoplessia cerebrale, encefalite, meningite semplice, reumatismo articolare acuto*, malattie dei *reni, alcoolismo cronico e diabete*. In primavera (2° trimestre) ebbero il sopravvento le morti per *morbillo, sifilide, tubercolosi*, in tutte le sue varie forme e sedi, e per *suicidio*. In estate (3° trimestre) le morti per *anemia, febbre tifoidea, leucemia, gastrite, gastro enterite, appendicite e peritonite, febbri da malaria e cachessia palustre, tetano, pustola maligna, tumori maligni, cause violente accidentali* e per *omicidio*. In autunno (4° trimestre) segnarono i loro massimi le morti per *scarlattina, epatite e pellagra*.

§ 4. — Cause di morte predominanti in ciascun sesso.

Morirono nel 1916, in tutto il Regno, 370,013-maschi e 351,834 femmine; nella ragione cioè di 105 maschi ogni 100 femmine. Nell'anno 1915 tale rapporto era stato pure di 105 e nel 1914 di 103.

Quantunque muoiano ogni anno più maschi che femmine, nondimeno parecchie malattie, comuni ai due sessi, sono maggiormente esiziali alle donne.

Infatti, nel 1916 morirono più femmine che maschi per *febbre tifoidea, ipertosse, influenza, tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi, *anemia e clorosi, marasmo senile, tumori maligni, bronchite cronica, vizi di cuore, peritonite, reumatismo cronico* e per *ustioni*.

Furono invece più frequenti nei maschi le morti di bambini nell'atto del *parto* e per *vizi congeniti*; le morti per *atrofia congenita e immaturità, per morbillo, scarlattina, risipola, meningite cerebro spinale epidemica, difterite e laringite crupale, febbri da malaria e cachessia palustre, sifilide, pustola maligna, rabbia, pellagra, gotta, diabete, meningite semplice cerebrale e spinale, mielite, encefalite, apoplessia e congestione cerebrale, rammollimento cerebrale, paralisi progressiva, epilessia, tetano, eclampsia infantile, bronchite acuta, pleurite, polmonite crupale, bronco polmonite acuta, polmonite cronica, malattie delle arterie, malattie dello stomaco, diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, epatite, ittero, volvolo, ernie intestinali e addominali, appendicite, malattie dei reni, malattie della vescica, calcoli renali e vescicali, malattie dell'uretra e prostata, flemmone e ascesso, sclerema, reumatismo articolare acuto, alcoolismo cronico* e le *morti violente per cause accidentali, per suicidio e per omicidio*.

Risultanze quasi analoghe presentano le statistiche degli anni 1887 e seguenti.

§ 5. — Cause di morte predominanti nelle diverse età (a).

Nelle tavole analitiche i morti sono stati divisi, secondo l'età, in 25 gruppi, e cioè: nel primo mese di vita; da 1 mese a 12 mesi; nel 2°, nel 3°, nel 4° e nel 5° anno di età, e poi per gruppi di cinque in cinque anni pel rimanente della serie. Ma nelle notizie che formano oggetto di questa Introduzione, la classificazione dei morti per età è riassunta in otto gruppi, e cioè: nel primo anno di età, da 1 a 4 anni, da 5 a 9, da 10 a 19, da 20 a 39, da 40 a 59, da 60 a 79 e da 80 anni in su.

Esaminando le proporzioni dei morti nel 1916, classificati per malattie, a 1000 morti per qualsiasi causa in ciascun gruppo d'età e sesso (prospetto n. 7), si nota quanto segue, avvertendo che, per ciascun gruppo di età, le cause di morte più frequenti, qui menzionate, sono disposte secondo l'ordine discendente dei quozienti di mortalità verificatisi nei maschi.

Nel gruppo dei bambini, nel primo anno di età, le cause più frequenti di morte, nel 1916, sono state la *diarrea infantile* e la *gastro enterite* (271 ogni 1000 morti nei maschi e 282 nelle femmine), l'*atrofia congenita* e l'*immaturità* (177 nei primi e 183 nelle seconde), la *bronchite acuta* (140 e 128), la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite erupale* (97 e 84), l'*eclampsia infantile* (67 e 64), l'*anemia* e *leucemia* (44 e 50), la *gastrite* (43 e 47), l'*ipertosse* (20 e 24), la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (18 in ambo i sessi), il *morbillo* (11 e 13) e la *meningite semplice cerebrale e spinale* (11 e 10).

Nel gruppo da 1 a 4 anni, tennero il primo posto, come nel gruppo precedente, le morti per *diarrea infantile* e *gastro enterite* (242 ogni 1000 morti nei maschi e 254 nelle femmine); vennero in seguito la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite erupale* (180 nei primi e 172 nelle seconde), la *bronchite acuta* (128 e 138), il *morbillo* (67 e 66), la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (51 e 49), l'*eclampsia infantile* (42 e 41), l'*ipertosse* (29 e 40), la *difterite* e la *laringite erupale* (27 e 21), le malattie dei reni (24 e 23), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (24 e 20), l'*anemia* e *leucemia* (22 e 24), le *morti violente per causa accidentale* (20 e 16), la *gastrite* (18 e 21) e la *scarlattina* (14 e 12).

Nel gruppo da 5 a 9 anni, predominarono le morti per *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi con 139 per ogni 1000 morti nei maschi e 149 nelle

(a) Avvertiamo che l'età dei morti è data in anni compiuti, quindi nel gruppo dei morti in età « fino a 1 anno » sono compresi i bambini dalla nascita fino al limite di 365 giorni; nel gruppo dei morti « di 1 anno » sono compresi i bambini che contavano da 1 anno e 1 giorno fino a 1 anno e 365 giorni di età; e così per i gruppi dei morti di 2, di 3 e di 4 anni. Nel gruppo « da 5 a 9 anni » sono compresi i morti che avevano già compiuti i 5 anni, ed erano perciò entrati nel sesto anno di età, fino a quelli che avevano 9 anni e 365 giorni. Con lo stesso criterio sono formati tutti gli altri gruppi di età.

Questo stesso metodo di aggruppamento dei morti secondo l'età fu sempre tenuto nelle statistiche precedenti; solo che per indicare i diversi gruppi si usavano, nelle statistiche a tutto l'anno 1911, le seguenti espressioni: *Non superiore a 1 anno; oltre 1 anno a 2 compiuti; oltre 2 anni a 3 compiuti;.....; oltre 5 anni a 10 compiuti; oltre 10 anni a 15 compiuti*, e così di seguito per le età successive; ma siccome la ripetizione di uno stesso anno di età in due colonne successive poteva far sorgere qualche equivoco, così a cominciare dall'anno 1912, per maggior precisione e chiarezza, si adottarono le seguenti diciture: *fino a 1 anno; di 1 anno; di 2 anni; di 3 anni; di 4 anni; da 5 a 9 anni; da 10 a 14 anni, ecc.*

femmine, la *diarrea* e l'*enterite* con 125 nei primi e 134 nelle seconde, la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* con 123 e 125, la *meningite semplice cerebrale e spinale* con 53 e 51, le *morti violente per causa accidentale* con 49 e 37, le malattie dei *reni* con 44 e 39, la *bronchite acuta* con 44 e 52, la *febbre tifoidea* con 44 e 48, il *morbillo* con 39 e 44, la *difterite* e *laringite crupale* con 36 e 34, la *scarlattina* con 30 e 27 e le *febbri da malaria* e la *cachessia patustre* con 29 e 25.

Nel gruppo di età da 10 a 19 anni, più di un quarto delle morti nei maschi e più di un terzo nelle femmine derivarono dalla *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (254 su 1000 morti nei maschi e 388 nelle femmine). Vennero appresso, a grande distanza, la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* (97 nei maschi e 84 nelle femmine), la *febbre tifoidea* (89 e 104), le *morti violente per causa accidentale* (85 e 19), la *diarrea* e la *gastro enterite* (71 e 63), le malattie del cuore (48 e 51), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (36 e 34), le malattie dei *reni* (28 e 27) e la *meningite cerebro spinale epidemica* (25 e 15).

Nelle morti avvenute nei maschi da 20 a 39 anni, poco meno di un terzo era dovuto alla *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (331 ogni 1000 maschi morti), mentre nelle femmine il quoziente di mortalità per *tuberculosis* rappresenta assai più di un terzo delle morti verificatesi in tale gruppo di età, e cioè 396 ogni 1000. Seguirono, a grande distanza, le morti per *polmonite crupale e bronco polmonite acuta* (90 nei maschi e 86 nelle femmine), la *febbre tifoidea* (62 e 61), le malattie del cuore (45 e 69), le *morti violente per causa accidentale* (44 e 10), l'*enterite* e la *diarrea* (34 e 37), le malattie dei *reni* (24 e 38) e i *suicidi* (19 e 10). Nelle femmine di questo gruppo di età, le malattie di *gravidanza, parto e puerperio*, compresa la *febbre puerperale*, erano rappresentate dal quoziente di 56 su 1000 morte, e nei maschi, pure di questo gruppo, 113 su 1000 erano morti per ferite riportate in guerra (a).

Nel gruppo da 40 a 59 anni occuparono il primo posto la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta*, che, insieme, cagionarono 150 morti ogni 1000 nei maschi e 123 nelle femmine. A queste tennero dietro la *tuberculosis* in tutte le sue varie forme e sedi (129 in ambo i sessi), le malattie del cuore, le quali diedero nelle femmine un quoziente di mortalità molto più alto di quello dei maschi (119 ogni 1000 morti nei maschi, contro 167 nelle femmine), i *tumori maligni*, i quali diedero nei maschi un quoziente assai più basso (85 ogni 1000 morti) di quello verificatosi nelle femmine (138), l'*apoplessia* e *congestione cerebrale* (79 in ambo i sessi), le *morti violente per causa accidentale* (39 e 9), le malattie dei *reni* (38 e 47), l'*enterite* e la *diarrea* (37 e 43), l'*epatite* (35 e 15) e la *bronchite acuta e cronica* (27 e 29).

Nel gruppo da 60 a 79 anni, il maggior numero dei morti fu dato dalle malattie del cuore, le quali, anche in questo gruppo d'età, diedero nelle femmine un quoziente di mortalità assai più grande di quello dei maschi (183 ogni 1000 morti nei maschi, contro 239 nelle femmine); seguirono l'*apoplessia* e *congestione cerebrale* (154 e 137), la *polmonite crupale* e la *bronco polmonite acuta* (132 e 124),

(a) Veggasi, per il valore da attribuirsi a questa proporzione, quanto si è detto a pagina VIII.

il *marasma senile* (112 e 145), i *tumori maligni* (66 e 71), la *bronchite acuta e cronica* (46 e 55), le *malattie delle arterie* (44 e 28), l'*enterite* e la *gastro enterite* (41 e 42) e le *malattie dei reni* (31 e 26). Le morti per *tubercolosi*, le quali, come abbiamo già visto, nei gruppi precedenti occupano quasi sempre il primo posto, in questo, invece, sono rappresentate da un basso quoziente, sia nei maschi che nelle femmine, e cioè da 19 su 1000 morti nei primi e da 17 nelle seconde.

Finalmente nel gruppo da 80 anni in su, poco meno della metà delle morti furono causate dal *marasma senile* (452 su 1000 morti nei maschi e 490 nelle femmine). Dopo questa, ma a grandissima distanza, le malattie che causarono una mortalità più rilevante furono quelle del *cuore*, le quali, come nei gruppi precedenti, diedero nelle femmine un quoziente più grande di quello dei maschi (120 ogni 1000 morti nei maschi e 144 nelle femmine); l'*apoplezia* e *congestione cerebrale* (112 e 92), la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (74 e 70), la *bronchite acuta e cronica* (50 e 51), le *malattie delle arterie* (46 e 34), l'*enterite* e la *diarrea* (32 e 28), i *tumori maligni* (16 e 21) e le *malattie dei reni* (14 e 10).

Prescindendo da ogni classificazione per età, considerando cioè la mortalità generale, le malattie che nel 1916 riuscirono più letali furono anzitutto la *diarrea*, l'*enterite* e le altre malattie del *tubo intestinale*, che, in complesso, cagionarono 125 morti ogni 1000 nei maschi e 127 nelle femmine; e poi, in ordine decrescente, la *bronco polmonite acuta* e la *polmonite crupale* (124 nei maschi e 114 nelle femmine), le malattie del *cuore*, le quali diedero nei maschi un quoziente di mortalità assai più basso di quello delle femmine (79 nei primi e 105 nelle seconde), la *tubercolosi* in tutte le sue varie forme e sedi (79 e 91), la *bronchite acuta e cronica* (75 e 77), il *marasma senile* (65 e 82), l'*apoplezia* e *congestione cerebrale* (59 e 54), l'*immaturità* e l'*atrofia congenita* (38 e 35), i *tumori maligni* (30 e 38), le *malattie dei reni* (24 in ambo i sessi), le *morti violente per causa accidentale* (23 e 9), l'*eclampsia infantile* (22 e 21), le *malattie delle arterie* (18 e 12), l'*anemia* e *leucemia* (17 e 19), il *morbillo* (16 in ambo i sessi), le *malattie dello stomaco* (15 in ambo i sessi), la *febbre tifoidea* (15 e 16), la *meningite semplice cerebrale e spinale* (12 e 11) e l'*epatite* (10 e 5).

Risultanze non molto dissimili a quelle qui esposte, presentano le statistiche degli anni dal 1887 in poi.

Segue Morti nel Regno nell'anno 1916 classificati

B) Cifre proporzionali a 1000 morti del

Segue PROSPETTO N. 7

Table with columns: NUMERO dell'elenco nosologico, CAUSE DI MORTE, and NUMERO DEI (subdivided into age groups: Fino a 1 anno, da 1 a 4 anni, da 5 a 9 anni, da 10 a 19 anni). Rows list various diseases like Malattie fetali e vizi congeniti, Anemia, Leucemia, etc.

per età, sesso e principali cause di morte.

rispettivi gruppi di età, in ciascun sesso (a).

Table with columns: MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ (subdivided into age groups: da 20 a 39 anni, da 40 a 59 anni, da 60 a 79 anni, da 80 anni in su), TOTALE GENERALE (Maschi, Femmine, Totale), and NUMERO dell'elenco nosologico. Rows list various diseases and their mortality rates across age groups and sexes.

(a) Esclusi i morti per causa ignota o non dichiarata.

(b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche i individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli e dei bombardamenti di città costiere. (Veggasi la nota (a) nel prospetto delle cifre assolute).

rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli e dei bombardamenti di città costiere. (Veggasi la nota (a) nel prospetto delle cifre assolute).

§ 6. — **Influenza della legittimità dei nati sulla mortalità dei bambini.**

I bambini morti prima di aver compiuto cinque anni di età sono stati divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima, comprendendosi in questo secondo gruppo anche i bambini di stato civile ignoto, perchè trovati esposti nelle ruote o in luoghi pubblici. (Tavola VI, a pagina 78).

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel 1916 in età non superiore ad 1 anno a 1000 nati vivi nello stesso anno, si trova che, per 1000 nati legittimi, ne morirono nel primo mese dalla nascita 42 ed entro il primo anno d'età 162; e che per 1000 nati illegittimi ed esposti, ne morirono nel primo mese 100 ed entro il primo anno di età 270.

Confrontando tali quozienti con quelli dei due anni precedenti, si scorge che la mortalità infantile nei primi due anni di guerra, specialmente nel 1916, presenta un aumento rispetto a quella del 1914.

Mortalità nel Regno dei bambini durante il primo anno di età, senza distinzione di sesso.

(Cifre assolute dei morti nel 1916 e cifre proporzionali a 1000 nati vivi, negli anni 1914, 1915 e 1916).

PROSPETTO N. 8.

	NATI VIVI nel 1916	MORTI NEL 1916		MORTI PER 1000 NATI VIVI					
		Nel primo mese di vita	Da 1 mese a 12 mesi	Nel primo mese di vita			Da 1 mese a 12 mesi		
				1914	1915	1916	1914	1915	1916
Legittimi	844 742	35 804	100 881	44	45	42	82	98	120
Illegittimi ed esposti	36 884	3 674	6 272	96	93	100	131	138	170

Mortalità nel Regno dei bambini nei primi cinque anni di età distinti per sesso.

(Cifre assolute dei morti nel 1916 e proporzioni fra i due sessi su 100 morti nei primi cinque anni d'età, negli anni 1914, 1915 e 1916).

PROSPETTO N. 9.

		BAMBINI MORTI NEL REGNO NELL'ANNO 1916				PROPORZIONE fra i due sessi su 100 morti nei primi cinque anni di età		
		Nel primo mese di vita	Da 1 mese a 12 mesi	Da 1 anno a 4 anni	Totale dei bambini morti nei primi cinque anni di età	1914	1915	1916
Legittimi	Maschi	19 774	54 178	60 385	134 337	53	53	52
	Femmine	16 030	46 703	59 168	121 901	47	47	48
Illegittimi ed esposti	Maschi	1 902	3 070	1 574	6 546	51	49	50
	Femmine	1 772	3 202	1 598	6 572	49	51	50

La proporzione delle bambine illegittime morte nei primi cinque anni d'età, è maggiore di quella delle bambine legittime.

Il prospetto che segue indica, per le malattie più frequenti nell'infanzia, i quozienti specifici di mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi morti nel Regno durante il primo anno di età, confrontati a 1000 nati vivi, negli anni 1914, 1915 e 1916.

**Cause più frequenti delle morti nel Regno dei bambini nel primo anno di età,
durante gli anni 1914, 1915 e 1916.**

PROSPETTO N. 10.

CAUSE DI MORTE (a)	PER 1000 NATI VIVI morirono nel primo anno di età					
	Legittimi			Illegittimi ed esposti		
	1914	1915	1916	1914	1915	1916
Malattie fetali e vizi congeniti	1.8	1.8	1.7	2.6	2.2	2.4
Atrofia congenita, immaturità.	28.8	29.6	28.4	59.1	58.4	60.9
Anemia e leucemia	4.6	6.4	7.4	9.5	11.3	15.0
Malattie dello stomaco, atresia.	5.7	6.8	6.9	13.5	14.8	18.3
Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc.	31.3	39.0	44.6	56.1	56.9	69.8
Epatite	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Malattie dei reni	0.9	1.0	1.1	1.4	1.3	1.5
Peritonite e appendicite.	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
Morbillo	0.9	1.2	2.0	0.8	1.5	2.1
Scarlattina.	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
Risipola	0.8	0.7	0.7	1.1	0.9	1.2
Febbre tifoidea	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Meningite cerebro spinale epidemica	0.1	0.2
Ipertosse	1.7	2.5	3.6	1.7	2.4	2.9
Difterite e laringite crupale	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2
Febbri da malaria e cachessia palustre	0.3	0.5	0.8	0.3	0.4	0.5
Influenza	0.5	0.6	1.0	0.5	0.5	0.5
Sifilide	0.4	0.3	0.4	13.5	12.2	16.5
Bronchite acuta	15.9	17.7	22.3	19.0	18.8	20.5
Polmonite crupale	2.9	3.1	4.2	3.8	4.3	4.5
Bronco polmonite acuta	7.4	8.4	10.7	9.9	9.6	12.5
Malattie della pleura	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
Tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi	2.1	2.4	3.0	3.4	3.5	4.2
Malattie del cuore	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6
Malattie delle arterie.	0.1	0.1	0.1	0.1	..	0.2
Meningite semplice cerebrale e spinale	2.3	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7
Encefalite	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
Eclampsia infantile	8.8	9.7	10.8	12.2	11.2	13.1
Tumori maligni	0.1	0.1
Morte violenta { per causa accidentale	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3
{ per infanticidio	0.1	0.1	0.1
TOTALE DEI BAMBINI MORTI NEL PRIMO ANNO DI ETÀ PER QUALSIASI CAUSA	125.5	143.0	161.8	227.0	230.5	269.7

(a) In questo elenco di malattie non sono citate quelle che negli anni 1914-1916 non furono causa di morte nei bambini nel primo anno d'età o ne causarono un numero minimo.

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età è assai più grande di quella dei legittimi; ed infatti, nel 1916, per 1000 nati vivi ne morirono 270 dei primi e 162 dei secondi. La maggiore mortalità nell'infanzia di nascita illegittima è più specialmente dovuta all'*atrofia congenita* e all'*immaturità* (60,9 morti illegittimi nel 1916, contro 28,4 legittimi), alla *diarrea, enterite e colera indigeno* (69,8 dei primi e 44,6 dei secondi), alla *sifilide* (16,5 illegittimi, contro 0,4 legittimi), alle malattie dello *stomaco* (18,3 illegittimi, contro 6,9 legittimi) e all'*anemia* (15,0 dei primi e 7,4 dei secondi), venendo così comprovato che, se non pochi fra gli illegittimi nascono con una costituzione fisica debole o sono affetti da *lue congenita*, la grande mortalità che si verifica tra essi è dovuta, in buona parte, al difetto di cure e all'alimentazione disadatta, la quale cagiona gravi disturbi nell'apparato digerente.

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni di stato civile per susseguente matrimonio dei genitori, ed i bambini morti dopo essere stati legittimati sono segnati nella scheda necrologica come legittimi, mentre nella statistica dei nati sono stati iscritti fra gli illegittimi.

§ 7. — Influenza della professione sulla mortalità della popolazione maschile.

Nella tavola IV, a pagina 52, sono classificati i maschi morti nel 1916 in età da 15 anni in su, secondo la professione esercitata e secondo la causa della morte. Da quella tavola si può rilevare in quali professioni gli individui maschi adulti siano di preferenza colpiti da determinate malattie.

Convien per altro stare in guardia contro alcune cause di errore in cui si può incorrere nel giudicare del grado di salubrità delle varie professioni. Alcune professioni, come quelle di medico, avvocato, notaio, ingegnere, sacerdote, richiedono una carriera preparatoria assai lunga, e pertanto possono essere esercitate solo da individui che abbiano almeno 23 o 24 anni di età; e per queste professioni non vi possono essere morti di età più giovane, mentre si hanno molti morti fra 15 e 20 anni nelle professioni di agricoltore o di marinaio o di tipografo. D'altra parte, non pochi individui, coll'avanzare dell'età, cambiano professione, sia perchè sono migliorate le loro condizioni finanziarie, sia perchè, col diminuire delle loro forze, devono procurarsi una occupazione meno faticosa. Si troveranno perciò pochi morti in età avanzata fra i commessi di negozio, non perchè siano morti quasi tutti in età giovane, ma perchè parecchi col tempo sono diventati padroni e all'atto di morte sono registrati fra i negozianti; così pure parecchi facchini e marinai vecchi sono ridotti alla condizione di bracciante, e quasi tutti gli impiegati, i maestri, gli ufficiali dell'esercito e le guardie sono passati, nell'età avanzata, nella categoria dei pensionati.

Nei confronti istituiti nelle pagine seguenti, ci siamo limitati a indicare, per varie cause di morte più frequenti o più caratteristiche, durante l'anno 1916; le professioni dei defunti nelle quali si sono osservati i massimi di mortalità. Le proporzioni sono state calcolate in rapporto a 100 maschi morti per qualsiasi malattia, in età da 15 anni in su, che esercitavano la medesima professione. Accanto alle proporzioni dell'anno 1916 abbiamo indicate, a titolo di confronto, anche quelle degli anni 1914 e 1915.

Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su per varie cause più frequenti o più caratteristiche, classificati secondo le professioni. (Cifre proporzionali a 100 maschi morti per qualsiasi malattia in età da 15 anni in su della stessa categoria professionale, negli anni 1914, 1915 e 1916).

Morti per febbri da malaria e cachessia palustre.

	1914	1915	1916		1914	1915	1916
Pastori, mandriani . . .	1.4	1.8	2.2	Minatori, marmisti . . .	0.2	0.5	0.9
Ferrovieri e tramvieri . .	1.2	1.0	1.2	Agricoltori, boscaioli . .	0.4	0.6	0.8
Militari	0.1	0.5	1.0	Di qualsiasi professione .	0.3	0.4	0.6

Morti per febbre tifoidea.

	1914	1915	1916		1914	1915	1916
Militari	15.6	22.2	10.2	Orefici, orologiai	1.8	0.4	2.4
Studenti	5.3	5.9	6.6	Fabbri, meccanici, arrotini	1.8	1.9	2.3
Infermieri	3.4	4.5	2.9	Filatori, tessitori, tintori	0.7	1.3	2.2
Ferrovieri e tramvieri . .	2.4	2.6	2.5	Fabbricanti ed operai non specificati	1.7	1.7	2.1
Conciatori	0.7	1.7	2.4	Di qualsiasi professione .	1.2	2.0	1.9
Commessi di negozio . . .	2.6	2.5	2.4				

Morti per pellagra.

	1914	1915	1916		1914	1915	1916
Cestai	0.6	Agricoltori, boscaioli . . .	0.4	0.4	0.3
Fornaciai	0.2	0.5	Marinai, pescatori	0.3	0.1	0.3
Braccianti, manovali . . .	0.2	0.2	0.3	Di qualsiasi professione . .	0.2	0.2	0.2

Morti per apoplezia e congestione cerebrale.

	1914	1915	1916		1914	1915	1916
Sacerdoti, monaci	15.3	14.7	15.0	Tappezzieri e materassai	11.7	9.6	12.1
Proprietari e benestanti .	13.8	14.5	13.9	Cappellai, guantai	12.4	12.7	12.1
Trattori, vinai	11.6	9.9	13.9	Droghieri e farmacisti . .	15.2	13.9	11.9
Impiegati e pensionati civili	13.6	14.8	13.7	Fruttivendoli, venditori ambulanti	11.8	12.1	11.9
Maestri e professori . . .	12.0	12.8	13.7	Mendicanti e ricoverati . .	13.0	13.4	11.5
Domestici, portieri	12.0	13.2	13.0	Negozianti, albergatori . .	11.4	13.0	11.4
Medici, veterinari	10.7	11.0	13.0	Avvocati, procuratori, notai, uscieri giudiziari . .	11.5	13.0	11.3
Sarti	10.9	11.3	12.6	Marinai, pescatori	11.1	11.4	11.3
Lattai e casari	13.3	5.9	12.4	Di qualsiasi professione . .	11.0	10.8	10.1
Ingegneri, agrimensori . .	12.4	14.1	12.1				
Fornaciai	11.0	11.8	12.1				

CAPO III.

NOTIZIE PARTICOLARI SULLE MORTI VIOLENTE.

§ 1. — Morti per causa violenta ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1916.

Diamo nel seguente prospetto il numero dei morti nel Regno per causa violenta accidentale e quello dei morti per omicidio e suicidio, divisi per sesso, negli anni dal 1887 al 1916.

Classificazione delle morti violente nel Regno, durante gli anni dal 1887 al 1916.

PROSPETTO N. 11.

ANNI	NUMERO DEI MORTI								
	Per causa violenta accidentale			Per omicidio (a)			Per suicidio		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
1887.	11 180	7 518	3 662	1 547	1 358	189	1 449	1 182	267
1888.	11 356	7 664	3 692	1 637	1 433	204	1 590	1 280	310
1889.	10 278	6 868	3 410	1 458	1 273	185	1 463	1 144	319
1890.	9 784	6 557	3 227	1 317	1 128	189	1 652	1 356	296
1891.	10 310	6 869	3 441	1 407	1 205	202	1 697	1 381	316
1892.	10 146	6 831	3 315	1 558	1 358	200	1 723	1 392	331
1893.	10 008	6 586	3 422	1 648	1 421	224	1 737	1 432	305
1894.	9 891	6 484	3 407	1 429	1 238	191	1 732	1 381	351
1895.	8 894	5 833	3 061	1 487	1 276	211	1 874	1 507	367
1896.	9 628	6 283	3 345	1 456	1 256	200	2 000	1 594	406
1897.	10 304	6 741	3 563	1 540	1 327	213	1 895	1 505	390
1898.	10 066	6 700	3 366	1 706	1 457	249	2 059	1 629	430
1899.	10 229	6 743	3 486	1 417	1 211	206	2 019	1 591	425
1900.	10 184	6 780	3 404	1 306	1 103	203	2 040	1 615	425
1901.	10 771	7 003	3 763	1 262	1 071	191	2 014	1 597	417
1902.	10 493	6 867	3 626	1 332	1 133	199	2 010	1 580	430
1903.	10 322	6 804	3 518	1 305	1 106	199	1 922	1 537	385
1904.	11 044	7 480	3 564	1 312	1 135	177	2 153	1 705	451
1905.	13 146	8 720	4 426	1 444	1 241	203	2 379	1 869	510
1906.	10 820	7 192	3 628	1 317	1 134	183	2 319	1 755	564
1907.	11 442	7 829	3 613	1 283	1 091	192	2 445	1 821	624
1908.	(b) 89 170	46 794	42 376	1 528	1 296	232	2 693	2 079	614
1909.	12 943	8 843	4 100	1 375	1 133	242	2 969	2 275	694
1910.	11 005	7 544	3 462	1 153	942	216	2 880	2 190	690
1911.	11 088	7 543	3 545	1 090	889	201	2 754	1 939	815
1912.	10 979	7 592	3 387	1 113	901	212	2 986	2 161	825
1913.	11 244	7 712	3 532	1 215	1 028	187	3 107	2 276	831
1914.	11 456	7 990	3 466	1 360	1 132	228	3 185	2 294	891
1915.	(c) 42 178	23 106	19 072	1 290	1 050	240	3 092	2 287	805
1916.	11 581	8 323	3 258	(d) 947	748	199	2 531	1 799	732

(a) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e seguiti in duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente, i quali, ai termini dell'art. 49 del Codice penale, possono essere non punibili.

(b) Compresi i morti nel disastro del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1908, in numero di 77,283.

(c) Compresi i morti nel disastro del terremoto, avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 30,476 (maschi 14,917 e femmine 15,559).

(d) In questo numero sono compresi 5 omicidi (4 maschi e una femmina) avvenuti in conflitto con la forza pubblica, così ripartiti per Comuni: *Albenga* (Genova) un maschio, *Collarmele* (Aquila) un maschio, *Molochio* (Reggio di Calabria) un maschio e una femmina, e *Valguarnera Caropepe* (Caltanissetta) un maschio; e 45 di persone rivestite di pubblica autorità (sei carabinieri, ventitre soldati, due guardie di finanza, quattro guardie di città, una guardia daziaria e sette guardie campestri) delle quali s'ignora se e quante perirono nel compimento del proprio dovere. Nel 1916 non si ebbe alcuna dichiarazione di morte avvenuta in duello. Per gli anni anteriori, veggansi i volumi che si riferiscono agli anni dal 1905 al 1915.

§ 2. — Morti per causa violenta accidentale, negli anni 1914-1916, classificati per sesso, età, specie dell' infortunio e natura del veleno nei casi di avvelenamento.

Anche per l'anno 1916 non possiamo qui dare i quozienti su 100.000 abitanti delle morti per causa violenta accidentale in ciascun Compartimento, non conoscendosi la popolazione dei medesimi in detto anno, per le ragioni esposte nel paragrafo 3 del Cap. I. Nel complesso del Regno, per il quale si è potuto calcolare la popolazione, le morti accidentali diedero nel 1916 un quoziente di 31,62 ogni 100.000 abitanti, che è leggermente inferiore a quello dell'anno 1915 (32,21, escluse le vittime del terremoto) e a quello del 1914 (31,95).

Età e sesso. — Nel 1916 su 100 maschi morti per causa violenta accidentale, 30 erano in età da 0 a 14 anni, 49 fra 15 e 59 anni e 21 da 60 anni in su.

Nelle femmine, gli infortuni furono relativamente più numerosi nell'infanzia e nell'adolescenza (51 per cento in età da 0 a 14 anni) e nell'età avanzata (25 per cento da 60 anni in su), mentre le età fra 15 e 59 anni non diedero che un quoziente di 24 per cento.

Nel prospetto seguente sono indicate queste proporzioni per gli anni 1914-1916.

**Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1914-1916,
classificati per gruppi d'età e per sesso**

PROSPETTO N. 12.

ETÀ DEI DEFUNTI	CIFRE ASSOLUTE									CIFRE PROPORZIONALI a 100 morti accidentali					
	1914			1915			1916			1914		1915		1916	
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Fino a 1 anno.	302	161	141	406	213	193	246	134	112	2	4	2	4	2	3
Da 1 a 4 anni	2 465	1 336	1 129	2 578	1 462	1 116	2 216	1 240	976	17	33	16	24	15	30
» 5 » 14 »	1 530	975	555	1 856	1 115	741	1 669	1 080	589	12	16	13	16	13	18
» 15 » 29 »	1 620	1 377	243	2 150	1 644	506	1 876	1 566	310	17	7	19	11	20	10
» 30 » 39 »	899	742	157	1 134	885	249	893	753	140	9	4	10	6	9	4
» 40 » 49 »	928	777	151	1 109	823	286	889	773	116	10	4	9	6	10	4
» 50 » 59 »	1 043	841	202	1 188	869	319	1 004	796	208	11	6	10	7	10	6
» 60 » 69 »	1 186	883	303	1 474	1 010	464	1 113	827	286	11	9	11	10	10	9
Da 70 anni in su	1 461	881	580	1 624	905	719	1 364	849	515	11	17	10	16	11	16
Età ignota.	22	17	5	28 659 (a)	14 180	14 479 (b)	311	305 (c)	6
TOTALE	11 456	7 990	3 466	42 178	23 106	19 072	11 581	8 323	3 258	100	100	100	100	100	100

(a) Compresi 28,607 morti (maschi 14,139 e femmine 14,468) a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(b) Compresi 30,476 morti (maschi 14,917 e femmine 15,559) a causa del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915.

(c) Compresi 273 morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.

Cause. — Fra le cause più frequenti delle morti accidentali avvenute nei maschi durante l'anno 1916, si notarono le cadute, gli schiacciamenti, gli annegamenti e le ustioni. Nelle femmine prevalgono le ustioni (37 su 100) e vengono quindi le cadute, gli annegamenti e gli schiacciamenti.

Morti nel Regno per causa violenta accidentale, durante gli anni 1914-1916, classificate secondo la specie dell'infortunio e il sesso.

PROSPETTO N. 13.

CAUSE delle morti accidentali	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI											
	Cifre assolute						Cifre proporzionali a 100 per qualsiasi causa					
	1914		1915		1916		1914		1915 (l)		1916	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
In stato d'ubbrichezza . . .	{a} 109	{a} 6	{b} 46	{b} 6	{c} 36	{c} 3	1.36	0.17	0.56	0.17	0.43	0.09
Annegamento	1 264	466	1 472	542	1 309	477	15.82	13.44	17.98	15.43	15.73	14.64
Freddo	98	41	314	49	177	27	1.23	1.18	3.83	1.39	2.13	0.83
Insolazione	35	16	39	21	72	32	0.44	0.46	0.48	0.60	0.87	0.98
Fulminazione { naturale	126	52	157	65	119	36	1.58	1.50	1.92	1.85	1.43	1.10
	da apparecchi elettrici	81	3	93	6	109	2	1.01	0.09	1.14	0.17	1.31
Caduta	2 618	784 (d)	2 571	800	(e) 2 481	819	32.77	22.62	31.40	22.77	29.81	25.14
Lesione causata da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	321	51	303	55	(f) 620	62	4.02	1.47	3.70	1.57	7.45	1.90
Ferita da taglio.	32	5	31	6	27	6	0.40	0.14	0.38	0.17	0.32	0.18
Lesione da macchine agrarie e industriali	70	9	87	11	99	7	0.88	0.26	1.06	0.31	1.19	0.21
Schiacciamento	(g) 1 535	(g) 323	(h) 16 394	(h) 15 919	(i) 1 704	(i) 317	19.21	9.32	(l) 18.04	(l) 10.25	20.47	9.73
Violenza d'animali	177	19	161	29	151	24	2.22	0.55	1.97	0.83	1.81	0.74
Ustione	1 108	1 479	1 020	1 352	1 002	1 220	13.87	42.67	12.46	38.49	12.04	37.45
Soffocamento	84	50	90	50	77	52	1.05	1.44	1.10	1.42	0.93	1.60
Asfissia	137	53	185	53	215	82	1.71	1.53	2.26	1.51	2.58	2.52
Avvelenamento acuto	121	90	93	91	85	77	1.51	2.60	1.14	2.50	1.02	2.36
Morso di vipera o di altri animali velenosi	8	4	13	5	14	4	0.10	0.12	0.16	0.14	0.17	0.12
Diverse o non determinate	66	15	37	12	26	11	0.82	0.44	0.42	0.34	0.31	0.35
TOTALE	7 990	3 486	23 106	19 072	8 323	3 258	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Dei 115 casi di morte in istato d'ubbrichezza nell'anno 1914, 60 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 55 per infortunio causato dall'ubbrichezza, e cioè, 42 per caduta, 4 per annegamento, 7 per assideramento e 2 per schiacciamento.

(b) Dei 32 casi di morte in istato d'ubbrichezza nell'anno 1915, 41 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 11 per infortunio causato dall'ubbrichezza, e cioè, 8 per caduta e 3 per assideramento.

(c) Dei 39 casi di morte in istato d'ubbrichezza nell'anno 1916, 27 avvennero per avvelenamento acuto da alcool e 12 per infortunio causato dall'ubbrichezza, e cioè, 6 per caduta, 3 per annegamento, 2 per assideramento e 1 per asfissia.

(d) Compresi 14 morti per precipitazione di velivoli.

(e) Compresi 58 morti per precipitazione di velivoli.

(f) Compresi 273 morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.

(g) Nei 1858 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1914, ve ne sono compresi 112 per investimento da automobile (80 maschi e 32 femmine), 46 per investimento da bicicletta (36 maschi e 10 femmine), 11 per investimento da motocicletta (7 maschi e 4 femmine), 222 per investimento ferroviario (192 maschi e 30 femmine), 152 per investimento tranviario (130 maschi e 22 femmine) e 2 per schiacciamento da ascensore (un maschio e una femmina). Inoltre, il terremoto, avvenuto nella provincia di Catania il giorno 8 maggio 1914, fu causa di 55 vittime nel Comune di Acireale (maschi 39 e femmine 16), di 10 nel Comune di Zafferana Etnea (4 maschi e 6 femmine) e di 2 femmine in quello di Giarre.

(h) Nei 32,313 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1915 sono comprese le vittime del terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915, in numero di 30.476. Dedotte tali vittime, il numero dei decessi per schiacciamento accidentale nel 1915 si riduce a 1837, ed esso comprende 154 morti per investimento da automobile (116 maschi e 38 femmine), 35 per investimento da bicicletta (23 maschi e 12 femmine), 12 per investimento da motocicletta (10 maschi e 2 femmine), 286 per investimento ferroviario (247 maschi e 39 femmine), 170 per investimento tranviario (139 maschi e 31 femmine), 5 maschi per schiacciamento da ascensore e un maschio per incidente aeronautico.

(i) Nei 2021 casi di morte per schiacciamento nell'anno 1916, ve ne sono compresi 159 per investimento da automobile (121 maschi e 38 femmine), 26 per investimento da bicicletta (24 maschi e 2 femmine), 11 per investimento da motocicletta (8 maschi e 3 femmine), 320 per investimento ferroviario (286 maschi e 34 femmine), 212 per investimento tranviario (173 maschi e 39 femmine), 22 per investimento da autocarro (17 maschi e 5 femmine), 5 maschi e una femmina per schiacciamento da ascensore e un maschio per incidente aeronautico.

(l) Nel calcolare i rapporti a 100 morti accidentali, per l'anno 1915, si è fatta astrazione dei morti nel terremoto, e ciò allo scopo di rendere comparabili le cifre proporzionali di detto anno con quelle dei due anni precedenti.

(m) Compresi le vittime del terremoto, in numero di 14.917.

(n) Compresi le vittime del terremoto, in numero di 15.559.

Per le morti dovute ad avvelenamento acuto, sia accidentale, sia volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze venefiche introdotte nell'organismo. Tra gli avvelenamenti acuti accidentali abbiamo compresi anche quelli causati da morsicatura di vipera o di altri animali velenosi. Qui appresso sono riferiti i casi avvenuti nell'anno 1916.

Morti nel Regno per avvelenamento acuto e per morsi di vipera o di altri animali velenosi, nell'anno 1916, classificati per sesso e secondo la specie del veleno (a).

PROSPETTO N. 14.

NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto		Suicidi per avvelenamento		NATURA DEI VELENI	Morti accidentali per avvelenamento acuto		Suicidi per avvelenamento	
	M.	F.	M.	F.		M.	F.	M.	F.
Acido solforico	14	3	5	7	Cloralio	1	..
Id. muriatico	1	..	1	4	Fernet	2	2
Id. cloridrico	1	1	1	2	Benzina e petrolio.	1	2	1	..
Id. nitrico.	1	..	1	..	Nitroglicerina	1	..
Id. ossalico	1	..	1	Creolina.	1	..
Id. fenico	2	1	1	1	Cicuta	1	2
Id. arsenioso	1	1	1	2	Atropina	1
Arseniato di rame	1	Laudano	1	3
Acidi non specificati	2	1	Oppio	1
Emulsione di mandorle amare	1	Morfina	5	4
Potassa caustica	1	..	5	20	Caffeina	1	..
Lisciva	8	Veronal	3	2
Fosforo	1	4	Chinino	6	8	2	4
Tintura di iodio	1	Stricnina	3	3
Cianuro di potassio.	1	1	Nicotina	1
Solfato di rame	2	1	4	11	Cocaina	1	..	1
Solfuro di carbonio.	4	Funghi	29	36
Acqua di calce	1	Sostanze alimentari guaste	1	2
Sublimato corrosivo	11	7	53	143	Veleni non specificati	6	4	5	10
Altri sali di mercurio	1	1	3	..	Morsi di vipera o di altri animali velenosi	14	4
Calomelano	1	TOTALE	99	81	105	236

(a) Giova ricordare che tra i morti per malattie ordinarie sono compresi, nel 1916, altri 59 individui (maschi 36 e femmine 23) morti per avvelenamento cronico contratto, per la maggior parte, in taluni esercizi professionali.

Professioni. — La tavola IX, a pagina 82, dà il numero dei maschi morti per causa violenta accidentale in età da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio. Raggiungendo i maschi morti per causa violenta accidentale, classificati per professione, a 100 morti per qualsiasi causa, della corrispondente età e professione, ciò che si fa nel prospetto seguente, risulta che gli infortuni mortali sono stati, nel 1916, più frequenti nei minatori e marmisti, nei ferrovieri e tramvieri, nei macchinisti e fuochisti, nei fattorini postali e telegrafici, nei cocchieri, stallieri, mulattieri e carrettieri, nei fabbricanti ed operai non specificati, nei militari, ecc.

PROSPETTO N. 15.

Maschi morti nel Regno in età da 15 anni in su per causa violenta accidentale, classificati per professione, su 100 maschi della stessa età e professione morti per qualsiasi causa, negli anni 1914, 1915 e 1916.

	1914	1915	1916		1914	1915	1916
Minatori, marmisti . .	10.6	11.9	15.1	Fabbri, meccanici, ar-			
Ferrovieri e tramvieri .	9.0	10.2	12.2	rotini	4.1	4.2	4.0
Macchinisti e fuochisti .	10.8	12.1	12.1	Muratori, scalpellini, fu-			
Fattorini postali e tele-				misti	5.8	4.7	3.9
grafici	3.5	4.4	6.8	Studenti	2.8	3.3	3.9
Cocchieri, stallieri, mu-				Cartai	2.5	4.9	3.8
lattieri, carrettieri . .	8.0	6.3	5.8	Facchini, lavandai,			
Fabbricanti ed operai				spazzini	3.2	3.6	3.7
non specificati	4.0	4.8	5.5	Braccianti, manovali . .	4.0	3.6	3.5
Militari	9.1	5.3	4.6	Marinai, pescatori . . .	3.5	3.5	3.5
Lattai e casari	2.7	3.8	4.4	Di qualsiasi professione	2.9	2.9	2.8

§ 3. — Morti per omicidio, negli anni 1914-16, classificati secondo il sesso e il mezzo di uccisione.

Nel 1916 i morti per omicidio (compresi quelli per infanticidio), secondo le dichiarazioni dei medici visitatori (a), furono 947.

Esaminando, in relazione al sesso dei colpiti, i mezzi coi quali ne fu procurata la morte, si hanno, per il Regno, le cifre seguenti:

PROSPETTO N. 166.

PERSONE UCCISE MEDIANTE	ANNO 1914			ANNO 1915			ANNO 1916		
	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale	Maschi	Fem.	Totale
arma da fuoco . . .	631	114	745	588	91	679	428	81	509
arma da taglio . . .	336	65	401	307	84	391	202	58	260
arma contundente. . .	135	29	164	119	25	144	84	32	116
strangolamento . . .	7	9	16	8	19	27	14	14	28
avvelenamento . . .	1	2	3	1	3	4	3	1	4
annegamento . . .	3	..	3	5	7	12	2	4	6
soffocazione . . .	5	3	8	6	2	8	5	3	8
assideramento	1	..	1
precipitazione . . .	3	2	5	2	1	3	1	..	1
mezzo non determinato	11	4	15	14	8	22	8	6	14
Totale . . .	1132	228	1360	1050	240	1290	748	199	947

§ 4. — Morti per suicidio, negli anni 1914-16, classificati per sesso, età, stato civile, professione, mesi e mezzi o modi di uccisione.

Abbiamo dato a pagina XLVI le cifre dei suicidi divisi per sesso, in ciascun anno dal 1887 al 1916. Da esse apparisce che il numero dei suicidi è venuto crescendo fino al 1898, dopo il quale anno si nota una leggiera diminuzione fino al 1903. Negli anni seguenti, fino al 1914, le morti per suicidio crebbero notevolmente, tantochè esse furono 3.185 in detto anno, corrispondenti a 8.88 ogni 100,000 abitanti, mentre nell'anno 1887 diedero soltanto un quoziente di 4.89; si mantennero ancora alte nel 1915 (8,51 ogni 100.000 abitanti), mentre diminuirono notevolmente nel 1916, nel quale anno il quoziente per dette morti discese a 6.91 ogni 100.000 abitanti. Non possiamo qui dare i quozienti su 100.000 abitanti dei suicidi nell'anno 1916 in ciascun Compartimento, non conoscendosi la popolazione dei medesimi in detto anno, per le ragioni esposte nel paragrafo 3 del Capo I di questa relazione.

(a) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta di un delitto flagrante, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione meccanica o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano fortuiti, oppure causati da mano omicida. Soltanto l'Autorità giudiziaria, dopo pazienti ricerche e, non di rado, previe laboriose perizie, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Infatti i risultati delle due statistiche differiscono specialmente quanto agli omicidi d'infante ed ai venefici, per i quali occorrono indagini lunghe ed accurate da parte del giudice istruttore per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

Sesso e stato civile. — Fra i 2,531 individui morti nel 1916 per suicidio, 1,799 erano maschi e 732 femmine, cioè ogni 100 suicidi si contarono 71 maschi e 29 femmine. Nel 1915 su 100 suicidi si erano contate 26 femmine, 28 nel 1914, 27 nel 1913, 28 nel 1912, 30 nel 1911, 24 nel 1910, 23 nel 1909, pure 23 nel 1908, 26 nel 1907, 24 nel 1906, 21 nel 1905, 20.6 in media nel decennio 1895-904 e 19.0 nel decennio 1885-94: è adunque venuta crescendo col tempo la proporzione delle femmine che si tolsero la vita, rispetto a quella dei maschi.

Secondo lo stato civile, i suicidi si distribuivano, negli anni 1914, 1915 e 1916, così:

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1914, 1915 e 1916, classificati per sesso e stato civile.

A) Cifre assolute.

PROSPETTO N. 17.

STATO CIVILE	1914			1915			1916		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi e nubili . . .	1 466	1 002	464	1 304	941	363	1 039	720	319
Coniugati	1 308	989	319	1 312	990	322	1 052	770	282
Vedovi	350	257	93	376	265	111	302	191	111
Ignoto	61	46	15	100	91	9	138	118	20
TOTALE . . .	3 185	2 294	891	3 092	2 287	805	2 531	1 799	732

B) Cifre proporzionali.

STATO CIVILE	OGNI 100 SUICIDI DEL MEDESIMO GRUPPO DI STATO CIVILE						OGNI 100 SUICIDI IN TOTALE		
	1914		1915		1916		1914	1915	1916
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine			
Celibi e nubili . . .	68	32	72	28	69	31	46	42	41
Coniugati	76	24	75	25	73	27	41	43	42
Vedovi	73	27	70	30	63	37	11	12	12
Ignoto	75	25	91	9	86	14	2	3	5
TOTALE . . .	72	28	74	26	71	29	100	100	100

Età. — Nel prospetto seguente è data la classificazione per sesso e per gruppi d'età delle persone suicidatesi nell'anno 1916, ed è fatto il confronto colle notizie degli anni 1914 e 1915 e con quelle del periodo 1896-913. Per il sessennio 1911-1916, i suicidi in ciascun gruppo d'età sono stati confrontati coi viventi coetanei, secondo il censimento del 10 giugno 1911.

Suicidi nel Regno nel periodo 1896-1913 e negli anni 1914, 1915 e 1916, classificati per sesso e per gruppi d'età.

PROSPETTO N. 18.

A) **Cifre assolute.**

ANNI D'ETÀ	Periodo 1896-1913 (Somma dei dati annuali)		1914		1915		1916	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	Fino a 15 anni	183	62	7	9	10	7	9
15-19 »	2 087	1 299	143	156	142	129	129	102
20-24 »	4 196	1 687	315	188	260	145	161	130
25-29 »	2 981	1 127	187	105	216	109	195	86
30-39 »	4 917	1 559	328	152	337	104	342	129
40-49 »	5 382	1 380	365	101	340	107	268	75
50-59 »	5 771	1 263	419	78	402	80	266	81
60-69 »	4 399	935	322	69	365	72	250	63
70-79 »	2 117	475	170	24	164	48	144	46
80 e più »	438	102	28	7	38	4	23	15
Età ignota	250	37	10	2	13	..	12	..
TOTALE	32 721	9 926	2 294	891	2 287	805	1 799	732

B) **Cifre proporzionali.**

ANNI D'ETÀ	Ogni 100 morti per suicidio (a)								Sessennio 1911-16	
	Periodo 1896-1913		1911		1915		1916		Suicidi per ogni 100,000 viventi (b) (Media annuale)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Fino a 15 anni	0.6	0.6	0.3	1.0	0.4	0.9	0.5	0.7	(c)1.2	(c)0.6
15-19 »	6.4	13.1	6.3	17.5	6.2	16.0	7.2	13.9	8.8	7.7
20-24 »	12.9	17.0	13.8	21.1	11.4	18.0	9.0	17.8	19.0	10.1
25-29 »	9.2	11.4	8.2	11.8	9.5	13.5	10.9	11.8	18.4	7.9
30-39 »	15.1	15.8	14.4	17.1	14.8	12.9	19.1	17.6	16.7	5.8
40-49 »	16.6	14.0	16.0	11.4	15.0	13.3	15.0	10.2	18.9	5.3
50-59 »	17.8	12.8	18.3	8.8	17.7	9.9	14.9	11.1	24.1	5.5
60-69 »	13.6	9.5	14.1	7.8	16.1	8.9	14.0	8.6	27.0	6.0
70-79 »	6.5	4.8	7.4	2.7	7.2	6.0	8.1	6.3	29.0	6.8
80 e più	1.3	1.0	1.2	0.8	1.7	0.6	1.3	2.0	25.4	7.0
TOTALE	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	17.6	6.3

Fra i maschi le proporzioni più alte di suicidi ogni 100 del totale, sono date da individui in età da 30 a 59 anni: fra le femmine se ne trova una proporzione relativamente più alta in quelle che hanno da 15 a 39 anni. Facendo i rapporti col totale dei viventi coetanei, si trova che il numero dei suicidi nei maschi cresce coll'avanzare dell'età; nelle femmine i rapporti si mantengono più costanti nei differenti gruppi d'età. Tanto fra i maschi, quanto fra le femmine, si osserva una forte propor-

(a) Esclusi i suicidi d'età ignota.

(b) Queste proporzioni sono state calcolate sui viventi in ciascuna età, secondo il censimento del 10 giugno 1911.

(c) Queste proporzioni sono state calcolate sui viventi in età dai 12 a 14 anni e 365 giorni.

(d) I totali sono stati calcolati sulle cifre della popolazione da 12 anni in su.

zione di suicidi nel gruppo d'età da 20 a 24 anni, quando cominciano le prime disillusioni della vita e non si è ben preparati a sostenere la lotta per l'esistenza; poi le proporzioni scemano fino al 39° anno, dopo il quale avviene, specialmente nei maschi, un sensibile aumento.

Mezzi o modi di suicidio. — Rispetto ai mezzi o modi adoperati per togliersi la vita, la nostra statistica distingue i suicidi in nove categorie.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli anni 1914, 1915 e 1916

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1914-16, classificati secondo i mezzi o modi adoperati.

PROSPETTO N. 19.

A) Cifre assolute.

MEZZI O MODI del suicidio	1914			1915			1916		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Per annegamento	518	338	180	583	379	204	470	273	197
Con arma da fuoco	838	776	62	813	756	57	620	579	41
Con arma da taglio	121	105	16	100	87	13	112	97	15
Per impiccamento	582	463	119	598	492	106	487	387	100
Per precipitazione	330	214	116	341	224	117	326	221	105
Per schiacciamento	134	114	20	96	82	14	91	81	10
Per avvelenamento	539	202	337	438	184	254	(c) 341	105	236
Per asfissia	103	67	36	89	61	28	58	36	22
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	20	15	5	34	22	12	26	20	6
	(a)			(b)			(d)		
TOTALE	3 185	2 294	891	3 092	2 287	805	2 531	1 799	732

B) Cifre proporzionali a 100 del totale.

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	1914		1915		1916	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Per annegamento	14.73	20.20	16.57	25.34	15.18	26.91
Con arma da fuoco	33.83	6.96	33.06	7.08	32.19	5.60
Con arma da taglio	4.58	1.80	3.80	1.61	5.39	2.05
Per impiccamento	20.18	13.36	21.51	13.17	21.51	13.66
Per precipitazione	9.33	13.02	9.79	14.53	12.28	14.34
Per schiacciamento	4.97	2.24	3.59	1.74	4.50	1.37
Per avvelenamento	8.81	37.82	8.05	31.55	5.84	32.24
Per asfissia	2.92	4.04	2.67	3.48	2.00	3.01
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	0.65	0.56	0.96	1.50	1.11	0.82
TOTALE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

(a) Fra i suicidi dell'anno 1914 ve ne sono compresi 70 (maschi 46 e femmine 24) compiuti in istato di delirio per psicopatia, fra cui 6 maschi e una femmina per frenosi pellagrosa, 4 maschi per frenosi alcoolica, una femmina per frenosi isterica, 1 maschio per mania religiosa e 23 maschi e 10 femmine per neurastenia.

(b) Fra i suicidi dell'anno 1915 ve ne sono compresi 52 (maschi 29 e femmine 23) compiuti in istato di delirio per psicopatia, fra cui 5 maschi e una femmina per frenosi pellagrosa, 1 maschio per frenosi alcoolica, 2 maschi per frenosi epilettica, una femmina per frenosi isterica, 1 maschio per mania di persecuzione e 9 maschi e 12 femmine per neurastenia.

(c) Per le specie dei veleni adoperati, veggasi a pag. L.

(d) Fra i suicidi dell'anno 1916 ve ne sono compresi 52 (maschi 34 e femmine 18) compiuti in istato di delirio per psicopatia, fra cui 2 maschi per frenosi alcoolica, 1 maschio per frenosi epilettica, 3 maschi e 2 femmine per melancolia, 2 maschi per lipemania, 2 maschi per demenza, 1 maschio per mania di persecuzione, 1 maschio per delirio acuto e 16 maschi e 11 femmine per neurastenia.

Mesi in cui avvennero i suicidi. — In relazione alle stagioni e ai mesi nei quali accaddero, i suicidi distribuivansi, in cifre assolute ed in cifre proporzionali a 1,200 (a), secondo che è indicato qui sotto. La maggior frequenza dei suicidi si nota, di solito, nell'estate e nella primavera; la minore nell'autunno e nell'inverno.

Suicidi nel Regno avvenuti negli anni 1914-1916, divisi per mesi e per stagioni.

PROSPETTO N. 20.

MESI E STAGIONI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI SU 1,200 (a)		
	1914	1915	1916	1914	1915	1916
Marzo	277	303	226	102	115	106
Aprile	283	271	216	108	106	104
Maggio	310	328	298	115	125	139
<i>Primavera</i>	870	902	740	325	346	349
Giugno	318	353	257	121	139	124
Luglio	308	293	261	114	112	122
Agosto	296	268	196	109	102	92
<i>Estate</i>	922	914	714	344	353	338
Settembre	248	224	163	95	88	78
Ottobre	213	191	192	79	73	90
Novembre	244	198	131	93	78	63
<i>Autunno</i>	705	613	486	267	239	231
Dicembre	248	207	185	92	79	86
Gennaio	206	225	226	76	86	106
Febbraio	234	231	180	96	97	90
<i>Inverno</i>	688	663	591	264	262	282
ANNO	3 185	3 092	2 531	1 200	1 200	1 200

(a) Nel calcolare le cifre proporzionali furono fatte le operazioni necessarie per ridurre i giorni dei singoli mesi dell'anno ad uno stesso numero, cioè a trenta.

Professioni. — La professione, e più ancora la condizione economica ad essa inerente, influiscono notevolmente sulla frequenza dei suicidi. Nella tavola XIII, a pagina 87, è data la classificazione per professioni dei maschi e delle femmine che si tolsero la vita nell'anno 1916. Per meglio dimostrare l'influenza di questo fattore, esponiamo nel prospetto seguente il numero dei maschi che si uccisero in età da 15 anni in su, durante il quinquennio 1911-15 e nell'anno 1916, classificati secondo alcune professioni, tanto in cifre assolute, quanto in cifre proporzionali a 100,000 individui della stessa professione, giusta il censimento del 10 giugno 1911.

Suicidi (maschi) nel Regno in età da 15 anni in su, nel quinquennio 1911-15 e nell'anno 1916, classificati per professioni.

PROSPETTO N. 21.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	MASCHI da 15 anni in su, secondo il censimento del 10 giugno 1911	SUICIDI (maschi) in età da 15 anni in su		
		Cifre assolute		Proporzioni a 100,000 individui della stessa professione — Media annua del sessenn. 1911-16
		Quinquen. 1911-15 (Somma dei dati annuali)	Anno 1916	
Di qualsiasi professione	11 038 110	10 889	1 790	19
Agricoltori, boscaioli, carbonai, pastori, mandriani, braccianti, manovali, selciatori	5 560 404	2 966	523	10
Filatori, tessitori, tintori, cordai	83 769	67	7	15
Muratori, imbianchini, scalpellini, pittori di stanze	425 130	436	47	19
Barbieri	56 431	84	7	27
Sarti	110 560	101	12	17
Tipografi, litografi, legatori di libri	34 404	52	8	29
Caffettieri, liquoristi, pasticciere, osti, trat- tori, vinai, birrai	154 175	152	20	19
Corpi armati (escluso l'esercito)	62 234	140	15	42
Professori e maestri	45 773	65	11	28
Capitalisti e benestanti	234 027	642	88	52
Medici, dentisti, veterinari	27 595	52	11	38
Sacerdoti e monaci	74 248	29	3	7

Elenco nosologico adottato per la Statistica delle cause di morte.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Asfissia e apoplezia nel parto. 2. Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità. 3. Cianosi, vizi congeniti di cuore. 4. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.). 5. Labbro leporino complicato (gola lupina). 6. Atrfia congenita, atelectasia polmonare, immaturità. 7. Vaiuolo e vaiuoloide. 8. Morbillo (rosolia). 9. Scarlattina. 10. Risipola. 11. Febbre tifoidea, pneumo-tifo, meningotifo, paratifo, febbre miliare. 12. Tifo petecchiale (tifo esantematico). 13. Meningite cerebro-spinale epidemica. 14. Difterite. 15. Laringite crupale. 16. Ipertosse (tosse convulsiva). 17. Grippe o influenza. 18. Febbri da malaria. 19. Cachessia palustre. 20. Dissenteria epidemica. 21. Colèra asiatico. 22. Siflide. 23. Settlicemia, pioemia, cangrena nosocomiale. 24. Pustola maligna, carbonchio. 25. Moccio (farcino, cimurro). 26. Lebbra (elefantiasi dei greci). 27. Rabbia (idrofobia). 28. Actinomicosi, varicella, febbre ricorrente, morbo di Weil ed altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose non specificate. 29. Turbercolosi disseminata. 30. Meningite tubercolare, basilare, idrocefalo acquisito. 31. Turbercolosi polmonare, polmonite caseosa, tisi polmonare. 32. Tabe mesenterica ed intestinale. 33. Scrofola disseminata. 34. Lupus. 35. Artrite fungosa, sinovite fungosa. 36. Turbercolosi delle ossa. 37. Male vertebrale di Pott. 38. Rachitide. | <ol style="list-style-type: none"> 39. Anemia, clorosi. 40. Leucemia, anemia pernicioza progressiva, anemia splenica, morbo di Banti, di Hodgkin. 41. Porpora emorragica, morbo di Werloff. 42. Emofilia, morbo di Barlow. 43. Scorbuto. 44. Marasmo senile. 45. Pellagra. 46. Gotta. 47. Diabete zuccherino ed insipido. 48. disseminati in più organi. 49. dell'utero, vagina, ovaia. 50. delle mammelle. 51. della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli. 52. della bocca, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea. 53. dello stomaco, esofago. 54. del fegato. 55. della milza, del pancreas, intestino, peritoneo. 56. delle ossa, delle articolazioni. 57. dei centri nervosi e degli organi dei sensi. 58. d'altri organi. 59. Meningite semplice cerebrale e spinale. 60. Mielite, tabe dorsale, morbo di Bell, di Brown-Séguard, di Morvan. 61. Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson, di Raynaud, paralisi agitante. 62. Paralisi infantile. 63. Encefalite. 64. Apoplezia e congestione cerebrale. 65. Tumori cerebrali e spinali (a). 66. Rammollimento cerebrale. 67. Paralisi progressiva, demenza paralitica. 68. Epilessia, morbo di Jackson. 69. Convulsioni, isterismo. 70. Corea. 71. Tetano e trisma. 72. Eclampsia infantile, trisma dei neonati, atetosi. 73. Successioni della pazzia, mania, neurastenia (b). 74. Malattie degli organi della vista (a) 75. Malattie degli orecchi, otite, morbo del Ménière (a). |
|--|---|

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) In questa voce sono classificati gli individui colpiti da alienazione mentale, pei quali non fu specificata la causa diretta della morte.

76. Malattie delle fosse nasali, della trachea, laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.) (a).
77. Bronchite acuta.
78. Bronchite cronica.
79. Malattie della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, piotorace, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.) (a).
80. Congestione polmonare ed apoplessia polmonare.
81. Polmonite crupale.
82. Bronco polmonite acuta.
83. Polmonite cronica, cangrena polmonare.
84. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, mixedema) (a).
85. Gozzo esoftalmico, morbo di Basedow.
86. Asma, enfisema.
87. Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti (emorragia, endoarterite, ateromasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo, onfalite)
88. Malattie delle vene (flebite, varici, trombosi, emorroidi).
89. Malattie dei vasi linfatici (linfangiite, adenite).
90. Malattie del cuore (endocardite, lesioni valvolari, ipertrofia, miocardite, rottura, ecc.).
91. Malattie del pericardio (pericardite, idrocardio).
92. Angina pectoris, morbo di Huntington.
93. Sincope.
94. Malattie della bocca e della lingua, noma, cancro acquatico, morbo di Riga, glossite, ulcerazione al frenulo (a).
95. Orecchioni.
96. Malattie delle tonsille, della faringe, dell'esofago (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.) (a)
97. Malattie dello stomaco, gastrite, atropia, dispepsia, morbo di Ludwig (a).
98. Ulcera rotonda dello stomaco.
99. Epatite, cirrosi epatica.
100. Atrofia gialla acuta del fegato.
101. Calcoli biliari.
102. Ittero grave, melena, morbo di Winkel.
103. Malattie della milza e del pancreas (a).
104. Diarrea infantile, gastro enterite, colera indigeno, enterite, tifite, colite, ulcera intestinale, proctite, autointossicazione intestinale, dentizione difficile.
105. Volvolo.
106. Tumori intestinali e addominali (a).
107. Ernie intestinali e addominali.
108. Malattie da echinococco.
109. Altri parassiti intestinali (ascaridi, tenia, anchilostoma).
110. Appendicite, ascesso della fossa iliaca.
- 110^a. Peritonite.
111. Idrope-ascite.
112. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, tumori) (a).
113. Malattie della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, paralisi e tumori) (a).
114. Calcoli renali e vescicali.
115. Malattie dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata) (a).
116. Malattie delle capsule soprarrenali (morbo di Addison).
117. Malattie dei testicoli (tumori, ecc.) (a).
118. Malattie dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.) (a).
119. Malattie dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocoele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.) (a).
120. Malattie delle mammelle (ascesso, tumori) (a).
121. Metrorragia dopo il parto.
122. Distocia, gravidanza extrauterina, rottura dell'utero.
123. Eclampsia puerperale.
124. Febbre puerperale.
125. Pelvi e metropertonite puerperale.
126. Sincope ed altri accidenti nel parto.
127. Flemmone, ascesso (a).
128. Cangrena della pelle.
129. Elefantiasi degli arabi.
130. Favo, foruncoli.
131. Pemfigo, eczema (crosta latte, psoriasi, ectima, ecc.).
132. Sclerema, edema dei neonati, lithopedion.
133. Osteomalacia e altre malattie delle ossa (a).
134. Reumatismo articolare acuto.
135. Reumatismo cronico.
136. Psoite.
137. Atrofia muscolare progressiva, morbo di Duchenne.
138. Alcoolismo cronico.
139. Avvelenamento cronico accidentale o professionale.

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

- | | | |
|------|---|--|
| 140. | in istato di ubbriachezza. | 157. Omicidio (compreso quello d'infante). |
| 141. | per annegamento. | 158. Duello. |
| 142. | per freddo. | 158 a. Morti per ferite riportate in guerra. |
| 143. | per insolazione. | 159. Condanna alla pena capitale (a). |
| 144. | per fulminazione: | 160. per annegamento. |
| | a) naturale. | 161. con arma da fuoco. |
| | b) da apparecchi elettrici. | 162. con arma da taglio. |
| 145. | per caduta. | 163. per impiccamento. |
| 146. | per lesioni causate da scoppio di
esplosivi, di armi da fuoco, di
mine. | 164. per precipitazione. |
| 147. | per ferite da taglio. | 165. per schiacciamento sotto convogli
ferroviari, sotto tramways, ecc. |
| 148. | per lesioni prodotte da macchine
agrarie ed industriali. | 166. per avvelenamento. |
| 149. | per schiacciamento da caduta
d'alberi o d'altri corpi, da frane,
valanghe, entro miniere; sotto
veicoli o cavalli, sotto con-
vogli ferroviari. | 167. per asfissia. |
| 150. | per violenze d'animali. | 168. con altro mezzo o con mezzo non
determinato. |
| 151. | per ustione. | |
| 152. | per soffocamento. | |
| 153. | per asfissia. | |
| 154. | per avvelenamenti acuti. | |
| 155. | per morsi di vipera o di altri
animali velenosi. | |
| 156. | per cause non determinate. | |

Morte violenta accidentale

Suicidio

Morti per causa ignota o non dichiarata.

(a) Questa pena, cancellata dal Codice penale comune, andato in vigore nel 1890, è ancora mantenuta nei Codici penali speciali per l'Esercito e per la Marina.

TAVOLE

TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,
A — Per

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		L O M			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
1	Astissia e apoplessia nel parto	6	21	7	27	10	15	20	32	9	
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	6	6	4	8	12	1	13	7	11	
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	8	8	6	21	8	19	12	8	5	
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	1	3	6	2	..	1	1	..	
5	Labbro leporino	5	4	1	3	6	1	1	5	4	
6	Atrofia congenita, immaturità	235	404	260	517	439	56	088	563	363	
7	Vainolo	1	1	
8	Morbillo	53	53	74	97	141	10	565	411	123	
9	Scarlattina	22	9	17	17	124	1	7	6	4	
10	Risipola	33	22	34	75	51	3	18	42	28	
11	Febbre tifoidea	147	140	108	292	180	11	291	243	201	
12	Tifo petecchiale	1	1	1	1	..	
13	Meningite cerebro spinale epidemica	65	2	8	61	10	2	29	17	6	
14	Difterite	50	32	24	108	99	4	65	92	62	
15	Laringite crupale	33	29	12	19	22	4	40	48	43	
16	Ipertosse	124	131	148	138	163	10	260	253	170	
17	Influenza	65	98	116	200	106	12	80	129	188	
18	Febbri da malaria	2	1	4	2	7	..	1	..	2	
19	Cachessia palustre	2	..	2	1	
20	Dissenteria	1	
21	Colera asiatico	1	
22	Sifilide	18	9	6	42	51	8	7	14	13	
23	Setticemia, piemia	51	25	12	111	98	11	36	47	45	
24	Pustola maligna, carbonchio	1	3	9	8	4	2	
25	Moccio, cimurro	1	
26	Lebbra	1	..	1	1	
27	Rabbia	2	4	2	..	
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate	2	..	1	..	1	2	1	..	
29	Tubercolosi disseminata	63	62	84	119	161	32	117	133	90	
30	Meningite tubercul., idrocetalo acquisito	148	57	124	215	237	28	134	145	223	
31	Tubercolosi polmonare, tisi	1 019	562	833	1 813	1 817	204	613	741	826	
32	Tabe mesenterica	59	73	47	133	117	8	147	99	59	
33	Scrofolo disseminata	8	12	14	15	12	..	13	19	14	
34	Lupus	3	1	1	6	6	..	2	..	1	
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa	7	10	12	19	21	3	4	15	3	

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie.

B A R D I A				V E N E T O								E M I L I A		Numero dell'Elenco nosologico
MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
4	32	10	3	4	10	2	4	8	10	10	28	14	8	1
7	20	8	1	..	19	9	8	14	9	13	7	10	2	2
5	19	5	1	1	10	3	11	14	10	7	6	7	3	3
..	1	1	1	2	2	1	2	..	3	1	4
..	8	2	..	2	3	2	3	4	6	3	1	2	..	5
255	1 190	180	70	257	711	496	375	633	502	318	594	582	462	6
..	2	7
60	489	90	71	79	78	51	65	319	70	64	221	157	208	8
4	29	16	1	2	9	6	7	21	7	12	4	19	5	9
22	99	35	9	7	31	13	21	28	20	35	24	24	15	10
79	724	115	40	41	231	62	220	880	100	277	589	171	65	11
..	1	2	1	..	12
26	171	16	2	17	47	10	52	79	54	39	30	30	19	13
22	157	28	13	17	53	14	48	71	47	53	41	69	21	14
11	123	14	3	7	39	27	41	47	23	23	33	30	15	15
47	350	58	15	155	286	43	182	254	272	157	280	328	302	16
32	190	132	36	17	53	20	44	123	49	42	52	110	36	17
1	8	5	..	1	3	10	2	13	20	7	1	4	19	18
..	6	1	2	13	..	5	6	1	..	1	3	19
..	1	20
..	2	3	21
2	78	18	3	3	14	2	18	11	19	17	53	35	8	22
46	262	32	5	10	64	26	48	90	69	53	53	66	34	23
2	1	1	1	2	1	..	3	..	3	..	24
..	1	25
..	1	1	26
..	5	1	3	1	1	..	2	27
..	1	1	1	..	2	..	28
65	306	91	32	60	118	70	99	205	83	80	111	96	75	29
98	541	117	18	84	207	68	181	293	230	140	171	156	98	30
320	2 823	503	133	297	674	239	555	914	711	568	651	734	347	31
50	237	56	12	48	114	58	101	104	104	87	108	109	79	32
4	23	12	2	9	10	13	12	17	22	12	14	9	9	33
..	1	1	1	2	2	1	1	1	2	..	4	34
3	25	8	1	1	3	4	4	7	10	7	9	7	5	35

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,

A — Per

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	L'ARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELLE MILIA	AREZZO	PIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
1	Asfissia e apoplezia nel parto	3	11	6	2	6	5	3	17	1	2
2	Iidrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bilida, mostruosità	5	7	6	5	3	4	2	19	1	1
3	Gianosi, persistenza del foro di Botallo.	8	7	6	2	2	12	4	16	3	3
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	1	..	1
5	Labbro leporino	..	1	3	2	..	2	..	7	..	1
6	Atrofia congenita, immaturità	333	608	295	217	173	427	256	687	118	56
7	Vaiuolo	..	2
8	Morbillo	4	33	6	25	12	37	75	225	8	61
9	Scarlattina	9	11	4	29	10	6	2	20	1	3
10	Risipola	13	27	16	21	16	10	15	89	7	9
11	Febbre tifoidea	127	81	45	64	110	55	73	320	31	44
12	Tifo petecchiale	..	2	3
13	Meningite cerebro spinale epidemica.	29	8	24	15	11	7	26	105	6	30
14	Difterite	41	35	23	30	6	23	23	72	5	6
15	Laringite erupale	18	12	8	8	5	11	11	27	7	4
16	Ipertosse	162	256	95	44	105	169	106	307	6	4
17	Influenza	18	35	48	35	21	38	36	45	29	15
18	Febbrì da malaria	1	2	1	..	7	1	3	3	27	4
19	Cachessia palustre	1	1	2	3	..
20	Dissenteria
21	Colera asiatico
22	Sifilide	8	29	8	2	12	4	6	57	5	5
23	Setticemia, pioemia	21	31	38	25	35	27	19	136	8	26
24	Pustola maligna, carbonchio	..	4	2	2	1	1	2	5	2	..
25	Moccio, cimurro
26	Lebbra
27	Rabbia	..	1	1	1
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate	1	1	2	1
29	Tubercolosi disseminata	3	..	1	..	1	1	..
30	Meningite tubercul., idrocefalo acquisito.	86	69	51	32	30	45	59	203	29	21
31	Tubercolosi polmonare, tisi.	108	74	93	55	53	93	48	233	36	19
32	Tabe mesenterica	376	408	310	234	277	319	317	1 611	166	239
33	Scrofola disseminata	65	61	28	26	40	47	65	222	25	24
34	Lupus	9	3	9	6	2	4	8	17	6	5
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa.	3	3	2	2	..	2
		2	4	7	6	1	1	7	20	1	1

classificati secondo 168 cause di morte, provincie.

S C A N A				M A R C H E			U M B R I A	L A Z I O	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'elenco nosologico	
LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI		TERAMO
1	2	4	3	2	2	..	7	5	4	4	6	2	..	1
12	5	9	4	5	2	1	3	20	15	7	4	7	6	2
1	3	8	7	4	4	1	4	1	15	1	4	6	2	3
1	1	1	..	2	..	1	4
..	1	1	3	..	1	2	10	2	2	2	..	5
147	140	143	208	254	212	196	399	653	828	357	319	295	249	6
..	1	7
28	74	66	39	57	5	21	57	118	819	43	108	30	68	8
2	14	4	2	10	4	1	3	13	210	59	203	120	29	9
12	10	13	4	10	15	4	12	35	102	17	19	25	13	10
76	53	112	58	113	105	81	108	261	314	111	146	176	73	11
..	1	12
15	22	32	5	26	9	15	2	43	99	24	3	18	9	13
8	17	18	9	13	29	20	7	51	203	30	44	43	16	14
14	5	7	3	16	18	16	8	50	52	10	22	13	27	15
59	6	70	40	150	101	78	109	84	189	25	30	45	31	16
34	9	50	21	23	48	31	26	100	361	84	97	35	41	17
..	6	3	1	2	1	3	4	5	136	8	109	37	15	18
1	2	1	2	31	1	8	3	2	19
..	20
..	21
5	2	8	8	7	5	2	3	57	179	12	11	28	14	22
48	15	52	31	45	18	27	31	66	165	47	15	35	19	23
4	3	4	..	1	..	3	2	11	9	2	2	1	1	24
..	25
..	26
..	5	1	..	27
..	1	2	1	28
53	48	75	84	63	34	35	54	131	175	36	38	18	41	29
77	78	67	37	67	46	41	31	114	451	66	51	64	41	30
434	282	456	326	281	162	168	275	640	1 628	267	206	235	181	31
49	53	70	64	40	37	43	74	143	204	71	75	98	68	32
4	9	2	6	4	3	1	4	10	14	12	9	6	2	33
3	1	2	1	1	2	5	1	..	2	..	34
3	3	2	3	6	6	6	..	10	26	2	2	2	1	35

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILI-CATA	
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	CATANZARO
1	Asfissia e apoplessia nel parto . . .	4	5	8	10	8	12	5	6	5	4
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità . . .	8	40	23	26	11	13	9	23	15	10
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo . . .	2	..	9	11	7	8	..	17	1	2
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	1	..	5	4	2	3	..	3	..
5	Labbro leporino	3	2	5	6	3	5	3	3	..	1
6	Atrofia congenita, immaturità	237	165	407	567	329	918	451	610	246	237
7	Vaiuolo	1	5	2	..	1
8	Morbillo	148	70	364	276	341	126	254	432	222	49
9	Scarlatina	19	1	25	7	19	31	4	13	196	8
10	Risipola	14	15	26	36	31	53	34	56	37	24
11	Febbre tifoidea	87	47	165	159	141	155	163	184	122	121
12	Tifo petecchiale	3	1	1	2	17	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	12	7	73	93	6	8	36	41	18	31
14	Difterite	7	..	28	42	31	24	15	26	14	25
15	Laringite crupale	26	12	38	185	37	35	40	61	36	23
16	Ipertosse	21	3	44	63	84	112	39	155	86	21
17	Influenza	78	31	102	127	185	155	177	302	209	115
18	Febbri da malaria	21	9	48	21	33	240	574	335	354	124
19	Cachessia palustre	4	2	9	3	10	23	49	75	75	23
20	Dissenteria	1	1
21	Colera asiatico
22	Sifilide	3	23	49	289	24	53	15	58	23	30
23	Setticemia, piemia	19	21	51	83	40	82	20	90	27	43
24	Pustola maligna, carbonchio	3	6	3	3	6	3	9	12	6
25	Moccio, cimurro
26	Lebbra	1
27	Rabbia	2	1	3	8	2	4	1	2	2	5
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate	8	2	..
29	Tubercolosi disseminata	38	19	68	85	63	63	31	110	36	67
30	Meningite tubercol., idrocefalo acquisito . . .	57	26	86	202	80	163	64	217	40	43
31	Tubercolosi polmonare, tisi	193	112	515	1 324	345	727	428	970	257	337
32	Tabe mesenterica	58	18	230	288	115	552	138	216	94	72
33	Scrofolo disseminata	3	4	13	21	16	20	10	31	10	10
34	Lupus	3	1	2	1	..	1	..	2	..	3
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa . . .	2	2	7	27	5	19	3	4	4	6

Numero dell'elenco nosologico	CALABRIE										SICILIA								SARDEGNA	
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
1	5	2	2	4	2	3	3	1	..	10	5	1		
2	5	3	9	19	18	4	25	10	9	7	10	2		
3	5	4	5	7	2	4	4	2	3	7	6	1		
4	1	..	1	..	1	3	2	2	..	3	4	5		
5	1	3	3	4	2	..	6	2	2	3	4	5		
6	246	316	361	572	365	378	543	305	209	153	222	6		
7	7		
8	129	84	647	432	335	106	253	560	56	169	421	8		
9	96	191	72	63	50	15	220	372	162	3	..	9		
10	22	20	30	22	15	20	21	19	18	37	58	11		
11	111	132	101	259	117	134	177	154	92	98	58	11		
12	3	2	1	12		
13	10	27	74	25	89	5	139	84	16	22	9	13		
14	27	28	16	52	18	41	38	107	24	27	24	14		
15	21	18	9	29	31	18	22	11	18	6	13	15		
16	9	39	67	38	31	55	55	95	10	81	22	16		
17	173	108	40	160	182	91	57	111	36	113	74	17		
18	71	47	53	231	142	58	118	255	90	739	214	18		
19	15	12	16	31	20	24	25	55	15	119	47	19		
20	20		
21	21		
22	32	35	8	44	13	74	34	31	13	20	13	22		
23	27	49	53	63	39	87	108	32	39	43	39	23		
24	10	9	2	5	5	2	1	2	3	11	8	24		
25	25		
26	26		
27	1	1	1	3	2	1	6	..	2	27		
28	1	28		
29	42	42	21	55	25	63	186	80	37	152	121	29		
30	54	27	25	61	25	87	129	36	48	85	107	30		
31	280	272	209	504	223	425	850	287	330	634	567	31		
32	65	39	46	80	30	44	78	64	25	108	120	32		
33	10	14	22	6	8	3	13	12	9	41	24	33		
34	1	3	2	1	4	2	34		
35	1	6	2	3	4	3	11	5	3	8	7	35		

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,
A — Per

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi.	23	13	27	67	42	9	28	40	28	22
37	Morbo di Pott.	14	15	21	35	23	9	17	18	14	13
38	Rachitide.	10	5	7	55	33	2	81	92	49	22
39	Anemia	186	134	137	210	155	32	121	217	108	65
40	Leucemia	22	19	14	38	40	2	16	17	26	27
41	Porpora emorragica	7	3	3	11	4	..	3	6	6	1
42	Emofilia	2	7	4	6	6	..	5	3	4	4
43	Scorbuto	4	1	4	..	3	1	..	2
44	Marasmo senile	1 131	915	981	1 625	902	202	573	632	755	443
45	Pellagra	3	4	4	2	2	..	44	45	11	22
46	Gotta	5	3	5	5	8	..	6	4	4	..
47	Diabete	30	37	38	74	104	7	20	25	38	18
48	disseminati in più organi.	60	67	56	96	91	10	57	62	54	33
49	dell'utero, vagina, ovaia.	72	39	60	140	117	14	36	63	36	19
50	delle mammelle	16	12	21	58	54	3	16	25	21	9
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	15	10	12	26	23	4	4	7	10	3
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea.	20	10	28	58	53	4	24	40	30	16
53	dello stomaco, esofago	214	162	234	264	269	48	176	225	232	148
54	del fegato	82	37	60	96	96	11	44	54	63	32
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	63	44	79	120	97	12	38	57	52	44
56	delle ossa, articolazioni	5	14	6	16	15	..	5	7	6	7
57	dei centri nervosi e organi dei sensi	13	10	22	18	13	1	12	12	7	7
58	d'altri organi	55	30	37	76	90	11	29	29	28	29
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	191	148	170	220	328	30	201	213	191	84
60	Mielite, tabe dorsale	46	38	52	82	77	10	61	57	47	14
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	7	7	13	14	15	2	2	9	7	4
62	Paralisi infantile	6	5	4	6	9	2	9	22	3	1
63	Encefalite	41	21	53	77	45	5	31	28	32	19
64	Apoplezia e congestione cerebrale	920	621	796	1 272	922	136	667	868	760	517
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	..	2	..	3	9	..	5	7	7	4
66	Rammollimento cerebrale	9	13	11	33	20	3	13	16	28	14
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	10	55	36	83	86	2	30	78	55	50
68 e 69	Epilessia, isterismo	27	43	62	67	62	6	60	30	26	14
70	Corea	2	1	2	1	1	1	3	1
71	Tetano e trisina	14	8	8	23	19	6	8	14	6	9
72	Eclampsia infantile	162	152	106	190	256	31	162	149	118	68
73	Successioni della pazzia	..	1	..	3	2	1	4	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie

Numero dell'elenco nosologico	B A R D I A										V E N E T O						E M I L I A	
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA				
19	66	15	5	13	26	21	39	55	24	28	13	42	17	36				
10	65	6	1	7	21	3	9	21	18	5	14	11	11	37				
36	71	1	1	7	154	210	52	54	121	38	41	33	130	38				
78	470	57	31	70	239	207	182	337	293	122	237	93	156	39				
15	10	17	3	3	15	19	9	22	8	11	19	30	18	40				
2	11	4	1	..	3	..	3	7	2	1	3	4	1	41				
3	13	6	..	3	5	1	6	7	3	3	3	5	2	42				
5	7	2	..	2	3	3	2	1	5	1	2	3	4	43				
374	1 415	610	171	376	530	334	524	1.175	362	538	722	687	335	41				
14	61	6	2	6	111	27	60	55	16	34	73	14	8	45				
2	9	3	5	1	4	3	1	..	2	2	2	46				
13	86	23	11	4	14	10	23	32	25	28	20	36	9	47				
18	159	44	9	24	41	15	31	63	28	39	27	35	19	48				
37	148	32	8	11	40	16	25	40	27	27	28	71	24	49				
9	66	14	3	9	11	8	13	22	12	22	3	20	6	50				
6	29	7	4	4	13	4	16	12	17	12	9	14	4	51				
18	145	17	6	3	36	9	26	28	38	20	20	35	22	52				
127	508	168	32	52	126	51	87	169	113	103	81	221	53	53				
31	171	49	8	16	25	15	45	48	46	25	22	71	36	54				
27	168	71	16	14	45	19	32	39	54	42	21	92	21	55				
4	8	7	1	2	4	3	12	5	9	5	6	2	2	56				
5	27	9	1	4	10	3	12	10	14	11	6	11	7	57				
34	120	23	6	12	41	11	29	37	40	25	25	40	22	58				
94	650	85	21	32	108	78	85	135	88	75	170	121	52	59				
18	108	27	10	12	26	9	27	62	39	32	34	48	26	60				
7	19	3	1	1	4	1	4	4	8	6	7	6	3	61				
4	4	3	4	1	2	1	8	19	17	5	6	3	..	62				
15	82	21	4	8	24	13	74	55	23	13	30	35	20	63				
591	1 974	486	120	115	596	358	399	513	533	610	604	699	416	64				
..	..	9	..	1	1	2	..	5	..	2	..	65				
15	33	22	4	2	1	2	16	5	7	8	6	41	15	66				
1	54	30	10	8	7	3	4	62	6	33	7	81	4	67				
7	71	14	10	18	19	12	30	41	20	27	32	47	9	68				
1	5	2	1	..	3	2	3	..	69				
3	35	10	2	2	17	7	21	32	12	13	19	5	7	71				
93	332	51	44	55	171	88	223	311	244	80	235	83	78	72				
..	..	2	2	2	..	2	1	1	..	73				

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA										T O	
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO		
		36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	8	34	18	18	14	17	15	77	11	8
37	Morbo di l'ott	2	10	10	4	2	4	6	49	3	7		
38	Rachitide	89	70	52	6	17	49	31	40	9	2		
39	Anemia	68	93	46	49	31	93	62	110	27	15		
40	Leucemia	6	11	14	6	7	7	6	18	5	4		
41	Porpora emorragica	2	3	2	..	1	2	1	15	2	..		
42	Emofilia	1	..	3	3	1	1	2	7	..	3		
43	Scorbuto	1	5	10	7	1	4	..	2		
44	Marasmo senile	396	498	324	346	265	441	496	1 235	154	130		
45	Pellagra	9	5	2	17	1	3	6	9		
46	Gotta	2	2	1	5	..	1	3	5	2	2		
47	Diabete	21	24	9	11	10	9	10	73	2	14		
48	disseminati in più organi	20	36	20	23	24	44	23	89	8	6		
49	dell'utero, vagina, ovaia	14	38	31	23	25	27	22	90	12	14		
50	delle mammelle	7	5	11	11	8	9	8	38	2	11		
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	3	8	2	4	6	6	5	9	4	4		
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	16	13	12	14	24	19	7	31	3	9		
53	dello stomaco, esofago	160	92	157	97	165	93	135	507	66	46		
54	del fegato	46	34	33	27	48	34	27	101	21	14		
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	36	33	59	29	38	34	48	186	18	17		
56	delle ossa, articolazioni	3	8	7	2	5	2	2	4	..	2		
57	dei centri nervosi e organi dei sensi	11	3	13	6	5	6	9	34	4	6		
58	d'altri organi	29	22	30	17	17	12	16	77	6	11		
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	35	91	52	75	39	73	35	158	24	37		
60	Mielite, tabe dorsale	19	37	20	19	18	19	13	53	8	13		
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	3	2	4	5	5	1	3	8	5	5		
62	Paralisi infantile	18	3	6	5	1	9	3	17	3	2		
63	Encefalite	8	15	5	13	16	11	7	40	4	9		
64	Apoplessia e congestione cerebrale	455	465	440	332	313	472	416	1 297	122	145		
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	1	..	1	1		
66	Rammollimento cerebrale	4	14	38	10	9	18	3	47	2	4		
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	49	4	13	26	36	5	11	1	1		
68	Epilessia, isterismo	10	8	28	26	8	16	24	53	8	5		
69	Corea	1	1	1	1	5		
70	Tetano e trisma	15	5	4	3	4	2	6	12	..	3		
71	Eclampsia infantile	176	87	67	63	52	79	125	331	81	28		
72	Successioni della pazzia		
73			

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

SCANA				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'elenco nosologico
LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
24	12	26	12	18	12	21	13	32	48	21	27	24	20	36
17	6	9	5	4	2	6	3	18	37	6	1	5	7	37
15	13	13	18	54	79	69	64	71	74	38	31	24	34	38
33	58	57	67	77	64	60	109	181	298	110	112	70	79	39
13	17	13	9	13	11	9	5	22	71	13	39	19	10	40
1	..	3	2	1	7	11	4	1	2	5	41
..	1	1	1	1	..	2	7	1	3	2	2	42
..	1	1	1	..	1	1	..	43
502	429	471	261	475	481	487	420	1 228	1 187	833	838	856	718	44
2	..	6	1	1	5	16	11	65	6	..	1	1	1	45
6	..	1	3	3	2	2	2	3	17	2	5	2	3	46
32	8	15	11	19	11	14	15	33	136	14	12	17	7	47
29	13	32	25	25	32	18	15	58	103	28	34	22	12	48
28	15	37	27	23	11	16	24	61	159	25	22	24	22	49
13	6	9	5	7	12	10	9	31	52	11	11	13	5	50
8	4	6	4	9	9	7	18	20	35	5	6	6	2	51
17	8	15	9	9	8	7	7	22	67	13	10	11	3	52
92	74	87	139	73	39	90	80	126	304	74	44	33	24	53
..	17	44	12	24	18	13	26	55	117	23	22	18	11	54
39	20	43	36	29	11	28	29	65	138	24	17	20	19	55
6	..	2	3	2	2	5	4	5	19	1	2	2	3	56
5	6	7	8	4	3	3	7	12	24	7	1	10	7	57
19	11	20	16	15	21	28	25	39	82	15	14	21	18	58
44	56	52	47	66	22	21	20	96	346	41	87	43	48	59
21	4	12	16	23	17	18	14	70	82	28	37	31	13	60
3	1	2	2	3	2	6	2	17	14	6	7	5	2	61
3	1	5	1	..	5	5	2	12	15	6	2	2	1	62
5	5	9	10	14	7	31	4	20	54	16	17	14	8	63
346	179	478	396	539	396	558	477	1 030	1 373	468	523	565	504	64
3	..	1	9	..	1	65
15	1	11	12	16	14	4	10	10	110	5	6	4	6	66
26	1	41	4	5	5	1	3	11	155	9	9	2	2	67
19	14	42	30	15	13	13	17	54	47	34	27	39	28	68
..	..	1	2	1	..	1	..	6	2	..	1	1	1	70
5	2	2	6	3	4	7	8	8	7	2	1	8	3	71
63	79	104	91	200	185	214	239	406	841	100	108	327	343	72
3	2	73

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILI-CATA	
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	CATANZARO
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	25	14	46	89	29	71	24	47	31	27
37	Morbo di Pott	1	3	3	19	9	26	10	17	4	9
38	Rachitide	15	18	19	42	19	46	36	60	22	27
39	Anemia	183	104	217	302	187	457	254	625	155	135
40	Leuceinia	18	4	29	74	46	44	36	67	25	19
41	Porpora emorragica	6	2	7	11	7	18	4	13	6	9
42	Emofilia	2	1	5	12	4	7	5	7	3	1
43	Scorbuto	5	1	2	5	1	..
44	Marasmo senile	791	568	1 526	2 155	1 301	1 907	705	1 414	991	931
45	Pellagra
46	Gotta	6	..	8	6	6	9	3	12	1	8
47	Diabete	14	9	41	93	26	23	14	34	17	7
48	disseminati in più organi	40	20	76	105	52	85	30	62	30	42
49	dell'utero, vagina, ovaia	21	6	47	138	24	85	25	63	28	31
50	delle mammelle	10	3	22	56	16	31	10	20	12	16
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli	3	1	11	20	5	17	5	10	8	9
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	1	5	13	39	15	18	9	12	13	5
53	dello stomaco, esofago	22	20	52	74	41	45	16	57	43	23
54	del fegato	18	10	30	99	25	46	14	41	18	26
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	17	9	26	96	24	46	15	33	13	17
56	delle ossa, articolazioni	1	..	4	7	4	5	5	3	2	1
57	dei centri nervosi e organi dei sensi	7	2	9	18	3	9	2	7	4	3
58	d'altri organi	21	11	25	76	12	28	13	42	24	20
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	81	53	190	445	172	196	79	288	104	79
60	Mielite, tabe dorsale	38	12	49	84	40	70	23	36	34	37
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	6	2	10	18	12	5	6	12	7	4
62	Paralisi infantile	6	3	8	12	4	36	5	15	5	4
63	Encefalite	10	8	34	86	68	37	9	26	10	40
64	Apoplessia e congestione cerebrale	402	330	1 057	1 707	618	1 150	524	855	582	477
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	3	..	1	5	1	5	2	..
66	Rammollimento cerebrale	1	3	8	4	3	9	1	3	..	1
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	3	1	40	44	50	43	8	24	21	6
68 e 69	Epilessia, isterismo	30	22	75	58	74	44	17	29	40	43
70	Corea	1	1	1	2	..	2	..	3	3	1
71	Tetano e trisma	10	5	13	16	7	10	4	18	4	3
72	Eclampsia infantile	228	172	925	1 284	381	995	490	463	375	383
73	Successioni della pazzia	1	..	3	1	1	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

Numero dell'Elenco nosologico	CALABRIE								SICILIA								SARDEGNA	
	COSENZA	REGGIO di CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	Numero dell'Elenco nosologico	Numero dell'Elenco nosologico					
36	28	19	9	19	16	8	24	17	13	12	48	36						
37	9	6	6	4	4	5	9	8	3	15	12	37						
38	24	50	28	41	8	19	36	53	9	132	68	38						
39	95	198	400	324	342	201	594	294	180	357	151	39						
40	27	20	21	71	39	29	39	29	15	25	14	40						
41	2	5	7	6	4	7	13	7	6	8	8	41						
42	5	1	7	4	5	7	11	7	..	5	2	42						
43	5	1	1	..	7	3	2	43						
44	890	925	745	1 267	732	1 176	1 814	640	526	1 076	457	44						
45	1	45						
46	5	8	2	10	5	1	12	5	2	6	3	46						
47	13	12	14	48	26	26	58	38	22	25	15	47						
48	51	45	40	59	44	76	110	32	56	24	16	48						
49	34	38	20	57	13	28	52	50	22	18	17	49						
50	11	7	1	15	9	9	16	14	7	9	9	50						
51	2	7	8	8	1	6	3	3	5	2	3	51						
52	11	7	3	14	4	9	10	9	7	7	8	52						
53	54	41	18	71	24	66	43	40	23	48	31	53						
54	17	17	16	24	17	18	32	15	18	18	12	54						
55	16	22	6	33	15	33	33	18	20	24	12	55						
56	4	1	1	1	..	2	..	3	3	3	2	56						
57	8	3	1	9	3	6	7	4	8	10	4	57						
58	16	7	14	26	22	18	31	24	17	12	9	58						
59	82	93	50	161	84	101	226	60	69	70	58	59						
60	29	22	15	42	22	23	41	21	19	43	18	60						
61	7	5	..	4	2	3	3	7	2	4	6	61						
62	13	4	3	6	8	7	5	9	1	6	5	62						
63	14	11	6	15	12	8	22	10	13	29	12	63						
64	519	339	311	629	482	483	808	467	442	383	188	64						
65	2	..	3	2	..	3	2	5	4	65						
66	4	2	2	2	..	4	5	2	..	3	2	66						
67	22	1	31	43	1	52	125	4	2	48	12	67						
68	25	28	8	31	19	36	36	18	10	26	17	68						
69	2	1	1	1	3	1	2	1	..	1	..	70						
70	1	1	..	6	2	7	1	2	4	4	2	71						
71	1	1	..	196	159	280	126	173	38	104	23	72						
72	299	203	80	1	1	2	1	73						

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,
A — Per

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
74	Malattie degli occhi (a)	1	1	2	1	..
75	Malattie degli orecchi (a)	13	6	9	48	18	1	27	17	9	8
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	10	14	9	16	11	1	24	30	19	13
77	Bronchite acuta	460	582	497	784	612	18	1 254	837	538	395
78	Bronchite cronica	150	244	119	343	160	7	103	193	116	83
79	Malattie della pleura (a)	55	39	52	98	96	16	71	69	69	28
80	Congestione e apoplezia polmonare	14	17	11	21	15	..	22	15	24	7
81	Polmonite crupale	606	741	640	1 254	948	86	690	696	639	352
82	Bronco polmonite acuta	913	842	843	1 748	1 665	256	898	1 093	877	536
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	14	32	10	36	61	1	34	22	17	16
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	6	7	4	12	3	..	12	8	11	4
85	Morbo di Basedow	3	2	3	11	6	..	4	1	9	3
86	Asma, enfisema polmonare	46	35	52	75	59	13	39	48	50	42
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	181	128	199	425	423	41	143	265	229	148
88	Malattie delle vene, flebite, emproidi	4	4	4	11	9	1	4	5	1	2
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	5	7	4	11	13	3	5	9	10	6
90	Malattie del cuore	1 509	1 756	1 790	3 265	2 016	319	1 103	1 399	1 509	766
91	Malattie del pericardio	7	1	3	7	3	2	8	6	6	7
92	Angina pectoris	19	11	17	32	24	2	15	9	9	9
93	Sincope (b)	34	22	28	32	56	5	41	31	35	14
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	3	30	10	20	11	3	21	11	24	6
95	Orecchioni	2	..	1	2	4	..	4	3	1	1
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	7	18	12	29	31	3	27	17	15	10
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	98	142	138	201	211	28	210	200	227	76
98	Ulcera rotonda dello stomaco	6	11	13	28	30	3	7	4	18	10
99	Epatite, cirrosi epatica	131	77	124	176	178	39	84	114	88	42
100	Atrofia gialla acuta del fegato	1	1	3	2	3	..	3	3	1	1
101	Calcoli biliari	7	6	9	7	5	..	4	5	3	..
102	Ittero	23	29	21	62	24	..	21	31	29	18
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	5	1	1	2	1	1	5	2	4	2
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 106	1 151	589	1 338	1 547	218	3 284	2 217	1 453	634
105	Volvolo, occlusione intestinale	47	54	63	100	59	12	41	50	44	15
106	Tumori intestinali e addominali (a)	..	7	..	15	15	..	6	9	7	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie.

Numero dell'elenco nosologico	BARDIA				VENETO							EMILIA		Numero dell'elenco nosologico	
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA		FERRARA
74	..	6	1	1	..	1	..	74	
75	4	21	5	1	4	12	6	7	14	11	10	7	12	3	75
76	14	39	14	6	10	20	9	13	22	13	5	22	9	8	76
77	285	1 611	301	196	404	506	342	441	837	478	311	566	545	458	77
78	48	189	156	91	65	56	32	56	158	69	84	80	113	43	78
79	18	201	39	7	22	54	10	41	55	43	43	31	56	22	79
80	6	62	5	2	4	11	8	15	11	13	18	7	19	2	80
81	171	1 477	339	166	239	295	105	303	511	321	317	376	544	147	81
82	335	2 546	471	200	391	685	215	777	1 028	813	498	775	863	434	82
83	3	39	20	1	8	15	4	11	17	20	16	19	19	2	83
84	4	16	2	4	4	11	1	4	2	3	4	2	84
85	2	8	3	2	..	3	2	1	1	4	6	1	85
86	12	103	62	8	23	28	9	26	36	21	26	21	33	5	86
87	90	621	164	44	113	249	115	201	311	249	203	175	282	104	87
88	2	9	5	1	..	1	2	3	7	5	3	5	3	3	88
89	2	22	6	1	2	10	2	8	6	6	5	8	4	2	89
90	634	3 222	925	422	444	813	458	771	1 448	724	855	1 033	1 041	472	90
91	5	7	1	..	2	4	2	6	3	3	9	4	4	1	91
92	19	34	7	1	4	8	6	13	16	23	10	10	21	12	92
93	12	127	27	5	1	24	7	15	11	7	15	32	20	10	93
94	7	49	4	2	3	20	5	4	17	9	11	11	10	4	94
95	1	..	2	1	..	2	1	4	1	95
96	7	31	6	5	5	4	3	14	11	10	6	9	6	6	96
97	112	317	102	46	83	129	126	261	346	208	145	180	66	76	97
98	4	27	3	2	6	13	4	9	16	14	7	14	8	3	98
99	41	266	77	16	22	53	24	51	77	51	56	37	63	30	99
100	..	6	1	1	1	3	..	2	4	2	2	3	..	3	100
101	1	11	5	3	3	4	5	2	1	5	4	101
102	11	92	10	9	8	26	10	24	103	32	22	73	21	8	102
103	3	4	2	1	2	..	3	1	2	..	103
104	558	3 601	480	252	369	1 107	397	752	2 009	611	863	2 162	869	571	104
105	16	125	23	12	16	27	11	34	58	33	30	30	47	15	105
106	10	1	1	10	..	4	..	4	..	106

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,
A — Per

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA					T O				
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELLE EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
74	Malattie degli occhi (a)
75	Malattie degli orecchi (a)	2	12	4	4	5	5	3	12	1	2
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	4	16	10	6	4	6	3	12	1	3
77	Bronchite acuta	597	484	465	275	189	413	413	884	148	151
78	Bronchite cronica	64	71	60	52	53	47	54	142	19	23
79	Malattie della pleura (a)	23	23	28	15	16	22	25	77	5	18
80	Congestione e apoplezia polmonare	4	9	6	2	4	9	5	20	2	1
81	Polmonite crupale	228	338	230	216	189	284	234	941	73	120
82	Bronco polmonite acuta	347	562	495	424	249	440	389	1 545	131	297
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	4	4	6	2	7	7	1	9	1	2
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	..	5	5	3	3	1	1	2	..	1
85	Morbo di Basedow	..	2	..	1	1	2	..	3	1	..
86	Asma, enfisema polmonare	10	23	29	21	14	15	12	32	6	6
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	102	112	133	90	98	82	63	477	31	74
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	1	4	1	4	3	..	1	4	2	1
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	2	7	5	4	..	3	7	8	1	2
90	Malattie del cuore	479	608	569	581	381	561	468	1 684	190	251
91	Malattie del pericardio	4	4	1	..	1	3	2	4
92	Angina pectoris	13	12	9	13	10	9	10	53	6	3
93	Sincope (b)	4	7	17	21	4	16	4	32	7	10
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	9	6	12	6	5	7	9	26	2	1
95	Orecchioni	..	2	1	2	2	3
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	2	6	3	6	6	2	..	15	3	2
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	114	69	117	52	49	78	53	137	14	20
98	Ulcera rotonda dello stomaco	11	5	8	7	5	6	8	35	5	4
99	Epatite, cirrosi epatica	43	36	25	28	35	34	20	100	37	16
100	Atrofia gialla acuta del fegato	2	1	2	2	5
101	Calcoli biliari	..	2	3	..	2	2	2	14	1	2
102	Ittero	17	30	13	8	6	18	7	42	4	2
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	..	2	1	1	..	3
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	600	647	396	438	363	703	891	1 723	237	172
105	Volvolo, occlusione intestinale	15	24	20	21	15	22	13	51	7	7
106	Tumori intestinali e addominali (a)	..	3	..	1	1	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto..

classificati secondo 168 cause di morte,
provincie.

Numero dell'elenco nosologico	S C A N A				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'elenco nosologico
	LIVORNO	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PERUGIA	PERUGIA	ROMA	AQUILA DELLA ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
74	1	2	
75	8	1	12	3	2	4	3	2	12	27	9	..	6	2	
76	5	3	2	1	10	5	4	7	8	20	7	4	4	11	
77	255	207	273	274	484	326	279	412	896	959	384	474	346	245	
78	53	26	72	61	46	46	33	37	110	244	72	120	156	59	
79	28	14	25	24	14	22	10	13	47	138	23	22	23	18	
80	3	2	4	4	7	3	4	3	8	36	5	5	5	9	
81	244	219	210	116	163	174	118	131	467	1 290	395	431	403	178	
82	493	334	404	267	355	330	216	336	608	1 777	441	403	526	262	
83	8	4	8	2	2	3	..	3	6	44	1	14	4	1	
84	1	1	1	1	5	6	3	2	2	1	
85	1	1	4	2	1	
86	17	6	9	16	17	37	34	28	34	97	23	43	80	96	
87	164	32	127	114	72	49	54	47	138	738	90	90	96	81	
88	4	..	2	3	1	2	14	3	1	2	2	
89	2	2	7	8	3	4	3	2	9	3	2	5	5	3	
90	570	419	532	373	596	559	517	494	1 407	2 209	860	774	639	524	
91	2	1	3	2	1	3	5	9	1	5	4	1	
92	91	4	15	10	6	5	8	10	16	61	18	14	18	16	
93	9	9	13	17	10	10	12	8	32	59	20	16	16	14	
94	3	11	4	3	6	6	3	6	18	43	3	32	21	8	
95	..	1	3	1	2	..	4	3	..	4	1	1	
96	7	12	3	1	9	1	1	9	14	39	6	16	20	11	
97	36	80	32	45	77	53	46	81	128	234	91	94	126	86	
98	8	6	8	7	7	2	10	9	18	41	10	3	6	5	
99	54	22	27	24	44	27	24	30	58	203	40	48	65	36	
100	2	1	1	4	1	2	3	3	..	3	3	..	
101	2	2	2	..	3	5	27	5	..	3	..	
102	11	8	4	10	17	5	5	23	20	70	18	6	9	22	
103	..	3	..	2	2	..	1	..	1	7	2	1	1	..	
104	438	690	613	387	683	715	651	494	1 637	2 973	1 247	1 364	1 119	807	
105	13	10	28	16	18	12	14	13	46	73	26	36	31	17	
106	2	..	4	12	..	1	

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
74	Malattie degli occhi (a)	6	2
75	Malattie degli orecchi (a)	2	2	10	19	7	7	10	9	7	8
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	10	6	22	22	11	24	16	32	13	13
77	Bronchite acuta	489	461	1 001	2 144	938	3 006	1 018	1 911	913	735
78	Bronchite cronica	127	75	225	433	192	451	244	317	167	91
79	Malattie della pleura (a)	29	18	93	226	43	192	43	72	33	51
80	Congestione e apoplezia polmonare	4	6	2	8	12	17	9	18	7	7
81	Polmonite crupale	477	367	1 319	2 235	838	1 370	808	981	529	692
82	Bronco polmonite acuta	649	324	1 312	3 218	1 100	1 750	779	1 195	590	474
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	2	3	19	20	30	47	11	23	15	4
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	1	2	4	2	3	1	2	2
85	Morbo di Basedow	1	6	1	1	1
86	Asma, enfisema polmonare	35	35	59	48	56	50	31	51	63	52
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	119	61	176	410	176	153	61	145	80	87
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	2	12	4	4	1	5	..	1
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangioite, adenite)	1	4	8	8	6	6	4	3	4	..
90	Malattie del cuore	892	615	1 710	2 437	1 121	1 581	759	1 379	1 040	877
91	Malattie del pericardio	1	2	9	4	3	18	5	9	8	11
92	Angina pectoris	12	10	34	120	18	28	11	20	26	20
93	Sincope (b)	16	17	32	56	16	25	20	24	22	9
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	16	7	25	59	17	46	28	59	15	25
95	Orecchioni	3	2	..	7	3	2	4	2
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	9	6	17	16	18	15	25	16	21	11
97	Malattie dello stomaco, atropia (a)	129	115	304	498	173	661	214	425	155	119
98	Ulcera rotonda dello stomaco	3	8	21	30	6	5	6	15	12	12
99	Epatite, cirrosi epatica	57	36	136	281	81	143	91	152	83	91
100	Atrofia gialla acuta del fegato	2	1	1	4	4	1	4	2	2	1
101	Calcoli biliari	1	1	3	12	1	6	2	3	2	3
102	Ittero	24	10	34	54	26	26	16	26	15	9
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	4	2	3	11	..	2	1	..
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 288	740	2 238	4 209	2 034	1 987	2 256	4 156	2 474	1 248
105	Volvo, occlusione intestinale	25	30	44	91	53	87	30	70	45	26
106	Tumori intestinali e addominali (a)	4	10	1	6	2	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Esclusa la sincope da parto.

Numero dell'elenco nosologico	CALABRIE		SICILIA							SARDEGNA		
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
74	1	..	1	..	1	1	74
75	8	3	4	7	5	5	11	2	6	3	5	75
76	11	8	8	19	21	18	11	7	8	15	7	76
77	646	894	1 164	2 295	833	650	1 181	1 032	529	667	333	77
78	145	73	130	268	111	112	199	111	50	174	100	78
79	37	32	76	58	48	49	119	19	50	62	33	79
80	7	6	7	8	4	7	14	6	6	11	4	80
81	464	597	536	1 053	450	571	1 182	595	402	810	427	81
82	514	608	656	983	521	605	805	744	412	532	338	82
83	7	7	3	12	2	6	7	2	8	16	13	83
84	1	1	..	2	..	1	3	1	1	84
85	1	1	..	1	2	1	85
86	57	36	34	42	27	26	48	22	12	50	22	86
87	94	57	60	92	66	54	130	58	38	85	105	87
88	1	1	3	2	1	2	2	2	..	2	5	88
89	2	3	1	4	3	1	4	1	4	5	2	89
90	841	794	570	1 032	604	922	1 455	545	423	802	361	90
91	2	3	4	7	3	3	3	3	2	14	3	91
92	21	25	13	15	7	20	40	13	8	10	8	92
93	19	7	6	10	9	5	21	5	17	14	13	93
94	14	17	35	47	49	12	36	58	22	10	4	94
95	3	2	2	1	4	1	2	2	5	2	1	95
96	13	8	15	20	10	5	14	14	15	16	18	96
97	82	164	214	320	316	76	218	313	107	192	117	97
98	9	14	8	19	3	15	10	6	6	9	3	98
99	88	72	70	156	54	68	129	89	60	127	36	99
100	1	1	2	1	2	1	3	1	..	4	2	100
101	5	1	1	6	4	4	8	..	2	1	1	101
102	16	25	22	24	15	26	29	32	12	46	14	102
103	3	4	1	2	3	2	7	4	1	7	1	103
104	1 317	1 483	1 450	3 942	1 768	1 314	2 130	2 620	1 115	1 640	944	104
105	31	20	20	37	26	33	41	26	22	23	20	105
106	2	..	3	3	..	1	16	1	8	106

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA		LOM			
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
107	Ernie intestinali e addominali	20	26	31	82	67	4	25	29	20	11
108	Malattie da echinococco.	1	1	..	1	1
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e altri parassiti intestinali	10	20	15	6	14	..	52	25	17	10
110	Appendicite	18	6	26	44	13	2	10	13	13	11
110a	Peritonite	69	52	70	162	133	8	86	74	79	54
111	Idrope-ascite	17	12	6	30	4	2	9	6	10	1
112	Malattie dei reni (a)	234	182	325	554	378	56	238	217	261	143
113	Id. della vescica (a)	36	30	32	80	64	10	16	24	35	12
114	Calcoli renali e vescicali.	4	2	8	8	3	3	..	1	2
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	16	19	18	51	37	5	7	14	15	8
116	Id. delle capsule suprarenali	5	1	..	8	7	..	2	1	..	4
117	Id. dei testicoli (a)
118	Id. dell'ovaia (a)	1	1
119	Id. dell'utero e vagina (b)	10	8	14	29	20	2	8	18	14	6
120	Id. delle mammelle (b).	1
121	Metrorragia dopo il parto	4	25	10	10	13	5	16	16	3	4
122	Distocia	3	11	1	2	3	10	3	1
123	Eclampsia puerperale	7	7	9	6	1	2	5	8	2
124	Febbre puerperale.	10	20	19	23	21	3	13	17	11	7
125	Pelvi e metropertontite puerperale	3	3	3	4	..	1	5	6	1
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	5	4	2	2	5	..	5	2	1	1
127	Flemmone, ascesso (a)	23	23	22	34	39	2	32	22	30	30
128	Cangrena della pelle	1	2	1	1	1	4	..	1
129	Elefantiasi degli arabi	2	1
130	Favo, foruncoli.	2	1	2	4	3	..	2	3	3	1
131	Pemfigo, eczema, ectima	8	11	7	21	21	..	15	10	12	8
132	Sclerema.	12	3	10	12	9	..	21	41	43	30
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	15	9	22	32	45	3	30	23	19	13
134	Reumatismo articolare acuto	26	19	26	49	38	4	19	24	23	7
135	Id. cronico	19	28	10	34	23	8	8	20	25	18
136	Psoite.	1	1
137	Atrofia muscolare progressiva	1	1	4	2	..	2	..	2	..
138	Alcolismo cronico	25	11	20	28	31	2	9	11	9	2
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	1	3	..	2	7	1	1	..	2	..

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
 (b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

Numero dell'Elenco nosologico	B A R D I A				V E N E T O							E M I L I A			
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
107	10	50	18	4	7	8	9	12	16	13	14	18	27	7	107
108	1	1	..	1	1	..	108
109	21	34	10	10	30	38	55	36	37	21	21	14	40	50	109
110	10	45	6	3	3	7	2	11	15	15	15	8	10	3	110
110a	35	204	60	15	28	55	29	47	102	62	55	116	88	29	110a
111	4	16	11	1	5	3	8	1	6	1	1	3	111
112	100	723	215	47	48	156	73	178	301	225	138	191	163	93	112
113	13	58	43	6	7	27	13	22	20	15	27	28	27	14	113
114	..	6	3	1	4	1	1	..	2	2	..	4	114
115	10	48	10	9	3	11	4	20	16	17	16	11	15	12	115
116	2	7	3	1	4	5	2	1	3	5	4	116
117	117
118	1	118
119	7	27	6	1	5	2	2	8	17	7	10	7	5	3	119
120	..	1	120
121	7	11	8	2	1	6	7	11	10	6	7	21	8	1	121
122	3	7	1	..	1	..	2	1	3	2	2	..	122
123	4	19	3	2	1	3	3	4	21	5	5	9	6	1	123
124	10	73	15	2	6	7	9	7	18	8	9	14	8	5	124
125	1	3	3	1	1	2	2	5	6	3	1	3	5	..	125
126	1	3	1	..	2	1	..	1	4	..	4	3	2	1	126
127	24	107	23	9	10	22	19	22	47	25	24	26	36	8	127
128	..	1	1	1	1	1	1	2	1	128
129	1	1	129
130	1	7	3	1	1	6	..	1	4	4	3	2	4	1	130
131	2	29	3	..	3	14	4	6	6	9	7	10	10	8	131
132	34	70	15	13	35	18	6	5	16	20	11	14	132
133	8	106	10	5	1	13	11	26	18	15	12	6	27	12	133
134	18	62	21	4	9	21	12	21	37	17	17	21	35	8	134
135	2	34	9	5	7	5	4	4	10	9	15	10	20	3	135
136	1	..	2	136
137	..	3	2	2	2	2	..	1	1	..	137
138	5	32	12	2	11	14	5	20	22	13	18	17	9	1	138
139	1	5	1	1	1	..	1	3	2	139

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA						T O			
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO
107	Ernie intestinali e addominali	5	12	8	11	6	8	12	36	2	4
108	Malattie da echinococco.	1	1	..	1	7	1	1
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e altri parassiti intestinali.	26	29	4	19	18	19	20	20	3	..
110	Appendicite	6	6	6	6	3	4	2	19	2	5
110a	Peritonite	45	51	33	44	25	44	21	72	14	13
111	Idrope-ascite	5	3	6	1	2	1	6
112	Malattie dei reni (a)	128	130	97	88	73	146	84	411	42	43
113	Id. della vescica (a)	8	15	21	12	11	7	18	68	5	9
114	Calcoli renali e vescicali	2	1	3	..	1	1	4	..	1
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	13	8	22	11	11	..	3	30	1	9
116	Id. delle capsule surrenali	1	2	1	2	..	2	1	8
117	Id. dei testicoli (a)	1
118	Id. dell'ovaia (a)	1	1
119	Id. dell'utero e vagina (b)	2	5	5	7	3	3	4	6	2	5
120	Id. delle mammelle (b)
121	Metrorragia dopo il parto	3	9	9	11	4	6	7	15	3	2
122	Distocia	3	2	1	3	1	..	2	3	1	..
123	Eclampsia puerperale.	8	7	9	..	5	1	3	3	1	1
124	Febbre puerperale	2	10	9	7	1	10	10	32	2	..
125	Pelvi e metropertontite puerperale	1	2	5	2	..	2	2	3	..	1
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	2	2	1	1	..	3	..	3	1	..
127	Flemmone, ascesso (a)	9	17	31	16	2	11	14	60	7	5
128	Cangrena della pelle	2	..	1	1
129	Elefantiasi degli arabi	1
130	Favo, foruncoli	2	1	3	1	..	1	..	1	1	..
131	Pemfigo, eczema, ectima	5	10	11	4	2	5	3	27	1	2
132	Sclerema.	24	101	22	10	3	49	6	17	5	1
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	4	19	8	7	7	15	6	33	2	1
134	Reumatismo articolare acuto	2	11	12	13	7	6	10	26	5	5
135	Id. cronico	2	6	14	4	5	5	7	16	7	6
136	Psoite.
137	Atrofia muscolare progressiva.	1	1	2
138	Alcoolismo cronico	2	4	3	8	1	10	6	6	..	1
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	1	1

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

SCANA				MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE				Numero dell'Elenco nosologico
LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	PESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	CHIETI	TERAMO	
9	5	17	11	10	7	13	9	35	61	15	17	19	7	107
..	..	2	2	2	..	2	..	1	11	2	..	1	..	108
2	10	2	3	15	4	17	10	27	23	5	13	7	9	109
10	2	9	5	9	9	3	5	17	58	6	8	8	3	110
48	16	30	14	33	24	22	31	63	135	23	41	36	28	110a
2	1	3	3	1	2	2	..	3	15	4	5	1	6	111
158	85	96	68	144	116	114	126	250	902	195	249	222	147	112
20	10	19	14	17	16	10	13	35	57	21	19	27	19	113
1	..	3	..	3	1	4	6	1	4	..	1	114
9	4	15	5	8	6	4	7	16	50	10	5	5	4	115
1	1	1	6	..	2	..	1	5	9	4	2	3	5	116
..	1	..	2	117
..	118
1	5	2	4	1	4	6	2	6	25	7	9	5	6	119
..	1	1	..	120
3	6	6	2	6	2	5	9	13	10	7	4	3	7	121
..	2	2	1	3	1	3	4	3	4	6	5	122
5	4	2	1	3	2	2	8	13	9	3	3	9	4	123
9	9	4	6	5	3	4	5	19	37	13	10	9	8	124
..	2	1	1	1	2	..	3	4	2	1	..	4	..	125
..	1	2	7	8	3	4	2	2	126
24	9	7	11	12	7	19	12	35	77	13	15	30	19	127
1	1	1	1	..	3	3	7	1	..	3	2	128
..	1	..	129
..	2	1	..	1	2	3	10	1	3	1	1	130
3	2	3	2	3	4	1	..	9	22	2	4	9	14	131
3	4	5	5	5	2	4	5	21	17	7	13	8	1	132
18	11	13	6	9	4	6	13	10	34	2	8	1	4	133
10	4	14	12	12	6	7	12	32	48	14	13	10	5	134
10	8	9	7	1	6	9	4	11	19	28	19	10	9	135
..	1	1	..	1	136
1	1	1	..	1	1	3	2	2	137
3	2	9	2	8	4	8	8	5	31	3	..	3	5	138
1	1	3	1	1	2	..	2	1	..	139

Segue TAV. I. — Merti, durante l'anno 1916,
A — Per

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CATANZARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
107	Ernie intestinali e addominali	27	13	42	122	28	106	39	72	40	28
108	Malattie da echinococco	1	..	6	2	3	..	7	2	..
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma e altri parassiti intestinali	22	13	29	15	22	46	25	72	14	16
110	Appendicite	4	5	13	44	8	26	5	10	6	8
110a	Peritonite	33	28	60	127	60	120	37	58	57	58
111	Idrope-ascite	6	5	21	28	7	27	15	15	14	11
112	Malattie dei reni (a)	175	172	404	1 222	327	837	231	428	346	214
113	Id. della vescica (a)	31	12	50	122	62	49	21	40	45	24
114	Calcoli renali e vescicali	3	2	1	8	1	2	1	4	2	3
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	3	1	10	22	6	3	6	10	5	8
116	Id. delle capsule surrenali	2	..	1	4	3	5	3	4	2	..
117	Id. dei testicoli (a)	1	1	1	1	1	..
118	Id. dell'ovaia (a)	2
119	Id. dell'utero e vagina (b)	6	4	10	28	11	12	4	9	4	10
120	Id. delle mammelle (b)	1
121	Metrorragia dopo il parto	6	6	18	26	12	16	5	22	5	10
122	Distocia	4	2	3	2	6	1	2	5	7	4
123	Eclampsia puerperale	3	1	5	15	4	14	7	11	6	3
124	Febbre puerperale	9	7	11	26	14	12	12	13	9	20
125	Pelvi e metropertontite puerperale	3	1	7	7	3	1	5	2	6	5
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	2	2	3	4	2	7	4	3	8
127	Flemmone, ascesso (a)	15	15	39	101	41	70	28	49	26	44
128	Cangrena della pelle	1	1	2	9	..	1	2	..	2	..
129	Elefantiasi degli arabi
130	Favo, foruncoli	3	1	2	6	2	4	5	7	1	1
131	Pemfigo, eczema, ectima	4	4	11	12	15	8	8	18	12	2
132	Sclerema	13	7	21	56	23	204	35	33	29	9
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	8	4	13	28	16	23	7	15	11	7
134	Reumatismo articolare acuto	8	12	30	36	17	23	23	18	25	15
135	Id. cronico	15	9	16	25	19	19	21	11	26	22
136	Psoite	1	2
137	Atrofia muscolare progressiva	2	..	2	3	1	2	..	1	2	2
138	Alcoolismo cronico	4	1	3	9	7	3	1	4	1	5
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	1	..	5	2	1	..	2

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.
(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

classificati secondo 168 cause di morte.
provincie.

Numero dell'Elenco nosologico	CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA	
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI	
107	31	19	18	53	21	17	39	28	17	51	19	107
108	..	1	4	4	2	..	2	..	5	3	3	108
109	10	8	23	35	6	9	7	62	14	13	5	109
110	12	6	9	16	4	6	14	10	4	5	4	110
110a	39	17	100	72	47	39	123	31	39	60	28	110a
111	14	11	9	17	9	9	22	11	3	38	5	111
112	249	297	335	535	231	230	531	372	217	303	131	112
113	30	29	24	36	19	33	50	29	28	22	13	113
114	..	3	8	7	5	1	15	7	4	7	2	114
115	12	4	1	13	2	11	13	7	5	10	15	115
116	1	3	..	1	7	..	2	2	1	116
117	2	117
118	1	2	118
119	13	5	3	8	2	5	12	6	2	5	4	119
120	1	120
121	11	16	7	21	13	11	15	8	11	20	14	121
122	14	1	2	6	2	5	4	3	..	5	1	122
123	7	3	2	5	5	3	5	5	2	4	6	123
124	17	28	10	15	5	13	17	14	6	21	9	124
125	11	2	1	5	1	1	3	4	1	3	3	125
126	6	1	2	3	5	..	1	3	..	4	4	126
127	33	32	22	35	34	19	45	24	23	29	18	127
128	2	2	4	..	1	4	1	1	2	128
129	1	1	129
130	3	..	2	4	2	3	4	3	3	6	4	130
131	6	5	11	10	1	7	5	18	9	34	8	131
132	6	8	2	3	1	2	4	7	..	1	1	132
133	7	7	5	13	4	7	19	5	7	15	4	133
134	14	19	5	13	11	7	18	6	10	19	12	134
135	23	10	6	9	15	9	11	3	7	27	23	135
136	1	1	1	..	136
137	1	2	..	1	1	..	1	2	137
138	3	3	..	2	2	5	2	1	3	13	8	138
139	1	1	139

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,

A — Per

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE				LIGURIA			LOM		
		ALESSANDRIA	CUNEO	NOVARA	TORINO	GENOVA	PORTO MAURIZIO	BERGAMO	BRESCIA	COMO	CREMONA
140	in istato d'ubriachezza		1	3	1	3	2	1	
141	per annegamento	54	42	45	64	42	11	27	76	30	46
142	per freddo	19	6	7	7	3	1	5	8	2	2
143	per insolazione	1	1
144	per fulminazione:										
	A) naturale	3	3	1	2	1	..	1	..	2	..
	B) da apparecchi elettrici	2	4	3	9	9	2	4	5	1	2
145	per caduta	65	77	81	156	139	25	66	83	56	27
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	15	6	4	19	(c) 333	1	9	5	5	..
147	per ferite da taglio	1	..	2	3	..
148	per lesioni da macchine agrarie e industriali	1	2	5	8	11	1	1	2	1	2
149	per schiacciamento	54	22	41	114	85	8	36	99	25	29
150	per violenze d'animali	1	4	1	6	2	1	1	4	1	6
151	per ustione	22	26	30	50	42	8	50	44	40	13
152	per soffocamento	1	3	1	7	3	..	7	11	5	1
153	per asfissia	13	6	5	7	11	..	15	6	3	1
154	per avvelenamenti acuti	3	1	5	5	4	..	5	4	3	..
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	2
156	per cause diverse o non determinate	1	1	5	1	..	1	1
157	Omicidio (compreso quello d'infante).	11	6	6	22	23	6	3	7	5	4
a	Per ferite riportate in guerra (b).	103	27	41	124	69	3	58	83	15	73
159	Condanna alla pena capitale
160	per annegamento	21	14	20	20	6	2	3	2	10	1
161	con arma da fuoco	22	15	9	42	44	6	8	14	11	3
162	id. da taglio	6	..	3	2	3	2	5	..	3	1
163	per impiccamento	15	20	13	33	19	6	3	11	12	5
164	per precipitazione	4	3	9	28	38	5	1	..	7	2
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	4	6	1	18	2	2	3
166	per avvelenamento	5	4	6	10	21	2	..	3	7	1
167	per asfissia	4	..	1	5	13	2	..	1
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	1
	Totale dei morti per causa determinata.	12 243	11 840	11 492	21 555	18 379	2 449	14 997	14 861	12 421	7 193
	Morti per causa ignota o non dichiarata	20	(d) 218	52	(d) 245	5	2	7	13	14	6
	TOTALE GENERALE	12 263	11 558	11 544	21 800	18 384	2 451	15 004	14 874	12 435	7 199

classificati secondo 168 cause di morte.

provincie.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	BARDIA				VENETO								EMILIA		Numero dell'Elenco nosologico (a)
	MANTOVA	MILANO	PAVIA	SONDRIO	BELLUNO	PADOVA	ROVIGO	TREVISO	UDINE	VENEZIA	VERONA	VICENZA	BOLOGNA	FERRARA	
140	..	1	1	..	1	4	2	..	1	1	140
141	30	96	40	5	13	43	17	62	60	86	32	35	34	26	141
142	3	7	5	1	4	5	5	18	11	2	6	41	9	2	142
143	..	1	1	2	1	..	2	143
144	..	2	2	1	2	2	2	..	144
	..	6	1	..	1	2	1	2	3	2	3	4	2	2	
145	31	117	41	25	40	28	15	44	112	28	42	57	44	21	145
146	1	2	..	3	1	1	..	1	10	4	10	3	4	6	146
147	..	4	..	1	..	1	..	1	4	1	1	..	147
148	2	10	2	1	1	2	6	2	148
149	8	186	21	18	26	34	5	20	50	24	47	80	45	9	149
150	1	4	3	..	2	3	1	..	5	3	7	1	5	2	150
151	16	91	21	6	13	19	13	21	26	15	11	19	32	11	151
152	2	3	1	2	2	6	10	5	3	3	1	1	152
153	3	11	4	..	25	1	..	3	17	2	1	1	3	..	153
154	1	5	1	1	..	3	..	1	13	2	3	1	..	1	154
155	..	1	1	2	155
156	1	..	2	1	1	..	1	156
157	..	18	..	3	2	4	1	5	7	3	7	6	5	3	157
a	23	509	49	3	70	139	35	87	481	134	227	1 026	229	39	158a
159	2	159
160	15	21	13	4	1	6	4	4	6	8	12	3	21	6	160
161	2	41	7	3	4	6	3	3	13	9	11	1	14	9	161
162	3	5	1	..	2	1	2	4	1	1	10	1	162
163	10	17	5	1	4	10	4	12	18	7	6	7	17	4	163
164	2	24	3	2	2	4	..	1	5	3	4	1	11	..	164
165	1	7	2	3	..	3	2	2	4	..	6	1	165
166	5	29	1	..	3	4	3	..	4	4	5	..	4	4	166
167	..	8	1	2	1	1	..	1	1	..	167
168	1	2	168
	5 820	33 058	7 527	2 681	4 699	10 226	5 162	8 889	16 434	9 384	8 610	13 187	11 317	6 331	
	6	23	18	15	5	3	4	4	34	14	2	63	47	125	
	5 826	33 081	7 545	2 696	4 704	10 229	5 166	8 893	16 468	9 398	8 612	13 250	11 364	6 456	

(a) Nell'anno 1916 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 153 dell'Elenco nosologico).
 (b) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche gli individui
 (c) Compresi 273 maschi morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.
 (d) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in piccoli centri tuttora privi di sanitario, o che distano molto

che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli e dei bombardamenti di città costiere.
 dal luogo dove questo risiede.

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,

A — Per

Numero dell'Elenco nosologico (α)	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA										T O
		FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE	GROSSETO	LIVORNO	
140	in istato d'ubriachezza	2	1	
141	per annegamento	25	27	26	21	12	20	15	32	7	15	
142	per freddo	5	1	2	1	4	1	1	
143	per insolazione	1	
144	per fulminazione :											
	A) naturale	3	2	1	1	
	B) da apparecchi elettrici	2	2	2	1	..	2	2	
145	per caduta	32	29	20	32	26	22	33	60	19	15	
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	1	5	5	..	2	4	6	7	1	2	
147	per ferite da taglio	1	1	1	1	3	
148	per lesioni da macchine agrarie e industriali	2	1	2	1	3	5	
149	per schiacciamento	13	12	13	18	10	11	15	47	5	9	
150	per violenze d'animali	1	2	1	..	3	..	1	1	3	..	
151	per ustione	17	18	19	19	10	20	19	34	5	4	
152	per soffocamento	4	4	1	4	..	4	1	..	
153	per asfissia	2	5	..	1	2	1	1	5	1	1	
154	per avvelenamenti acuti	2	2	..	1	1	..	1	4	3	..	
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	1	
156	per cause diverse o non determinate	1	1	..	
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	3	..	4	4	6	6	..	8	3	2	
158a	Ferite riportate in guerra (b)	20	42	49	36	136	70	7	163	1	19	
159	Condanna alla pena capitale	
160	per annegamento	2	6	3	3	4	8	6	24	1	1	
161	con arma da fuoco	6	4	3	2	6	4	4	20	3	7	
162	id. da taglio	1	2	2	1	1	1	3	1	3	
163	per impiccamento	6	13	7	7	5	8	2	16	1	1	
164	per precipitazione	6	2	3	3	2	1	10	2	7	
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	2	..	2	3	1	1	2	
166	per avvelenamento	1	3	4	..	1	2	..	11	..	5	
167	per asfissia	1	3	1	1	
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	2	1	
	Totale dei morti per causa determinata	6 288	7 433	5 852	4 996	4 301	6 361	5 848	18 810	2 303	2 613	
	Morti per causa ignota o non dichiarata	4	1	1	33	9	56	(c) 183	12	27	2	
	TOTALE GENERALE	6 292	7 434	5 853	5 029	4 310	6 417	6 031	18 822	2 330	2 620	

classificati secondo 168 cause di morte. provincie.

Numero dell'Elenco nosologico (α)	S C A N A				M A R C H E				U M B R I A	L A Z I O	A B R U Z Z I E M O L I S E				Numero dell'Elenco nosologico (α)
	LUCCA	MASSA E CARRARA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PICENO	MACERATA	FESARO E URBINO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOTABASSO	CHIETI	TERAMO	
140	1	2	1	140
141	16	3	13	11	19	11	12	20	27	53	11	11	12	11	141
142	1	..	1	1	1	1	..	14	1	1	..	142
143	..	2	2	2	1	5	1	1	1	..	143
144	1	2	..	3	..	3	..	1	4	11	1	6	2	2	144
	1	1	..	3	..	1	6	4	2	..	
145	34	36	36	19	29	16	36	27	66	133	29	31	46	31	145
146	5	1	3	1	3	6	4	4	6	15	4	4	3	2	146
147	1	147
148	1	..	2	..	1	2	1	1	..	3	2	1	148
149	11	21	32	9	15	11	8	13	28	84	17	12	10	8	149
150	1	2	1	1	2	7	9	7	5	..	1	150
151	18	16	12	14	18	15	14	11	63	85	24	43	40	22	151
152	1	3	1	..	1	..	1	..	3	2	..	1	152
153	1	1	1	2	2	1	1	..	5	4	1	1	153
154	1	3	3	2	0	2	3	2	1	3	1	1	154
155	1	2	155
156	2	1	3	1	..	3	2	156
157	5	..	5	1	1	2	..	7	6	45	13	10	14	5	157
158a	8	9	23	7	10	16	6	11	25	69	14	4	10	1	158a
159	1	159
160	3	1	10	8	2	..	5	4	12	19	2	6	3	3	160
161	4	3	14	3	5	2	3	4	9	28	5	3	6	1	161
162	1	..	2	..	3	1	2	8	3	1	1	..	162
163	10	2	9	10	3	2	3	3	11	20	2	2	5	1	163
164	2	1	3	4	3	3	2	1	7	29	..	5	2	1	164
165	1	..	1	1	1	1	..	165
166	2	1	2	2	..	1	1	1	8	26	2	1	3	1	166
167	2	1	1	3	1	..	1	..	167
168	1	1	168
	5 513	4 356	5 855	4 334	6 068	5 127	5 007	5 525	13 248	26 127	7 720	8 279	7 949	5 854	
	1	57	9	17	7	14	15	9	7	66	(d) 122	(d) 82	(d) 118	59	
	5 514	4 413	5 864	4 351	6 075	5 141	5 022	5 534	13 255	26 193	7 842	8 361	8 067	5 918	

(a) Nell'anno 1916 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico).

(b) Veggasi la nota (b) a pag. 26.

(c) Essendo andate smarrite 102 schede spedite dal Comune di Cortona riferentisi al terzo trimestre dell'anno 1916, furono richiesti e inviati

(d) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in piccoli centri tuttora privi di sanitario, o che distano molto

dal luogo dove questo risiede. I duplicati di dette schede, sulle quali, però, non fu possibile specificare la causa di morte dei singoli individui.

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	CAMPANIA					PUGLIE			BASILICATA	CANTANARO
		AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	NAPOLI	SALERNO	BARI DELLE PUGLIE	FOGGIA	LECCE	POTENZA	
140	in istato d'ubriacchezza	1	2	2	1	..	2
141	per annegamento	13	7	30	31	25	26	11	38	14	13
142	per freddo	1	4	3	3	2	3	..
143	per insolazione	1	..	4	2	4	12	5	..
144	per fulminazione:										
	A) naturale	5	1	6	3	8	5	10	11	7	4
	B) da apparecchi elettrici	1	4	3
145	per caduta	32	24	67	147	65	91	30	58	..	33
146	per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	8	4	8	13	5	3	8	11	5	8
147	per ferite da taglio	1	1	1
148	per lesioni da macchine agrarie ed industriali	3	5	..	1	..	2	3	..
149	per schiacciamento	13	5	45	108	24	44	12	42	48	14
150	per violenze d'animali	2	1	3	3	..	3	4	4	7	1
151	per ustione	61	44	99	95	80	55	41	55	75	46
152	per soffocamento	4	4	1	2	..	1	1	1
153	per asfissia	6	..	2	3	2	6	5	5	..	1
154	per avvelenamenti acuti	1	1	3	7	2	2	1	8
155	per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	..	2	..	1	1
156	per cause diverse o non determinate	1	..	2	1	1
157	Omicidio (compreso quello d'infante)	14	8	35	69	22	23	29	17	25	33
158a	Per ferite riportate in guerra (b)	2	1	36	36	12	37	8	21	..	24
159	Condanna alla pena capitale
160	per annegamento	5	5	9	5	2	18	9	10	7	..
161	con arma da fuoco	3	1	11	31	10	8	2	7	6	2
162	id. da taglio	1	..	1	2	2	..	1	1	..	1
163	per impiccamento	2	4	8	2	3	5	2	3	1
164	per precipitazione	1	..	5	26	2	8	1	1	5	1
165	per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tramways, ecc.	1	1	1	1
166	per avvelenamento	1	2	8	53	1	6	3	..	4	4
167	per asfissia
168	con altro mezzo o con mezzo non determinato	2	2	4
	Totale dei morti per causa determinata	8 118	5 435	17 133	30 723	13 265	22 977	12 228	20 876	12 202	9 300
	Morti per causa ignota o non dichiarata	14	9	(c) 167	100	74	7	43	45	(c) 182	(c) 163
	TOTALE GENERALE	8 132	5 444	17 300	30 823	13 339	22 984	12 271	20 921	12 384	9 472

(a) Nell'anno 1916 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell'Elenco nosologico).
 (b) Veggasi la nota (b) a pag. 26.
 (c) Questi decessi si riferiscono a persone morte senza assistenza medica in piccoli centri tuttora privi di sanitario, o che distano molto

Numero dell'Elenco nosologico (a)	CALABRIE		SICILIA								SARDEGNA		
	COSENZA	REGGIO DI CALABRIA	CALTANISSETTA	CATANIA	GIRGENTI	MESSINA	PALERMO	SIRACUSA	TRAPANI	CAGLIARI	SASSARI		
140	1	1	..	140
141	8	6	7	11	8	17	13	16	12	22	12	..	141
142	..	2	1	..	2	2	1	3	..	1	1	..	142
143	3	1	14	8	5	2	7	2	1	4	3	..	143
144	6	3	2	5	2	2	1	2	..	4	1	..	144
	1	2	1	144
145	56	33	19	47	28	49	66	28	32	37	19	..	145
146	7	7	7	10	12	3	11	5	6	2	2	..	146
147	2	..	1	147
148	..	1	1	1	1	..	148
149	18	12	24	27	16	18	20	13	4	16	10	..	149
150	1	1	4	3	2	4	7	3	3	2	5	..	150
151	71	51	23	41	35	28	40	26	5	30	22	..	151
152	..	1	1	2	..	1	..	1	152
153	2	..	6	2	62	3	3	4	3	2	2	..	153
154	4	..	6	5	4	1	7	2	1	..	1	..	154
155	1	1	155
156	1	1	156
157	19	32	37	21	77	6	72	9	66	12	14	..	157
158a	7	8	2	2	..	1	7	..	1	4	3	..	158a
159	159
160	2	1	..	11	2	4	2	7	6	6	160
161	9	1	9	24	7	11	12	7	4	4	2	..	161
162	1	1	1	1	1	1	..	2	2	..	162
163	2	1	1	6	4	8	7	5	2	2	6	..	163
164	1	4	1	3	2	5	2	..	164
165	1	2	1	165
166	1	1	6	15	2	6	12	5	1	5	2	..	166
167	1	1	167
168	2	5	1	1	168
	9 068	9 375	9 682	17 707	9 625	9 758	16 658	11 938	6 749	11 845	6 827	..	
	99	84	21	(c) 324	17	38/	92	7	3	(c) 565	(c) 397	..	
	9 167	9 459	9 703	18 031	9 642	9 796	16 750	11 940	6 752	12 430	7 224	..	

dal luogo dove questo risiede.

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,
B — Per compartimenti e

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
1	Asfissia e apoplezia nel parto	61	10	125	76	55	33
2	Idrocefalo congenito, ernie cerebrali, spina bifida, mostruosità	24	13	80	79	42	53
3	Cianosi, persistenza del foro di Botallo	43	8	74	62	47	45
4	Atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)	10	2	6	7	4	4
5	Labbro leporino	13	7	22	24	10	9
6	Atrofia congenita, immaturità	1 416	495	3 597	3 886	3 097	1 755
7	Vaiuolo	1	..	1	2	2	..
8	Morbillo	277	151	2 010	947	482	576
9	Scarlattina	65	125	76	68	93	48
10	Risipola	164	54	289	179	142	159
11	Febbre tifoidea	687	191	1 803	2 400	718	767
12	Tifo petecchiale	2	..	4	2	3	3
13	Meningite cerebro spinale epidemica	136	42	292	328	143	241
14	Difterite	214	103	469	347	256	158
15	Laringite crupale	93	26	295	240	107	78
16	Ipertosse	541	173	1 249	1 629	1 521	598
17	Influenza	479	118	867	400	341	239
18	Ebbri da malaria	9	7	22	57	35	47
19	Cachessia palustre	2	2	8	27	6	8
20	Dissenteria	1	1	..
21	Colera asiatico	1	5
22	Sifilide	75	59	143	137	106	96
23	Setticemia, pioemia	229	109	558	413	277	335
24	Pustola maligna, carbonchio	13	12	7	8	13	20
25	Moccio, cimurro	1	1	..
26	Lebbra	1	1	2	1	1	1
27	Rabbia	2	..	13	7	4	1
28	Altre malattie infettive e infezioni non determinate	3	1	3	3	6	2
29	Tubercolosi disseminata	328	1	907	826	484	572
30	Meningite tubercolare, idrocefalo acquisito	544	265	1 415	1 374	730	595
31	Tubercolosi polmonare, tisi	4 227	2 021	6 283	4 609	3 055	3 881
32	Tabes mesenterica	312	125	779	727	455	572
33	Scrofola disseminata	49	12	92	109	51	57
34	Lupus	11	6	9	13	10	9
35	Artrite fungosa, sinovite fungosa	48	24	59	45	33	40

classificati secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'Elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
11	5	4	12	35	23	5	11	15	15	310	186	496	1
11	20	15	24	78	45	15	18	94	17	301	327	628	2
13	4	15	13	29	25	1	11	27	13	227	200	427	3
..	..	1	3	10	5	3	1	9	1	49	17	66	4
5	2	10	6	19	11	..	5	19	7	92	77	169	5
1 061	653	828	1 220	1 705	1 979	346	799	2 724	675	13 901	12 335	26 236	6
..	..	1	..	6	2	..	1	8	8	16	7
140	118	819	249	1 199	812	222	262	2 390	590	5 738	5 506	11 244	8
18	13	210	411	71	48	196	295	954	3	1 420	1 274	2 694	9
41	35	102	74	125	143	37	66	148	54	921	891	1 812	10
407	261	314	506	599	502	122	364	1 034	156	5 369	5 462	10 831	11
..	1	7	17	..	1	3	3	22	24	46	12
52	43	99	54	191	85	18	68	432	31	1 339	866	2 255	13
73	51	203	133	108	65	14	80	296	51	1 415	1 206	2 621	14
58	50	52	72	298	136	36	62	138	19	1 016	744	1 760	15
438	84	189	131	218	306	86	69	354	103	3 450	4 239	7 689	16
128	100	361	257	523	634	209	396	680	187	2 834	3 085	5 919	17
10	5	136	169	132	149	354	242	947	953	2 374	1 900	4 274	18
1	2	34	14	28	147	75	50	186	196	461	325	786	19
..	1	1	1	3	4	20
..	5	10	1	11	21
17	57	179	65	388	126	23	97	217	33	1 062	756	1 818	22
121	66	165	116	214	192	27	119	421	82	1 817	1 627	3 444	23
6	11	9	6	15	21	12	25	23	19	140	80	220	24
..	1	1	2	25
..	1	6	..	8	6	14	26
..	..	5	1	16	8	2	7	15	..	57	24	81	27
1	..	2	1	..	8	2	..	1	..	19	14	33	28
186	131	175	133	273	204	36	152	467	273	2 562	2 778	5 340	29
185	114	451	222	451	444	40	124	411	192	3 903	3 654	7 557	30
586	640	1 628	889	2 489	2 125	257	889	2 828	1 201	17 867	20 041	37 908	31
194	143	204	312	709	906	94	176	367	228	2 866	3 437	6 303	32
12	10	14	29	57	61	10	34	73	65	351	384	735	33
1	2	5	3	7	3	..	7	7	2	43	52	95	34
18	10	26	7	43	26	4	13	31	15	235	207	442	35

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,
B — Per compartimenti e

Num. dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA
36	Tubercolosi delle ossa e d'altri organi	130	51	223	249	168	185
37	Morbo di Pott	85	25	144	98	54	102
38	Rachitide	77	35	353	677	446	139
39	Anemia	667	187	1 147	1 696	629	429
40	Leucemia	93	42	161	106	99	85
41	Porpora emorragica	24	4	34	19	15	24
42	Emofilia	19	6	38	31	16	13
43	Scorbuto	5	4	20	19	35	4
44	Marasmo senile	4 655	1 194	4 973	4 611	3 292	3 678
45	Pellagra	13	2	205	382	59	24
46	Gotta	18	8	33	11	15	22
47	Diabete	179	111	234	156	129	155
48	disseminati in più organi	279	101	436	268	221	225
49	dell'utero, vagina, ovaia	311	131	379	217	256	245
50	delle mammelle	107	57	163	100	77	92
51	della vescica, uretra, prostata, del pene, dei testicoli, dei reni	63	27	70	87	47	44
52	della bocca, labbra, lingua, del palato, delle fauci, della tiroide, laringe, trachea	116	57	296	180	155	99
53	dello stomaco, esofago	874	317	1 616	782	1 038	1 146
54	del fegato	275	107	452	242	332	269
55	della milza, del pancreas, intestino, peritoneo	306	109	473	266	342	407
56	delle ossa, articolazioni	41	15	45	43	35	19
57	dei centri nervosi e organi dei sensi	63	14	80	70	62	79
58	d'altri organi	198	101	298	220	189	176
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	729	358	1 569	771	538	453
60	Mielite, tabe dorsale	218	87	342	241	206	140
61	Morbo di Landry, di Friedreich, di Parkinson	41	17	52	35	29	29
62	Paralisi infantile	21	11	50	59	45	35
63	Encefalite	192	50	232	240	123	89
64	Apoplezia e congestione cerebrale	3 609	1 058	5 983	3 728	3 592	3 379
65	Tumori cerebrali e spinali (a)	5	9	32	9	5	4
66	Rammollimento cerebrale	66	23	145	47	149	95
67	Paralisi progressiva, demenza paralitica	184	88	308	130	213	90
68	Epilessia, isterismo	199	68	232	199	152	195
69	Corea	6	1	13	6	7	8
70	Tetano e trisma	53	25	87	123	45	36
71	Eclampsia infantile	610	287	1 017	1 407	685	902
72	Successioni della pazzia	4	2	9	5	1	3

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

classificati secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

MARCHÉ	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	REGNO			Num. dell'elenco nosologico
										MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
64	32	48	95	203	142	21	74	106	90	961	930	1 891	36
15	18	37	19	35	53	4	24	39	27	388	391	779	37
266	71	74	130	113	142	22	101	194	200	1 550	1 490	3 040	38
310	181	298	371	993	1 336	155	428	2 335	508	5 711	5 959	11 670	39
38	22	71	81	171	147	25	66	243	39	658	831	1 489	40
2	7	11	12	33	35	6	16	50	16	149	159	308	41
3	2	7	8	24	19	3	7	47	7	131	119	250	42
1	1	..	1	8	5	1	..	14	5	64	59	123	43
1 866	1 228	1 187	3 245	6 341	4 026	991	2 746	6 900	1 538	23 803	28 663	52 466	44
33	65	6	3	1	..	410	383	793	45
9	3	17	12	26	24	1	21	37	9	188	78	266	46
59	33	136	50	183	71	17	32	232	40	1 100	727	1 827	47
90	58	103	96	293	177	30	138	417	40	1 243	1 729	2 972	48
74	61	159	93	236	173	28	103	242	35	..	2 743	2 743	49
38	31	52	40	167	61	12	34	71	18	27	1 033	1 060	50
43	20	35	19	40	32	8	18	34	5	469	123	592	51
31	22	67	37	73	39	18	23	56	15	866	418	1 284	52
232	126	304	175	209	118	43	128	285	79	4 298	3 224	7 522	53
81	55	117	74	182	101	18	60	140	30	1 335	1 200	2 535	54
100	65	138	80	172	94	18	55	138	36	1 180	1 639	2 819	55
13	5	19	8	16	13	2	6	10	5	161	134	295	56
17	12	24	25	39	18	4	14	38	14	303	270	573	57
39	39	82	68	145	83	24	43	152	21	1 079	849	1 928	58
139	96	316	219	941	563	104	254	751	128	4 242	3 707	7 949	59
72	70	82	109	223	129	34	88	189	61	1 265	1 026	2 291	60
13	17	14	20	48	23	7	16	21	10	210	182	392	61
12	12	15	11	33	56	5	21	39	14	225	211	436	62
56	20	54	55	206	72	10	65	86	41	873	718	1 591	63
1 973	1 030	1 373	2 060	4 114	2 529	582	1 335	3 622	571	21 565	18 973	40 538	64
..	..	9	1	4	11	2	2	10	9	67	45	112	65
44	10	110	21	19	13	..	7	15	5	437	322	769	66
14	11	155	22	138	75	21	29	258	60	1 116	680	1 796	67
58	54	47	128	259	90	40	96	158	43	1 196	822	2 018	68
2	6	2	3	5	5	3	4	9	1	33	48	81	70
22	8	7	14	51	32	4	5	22	6	396	144	540	71
838	406	841	968	2 993	1 948	375	885	1 052	127	8 187	7 154	15 341	72
..	..	2	..	4	1	1	..	2	3	26	11	37	73

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,
B — Per compartimenti e

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA	REGNO													
								MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	
74	Malattie degli occhi (a)	..	1	11	1	1	1	3	6	2	3	1	9	21	30	74
75	Malattie degli orecchi (a)	76	19	92	71	47	42	11	12	27	17	40	26	7	19	40	8	350	204	554	75
76	Malattie delle fosse nasali, della trachea, della laringe (a)	49	12	159	114	63	30	26	8	20	26	71	72	13	32	92	22	476	333	809	76
77	Bronchite acuta	2 323	730	5 417	3 835	3 426	2 635	1 501	396	959	1 449	5 033	5 935	913	2 275	7 684	1 000	23 601	22 460	46 061	77
78	Bronchite cronica	856	197	919	600	503	455	162	110	244	407	1 052	1 012	167	309	981	274	3 858	4 390	8 248	78
79	Malattie della pleura (a)	244	112	505	392	205	216	59	47	138	86	409	307	33	120	419	95	2 059	1 238	3 297	79
80	Congestione ed apoplezia polmonare	63	15	143	87	55	41	17	8	36	24	32	44	7	20	52	15	395	264	659	80
81	Polmonite crupale	3 241	1 034	4 530	2 467	2 176	2 157	586	467	1 290	1 407	5 236	3 159	529	1 753	4 789	1 237	20 110	15 948	36 058	81
82	Bronco polmonite acuta	4 346	1 921	6 956	5 182	3 814	3 860	1 237	608	1 777	1 632	6 603	3 724	590	1 596	4 726	870	25 487	23 955	49 442	82
83	Polmonite cronica, cangrena polmonare	92	62	152	110	51	35	8	6	44	20	74	81	15	18	40	29	497	340	837	83
84	Malattie della tiroide e del timo (a)	29	3	61	25	23	7	1	5	6	8	12	1	2	4	6	5	89	109	198	84
85	Morbo di Basedow	19	6	30	13	13	6	..	4	2	1	8	2	..	1	2	3	18	92	110	85
86	Asma, enfisema polmonare	208	72	364	190	150	104	116	34	97	242	233	132	63	145	211	72	1 299	1 134	2 433	86
87	Malattie delle arterie e cangrena senile degli arti	933	464	1 704	1 616	1 003	1 082	222	138	738	357	942	359	80	238	498	190	6 444	4 120	10 564	87
88	Malattie delle vene, flebite, emorroidi	23	10	29	26	19	17	1	2	14	8	18	10	..	3	12	7	98	101	199	88
89	Malattie dei vasi linfatici (linfangiome, adenite)	27	16	61	47	27	37	12	9	3	15	27	13	4	5	18	7	175	153	328	89
90	Malattie del cuore	8 320	2 335	9 980	6 546	4 692	4 437	2 166	1 407	2 209	2 797	6 775	3 719	1 040	2 512	5 551	1 163	28 898	36 301	65 699	90
91	Malattie del pericardio	18	5	40	33	18	14	4	5	9	11	19	32	8	16	25	17	132	142	274	91
92	Angina pectoris	79	26	103	90	99	110	29	16	61	66	194	59	26	66	116	18	763	395	1 588	92
93	Sincope (b)	116	61	292	112	99	101	40	32	59	66	137	69	22	35	73	27	742	599	1 341	93
94	Malattie della bocca e della lingua (a)	63	14	114	80	59	59	21	18	43	64	124	133	15	56	259	14	537	599	1 136	94
95	Orecchioni	5	4	13	3	10	9	3	4	3	6	5	12	4	7	17	3	66	42	108	95
96	Malattie delle tonsille, faringe, esofago (a)	66	34	118	56	40	33	20	14	39	53	66	56	21	32	93	34	417	358	775	96
97	Malattie dello stomaco, atrepsia (a)	579	239	1 290	1 478	621	417	257	123	234	397	1 219	1 300	155	365	1 564	309	5 336	5 216	10 552	97
98	Ulcera rotonda dello stomaco	58	33	75	83	53	81	28	18	41	24	68	26	12	35	67	12	413	301	714	98
99	Epatite, cirrosi epatica	508	217	723	371	294	300	125	58	203	189	591	386	83	251	626	163	3 505	1 588	5 093	99
100	Atrofia gialla acuta del fegato	7	3	16	17	8	11	7	3	3	6	12	7	2	3	10	6	62	59	121	100
101	Calcoli biliari	29	5	29	18	18	25	3	5	27	8	18	11	2	9	25	2	69	165	234	101
102	Ittero	135	24	221	298	111	88	50	20	70	55	148	68	15	50	160	60	902	671	1 573	102
103	Malattie della milza e del pancreas (a)	9	2	20	9	6	8	3	1	7	4	9	13	1	7	20	8	64	63	127	103
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	4 184	1 765	12 479	8 270	4 592	5 201	2 543	1 637	2 973	4 537	10 509	8 399	2 474	4 043	14 339	2 584	46 106	44 428	90 534	104
105	Volvolo, occlusione intestinale	264	71	326	239	179	145	57	46	73	110	243	187	45	77	205	43	1 315	995	2 310	105
106	Tumori intestinali e addominali (a)	22	15	35	15	11	6	12	1	3	17	2	2	23	9	55	123	178	106

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari
(b) Esclusa la sincope da parto.

classificati secondo 168 cause di morte,
per il complesso del Regno.

Num. dell'Elenco nosologico	REGNO										MASCHE	FEMMINE	TOTALE dei morti	Num. dell'Elenco nosologico
	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA				
74	1	3	6	2	3	1	9	21	30	74
75	11	12	27	17	40	26	7	19	40	8	350	204	554	75
76	26	8	20	26	71	72	13	32	92	22	476	333	809	76
77	1 501	396	959	1 449	5 033	5 935	913	2 275	7 684	1 000	23 601	22 460	46 061	77
78	162	110	244	407	1 052	1 012	167	309	981	274	3 858	4 390	8 248	78
79	59	47	138	86	409	307	33	120	419	95	2 059	1 238	3 297	79
80	17	8	36	24	32	44	7	20	52	15	395	264	659	80
81	586	467	1 290	1 407	5 236	3 159	529	1 753	4 789	1 237	20 110	15 948	36 058	81
82	1 237	608	1 777	1 632	6 603	3 724	590	1 596	4 726	870	25 487	23 955	49 442	82
83	8	6	44	20	74	81	15	18	40	29	497	340	837	83
84	1	5	6	8	12	1	2	4	6	5	89	109	198	84
85	..	4	2	1	8	2	..	1	2	3	18	92	110	85
86	116	34	97	242	233	132	63	145	211	72	1 299	1 134	2 433	86
87	222	138	738	357	942	359	80	238	498	190	6 444	4 120	10 564	87
88	1	2	14	8	18	10	..	3	12	7	98	101	199	88
89	12	9	3	15	27	13	4	5	18	7	175	153	328	89
90	2 166	1 407	2 209	2 797	6 775	3 719	1 040	2 512	5 551	1 163	28 898	36 301	65 699	90
91	4	5	9	11	19	32	8	16	25	17	132	142	274	91
92	29	16	61	66	194	59	26	66	116	18	763	395	1 588	92
93	40	32	59	66	137	69	22	35	73	27	742	599	1 341	93
94	21	18	43	64	124	133	15	56	259	14	537	599	1 136	94
95	3	4	3	6	5	12	4	7	17	3	66	42	108	95
96	20	14	39	53	66	56	21	32	93	34	417	358	775	96
97	257	123	234	397	1 219	1 300	155	365	1 564	309	5 336	5 216	10 552	97
98	28	18	41	24	68	26	12	35	67	12	413	301	714	98
99	125	58	203	189	591	386	83	251	626	163	3 505	1 588	5 093	99
100	7	3	3	6	12	7	2	3	10	6	62	59	121	100
101	3	5	27	8	18	11	2	9	25	2	69	165	234	101
102	50	20	70	55	148	68	15	50	160	60	902	671	1 573	102
103	3	1	7	4	9	13	1	7	20	8	64	63	127	103
104	2 543	1 637	2 973	4 537	10 509	8 399	2 474	4 043	14 339	2 584	46 106	44 428	90 534	104
105	57	46	73	110	243	187	45	77	205	43	1 315	995	2 310	105
106	12	1	3	17	2	2	23	9	55	123	178	106

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,

B — Per compartimenti e

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	VENETO	EMILIA	TOSCANA	REGNO													
								MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE dei morti	Num. dell'Elenco nosologico
107	Ernie intestinali e addominali	159	71	167	97	84	96	39	35	61	58	232	217	40	78	193	70	924	773	1 697	107
108	Malattie da echinococco.	2	1	2	2	3	14	4	1	11	3	9	10	2	1	17	6	49	39	88	108
109	Ascaridi, tenia, anchilostoma ed altri parassiti intestinali	51	14	179	252	205	60	46	27	23	34	101	143	14	31	156	18	674	680	1 354	109
110	Appendicite	94	15	111	76	44	54	26	17	58	25	74	41	6	26	63	9	423	316	739	110
110a	Peritonite	353	141	607	494	362	228	110	63	135	128	308	215	57	144	451	88	1 769	2 115	3 884	110a
111	Idrope-ascite	65	6	58	24	21	16	5	3	15	16	67	57	14	36	80	43	258	268	526	111
112	Malattie dei reni (a)	1 295	434	1 944	1 310	918	987	500	250	902	813	2 300	1 496	346	760	2 451	434	8 696	8 444	17 140	112
113	Id. della vescica (a)	178	74	207	159	115	163	56	35	57	86	277	110	45	83	219	35	1 685	214	1 899	113
114	Calcoli renali e vescicali	14	11	16	10	11	10	4	4	6	6	15	7	2	6	47	9	147	33	178	114
115	Malattie dell'uretra e prostata (a)	104	42	121	98	92	76	25	16	50	24	42	19	5	24	52	25	801	14	315	115
116	Id. delle capsule surrenali	14	7	19	16	17	18	3	5	9	14	10	12	2	..	14	3	95	68	163	116
117	Id. dei testicoli (a)	1	1	2	1	3	1	..	2	..	11	..	11	117
118	Id. dell'ovaia (a)	1	..	1	1	2	2	1	2	..	10	10	118
119	Id. dell'utero e vagina (b)	61	22	87	58	33	29	13	6	25	27	59	25	4	28	38	9	..	524	524	119
120	Id. delle mammelle (b)	1	..	1	1	1	1	1	..	2	4	6	120
121	Metrorragia dopo il parto	49	18	67	69	51	44	22	13	10	21	68	43	5	37	86	34	..	637	637	121
122	Distocia	17	..	28	9	12	8	7	3	4	18	17	8	7	19	23	6	..	186	186	122
123	Eclampsia puerperale	23	7	45	51	37	20	15	13	9	19	28	32	6	13	27	10	..	355	355	123
124	Febbre puerperale	72	24	148	78	52	72	17	19	37	40	61	37	9	65	80	30	..	841	841	124
125	Pelvi e metropertoneite puerperale	9	4	21	23	17	10	6	4	2	5	21	8	6	18	16	6	..	176	176	125
126	Sincope da parto e altre malattie puerperali	13	5	14	15	12	4	3	7	8	11	11	13	3	15	14	8	..	156	156	126
127	Flemmone, ascesso (a)	102	41	277	195	130	137	50	35	77	86	211	147	26	109	202	47	1 144	728	1 872	127
128	Cangrena della pelle	3	2	8	4	6	4	4	3	7	6	13	3	2	4	10	3	43	39	82	128
129	Elefantiasi degli arabi	3	..	1	..	1	1	1	2	..	5	4	9	129
130	Favo, foruncoli	9	3	21	21	13	5	3	3	10	6	14	16	1	4	21	10	101	59	160	130
131	Pemfigo, eczema, ectima	47	21	79	59	55	43	8	9	22	29	46	34	12	13	61	42	330	250	580	131
132	Sclerema	37	9	254	113	234	46	16	21	17	29	120	272	29	23	19	2	686	555	1 241	132
133	Malattie delle ossa e osteomalacia (a)	78	48	219	102	99	90	32	10	34	15	69	45	11	21	60	19	539	413	952	133
134	Reumatismo articolare acuto	120	42	178	155	94	86	37	32	48	42	103	64	25	48	70	31	609	566	1 175	134
135	Id. cronico	91	31	121	64	59	70	20	11	19	66	84	51	26	55	60	50	328	550	878	135
136	Psoite	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	7	7	14	136
137	Atrofia muscolare progressiva	6	2	9	7	3	5	1	1	3	4	8	3	2	3	4	3	40	24	64	137
138	Alcoolismo cronico	84	33	82	120	38	29	28	5	31	11	24	8	1	11	15	21	489	52	541	138
139	Avvelenamento cronico accidentale e professionale	6	8	10	8	2	2	4	1	2	3	8	3	2	..	36	23	59	139

classificati secondo 168 cause di morte.

per il complesso del Regno.

Num. dell'Elenco nosologico	REGNO										MASCHE	FEMMINE	TOTALE dei morti	Num. dell'Elenco nosologico
	MARCHE	UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE	CAMPANIA	PUGLIE	BASILICATA	CALABRIE	SICILIA	SARDEGNA				
107	39	35	61	58	232	217	40	78	193	70	924	773	1 697	107
108	4	1	11	3	9	10	2	1	17	6	49	39	88	108
109	46	27	23	34	101	143	14	31	156	18	674	680	1 354	109
110	26	17	58	25	74	41	6	26	63	9	423	316	739	110
110a	110	63	135	128	308	215	57	144	451	88	1 769	2 115	3 884	110a
111	5	3	15	16	67	57	14	36	80	43	258	268	526	111
112	500	250	902	813	2 300	1 496	346	760	2 451	434	8 696	8 444	17 140	112
113	56	35	57	86	277	110	45	83	219	35	1 685	214	1 899	113
114	4	4	6	6	15	7	2	6	47	9	147	33	178	114
115	25	16	50	24	42	19	5	24	52	25	801	14	315	115
116	3	5	9	14	10	12	2	..	14	3	95	68	163	116
117	1	2	1	3	1	..	2	..	11	..	11	117
118	2	1	2	..	10	10	118
119	13	6	25	27	59	25	4	28	38	9	..	524	524	119
120	1	1	1	1	..	2	4	6	120
121	22	13	10	21	68	43	5	37	86	34	..	637	637	121
122	7	3	4	18	17	8	7	19	23	6	..	186	186	122
123	15	13	9	19	28	32	6	13	27	10	..	355	355	123
124	17	19	37	40	61	37	9	65	80	30	..	841	841	124
125	6	4	2	5	21	8	6	18	16	6	..	176	176	125
126	3	7	8	11	11	13	3	15	14	8	..	156	156	126
127	50	35	77	86	211	147	26	109	202	47	1 144	728	1 872	127
128	4	3	7	6	13	3	2	4	10	3	43	39	82	128
129	1	2	..	5	4	9	129
130	3	3	10	6	14	16	1	4	21	10	101	59	160	130
131	8	9	22	29	46	34	12	13	61	42	330	250	580	131
132	16	21	17	29	120	272	29	23	19	2	686	555	1 241	132
133	32	10	34	15	69	45	11	21	60	19	539	413	952	133
134	37	32	48	42	103	64	25	48	70	31	609	566	1 175	134
135	20	11	19	66	84	51	26	55	60	50	328	550	878	135
136	..	1	1	1	1	2	2	1	7	7	14	136
137	1	1	3	4	8	3	2	3	4	3	40	24	64	137
138	28	5	31	11	24	8	1	11	15	21	489	52	541	138
139	4	1	2	3	8	3	2	..	36	23	59	139

(a) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari.

(b) Escluse le affezioni cancerose e tubercolari e quelle dipendenti da gravidanza, parto e puerperio.

Segue TAV. I. — Morti, durante l'anno 1916,
B — Per compartimenti e

Table with columns: CAUSE DI MORTE, PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA, TOSCANA. Rows include causes like 'in istato d'ubriachezza', 'per annegamento', etc., and a 'TOTALE GENERALE' row at the bottom.

classificati secondo 168 cause di morte.
per il complesso del Regno.

Table with columns: MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIE, SICILI, SARDEGNA, MASCHI, FEMMINE, TOTALE dei morti, and a final column for 'Num. dell'Elenco nosologico (c)'. Rows correspond to the causes listed on page 40.

(a) Nell'anno 1916 non si verificarono nel Regno casi di morte per « ferite riportate in duello » (n. 158 dell' Elenco nosologico).
(b) Veggasi la nota (b) a pag. 26.
(c) Compresi 273 maschi morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.

TAV. II. — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1916, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

Avvertenza. — Le 168 voci dell'elenco nosologico, che ha servito di base alla classificazione particolareggiata delle cause di morte contenuta nella Tav. I, sono state qui riassunte in 54, raggruppando insieme le specificazioni di alcune forme morbose o di morte violenta, o riunendo sotto l'unica e generica voce di « *altre malattie* » quelle meno frequenti o meno caratteristiche per lo studio delle condizioni sanitarie del Regno.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
		1 a 5.	Malattie fetali e vizi congeniti	304	229	228	200	220	178	227	200	979
6	Atrofia congenita, immaturità	5 386	4 993	2 922	2 387	2 534	2 243	3 059	2 712	13 901	12 335	26 236
39	Anemia	1 292	1 348	1 356	1 380	1 838	1 884	1 225	1 347	5 711	5 959	11 670
40	Leucemia	173	190	172	211	187	231	126	199	658	831	1 489
44	Marasmo senile	7 901	9 375	4 813	5 983	5 135	6 200	5 954	7 105	23 803	28 663	52 46
97	Malattie dello stomaco, atrespia	1 234	1 121	1 295	1 271	1 744	1 806	1 063	1 018	5 336	5 216	10 552
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	5 888	5 563	10 066	9 377	21 836	21 583	8 316	7 905	46 106	44 423	90 534
20	Dissenteria.	1	1	..	1	..	1	1	3	4
99	Epatite, cirrosi epatica. . .	852	383	819	371	909	424	925	410	3 505	1 588	5 093
112	Malattie dei reni	2 455	2 431	1 963	1 844	1 981	1 931	2 297	2 235	8 696	8 444	17 140
110	Appendicite	95	84	103	80	108	89	117	63	423	316	739
110 a	Peritonite.	397	505	407	504	526	587	439	519	1 769	2 115	3 884
7	Vaiuolo	1	6	6	..	1	2	8	8	16
8	Morbillo.	2 047	1 834	2 000	1 998	1 185	1 253	506	421	5 738	5 506	11 244
9	Scarlattina.	221	201	238	219	399	356	562	498	1 420	1 274	2 694
10	Risipola	283	250	184	178	181	206	273	257	921	891	1 812
11	Febbre tifoidea	1 153	749	794	671	1 852	2 145	1 570	1 897	5 369	5 462	10 831
12	Tifo petecchiale	4	3	9	13	6	4	3	4	22	24	46
13	Meningite cerebro spinale epidemica	642	339	508	392	123	85	116	50	1 389	866	2 255
16	Ipertosse	1 198	1 425	922	1 156	949	1 144	381	514	3 450	4 239	7 689
14	Difterite	483	412	255	220	243	183	434	391	1 415	1 206	2 621
15	Laringite crupale.	400	290	159	128	174	115	283	211	1 016	744	1 760
18	Febbri da malaria	240	178	270	230	1 253	1 028	611	464	2 374	1 900	4 274
19	Cachessia palustre	80	51	84	52	157	108	140	114	461	325	786
17	Influenza	2 188	2 389	410	453	65	86	171	157	2 834	3 085	5 919
22	Sifilide	276	180	274	188	244	210	268	178	1 062	776	1 838
71	Tetano e trisma	59	12	107	45	146	60	84	27	396	144	540
24	Pustola maligna, carbonchio .	27	8	25	10	56	31	32	31	140	80	220

Segue TAV. II — Morti nel Regno in ciascun trimestre dell'anno 1916, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	1° trimestre		2° trimestre		3° trimestre		4° trimestre		Anno		
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Totale
27	Rabbia	11	3	11	8	18	5	17	8	57	24	81
124	Febbre puerperale	253	..	183	..	182	..	223	..	841	841
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	441	..	315	..	356	..	398	..	1 510	1 510
77	Bronchite acuta	10 231	9 438	5 938	5 475	3 474	3 626	3 958	3 891	23 601	22 460	46 061
78	Bronchite cronica	1 415	1 686	964	1 050	659	736	820	913	3 858	4 390	8 248
81	Polmonite crupale	8 465	6 607	4 882	3 948	2 980	2 517	3 783	2 876	20 110	15 948	36 058
82	Bronco polmonite acuta	11 582	11 075	6 286	5 766	3 570	3 376	4 049	3 738	25 487	23 955	49 442
79	Malattie della pleura	563	381	580	325	489	284	427	218	2 059	1 238	3 297
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	5 519	5 909	5 448	6 006	4 816	5 708	4 646	5 196	20 429	22 819	43 248
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	2 162	2 133	2 477	2 620	2 319	2 479	1 789	1 823	8 747	9 055	17 802
90	Malattie del cuore	8 962	12 092	6 604	8 036	6 181	7 509	7 151	9 164	28 898	36 801	65 699
87	Malattie delle arterie	1 987	1 340	1 544	938	1 331	846	1 582	996	6 144	4 120	10 564
61	Apoplessia e congestione cerebrale	6 732	5 925	4 952	4 253	4 458	3 962	5 423	4 833	21 565	18 973	40 538
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	1 310	1 114	1 135	1 030	1 005	907	792	656	4 242	3 707	7 949
63	Encefalite	224	234	180	146	224	190	245	148	873	718	1 591
72	Eclampsia infantile	2 644	2 185	2 098	1 837	1 856	1 832	1 589	1 300	8 187	7 154	15 341
134	Reumatismo articolare acuto	182	150	148	136	133	139	146	141	609	566	1 175
45	Pellagra	117	89	87	98	105	111	101	85	410	383	793
47	Diabete	343	240	238	147	214	158	275	182	1 100	727	1 827
138	Alcolismo cronico	166	18	111	15	101	13	111	6	489	52	541
48 a 53	Tumori maligni	2 306	3 134	2 643	3 276	2 902	3 596	2 810	3 356	10 961	13 362	24 323
140 a 156	per causa accidentale	1 771	902	1 854	683	2 427	842	2 271	831	8 323	3 258	11 581
157	per omicidio	160	48	189	58	219	51	180	42	748	199	947
158 a	Morte violenta per ferite riportate in guerra (a)	593	11	1 185	27	1 776	19	975	34	4 529	91	4 620
159	per condanna alla pena capitale	2	..	1	3
160 a 163	per suicidio	436	196	563	208	437	183	363	145	1 799	732	2 531
	Altre malattie	7 198	5 665	5 947	4 551	6 127	4 737	6 086	4 500	25 358	19 453	44 811
	Causa ignota o non dichiarata	592	580	425	391	674	703	533	409	2 224	2 083	4 307
	TOTALE GENERALE.	111 251	106 426	86 872	81 094	92 584	89 238	79 306	75 076	370 013	351 834	721 847

(a) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 4350), anche gli individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 165 e femmine 81) e dei bombardamenti di città costiere (maschi 14 e femmine 10).

TAV. III. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916,

(Vedasi l'avvertenza)

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI											
		Fino a 1 mese		Da 1 mese a 12 mesi		Di 1 anno		Di 2 anni		Di 3 anni		Di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
5	Malattie fetali e vizi congeniti	616	466	244	230	49	51	20	13	5	8	11	8
6	Atrofia congenita, immaturità	12 300	10 649	1 691	1 686
39	Anemia	3 373	3 283	876	952	185	232	69	76	49	43
40	Leucemia	88	75	106	109	42	33	22	14	9	12
44	Marasmo senile
97	Malattie dello stomaco, atrespia	1 040	897	2 302	2 284	741	857	225	229	97	99	63	52
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	1 894	1 459	19 354	17 534	10 249	10 421	2 823	2 932	1 165	1 247	655	750
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica	16	8	36	28	22	29	16	9	7	6	9	6
112	Malattie dei reni	71	61	487	388	537	513	423	414	309	269	202	214
110	Appendicite	9	2	2	2	3	1	2	2	9	1
110 a	Peritonite	24	15	101	83	62	69	46	43	42	36	46	40
7	Vaiuolo	3	3	2	1	..	1	1	1
8	Morbillo	14	16	870	849	2 031	1 754	1 074	1 154	691	718	326	374
9	Scarlattina	5	1	82	74	233	159	225	190	220	197	191	172
10	Risipola	128	116	173	204	23	45	8	8	7	6	3	4
11	Febbre tifoidea	4	2	68	48	98	64	90	96	91	92	99	96
12	Tifo petecchiale	1	1	1	..	1	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	69	51	69	37	54	43	55	40	58	35
16	Ipertosse	57	67	1 492	1 570	1 158	1 405	393	576	173	296	85	150
14	Difterite	2	3	108	77	315	235	243	201	221	152	175	156
15	Laringite crupale	20	5	130	73	270	166	193	158	137	127	117	88
18	Febbri da malaria	15	13	293	281	222	255	175	174	114	109	104	84
19	Cachessia palustre	48	37	65	46	36	26	13	10	7	8
17	Influenza	64	33	424	341	250	187	77	92	58	81	42	41
22	Sifilide	181	164	332	308	32	33	14	15	4	2	3	3
71	Tetano e trisma	7	2	..	1	1	2	4	..	5	2	6	..

classificati per età, sesso e per le principali cause di morte.

premessa alla Tavola II).

MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ																				Numero dell'elenco nosologico
Da 5 a 9 anni		Da 10 a 14 anni		Da 15 a 19 anni		Da 20 a 24 anni		Da 25 a 29 anni		Da 30 a 34 anni		Da 35 a 39 anni		Da 40 a 44 anni						
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine					
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine					
30	22	4	9	1 a 5				
..	6				
92	119	49	66	69	83	90	94	86	108	99	102	98	113	88	134	39				
41	37	20	26	17	44	13	40	20	62	22	57	31	49	32	52	40				
..	41				
87	99	26	44	22	27	30	28	25	23	26	31	27	27	30	21	97				
1 433	1 534	537	540	458	437	382	347	359	321	287	323	258	298	278	317	104				
..	1	20				
35	18	28	12	28	14	24	22	50	37	87	56	155	78	202	98	99				
500	442	206	194	192	217	223	232	214	300	219	363	233	363	244	401	112				
23	24	38	36	61	29	33	24	28	29	24	16	29	11	26	15	110				
167	167	128	125	141	161	126	179	89	183	80	155	79	148	90	142	116 a				
..	1	1	..	1	7				
443	510	42	50	66	30	138	14	17	13	5	7	2	6	5	2	8				
347	313	54	92	30	34	12	14	9	15	1	6	2	1	3	..	9				
15	6	11	8	16	27	29	29	26	29	33	26	28	28	33	29	10				
509	547	451	628	808	983	907	787	640	574	502	429	260	299	231	183	11				
3	..	1	1	..	4	3	3	1	2	3	..	1	..	2	5	12				
207	196	136	143	211	96	250	54	107	34	66	41	31	27	25	18	13				
79	149	4	15	2	3	3	1	..	2	1	2	1	..	16				
283	290	38	53	14	15	4	4	1	4	..	1	1	2	1	3	14				
126	105	13	11	1	5	..	5	..	2	..	1	1	..	1	..	15				
313	260	163	86	125	51	84	43	53	51	61	58	65	56	66	41	18				
24	22	18	12	12	5	12	9	6	9	15	13	19	14	18	10	19				
104	106	44	70	65	76	48	66	24	67	38	56	40	63	62	65	17				
9	1	4	2	9	10	30	18	46	25	48	26	46	25	53	25	22				
53	22	62	14	37	14	25	3	20	3	8	7	20	14	19	7	71				

Segue TAV. III. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916,

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		Da 45 a 49 anni		Da 50 a 54 anni		Da 55 a 59 anni		Da 60 a 64 anni		Da 65 a 69 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti
6	Atrofia congenita, immaturità
39	Anemia	122	139	159	171	204	233
40	Leucemia	33	46	32	40	40	45	37	33	24	29
44	Marasmo senile	568	792	1 197	1 582
97	Malattie dello stomaco, atresia	45	28	40	46	60	46	99	65	113	83
101	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	292	313	409	418	494	491	680	723	928	977
20	Dissenteria.	1	1
99	Epilite, cirrosi epatica . .	317	102	424	151	465	192	514	214	451	189
112	Malattie dei reni	351	365	405	420	518	496	692	662	790	641
110	Appendicite	21	17	18	23	22	17	30	18	14	13
110 a	Peritonite	70	90	74	92	88	86	99	92	96	74
7	Vaiuolo
8	Morbillo	2	2	5	..	1	1	2	2
9	Scarlattina	1	2	2	2	1	..	1	..
10	Risipola	36	25	33	49	48	24	66	40	64	45
11	Febbre tifoidea	159	137	125	123	92	107	87	93	60	61
12	Tifo petecchiale	2	1	..	3	..	1	1	1	1	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica	18	6	15	16	9	8	2	9	4	6
16	Ipertosse	1	1	1
14	Difterite.	1	1	3	..	2	2	2	1	1	2
15	Laringite crupale.	1	2	2	1	2	..	1	..
18	Febbri da malaria	61	49	82	41	93	53	84	64	77	47
19	Cachessia palustre	17	13	25	12	27	21	32	24	28	17
17	Influenza	58	54	87	73	115	108	159	179	221	297
22	Siflide	60	21	71	19	46	24	33	16	19	13
71	Tetano e trisma	21	12	29	11	14	9	23	5	19	5

classificati per età, sesso e per le principali cause di morte.

Numero dell'elenco nosologico	MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ												Totale generale			Numero dell'elenco nosologico		
	Da 70 a 74 anni		Da 75 a 79 anni		Da 80 a 84 anni		Da 85 a 89 anni		Da 90 anni in su		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale			
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine						
..	979	807	1 786	1 a 5
..	13 901	12 335	26 236	6
..	3	6	5 711	5 959	11 670	39	
..	19	20	7	6	3	2	658	831	1 489	40	
..	3 361	4 510	5 520	6 634	7 235	8 394	4 270	4 762	1 648	1 965	..	4	24	23 803	28 663	52 466	44	
..	93	103	83	75	39	37	12	8	2	6	1	5 336	5 216	10 552	97	
..	1 204	1 175	1 033	995	665	580	215	224	43	52	11	20	46 106	44 428	90 534	104		
..	1	1	3	4	20	
..	356	183	180	76	64	43	12	15	4	2	3	..	3 505	1 588	5 093	99		
..	817	663	637	448	292	234	104	64	24	21	6	9	8 696	8 114	17 140	112		
..	17	14	8	8	1	10	..	4	423	316	739	110		
..	54	66	43	40	16	20	6	8	1	..	1	1	1 769	2 115	3 884	110 a		
..	1	8	8	16	7		
..	..	2	1	..	2	1	1	1	5 738	5 506	11 244	8		
..	..	2	1	1 420	1 274	2 694	9		
..	60	53	47	45	23	30	9	10	2	4	..	1	921	891	1 812	10		
..	43	69	25	27	10	9	3	1	1	..	6	7	5 369	5 462	10 831	11		
..	1	1	22	24	46	12		
..	2	2	..	1	1	1	1	1 389	866	2 255	13		
..	1	1	3 450	4 239	7 689	16		
..	..	2	1	1	1 415	1 206	2 621	14		
..	1	1 016	744	1 760	15		
..	74	38	30	27	17	13	3	4	1	2	1	..	2 374	1 900	4 274	18		
..	20	12	11	2	2	3	1	..	461	325	786	19		
..	302	351	253	316	207	232	70	106	22	21	..	4	2 834	3 085	5 919	17		
..	14	1	7	3	..	1	..	1	1	1 062	756	1 818	22		
..	15	5	6	4	2	1	..	1	396	144	540	71		

Segue TAV. III. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916.

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI												
		Fino a 1 mese		Da 1 mese a 12 mesi		Di 1 anno		Di 2 anni		Di 3 anni		Di 4 anni		
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
24	Pustola maligna, carbonchio	2	1	2	3	1	2	3	2	1	3	..	
27	Rabbia	1	2	1	..	1	..	2	1	
124	Febbre puerperale	
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	
77	Bronchite acuta	1 618	1 167	9 325	7 466	4 941	5 122	1 745	1 930	819	851	369	432	
78	Bronchite cronica	218	208	90	86	40	28	15	24	
81	Polmonite crupale	169	108	2 021	1 421	1 776	1 352	708	676	435	413	274	263	
82	Bronco polmonite acuta	357	281	5 074	3 820	4 512	4 088	1 855	1 894	952	1 052	552	614	
79	Malattie della pleura	6	7	95	70	165	107	96	76	74	46	56	27	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	26	12	264	223	270	282	205	172	113	133	93	118	
30	Altre forme tubercolari	33	46	1 106	956	1 022	954	617	526	443	429	354	328	
32 a 37	Malattie del cuore	5	3	230	178	139	127	88	73	73	79	52	65	
87	Malattie delle arterie	15	14	11	11	8	2	3	3	3	1	3	1	
64	Apoplessia e congestione cerebrale	6	1	16	14	9	10	6	5	3	4	6	1	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	38	27	813	653	611	439	361	303	283	235	242	216	
63	Encefalite	3	5	68	52	46	31	27	32	29	25	12	25	
72	Eclampsia infantile	1 440	1 098	3 843	3 218	1 427	1 349	617	589	354	303	190	223	
134	Reumatismo articolare acuto	3	2	9	14	11	10	6	7	3	4	10	5	
45	Pellagra	2	1	..	1	1	
47	Diabete	2	..	1	..	1	1	1	1	1	2	
138	Alcoolismo cronico	
48 a 58	Tumori maligni	4	2	31	13	24	22	25	9	20	7	17	10	
140 a 156	Morte violenta	21	26	113	86	306	239	434	311	305	259	195	167	
157		per causa accidentale	3	1	2	2	2	1	..
158 a		per ferite riportate in guerra (a)	3	..	2	2	4	2	3	2
159		per condanna alla pena capitale
160 a 168	per suicidio	
	Altre malattie	1 469	1 022	2 038	1 830	1 550	1 431	813	766	472	483	355	307	
	Causa ignota o non dichiarata	494	364	234	203	98	115	58	37	26	27	
	TOTALE GENERALE	21 876	17 802	57 248	49 905	34 689	33 370	14 170	14 219	8 000	7 985	5 100	5 192	

(a) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra (maschi 4350), anche (maschi 14 e femmine 10).

classificati per età, sesso e per le principali cause di morte.

MORTI CLASSIFICATE PER ETÀ																				Numero dell'elenco nosologico
Da 5 a 9 anni		Da 10 a 14 anni		Da 15 a 19 anni		Da 20 a 24 anni		Da 25 a 29 anni		Da 30 a 34 anni		Da 35 a 39 anni		Da 40 a 44 anni						
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine					
6	5	5	3	4	5	1	4	6	5	8	6	7	6	8	6	24				
11	9	14	2	3	2	1	2	..	1	..	4	1	27				
..	23	..	159	..	195	..	198	..	156	..	94	124				
..	43	..	186	..	308	..	349	..	381	..	205	121, 122, 123, 125, 126				
507	594	104	150	95	170	100	116	120	88	82	114	82	90	79	96	77				
32	65	22	47	50	61	63	57	56	63	50	82	62	64	69	76	78				
514	484	222	241	598	329	581	341	443	412	484	462	533	520	735	512	81				
898	954	212	339	332	389	462	305	294	334	300	317	267	284	313	345	82				
96	70	40	48	116	76	230	64	115	69	105	52	79	66	75	42	79				
386	552	408	1 107	1 919	3 320	3 736	3 905	2 908	3 352	2 288	2 840	1 683	1 897	1 417	1 435	29 e 31				
1 205	1 156	657	807	588	767	742	665	423	520	309	385	221	299	219	243	30, 32 a 37				
291	294	295	359	377	426	382	458	362	509	419	386	503	735	674	941	90				
3	3	2	1	4	5	19	12	23	16	24	21	37	26	95	36	87				
25	16	20	10	35	31	47	49	67	86	110	79	165	153	324	276	64				
608	587	262	300	241	232	176	143	116	93	81	83	67	91	62	61	59				
46	65	30	35	27	26	44	31	46	23	52	17	55	22	27	37	63				
286	327	30	47	72				
60	44	64	51	59	34	56	40	50	32	25	25	22	20	17	27	131				
1	2	1	..	1	2	..	6	4	4	6	14	2	22	17	19	45				
10	9	7	13	24	12	23	19	28	16	31	23	40	21	54	33	17				
..	3	1	8	..	17	1	33	5	40	6	138				
56	43	29	35	53	57	81	70	98	147	165	261	224	433	392	736	48 a 58				
559	419	521	170	672	120	506	92	388	98	400	78	353	62	388	59	140 a 156				
9	3	33	8	100	18	67	25	66	24	69	25	56	17	58	12	157				
11	11	19	4	128	6	2 048	7	1 265	11	762	12	136	5	38	3	158 a				
..	2	1	..	159				
..	..	9	5	129	102	161	130	195	86	166	73	176	56	119	45	160 a 168				
912	781	497	412	568	421	763	508	566	565	683	659	592	636	731	705	..				
71	87	33	34	33	55	53	47	46	41	30	30	28	42	37	50	..				
11 526	11 575	5 613	6 465	8 539	9 097	12 816	9 505	9 606	8 991	8 296	8 487	6 850	7 733	7 503	7 669	..				

gl'individui che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli (maschi 165 e femmine 81) e dei bombardamenti di città costiere

Segue TAV. III. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916,

Numero dell'elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	NUMERO DEI									
		Da 45 a 49 anni		Da 50 a 54 anni		Da 55 a 59 anni		Da 60 a 64 anni		Da 65 a 69 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
21	Pustola maligna, carbonchio	15	3	13	8	17	5	17	8	8	2
27	Rabbia	3	..	2	..	2	3	3	1	1	1
124	Febbre puerperale	13	..	1
121, 122, 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	37	..	1
77	Bronchite acuta	118	98	175	138	218	203	345	403	502	605
78	Bronchite cronica	71	78	126	162	215	207	340	382	467	562
81	Polmonite crupale	848	491	1 093	682	1 278	903	1 650	1 385	1 828	1 497
82	Bronco polmonite acuta	395	321	574	475	778	718	1 169	1 166	1 463	1 515
79	Malattie della pleura	73	48	90	41	98	57	131	71	146	74
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	1 126	1 013	1 051	789	940	608	660	507	434	376
30	Altre forme tubercolari	141	187	171	195	130	167	142	132	91	132
32 a 37	Malattie del cuore	884	1 089	1 337	1 618	1 910	2 378	3 040	3 907	4 154	5 475
87	Malattie delle arterie	146	60	226	97	337	164	650	311	883	512
64	Apoplessia e congestione cerebrale	515	421	900	896	1 458	1 274	2 401	2 208	3 462	3 106
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	58	46	64	45	38	39	38	39	30	22
63	Encefalite	39	26	49	30	54	39	49	43	53	41
72	Eclampsia infantile
134	Reumatismo articolare acuto	35	29	31	32	32	33	28	35	32	42
45	Pellagra	23	22	32	24	42	43	60	46	71	54
47	Diabete	61	36	90	70	148	76	164	129	159	105
138	Alcolismo cronico	52	7	62	7	63	6	74	2	55	5
48 a 58	Tumori maligni	600	1 063	1 083	1 522	1 332	1 669	1 792	1 956	1 805	1 860
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale	385	57	401	102	395	106	428	134	399	152
157	per omicidio	70	13	51	9	40	5	47	9	33	11
158 a	per ferite riportate in guerra (a)	26	5	8	5	8	1	3	7	5	1
159	per condanna alla pena capitale
160 a 168	per suicidio	149	30	139	37	127	44	130	33	120	30
	Altre malattie	906	675	1 113	801	1 418	978	1 819	1 255	2 211	1 419
	Causa ignota o non dichiarata	40	34	54	55	68	63	63	68	72	74
	TOTALE GENERALE	8 471	7 356	10 977	9 554	18 490	11 761	18 455	17 270	22 596	21 757

(a) Veggasi la nota (a) a pagina 48.

(b) Compresi 273 maschi morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.

classificati per età, sesso e per le principali cause di morte.

MORTI, CLASSIFICATI PER ETÀ														Totale generale			Numero dell'elenco nosologico
Da 70 a 74 anni		Da 75 a 79 anni		Da 80 a 84 anni		Da 85 a 89 anni		Da 90 anni in su		Età ignota		Maschi	Femmine	Totale			
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine						
8	2	4	2	2	1	140	80	220	24		
2	2	2	1	57	24	81	27		
..	2	..	841	841	124		
..	1 510	1 510	1 510	(121, 122, 123, 125, 126)		
695	868	659	837	572	605	242	235	59	74	..	8	23 601	22 460	46 061	77		
614	785	674	690	374	455	172	164	36	44	2	..	3 858	4 300	8 248	78		
1 807	1 533	1 267	1 100	608	581	194	187	42	46	2	9	20 110	15 948	36 058	81		
1 902	1 892	1 502	1 506	898	956	332	299	91	75	3	16	25 487	23 955	49 442	82		
91	67	57	33	19	19	4	8	1	..	1	..	2 059	1 238	3 297	79		
237	195	117	100	32	25	6	11	2	6	18	11	20 429	22 819	43 248	29 e 31		
69	78	41	54	10	18	2	6	1	3	7	2	8 747	9 055	17 802	30		
5 649	7 077	4 524	5 856	2 578	3 234	721	987	157	220	14	27	28 898	36 801	65 699	32 a 37		
1 322	856	1 304	914	919	677	330	285	76	90	1	2	6 444	4 120	10 564	87		
4 717	4 146	3 973	3 328	2 309	2 055	796	643	146	149	19	9	21 565	18 973	40 538	64		
20	24	23	12	5	9	3	4	..	2	2	2	4 242	3 707	7 949	59		
47	56	39	34	20	15	5	7	..	1	6	..	873	718	1 591	63		
..	8 187	7 154	15 341	72		
24	30	20	30	6	17	4	3	2	609	566	1 175	134		
87	67	40	31	16	19	3	5	2	410	383	793	45		
141	74	80	57	25	24	6	5	..	1	1 100	727	1 827	47		
41	6	26	4	6	2	4	2	..	489	52	541	138		
1 682	1 738	971	1 049	360	477	94	148	17	21	6	9	10 961	13 362	24 323	48 a 58		
395	190	244	155	144	101	54	61	12	8	305	6	8 323	3 258	11 581	140 a 156		
23	12	12	2	3	2	3	1	748	199	947	157		
3	4	1	2	3	1	53	..	4 529	91	4 620	158 a		
..	3	..	3	159		
97	35	47	11	14	8	8	5	1	2	12	..	1 799	732	2 531	160 a 168		
2 462	1 639	1 940	1 268	1 038	632	348	199	71	43	23	18	25 358	19 453	44 811			
81	113	82	38	64	77	28	35	13	17	418	327	2 224	883	4 307			
28 702	28 760	25 578	25 871	18 603	19 622	8 100	8 506	2 480	2 876	934	525	370 013	351 834	721 847			

TAV. V. — A) Morti, durante l'anno 1916, nei 69 Comuni

Table with columns: Num. dell'Elenco nosologico, CAUSE DI MORTE, ALESSANDRIA, CUNEO, NOVARA, TORINO, GENOVA, PORTO MAURIZIO, BERGAMO, BRESCIA, COMO. Rows list various diseases like Malattie fetali e vizi congeniti, Anemia e leucemia, etc.

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le principali cause di morte.

Table with columns: BARDIA, CREMONA, MANTOVA, MILANO, PAVIA, SONDRIO, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, UDINE, VENEZIA, VERONA, VICENZA, EMILIA, BOLOGNA, Num. dell'Elenco nosologico. Rows list various diseases like Malattie fetali e vizi congeniti, Anemia e leucemia, etc.

(a) In questa voce sono compresi, oltre i morti per ferite riportate in combattimento o in altre operazioni di guerra, anche gli individui

che rimasero vittime dello scoppio di bombe lanciate da velivoli e dei bombardamenti di città costiere.

Segue TAV. V. — A) Morti, durante l'anno 1916, nei 69 Comuni

Num. dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE	Segue EMILIA								
		FERRARA	FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO NELL'EMILIA	AREZZO	FIRENZE
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti . . .	8	3	7	4	1	3	6	1	8
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	89	31	98	85	31	39	79	47	142
39 e 40	Anemia e leucemia . . .	44	6	29	9	17	9	33	19	28
44	Marasmo senile . . .	102	40	154	42	35	72	141	70	225
97	Malattie dello stomaco, atresia . . .	31	11	12	12	5	8	19	8	49
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	187	60	173	80	119	134	240	158	300
20	Dissenteria
99	Epatite, cirrosi epatica . . .	10	11	10	8	7	13	14	5	43
112	Malattie dei reni . . .	33	12	36	36	37	14	56	14	185
110	Appendicite . . .	3	1	..	4	3	1	3	..	7
110 a	Peritonite . . .	11	12	15	13	15	8	14	2	27
7	Vaiuolo
8	Morbillo . . .	40	..	6	2	6	1	2	7	52
9	Scarlattina . . .	3	..	1	..	13	..	1	2	10
10	Risipola . . .	9	1	9	5	4	3	2	1	31
11	Febbre tifoidea . . .	31	24	31	27	30	33	13	12	81
12	Tifo petecchiale	1	1
13	Meningite cerebro spinale epidemica . . .	10	11	3	24	6	4	5	11	43
16	Ipertosse . . .	41	2	40	5	6	21	29	22	16
14	Difterite . . .	2	3	10	18	9	1	5	3	28
15	Laringite crupale . . .	5	1	1	..	3	1	3	3	..
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . .	3	1	1	5	1
17	Influenza . . .	11	2	8	5	11	7	11	7	4
22	Sifilide . . .	6	1	26	6	2	6	4	4	48
71	Tetano e trisma . . .	6	2	3	4	2	..	1	3	8
24	Pustola maligna, carbonchio	2	1	3
27	Rabbia	1
124	Febbre puerperale . . .	2	..	4	5	1	..	5	2	17
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio . . .	1	2	4	8	7	4	2	1	8
77	Bronchite acuta . . .	96	24	63	60	38	52	117	101	130
78	Bronchite cronica . . .	8	19	10	17	12	22	11	14	44
81	Polmonite crupale . . .	65	29	83	54	60	43	53	35	272
82	Bronco polmonite acuta . . .	163	52	177	127	72	68	140	53	515
79	Malattie della pleura . . .	9	2	14	15	7	7	8	6	36
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . .	189	82	157	157	117	88	115	75	671
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	92	34	41	65	26	31	54	29	242
90	Malattie del cuore . . .	174	74	110	110	83	95	158	94	443
87	Malattie delle arterie . . .	58	36	53	41	38	31	24	15	240
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . .	167	77	135	75	76	85	140	103	373
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	20	5	26	6	22	8	21	6	34
63	Encefalite . . .	15	1	4	1	8	9	4	1	19
72	Eclampsia infantile . . .	24	9	10	8	11	17	19	19	48
134	Reumatismo articolare acuto . . .	2	..	4	2	3	3	4	1	7
45	Pellagra . . .	4	..	1	..	12	1	3
47	Diabete . . .	4	2	10	4	3	5	3	..	27
138	Alcoolismo cronico	2	2	5	..	4	4	1
48 a 53	Tumori maligni . . .	97	75	87	132	79	104	77	59	399
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale . . .	30	18	30	23	27	19	18	22	70
157	per omicidio . . .	1	1	1	1	1	..	5
158 a	per ferite riportate in guerra (a) . . .	30	14	37	47	33	98	61	7	137
159	per condanna alla pena capitale
160 a 168	per suicidio . . .	12	2	12	8	7	13	12	2	46
	Altre malattie . . .	150	48	159	177	121	75	132	68	408
	Causa ignota o non dichiarata . . .	3	8	..	1	8
	TOTALE GENERALE . . .	2 101	840	1 914	1 535	1 235	1 269	1 855	1 119	5 542

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56.

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le principali cause di morte.

Num. dell'Elenco nosologico	TOSCANA						MARCHE				UMBRIA	LAZIO	ABRUZZI E MOLISE		Num. dell'Elenco nosologico
	GROSSETO	LIVORNO	LUCCA	MASSA	PISA	SIENA	ANCONA	ASCOLI PicENO	MACERATA	PESARO	PERUGIA	ROMA	AQUILA DEGLI ABRUZZI	CAMPOBASSO	
1 a 5	..	6	..	2	5	4	3	..	1	..	1	13	1	1	1 a 5
6	8	49	30	34	23	42	16	18	13	27	67	342	23	9	6
39 e 40	6	11	14	22	9	23	8	4	2	19	13	129	9	5	39 e 40
44	8	89	85	67	74	40	102	75	40	35	114	170	33	24	44
97	3	18	15	25	9	3	13	6	4	5	14	75	5	1	97
104	43	147	58	147	114	85	84	79	60	47	133	882	65	52	104
20	20
99	6	13	19	1	12	10	8	3	1	3	8	105	2	1	99
112	10	32	66	20	31	24	18	9	6	11	26	439	15	5	112
110	..	5	2	..	7	1	2	4	..	1	1	41	1	..	110
110 a	6	12	17	1	10	1	7	3	1	10	11	73	2	7	110 a
7	1	7
8	..	60	11	47	18	13	5	..	2	..	3	323	1	..	8
9	..	3	1	..	3	1	1	1	1	127	..	3	9
10	1	9	3	..	4	..	1	1	7	42	7	..	10
11	3	41	19	21	28	16	41	16	18	9	29	119	14	4	11
12	12
13	2	22	4	9	28	3	14	..	3	1	9	55	4	..	13
16	2	4	7	2	14	1	14	8	..	1	..	74	16
14	..	2	1	10	9	2	3	8	3	..	4	145	4	..	14
15	2	2	6	1	3	1	3	7	1	15
18 e 19	11	3	..	6	1	..	1	..	1	36	1	3	18 e 19
17	..	10	12	1	14	8	2	2	4	1	4	140	..	3	17
22	..	5	4	..	5	5	3	1	..	3	11	161	1	..	22
71	..	3	1	2	1	2	1	1	2	4	71
24	3	..	2	1	4	24
27	4	27
124	4	4	2	4	2	5	18	1	..	124
121 a 123, 125, 126	2	4	5	1	1	1	3	2	..	2	3	10	121 a 123, 125, 126
77	9	135	62	34	31	39	45	63	17	22	60	186	10	20	77
78	1	24	23	3	11	24	7	3	3	3	6	76	..	7	78
81	11	94	68	26	41	35	45	15	11	9	57	587	19	33	81
82	19	276	187	101	149	74	60	65	23	38	37	912	35	10	82
79	..	16	13	5	6	12	4	1	2	2	5	86	1	1	79
29 e 31	45	255	196	65	171	138	119	38	33	43	96	1 203	35	6	29 e 31
30, 32 a 37	1	49	69	32	57	43	39	14	18	13	28	390	27	4	30, 32 a 37
90	10	215	158	60	116	99	79	60	57	48	118	770	53	55	90
87	10	70	57	3	32	54	15	4	6	7	10	433	7	4	87
64	12	111	101	40	91	95	87	49	41	51	99	487	39	21	64
59	2	31	9	18	11	9	10	4	1	4	16	142	..	15	59
63	..	8	1	1	2	3	6	3	17	2	8	28	5	1	63
72	10	23	13	14	4	12	12	34	10	9	47	206	24	7	72
134	..	5	4	..	3	5	2	2	1	25	1	1	134
45	1	..	17	2	45
47	..	11	12	2	5	4	3	..	4	2	4	81	1	..	47
138	..	1	2	1	2	1	2	..	3	1	4	13	138
48 a 53	10	124	92	29	89	94	49	23	23	30	49	697	19	2	48 a 53
140 a 156	10	40	31	15	31	15	18	11	5	8	28	158			

Segue TAV. V. — A) Morti, durante l'anno 1916, nei 69 Comuni

capiluoghi di Provincia, classificati secondo le principali cause di morte.

Table with columns for nosological categories (CAUSE DI MORTE), provinces (e.g., ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA), and numerical counts. Includes a 'TOTALE GENERALE' row at the bottom.

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 56.

Segue TAV. V. — B) Morti, durante l'anno 1916, nei 145 Comuni

Num. dell'Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	Segue LOMBARDIA										Num. dell'Elenco nosologico (a)
		VARESE	CASALMAGGIORE	CREMA	ABBiate-GRASSO	GALLARATE	LODI	MONZA	BOBBIO	MORTARA	VOGHERA	
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	1	1	1	4	4	1	1	2	
6	Atrofia congenita, immaturità	7	18	11	3	3	23	33	3	2	11	
39 e 40	Anemia e leucemia	1	12	2	5	5	4	11	..	2	10	
44	Marasmo senile	13	31	9	35	10	24	43	5	1	22	
97	Malattie dello stomaco, atrepsia	2	3	..	6	..	4	4	..	2	8	
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc.	26	9	28	41	17	51	107	3	3	21	
20	Dissenteria	
99	Epatite, cirrosi epatica	2	1	4	2	..	3	11	..	2	7	
112	Malattie dei reni	9	15	8	9	6	15	30	2	4	25	
110	Appendicite	3	..	1	1	1	2	2	
110 a	Peritonite	3	6	4	1	4	5	8	4	
8	Morbillo	15	2	..	2	7	
9	Scarlattina	1	
10	Risipola	2	1	4	3	2	1	
11	Febbre tifoidea	9	2	16	1	1	36	28	1	3	7	
13	Meningite cerebro spinale epidemica	..	1	1	2	5	7	9	
16	Iperfosse	3	3	..	4	..	2	12	2	
14	Difterite	1	..	1	..	2	1	3	1	
15	Laringite crupale	1	1	4	1	
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre	
17	Influenza	4	1	4	20	..	6	4	..	4	2	
22	Sifilide	1	1	2	4	
71	Tetano e trisma	1	..	1	1	2	
24	Pustola maligna, carbonchio	
27	Rabbia	..	1	
124	Febbre puerperale	2	2	1	6	
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	2	..	2	1	2	
77	Bronchite acuta	13	9	13	8	5	32	60	3	2	5	
78	Bronchite cronica	2	1	4	2	4	1	3	3	
81	Pulmonite crupale	19	9	30	13	10	16	59	2	4	16	
82	Bronco polmonite acuta	32	17	35	15	19	42	72	10	8	36	
79	Malattie della pleura	9	3	1	1	3	5	8	1	2	5	
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare	39	13	40	15	35	74	86	1	12	75	
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari	8	14	13	12	8	22	19	3	1	18	
90	Malattie del cuore	36	30	49	28	23	74	130	10	13	41	
87	Malattie delle arterie	16	9	1	25	6	14	4	..	9	10	
64	Apoplezia e congestione cerebrale	25	36	34	17	12	40	78	5	11	30	
59	Meningite semplice cerebrale e spinale	6	2	6	9	8	4	22	1	..	5	
63	Encefalite	4	1	1	2	1	2	
72	Eclampsia infantile	2	6	..	2	..	3	14	1	..	3	
134	Reumatismo articolare acuto	1	..	2	1	..	
45	Pellagra	1	1	1	2	1	
47	Diabete	..	3	4	1	1	
138	Alcoolismo cronico	2	..	1	1	2	
48 a 58	Tumori maligni	25	9	15	11	17	45	43	3	7	24	
140 a 156	per causa accidentale	8	10	8	3	8	17	15	1	1	16	
157	per omicidio	1	
158 a	per ferite riportate in guerra (b)	1	..	7	25	4	..	5	21	
159	per condanna alla pena capitale	
160 a 168	per suicidio	6	1	..	4	8	..	4	2	
	Altre malattie	32	23	31	27	18	54	58	6	17	47	
	Causa ignota o non dichiarata	1	
	TOTALE GENERALE	371	300	395	320	233	685	1 010	65	126	509	

a) Veggasi la nota (b) a pag. 62.

(b) (a) » 56.

(c) Nel maggio 1916, per esigenze militari, venne sgombrato il Comune di Asiago, e quindi il numero dei morti qui indicato per il detto

capiluoghi di Circondario, classificati secondo le principali cause di morte.

Num. dell'Elenco nosologico (a)	VENETO									EMILIA						Num. dell'Elenco nosologico (a)
	FELTRE	PIEVE DI CADORE	ADRIA	CIVIDALE DEL FRIULI	PORDENONE	TOLMEZZO	CHIOGGIA	ASIAGO (c)	IMOLA	VERGATO	CENTO	COMACCHIO	CESENA	RIMINI	MIRANDOLA	
1 a 5	1	4	2	..	3	1	5	1 a 5	
6	19	1	37	6	8	11	65	..	29	14	20	16	42	45	21	6
39 e 40	17	..	5	5	5	3	71	..	12	1	3	3	7	10	6	39 e 40
44	22	7	25	24	22	18	35	..	39	4	22	12	29	64	30	44
97	2	..	4	12	3	..	23	..	1	1	7	..	9	25	1	97
104	18	3	52	44	72	16	94	3	102	10	25	19	130	105	6	104
20	1	20
99	2	..	6	2	5	..	6	..	3	..	1	..	8	10	3	99
112	6	1	11	18	12	10	21	2	12	..	5	2	23	25	2	112
110	1	1	..	2	1	..	1	..	1	1	..	110
110 a	2	..	1	9	2	2	2	..	3	1	7	..	1	110 a
8	1	3	7	4	..	7	..	1	8
9	4	1	1	..	7	1	9
10	1	..	2	2	2	1	2	2	2	1	2	3	2	10
11	7	..	12	317	31	10	5	5	17	3	4	1	27	12	4	11
13	3	..	24	1	3	..	2	2	..	11	..	13
16	2	..	1	..	2	2	28	..	23	4	15	1	13	69	2	16
14	3	..	1	..	14	..	5	2	9	..	4	..	8	6	6	14
15	2	2	4	2	..	5	5	..	15
18 e 19	2	3	18 e 19
17	2	..	3	2	3	..	8	..	5	..	1	8	..	17
22	2	..	2	1	..	2	..	1	..	6	1	..	22
71	1	6	3	..	1	..	1	3	2	..	71
24	1	24
27	27
124	1	..	3	1	124
121 a 123, 125, 126	15	..	3	1	..	1	2	..	121 a 123, 125, 126
77	3	8	22	15	7	7	81	4	32	3	12	10	80	113	18	77
78	3	..	3	1	3	1	10	..	10	1	1	..	14	4	2	78
81	57	..	16	39	12	13	23	4	23	6	5	2	41	52	10	81
82	24	1	11	33	20	19	66	5	79	12	21	13	79	58	12	82
79	2	..	3	3	1	2	4	..	2	..	4	11	..	79
29 e 31	44	3	40	44	48	14	52	3	56	5	23	16	69	85	26	29 e 31
30, 32 a 37	7	2	16	18	14	10	52	1	36	1	15	6	28	45	9	30, 32 a 37
90	31	4	38	37	19	16	92	3	111	24	39	27	60	95	23	90
87	8	2	25	6	7	2	7	2	8	..	12	2	10	19	2	87
64	9	2	31	13	25	5	52	6	45	4	23	18	64	90	26	64
59	9	..	9	7	1	1	26	1	10	7	7	6	4	59
63	2	..	5	1	4	..	3	1	1	63
72	4	1	8	2	6	6	71	..	9	1	3	1	61	16	1	72
134	5	2	3	2	2	..	1	..	2	2	1	134
45	1	..	3	..	2	4	1	1	..	1	2	..	45
47	2	5	..	3	1	..	7	1	1	47
138	5	2	1	..	138
48 a 58	14	3	13	10	21	4	26	3	51	9	13	6	64	55	10	48 a 58
140 a 156	9	2	5	22	6	12	10	3	13	5	1	4	13	25	2	140 a 156
157	..	1	..	1	1	1	1	..	157
158 a	27	114	36	24	13	..	13	3	5	1	..	158 a
159	2	159
160 a 168	3	1	1	3	2	2	3	1	3	2	5	2	1	160 a 168
	21	4	66	48	25	8	58	2	89	8	30	15	53	49	37	
	1	1	24	1	
	410	47	493	891	453	232	1 025	(c) 80	871	125	328	195	991	1 145	276	

Comune si riferisce soltanto al periodo dal 1° gennaio al 15 maggio 1916.

Segue TAV. V. — B) Morti, durante l'anno 1916, nei 145 Comuni

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE' and regional sub-headers 'Abruzzi e Molise' and 'C A M'. Rows list various medical conditions and their counts across these regions.

capiluoghi di Circondario, classificati secondo le principali cause di morte.

Table with columns for regional sub-headers 'PANIA', 'PUGLIE', and 'BASILICATA'. Rows list municipalities and their corresponding mortality counts for various causes.

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 62. (b) Essendo andate smarrite 49 schede spedite dal Comune di Nola e riferenti al terzo trimestre dell'anno 1916, furono richiesti e inviati (c) Veggasi la nota (a) a pag. 56.

duplicati di dette schede, sulle quali, però, non fu possibile di specificare la causa di morte dei singoli individui.

Scg. TAV. V. - C) Morti, durante l'anno 1916, nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano classificati secondo le

Table with columns for provinces (Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia) and various causes of death (e.g., Malattie fetali, Anemia e leucemia, etc.).

non meno di 20,000 abitanti presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, principali cause di morte (a).

Table with columns for provinces (Toscana, Marche, Umbria, Campania) and various causes of death (e.g., Malattie fetali, Anemia e leucemia, etc.).

(a) I 75 Comuni non capiluoghi sono ordinati per Provincie e per Compartimenti. (b) Nell'anno 1916 non si verificarono casi di morte per dissenteria e per colera nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20,000 abitanti. (c) Veggasi la nota (a) a pag. 56. (d) Essendo andate smarrite 162 schede spedite dal Comune di Cortona e riferentisi al terzo trimestre dell'anno 1916, furono richiesti e inviati i duplicati di dette schede, sulle quali, però, non fu possibile di specificare la causa di morte dei singoli individui.

Segue TAV. V. — C) Morti, durante l'anno 1916, nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano classificati secondo le

Num. dell' Elenco nosologico (a)	CAUSE DI MORTE	S I									
		ADERNÒ	AGRA	GIARRE	PATERNÒ	VIZZINI	CANICATTI	FAVARA	LIGATA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BAGHERIA
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti	2	1	..	1	3	1	2
6	Atrofia congenita, immaturità . . .	18	14	11	34	15	27	16	23	14	17
39 e 40	Anemia e leucemia . . .	6	32	7	13	5	35	29	14	12	11
44	Marasmo senile . . .	19	30	38	56	24	55	39	49	52	19
97	Malattie dello stomaco, atropsia . . .	3	5	6	2	2	41	2	117
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ulcera intestinale, ecc. . .	284	68	34	212	131	168	86	59	83	57
99	Epatite, cirrosi epatica . . .	4	3	3	2	2	3	5	2	11	7
112	Malattie dei reni . . .	34	9	11	16	15	15	30	6	10	8
110	Appendicite	3	2	1	..	2	1
110 a	Peritonite	1	..	1	3	4
8	Morbillo . . .	13	84	41	27	6	28	..	45
9	Scarlattina	1	..	47	4	1
10	Risipola	1	..	1	1	1
11	Febbre tifoidea . . .	5	11	4	2	6	7	2	8	2	9
12	Tifo petecchiale
13	Meningite cerebro spinale epidemica	1	4	9	2	5
16	Ipertosse	1	..	3	..	1
14	Difterite . . .	1	2	2	..	1	2	1	1
15	Laringite crupale . . .	6	..	3	1	1	14
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre . . .	24	9	2	12	14	17	2	19	2	1
17	Influenza . . .	4	1	10	12	5	32	..	18	1	..
22	Sifilide . . .	1	1	..	1	4	2	1	3
71	Tetano e trisma	1	1
21	Pustola maligna, carbonchio	1
27	Rabbia	1
124	Febbre puerperale . . .	1	..	1	..	1	1
121 a 123, 125, 126	Altre malattie di gravidanza, parto e puerperio	1	1	1	2	2	1	2	..	1
77	Bronchite acuta . . .	117	47	29	361	29	68	51	51	31	27
78	Bronchite cronica . . .	9	3	3	1	5	9	18	2	8	3
81	Polmonite crupale . . .	28	44	14	64	25	28	16	19	8	41
82	Bronco polmonite acuta . . .	73	37	17	32	23	47	60	20	34	7
79	Malattie della pleura . . .	1	..	1	2	..	4	9	2	6	1
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare . . .	6	17	6	15	11	15	10	25	9	32
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari . . .	3	3	..	2	5	7	1	6	..	14
90	Malattie del cuore . . .	20	34	32	28	33	56	16	32	65	23
87	Malattie delle arterie . . .	6	3	2	4	1	3	2	1	..	1
64	Apoplessia e congestione cerebrale . . .	27	20	23	23	19	33	29	29	20	28
59	Meningite semplice cerebrale e spinale . . .	10	..	4	2	8	7	1	18	1	7
63	Encefalite	2	..	2	3	..	2
72	Eclampsia infantile . . .	1	2	8	..	13	7	26	3	22	3
134	Reumatismo articolare acuto . . .	1	1	2	..	2
45	Pellagra
47	Diabete . . .	2	1	1	..	1	3	2	1
138	Alcoolismo cronico	1	1
48 a 58	Tumori maligni . . .	8	9	23	6	6	7	8	6	5	10
140 a 156	Morte violenta per causa accidentale . . .	7	12	3	1	1	9	9	4	..	1
157	per omicidio	2	5	..
153 a	per ferite riportate in guerra (b)
160 a 168	per suicidio . . .	1	..	4	3	1	..	2	1	..	1
	Altre malattie . . .	18	16	19	21	33	33	26	36	23	14
	Causa ignota o non dichiarata	6	1
	TOTALE GENERALE . . .	761	440	338	1 019	548	798	523	631	428	405

(a) Veggasi la nota (b) a pag. 72.
(b) » » (a) » 56.

non meno di 20.000 abitanti presenti alla data del Censimento del 10 giugno 1911, principali cause di morte.

C I L I A	S I										Totale dei morti nei 75 Comuni non capiluoghi che contavano non meno di 20.000 abitanti	Num. dell' Elenco nosologico (a)
	MONREALE	PARTINICO	COMISO	LENTINI	RAGUSA	SCIOLI	VITTORIA	CASTEL-VETRANO	MARSALA	MONTE SAN GIULIANO		
	3	1	1	2	1	1	91	1 a 5
	9	10	33	10	25	32	13	51	6	..	1 520	6
	17	8	36	4	6	7	15	12	12	..	980	39 e 40
	59	27	57	20	4	24	57	53	37	..	3 340	44
	4	2	9	1	8	27	63	12	1	..	906	97
	35	84	99	113	222	116	190	91	114	56	6 247	104
	1	7	2	10	5	2	6	8	8	9	328	99
	8	17	7	16	23	7	24	12	39	14	1 157	112
	45	110
	1	2	..	1	1	207	110 a
	1	12	61	23	44	10	85	4	3	..	828	8
	7	..	1	..	9	11	3	1	2	23	143	9
	1	3	..	1	..	1	2	3	4	1	107	10
	1	6	1	15	17	7	9	4	11	10	515	11
	17	12
	2	..	4	6	2	..	4	..	2	..	120	13
	5	4	23	2	6	9	20	1	5	..	384	16
	..	1	..	1	6	..	3	1	2	..	86	14
	..	1	1	2	111	15
	2	8	26	16	15	25	11	6	25	6	409	18 e 19
	1	1	6	..	2	2	3	7	4	2	344	17
	..	1	1	3	2	..	2	..	2	..	85	22
	1	1	..	23	71
	1	..	10	24
	8	27
	1	..	2	..	2	1	3	..	3	..	43	124
	..	2	3	1	..	76	121 a 123, 125, 126
	52	29	36	65	116	42	63	24	73	32	4 296	77
	5	9	8	5	12	2	8	5	1	6	651	78
	15	50	30	17	31	8	61	50	46	13	2 514	81
	21	33	37	28	44	19	165	10	51	14	3 684	82
	1	4	1	3	3	4	1	249	79
	16	16	27	20	29	11	28	27	60	29	2 317	29 e 31
	5	8	7	4	10	2	4	2	21	6	1 184	30, 32 a 37
	36	32	22	24	45	31	47	41	64	39	3 363	90
	6	4	1	..	18	2	1	3	7	3	401	87
	21	26	25	15	37	18	41	40	83	33	2 500	64
	3	18	2	7	6	4	3	7	11	7	533	59
	1	1	1	2	117	63
	1	..	9	1	5	3	17	4	1 382	72
	1	61	134
	11	45
	1	1	3	1	3	4	1	2	2	2	99	47
	1	14	138
	3	9	10	8	28	4	19	13	31	16	1 231	48 a 58
	3	7	6	5	4	2	13	6	11	5	540	140 a 156
	1	3	1	2	1	8	2	2	71	157
	62	158 a
	1	1	2	1	2	..	2	1	1	1	126	160 a 168
	13	32	33	17	63	36	57	19	45	32	2 635	188
	2	..	2	1	188	
	365	480	680	467	854	471	1 083	498	881	426	46 390	

TAV. VI. — Bambini illegittimi ed esposti morti nel Regno nei primi cinque anni di età, durante l'anno 1916, classificati per sesso e per le principali cause di morte.

Numero dell'Elenco nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	BAMBINI ILLEGITTIMI ED ESPOSTI MORTI NEL REGNO, CLASSIFICATI PER ETÀ											
		fino a 1 mese		da 1 mese a 12 mesi		di 1 anno		di 2 anni		di 3 anni		di 4 anni	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
1 a 5	Malattie fetali e vizi congeniti.	42	23	11	11	2	..	1
6	Atrofia congenita, immaturità.	952	906	177	210
39 e 40	Anemia e leucemia.	260	292	37	46	5	9	1	1	2	2
97	Malattie dello stomaco, atrepsia.	115	111	196	252	28	38	12	14	4	1	1	..
104	Diarrea, enterite, colera indigeno, ecc.	246	281	956	1 093	285	329	61	69	21	27	9	11
99	Epatite, cirrosi epatica.	1	..	2	3	1	..	1
112	Malattie dei reni.	6	5	13	31	11	18	7	9	7	3	2	2
110	Appendicite.	1
110 a	Peritonite.	1	2	4	5	3	1	1	..	1
8	Morbillo.	2	3	43	31	54	52	36	46	20	16	8	5
9	Scarlattina.	2	1	4	5	2	7	4	..	1	1
10	Risipola.	4	7	13	19	3	1	1
11	Febbre tifoidea.	1	1	1	2	4	2	..	1	1	..
13	Meningite cerebro spinale epidemica.	1	4	4	2	1	2	1	1	1
16	Ipertosse.	4	..	51	53	54	39	17	21	4	4	..	2
14	Difterite.	9	5	8	2	5	4	1	1
15	Laringite crupale.	7	2	7	1	3	6	5	1
18 e 19	Febbri da malaria e cachessia palustre.	1	1	7	9	5	9	9	5	1	4
17	Influenza.	4	1	10	5	2	2	..	2	1	2	..	1
22	Sifilide.	113	102	197	196	11	10	2	2	1	1	..	1
71	Tetano e trisma.	1
24	Pustola maligna, carbonchio.	1	..
77	Bronchite acuta.	78	56	325	298	118	122	38	51	16	10	7	4
78	Bronchite cronica.	9	2	2	1
81	Polmonite crupale.	15	11	74	66	42	30	14	22	5	8	4	3
82	Bronco polmonite acuta.	33	23	244	162	155	127	44	50	16	21	5	5
79	Malattie della pleura.	1	4	..	6	..	2	2
29 e 31	Tubercolosi disseminata e polmonare.	1	..	23	19	5	15	10	5	2	2	..	5
30, 32 a 37	Altre forme tubercolari.	4	3	51	54	37	27	13	17	3	16	6	4
90	Malattie del cuore.	2	2	5	12	4	1	2	1	1
87	Malattie delle arterie.	2	1	2	2
64	Apoplessia e congestione cerebrale.	1
59	Meningite semplice cerebrale e spinale.	6	1	33	23	12	7	4	8	9	2	..	2
63	Encefalite.	1	..	5	1	1
72	Eclampsia infantile.	87	75	163	157	40	41	16	15	3	2	1	1
134	Reumatismo articolare acuto.	1	..	1
47	Diabete.	1
48 a 58	Tumori maligni.	1	1	1	1	1
140 a 156	Morte violenta { per causa accidentale.	4	2	5	..	7	1	6	7	3	3	1	..
157	Morte violenta { per infanticidio.	1	1
	Altre malattie.	177	152	164	170	65	65	30	20	8	6	5	5
	Causa ignota o non dichiarata.	16	19	4	3	1	1
	TOTALE.	1 902	1 772	3 070	3 202	1 024	1 004	351	396	142	140	57	58

(a) In questo elenco sono indicate soltanto quelle cause che nell'anno 1916 produssero la morte di bambini illegittimi ed esposti nei primi cinque anni di età.

TAV. VII. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916, per causa violenta accidentale, classificati secondo il sesso, l'età e la specie dell'infortunio

CAUSE delle morti accidentali	Complesso			NUMERO DEI MORTI CLASSIFICATI PER ETÀ																			
				fino a 1 anno		Da 1 a 4 anni		Da 5 a 14 anni		Da 15 a 29 anni		Da 30 a 39 anni		Da 40 a 49 anni		Da 50 a 59 anni		Da 60 a 69 anni		Da 70 anni in su		Età ignota	
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
				Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
In istato d'ubriachezza	39	36	3	1	1	2	..	2	..	5	1	5	1	9	..	6	..	5	..	1	..
Per annegamento	1 786	1 309	477	4	2	369	226	244	79	305	50	79	24	54	15	70	27	91	23	84	30	9	1
Per freddo	204	177	27	11	12	1	2	1	..	92	1	32	1	4	..	9	2	12	2	15	7
Per insolazione	104	72	32	1	..	3	1	18	5	7	5	3	1	10	3	10	5	10	8	10	4
Per fulminazione:																							
A) naturale	155	119	36	3	3	25	5	29	14	19	7	17	1	10	4	11	2	5
B) da apparecchi elettrici	111	109	2	1	..	20	1	46	1	17	..	17	..	7	1	..
Per caduta	3 300	2 481	819	24	13	100	84	264	82	340	64	221	39	301	45	321	99	413	145	488	248	9	..
Per lesioni causate da scoppio di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.	(a) 682	(a) 620	62	1	1	11	9	65	23	151	22	51	1	32	1	19	3	12	1	4	1	274 (a)	..
Per ferite da taglio	33	27	6	..	1	2	1	9	1	1	2	4	1	3	..	6	2
Per lesioni da macchine agrarie e industriali	105	99	7	13	3	34	2	11	1	17	..	14	1	6	..	3	..	1	..
Per schiacciamento	2 021	1 704	317	3	2	89	66	230	77	389	38	247	20	215	19	224	31	171	30	110	32	7	2
Per violenze di animali	175	151	24	1	1	6	4	27	4	26	4	6	1	24	..	19	..	24	3	18	7
Per ustione	2 222	1 002	1 220	41	43	598	524	96	270	66	67	26	29	31	18	28	28	30	63	81	175	2	3
Per soffocamento	129	77	52	24	19	24	20	13	8	8	3	3	1	2	1	2	..	1
Per asfissia	297	215	82	15	18	16	17	21	10	50	14	21	4	30	2	28	3	24	4	10	10
Per avvelenamento acuto	162	85	77	2	..	18	18	19	18	14	20	4	9	6	4	8	3	10	4	4	1
Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi	18	14	4	8	1	..	2	2	..	1	..	2	1	1
Per cause diverse o non determi- nate	37	26	11	1	..	1	..	5	2	6	1	2	..	4	6	..	1	5	1	1	..	1	..
TOTALE	11 581	8 323	3 258	134	112	1 240	976	1 080	589	1 566	310	753	140	773	116	796	203	827	286	849	515	305 (a)	6

(a) Compresi 273 maschi morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.

TAV. VIII. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916, per causa violenta accidentale,

MESI	IN COMPLESSO			IN ISTATO D'UBBRIACHEZZA		PER ANNEGAMENTO		PER FREDDO		PER INSOLAZIONE		PER FULMINAZIONE				PER CADUTA	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	NATURALE		DA APPARECCHI ELETTRICI		M.	F.
												M.	F.	M.	F.		
Gennaio	991	634	357	7	..	57	24	62	9	8	..	7	..	186	64
Febbraio	850	546	304	2	..	48	20	30	7	1	..	5	..	181	49
Marzo	832	591	241	4	..	63	31	17	3	1	..	4	..	149	44
Aprile	717	500	217	2	1	83	45	9	1	8	3	6	..	140	58
Maggio	845	600	245	6	1	126	47	3	2	1	2	16	8	8	..	211	69
Giugno	975	754	221	3	..	166	36	(a) 5	..	26	3	12	3	12	..	240	79
Luglio	1 208	902	306	1	..	223	67	(a) 2	..	35	25	18	4	7	..	239	95
Agosto	1 038	828	270	165	52	(a) 2	..	10	..	26	6	14	..	267	83
Settembre	963	697	266	2	..	99	41	(a) 4	1	17	8	15	2	250	84
Ottobre	1 256	974	282	4	..	108	42	2	2	5	1	9	..	251	80
Novembre	937	676	261	2	..	89	39	13	2	5	3	12	..	201	60
Dicembre	909	621	283	3	1	82	33	28	2	2	..	10	..	166	51
ANNO	11 581	8 323	3 258	36	3	1 309	477	177	27	72	32	119	36	109	2	2 481	819

(a) Militari morti in seguito a congelamento dei piedi.
 (b) Compresi 273 morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.

classificati secondo il sesso ed i mesi e secondo la specie dell'infortunio.

PER LESIONI CAUSATE da scoppi di esplosivi, di armi da fuoco, di mine, ecc.		PER FERITE DA TAGLIO		PER LESIONI da macchine agrarie e industriali		PER SCHIACCIAMENTO		PER VIOLENZE di animali		PER USTIONE		PER SOFFOCAMENTO		PER ASFISSIA		PER AVVELENAMENTI ACUTI		PER MORSI DI VIPERA o di altri animali velenosi		PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMINATE	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
21	5	2	1	8	..	134	24	6	2	117	218	6	4	10	5	1	1	2	..
18	2	2	2	119	22	3	2	117	188	7	1	8	7	2	4	3	..
26	3	1	..	3	..	183	21	2	99	109	6	3	21	20	4	5	1
15	5	3	..	4	..	122	17	12	2	73	73	5	5	12	3	5	2	1	2
18	5	1	3	7	1	114	31	13	2	46	55	12	4	5	6	10	6	1	2	2	1
20	3	6	1	7	..	142	28	14	3	67	53	11	4	7	4	8	4	5	..	3	..
67	12	3	..	16	2	165	28	28	4	67	52	7	8	12	4	8	4	1	..	3	1
37	5	2	..	17	1	169	33	20	1	72	76	7	6	10	4	7	2	1	1	2	..
27	5	3	..	14	1	148	29	13	1	62	64	1	6	25	3	13	17	4	1	..	3
315 (b)	5	3	1	7	..	148	32	9	1	71	85	4	1	18	6	17	25	1	..	2	1
27	9	3	..	9	..	128	26	16	1	91	102	4	3	67	9	5	5	4	2
29	3	5	..	132	26	8	3	120	145	7	7	20	11	5	2	4	1
620 (b)	62	27	6	99	7	1 704	317	151	24	1 002	1 220	77	52	215	82	85	77	14	4	26	11

TAV. IX. — Maschi morti nel Regno, durante l'anno 1916, per causa violenta accidentale, in età

PROFESSIONI O CONDIZIONI	TOTALE dei maschi da 15 anni in su morti per causa violenta accidentale	IN STATO d'UBBRIACHEZZA	PER ANNEGAMENTO	PER FREDDO	PER INSOLAZIONE	PER FULMINAZIONE		PER CADUTA
						NATURALE	DA APPARECCHI ELETTRICI	
Agricoltori, boscaioli e carbonai	1 900	9	218	18	34	46	12	933
Braccianti, manovali, cantonieri e selciatori	460	3	42	4	4	7	8	173
Pastori	51	..	10	3	..	22
Minatori, marnisti, scavatori, zolfatai e salinai	191	..	3	..	1	26
Fabbri, meccanici, elettricisti, maniscalchi e stagnini	180	1	16	3	32	38
Macchinisti e fuochisti	35	1	5	1	4
Fornaciai	5	..	1	2
Vetrai	3	1
Muratori, scalpellini, pittori di stanze e imbianchini	265	3	17	2	1	1	6	143
Falegnami, verniciatori, carrozzai, calafati, carpentieri e segatori di legna	106	1	12	1	..	2	..	48
Cestai	3	..	1	2
Tappezzieri	2	1
Cartai	4
Tipografi	3	..	2	1
Filatori, tessitori, tintori, cardatori e cordai	25	..	8	5
Conciatori di pelli	4
Calzolai, sellai e pellettieri	58	..	13	3	2	14
Sarti	24	..	3	10
Cappellai	3	..	1
Barbieri	13	..	3	4
Mugnai, pastaia, fornai e panettieri	50	..	10	1	10
Orefici e orologiai	1	..	2	2
Caffettieri, pasticciieri e birrai	8	4
Trattori, vmai e osti	18	1	5	6
Camerieri di esercizi pubblici	3	..	1	2
Lattai e casari	11	..	7	4
Macellai e pizzicagnoli	12	..	3	3
Fabbricanti e operai non specificati	350	2	22	4	1	2	13	76
Marinai, pescatori, barcaiuoli e capitani marittimi	69	..	30	3	..	6	1	17
Cocchieri, stallieri, carrettieri e mulattieri	178	1	4	1	71
Ferrovieri e tramvieri	112	..	6	1	8
Fattorini postali e telegrafici	17	..	3	6
Droghieri e farmacisti	2	..	1	1
Negozianti, sensali, agenti di cambio e impresari	59	..	8	1	22
Commessi di negozio	8	1	2
Fruttivendoli e venditori ambulanti	35	1	12	11
Domestici, cuochi, uscieri, sagrestani e portieri.	31	2	1	..	16
Facchini, lavandai e spazzini	60	..	9	1	23
Impiegati pubblici e privati, magistrati e pensionati civili	101	3	15	..	1	1	1	35
Corpi armati (escluso l'esercito)	16	..	2	1	..	3
Militari	618	..	105	117	..	5	5	157
Maestri e professori	16	..	2	2	6
Sacerdoti monaci e chierici	18	..	1	1	..	11
Medici, veterinari e flebotomi	8	1
Infermieri	4	1
Avvocati e notai	6	2
Ingegneri e agrimensori	12	2	1	4
Proprietari e benestanti	125	..	15	..	1	5	..	65
Studenti	42	..	17	6
Mendicanti e ricoverati	28	2	4	6	14
Altre professioni e professioni ignote	509	3	52	1	5	4	3	77
TOTALE dei morti da 15 anni in su	5 869	33	692	164	50	91	88	2 093

(a) Compresi 273 morti in seguito ad infortunio avvenuto per scoppio di esplosivi nel Comune di Spezia.

da 15 anni in su, classificati secondo la professione o condizione e secondo la specie dell'infortunio.

PER LESIONI causate da scoppio di esplosivi, d'armi da fuoco, dimine, ecc.	PER FERITE DA TAGLIO	PER LESIONI da macchine agrarie e industriali	PER SCHIACCIAMENTO	PER VIOLENZE di animali	PER USTIONE	PER SOFFOCAMENTO	PER ASPISSIA	PER AVVELENAMENTI ACUTI	PER MORSI di altri animali velenosi	PER CAUSE DIVERSE o NON DETERMINATE
73	7	16	314	70	88	4	34	11	3	10
11	2	9	152	1	24	..	12	4	..	1
1	6	2	7
15	..	1	78	..	4	..	60	2	..	1
16	..	10	46	1	13	1	2	1
4	..	2	6	..	10	..	1	1
..	2
1	1
10	61	..	8	1	9	2	..	1
4	2	3	21	1	4	1	..	4	..	1
..
..	1
..	..	1	1	..	2
..
1	..	4	5	..	2	1
..	..	2	1
6	..	1	13	1	4	..	1
1	5	1	1	1
..	2
..	3	..	1	..	1	1
1	..	5	21	..	2
..
..	4
..	1	..	4	1
..	4
..	5
..
..	5	..	1
36	..	20	140	1	22	1	8	1	1	..
2	..	1	6	..	2	..	1
5	..	1	78	11	1	1	2	1	..	1
4	88	..	5
..	7	1
2	1	2	17	1	1	..	1	3
..	5
..	10	..	1
..	4	2	2	..	3	1
..	27
6	1	..	30	..	2	..	5	1
2	8
42	..	1	117	12	27	6	15	4	1	1
..	5	1
..	5
..	2	..	2
..	2	..	1
1	3
..	1
..	4	1
2	2	1	22	5	4	..	2	1
7	8	1	3
..	2
(a) 237	..	5	36	5	22	1	2	4	1	1
(a) 543	16	86	1 392	117	264	16	163	46	6	12

TAV. X. — Suicidi, nell'anno 1916, classificati per sesso, per mesi e per mezzi o modi di uccisione e distribuiti per compartimenti.

	REGNO		PIE- MONTE		LIGURIA		LOM- BARDIA		VENETO		EMILIA		TO- SCANA		MARCHE		UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPAN- IA		PUGLIE		BASILI- CATA		CALA- BRIE		SICILIA		SARDE- GNA		
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Gennaio	226	157	69	28	10	6	4	18	7	21	3	14	5	15	7	1	3	4	2	5	4	3	1	14	9	9	1	3	1	3	..	11	10	2	
Febbraio	180	124	56	19	5	15	2	17	4	11	4	11	8	12	2	1	3	..	3	5	1	8	7	5	4	4	1	7	10	6	2
Marzo	226	155	71	30	7	13	6	25	8	18	7	16	6	12	2	7	2	1	1	5	5	4	5	4	4	5	6	1	1	..	2	11	8	3	1
Aprile	216	160	56	22	4	6	6	26	7	17	1	15	4	17	9	1	..	4	4	12	2	6	1	11	9	2	2	1	2	1	..	12	3	4	2
Maggio	298	220	78	31	12	19	6	33	17	25	5	19	10	18	5	3	..	4	2	14	5	3	2	20	7	4	2	3	..	3	..	21	4	..	1
Giugno	257	183	74	34	10	12	3	32	5	22	5	15	10	15	7	6	..	1	5	10	7	7	2	11	7	4	4	1	2	11	7	2	..
Luglio	261	186	75	22	7	11	5	33	9	19	6	21	5	14	3	6	1	4	3	12	8	1	1	11	13	10	3	3	1	1	1	17	9	1	..
Agosto	196	138	58	16	9	7	3	14	7	15	4	15	3	16	4	4	1	2	1	7	3	7	1	15	6	7	1	1	1	1	2	9	11	2	1
Settembre	163	113	50	21	8	10	3	17	6	14	2	9	4	9	2	4	1	1	2	3	4	4	2	7	1	3	2	..	1	..	1	6	11	5	..
Ottobre	192	139	53	19	8	8	5	16	4	15	2	18	3	17	8	5	1	2	1	4	3	3	3	9	6	5	2	1	..	4	1	12	6	1	..
Novembre	131	97	34	15	5	9	..	16	4	6	5	8	5	15	5	..	1	1	1	5	1	1	1	10	4	2	3	..	5	2	1	..
Dicembre	185	127	58	22	4	6	5	19	9	10	2	22	5	10	10	4	2	..	3	7	2	2	2	8	5	3	4	2	..	2	..	8	5	2	..
Per amiegamento	470	273	197	42	33	7	1	45	24	32	12	27	26	36	18	7	4	4	8	13	6	9	5	14	12	16	21	1	6	2	1	14	18	4	2
Con arma da fuoco	620	579	41	81	4	48	2	86	3	46	4	47	1	52	6	12	2	7	2	23	..	13	2	52	4	16	1	6	..	10	2	66	8	6	..
Con arma da taglio	112	97	15	11	..	3	2	15	3	10	1	16	2	10	1	2	2	2	..	6	2	5	..	6	..	2	2	..	3	2	4	..
Per impiccamento	437	387	100	71	15	22	3	50	14	58	10	51	16	41	7	7	4	7	4	17	3	5	5	12	4	10	..	3	..	3	1	21	12	6	2
Per precipitazione	326	221	105	30	14	27	16	31	10	16	4	21	6	17	13	3	1	2	5	16	13	6	2	23	11	7	3	3	2	2	..	5	5	7	..
Per schiacciamento	91	81	10	27	2	16	1	11	3	12	3	4	..	1	..	1	..	1	..	1	..	2	..	1	1	..	3	1
Per avvelenamento	341	105	236	8	17	6	17	16	30	12	11	7	12	6	17	2	1	1	7	7	19	..	7	18	47	4	5	3	1	2	4	11	36	2	5
Per asfissia	58	36	22	6	4	8	7	7	2	5	1	4	1	..	2	2	1	..	1	1	2	2	1	1
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	26	20	6	1	3	..	1	1	1	..	1	1	6	3	
TOTALE	2 531	1 799	732	279	89	122	48	286	87	193	46	186	68	170	64	42	15	24	28	89	45	41	21	131	78	59	31	16	9	22	8	130	86	29	9

TAV. XI. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1916, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, il sesso e l'età.

E T À	COMPLESSO			PER ANNEGAMENTO		CON ARMA DA FUOCO		CON ARMA DA TAGLIO		PER IMPICCAMENTO		PER PRECIPITAZIONE		PER SCHIACCIAMENTO		PER AVVELENAMENTO		PER ASPISSIA		CON ALTRO MEZZO O CON MEZZO NON DETERMINATO	
	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Fino a 15 anni	14	9	5	1	3	6	2	1	..	1
Da 15 a 19 anni	231	129	102	17	21	57	11	..	1	24	6	9	6	10	1	10	51	1	4	1	1
» 20 » 24 »	291	161	130	10	21	82	12	6	1	23	9	13	13	8	4	16	65	2	5	1	..
» 25 » 29 »	281	195	86	21	14	74	7	8	2	31	14	31	9	9	1	13	35	6	4	2	..
» 30 » 39 »	471	342	129	30	34	119	9	26	1	72	22	54	17	16	2	20	40	3	4	2	..
» 40 » 49 »	343	268	75	47	22	88	..	15	1	63	17	26	16	7	1	15	16	5	1	2	1
» 50 » 59 »	347	266	81	43	32	58	1	20	3	67	12	33	16	13	1	13	12	14	3	5	1
» 60 » 69 »	313	250	63	50	21	62	1	15	3	66	11	32	14	9	..	12	12	2	..	2	1
» 70 » 79 »	190	144	46	45	24	30	..	5	3	28	6	17	6	6	..	5	5	3	1	5	1
» 80 anni in su	38	23	15	7	5	5	..	1	..	4	3	4	6	2	1
Età ignota	12	12	..	2	..	4	..	1	..	3	..	2
TOTALE	2 531	1 799	732	273	197	579	41	97	15	387	100	224	105	81	10	105	236	36	22	20	..

TAV. XII. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1916, classificati secondo lo stato civile, il sesso e i mezzi o modi di uccisione

MEZZI DI UCCISIONE	COMPLESSO			CELIBI			CONIUGATI			VEDOVI			STATO CIVILE IGNOTO		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femm.
Per annegamento	470	273	197	159	90	69	200	117	83	92	50	42	19	16	3
Con arma da fuoco	620	579	41	294	267	27	247	239	8	42	37	5	37	36	1
Con arma da taglio	112	97	15	33	29	4	54	48	6	18	13	5	7	7	..
Per impiccamento	487	387	100	178	153	25	229	171	58	54	39	15	26	24	2
Per precipitazione	320	221	105	109	75	34	147	100	47	47	25	22	23	21	2
Per schiacciamento	91	81	10	46	40	6	30	27	3	8	8	..	7	6	1
Per avvelenamento.	341	105	236	192	52	140	108	39	69	26	9	17	15	5	10
Per asfissia	58	36	22	22	9	13	24	18	6	8	6	2	4	3	1
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	26	20	6	6	5	1	13	11	2	7	4	3
TOTALE	2 531	1 799	732	1 039	720	319	1 052	770	282	302	191	111	138	118	20

TAV. XIII. — Suicidi nel Regno, durante l'anno 1916, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	SUICIDI	PROFESSIONI O CONDIZIONI	SUICIDI
Maschi.			
Agricoltori	431	Fabbricanti e operai non specificati	63
Braccianti e manovali	74	Marinai, pescatori, barcaiuoli e capitani marittimi	15
Pastori e mandriani	15	Cocchieri, stallieri e carrettieri	19
Minatori, marmisti, zolfatai e salinai	9	Ferrovieri e tramvieri	12
Fabbrì, meccanici, elettricisti e calderai	60	Fattorini postali e telegrafici	9
Macchinisti	1	Farmacisti	6
Fornaciai	1	Negozianti, albergatori e sensali	68
Vetrai	2	Commessi di negozio	15
Muratori, scalpellini e pittori di stanze	47	Fruttivendoli, pescivendoli e venditori ambulanti	18
Falegnami, carrozzai e carpentieri	41	Domestici, cuochi, uscieri e portieri	13
Cestai e impagliatori	2	Facchini, lavandai e spazzini	29
Tappezzieri e materassai	3	Impiegati pubblici e privati e pensionati civili	121
Cartai	1	Corpi armati (escluso l'esercito)	15
Tipografi e litografi	8	Militari e pensionati militari	263
Tessitori e tintori	7	Maestri e professori	11
Conciatori di pelli	2	Sacerdoti	3
Calzolai e valigiai	37	Medici	11
Sarti	12	Infermieri	2
Cappellai, guantai e berrettai	3	Avvocati, notai e uscieri giudiziari	17
Barbieri	7	Ingegneri	13
Mugnai, pastai, fornai e panettieri	27	Proprietari e benestanti	88
Orefici	7	Studenti	31
Caffettieri e pasticciieri	6	Mendicanti e ricoverati	8
Trattori, vinai, osti e liquoristi	14	Altre professioni e professioni ignote	94
Camerieri di esercizi pubblici	13		
Macellai e pizzicagnoli	13	TOTALE	1 790
Femmine.			
Contadine	114	Maestre e professoressa	10
Braccianti e giornaliera	8	Impiegate e pensionate	9
Filatrici e tessitrici	7	Levatrici	3
Sarte, modiste, cucitrici e bustaie	34	Studentesse	4
Cappellaie	2	Artiste di teatro	3
Stiratrici	4	Proprietarie e benestanti	49
Operale in genere	15	Donne di casa	366
Negozianti	4	Mendicanti	1
Ostesse	1	Altre professioni e professioni ignote	51
Pescivendole, erbivendole e venditrici ambulanti	4		
Cameriera, domestiche, portinaie e cuoche	35	TOTALE	727
Commesse di negozio	3		

TAV. XIV. — Morti nel Regno, durante l'anno 1916, per omicidio, in età da 15 anni in su, classificati per sesso e secondo la professione o condizione.

PROFESSIONI O CONDIZIONI	OMICIDI	PROFESSIONI O CONDIZIONI	OMICIDI
--------------------------	---------	--------------------------	---------

Maschi

Agricoltori	306	Cocchieri, carrettieri e mulattieri	9
Braccianti, cantonieri e selciatori	26	Ferrovieri	2
Pastori	42	Fattorini postali	2
Marmisti, cavatori e zolfatai	10	Negozianti e sensali	22
Fabbri, meccanici, calderai e stagnini	11	Commessi di negozio	2
Fuochisti	1	Fruttivendoli, pescivendoli e venditori ambulanti	7
Cementisti	1	Domestici e portieri	5
Vetrai	3	Facchini e lavandai	7
Muratori e pittori di stanze	15	Impiegati pubblici e privati	8
Falegnami	18	Corpi armati (escluso l'esercito)	12
Tappezzieri	1	Militari	31
Calzolai	15	Sacerdoti	3
Sarti	5	Medici	3
Barbieri	3	Avvocati	2
Mugnai, fornai e panettieri	6	Ingegneri e agrimensori	2
Osti	2	Proprietari e benestanti	28
Lattai	1	Studenti	3
Macellai e pizzicagnoli	8	Mendicanti	2
Fabbricanti e operai non specificati	23	Altre professioni e professioni ignote	47
Pescatori	4		
		TOTALE	698

Femmine

Contadine	68	Cameriere e domestiche	4
Braccianti	1	Impiegate	1
Filatrici e tessitrici	2	Suore	1
Lavandaie	1	Ballerine	1
Sarte	4	Proprietarie e benestanti	8
Pettinatrici	1	Donne di casa	80
Operaie in genere	4	Professioni ignote	7
Negozianti	1		
Ostesse	1	• TOTALE	185

