

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA

---

STATISTICA  
DELLE CAUSE DI MORTE  
NELL'ANNO 1936



ROMA  
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA  
Via Emilio Morosini, 17  
—  
1937 - Anno XVI

# ELENCO

dei volumi sulla " *Statistica delle cause di morte* ",  
pubblicati anteriormente al presente

(Le pubblicazioni contrassegnate con asterisco sono esaurite)

<i>Statistica delle cause delle morti</i> avvenute in 281 Comuni capi- luoghi di Provincia, Circondario o di Distretto.	1881	* <i>Statistica delle cause di morte</i>	1897	
* <i>Statistica delle cause di morte</i> nei Comuni capiluoghi di Pro- vincia e di Circondario.	1882	* Id.	id.	1898
* Id.	id.	Id.	id.	1899, L. 5
* Id.	1883 <sup>(1)</sup>	* Id.	id.	1900
* Id.	1884	* Id.	id.	1901
* Id.	1885	* Id.	id.	1902
* Id.	1886 <sup>(2)</sup>	Id.	id.	1903, L. 5
* <i>Statistica delle cause delle morti</i> avvenute in tutti i Comuni del Regno.	1887 <sup>(3) (4) (5)</sup>	Id.	id.	1904, L. 5
* Id.	id.	* Id.	id.	1905 <sup>(5) (12)</sup>
* <i>Statistica delle cause di morte in</i> tutti i Comuni del Regno.	1888 <sup>(5)</sup>	Id.	id.	1906, L. 5
* <i>Cause di morte</i> - Statistica del- l'anno	1889 <sup>(5) (6) (7)</sup>	Id.	id.	1907, L. 5
* <i>Cause di morte</i> - Statistica de- gli anni	1890 <sup>(8)</sup>	* Id.	id.	1908, L. 5
* Id.	id.	* Id.	id.	1909, L. 5
* <i>Cause di morte</i> - Statistica del- l'anno	1891-92 <sup>(5) (9)</sup>	Id.	id.	1910
* Id.	1893-94 <sup>(10)</sup>	* Id.	id.	1911 <sup>(5)</sup>
* <i>Cause di morte</i> - Statistica del- l'anno	1895 <sup>(11)</sup>	Id.	id.	1912, L. 5
* Id.	id.	Id.	id.	1913, L. 5
	1896	Id.	id.	1914, L. 5
		Id.	id.	1915, L. 5
		* Id.	id.	1916, L. 5
		Id.	id.	1917
		Id.	id.	1918, L. 5

(Segue)

(1) In questo volume è data anche la statistica delle morti violente in tutto il Regno. Tale statistica s'incominciò a fare nel 1864, e per i due anni 1864 e 1865 fu pubblicata in appendice al volume del *Movimento dello stato civile*. Per gli anni 1866-70 essa fu pubblicata in fascicoli speciali; dal 1871 al 1882 fu data nuovamente nei volumi annuali del *Movimento dello stato civile*, e a partire dal 1883 fu, per analogia di materia, unita alla *Statistica delle cause delle morti*.

(2) Con una appendice riguardante i *Provvedimenti a favore dei bambini esposti o altrimenti abbandonati dai genitori*, negli anni 1885, 1886 e 1887.

(3) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, durante il decennio dal giugno 1879 al luglio 1889.

(4) Con tavole riguardanti il *Censimento dei Sanitari stipendiati dai Comuni e da altri Enti per la cura gratuita dei poveri a domicilio*, al 31 marzo 1888.

(5) Con confronti internazionali.

(6) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° gennaio 1890 al 30 settembre 1891.

(7) Con tavole riguardanti il *Movimento degli infermi negli Ospedali civili*, durante i sei anni corsi dal 1883 al 1888.

(8) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1892.

(9) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° giugno 1879 al 31 dicembre 1892.

(10) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° giugno 1879 al 1° luglio 1895.

(11) Con tavole riguardanti la *Statistica dei duelli*, dal 1° giugno 1879 al 31 dicembre 1896.

(12) Con un'appendice sull'*Assistenza agli esposti* nel quinquennio 1902-06.

# ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

## ERRATA - CORRIGE

	<i>Errata</i>	<i>Corrige</i>
Pag. 4* nota (1) 4 <sup>a</sup> riga . . . . .	pag. 16	pag. 10
• 5* prospetto 2, Lucania (ultima colonna) . . .	556	555
• 21* prospetto 17, Complesso nubili età 39-34 . .	1,18	1,19
• 23* penultima riga . . . . .	Genova (2,3)	Genova (2,3 su 10.000 abitanti)
• 31* 9 <sup>a</sup> riga (testo) . . . . .	negli stessi Com- partimenti	negli stessi Compart. eccettuata la Sicilia)
• 34* prospetto 25 . . . . .	1935-1936	1935*-1936*
• » prima della nota (a) a piè pagina . . . .		(*) Vedi nota (a) a pag. precedente
• 58* prospetto 48 . . . . .	Fornaciaci	Falgognaui
• 64* prospetto 56, nota (a) . . . . .	esclusi i suicidi di stato civile ignoto	esclusi i suicidi di sta- to civile ignoto e di età ignota
• 9 Venezia Trid. MF, N. 107 al 109 dell' Elenco Nosologico . . . . .	201	1201
• 27 Abruzzi e Mol. (Totale F), dal N. 20 al 31 dell' Elenco Nosologico . . . . .	—	1
	1	—
	—	3
	538	535
	3	364
	364	57
	57	57
	57	7
	7	14
	14	4
	4	3
	3	8
	8	—
• 57 Napoli o Campania MF, N. 196 e 198 del- l' Elenco Nosologico . . . . .	—	2
	2	—
• 60 Classi di Comuni da 2000 a 4999 e da 10.000 a 19.999, N. 163 al 171 dell' Elenco Nos. • » Classi di Comuni da 2000 a 4999 e da 10.000 a 19.999, N. 199 e 209 dell' Elenco Nos.	578 e 456	579 e 455
• 69 Tot. di 4 anni, N. 71b dell' Elenco Nos. . .	1	11
• 72 Tot. meno di 1 mese, N. 135b Elenco Nos. .		2
• 76 Tot. da 40 a 44 anni, N. 35 Elenco Nos. . .	1369 e 616	3
• 79 Da 85 a 89 anni femmine, classe IV . . . .		4
• 92, 94 e 96 Note (*), (**), (a) . . . . .	pag. 88	pag. 90
• 96-97 Note a piè pagina . . . . .	(i) ed (l)	vanno soppresse
131 Tot. (Altri Corpi armati, ecc.) Mal. app. resp., gruppo d'età 75 a 79 . . . .		3

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA

---

STATISTICA  
DELLE CAUSE DI MORTE  
NELL'ANNO 1936



ROMA  
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA  
Via Emilio Morosini, 17

1937 - Anno XVI



A S. E. IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI  
CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO

ECCELLENZA,

*Ho l'onore di presentare all'E. V. il volume sulla Statistica delle cause di morte nell'anno 1936, che, oltre alle solite notizie, contiene alcuni nuovi dati e classificazioni sui bambini morti nel primo anno di vita e sui morti per diabete mellito.*

Roma, 14 dicembre 1937-XVI

IL PRESIDENTE  
DELL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
FRANCO SAVORGNAN

# I N D I C E

LETTERA DI PRESENTAZIONE A S. E. IL CAV. BENITO MUSSOLINI, CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO . . . . .	Pag. III
--	----------

AVVERTENZE . . . . .	» VI
NOTIZIE INEDITE . . . . .	» VII

## INTRODUZIONE.

### CAPO I. — Cause delle morti:

§ 1. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1934, 1935 e 1936 . . . . .	» 1*
§ 2. — Intensità e frequenza di alcune cause di morte . . . . .	» 4*
<i>Morbillo</i> . . . . .	» 4*
<i>Scarlattina</i> . . . . .	» 5*
<i>Febbre tifoidea e paratifo</i> . . . . .	» 6*
<i>Difterite e croup</i> . . . . .	» 7*
<i>Tosse convulsa</i> . . . . .	» 8*
<i>Poliomielite anteriore acuta</i> . . . . .	» 9*
<i>Influenza</i> . . . . .	» 10*
<i>Sifilide</i> . . . . .	» 11*
<i>Tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi</i> . . . . .	» 11*
<i>Febbri da malaria e cachessia palustre</i> . . . . .	» 18*
<i>Tumori maligni</i> . . . . .	» 18*
<i>Diabete mellito</i> . . . . .	» 22*
<i>Convulsioni nei bambini in età inferiore ai 5 anni</i> . . . . .	» 24*
<i>Malattie del cuore</i> . . . . .	» 24*
<i>Bronchite acuta e cronica</i> . . . . .	» 25*
<i>Broncopolmonite acuta e polmonite lobare</i> . . . . .	» 26*
<i>Enteriti al disotto di 2 anni</i> . . . . .	» 27*
<i>Cirrosi alcoolica del fegato e alcoolismo cronico</i> . . . . .	» 28*
<i>Malattie della gravidanza, parto e puerperio</i> . . . . .	» 29*
<i>Mortalità nel primo anno di vita per alcune principali cause</i> . . . . .	» 35*
<i>Marasma senile</i> . . . . .	» 37*
§ 3. — Mortalità nel Regno dei bambini, durante il primo anno di vita, per cause, in relazione alla legittimità dei natali . . . . .	» 38*
§ 4. — Bambini morti nel primo anno di vita, secondo l'età alla morte . . . . .	» 41*
§ 5. — Mortalità neonatale e nel primo mese di vita secondo il genere del parto, nel biennio 1934-35 e nell'anno 1936 . . . . .	» 43*
§ 6. — Morti dopo atto operatorio, nell'anno 1936 . . . . .	» 44*
Quozienti di letalità, nel Regno, per malattie infettive soggette a denuncia, durante gli anni dal 1888 al 1936 . . . . .	» 46*

### CAPO II. — Notizie sulle morti violente e sulle morti causate da avvelenamenti cronici accidentali o professionali:

§ 1. — Morti per causa violenta, ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1936 . . . . .	» 48*
§ 2. — Notizie sulle morti per causa violenta accidentale . . . . .	» 48*
§ 3. — Morti causate da avvelenamenti cronici e intossicazione . . . . .	» 56*
§ 4. — Omicidi e infanticidi . . . . .	» 59*
§ 5. — Notizie sui morti per suicidio . . . . .	» 62*

### CAPO III. — Le cause di natimortalità nel sessennio 1931-36 . . . . .

#### ALLEGATO :

Fac-simile della scheda individuale (modello B) per i morti (maschi) . . . . .	» 72*
--	-------

TAVOLE

TAV. I. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte :	
.i) Per Provincie e Compartimenti . . . . .	Pag. 2
B) Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno . . . . .	» 50
» 2. — Morti, nell'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno . . . . .	» 56
» 3. — Morti nel 1936, classificati per cause e classi di Comuni : . . . . .	» 60
» 4. — Morti, durante l'anno 1936, nei Comuni con più di 100 000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, classificati secondo le cause di morte . . . . .	» 62
» 5. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso . . . . .	» 64
» 6. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1936, classificati secondo le cause, l'età ed il sesso . . . . .	» 88
» 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione . . . . .	» 90
» 8. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1936, nei singoli Compartimenti, distinti secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso . . . . .	» 98
» 9. — Bambini, nati da parti multipli, morti nel primo mese di vita, durante l'anno 1936, classificati per alcune cause di morte, sesso, età e filiazione . . . . .	» 100
» 10. — Bambini, morti nella prima settimana di vita, durante l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso . . . . .	» 102
» 11. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso . . . . .	» 104
» 12. — Morti, durante l'anno 1936, per gruppi di età da 15 anni in poi, classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso . . . . .	» 120
» 13. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno . . . . .	» 136
» 14. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, lo stato civile ed il sesso . . . . .	» 140
» 15. — Femmine morte nel Regno per tumori degli organi genitali e delle mammelle, nell'anno 1936, classificate per età e stato civile . . . . .	» 142
» 16. — Madri morte durante l'anno 1936, per infezioni puerperali, nei singoli Compartimenti e nel Regno, con distinzione di primipare e pluripare e classificate per gruppi di età . . . . .	» 143
» 17. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso . . . . .	» 145
» 18. — Morti, durante l'anno 1936, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, il sesso e il mese in cui avvenne la morte . . . . .	» 152
» 19. — Morti per suicidio, durante l'anno 1936, distinti per sesso, per mese in cui avvenne il decesso, per classi di Comuni, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno . . . . .	» 153
» 20. — Morti per suicidio, durante l'anno 1936, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso . . . . .	» 154
» 21. — Nati morti distinti secondo le cause, la specie del parto, la filiazione ed il sesso, nell'anno 1936 . . . . .	» 156
» 22. — Nati morti legittimi, nell'anno 1936, da madri che presumibilmente non ebbero figli prima dell'attuale matrimonio, per cause, età della madre al parto e ordine di generazione . . . . .	» 156
» 23. — Popolazione residente censita al 21 aprile 1936, nelle Provincie, nei Comuni capiluoghi di Provincia e negli altri Comuni di ciascun Compartimento e del Regno . . . . .	» 158



## AVVERTENZE

1. — Tutti i dati contenuti nel presente volume, a meno che non sia diversamente indicato, si riferiscono al Regno nei confini prebellici, fino a tutto l'anno 1923; dal 1924 in poi, i dati si riferiscono al Regno negli attuali confini.

2. — Nei prospetti e nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

Due puntini (..), per i numeri relativi, quando non raggiungano la cifra significativa nell'ordine minimo considerato (0,001; 0,01; ecc.).

La linea (—), quando non è stato registrato alcun caso, oppure non si conoscono i dati.

3. — Nei prospetti, la somma delle cifre proporzionali non sempre dà, nel totale, cento o mille, ecc., a causa degli arrotondamenti.

4. — Gli Elenchi nosologici delle cause di morte adottati nel presente volume sono quelli stabiliti dalla IV Conferenza internazionale (tenuta a Parigi nell'ottobre 1929), costituiti da una nomenclatura dettagliata di 200 voci, una intermedia di 85 voci ed una abbreviata di 43 voci (a).

5. — I dati contenuti nel presente volume si riferiscono alla circoscrizione territoriale quale era al 31 dicembre degli anni considerati, secondo le variazioni effettuate a detta data (b).

6. — I quozienti di mortalità sono stati calcolati, generalmente, sulla popolazione presente alla metà di ciascun periodo (c). Per i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22 e 1930-32 sulla popolazione *presente* censita rispettivamente il 10 febbraio 1901, il 10 giugno 1911, il 1° dicembre 1921 e il 21 aprile 1931. Per l'anno 1936 i quozienti sono stati calcolati sulla popolazione *residente* censita al 21 aprile 1936.

7. — Si rimanda il lettore al volume sul *Movimento della popolazione nell'anno 1936* (pagina 10\*), per quanto riguarda la mortalità generale del Regno, delle Province e dei Comuni capiluoghi di Provincia.

8. — Per le modalità di rilevazione dei dati, cfr.: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « *Statistica delle Cause di morte negli anni 1928, 1929 e 1930* ». I modelli di rilevazione o le indicazioni delle variazioni annuali sono riportati in allegato ai volumi. Per il 1936 cfr. pagg. 72\* e 73\*.

9. — Per i dati meteorologici mensili nel 1936, cfr.: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Annuario Statistico Italiano, Anno 1937-XV*, IV Serie, Vol. IV, pagg. 1-3.

10. — Per le notizie esistenti presso l'Istituto Centrale di Statistica e non pubblicate, vedi l'elenco a pagina seguente.

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte e dizionario delle malattie* — 5ª edizione — Roma, Tipografia Ippolito Failli — 1936-XIV, pag. 44 e seguenti.

(b) Le notizie sulle variazioni territoriali delle circoscrizioni amministrative del Regno sono contenute in appositi volumi pubblicati periodicamente.

(c) I criteri e i metodi seguiti per calcolare la popolazione nell'intervallo fra i censimenti sono generalmente indicati nei volumi sul movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile.

NOTIZIE ESISTENTI PRESSO L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E NON PUBBLICATE  
sulla Statistica delle « Cause di Morte » nell'anno 1936

L'Istituto Centrale di Statistica fornisce, dietro richiesta, le notizie non pubblicate, contro il semplice rimborso delle spese vive: di copiatura, di collazionatura, di eventuale elaborazione e di posta.

Nella colonna 3 sono indicate le Circostrizioni territoriali alle quali i dati si riferiscono. Per rendere più agevole la ricerca delle Circostrizioni territoriali, queste sono state contraddistinte con un numero progressivo secondo l'ordine indicato qui di seguito.

Numero d'ordine delle Circostrizioni territoriali.

- |   |  |
|---|--|
| 1 — Singoli Comuni.   | 9 — Compartimento.   |
| 2 — Singoli Capiluoghi di Provincia.  | 10 — Complesso dei 94 Comuni Capiluoghi di Provincia.                        |
| 3 — Complesso dei Comuni della Provincia (escluso il Capoluogo di Provincia).   | 11 — Complesso dei Comuni del Regno (esclusi i Capiluoghi di Provincia).     |
| 4 — Classi di Comuni della Provincia (a).                                       | 12 — Singoli Comuni con oltre 100.000 abitanti.                              |
| 5 — Provincia.  | 13 — Ripartizione geografica.  |
| 6 — Complesso dei Capiluoghi di Prov. del Compartimento.                        | 13bis — Complesso dei Capiluoghi e altri Comuni per Ripartizione geografica. |
| 7 — Complesso dei Comuni del Compartimento (esclusi i Capiluoghi di Provincia). | 14 — Classi di Comuni del Regno (a).   |
| 8 — Classi di Comuni del Compartimento (a).                                     | 15 — Regno.  |

AVVERTENZA — Le notizie non pubblicate si riferiscono a tutti i dati contenuti nelle tavole.

1	2	3
N. Tavole	NOTIZIE CONTENUTE NELLE TAVOLE (*)	Circostrizioni territoriali (*)
1	Morti, distinti secondo 200 cause di morte . . . . .	5 . . . . . 9 . . . . . 13 . . . . . 15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	5 . . . . . 9 . . . . . 13 . . . . . 15 . . . . .
2	Morti, classificati secondo le cause di morte (nom. abbreviata), nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno . . . . .	6 7 . . . . . 10 11 . . . . . 15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	2 3 . . . . . 6 . . . . . 10 . . . . . 15 . . . . .
3	Morti, classificati per cause (nom. abbreviata) e classi di Comuni <b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	5 . . . . . 14 15 . . . . .
4	Morti, nei Comuni con più di 100.000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, classificati secondo le cause di morte (nom. abbreviata) . . . . .	5 . . . . . 14 15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	12 . . . . . 12 . . . . .
5	Morti, classificati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
6	Bambini morti nel primo anno di vita classificati secondo le cause, l'età ed il sesso . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
7	Bambini, morti nel primo anno di vita, classificati secondo le cause di morte (nom. dettagliata), l'età e la filiazione . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
8	Bambini, morti nel primo anno di vita, nei singoli Compartimenti, distinti secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso . . . . .	9 . . . . . 15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	9 . . . . . 15 . . . . .
9	Bambini, nati da parti multipli, morti nel primo mese di vita, classificati per alcune cause di morte, sesso, età e filiazione . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
10	Bambini morti nella prima settimana di vita, classificati secondo le cause di morte (nom. dettagliata), l'età ed il sesso . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
11	Morti, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia), la professione o condizione ed il sesso . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
12	Morti, per gruppi di età da 15 anni in poi, classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
13	Morti, classificati secondo le cause di morte (nom. abbreviata), con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno . . . . .	9 . . . . . 15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	9 . . . . . 15 . . . . .
14	Morti, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte (nom. abbreviata), lo stato civile ed il sesso . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
17	Morti, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
18	Morti, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infornuto, il sesso e il mese in cui avvenne la morte . . . . .	9 . . . . . 15 . . . . .
20	Morti per suicidio, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso . . . . .	9 . . . . . 15 . . . . .
22	Nati morti legittimi, da madri che presumibilmente non ebbero figli prima dell'attuale matrimonio, per cause, età della madre al parto e ordine di generazione: . . . . .	13 . . . . . 15 . . . . .
	da parti semplici . . . . .	13bis 15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	13bis 15 . . . . .
	da parti multipli . . . . .	15 . . . . .
	<b>con distinzione di sesso</b> . . . . .	15 . . . . .

(\*) Le notizie non pubblicate e i numeri corrispondenti alle Circostrizioni territoriali per le quali si hanno notizie inedite, sono in carattere neretto.

(a) Le classi di Comuni sono: 1) meno di 2.000 abit.; 2) da 2.000 a 4.999 abit.; 3) da 5.000 a 9.999 abit.; 4) da 10.000 a 19.999 abit.; 5) da 20.000 a 49.999 abit.; 6) da 50.000 a 99.999 abit.; 7) da 100.000 abit. e più.



# INTRODUZIONE

## CAPO I.

### CAUSE DELLE MORTI.

**§ 1. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1934, 1935 e 1936.** — Nel 1936 le cause delle morti furono specificate dai medici curanti o necroscopi per 588 629 casi e restarono ignote per 1007, cioè 17 casi su 10 000. Il numero dei morti per causa non specificata, per la maggiore cura posta dai medici nel compilare la scheda e per la più accurata revisione fatta dall'Istituto Centrale di Statistica delle schede mod. *B* e *B-bis*, è andato notevolmente diminuendo dopo il 1925.

Nel prospetto 1 sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni 1934, 1935 e 1936, classificate secondo la nomenclatura nosologica intermedia stabilita a Parigi nel 1929. Le cifre contenute in detto prospetto e quelle relative agli anni 1931, 1932 e 1933 che si trovano nel volume « *Statistica delle Cause di morte nell'anno 1933, Parte I - Introduzione* », alle pagine 5\* e 6\*, costituiscono una nuova serie di dati e sono comparabili alle analoghe, contenute nei volumi precedenti dal 1887 al 1930, solo per alcune voci. Il lettore, che vorrà rendersi un conto più esatto della comparabilità dei dati della nuova serie con quelli della serie dal 1924 al 1930, potrà consultare le tabelle allegate alla Introduzione sulla Statistica delle Cause di morte per gli anni 1931 e 1932 (\*).

Dal prospetto 1 si rileva che le malattie che diedero, nel 1936, i più alti quozienti di mortalità, furono, in ordine decrescente: *polmoniti*; *emorragia*; *embolia e trombosi cerebrale*; *enteriti (al disotto di due anni)*; *cancri ed altri tumori maligni*; *tubercolosi dell'apparato respiratorio*; *malattie del miocardio*; *endocarditi croniche*; *nefriti*; *bronchiti*; *altre malattie del cuore*; *arteriosclerosi e cangrena*; *morti accidentali*; *influenza*; *debolezza congenita*; *ogni altra forma di tubercolosi*; *nascita prematura*; con andamento pressochè analogo a quello dell'anno precedente.

Si esclude la *semilità*, in quanto in essa possono addensarsi cause di morte non bene specificate.

---

(\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932, Parte I - Introduzione - Allegato I a pag. 133\* e Allegato II a pag. 146\** — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1935-XIII.

PROSPETTO 1. — Morti avvenute nel Regno, negli anni 1934, 1935(\*) e 1936(\*), classificate secondo le cause.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CIFRE ASSOLUTE			CIFRE PROPORZIONALI A 1 000 000 DI ABITANTI		
		1934	1935	1936	1934	1935	1936
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie</b>	<b>75357</b>	<b>75686</b>	<b>70833</b>	<b>1776</b>	<b>1768</b>	<b>1648</b>
1, 2	Febbre tifoidea e paratifi . . . . .	4868	5228	3839	115	122	89
3	Tifo petecchiale . . . . .	4	3	3	..	..	..
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	3	1	—	..	..	—
7	Morbillo . . . . .	3479	2420	1966	82	57	46
8	Scarlattina . . . . .	962	1220	571	23	28	13
9	Tosse convulsa . . . . .	2189	1922	2372	52	45	55
10	Difterite . . . . .	2838	2916	2571	67	68	60
11	Influenza . . . . .	8277	11704	10675	195	273	248
13	Dissenteria . . . . .	374	367	271	9	9	6
23	Tubercolosi dell'appar. respirat. (a) . . . . .	29363	28032	27856	692	655	648
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi . . . . .	9857	10005	9640	232	234	224
34	Sifilide . . . . .	1563	1815	1759	37	42	41
36	Infezione purul. e settic., non puerp. . . . .	4988	3693	3543	118	86	82
38	Malaria . . . . .	2238	1693	1291	53	40	30
dal 39 al 42	Malattie dovute a protozoi od elminti . . . . .	689	706	672	16	16	16
4. 5. 12, dal 15 al 22, 33, 35. 37. 43. 44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	3660	3961	3804	86	93	88
	<b>II. - Tumori (neoplasie)</b>	<b>35115</b>	<b>36429</b>	<b>37699</b>	<b>828</b>	<b>851</b>	<b>877</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni . . . . .	34228	35045	36087	807	818	839
54. 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	887	1384	1612	21	32	37
	<b>III. - Malattie reumatiche, (c)</b>	<b>9607</b>	<b>10511</b>	<b>10240</b>	<b>226</b>	<b>245</b>	<b>238</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	2213	2487	2348	52	58	55
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	1269	1414	1373	30	33	32
59	Diabete mellito . . . . .	4034	4358	4238	95	102	100
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	564	634	643	13	15	15
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat. . . . .	464	582	568	11	14	13
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	1063	1036	1020	25	24	24
	<b>IV. - Mal. del sangue e org. ematopoietici.</b>	<b>3004</b>	<b>2953</b>	<b>3030</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	1207	1151	1127	28	27	26
70. 72. 73. 74	Leucemie, aleucemie (d) . . . . .	1797	1802	1903	42	42	44
	<b>V. - Avvelenamenti cronici e Intossicazioni</b>	<b>678</b>	<b>601</b>	<b>596</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	649	540	560	15	13	13
76, 77	Altri avvelenamenti cronici . . . . .	29	61	36	1	1	1
	<b>VI. - Mal. del sist. nervoso e org. del sensi.</b>	<b>69479</b>	<b>73144</b>	<b>73358</b>	<b>1638</b>	<b>1708</b>	<b>1706</b>
79	Meningite semplice . . . . .	2604	2683	2859	61	63	66
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	273	294	323	7	7	8
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebrale . . . . .	54320	57539	57919	1281	1344	1347
83	Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	800	792	824	19	18	19
84	Demenza precoce ed altre psicosi . . . . .	1294	1253	1283	31	29	30
85	Epilessia . . . . .	1436	1555	1476	34	36	34
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	7979	8132	7802	188	190	181
88, 89	Mal. occhio, orecchio e annessi . . . . .	768	896	872	18	21	20
	<b>VII. - Malattie dell'apparato circolatorio.</b>	<b>75648</b>	<b>81336</b>	<b>86349</b>	<b>1783</b>	<b>1900</b>	<b>2008</b>
90	Pericardite . . . . .	187	204	231	4	5	5
91	Endocardite acuta . . . . .	434	518	551	10	12	13
92	Endocardite cronica, (e) . . . . .	20831	21699	23327	491	507	543
93	Malattie del miocardio . . . . .	22743	23999	25161	536	561	585
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris . . . . .	3169	3566	3772	75	83	88
95	Altre malattie del cuore . . . . .	13967	15162	16238	329	354	378
96	Aneurisma, escluso quello del cuore . . . . .	748	775	730	18	18	17
97, 98	Arteriosclerosi (f) e cangrena . . . . .	12193	13618	14578	287	318	339
dai 99 al 103	Altre mal. dell'apparato circolatorio . . . . .	1376	1795	1761	32	42	41

(\*) Non compresi per il 1935, 390 militari e 259 operai; per il 1936, 3017 militari e 626 operai deceduti nell'Africa Orientale Italiana (dati desunti dai bollettini pubblicati sui quotidiani) e 37 morti (maschi) nel Comune di Anzio (Roma) nel periodo 21 aprile-31 dicembre 1936, le cui schede di morte sono pervenute in ritardo.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (d) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (e) comprese le affezioni valvolari. (f) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

Segue: PROSPETTO 1. — Morti avvenute nel Regno, negli anni 1934, 1935 (\*) e 1936 (\*), classificate secondo le cause.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CIFRE ASSOLUTE			CIFRE PROPORZIONALI A 1 000 000 DI ABITANTI		
		1934	1935	1936	1934	1935	1936
	<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio</b>	<b>99027</b>	<b>108393</b>	<b>113512</b>	<b>2334</b>	<b>2532</b>	<b>2640</b>
106	Bronchiti . . . . .	15653	16484	17151	369	385	399
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	75108	82797	86679	1771	1934	2016
110	Pleuriti . . . . .	2664	2696	2761	63	63	64
104, 105, dal III al 114	Altre mal. dell'appar. respiratorio, (a)	5602	6416	6921	132	150	161
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente . .</b>	<b>77088</b>	<b>78649</b>	<b>70736</b>	<b>1817</b>	<b>1837</b>	<b>1645</b>
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno .	2789	2782	3073	66	65	71
119	Enteriti al disotto di due anni . . .	44261	46097	37907	1043	1077	832
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni ed oltre)	9803	9365	8792	231	219	204
121	Appendicite . . . . .	2634	2800	2767	62	65	64
122	Ernia, occlusione intestinale . . . .	4214	4436	4376	99	104	102
124	Cirrosi del fegato . . . . .	5107	4898	5237	120	114	122
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari, (b) . .	2942	3041	3260	69	71	76
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente .	5338	5230	5324	126	122	124
	<b>X. - Mal. dell'apparato urinario e genitale</b>	<b>21604</b>	<b>23269</b>	<b>23551</b>	<b>509</b>	<b>543</b>	<b>548</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	16624	17648	17504	392	412	407
133	Altre malattie dei reni, (c) . . . . .	919	1028	1059	22	24	25
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	407	480	515	10	11	12
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori .	1231	1355	1429	29	32	33
136	Mal. dell'uretra, ascesso urinoso, ecc.	178	187	247	4	4	6
137	Malattie della prostata . . . . .	1853	2144	2405	44	50	56
138, 139	Malattie degli organi genitali, (d) . .	392	427	392	9	10	9
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerperio .</b>	<b>2708</b>	<b>3017</b>	<b>2883</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>67</b>
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . . .	189	249	206	4	6	5
144	Emorragia puerperale . . . . .	505	512	501	12	12	12
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali . . .	1052	1253	1183	25	29	28
146, 147	Tossicemia della gravidanza, (e) . . .	569	564	574	13	13	13
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	393	439	419	9	10	10
	<b>XII. - Mal. pelle e del tessuto cellulare .</b>	<b>1944</b>	<b>2381</b>	<b>2356</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>55</b>
151, 152, 153	Mal. pelle e del tessuto cellulare . . .	1944	2381	2356	46	56	55
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e organi della locom.</b>	<b>974</b>	<b>1085</b>	<b>1021</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
154, 155, 156	Mal. ossa e organi della locomoz. (f) .	974	1085	1021	23	25	24
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti . .</b>	<b>2752</b>	<b>2873</b>	<b>2938</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>68</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (g) .	2752	2873	2938	65	67	68
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia . . . . .</b>	<b>26556</b>	<b>27878</b>	<b>26166</b>	<b>626</b>	<b>651</b>	<b>609</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	11161	11203	10318	263	262	240
159	Nascita prematura (g) . . . . .	9037	9812	9528	213	229	222
160	Conseguenze del parto (g) . . . . .	665	814	890	16	19	21
161	Altre malattie speciali dell'infanzia .	5693	6049	5430	134	141	126
	<b>XVI. - Senilità . . . . .</b>	<b>38022</b>	<b>40726</b>	<b>41059</b>	<b>896</b>	<b>951</b>	<b>955</b>
162	Senilità . . . . .	38022	40726	41059	896	951	955
	<b>XVII. - Morti violente o accidentali . . .</b>	<b>18606</b>	<b>19159</b>	<b>17983</b>	<b>439</b>	<b>447</b>	<b>418</b>
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	3686	3267	3399	87	76	79
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	849	821	861	20	19	20
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	13940	15000	13609	329	350	317
195	Altre morti violente (h) . . . . .	129	67	104	3	2	2
196, 197	Ferite di guerra (i) . . . . .	—	—	3	—	—	—
198	Esecuzione giudiziaria . . . . .	2	4	7	..	..	..
	<b>Totale dei morti per causa determinata</b>	<b>558169</b>	<b>588090</b>	<b>584310</b>	<b>13158</b>	<b>13735</b>	<b>13591</b>
199, 200	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate .</b>	<b>5170</b>	<b>5863</b>	<b>5326</b>	<b>122</b>	<b>137</b>	<b>124</b>
	Morte improv. e cause non spec. o mal definite . . . . .	5170	5863	5326	122	137	124
	<b>Totale generale . . . . .</b>	<b>563339</b>	<b>593953</b>	<b>589636</b>	<b>13280</b>	<b>13872</b>	<b>13715</b>

(\*) Vedi la corrispondente nota (\*) a pagina precedente.

(a) esclusa la tubercolosi. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria, eclampsia, ecc.. (f) esclusa la tubercolosi ed il reumatismo. (g) esclusi i nati morti. (h) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (i) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

**§ 2. — Intensità e frequenza di alcune cause di morte.** — Come negli anni precedenti, viene illustrato l'andamento della mortalità per alcune principali cause di morte (vedi indice preposto al presente volume). Si rimanda il lettore, per maggiori particolari (comparazione nel tempo e nello spazio della mortalità per le suddette cause e quozienti specifici per sesso e per età), ai volumi precedenti (1), facendo notare che, nelle pagine che seguono, i commenti sono generalmente limitati, per brevità, al solo confronto, nel tempo, fra il 1936 ed il periodo base 1900-02 e, nello spazio, per il solo anno 1936.

Nel prospetto 34 risultano i quozienti di letalità per alcune malattie infettive soggette a denuncia, ottenuti mettendo a confronto il numero dei casi denunciati, comunicati dal *Ministero dell'Interno - Istituto di Sanità Pubblica - Sezione di epidemiologia*, col numero dei morti.

*A proposito di tali quozienti, è bene tener presente che, in quei casi in cui la malattia assume un andamento benigno, il che particolarmente può avvenire per il morbillo, per la tosse convulsa, per l'influenza e per la malaria, fra le malattie qui considerate, può non essere richiesta l'opera del medico, nè mancano casi nei quali la denuncia non viene fatta. Ne deriva che le denunce registrate possono essere inferiori ai casi realmente verificatisi, e quindi la letalità indicata essere superiore alla reale.*

**Morbillo.** — La mortalità nel Regno nei vecchi confini, prendendo a base quella del 1900-02, è diminuita nell'anno 1936 dell'82 %, ed anche nei singoli Compartimenti essa, nel 1936, è inferiore, in modo più o meno sensibile, a quella del periodo base.

La mortalità del 1936 è stata superiore a quella media del Regno in 8 Compartimenti (Venezia Giulia e Zara, Marche, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Lucania, Calabrie e Sardegna).

Il *morbillo* dà il massimo numero delle morti nei primi dieci anni di vita. Nelle età successive i casi di morte si vanno facendo sempre più rari in relazione alla minore frequenza dei casi di malattia in tali età. Nell'anno 1936, la mortalità per questa infezione, nel primo anno di vita, è stata superiore negli illegittimi (5,5 su 10 000 nati vivi) in confronto ai legittimi (4,2). La letalità, ottenuta ragguagliando il numero delle morti attribuite a tale infezione al numero dei casi denunciati alle Autorità sanitarie, è stata, nel 1936, del 2,7 %, segnando un lieve aumento a confronto di quella dell'anno precedente (\*).

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Statistica delle Cause di morte nell'anno 1933*, Parte I - Introduzione - Roma, Tipografia Operaia Romana, 1936-XIV, pag. 7\* e segg.

IDEM ... IDEM ..., negli anni 1931 e 1932 - Roma, Tipografia Operaia Romana, 1935-XIII, pag. 16\* e segg.

(\*) Vedi a tale proposito quanto è detto nel 3° Capoverso del § 2.

PROSPETTO 2. — **Mortalità per morbillo** (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	22.7	12.6	5.1	3.9	1.2	55	23	17	5	91	51	51	39	26	
Liguria . . . . .	23.9	12.4	4.1	2.5	1.0	52	17	10	4	96	50	41	25	21	
Lombardia . . . . .	30.5	29.5	9.2	8.5	1.1	96	30	28	3	122	119	93	85	23	
Venezia Trid. (a) . . .	—	—	—	3.4	1.5	—	—	—	—	—	—	—	34	33	
Veneto . . . . .	21.3	12.9	4.5	5.9	1.3	61	21	28	6	85	52	46	59	29	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	7.1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	71	262	
Emilia . . . . .	17.3	21.0	5.7	6.6	2.3	121	33	38	13	69	85	57	66	51	
Toscana . . . . .	17.5	13.4	8.0	4.4	2.1	77	46	25	12	70	54	80	44	46	
Marche . . . . .	19.4	11.1	6.6	4.8	5.6	57	34	25	29	78	45	66	48	123	
Umbria . . . . .	16.2	12.8	8.1	3.0	3.2	79	50	19	20	65	52	81	30	69	
Lazio . . . . .	44.9	38.9	18.2	13.7	1.9	87	41	31	4	180	157	182	137	40	
Abruzzi e Molise . . .	24.7	23.7	11.4	11.1	10.0	96	46	45	40	99	96	115	111	219	
Campania . . . . .	34.6	25.4	12.2	14.6	6.1	74	35	42	18	138	103	122	146	134	
Puglie . . . . .	23.5	58.5	17.1	27.9	22.1	249	73	119	94	94	236	171	279	483	
Lucania . . . . .	76.6	51.9	38.0	33.9	25.4	68	50	44	33	307	210	380	339	556	
Calabrie . . . . .	28.3	34.3	21.3	9.5	6.2	121	75	34	22	113	139	213	95	136	
Sicilia . . . . .	18.5	31.4	9.6	14.1	2.5	170	52	77	14	74	127	96	141	55	
Sardegna . . . . .	10.7	22.3	17.4	13.9	6.1	208	162	130	57	43	90	174	139	133	
REGNO { vecchi confini.	25.0	24.8	10.0			99	40	41	18	100	100	100			
{ attuali confini				10.0	4.6								100	100	

(a) Per la Venezia Tridentina e per la Venezia Giulia e Zara, si conosce il numero dei morti per le singole cause soltanto dal 1924 in poi.

**Scarlattina.** — La mortalità nel Regno, nei vecchi confini, è diminuita del 67 % nell'anno 1936 in confronto a quella del periodo base 1900-02; però i singoli Compartimenti non presentano tutti una diminuzione, perchè nel Lazio, Campania e, specialmente, nella Sardegna, la mortalità del 1936 è stata superiore a quella del periodo base, fatto che si deve, presumibilmente, attribuire a ricorsi epidemici della malattia in tali Compartimenti.

In confronto della mortalità media del Regno nel 1936, hanno segnato numeri indici superiori, i Compartimenti del Lazio, degli Abruzzi e Molise, della Campania, della Lucania e della Sardegna, e fra questi, in ispecial modo, la Campania e la Sardegna.



La *scarlattina*, come il *morbillo*, dà il massimo numero dei morti nei primi dieci anni di vita; la mortalità nel primo anno di vita, nel 1936, è stata lievemente superiore negli illegittimi (0,7 su 10 000 nati vivi) in confronto ai legittimi (0,4); infine, la letalità per tale infezione, nel Regno, è stata, nel 1936, del 3,8 % (\*).

PROSPETTO 3. — Mortalità per scarlattina (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	1.0	1.6	0.8	0.6	0.5	155	75	55	53	25	20	15	13	41	
Liguria . . . . .	3.6	1.6	0.9	0.6	0.3	44	25	17	7	88	20	17	15	21	
Lombardia . . . . .	0.7	1.7	2.9	0.7	0.3	225	389	93	45	18	21	55	16	26	
Venezia Trid. (a) . . .	—	—	—	2.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	61	68	
Veneto . . . . .	2.6	3.1	0.7	1.1	0.6	117	26	43	23	64	39	13	26	46	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	59	15	
Emilia . . . . .	2.0	3.2	1.4	0.8	0.5	159	68	40	26	50	40	26	19	41	
Toscana . . . . .	4.4	1.9	0.9	0.7	0.8	43	20	17	19	106	23	17	17	61	
Marche . . . . .	4.4	1.8	2.5	1.4	0.5	41	57	32	12	108	23	48	33	41	
Umbria . . . . .	1.0	2.2	11.7	1.3	—	208	1110	124	—	26	27	219	30	—	
Lazio . . . . .	1.3	3.5	32.0	11.3	3.4	278	2562	902	272	30	43	603	261	256	
Abruzzi e Molise . . .	5.7	8.7	5.2	3.5	1.6	154	92	62	27	138	108	98	81	118	
Campania . . . . .	5.1	8.1	4.0	4.2	5.5	158	79	82	108	124	100	76	97	415	
Puglie . . . . .	11.9	11.1	15.0	5.9	0.7	94	126	49	6	289	138	283	136	54	
Lucania . . . . .	14.9	11.4	6.2	22.7	2.8	77	42	153	19	362	141	117	526	208	
Calabrie . . . . .	16.3	31.1	5.8	22.2	0.6	191	35	137	3	396	386	108	514	42	
Sicilia . . . . .	4.1	32.5	10.1	7.5	0.9	796	247	185	21	99	403	190	174	66	
Sardegna . . . . .	0.3	0.2	0.1	16.1	4.5	92	48	6452	1816	6	3	2	373	342	
<b>REGNO</b> (vecchi confini)	<b>4.1</b>	<b>8.1</b>	<b>5.3</b>			<b>196</b>	<b>129</b>	<b>107</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
(attuali confini)				<b>4.3</b>	<b>1.3</b>								<b>100</b>	<b>100</b>	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**Febbre tifoidea e paratifo.** — La mortalità è diminuita, in misura più o meno notevole, nel 1936 in confronto a quella del periodo base 1900-02, sia nel Regno nei vecchi confini, sia nei singoli Compartimenti. La diminuzione nel Regno è stata del 77 %.

Detta mortalità, inoltre, si dimostra, nel 1936, nei Compartimenti della Lombardia, della Venezia Tridentina, del Veneto, degli Abruzzi e Molise, della Campania, delle Puglie, della Lucania e della Sicilia, superiore a quella media del Regno.

La *febbre tifoidea* ed il *paratifo* danno nelle età giovanili da 10 a 24 anni il massimo numero delle morti che diminuiscono notevolmente nelle età successive;

(\*) Cfr. la nota (\*) a pag. 4\*.

nel 1936, fra gli illegittimi nel primo anno di vita, non si è verificato alcun caso di morte, mentre nei legittimi la mortalità è stata di 0,2 su 10.000 nati vivi.

La letalità per *febbre tifoidea e paratifo* nel Regno, è stata, nel 1936, del 13,8 % (\*).

PROSPETTO 4. — Mortalità per febbre tifoidea e paratifo (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932 (*)	1936 (*)	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	18,6	15,6	19,6	10,9	6,4	84	105	58	35	47	62	78	71	72	
Liguria . . . . .	16,0	15,0	17,2	13,2	7,2	94	108	82	45	41	59	68	86	80	
Lombardia . . . . .	42,2	31,2	41,3	19,8	10,0	74	98	47	24	108	124	164	130	112	
Venezia Trid. (a) . .	—	—	—	9,3	9,1	—	—	—	—	—	—	—	61	102	
Veneto . . . . .	34,2	26,8	26,3	15,8	9,4	78	77	46	27	87	106	104	103	105	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	10,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	66	56	
Emilia . . . . .	28,9	21,0	22,0	14,7	7,0	73	76	51	24	74	83	87	97	78	
Toscana . . . . .	43,0	22,8	22,5	11,9	5,7	53	52	28	13	110	90	89	78	64	
Marche . . . . .	34,3	25,4	27,8	16,5	7,1	74	81	48	21	88	101	110	108	80	
Umbria . . . . .	40,0	37,1	32,9	22,5	6,8	93	82	56	17	102	147	131	148	76	
Lazio . . . . .	41,1	29,5	22,8	13,0	8,4	72	55	32	20	105	117	91	86	94	
Abruzzi e Molise . .	45,0	32,6	28,3	22,4	11,2	72	63	50	25	115	129	112	147	125	
Campania . . . . .	35,0	18,4	17,0	16,0	13,1	53	49	46	38	89	73	68	105	147	
Puglie . . . . .	64,9	25,3	18,2	17,5	11,1	39	28	27	17	166	100	72	115	125	
Lucania . . . . .	37,5	19,8	25,2	18,4	11,2	53	67	49	30	96	79	100	121	126	
Calabrie . . . . .	44,2	26,0	26,4	13,6	7,3	59	60	31	16	113	103	105	89	82	
Sicilia . . . . .	61,9	35,7	23,5	14,0	10,9	58	38	23	18	158	141	93	92	123	
Sardegna . . . . .	16,3	13,1	25,8	11,4	5,5	81	158	70	34	42	52	102	75	62	
REGNO (vecchi confini)	39,2	25,2	25,2			64	64	39	23	100	100	100			
(attuali confini)				15,2	2,9								100	100	

(\*) Non sono compresi i casi di morte per *febbre miliare* (1 nel 1932, 5 nel 1935 e 1 nel 1936).

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**Difterite e croup.** — La mortalità ha subito nel Regno nei vecchi confini, una diminuzione del 63 % nell'anno 1936 in confronto del triennio base 1900-02; e anche nei singoli Compartimenti, fatta eccezione per gli Abruzzi e Molise e la Sardegna, essa è stata inferiore a quella del periodo base.

Inoltre, la mortalità supera nel 1936 quella media del Regno, nella Lombardia, nel Veneto, nelle Marche, nell'Umbria, nel Lazio e negli Abruzzi e Molise.

Il massimo numero di morti si ha nei primi dieci anni di vita, dopo i quali i casi di morte si vanno facendo sempre più rari; nell'anno 1936, similmente ai due

(\*) Cfr. la nota (\*) a pag. 4\*.

anni precedenti, la mortalità dei bambini nel primo anno di vita è stata inferiore nei legittimi (2,4 su 10 000 nati vivi) a confronto degli illegittimi (4,8).

La letalità per *difterite e croup*, è stata, nel 1936, del 10,1 % (\*).

PROSPETTO 5. -- Mortalità per *difterite e croup* (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	15.3	9.3	8.1	4.5	3.7	61	53	29	24	94	80	101	57	62	
Liguria . . . . .	14.6	11.4	7.3	4.3	4.3	78	50	30	29	90	98	91	55	72	
Lombardia . . . . .	33.9	13.5	7.4	8.7	9.6	40	22	26	28	110	116	93	110	160	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	—	10.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	137	80	
Veneto . . . . .	18.9	13.5	11.9	10.2	6.5	71	63	54	34	117	115	150	129	108	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	9.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	126	91	
Emilia . . . . .	17.0	13.4	9.3	7.3	4.7	79	55	43	28	105	115	117	92	79	
Toscana . . . . .	21.5	7.9	8.4	6.1	4.7	37	39	28	22	133	68	105	78	79	
Marche . . . . .	8.8	11.1	8.9	11.4	8.1	126	102	130	92	54	95	112	144	135	
Umbria . . . . .	15.3	8.4	12.0	9.7	11.6	55	79	63	76	95	72	151	122	194	
Lazio . . . . .	10.2	14.1	9.0	11.7	6.9	138	88	115	68	63	121	113	148	116	
Abruzzi e Molise . . . . .	9.0	16.0	8.2	9.9	9.4	177	91	110	104	56	137	103	126	157	
Campania . . . . .	8.7	10.8	6.6	8.9	4.9	124	76	103	56	54	92	83	113	81	
Puglie . . . . .	12.2	10.0	6.1	4.0	4.3	82	50	33	35	75	85	76	51	72	
Lucania . . . . .	9.0	10.9	7.1	7.6	4.2	121	79	84	47	56	93	89	97	71	
Calabrie . . . . .	12.4	13.2	7.7	8.4	4.1	107	63	68	33	77	113	97	107	69	
Sicilia . . . . .	10.3	12.0	5.2	6.4	4.8	116	50	62	47	64	103	65	82	81	
Sardegna . . . . .	5.0	7.2	6.1	7.6	5.6	144	122	151	112	31	62	77	96	94	
REGNO { vecchi confini . . . . .	16.2	11.7	8.0			72	49	48	37	100	100	100			
REGNO { attuali confini . . . . .				7.9	6.0								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**Tosse convulsa.** — La mortalità è diminuita, in misura più o meno notevole, nel 1936 in confronto a quella del periodo base 1900-02, sia nel Regno nei vecchi confini, sia nei singoli Compartimenti. La diminuzione nel Regno è stata del 74 %.

Nella Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabrie e Sardegna, detta mortalità è stata, nel 1936, superiore a quella media del Regno mentre nella Lucania è risultata uguale.

Il massimo numero di morti per *tosse convulsa* si riscontra nei primi cinque anni di vita: nelle successive età, rarissimi sono i casi di morte; nell'anno 1936, come nei tre anni precedenti e nei bienni 1929-30 e 1931-32, la mortalità per tale

(\*) Cfr. la nota (\*) a pag. 4\*.

malattia nei bambini nel primo anno di vita, è stata superiore negli illegittimi (20,7 su 10 000 nati vivi) in confronto ai legittimi (13,0).

La letalità per *tosse convulsa* nel Regno, è stata, nel 1936, del 7,8% (\*).

PROSPETTO 6. — **Mortalità per tosse convulsa** (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	22.7	17.7	6.0	4.9	2.4	78	27	22	11	107	97	65	73	44	
Liguria . . . . .	17.3	13.1	8.4	4.6	3.3	76	48	26	19	81	72	90	69	61	
Lombardia . . . . .	27.6	22.9	10.6	9.2	8.2	83	39	33	30	130	125	114	137	149	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	—	8.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	130	95	
Veneto . . . . .	30.9	32.0	14.7	9.1	7.4	103	47	29	24	146	175	158	137	135	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	5.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	86	74	
Emilia . . . . .	28.3	23.4	12.8	6.9	5.0	83	45	24	18	133	128	138	104	91	
Toscana . . . . .	23.1	18.7	8.6	6.0	6.0	81	37	26	26	109	103	92	90	109	
Marche . . . . .	22.4	22.2	11.1	6.8	7.6	99	50	30	34	106	122	120	102	138	
Umbria . . . . .	23.2	15.4	9.9	8.4	2.9	66	43	36	12	109	85	106	126	52	
Lazio . . . . .	12.9	16.4	8.3	5.9	5.9	127	64	46	46	61	90	89	89	108	
Abruzzi e Molise . . . . .	17.6	14.6	11.7	6.6	3.2	83	66	38	19	83	80	125	99	59	
Campania . . . . .	10.8	8.1	5.3	5.2	7.4	75	49	48	68	51	45	57	78	134	
Puglie . . . . .	11.1	10.6	8.0	5.5	2.5	95	72	50	23	52	58	86	83	46	
Lucania . . . . .	13.5	16.9	6.0	8.3	5.5	126	44	61	41	63	93	64	124	100	
Calabrie . . . . .	20.8	14.9	5.8	9.1	6.0	72	28	44	29	98	82	62	137	109	
Sicilia . . . . .	15.6	11.6	6.0	3.2	3.1	75	38	20	20	73	64	64	48	56	
Sardegna . . . . .	33.3	26.4	19.6	10.3	8.8	79	59	31	26	157	145	210	155	159	
REGNO { vecchi confini.	21.2	18.2	9.3			86	44	31	26	100	100	100			
REGNO { attuali confini				6.7	5.5								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**Poliomielite anteriore acuta.** — La mortalità, nel Regno nei vecchi confini, ha subito nell'anno 1936 un aumento del 30% in confronto a quella del periodo base 1900-02; però i singoli Compartimenti non presentano tutti un aumento perchè nel Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana, Campania e Puglie, la mortalità del 1936 è stata inferiore a quella del periodo base; nella Venezia Tridentina non si è avuto alcun caso di morte per poliomielite anteriore acuta.

La mortalità appare, nel 1936, più alta di quella media del Regno, nel Lazio, Calabrie, Sicilia e Sardegna ed in special modo nelle Marche e nell'Umbria, che dimostrano un addensamento maggiore della mortalità anche nei precedenti trienni presi in considerazione.

(\*) Cfr. la nota (\*) a pagina 4\*.

PROSPETTO 7. — Mortalità per poliomielite anteriore acuta (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	0,6	0,6	0,9	0,7	0,5	102	161	116	84	70	57	64	71	48	
Liguria . . . . .	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	65	58	71	85	80	42	26	49	53	
Lombardia . . . . .	0,5	0,6	0,9	0,7	0,7	114	169	131	131	63	57	60	72	65	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Veneto . . . . .	1,0	1,2	1,3	0,8	1,0	123	135	82	104	122	121	93	87	100	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	40	60	
Emilia . . . . .	0,8	1,1	1,2	0,7	0,6	136	144	88	73	101	111	82	77	59	
Toscana . . . . .	0,7	0,8	1,3	0,9	0,6	116	200	127	96	83	77	93	91	63	
Marche . . . . .	1,3	1,5	3,0	3,4	3,1	111	224	261	237	163	145	206	371	307	
Umbria . . . . .	1,3	1,5	3,9	2,2	3,9	108	291	160	286	167	144	273	232	378	
Lazio . . . . .	1,2	1,0	2,2	0,9	2,0	85	185	76	171	144	98	151	96	196	
Abruzzi e Molise . . . . .	0,7	1,1	1,2	1,1	0,9	162	172	155	136	85	111	83	115	92	
Campania . . . . .	0,8	1,0	1,5	0,9	0,6	130	186	114	82	98	102	102	97	64	
Puglie . . . . .	0,9	1,4	2,0	1,1	0,9	148	213	115	95	114	135	136	114	85	
Lucania . . . . .	0,4	1,1	2,1	1,2	0,9	256	520	305	224	51	104	148	134	90	
Calabrie . . . . .	1,0	1,1	1,7	1,8	1,2	112	169	173	117	126	113	119	189	116	
Sicilia . . . . .	0,9	1,3	1,5	0,7	1,5	134	161	78	167	115	124	104	78	152	
Sardegna . . . . .	1,0	2,0	2,4	1,0	1,5	197	241	98	144	125	197	169	106	142	
REGNO } vecchi confini . . . . .	0,8	1,0	1,4			125	178	117	130	100	100	100			
REGNO } attuali confini . . . . .				0,9	1,0								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**Influenza.** — I massimi della mortalità, nel Regno, nel periodo di tempo corso dal 1887 al 1936, si verificarono negli anni seguenti: 1918 (morti 7743 per un milione di abitanti); 1919 (881); 1920 (672); 1892 (653); 1900 (535); 1929 (482) e 1894 (472). I minimi, negli anni 1891 (10 morti per un milione di abitanti); 1889 (17); 1887 (18); 1888 (20); 1910 (81); 1893 (88); 1912 (90) e 1914 (94). Nel 1936, la mortalità per detta causa è stata di 248 per un milione di abitanti con una diminuzione del 9 % a confronto del 1935.

I Compartimenti in cui la mortalità raggiunse il massimo furono, nel 1936, le Puglie (45,1 su 100 000 abitanti), la Campania (33,9), la Sardegna (33,4), gli Abruzzi e Molise (32,2) e l'Umbria (31,5); i minimi si osservarono nella Sicilia (14,3), Venezia Giulia e Zara (15,8), Liguria (17,4), Toscana (18,4) e Venezia Tridentina (18,5). Il numero medio giornaliero delle morti nel Regno, per il 1936 risulta maggiore nei mesi di marzo, dicembre e febbraio.

L'influenza dà, in genere, il massimo numero delle morti nelle età avanzate e nei primi cinque anni di vita.

Nel 1936, la mortalità per *influenza* nei bambini nel primo anno di vita è stata superiore negli illegittimi (25,8 su 10 000 nati vivi) in confronto dei legittimi (18,2).

La letalità per *influenza*, nel 1936, è stata del 22,4 % (\*). Nei dodici anni in cui si conosce il numero dei casi denunziati di *influenza* (dal 1925 al 1936), si notano forti sbalzi nei coefficienti di letalità (vedi prospetto 34) che debbono presumersi dipendenti da un duplice ordine di cause, forse anche concomitanti, e cioè, da un

(\*) Cfr. la nota (\*) a pagina 4\*.

andamento più benigno assunto dall'*influenza* in alcuni anni, mentre in altri l'infezione si è dimostrata più grave anche per le più frequenti complicazioni, e da una maggiore diligenza da parte dei medici nel denunciare i casi constatati. Il minimo coefficiente di letalità (6,9) si è avuto nel 1933, il massimo nel 1934 (30,1).

**Sifilide.** — La *sifilide* è raramente indicata come causa diretta di morte negli adulti, e quindi sfugge, in gran parte, ad una esatta rilevazione.

La mortalità per questa infezione aumentò dal 1887 al 1893 (da 64 per ogni milione di abitanti nel 1887 a 77 nel 1893, anno, quest'ultimo, in cui si è avuto il massimo quoziente fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi).

Negli anni dal 1894 al 1899 la mortalità si mantenne ancora alta, ma, a partire dal 1900 fino al 1914, diminuì sensibilmente, oscillando, in questo periodo, fra un minimo di 46 per ogni milione di abitanti nel 1909 e un massimo di 65 nel 1900.

Negli anni bellici, il quoziente di mortalità (49) fu di poco inferiore a quello verificatosi nel triennio anteguerra (51); e negli anni dal 1919 al 1930 i quozienti si ridussero ancora, oscillando fra un minimo di 31 nel 1930 (il più piccolo quoziente fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi) e un massimo di 45 nel 1925.

Negli anni 1931 e 1932, il quoziente è stato di 33 per ogni milione di abitanti; è diminuito di un punto nel 1933, è salito a 37 nel 1934 ed a 42 nel 1935. Nel 1936 il quoziente di mortalità è risultato di 41 per ogni milione di abitanti.

I Compartimenti in cui la mortalità per *sifilide* raggiunse il massimo furono, nel 1936, la Campania (9,4 su 100 000 abitanti), il Lazio (7,4) e la Venezia (Giulia e Zara (7,2); i minimi si osservarono nelle Marche (1,8), nel Veneto (2,1), nel Piemonte (2,2), nell'Emilia e nell'Umbria (2,3).

Il numero dei maschi morti per *sifilide*, negli anni 1887, 1888, 1889, 1891 e 1893, è inferiore a quello delle femmine; nel 1890 si ha lo stesso numero nei due sessi, nel 1892 e dal 1894 al 1936 il numero dei maschi è maggiore di quello delle femmine, specialmente negli anni dal 1904 in poi.

La *sifilide* dà il massimo numero delle morti nel primo anno di vita e la mortalità dei bambini al disotto di un anno di età, nell'anno 1936, è assai più alta negli illegittimi (45,4 su 10 000 nati vivi) in confronto ai legittimi (4,7), con comportamento, in genere, analogo a quello degli anni precedenti.

**Tubercolosi nelle sue varie forme e sedi.** — Nell'andamento della mortalità per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, prendendo come base il triennio 1887-89 (\*), si possono distinguere tre periodi (vedi prospetto 8):

il primo, nel quale l'andamento può considerarsi progressivamente decrescente, va dal triennio 1887-1889 all'anno 1914, in cui il numero indice da 100 discende a 68;

il secondo, nel quale l'andamento è progressivamente crescente, va dal 1915 al 1918: in questo periodo il numero indice risale fino a 82 nel 1917 e a 98 nel 1918, nel quale anno, in dipendenza della *pandemia influenzale*, tutte le cause di morte raggiunsero un limite superiore al normale;

(\*) Nel formare i valori medi, si sono compresi fra i morti per *tubercolosi*, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni 1887-1905 erano stati esclusi.

il terzo va dal 1919 al 1936 ed in esso l'andamento, pur con delle irregolarità, torna ad assumere un carattere decrescente, tantochè i numeri indici degli anni 1935 e 1936 (42 e 41, rispettivamente) sono i più bassi fra tutti quelli dei periodi considerati.

Si può, quindi, concludere che la mortalità per *tubercolosi in tutte le sue varie e forme e sedi*, eccetto che nel periodo bellico, abbia avuto un andamento decrescente.

PROSPETTO 8. — Mortalità per tubercolosi (in tutte le sue varie forme e sedi) nei periodi sotto indicati.

PERIODI	CIFRE PROPORZIONALI A 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (triennio 1887-89 = 100)	PERIODI	CIFRE PROPORZIONALI A 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (triennio 1887-89 = 100)
1887-89 (media annuale).	(a) 2 128	100	1921 . . . . .	1 421	67
1890-92 . . . . .	(a) 1 995	94	1922 . . . . .	1 430	67
1893-95 . . . . .	(a) 1 909	90	1923 . . . . .	1 462	69
1896-98 . . . . .	1 809	85	1924 . . . . .	1 562	73
1899-901 . . . . .	1 796	84	1925 . . . . .	1 532	72
1902-04 . . . . .	1 629	77	1926 . . . . .	1 467	69
1905-07 . . . . .	1 706	80	1927 . . . . .	1 363	64
1908-10 . . . . .	1 655	78	1928 . . . . .	1 279	60
1911-13 . . . . .	1 567	74	1929 . . . . .	1 237	58
1914 . . . . .	1 449	68	1930 . . . . .	1 115	52
1915 . . . . .	1 576	74	1931 . . . . .	1 082	51
1916 . . . . .	1 664	78	1932 . . . . .	1 038	49
1917 . . . . .	1 749	82	1933 . . . . .	992	47
1918 . . . . .	2 090	98	1934 . . . . .	925	43
1919 . . . . .	1 725	81	1935 . . . . .	888	42
1920 . . . . .	1 598	75	1936 . . . . .	872	41

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per *malattie delle ossa* in genere.

Diamo, nel prospetto 9, le cifre assolute dei morti, nel Regno, per *tubercolosi dell'apparato respiratorio*, delle *meningi* e del *sistema nervoso centrale*, per le *altre forme tubercolari* e per il complesso di tutte le *malattie tubercolari*, durante il periodo dal 1887 al 1936, con la distinzione del sesso e la proporzione dei maschi per 100 femmine.

Il numero assoluto dei maschi morti per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, è costantemente inferiore a quello delle femmine. Nel periodo anteguerra, la differenza, a favore dei maschi, si può, salvo rare eccezioni, considerare più elevata che negli anni di guerra e negli anni successivi.

Fra il numero dei maschi e delle femmine morti per alcune delle *forme tubercolari*, però, non esistono gli stessi rapporti che fra i morti di ciascun sesso per *tutte le forme tubercolari*.

Infatti, nei morti per *tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale*, il numero dei maschi supera costantemente quello delle femmine, eccetto nel 1931 in cui è uguale, nel 1933, 1934 e 1935 in cui è inferiore; nei morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* e per le *altre forme di tubercolosi*, il numero dei maschi è costantemente inferiore a quello delle femmine, e le differenze più sensibili, in genere, fino all'anno 1920 si notano nei riguardi delle morti per *tubercolosi dell'appa-*

*rato respiratorio.* Anche le differenze fra il numero dei maschi e delle femmine, morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio*, sembrano essersi ridotte durante la guerra e sembra che tale riduzione si sia mantenuta anche nel dopo guerra. Generalmente si può dire che la differenza del numero dei morti nei due sessi tende nel tempo a diminuire.

PROSPETTO 9.

PERIODI (media annuale)	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO RESPIRATORIO			TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE			ALTRE FORME TUBERCOLARI			COMPLESSO DELLE MALATTIE TUBERCOLARI		
	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F
1887-89 . .	14 067	17 856	79	3 039	2 534	120	11 970	14 039	85	29 076	34 429	84
1890-92 . .	14 023	17 275	81	3 080	2 690	114	10 861	12 834	85	27 964	32 799	85
1893-95 . .	14 296	16 762	85	2 857	2 570	111	10 604	12 243	87	27 757	31 575	88
1896-98 . .	14 535	17 075	85	2 341	2 275	103	9 752	11 396	86	26 628	30 746	87
1899-901 . .	16 890	20 005	84	3 061	2 795	110	7 089	8 222	86	27 040	31 022	87
1902-04 . .	15 574	18 371	85	2 819	2 665	106	6 546	7 584	86	24 939	28 620	87
1905-07 . .	15 886	18 856	84	2 931	2 811	104	7 447	8 955	83	26 264	30 622	86
1908-10 . .	16 829	19 069	88	3 097	2 862	108	6 693	7 868	85	26 619	29 799	89
1911-14 . .	15 798	18 234	87	3 067	2 949	104	6 598	7 547	87	25 463	28 730	89
1915-17 . .	17 735	20 127	88	3 552	3 371	105	7 336	8 065	91	28 623	31 563	91
1918 . . .	23 576	25 788	91	3 580	3 387	106	8 648	8 965	96	35 804	38 140	94
1919-20 . .	19 732	21 704	91	3 142	2 989	105	6 209	6 411	97	29 083	31 104	94
1921-23 . .	17 747	19 595	91	2 922	2 774	105	4 679	5 130	91	25 348	27 499	92
1924-26 . .	20 790	23 327	89	3 081	3 040	101	4 333	4 867	89	28 204	31 234	90
1927-30 . .	17 385	19 762	88	2 737	2 647	103	3 630	4 198	86	23 752	26 607	89
1931 . . .	15 927	17 131	93	2 364	2 364	100	3 174	3 576	89	21 465	23 071	93
1932 . . .	15 456	16 542	93	2 353	2 256	104	3 068	3 536	87	20 877	22 334	93
1933 . . .	15 385	16 091	96	2 003	2 147	93	2 868	3 168	91	20 256	21 406	95
1934 . . .	14 259	15 109	94	1 995	2 028	98	2 674	3 160	85	18 928	20 297	93
1935 . . .	13 782	14 250	97	2 013	2 034	99	2 778	3 180	87	18 573	19 464	95
1936 . . .	13 901	13 955	100	1 973	1 966	100	2 620	3 081	85	18 494	19 002	97

Dal prospetto 10 si rileva che la diminuzione della mortalità per le varie forme della *tubercolosi*, dal periodo 1887-89 all'anno 1936, è stata più notevole per la *scrofula* (94 %), *tube mesenterica e tubercolosi intestinale* (91 %), *tubercolosi disseminata* (87 %), *meningite tubercolare* (51 %), che non per la *tubercolosi polmonare e tisi* (39 %). Solamente la mortalità per *tubercolosi delle ossa, delle articolazioni e dei rimanenti organi o sistemi* è aumentata nel 1936 del 21 % a confronto del periodo 1887-89.

È da notare, però, che i quozienti di mortalità delle *diverse forme tubercolari* calcolati sul complesso della popolazione possono essere influenzati dalla diversa composizione per età di essa popolazione, tanto più che, come è noto, le *diverse forme tubercolari* incidono con diversa frequenza nelle diverse età.



## PROSPETTO 10.

PERIODI	TUBERCOLOSI DISSEMINATA	TUBERCOLOSI POLMONARE, TISI	SCROFOLA DISSEMINATA E LUPUS	MENINGITE TUBERCOLARE E IDROCEFALO ACQUISITO	TABE MESENTERICA E TUBERCOLOSI INTESTINALE	ARTRITE E SINOVITE FUNGOSA, TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DI ALTRI ORGANI, MORBO DI POTTS	COMPLESSO DELLE MALATTIE TUBERCOLARI
Cifre proporzionali a 1 000 000 di abitanti							
1887-89 (media annuale)	307	1 070	103	187	422	(a) 39	2 128
1890-92 »	290	1 028	86	189	364	(a) 38	1 995
1893-95 »	290	999	67	175	335	(a) 43	1 909
1896-98 »	244	997	58	146	302	62	1 809
1899-901 »	97	1 141	45	181	269	63	1 796
1902-04 »	101	1 033	36	167	227	65	1 629
1905-07 »	190	1 042	35	172	193	74	1 706
1908-10 »	161	1 053	27	175	164	75	1 655
1911-13 »	139	978	23	175	173	79	1 567
1914-16 »	133	986	22	181	159	82	1 563
1917-19 »	153	1 226	21	186	169	100	1 855
1920-23 »	84	1 040	14	158	108	74	1 478
1924-27 »	50	1 097	12	154	95	72	1 480
1928-30 »	43	893	8	129	71	66	1 210
1931	40	803	6	115	57	60	1 082
1932	43	(b) 769	6	111	55	54	1 038
1933	40	(b) 749	5	99	46	52	992
1934	38	(b) 692	5	95	46	48	925
1935	42	(b) 655	5	95	45	47	888
1936	41	(b) 648	6	92	39	47	872

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per *malattie delle ossa in genere*.

(b) Compresi i morti per *tubercolosi dei gangli tracheo-bronchiali*. Nell'anno 1931, i morti per detta causa furono in numero di 3.

Più sicura misura dell'andamento della mortalità è dato dal confronto dei quozienti specifici per età e sesso quali furono esposti nella « *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932* » (\*).

Il numero dei morti per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, è probabilmente superiore a quello indicato nei prospetti delle pagine precedenti, non essendovi compresi quei casi che, pur essendo di natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *bronchite cronica*, di *meningite semplice*, di *pleurite* o di *peritonite*, senza specificare se fossero di natura tubercolare.

Sembra utile, per ciò, vedere anche quale sia stato, nel tempo, l'andamento della mortalità per le malattie ora citate, perchè se la mortalità segna una diminuzione pari o maggiore a quella della *tubercolosi*, si può presumere che non debbano essere molti i casi di queste malattie che possano celare forme di natura tubercolare non dichiarate.

La diminuzione della mortalità per il *complesso delle malattie tubercolari*, dalla media del triennio 1887-89, a quella del decennio 1927-36, è stata del 49 %; durante lo stesso periodo la mortalità per *meningite semplice* ha avuto una diminu-

(\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932* - Parte I - Introduzione, pagg. 31\* e segg.

zione dell'84% e quella per *pleurite*, grosso modo (a), una diminuzione del 44 %. La mortalità per *bronchite cronica*, dalla media del triennio 1899-901 (b) a quella del decennio 1927-36 è aumentata del 3% (c); per tutte le forme tubercolari vi è stata una diminuzione del 40%.

La mortalità per *peritonite*, dalla media del triennio 1908-10 (d) a quella del decennio 1927-36 è diminuita del 40 %; per tutte le forme tubercolari la diminuzione è stata del 35 %.

Sembra quindi potersi ritenere che il miglioramento riscontrato nella mortalità per malattie tubercolari non subisca, o subisca in minima parte, l'influenza delle denunce delle morti per *pleurite*, *meningite* e *peritonite*, in cui non è stata indicata la natura tubercolare. Una certa influenza si deve ritenere abbiano sul miglioramento della mortalità per malattie tubercolari i casi di natura tubercolare, dichiarati dai medici come deceduti per *bronchite cronica*.

Esaminiamo ora, nei tre prospetti seguenti, la mortalità :

1) per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* — 2) per *tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale* — 3) per le restanti forme tubercolari.

La mortalità per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* nel Regno (nei vecchi confini), è discesa nel 1936, a confronto del 1900-02, del 44 %. In tutti i Compartimenti, nel 1936, la mortalità è diminuita più o meno notevolmente, a confronto del periodo base 1900-02, con un minimo del 24 % nella Sardegna ed un massimo del 54 % nella Liguria.

Inoltre, appare evidente, nel 1936, una maggiore intensità delle morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale (esclusa l'Emilia), nella Toscana, nel Lazio e nella Sardegna, a confronto della mortalità media del Regno.

La mortalità per *tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale*, in confronto del triennio base 1900-02 è diminuita nel 1936, per il Regno nei vecchi confini, del 49 %, ed è anche diminuita in tutti i Compartimenti, fatta eccezione per la Sardegna.

(a) Per ottenere la migliore comparabilità fra i dati relativi ai morti per *malattie della pleura* negli anni dal 1887 al 1923 e quelli dal 1924 al 1931, si è dovuto per quest'ultimo gruppo di anni unificare le voci « *malattie della pleura* (n. 105) », « *malattie del mediastino* (n. 111) » e « *altre malattie dell'apparato respiratorio* (n. 112) ». Negli anni dal 1932 al 1936 si sono unificate le voci « *Pleuriti* (n. 110) » e « *altre malattie dell'apparato respiratorio, compresa la cangrena del polmone* (n. 114-b) » : in queste voci, però, a confronto di quelle sopra menzionate, non sono compresi, i morti per *emotorace* e vi sono invece compresi i morti per *cangrena polmonare*.

(b) Negli anni precedenti, i morti per *bronchite cronica* non erano tenuti distinti da quelli per *bronchite acuta*.

(c) Negli anni dal 1932 al 1936 nella voce « *bronchite cronica* (n. 106-b) » non sono compresi i morti per *catarro soffocante* e per *catarro bronchiale non specificato*, da 60 anni in poi.

Per rendere i quozienti di mortalità per *bronchite cronica* negli anni dal 1933 al 1936 comparabili con il quoziente del triennio 1899-1901, ai morti per *bronchite cronica* (n. 106-b) si sono aggiunti quelli per *bronchite non specificata* (n. 106-c) da 60 anni ed oltre : per il 1932 tale numero è stato ottenuto a calcolo, supponendo che esso fosse stato a confronto del totale dei morti per *bronchite non specificata*, nella stessa proporzione verificatasi nel 1931.

(d) Negli anni precedenti, i morti per *peritonite* erano uniti a quelli per *appendicite*.

## PROSPETTO 11. — Mortalità per tubercolosi dell'apparato respiratorio (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	136.7	123.5	122.3	86.9	72.9	90	89	64	53	122	122	119	109	113	
Liguria . . . . .	171.0	152.4	146.0	100.5	78.0	89	85	59	46	153	150	142	126	120	
Lombardia . . . . .	147.9	128.4	126.1	92.9	69.6	87	85	63	47	133	127	123	116	107	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	—	125.9	109.3	—	—	—	—	—	—	—	158	169	
Veneto . . . . .	116.9	116.0	124.4	89.3	69.8	99	106	76	60	105	114	121	112	108	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	145.2	125.5	—	—	—	—	—	—	—	182	194	
Emilia . . . . .	118.0	101.9	99.2	74.9	63.4	86	84	63	54	106	101	96	94	98	
Toscana . . . . .	139.2	126.4	120.6	95.7	78.8	91	87	69	57	125	125	117	120	122	
Marche . . . . .	82.6	73.4	84.3	63.5	49.1	89	102	77	60	74	72	82	79	76	
Umbria . . . . .	83.3	84.8	97.5	69.5	56.5	102	117	83	68	75	84	95	87	87	
Lazio . . . . .	117.0	113.6	111.0	74.4	65.5	97	95	64	56	105	112	108	93	101	
Abruzzi e Molise . . . . .	69.8	66.6	65.9	52.6	43.9	95	94	75	63	63	66	64	66	68	
Campania . . . . .	81.4	72.2	72.6	55.3	51.0	89	89	68	63	73	71	71	69	79	
Puglie . . . . .	94.0	84.3	91.5	72.5	57.1	90	97	77	61	84	83	89	91	88	
Lucania . . . . .	52.2	52.1	60.6	41.4	32.2	100	116	79	62	47	51	59	52	50	
Calabria . . . . .	69.6	58.0	65.5	48.8	37.3	83	94	70	54	62	57	64	61	57	
Sicilia . . . . .	85.6	70.7	70.8	60.2	51.1	83	83	70	60	77	70	69	75	79	
Sardegna . . . . .	118.6	121.6	149.9	123.7	90.3	102	126	104	76	106	120	146	155	139	
REGNO { vecchi confini . . . . .	111.6	101.3	102.9			91	92	69	56	100	100	100			
REGNO { attuali confini . . . . .				79.8	64.8								100	100	

## PROSPETTO 12. — Mortalità per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale. (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	13.7	13.6	10.9	9.1	7.0	99	79	67	51	78	77	71	79	76	
Liguria . . . . .	25.3	23.1	15.8	11.3	8.8	91	62	45	35	144	131	103	98	96	
Lombardia . . . . .	24.4	22.3	19.1	12.9	8.8	92	78	53	36	138	127	124	111	96	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	—	10.6	11.1	—	—	—	—	—	—	—	91	121	
Veneto . . . . .	26.6	26.6	26.6	17.5	12.9	100	100	66	49	151	151	173	151	141	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	15.6	12.4	—	—	—	—	—	—	—	134	135	
Emilia . . . . .	21.2	20.2	20.0	12.3	10.7	95	94	58	51	120	115	130	106	117	
Toscana . . . . .	16.5	18.2	14.5	10.1	7.8	110	88	61	47	94	104	94	87	85	
Marche . . . . .	16.0	14.1	13.6	9.6	7.7	88	85	60	48	91	80	89	83	84	
Umbria . . . . .	12.2	13.1	14.2	10.4	10.3	107	116	85	85	69	74	92	90	113	
Lazio . . . . .	28.4	27.3	22.6	14.5	10.9	96	80	51	38	161	155	147	125	119	
Abruzzi e Molise . . . . .	16.3	15.6	12.9	10.3	7.2	96	79	63	44	93	89	84	88	79	
Campania . . . . .	15.5	13.3	10.1	7.7	6.8	85	65	50	44	88	75	66	66	75	
Puglie . . . . .	16.1	19.5	15.4	14.5	12.3	121	96	90	76	91	111	100	125	135	
Lucania . . . . .	9.2	11.6	7.6	6.2	5.2	126	82	68	50	52	66	49	54	56	
Calabria . . . . .	10.5	8.4	7.8	6.2	4.9	80	75	59	46	60	48	51	54	53	
Sicilia . . . . .	7.3	8.2	8.2	7.7	6.6	113	98	106	90	41	47	47	67	72	
Sardegna . . . . .	13.2	19.5	18.3	20.1	17.5	147	139	152	132	75	111	119	174	191	
REGNO { vecchi confini . . . . .	17.6	17.6	15.4			100	87	65	51	100	100	100			
REGNO { attuali confini . . . . .				11.6	9.2								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**PROSPETTO 13. — Mortalità per malattie tubercolari, esclusa la tubercolosi dell'apparato respiratorio e la tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale (medie annuali).**

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	27.1	29.6	21.0	13.7	11.0	109	77	50	40	62	71	76	83	83	
Liguria . . . . .	32.3	35.4	21.3	14.1	13.7	110	66	44	42	74	84	77	85	103	
Lombardia . . . . .	44.1	44.6	30.0	16.3	12.9	101	68	37	29	101	106	108	99	98	
Venezia Trid.(a) . . . . .	—	—	—	22.5	20.5	—	—	—	—	—	—	—	136	154	
Veneto . . . . .	46.2	50.7	34.3	21.1	14.8	110	74	46	32	106	121	123	128	112	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	19.5	17.3	—	—	—	—	—	—	—	118	130	
Emilia . . . . .	48.4	44.7	28.4	17.4	16.8	92	59	36	35	111	107	102	106	127	
Toscana . . . . .	44.0	47.7	35.3	19.7	15.6	109	80	45	35	101	114	127	119	117	
Marche . . . . .	42.8	39.5	31.6	17.5	15.6	92	74	41	37	98	94	114	106	118	
Umbria . . . . .	49.1	41.1	31.2	19.1	15.0	84	63	39	31	112	98	112	116	113	
Lazio . . . . .	54.5	38.1	24.6	13.3	10.7	70	45	24	20	125	91	88	80	80	
Abruzzi e Molise . . . . .	56.6	43.6	28.7	17.6	11.8	77	51	31	21	129	104	103	106	89	
Campania . . . . .	53.4	43.3	26.9	13.8	11.3	81	50	26	21	122	103	97	84	85	
Puglie . . . . .	68.3	49.5	35.1	19.1	11.6	73	51	28	17	156	118	126	116	88	
Lucania . . . . .	40.7	36.9	25.6	15.9	16.2	91	63	39	40	93	88	92	96	122	
Calabrie . . . . .	32.2	32.8	21.5	12.9	9.8	102	67	40	30	74	78	77	78	74	
Sicilia . . . . .	29.8	31.6	15.9	10.8	8.6	106	53	36	29	68	75	57	66	65	
Sardegna . . . . .	41.6	66.6	43.8	28.3	27.5	160	105	68	66	95	159	158	171	207	
REGNO ( vecchi confini	43.7	41.9	27.8			96	64	37	30	100	100	100			
( attuali confini				16.5	13.3								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

Esaminando la mortalità dei Compartimenti, si nota che la Venezia Tridentina, il Veneto, la Venezia Giulia e Zara, l'Emilia, l'Umbria, il Lazio, le Puglie e la Sardegna, hanno, nel 1936, una mortalità superiore a quella del Regno. L'Italia Settentrionale appare, così, quella che ha il maggior numero di Compartimenti con mortalità superiore alla media del Regno.

La mortalità per *malattie tubercolari (esclusa la tubercolosi dell'apparato respiratorio e la tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale)* nel 1936, in confronto del periodo base 1900-02, è diminuita sia nel Regno nei vecchi confini, sia nei singoli Compartimenti: nel Regno, la diminuzione è stata del 70 % e nei Compartimenti essa va da un minimo di 34 % nella Sardegna ad un massimo di 83 % nelle Puglie.

Inoltre, la Liguria, la Venezia Tridentina, il Veneto, la Venezia Giulia e Zara, l'Emilia, la Toscana, le Marche, l'Umbria, la Lucania e la Sardegna hanno avuto, nel 1936, una mortalità superiore a quella media del Regno.

Chiudiamo questi cenni sulla mortalità per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, col dire che nel 1936, la mortalità nei bambini nel primo anno di vita è stata maggiore negli illegittimi (9,4 su 10 000 nati vivi) che nei legittimi (7,8), come negli anni precedenti, dal 1929 in poi.

**Febbri da malaria e cachessia palustre.** — Una forte diminuzione si è avuta nei morti per *malaria e cachessia palustre*; ed infatti, mentre nel 1887 si verificarono nel Regno 21 033 decessi per tale morbo, pari a 710 per un milione di abitanti, nel triennio 1912-14 morirono, in media, soltanto 2 623 persone, e cioè, 74 per un milione di abitanti. Il quoziente di mortalità, durante gli anni bellici, è stato peraltro più alto di quello verificatosi nell'ora detto triennio, ma se si pensa alle condizioni eccezionali create dalla guerra, si può affermare che il servizio di profilassi della *malaria* è stato molto accurato, essendosi riusciti a infrenare l'inevitabile aggravamento di essa. Un miglioramento della mortalità si iniziò subito dopo la guerra e si accentuò nel 1923, nel quale anno le morti diedero un quoziente di 89 per un milione di abitanti. Nel 1924 si ebbe una leggera recrudescenza rispetto all'anno antecedente, però, dal 1925 al 1936 (30 per ogni milione di abitanti in questo ultimo anno), i quozienti, pure attraverso oscillazioni, mostrano una tendenza alla diminuzione.

Il Compartimento in cui la mortalità raggiunse il massimo fu, nel 1936, la Sardegna (28,4 su 100 000 abitanti) a cui seguono: la Lucania (13,8) e le Calabrie (9,4). I minimi si osservarono nel Piemonte e nella Liguria (0,2), nella Lombardia (0,3), nell'Emilia e nelle Marche (0,4), nella Toscana (0,5).

Il numero medio giornaliero delle morti nel Regno, per il 1936, risulta maggiore nei mesi di agosto, settembre, ottobre e luglio; ed anche nelle singole Ripartizioni geografiche si nota, all'incirca, analogo andamento.

La *malaria* dà il maggior numero di morti nei primi dieci anni di vita.

Nel 1936, la mortalità nei bambini legittimi (1,2 su 10 000 nati vivi), nel primo anno di vita, è stata superiore a quella degli illegittimi (0,5), analogamente a ciò che si è verificato nel 1934 e nel biennio 1931-32; mentre un comportamento contrario si è verificato nel 1935 e 1933.

La letalità per *malaria* nel Regno ha oscillato, nel periodo dal 1925 al 1936, da un minimo di 1,0 % nel 1934, 1935 e 1936 ad un massimo di 1,6 % nel 1932 (\*).

**Tumori maligni.** — È noto come i quozienti di mortalità per *tumori maligni* possano essere fortemente influenzati dalla diversa composizione per età della popolazione, perchè questa affezione è rara nelle età giovanili. Ci serviamo, tuttavia, di questi quozienti per un grossolano esame dell'andamento di detta mortalità, nel tempo e nello spazio, rimandando il lettore, desideroso di notizie più precise, ai quozienti specifici di mortalità per età pubblicati nella parte introduttiva della Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932 (a).

L'esame dei numeri indici mostra come la mortalità per *tumori maligni* sia gradualmente aumentata dal triennio 1887-89 al triennio 1920-22. Essa diminuisce nei successivi trienni 1923-25 e 1926-28 e risale poi, segnando il massimo nel 1936.

(\*) Cfr. la nota (\*) a pagina 4\*.

(a) Cfr. ; ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932* — Parte I — Introduzione, pagina 47\*.



Dall'esame dei dati contenuti nel prospetto 15, in cui è considerata la mortalità per *tumori maligni* secondo il sesso e la sede del tumore, riferendo i morti maschi e femmine rispettivamente alla popolazione maschile e femminile, si nota un andamento diverso, nel tempo, della mortalità per tumori delle varie sedi, e cioè: un comportamento oscillante con un aumento dell'8 % nel 1936 a confronto del triennio 1900-02 per i *tumori maligni dell'utero, vagina ed ovaia*; un aumento nel sesso femminile per i *tumori maligni delle mammelle*, specialmente nel triennio 1930-32 e nell'anno 1936; e pure un aumento, in ambedue i sessi, per i *tumori maligni dello stomaco, dell'esofago e degli altri organi*, eccetto che per le femmine nel triennio 1930-32, nel quale, la mortalità per l'insieme di queste localizzazioni, pur superando notevolmente la mortalità del triennio 1900-02, è inferiore a quella dei trienni 1910-12, 1920-22 e dell'anno 1936.

Dal prospetto 16 si rileva che la mortalità per *tumori maligni*, nel Regno, nei vecchi confini, ha subito, nel 1936, un aumento del 56% a confronto del periodo base 1900-02; anche nei singoli Compartimenti si nota, nel 1936, un aumento rispetto al 1900-02, da un minimo dell'1 % nella Campania ad un massimo del 131 % nella Sardegna.

Nel 1936, la mortalità più elevata, in confronto alla mortalità media del Regno, è data, in ordine decrescente, dalla Toscana, Venezia Tridentina, Piemonte, Emilia, Lombardia, Liguria, Venezia Giulia e Zara e Veneto. È da notarsi inoltre che il massimo della mortalità sia nei trienni presi in considerazione, eccettuato il 1930-32, che nell'anno 1936, è dato dalla Toscana.

PROSPETTO 16. — **Mortalità per tumori maligni** (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	52.5	73.3	81.7	94.7	118.5	140	156	180	226	99	111	119	131	141	
Liguria . . . . .	63.0	76.6	84.1	92.6	113.6	121	133	147	180	119	116	123	128	135	
Lombardia . . . . .	70.5	85.5	93.6	95.7	113.9	121	133	136	161	133	130	137	132	136	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	—	120.7	119.6	—	—	—	—	—	—	—	—	167	
Veneto . . . . .	55.9	65.8	64.5	76.8	91.1	118	115	137	163	106	100	94	106	109	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	84.3	102.1	—	—	—	—	—	—	—	—	117	
Emilia . . . . .	77.7	94.5	97.9	102.7	118.2	122	126	132	152	147	144	143	142	141	
Toscana . . . . .	83.5	97.4	105.9	112.7	128.3	117	127	135	154	157	148	155	156	153	
Marche . . . . .	61.7	70.6	72.1	70.5	80.2	114	117	114	130	116	107	105	98	96	
Umbria . . . . .	47.9	58.1	58.3	64.2	67.1	121	122	134	140	90	88	85	89	80	
Lazio . . . . .	55.4	68.4	76.1	70.0	78.1	124	137	126	141	104	104	111	97	93	
Abruzzi e Molise . . . . .	37.2	47.7	47.2	45.0	46.4	128	127	121	125	70	73	69	62	55	
Campania . . . . .	39.1	46.0	44.9	35.7	39.5	118	115	91	101	74	70	66	49	47	
Puglie . . . . .	33.2	41.3	38.6	36.4	42.5	124	116	110	128	63	63	56	50	51	
Lucania . . . . .	32.0	40.4	41.0	33.7	38.5	126	128	105	120	60	61	60	47	46	
Calabrie . . . . .	30.2	38.1	38.6	33.8	36.0	126	128	112	119	57	58	56	47	43	
Sicilia . . . . .	33.9	44.4	41.6	38.7	47.5	131	123	114	140	64	68	61	54	57	
Sardegna . . . . .	20.9	34.0	36.6	40.1	48.3	163	175	192	231	39	52	53	56	58	
REGNO <sup>vecchi confini.</sup>	53.0	65.7	68.5			124	129	134	156	100	100	100			
REGNO <sup>attuali confini.</sup>				72.2	83.9								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

Nel prospetto 17 sono riportati i quozienti di mortalità, nel biennio 1935-36, per *tumori degli organi genitali e delle mammelle* nelle femmine, distintamente per sede e natura del tumore, per età e stato civile, per 10 000 femmine censite della stessa età e stato civile.

Poichè alcuni di tali quozienti derivano da uno scarso numero di casi (cfr. tavole relative) deve essere fatta espressa riserva circa le deduzioni che se ne volessero trarre.

Nelle ultime colonne sono riportati i quozienti per gruppi più ampi di età, stabiliti col criterio della nota maggiore frequenza con cui si verificano casi di *tumori* nell'età più avanzata.

La mortalità per il complesso dei *tumori di qualsiasi natura degli organi genitali e delle mammelle* appare notevolmente più alta nelle coniugate, vedove e divorziate che non nelle nubili; ma se si esaminano i quozienti per grandi gruppi di età, questa prevalenza si nota solo, in lieve misura, per la mortalità delle coniugate, vedove e divorziate da 25 a 39 anni.

**PROSPETTO 17. — Mortalità femminile, nel biennio 1935-36, per tumori degli organi genitali e delle mammelle, secondo l'età e lo stato civile.**

(Cifre proporzionali a 10 000 femmine, censite al 21 aprile 1936, della stessa età e stato civile).

CAUSE DI MORTE STATO CIVILE	GRUPPI DI ETÀ												TOTALE	
	-25	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	25-39	40-79		40-69
<b>Complesso . . .</b>	<b>0.04</b>	<b>0.40</b>	<b>1.18</b>	<b>2.59</b>	<b>5.35</b>	<b>7.41</b>	<b>8.28</b>	<b>9.59</b>	<b>9.88</b>	<b>11.37</b>	<b>1.31</b>	<b>8.57</b>	<b>8.67</b>	<b>3.09</b>
Nubili . . . . .	0.03	0.34	1.18	2.25	6.00	8.20	9.99	12.17	12.25	17.38	0.96	10.33	10.60	0.94
Con., Ved. e Divorz.	0.24	0.47	1.18	2.66	5.23	7.28	8.04	9.25	9.59	10.69	1.45	8.31	8.39	5.50
<i>Tumori maligni dell'utero</i> (N. 48 Elenco) . . . . .	0.01	0.16	0.47	1.17	2.38	3.56	4.41	4.95	4.89	4.81	0.56	4.12	4.10	1.44
Nubili . . . . .	..	0.13	0.34	0.92	2.23	2.41	3.62	4.00	4.03	4.31	0.35	3.26	3.27	0.29
Con., Ved. e Divorz.	0.08	0.18	0.52	1.22	2.41	3.74	4.52	5.07	5.00	4.86	0.65	4.24	4.22	4.73
<i>Tumori maligni degli altri</i> <i>organi genitali femmi-</i> <i>nili</i> (N. 49 Elenco) . . . . .	0.01	0.07	0.10	0.14	0.33	0.46	0.51	0.66	0.67	0.98	0.10	0.61	0.62	0.23
Nubili . . . . .	0.01	0.07	0.17	0.16	0.35	1.04	0.90	0.89	0.82	1.55	0.12	0.89	0.91	0.09
Con., Ved. e Divorz.	0.05	0.08	0.08	0.14	0.32	0.37	0.45	0.63	0.65	0.91	0.10	0.17	0.58	0.38
<i>Tumori maligni dellemam-</i> <i>melle</i> (N. 50 Elenco) . . . . .	..	0.05	0.27	0.81	1.51	2.13	2.70	3.41	3.85	4.82	0.35	3.00	3.11	1.08
Nubili . . . . .	..	0.04	0.21	0.63	1.58	2.92	4.22	6.16	6.48	10.08	0.21	4.72	4.93	0.40
Con., Ved. e Divorz.	0.03	0.06	0.29	0.86	1.49	2.00	2.49	3.04	3.53	4.23	0.41	2.75	2.85	1.83
<i>Tumori non maligni degli</i> <i>organi genitali femmi-</i> <i>nili</i> (N. 54-a Elenco) . . . . .	0.02	0.12	0.33	0.45	1.11	1.23	0.65	0.54	0.45	0.73	0.28	0.81	0.82	0.33
Nubili . . . . .	0.01	0.10	0.44	0.53	1.79	1.79	1.21	1.08	0.93	1.38	0.28	1.43	1.45	0.15
Con., Ved. e Divorz.	0.08	0.12	0.29	0.44	0.58	1.23	0.58	0.46	0.39	0.66	0.29	0.72	0.73	0.54
<i>Tumori degli organi geni-</i> <i>tali femminili il cui ca-</i> <i>rattere maligno o non</i> <i>maligno non è specifi-</i> <i>cato</i> (N. 55-a Elenco) . . . . .	..	0.02	0.01	0.01	0.03	0.04	..	0.04	0.02	0.04	0.01	0.03	0.03	0.01
Nubili . . . . .	..	—	0.03	—	0.05	0.03	0.04	0.05	—	0.06	0.01	0.04	0.04	..
Con., Ved. e Divorz.	—	0.01	..	0.01	0.03	0.04	—	0.04	0.02	0.04	0.01	0.03	0.03	0.02



I *tumori* che danno la massima mortalità nelle donne di ogni stato civile sono quelli *maligni dell'utero*: per le coniugate, vedove e divorziate, in ogni grande gruppo di età, essa, per i *tumori maligni dell'utero* raggiunge i valori più alti.

Al contrario, per i *tumori maligni degli altri organi genitali femminili*, si ha nelle nubili una mortalità maggiore che nelle coniugate, in tutti i grandi gruppi di età considerati.

Analogo andamento si ha per i *tumori non maligni degli organi genitali femminili*, eccetto che nell'età da 25 a 39 anni, in cui la mortalità è lievemente superiore nelle coniugate, vedove e divorziate.

Per i *tumori maligni delle mammelle* invece si ha una mortalità minore nelle nubili solo nel gruppo di età 25-39 anni, mentre nei gruppi 40-79 e 40-∞ la mortalità nelle nubili è superiore di oltre il 70 % a confronto di quella delle coniugate, vedove e divorziate.

Per i *tumori degli organi genitali femminili il cui carattere maligno o non maligno non è specificato* si nota una maggiore mortalità delle coniugate, ma è da osservare che i casi registrati sono poco numerosi (19 nel 1935 e 31 nel 1936).

La mortalità per *tumori maligni*, è stata, nel 1936, come nel quinquennio 1931-35, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, sensibilmente superiore a quella degli altri Comuni, il che può dipendere dall'affluenza nei luoghi di cura di tali Comuni, dei malati del territorio circostante.

Fra i Comuni che al censimento del 21 aprile 1936, contavano una popolazione residente superiore ai 100 000 abitanti, i massimi della mortalità per *tumori maligni* si ebbero nel 1936 in Firenze (19,0 su 10 000 abitanti), Bologna (18,1), Brescia (15,6), Livorno (15,4), Trieste (15,3), Torino e Padova (15,0), Genova (13,9), Milano e Ferrara (13,6), Venezia (13,3); i minimi in Taranto (3,2), Bari (4,2), Reggio di Calabria (4,3), Messina e Palermo (5,5), Catania (5,9), con comportamento, all'incirca, uguale a quello verificatosi negli anni dal 1931 al 1935.

I decessi per *tumori maligni* sono più numerosi nelle femmine che nei maschi, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1936.

Sembra che le stagioni non abbiano nessuna influenza sul numero di questi decessi.

I *tumori maligni* danno il maggior numero di morti nell'età avanzate: più della metà dei morti nel 1936, come nel settennio 1929-35, era in età da 60 a 79 anni.

**Diabete mellito.** — Si è presa in particolare considerazione la mortalità per *diabete mellito*, perchè sull'aumento dei casi di questa malattia viene, da qualche tempo, richiamata l'attenzione degli studiosi. Bisogna, però, considerare che l'aumento, che si riscontra studiando le cifre, può essersi accentuato anche per la maggiore frequenza di diagnosi di tale malattia, dovuta al diffondersi dell'uso di mezzi più moderni di indagine clinica.

Dall'esame del prospetto 18, appare come la mortalità per *diabete mellito*, nel Regno, nei vecchi confini, sia aumentata, nel 1936, a confronto del triennio base 1900-02, del 194 %, ed anche in tutti i Compartimenti essa è notevolmente aumentata, da un massimo del 287 % nel Piemonte ad un minimo del 59 % nella Lucania. Inoltre, nel 1936, hanno superato la mortalità media del Regno, in ordine progres-

sivo decrescente, i seguenti Compartimenti: Liguria, Lazio, Venezia Giulia e Zara, Toscana, Sicilia, Piemonte e Marche.

PROSPETTO 18. — Mortalità per diabete mellito (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902 (*)	1910- 1912 (*)	1920- 1922 (*)	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	2.9	5.1	4.9	9.9	11.2	178	169	341	387	85	107	100	114	112	
Liguria . . . . .	5.7	8.3	8.3	16.0	18.5	147	146	282	326	167	173	169	185	185	
Lombardia . . . . .	2.8	4.2	4.4	7.6	9.0	149	157	271	323	83	87	90	88	91	
Venezia Trid. (a) . .	—	—	—	5.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	66	82	
Veneto . . . . .	2.7	4.1	3.6	6.7	7.9	151	130	245	289	81	86	73	78	79	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	8.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	96	124	
Emilia . . . . .	3.0	4.0	4.3	8.1	9.5	133	143	270	314	89	84	88	94	95	
Toscana . . . . .	4.0	5.6	5.0	8.9	12.1	139	125	222	302	118	116	103	103	121	
Marche . . . . .	3.5	4.7	4.6	8.8	11.1	132	130	250	316	104	97	94	102	111	
Umbria . . . . .	3.5	4.2	5.7	10.4	9.4	118	160	294	264	105	87	116	121	94	
Lazio . . . . .	5.2	8.5	8.0	12.5	14.9	164	154	241	288	153	177	163	144	150	
Abruzzi e Molise . .	3.1	4.2	4.7	6.5	6.5	134	152	209	208	92	87	97	76	65	
Campania . . . . .	3.9	5.1	5.7	9.9	9.1	131	147	255	235	114	106	116	114	91	
Puglie . . . . .	3.0	3.2	3.6	5.9	6.5	107	119	197	218	88	67	73	68	65	
Lucania . . . . .	3.1	2.4	3.0	5.1	5.0	77	96	164	159	92	50	61	59	50	
Calabrie . . . . .	2.7	3.4	3.1	5.6	5.6	128	117	210	211	78	71	63	65	56	
Sicilia . . . . .	3.7	5.2	5.6	9.8	12.1	140	151	265	326	109	108	114	114	121	
Sardegna . . . . .	4.0	5.5	6.0	7.6	7.7	137	151	191	194	118	114	123	89	78	
REGNO } vecchi confini.	3.4	4.8	4.9			141	145	256	294	100	100	100			
REGNO } attuali confini.				8.6	10.0								100	100	

(\*) Sono compresi i morti per *diabete insipido* (cifre trascurabili). (a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

Dato il concetto predominante, che il *diabete mellito* sia una malattia in certo modo legata alle condizioni di alimentazione e di vita della civiltà moderna, specialmente nei grandi centri, si sono calcolati, sui dati della Tav. 2 a pag. 56 delle «Tavole» del presente volume e per gli anni antecedenti sui dati delle rispettive analoghe tavole, quozienti di mortalità nel complesso dei capiluoghi di Provincia e degli altri Comuni di ciascun Compartimento. Nel periodo di osservazione di 8 anni (1929-36), la mortalità per *diabete mellito* risulta sensibilmente più accentuata nei capiluoghi di Provincia che negli altri Comuni: fanno eccezione, nel 1929, l'Umbria; nel 1930, la Lucania; nel 1931, la Venezia Tridentina; nel 1935 l'Umbria e la Lucania e nel 1936 la Lucania in cui non si è verificato alcun decesso nel complesso dei capiluoghi di Provincia.

La mortalità per *diabete mellito* nei 22 Comuni che al censimento del 21 aprile 1936 contavano più di 100 000 abitanti, nell'anno 1936, raggiunge i massimi nei Comuni di: Genova (2,3), Roma e Bologna (2,0); i minimi in Ferrara (0,5), Venezia e Bari (0,9).

**Convulsioni nei bambini in età inferiore ai 5 anni.** — Il quoziente di mortalità per *convulsioni* nei bambini, in età inferiore ai 5 anni, nel Regno, è diminuito progressivamente e sensibilmente dall'anno 1925 (1) (291 per un milione di abitanti) al 1930 (157). Nel sessennio 1931-36 si nota ancora un andamento decrescente da 149, 138, 125, 117, 115 a 112 per ogni milione di abitanti.

Poichè spesso, con la voce *convulsioni* viene indicato l'episodio finale della malattia, è da ritenere che, almeno in parte, la diminuzione della mortalità sia dovuta ad una più esatta specificazione della malattia prima, e della quale lo stato eclampico ha rappresentato l'accidente terminale.

È da notare, inoltre, che dal 1924 furono tenute distinte dalle *malattie delle ghiandole tiroidi, paratiroidi e del timo*, quelle delle *ghiandole paratiroidi* delle quali, in massima parte, lo stato spasmodico è l'espressione.

Forti differenze si osservano nella mortalità fra i singoli Compartimenti: nel 1936, dai massimi di 36,3 su 100 000 abitanti nella Lucania, di 32,3 nella Campania, di 27,1 nelle Calabrie e di 25,8 nelle Puglie, si scende a cifre minime di 1,8 nella Liguria, di 2,6 nel Piemonte, di 2,9 nella Sardegna, di 3,1 nella Lombardia e di 3,7 nella Toscana.

Mettendo a confronto la mortalità dei Compartimenti e del Regno, nel 1936, con quella degli anni dal 1931 al 1935, si nota: 1° che, in generale, i massimi ed i minimi della mortalità si sono verificati negli stessi Compartimenti; 2° che nel Regno, a partire dal 1931 come si è detto prima, vi è una costante e progressiva diminuzione della mortalità per *convulsioni* nei bambini in età inferiore ai 5 anni, fatto che, in genere, si verifica anche nella maggior parte dei Compartimenti.

**Malattie del cuore (\*).** — Dal prospetto seguente, appare che la mortalità per le *malattie del cuore* per il Regno nei vecchi confini, è diminuita, nel 1936, dell'11% a confronto di quella del periodo base 1900-02 e lo stesso comportamento si nota nei singoli Compartimenti, fatta eccezione del Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna che hanno segnato nel 1936 un aumento oscillante dal 3 al 15%.

Inoltre, nel 1936, si riscontra, in ordine progressivo decrescente, una mortalità maggiore a quella media del Regno nei seguenti Compartimenti: Venezia Tridentina, Piemonte, Liguria, Lombardia, Campania, Lucania e Abruzzi e Molise. È importante notare che il numero dei maschi morti per *malattie del cuore* è inferiore a quello delle femmine, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1936, fatto, in parte, dovuto forse alla maggiore predisposizione delle donne a contrarre affezioni reumatiche; infatti, in questi 50 anni di osservazione, solamente in 11, e cioè nel 1907, dal 1909 al 1917 e nel 1919, il numero dei maschi morti per *reumatismo articolare acuto* è stato maggiore di quello delle femmine.

Le *malattie del cuore* danno assai più della metà dei morti in età da 60 a 79 anni, mentre pochi sono i casi di morte nell'età infantile.

(1) La comparabilità dei dati per le *convulsioni* nei bambini, in età inferiore ai 5 anni, si può fare per gli anni dal 1925 in poi, perchè, da tale anno, i morti per detta causa, in età non inferiore ai 5 anni, non furono più compresi in questa voce, mentre precedentemente vi erano compresi i morti di età non superiore ai 15 anni.

(\*) Numeri 91, 92, 93 e 95 dell'Elenco nosologico.

PROSPETTO 19. — Mortalità per malattie del cuore (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	210.8	238.2	235.1	215.9	217.9	113	112	102	103	124	131	132	140	143	
Liguria . . . . .	181.5	196.6	201.0	190.1	187.2	108	111	105	103	107	108	113	124	123	
Lombardia . . . . .	196.6	206.5	198.7	170.9	174.9	105	101	87	80	116	114	112	111	115	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	—	196.9	219.0	—	—	—	—	—	—	—	128	144	
Veneto . . . . .	157.0	167.3	157.8	141.6	139.3	107	100	90	89	92	92	89	92	92	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	117.8	128.1	—	—	—	—	—	—	—	77	84	
Emilia . . . . .	165.2	167.7	161.2	144.2	139.5	102	98	87	84	97	92	91	94	92	
Toscana . . . . .	182.4	158.5	166.0	141.0	134.2	87	91	77	74	107	87	93	92	88	
Marche . . . . .	190.0	195.5	193.7	140.4	136.4	103	102	74	72	112	107	109	91	90	
Umbria . . . . .	179.1	188.7	185.6	150.3	149.3	105	104	84	83	105	104	104	98	98	
Lazio . . . . .	148.5	154.9	148.3	127.2	119.8	104	100	86	81	87	85	83	83	79	
Abruzzi e Molise . . . . .	172.6	191.8	193.9	173.0	155.9	111	112	100	90	102	105	109	113	103	
Campania . . . . .	209.0	210.1	194.5	167.2	167.5	101	93	80	80	123	115	109	109	110	
Puglie . . . . .	137.2	158.0	152.4	138.7	128.0	115	111	101	93	81	87	86	90	84	
Lucania . . . . .	180.8	193.2	205.4	162.4	159.8	107	114	90	88	106	106	115	106	105	
Calabria . . . . .	144.8	161.0	178.1	137.8	135.1	111	123	95	93	85	89	100	90	89	
Sicilia . . . . .	107.3	141.5	145.3	122.5	122.4	132	135	114	114	63	78	82	80	81	
Sardegna . . . . .	94.4	130.5	122.0	99.2	108.4	138	129	105	115	56	72	69	65	71	
REGNO } vecchi confini.	169.8	181.9	178.0			107	105	91	89	100	100	100			
REGNO } attuali confini.				153.7	151.8								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**Bronchite acuta e cronica** (\*). — La mortalità per *bronchiti (acute e croniche)* nel Regno, è stata nel 1936 di 399 per ogni milione di abitanti. Essa, attraverso oscillazioni più o meno ampie nel tempo ed un accentuatissimo aumento (1733 morti su 1 000 000 di abitanti) verificatosi nel 1918 in rapporto con la *pandemia influenzale*, ha, a partire dal 1887, un andamento decrescente con un massimo nel triennio 1890-92 (2611) ed un minimo nel 1934 (369), con una diminuzione dell'83 % a confronto del triennio 1887-89. Per un esatto criterio di comparazione nel tempo, occorre ricordare che nel 1924 furono mutati i criteri di classificazione, perchè le morti per *bronchite capillare*, non furono più comprese fra le *bronchiti acute*, ma fra le *bronco polmoniti*.

Volendosi considerare le morti per *bronchite acuta* separatamente da quelle per *bronchite cronica*, è bene tener presente che, negli anni anteriori al 1931, i morti per *bronchite (senz'altra indicazione sulla scheda)* al di sopra di 60 anni erano classificati fra i decessi per *bronchite cronica* e quelli fino a 60 anni fra i decessi per *bronchite acuta*.

Nella nuova nomenclatura nosologica, invece, i morti per *bronchite senza altra indicazione*, dal 1931 in poi, sono stati classificati in una voce separata, e quindi

(\*) Nella nomenclatura nosologica usata dall'Istituto per gli anni dal 1924 al 1930, le morti per *bronchiti* comprendono anche quelle per *catarro soffocante* (7 casi nel 1931), che invece a cominciare dal 1931 sono comprese nella voce « *congestione, edema, embolia, infarto emorragico e trombosì del polmone* ». Veggasi, a tale proposito, *Statistica delle Cause di morte* negli anni 1931 e 1932 — Parte I — Introduzione — Allegato I, a pag. 139\*.

le proporzioni per 100 000 abitanti, qui appresso indicate, per il 1936, per le due specie di *bronchiti*, non sono comparabili con quelle date nelle statistiche degli anni anteriori al 1931.

I Compartimenti in cui la mortalità per *bronchite acuta* raggiunse il massimo furono, nel 1936, la Lucania (27,4 per ogni 100 000 abitanti) e le Puglie (14,7); i minimi si ebbero nella Lombardia e Veneto (4,2), nell'Emilia e nella Sardegna (4,5).

I Compartimenti in cui la mortalità per *bronchite cronica* raggiunse i massimi furono, nel 1936, la Lucania (26,1 su 100 000 abitanti) e le Puglie (20,8); i minimi si ebbero nella Liguria (10,6), nel Veneto (11,6) e nella Lombardia (11,9).

Il maggior numero medio giornaliero di morti, per il complesso delle *bronchiti*, si ha nei mesi freddi, ed infatti, nel 1936, i massimi si notarono in dicembre, febbraio, marzo, gennaio e novembre, verificandosi nelle singole Ripartizioni geografiche, all'incirca, lo stesso comportamento; i morti per *bronchite acuta* appartengono, per la maggior parte, a bambini in età da 0 a 2 anni; nel 1936 la mortalità per il complesso delle *bronchiti* nei bambini nel primo anno di vita, è stata superiore nei legittimi (39,3 su 10 000 nati vivi) a confronto degli illegittimi (30,4).

#### **Broncopolmonite acuta e polmonite lobare.** — A) *Broncopolmonite acuta.* —

Nelle statistiche delle cause di morte, i decessi per *bronchite capillare* furono classificati, fino a tutto il 1923, fra le *bronchiti acute*, e, dal 1924 in poi, fra le *broncopolmoniti*; per tale fatto, la comparazione nel tempo della mortalità per *broncopolmonite* è possibile solo dal 1924. Essa ha una tendenza alla diminuzione, con riascerbazioni nel 1926 e nel 1929, nei quali anni anche la mortalità per *influenza* ha avuto notevoli aumenti in confronto agli anni contigui, onde è a presumersi che gli aumenti bruschi della mortalità per *broncopolmonite*, verificatisi in detti anni, siano principalmente dovuti a forme di origine *influenzale* e per le quali tale natura non era indicata, chè altrimenti sarebbero state classificate fra le morti dovute ad *influenza*. Nel 1930 il quoziente di mortalità fu di 1231 per un milione di abitanti, risali nel 1931 (1358) e nel 1932 (1416), per ridiscendere nel 1933 (1290) e nel 1934 (1223). Nel 1935 e 1936 la mortalità si rivela in aumento (1348 e 1441, rispettivamente, per un milione di abitanti).

La mortalità nei singoli Compartimenti oscilla, nel 1936, fra un minimo di 97 su 100 000 abitanti nella Venezia Tridentina ed un massimo di 231 nelle Puglie: i più alti quozienti si riscontrano, in genere, nell'Italia Meridionale ed Insulare.

B) *Polmonite lobare.* — Solo dal 1899 i morti per *polmonite lobare* furono distinti dai morti per *broncopolmonite*. La mortalità media annua per *polmonite lobare* dal 1899 al 1907, desunta da medie triennali, fu superiore a quella per *broncopolmonite*; nei trienni 1908-10 e 1911-13 e negli anni successivi essa fu sempre inferiore, sino a distanziarsene, in questi ultimi anni, di più della metà.

Poichè non si è modificato con l'andar del tempo il criterio di classificazione dei dati e poichè le oscillazioni annue della mortalità per *polmonite lobare* sono generalmente sincrone con quelle della mortalità per *broncopolmonite*, è a supporre una reale diminuzione di essa.

Nel sessennio 1931-36 il minimo della mortalità per *polmonite lobare* si è riscontrato nel 1934 (547 morti su un milione di abitanti), con comportamento analogo a quello della *broncopolmonite*.

La mortalità nei singoli Compartimenti oscilla, nel 1936, fra un minimo di 41 su 100 000 abitanti (Veneto) ed un massimo di 83 (Venezia Tridentina). Se si eccettua la Venezia Tridentina, che raggiunge l'apice nella scala crescente della mortalità per Compartimenti, la mortalità più intensa si riscontra, in genere, nei Compartimenti dell'Italia Meridionale e Insulare.

Il maggior numero medio giornaliero di morti per *broncopolmonite* e *polmonite lobare*, nel Regno, si verifica nei mesi freddi: nel 1936, i massimi si ebbero in dicembre, febbraio e marzo; i minimi in agosto, settembre, luglio e ottobre, con andamento, all'incirca, analogo a quello degli anni dal 1931 al 1935.

Un andamento quasi analogo si osserva nelle singole Ripartizioni geografiche.

Nei primi due anni di vita, e particolarmente a meno di un anno, si ha un forte numero di bambini morti per questo gruppo di cause; il numero dei morti diminuisce nelle età della fanciullezza e giovinezza ed incomincia, in genere, ad accentuarsi a partire dall'età di 30 anni, per subire un graduale aumento col passare alle età avanzate.

Nel 1936, la mortalità per *broncopolmonite* e *polmonite lobare* nei bambini nel primo anno di vita, è stata inferiore nei legittimi (206,9 su 10 000 nati vivi) a confronto degli illegittimi (227,7), analogamente a ciò che si è verificato nei due anni precedenti.

**Enteriti al disotto di 2 anni (\*).** — Dal 1924, le morti per *enteriti*, nei bambini in età inferiore ai 2 anni, sono state tenute distinte, per tutte le classificazioni, da quelle avvenute, per la stessa causa, in individui di età superiore a 2 anni.

Nel periodo 1924-36 si nota, nel Regno, nella mortalità per *enteriti* nei bambini al disotto di 2 anni, un aumento fino all'anno 1926 ed una tendenza alla diminuzione dal 1927 in poi; ed infatti, tale mortalità, da 1611, per ogni milione di abitanti nel 1924, salì a 1716 nel 1926, e negli anni dal 1927 al 1935 oscillò fra un minimo di 946 nel 1933 e un massimo di 1682 nel 1928. Nel 1936, il quoziente di mortalità fu di 882 per ogni milione di abitanti.

Il numero medio giornaliero dei morti nel Regno, durante il 1936, comincia a salire nel mese di giugno, raggiunge i massimi in luglio e agosto, per poi discendere nei mesi successivi; anche negli anni dal 1929 al 1935 si ha un andamento, all'incirca, analogo, il che conferma, quanto era già noto sulla maggiore frequenza delle malattie del tubo digerente nei mesi estivi. Un andamento poco differente si osserva nelle singole Ripartizioni geografiche.

Nel 1936, con lo stesso comportamento verificatosi nei bienni 1929-30, 1931-1932 e negli anni 1933, 1934 e 1935, la mortalità dei bambini per *enteriti* nel primo anno di vita, è stata maggiore fra gli illegittimi (343,6 su 10 000 nati vivi) che fra i legittimi (292,7).

---

(\*) Nella nomenclatura nosologica usata dall'Istituto Centrale di Statistica dal 1924 al 1930, in questa voce non erano comprese l'*infezione intestinale* e l'*enterocolite muco membranosa* al disotto di due anni.

**Cirrosi alcoolica del fegato e alcoolismo cronico.** — Per compilare il prospetto 20 si sono dovuti dedurre a calcolo i morti per *cirrosi alcoolica del fegato* nei trienni 1900-02, 1910-12 e 1920-22, essendo essi inclusi in un'unica voce (*epatite e cirrosi*): il calcolo è stato eseguito, supponendo che i morti per *cirrosi epatica* stessero al totale dei morti per *malattie epatiche* nella stessa proporzione verificatasi per il settennio 1924-30.

La mortalità per *cirrosi alcoolica del fegato ed alcoolismo cronico* nel Regno, nei vecchi confini, ha avuto nel 1936 una diminuzione del 2 % rispetto al periodo base 1900-02; fra i singoli Compartimenti hanno dimostrato una mortalità superiore a quella del periodo base, gli Abruzzi e Molise (80 %), l'Emilia (57 %), la Lucania (51 %), il Piemonte (50 %), la Campania (33 %), l'Umbria (17 %), la Toscana (15 %) e le Marche (8 %).

Inoltre, nel 1936, superano la mortalità media del Regno, in ordine decrescente, i seguenti Compartimenti: la Venezia Tridentina, il Piemonte, la Venezia Giulia e Zara, le Marche, la Liguria, la Lombardia, l'Emilia, l'Umbria e il Veneto, cioè, tutti i Compartimenti dell'Italia Settentrionale e due dell'Italia Centrale.

PROSPETTO 20. — **Mortalità per cirrosi alcoolica del fegato ed alcoolismo cronico.**  
(medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	2.7	3.5	2.7	3.9	4.0	132	101	145	150	146	131	143	203	213	
Liguria . . . . .	3.3	4.1	3.6	2.0	2.5	122	108	59	73	182	152	191	103	130	
Lombardia . . . . .	2.8	3.4	2.2	2.3	2.4	122	79	84	86	151	126	116	123	126	
Venezia Trid. (e) . . . . .	—	—	—	2.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	132	222	
Veneto . . . . .	3.9	5.5	3.9	2.4	1.9	143	102	61	49	210	206	206	123	101	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	107	185	
Emilia . . . . .	1.5	2.4	2.1	2.1	2.4	158	141	139	157	82	89	112	110	126	
Toscana . . . . .	1.1	1.9	1.3	1.6	1.3	169	115	141	115	62	72	69	84	70	
Marche . . . . .	2.8	5.2	3.0	3.4	3.1	184	108	120	108	154	194	161	177	162	
Umbria . . . . .	1.6	2.9	2.3	3.1	1.9	176	139	189	117	90	108	121	163	102	
Lazio . . . . .	1.7	3.5	2.1	1.5	1.6	207	126	89	97	91	129	111	77	86	
Abruzzi e Molise . . . . .	1.0	1.9	1.5	1.7	1.9	182	148	161	180	57	70	81	87	99	
Campania . . . . .	0.7	1.1	0.9	1.3	1.0	158	119	175	133	40	43	46	67	52	
Puglie . . . . .	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	116	84	71	79	42	33	34	29	32	
Lucania . . . . .	0.6	0.8	0.4	0.8	0.9	138	70	130	151	33	31	23	41	49	
Calabrie . . . . .	0.8	1.5	0.9	0.8	0.5	188	108	100	64	43	56	45	42	27	
Sicilia . . . . .	0.6	0.7	0.4	0.7	0.5	125	74	119	91	31	26	22	36	28	
Sardegna . . . . .	2.3	3.5	1.6	1.8	1.8	155	71	81	81	123	131	85	97	98	
REGNO { vecchi confini. . . . .	1.8	2.7	1.9			146	103	103	98	100	100	100			
{ attuali confini. . . . .				1.9	1.9								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**Malattie della gravidanza, parto e puerperio.** — La mortalità per *malattie della gravidanza, parto e puerperio* (prospetto 21) dal triennio 1887-89 al quinquennio 1900-04, ha subito una progressiva e notevole diminuzione: nel 1900-04 la diminuzione raggiunta è del 54 % in confronto al periodo base. Dopo un lieve rialzo nel quinquennio 1905-09, la mortalità ha raggiunto un minimo nel 1910-14 (23,6 per 10 000 parti) e poi, può dirsi, stabilizzata intorno al 28 per 10 000 parti.

La mortalità per *malattie della gravidanza, parto e puerperio* può scindersi in due componenti: la prima, dovuta alla *setticemia ed infezioni puerperali*, la seconda alle *altre malattie della gravidanza, parto e puerperio*.

La mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali* è discesa del 74 % dal 1887-89 al 1910-14; negli anni successivi essa è tornata leggermente ad aumentare, e sembra, dal 1925 al 1934, essersi stabilizzata intorno al 10,5 per 10 000 parti; nel 1935 essa è stata di 12,3 e nel 1936 di 12,1 su 10 000 parti.

La mortalità per *setticemia ed altre infezioni puerperali* (decremento nel 1936 del 69 % a confronto del 1887-89) ha risentito molto di più che la mortalità per le *altre malattie della gravidanza, parto e puerperio* (decremento del 3 %), delle migliorate condizioni di assistenza e profilassi.

PROSPETTO 21. — **Mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio.**

PERIODI	PARTI SEMPLICI E MULTIPLI (a)	MORTE PER SETTICEMIA E INFEZIONI PUERPERALI (b)			ALTRE MALATTIE DELLA GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO			IN COMPLESSO		
		cifre assolute	su 10 000 parti	Numeri indici (triennio 1887-89 = 100)	cifre assolute	su 10 000 parti	Numeri indici (triennio 1887-89 = 100)	cifre assolute	su 10 000 parti	Numeri indici (triennio 1887-89 = 100)
1887-89 (*) . . .	1 169 631	4 560	39.0	100	2 083	17.8	100	6 643	56.8	100
1890-94 (*) . . .	1 142 089	2 458	21.5	55	1 597	14.0	79	4 055	35.5	63
1895-99 (*) . . .	1 122 575	1 883	16.8	43	1 553	13.8	78	3 436	30.6	54
1900-04 (*) . . .	1 103 114	1 375	12.5	32	1 497	13.6	76	2 872	26.0	46
1905-09 (*) . . .	1 130 538	1 402	12.4	32	1 699	15.0	84	3 101	27.4	48
1910-14 (*) . . .	1 156 212	1 194	10.3	26	1 536	13.3	75	2 730	23.6	42
1915-19 (*) . . .	845 166	1 001	11.8	30	1 292	15.3	86	2 293	27.1	48
1920-24 (*) . . .	1 165 070	1 409	12.1	31	1 705	14.6	82	3 114	26.7	47
1925-29 (*) . . .	1 110 646	1 170	10.5	27	1 788	16.1	90	2 958	26.6	47
1930-32 (*) . . .	1 059 112	1 125	10.6	27	1 801	17.0	96	2 927	27.6	49
1933 . . . . .	1 016 965	1 102	10.8	28	1 744	17.1	96	2 846	28.0	49
1934 . . . . .	1 013 636	1 052	10.4	27	1 656	16.3	92	2 708	26.7	47
1935 . . . . .	1 016 538	1 253	12.3	32	1 764	17.4	98	3 017	29.7	52
1936 . . . . .	981 452	1 183	12.1	31	1 700	17.3	97	2 883	29.4	52

(\*) Media annuale. (a) Nel numero dei parti sono compresi anche quelli di nati morti. (b) Compreso l'aborto settico.

Dagli indici contenuti nel prospetto 22-A risulta che, nel Regno (nei vecchi confini), la mortalità in complesso è aumentata nel 1936, a confronto del 1900-02, del 12 %.

La mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali* ha avuto, nel 1936 una lieve diminuzione (1%); mentre le *altre malattie della gravidanza, parto e puerperio* sono aumentate del 24 % a confronto del triennio base 1900-02.



Osservando poi la mortalità nell'anno 1936 nei singoli Compartimenti, in confronto a quella del periodo 1900-02, si rileva che essa, nel complesso delle malattie in esame, è diminuita in 3 Compartimenti (Lucania, Calabrie e Sardegna).

PROSPETTO 22. — Mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio.  
(medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 10000 PARTI														
	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1936		
	setticemia ed inf. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed inf. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed inf. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed inf. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed inf. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
Piemonte . . . . .	12.9	17.3	30.2	14.0	15.7	29.7	13.2	13.9	27.1	13.0	18.3	31.3	14.8	18.6	33.4
Liguria . . . . .	13.9	14.2	28.2	12.3	15.2	27.4	13.2	11.9	25.0	10.8	18.7	29.5	17.0	19.9	36.9
Lombardia . . . . .	13.7	13.0	26.8	10.5	13.2	23.6	14.0	14.6	28.6	11.9	16.4	28.3	12.8	15.3	28.0
Venezia Trident. (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	24.3	38.7	14.7	19.2	33.9
Veneto . . . . .	9.3	12.7	22.0	6.0	11.9	17.9	7.2	11.1	18.3	9.3	14.3	23.6	8.1	14.9	23.0
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	16.2	31.8	17.4	21.2	38.7
Emilia . . . . .	13.4	15.9	29.3	9.0	13.9	22.9	12.8	14.1	26.8	11.8	18.1	29.9	16.5	20.7	37.1
Toscana. . . . .	9.7	12.0	21.7	8.3	13.1	21.4	12.0	13.4	25.4	10.7	17.3	28.0	11.4	17.4	28.8
Marche . . . . .	10.0	13.1	23.1	8.3	13.3	21.7	10.2	13.3	23.4	8.5	13.9	22.3	7.4	17.5	24.9
Umbria. . . . .	12.5	16.0	28.6	14.5	14.8	29.3	15.4	14.3	29.6	10.7	18.0	28.6	14.1	21.2	35.4
Lazio . . . . .	14.0	12.9	26.9	10.3	12.3	22.6	14.5	13.4	28.0	12.6	18.2	30.7	12.8	17.6	30.4
Abruzzi e Molise . .	12.8	17.3	30.1	11.2	19.2	30.4	13.0	19.3	32.4	10.2	21.2	31.4	19.0	22.2	41.2
Campania. . . . .	10.5	12.3	22.8	8.7	13.4	22.1	10.4	14.3	24.7	9.6	18.5	28.1	10.1	18.4	28.5
Puglie . . . . .	12.0	10.9	22.8	9.2	11.7	21.0	8.9	12.2	21.0	7.8	14.9	22.7	9.5	16.5	26.0
Lucania . . . . .	14.4	17.3	31.8	11.8	12.9	24.7	13.3	19.1	32.4	11.5	17.7	29.2	6.6	17.5	24.0
Calabrie . . . . .	15.7	15.8	31.5	14.3	15.4	29.8	13.4	16.2	29.5	11.5	15.8	27.2	10.6	12.6	23.2
Sicilia. . . . .	10.0	11.1	21.1	9.9	9.4	19.3	9.1	13.4	22.5	9.1	15.6	24.7	12.6	17.2	29.9
Sardegna . . . . .	19.4	25.6	44.9	14.9	22.5	37.3	16.8	18.5	35.4	11.7	20.7	32.4	11.6	16.6	28.2
REGNO } vecchi confini	12.1	13.9	25.9	10.0	13.4	23.4	11.4	14.0	25.4						
REGNO } attuali confini										10.6	17.0	27.6	12.1	17.3	29.4

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

La mortalità per *setticemia e infezioni puerperali* è diminuita, nel 1936, nei seguenti Compartimenti: Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Campania, Puglie, Lucania, Calabrie e Sardegna; mentre quella per le *restanti malattie della gravidanza, parto e puerperio* è diminuita soltanto nelle Calabrie e nella Sardegna.

PROSPETTO 22-A. — Numeri indici della mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	TRIENNIO 1900-02 = 100											
	1910-12			1920-22			1930-32			1935		
	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
Piemonte . . . . .	108	91	98	102	81	90	101	106	104	115	107	111
Liguria . . . . .	88	107	97	94	84	89	77	132	105	122	140	131
Lombardia . . . . .	76	101	88	102	112	107	87	126	106	93	117	105
Veneto . . . . .	65	94	82	78	88	83	100	113	107	87	118	105
Emilia . . . . .	68	87	78	95	89	91	88	114	102	123	130	127
Toscana . . . . .	85	109	98	123	112	117	110	144	129	117	145	133
Marche . . . . .	83	102	94	102	102	101	85	106	97	74	134	108
Umbria . . . . .	116	92	102	123	89	104	86	112	100	113	133	124
Lazio . . . . .	74	95	84	104	104	104	90	141	114	92	136	113
Abruzzi e Molise . . . . .	88	111	101	102	111	108	79	122	104	148	128	137
Campania . . . . .	83	108	97	99	116	108	92	150	123	97	149	125
Puglie . . . . .	77	108	92	74	112	92	65	137	100	79	151	114
Lucania . . . . .	82	75	78	92	110	102	79	102	92	45	101	76
Calabrie . . . . .	91	97	95	85	103	94	73	100	86	67	80	74
Sicilia . . . . .	98	85	91	91	121	107	90	141	117	126	156	141
Sardegna . . . . .	77	88	83	87	72	79	60	81	72	60	65	63
<b>REGNO (vecchi confini).</b>	<b>83</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>87</b>	<b>123</b>	<b>106</b>	<b>99</b>	<b>124</b>	<b>112</b>

Nel 1936, superano la mortalità media del Regno, per il complesso delle malattie prese in esame (vedi prosp. 22-B), in ordine decrescente, gli Abruzzi e Molise, la Venezia Giulia e Zara, la Liguria, l'Emilia, l'Umbria, la Venezia Tridentina, il Piemonte, il Lazio e la Sicilia.

Un analogo esame della mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali* ci fa notare che negli Abruzzi e Molise, Venezia Giulia e Zara, Liguria, Emilia, Piemonte, Venezia Tridentina, Umbria, Lombardia, Lazio e Sicilia essa ha superato nel 1936 quella media del Regno e lo stesso fatto si verifica per la mortalità delle *altre malattie della gravidanza, parto e puerperio* negli stessi Compartimenti, sebbene in ordine diverso ed ai quali si aggiungono la Campania, le Marche e la Lucania.

A complemento delle predette notizie, aggiungiamo che, secondo lo stato civile, le 2881 donne morte nel 1936, in età da 15 a 59 anni, per *malattie della gravidanza, parto e puerperio (comprese le infezioni puerperali)* si ripartivano così: nubili 225, coniugate 2623, vedove 30 e di stato civile ignoto 3.

PROSPETTO 22-B. — Numeri indici della mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	MORTALITÀ DEL REGNO = 100														
	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1936		
	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
Piemonte . . . . .	107	125	116	139	117	127	114	100	106	123	107	113	123	107	114
Liguria . . . . .	116	102	109	123	113	117	115	85	99	102	110	107	141	115	126
Lombardia . . . . .	114	94	103	104	98	101	122	104	113	112	97	102	106	88	95
Venezia Trident. (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	143	140	122	111	115
Veneto . . . . .	76	92	85	60	89	77	63	80	72	87	84	85	67	86	78
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	95	115	145	123	132
Emilia . . . . .	111	115	113	90	104	98	111	101	106	111	106	108	137	119	126
Toscana . . . . .	81	87	84	83	98	91	104	96	100	101	102	101	95	100	98
Marche . . . . .	83	94	89	83	100	93	88	95	92	80	82	81	61	101	85
Umbria . . . . .	103	115	110	144	110	125	134	102	117	101	106	104	117	122	120
Lazio . . . . .	116	93	104	104	92	97	126	96	110	118	107	111	106	102	104
Abruzzi e Molise .	106	125	116	113	143	130	114	138	127	96	124	113	157	128	140
Campania . . . . .	87	89	88	87	100	94	90	102	97	91	109	102	84	106	97
Puglie . . . . .	100	79	88	92	88	90	77	88	83	73	88	82	79	95	88
Lucania . . . . .	120	125	123	118	97	106	116	137	127	108	104	106	54	101	82
Calabrie . . . . .	130	114	121	144	115	127	117	116	116	108	93	98	88	73	79
Sicilia . . . . .	83	80	81	98	70	82	79	96	89	85	92	89	105	100	102
Sardegna . . . . .	161	185	173	149	168	160	146	132	139	110	122	117	96	96	96
REGNO { vecchi confini	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
REGNO { attuali confini										100	100	100	100	100	100

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

Esaminando i quozienti ottenuti riferendo le donne morte alle donne censite nelle rispettive classi di età (prospetto 23), si nota che la mortalità nelle donne per il complesso delle malattie della gravidanza, parto e puerperio è venuta scemando dal triennio 1900-02 al triennio 1930-32, e che la diminuzione maggiore si riscontra nell'età da 45 a 54 anni (50 %). In tutti i periodi considerati, il massimo della mortalità si osserva nell'età da 25 a 34 anni.

Le partorienti negli anni dal 1930 al 1936 sono state classificate secondo l'età e lo stato civile. Mettendo, invece, in rapporto il numero delle donne morte per malattie della gravidanza, parto e puerperio, distinte per classi di età, col numero delle partorienti della stessa età (prospetto 23, ultime cinque colonne), si rileva che la maggiore mortalità si verifica nell'età da 45 a 54 anni. Inoltre, nel 1936, rispetto al triennio 1930-32, si nota che la mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio ha segnato un aumento del 6 %. L'aumento si verifica anche nei singoli gruppi di età, presi in considerazione, con un minimo dell'1 % da 15 a 24 anni ed un massimo del 39 % da 45 a 54 anni.

Esaminando poi i quozienti specifici di mortalità per *malattie della gravidanza, parto e puerperio*, ottenuti negli anni dal 1930 al 1936, mettendo in rapporto il numero delle donne morte per tali malattie, in età da 15 a 54 anni, distinte secondo il loro stato civile, con il numero delle partorienti classificate anch'esse secondo lo stato civile (prospetto 24), si rileva che nel complesso, la mortalità tende ad aumentare fino al 1932, dimostrando in questo anno un aumento del 9 % a confronto del 1930. Essa diminuisce negli anni 1933 e 1934 e torna ad aumentare nel 1935. Nel 1936 vi è una lieve diminuzione (1 %) della mortalità a confronto dell'anno precedente.

La mortalità fra le donne nubili, vedove e divorziate è molto più accentuata di quella verificatasi fra le coniugate, ed essa, nel 1936 a confronto del 1930, è aumentata fra le nubili, vedove e divorziate in misura diversa che fra le coniugate: fra le prime, cioè, in modo più accentuato (24 %) che fra le seconde (9 %).

PROSPETTO 23. — Quozienti specifici di mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio.

GRUPPI DI ETÀ	SU 10.000 DONNE CENSITE DELLA STESSA ETÀ				SU 10.000 PARTI (a)				
	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32	1930-32	1933	1934	1935	1936
	medie annuali								
15-24 anni . . . . .	2.08	1.98	1.73	1.63	22.94	23.49	22.88	23.83	23.15
25-34 » . . . . .	5.59	4.79	4.89	4.01	23.64	24.44	22.57	26.64	25.30
35-44 » . . . . .	5.10	4.34	4.14	3.67	41.42	40.69	39.64	42.54	44.54
45-54 » . . . . .	0.42	0.31	0.35	0.21	58.02	52.36	64.91	73.44	80.52
<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.33</b>	<b>2.91</b>	<b>2.87</b>	<b>2.47</b>	<b>27.61</b>	<b>27.99</b>	<b>26.69</b>	<b>29.68</b>	<b>29.34</b>

(a) Il numero delle partorienti di età ignota è stato distribuito, a calcolo, per età, in proporzione dell'ammontare delle partorienti di età nota.

PROSPETTO 24. — Quozienti specifici di mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio, nelle donne da 15 a 54 anni, distinte secondo lo stato civile.

STATO CIVILE	SU 10.000 PARTI						
	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Nubili, vedove e divorziate . . . . .	46.12	50.86	54.43	45.52	48.69	51.45	56.97
Coniugate . . . . .	25.59	25.90	27.73	27.01	25.50	28.57	27.99
<b>Totale . . . . .</b>	<b>26.62</b>	<b>27.19</b>	<b>29.14</b>	<b>27.97</b>	<b>26.68</b>	<b>29.66</b>	<b>29.31</b>

Per gli anni 1935 e 1936 si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità per *malattie ed infezioni puerperali* secondo l'età ed il genere del parto (vedi prospetto 25, parte B).

Prendendo in esame i quozienti di mortalità che si riferiscono all'epoca dell'attività genetica femminile, si nota quanto segue: la mortalità per il *complesso delle malattie puerperali (escluse le infezioni)* nelle donne da 20 a 49 anni di età

è molto più accentuata in conseguenza di parti multipli che non di parti semplici; infatti, nel 1935 la mortalità per le donne decedute in seguito a parti multipli è più che tripla a confronto di quella delle donne che hanno avuto un parto semplice e, nel 1936, è più che doppia. La mortalità per *infezioni puerperali*, sia nelle donne che hanno avuto parto semplice che in quelle che hanno avuto parto multiplo, è inferiore a quella per le *altre malattie puerperali*.

È da osservare che lo scarso numero di donne, morte per *malattie puerperali* in seguito a parti multipli, può dar ragione di queste sensibili variazioni e di quelle che si notano nei quozienti di mortalità per le singole età.

PROSPETTO 25. — Madri morte nel Regno, negli anni 1935 e 1936, in seguito a malattie ed infezioni puerperali, classificate per gruppi di età e genere del parto.

GRUPPI DI ETÀ	1935						1936					
	Parti semplici			Parti multipli			Parti semplici			Parti multipli		
	(a)	(b)	Totale	(a)	(b)	Totale	(a)	(b)	Totale	(a)	(b)	Totale

A) - Cifre assolute

-15 . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—
15-19 . . .	39	56	95	1	1	2	35	39	74	1	—	1
20-24 . . .	222	228	450	12	11	23	192	236	428	4	7	11
25-29 . . .	283	332	615	7	16	23	276	309	585	12	9	21
30-34 . . .	240	278	518	13	11	24	254	253	507	5	12	17
35-39 . . .	289	186	475	16	7	23	294	188	482	11	7	18
40-44 . . .	157	109	266	10	5	15	178	97	275	6	4	10
45-49 . . .	23	13	36	1	—	1	13	19	32	1	1	2
20-49 . . .	1214	1146	2360	59	50	109	1207	1102	2309	39	40	79
50- <sup>m</sup> . . .	1	—	1	—	—	—	2	1	3	1	—	1
<b>Totale . . .</b>	<b>1254</b>	<b>1202</b>	<b>2456</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>111</b>	<b>1245</b>	<b>1143</b>	<b>2388</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>81</b>

B) - Cifre proporz. a 10 000 parti in donne della stessa età

-15 . . .	—	—	—	—	—	—	75.19	75.19	150.38	—	—	—
15-19 . . .	13.43	19.28	32.71	53.48	53.48	106.95	13.53	15.07	28.60	68.49	—	68.49
20-24 . . .	9.59	9.85	19.43	62.02	56.85	118.86	9.12	11.21	20.33	21.68	37.94	59.62
25-29 . . .	9.50	11.14	20.64	19.18	43.85	63.03	9.39	10.51	19.91	34.45	25.84	60.29
30-34 . . .	10.90	12.63	23.53	35.54	30.07	65.61	11.51	11.47	22.98	13.68	32.84	46.52
35-39 . . .	18.84	12.13	30.97	48.25	21.11	69.36	19.66	12.57	32.23	35.74	22.74	58.48
40-44 . . .	24.57	17.06	41.64	93.37	46.69	140.06	28.89	15.74	44.63	57.47	38.31	95.79
45-49 . . .	36.32	20.53	56.85	250.00	—	250.00	22.61	33.04	55.65	196.08	196.08	392.16
20-49 . . .	12.47	11.77	24.25	43.16	36.58	79.74	12.81	11.70	24.51	29.65	30.41	60.05
50- <sup>m</sup> . . .	62.50	—	62.50	—	—	—	126.58	63.29	189.87	5000.00	—	5000.00
<b>Totale . . .</b>	<b>12.51</b>	<b>11.99</b>	<b>24.49</b>	<b>43.29</b>	<b>36.80</b>	<b>80.09</b>	<b>12.86</b>	<b>11.81</b>	<b>24.67</b>	<b>30.82</b>	<b>30.07</b>	<b>60.89</b>

(a) Malattie puerperali, escluse le infezioni (N. 141, 144 a-b, 146, 148 a-b e 150 dell'Elenco nosologico).

(b) Infezioni puerperali (N. 140 e 145 a-b dell'Elenco nosologico).

### Mortalità nel primo anno di vita per alcune principali cause.

A) *Malattie dell'apparato respiratorio.* — Dal prospetto 26 si rileva che questo gruppo di malattie incide, sia nel 1935 che nel 1936, in considerevole misura nella mortalità dei bambini nel primo anno di vita (214,3 e 250,7, rispettivamente, per 10 000 nati vivi), in modo, però, sensibilmente minore delle *malattie dell'apparato digerente*. La mortalità per *malattie dell'apparato respiratorio* raggiunge, in questi due anni, in genere, i suoi massimi nei Compartimenti dell'Italia Meridionale, nella Lombardia e nella Sicilia; i minimi, nella Toscana, nella Liguria, nell'Umbria e nelle Marche. La mortalità per questo gruppo di malattie ha avuto, nel Regno, nel 1936, un aumento del 17 % a confronto dell'anno precedente.

Un aumento si è verificato anche in tutti i Compartimenti eccettuato il Piemonte.

PROSPETTO 26. — Mortalità per malattie dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente nei bambini nel primo anno di vita, negli anni 1935 e 1936 (per 10 000 nati vivi).

COMPARTIMENTI	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (a)		MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (b)		COMPARTIMENTI	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (a)		MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (b)	
	1935	1936	1935	1936		1935	1936	1935	1936
Piemonte . . . . .	185.4	174.3	202.1	173.5	Lazio . . . . .	177.0	218.3	271.6	252.7
Liguria . . . . .	138.3	153.8	124.2	102.9	Abruzzi e Molise	169.1	240.5	434.4	432.4
Lombardia . . . . .	254.9	277.2	464.3	383.2	Campania . . . . .	284.9	328.9	479.2	378.7
Venezia Trident.	191.6	258.8	285.2	194.3	Puglie . . . . .	299.7	399.5	473.4	447.2
Veneto . . . . .	163.3	183.9	170.7	155.4	Lucania . . . . .	268.9	422.1	574.3	501.1
Venezia G. e Zara	177.5	202.2	251.3	248.5	Calabrie . . . . .	231.1	276.6	406.9	409.2
Emilia . . . . .	166.1	206.3	139.9	134.9	Sicilia . . . . .	255.3	271.1	571.5	474.1
Toscana . . . . .	129.0	138.7	113.3	100.0	Sardegna . . . . .	172.2	191.8	371.7	279.1
Marche . . . . .	144.5	160.1	171.5	153.4	<b>REGNO . . . . .</b>	<b>214.3</b>	<b>250.7</b>	<b>349.5</b>	<b>305.6</b>
Umbria . . . . .	141.5	160.6	169.8	146.7					

(a) dal 104 al 114 dell'Elenco nosologico.

(b) dal 115 al 129 dell'Elenco nosologico.

Il maggior numero medio giornaliero di morti si è verificato, nel 1936, nei mesi di dicembre, marzo e febbraio; il minor numero, in settembre, agosto ed ottobre. La mortalità per *malattie dell'apparato respiratorio* dei bambini illegittimi (263,2 per 10 000 nati vivi) è, nel 1936, superiore a quella dei legittimi (250,1), con comportamento analogo a quella del 1935, 1934 e 1933.

B) *Malattie dell'apparato digerente.* — Fra queste malattie figura, per la massima parte dei casi (97 % nel 1935 e 1936), l'*enterite*, cosicchè si può ritenere che la notevole mortalità dovuta a questo gruppo di malattie (349,5 su 10 000 nati vivi nel 1935 e 305,6 nel 1936) sia da attribuirsi, nella quasi totalità, alla suddetta causa.

Nel 1936, a confronto dell'anno precedente, la mortalità per questo gruppo di malattie ha avuto nel Regno una sensibile diminuzione (13 %), comportamento che si verifica anche nei singoli Compartimenti, eccettuate le Calabrie.

La mortalità è notevolmente più alta, in genere, nei Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare. Il più basso quoziente si riscontra, nel 1936, nella Toscana (100,0), il più alto invece nella Lucania (501,1).

Il maggior numero medio giornaliero di morti si è verificato, nel 1936, nei mesi di luglio, agosto, giugno e settembre, il minore, nei mesi di marzo, gennaio, febbraio e aprile dimostrandosi così la non favorevole influenza dei calori estivi sulle condizioni dell'apparato digerente infantile.

La mortalità degli illegittimi (354,4 su 10 000 nati vivi) risulta superiore a quella dei legittimi (303,3), con analogo comportamento a quello verificatosi nel 1935, 1934 e 1933.

C) *Malattie della prima infanzia e vizi di conformazione congeniti.* — Le voci della vecchia nomenclatura, riguardanti le *malattie della prima infanzia* e i *vizi di conformazione congeniti*, sono state raggruppate con altri criteri nella nuova nomenclatura (1): inoltre, come è stato altra volta accennato (2), non si è sempre seguito lo stesso criterio nella classificazione di alcune voci di questa rubrica, cosicchè sulla comparabilità delle cifre relative a tali voci e specie di quelle relative ai morti per *asfissia ed apoplessia nel parto* è necessario fare delle riserve. Si è ritenuto, quindi, più opportuno, a partire dall'anno 1931, di raggruppare in un'unica voce ciò che era trattato, nei volumi precedenti fino al 1930, in tre distinti paragrafi (*asfissia e apoplessia nel parto; malattie fetali e vizi congeniti; debolezza congenita, immaturità e malattie speciali dei neonati*).

Analogamente a quanto è stato fatto per altre malattie, si sono messi in confronto i dati per Compartimenti e per il Regno per i trienni 1910-12, 1920-22, 1930-1932 e per l'anno 1936: si è dovuto escludere il triennio 1900-02, perchè dalle statistiche del tempo non risultano i dati dei morti per le suddette malattie nel 1° anno di vita, nei singoli Compartimenti del Regno.

Dal prospetto 27 si rileva che la mortalità per *malattie della prima infanzia e per vizi di conformazione congeniti*, nel Regno (nei vecchi confini), è diminuita nel 1936 del 19 % a confronto del triennio base 1910-12. Analogo andamento si nota, in genere, nei singoli Compartimenti, eccetto nella Campania, nelle Puglie e nella Lucania, in cui la mortalità è aumentata a confronto del triennio base 1910-1912, rispettivamente, del 7 %, del 5 % e del 29 %. Nel 1936, hanno superato la mortalità media del Regno, in ordine crescente, i seguenti Compartimenti: Abruzzi e Molise, Lombardia, Umbria, Veneto, Puglie, Marche, Venezia Giulia e Zara, Venezia Tridentina, Emilia e Lucania.

(1) Cfr. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932* — Parte I — Introduzione — Allegato II, pagine 156\* e 157\*.

(2) Cfr. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle Cause di morte negli anni 1929 e 1930* — Parte I — Introduzione, nota (b), pagina 63\*.

**PROSPETTO 27. — Mortalità per malattie della prima infanzia  
e per vizi di conformazione congeniti, nel primo anno di vita (medie annuali).**

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 10000 NATI VIVI				NUMERI INDICI							
	1910-12	1920-22	1930-32	1936	Triennio 1910-12 = 100			Mortalità del Regno = 100				
					1920-22	1930-32	1936	1910-12	1920-22	1930-32	1936	
Piemonte . . . . .	324.2	242.8	269.9	284.4	75	83	88	88	83	88	95	
Liguria . . . . .	285.5	205.7	232.2	253.2	72	81	89	78	71	76	85	
Lombardia . . . . .	369.4	202.9	323.4	314.0	79	88	85	101	100	105	105	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	360.9	355.9	—	—	—	—	—	118	119	
Veneto . . . . .	435.0	318.5	314.6	320.7	73	72	74	119	109	103	108	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	456.6	347.1	—	—	—	—	—	149	117	
Emilia . . . . .	513.4	381.6	382.5	366.6	74	74	71	140	121	125	123	
Toscana . . . . .	406.7	288.4	301.0	286.0	71	74	70	111	99	98	96	
Marche . . . . .	456.3	360.3	360.9	329.1	79	79	72	124	124	118	111	
Umbria . . . . .	458.6	349.3	342.2	315.2	76	75	69	125	120	112	106	
Lazio . . . . .	344.0	222.8	277.9	267.4	65	81	78	94	76	91	90	
Abruzzi e Molise . . . . .	371.7	325.1	334.3	305.8	87	90	82	101	112	109	103	
Campania . . . . .	228.6	209.8	237.8	243.6	92	104	107	62	72	78	82	
Puglie . . . . .	306.6	302.1	350.3	321.5	99	114	105	84	104	114	108	
Lucania . . . . .	308.1	281.5	354.6	396.7	91	115	129	84	97	116	133	
Calabrie . . . . .	276.0	231.1	243.1	260.7	84	88	94	75	79	79	88	
Sicilia . . . . .	379.1	323.6	285.9	267.8	85	75	71	103	111	93	90	
Sardegna . . . . .	345.1	291.4	290.3	288.2	84	84	84	94	100	95	97	
<b>REGNO</b> { vecchi conf.	<b>367.0</b>	<b>291.5</b>			<b>79</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
{ attuali conf.			<b>306.8</b>	<b>297.9</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

**Marasma senile.** — I quozienti di mortalità per *marasma senile* sono saliti da 962, per ogni milione di abitanti nella media del triennio 1887-89, a 1382 nel quinquennio 1919-23, a 1456 nel 1924 e a 1604 nel 1925. Dal 1926 al 1930 la mortalità è andata diminuendo, segnando, nel 1930, 906 morti per ogni milione di abitanti. Nel 1931, nel 1932 e nel 1933 si sono avuti, rispettivamente, 1001, 961 e 902 morti per un milione di abitanti e nel 1934 è stato segnato il minimo quoziente di mortalità (896). Nel 1935 e 1936 la mortalità per *marasma senile* è risultata rispettivamente di 951 e 955 per un milione di abitanti.

È da notare che sotto la voce « *marasma senile* » è presumibile vadano compresi molti casi di morte relativi a individui, che, giunti ad una età avanzata, muoiono con sintomi marantici che possono essere la conseguenza di malattie di organi interni, difficilmente diagnosticabili, come potrebbero, ad esempio, essere le forme lente di sclerosi polmonare di natura tubercolare, o carcinomi di organi interni e specialmente dell'apparato digerente, che, senza dare disturbi di canalizzazione, hanno portato a un progressivo decadimento generale dell'organismo.



Una maggiore esattezza nelle diagnosi, facilitata dal progressivo miglioramento dei mezzi di indagine diagnostica, può influire sull'abbassamento del quoziente di mortalità per *marasma senile*: inoltre, l'insistente opera di propaganda che l'Istituto Centrale di Statistica ha fatto direttamente e indirettamente, affinché i medici segnalassero, con la maggiore accuratezza possibile, la causa che determinò la morte dell'infermo, può avere anche influito sulla diminuzione notevole che si riscontra nei quozienti di mortalità per *marasma senile* dal 1926 in poi.

I Compartimenti in cui la mortalità per *marasma senile* raggiunse il massimo furono, nel 1936, la Venezia Giulia e Zara (165,5 per ogni 100 000 abitanti), la Sicilia (157,5), le Calabrie (139,7), gli Abruzzi e Molise (132,7) e la Lucania (131,6). I minimi, si verificarono nella Liguria (50,3), nella Lombardia (57,8) e nel Lazio (63,7).

**§ 3. — Mortalità nel Regno dei bambini, durante il primo anno di vita, per cause, in relazione alla legittimità dei natali.** — I bambini morti prima di aver compiuto il primo anno di vita sono stati divisi in due gruppi: nel primo mese di vita e da un mese a meno di un anno di età, e per ciascun gruppo si è rilevata la loro nascita legittima od illegittima.

**PROSPETTO 28. — Bambini d'ambo i sessi morti nel Regno, nel primo anno di vita, distinti secondo la filiazione, negli anni 1934, 1935 e 1936.**

ANNI — FILIAZIONE (a)	NATI — VIVI	MORTI		SU 100 MORTI NEL PRIMO ANNO DI VITA, DELLA MEDESIMA FILIAZIONE, MORIRONO		SU 1000 NATI VIVI MORIRONO DELLA MEDESIMA FILIAZIONE			
		nel primo mese di vita	da un mese a meno di un anno	nel primo mese di vita	da un mese a meno di un anno	nel primo mese di vita	da un mese a meno di un anno	nel primo anno di vita	
1934	Legittimi . . .	942 770	32 060	59 564	34.99	65.01	34.01	63.18	97.19
	Illegittimi . .	50 196	2 504	3 895	39.13	60.87	49.88	77.60	127.48
	<b>Totale . . .</b>	<b>992 966</b>	<b>34 564</b>	<b>63 459</b>	<b>35.26</b>	<b>64.74</b>	<b>34.81</b>	<b>63.91</b>	<b>98.72</b>
1935	Legittimi . . .	949 337	34 211	60 447	36.14	63.86	36.04	63.67	99.71
	Illegittimi . .	47 371	2 509	3 709	40.35	59.65	52.96	78.30	131.26
	<b>Totale . . .</b>	<b>996 708</b>	<b>36 720</b>	<b>64 156</b>	<b>36.40</b>	<b>63.60</b>	<b>36.84</b>	<b>64.37</b>	<b>101.21</b>
1936	Legittimi . . .	919 260	32 331	58 742	35.50	64.50	35.17	63.90	99.07
	Illegittimi . .	43 426	2 180	3 427	38.88	61.12	50.20	78.92	129.12
	<b>Totale . . .</b>	<b>962 686</b>	<b>34 511</b>	<b>62 169</b>	<b>35.70</b>	<b>64.30</b>	<b>35.85</b>	<b>64.58</b>	<b>100.43</b>

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti nel primo anno di vita, nel complesso del Regno, a 1000 nati vivi, si trova che, nel 1934, di 1000 nati vivi legittimi

(a) Nelle cifre dei legittimi sono compresi per gli anni 1934, 1935 e 1936, rispettivamente, 750, 857 e 990 morti nel 1° anno di vita (1 % del totale dei bambini morti nel 1° anno di vita per il 1936) per i quali non venne indicata la filiazione e che dalle notizie contenute nelle schede, poteva presumersi fossero legittimi.

Nelle cifre degli illegittimi sono compresi per gli anni sopraindicati, rispettivamente, 2312, 2216 e 2007 morti nel 1° anno di vita per i quali fu dichiarata ignota la filiazione.

timi, ne morirono nel primo mese 34,01 ed entro il primo anno di vita 97,19; nel 1935, ne morirono, rispettivamente, 36,04 e 99,71; nel 1936, 35,17 e 99,07. Nel 1934, di 1000 nati vivi illegittimi, ne morirono nel primo mese 49,88, ed entro il primo anno di vita 127,48; nel 1935, ne morirono, rispettivamente, 52,96 e 131,26; nel 1936, 50,20 e 129,12.

Osservando le quote percentuali dei morti nel primo mese di vita sul totale dei morti nel primo anno per ciascuna filiazione, si nota che di legittimi ne sono morti, nel 1934, 34,99 e di illegittimi 39,13; nel 1935, rispettivamente, 36,14 e 40,35; nel 1936, 35,50 e 38,88. La quota percentuale dei morti nel primo mese di vita è maggiore negli illegittimi che nei legittimi.

È da notare che nel tempo la differenza fra la mortalità degli illegittimi e quella dei legittimi nel primo mese di vita ha una netta tendenza alla diminuzione: infatti, partendo per esempio dal 1928, essa va progressivamente decrescendo, perchè segna negli illegittimi 29 punti in più nel 1928, 26 nel 1929, 23 nel 1930, 21 nel 1931 e 1932, 20 nel 1933, 16 nel 1934, 17 nel 1935 e 15 nel 1936, ciò che varrebbe a dimostrare che l'assistenza alla maternità illegittima ha notevolmente diminuito l'influenza nociva di tutte quelle cause di origine prenatale che si verificano durante la gravidanza od il parto e che, come è stato già detto, sono più diffuse in condizione di illegittimità. La benefica azione dell'assistenza alla maternità illegittima potrebbe anche essere convalidata dal fatto che nel 1933 la differenza in più della mortalità fra gli illegittimi a confronto dei legittimi nel primo mese di vita supera di 8 punti la differenza in più della mortalità fra gli illegittimi a confronto dei legittimi da un mese a meno di un anno, differenza che si è ridotta a 2 punti nel 1934 e 1935 ed a zero punti nel 1936.

Ora le cause di morte che agiscono nel periodo della gestazione sull'organismo materno (e quindi sul feto), o durante il parto, sono, per ragioni ovvie, molto più diffuse in condizione di illegittimità e spiegano questa più accentuata differenza negli anni passati, che è andata diminuendo fino ad annullarsi nel 1936, per la maggiore assistenza praticata alle madri di figli illegittimi durante la gravidanza ed il parto.

Questo fatto viene anche confermato dall'osservazione dei quozienti di mortalità, per singole cause, nei bambini nel primo anno di vita (prospetto 29), dai quali si nota come negli illegittimi il maggior aumento della mortalità si verifica proprio per quelle cause che generalmente agiscono o nel periodo della gestazione o durante il parto o nell'immediato *post partum*, come le *malattie della prima infanzia* e la *sifilide*. E ciò viene a convalidare l'opinione del Brend e del Savorgnan (a), che le cause che producono la morte nei primi quindici giorni di vita sono da ritenersi, per la massima parte, di origine prenatale, dipendenti da malattie costituzionali ma-

---

(a) Cfr. WILLIAM A. BREND, *Health and the State*, Londra 1917; FRANCO SAVORGNAN, *Demografia di guerra ed altri saggi*, pagg. 72 e segg. — Edizione Zanichelli, Bologna — Vedi anche: L. DE BERARDINIS, *Alcune caratteristiche della natimortalità e della mortalità infantile* — Appendice al *Compendio Statistico italiano, per l'anno 1932-XI, dell'Istituto Centrale di Statistica* — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1932-XI, pag. 323 e « *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile per gli anni 1929 e segg.* » dell'Istituto Centrale di Statistica.

PROSPETTO 29. — **Mortalità dei bambini d'ambo i sessi, nel primo anno di vita, nel 1936.**  
(Cifre proporzionali a 10 000 nati vivi).

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	LEGITTIMI (b)	ILLE- GITTIMI (b)	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	LEGITTIMI (b)	ILLE- GITTIMI (b)
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>990.7</b>	<b>1291.2</b>	<b>VIII. - Mal. dell'apparato respi- ratorio . . . . .</b>	<b>250.1</b>	<b>263.2</b>
<b>I. - Mal. infettive e parassitarie.</b>	<b>65.5</b>	<b>151.1</b>	106	39.3	30.4
I. 2	0.2	—	107, 108, 109	206.9	227.7
7	4.2	5.5	110	1.3	1.6
8	0.4	0.7	104, 105 dal III al IIIA	2.6	3.5
9	13.0	20.7	<b>IX. - Mal. dell'apparato dige- rente . . . . .</b>	<b>303.3</b>	<b>354.4</b>
10	2.4	4.8	117	..	—
11	18.2	25.8	119	292.7	343.6
13	0.6	—	121	0.1	0.2
dal 24 al 32	6.4	7.1	122	2.1	1.8
34	4.7	45.4	124	0.1	—
36	3.9	23.7	125, 126, 127	1.2	0.5
38	1.2	0.5	115, 116, 118, 123, 128, 129	7.2	8.3
dal 39 al 42	0.5	0.5	<b>X. - Mal. dell'apparato urinario e genitale. . . . .</b>	<b>7.4</b>	<b>9.7</b>
4, 5, 12 dal 15 al 22	8.5	14.0	130, 131, 132	6.4	7.1
33, 35, 37, 43, 44			133	0.4	0.9
<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	134	..	—
dal 45 al 53	0.3	0.5	135	0.5	1.2
54, 55	0.1	—	136	..	—
<b>III. - Malattie reumatiche, (c) . . . . .</b>	<b>6.9</b>	<b>8.1</b>	138, 139	0.2	0.5
56	0.1	0.7	<b>XII. - Mal. della pelle e del tes- tuto cellulare . . . . .</b>	<b>4.0</b>	<b>6.0</b>
59	..	—	151, 152, 153	4.0	6.0
dal 60 al 64	2.3	2.8	<b>XIII. - Mal. delle ossa e organi della locomozione . . . . .</b>	<b>0.5</b>	<b>1.4</b>
66	1.3	1.2	154, 155, 156	0.5	1.4
65, 67, 68, 69	3.1	3.5	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti . . . . .</b>	<b>26.0</b>	<b>26.3</b>
<b>IV. - Mal. del sangue e degli or- gani ematopoietici . . . . .</b>	<b>2.9</b>	<b>2.3</b>	157	26.0	26.3
71	1.6	0.2	<b>XV. - Malattie dell'infanzia. . . . .</b>	<b>265.8</b>	<b>399.1</b>
70, 72, 73, 74	1.4	2.1	158	106.3	124.8
<b>VI. - Mal. del sistema nervoso e organi dei sensi . . . . .</b>	<b>48.2</b>	<b>52.0</b>	159	95.0	183.1
79	8.3	8.8	160	9.1	11.7
82	0.3	0.2	161	55.3	79.4
85	0.3	—	<b>XVII. - Morti violente o acci- dentali . . . . .</b>	<b>2.1</b>	<b>8.1</b>
78, 81, 86, 87	38.2	40.5	dal 172 al 175	0.2	5.3
88, 89	1.1	2.5	dal 176 al 194	2.0	2.8
<b>VII. - Mal. dell'appar. circolat.</b>	<b>1.7</b>	<b>2.1</b>	<b>XVIII. - Cause di morte non de- terminate . . . . .</b>	<b>5.7</b>	<b>7.1</b>
90	..	—	199, 200	5.7	7.1
91	0.1	—			
92	0.3	0.2			
93	0.2	0.9			
95	0.5	0.7			
96	..	—			
97, 98	0.2	—			
dal 99 al 103	0.5	0.2			

(a) Non sono citati i numeri corrispondenti alle voci dell'Elenco nosologico per le quali, nell'anno 1936, non furono registrati casi di morte in bambini nel primo anno di vita.

(b) Cfr. la nota (a) a pag. 38\*.

(c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali.

terne e fetali, o da condizioni di lavoro o di ambiente, verificatesi durante la gravidanza, o da accidenti durante il parto.

Nel 1936, la mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di vita (1291 morti su 10 000 nati vivi illegittimi) è assai più elevata di quella dei legittimi (991 morti su 10 000 nati vivi legittimi) e la maggiore mortalità nell'infanzia di nascita illegittima è, più specialmente, dovuta, come si è già accennato, alle *malattie della prima infanzia* (399 morti illegittimi, su 10 000 nati vivi della stessa categoria, contro 266 legittimi); alla *sifilide* (45 illegittimi, contro 5 legittimi); alle *enteriti* (344 dei primi e 293 dei secondi) e all'*infezione purulenta e setticemia* (24 e 4, rispettivamente).

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni per susseguente matrimonio dei genitori, e i bambini morti dopo essere stati legittimati sono segnati nella scheda di morte come legittimi, mentre nella statistica dei nati vennero iscritti fra gli illegittimi, il che può avvenire del resto, ma in misura presumibilmente minore, anche per i morti sotto un anno.

**§ 4. — Bambini morti nel primo anno di vita secondo l'età alla morte.** — Nei volumi precedenti, l'età alla morte dei bambini deceduti a zero anni era specificata, in combinazione con le cause, per due periodi: nel primo mese, con sottodistinzioni, e nei restanti undici mesi senza ulteriori sottodistinzioni.

Per la prima volta, nel 1936, i morti in questo secondo periodo sono stati classificati per singoli mesi di età.

La distribuzione percentuale dei morti a zero anni nelle singole età alla morte per tutte le cause, segna il massimo, oltre il 35 %, nel primo mese di vita: la percentuale si abbassa all'8,7 % nel secondo mese e tende a diminuire nei mesi di età successivi, segnando il minimo nell'11° mese di età (4,8 %) e stabilizzandosi intorno al 5,5 % nell'età da 5 a 8 mesi incluso.

La frequenza con la quale le cause di morte incidono nei diversi mesi di età del primo anno di vita varia sensibilmente: a meno di un mese di età, circa i 3/4 dei bambini (74,8 %) muoiono per *vizi di conformazione congeniti, debolezza congenita, prematurità ed altre malattie speciali dell'infanzia*, mentre il secondo posto, a notevole distanza (9,8 %), spetta alle *malattie dell'apparato respiratorio*.

Le percentuali dei morti per *vizi di conformazione congeniti, debolezza congenita, ecc.* scendono al 22 e al 13 % nelle età di mesi 1 e 2, rispettivamente, per poi divenire trascurabili. Nelle età da 1 a 11 mesi la maggiore frequenza dei casi di morte spetta costantemente alle *malattie dell'apparato digerente* che nelle età di mesi 3, 4 e 5 si riscontrano con frequenze superiori al 50 %: i casi di morte per *malattie dell'apparato respiratorio*, che da 1 mese a 5 mesi di età si aggirano intorno al 30 %, nei mesi successivi raggiungono percentuali più alte, fino ad un massimo del 38,7 % nei bambini di 11 mesi di età.

PROSPETTO 30. — Bambini morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1936,  
per cause di morte e mesi di età.

A) — su 1 000 morti per ciascuna causa.

NUMERI NOMENCLATURA ABBREVIATA	CAUSE DI MORTE	ETÀ ALLA MORTE, IN MESI											IN COMPLESSO	
		meno di 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Dall'1 al 14	Malattie infettive e parassitarie . . . . .	125	96	80	65	67	76	78	78	88	80	84	83	1000
22 e 23	Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale e altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi . . . . .	328	102	82	69	67	57	51	62	52	51	38	41	1000
26, 27, 28	Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .	138	106	80	72	73	67	76	75	80	81	79	74	1000
Dal 29 al 32	Malattie dell'apparato digerente . . . . .	85	88	90	100	97	92	82	83	77	74	70	63	1000
38	Debolezza congenita, vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre mal. speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti).	891	64	29	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1000
41, 42	Morti violente ed accidentali . . . . .	217	74	57	61	57	43	43	78	52	78	122	117	1000
43	Cause di morte non specificate o mal definite	651	73	41	63	39	18	27	25	22	7	14	20	1000
	Restanti cause . . . . .	150	97	77	71	68	75	69	79	71	83	75	84	1000
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>357</b>	<b>87</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>1000</b>

B) — su 1 000 morti in ciascuna età (\*).

Dall'1 al 14	Malattie infettive e parassitarie . . . . .	24	77	82	75	79	95	100	99	113	104	114	120	69
22 e 23	Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale, altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi . . . . .	45	57	58	56	55	50	45	55	46	47	36	42	48
26, 27, 28	Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .	58	307	296	303	312	304	350	343	367	379	385	387	251
Dal 29 al 32	Malattie dell'apparato digerente . . . . .	73	312	406	514	508	507	462	459	433	423	416	399	306
38	Debolezza congenita, vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre mal. speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti).	748	218	128	19	15	10	10	6	8	6	8	4	298
41, 42	Morti violente ed accidentali . . . . .	1	2	2	2	2	2	2	3	2	4	6	6	2
	Restanti cause . . . . .	10	27	28	29	28	33	31	35	32	38	35	42	24
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

(\*) Esclusi i decessi per cause di morte non specificate o mal definite.

**§ 5. — Mortalità neonatale e nel primo mese di vita secondo il genere del parto, nel biennio 1934-35 e nell'anno 1936.** — Nel prospetto 31 sono calcolati i quozienti di mortalità neonatale (morti da 0 a 6 giorni per 10 000 nati vivi da parti dello stesso genere) e nel primo mese di vita, per alcune cause, distintamente per i morti derivanti da nati da parti semplici e per quelli derivanti da nati da parti multipli. Le cause di morte prese in considerazione sono quelle per le quali si verifica un maggior numero di decessi.

Il quoziente di neonatimortalità per i provenienti da parti multipli è dell'800 % e del 759 % più alto di quello dei provenienti da parti semplici rispettivamente nel biennio 1934-35 e nell'anno 1936. Tale quoziente, se riferito alle singole cause prese in considerazione, mostra differenze percentuali molto diverse fra i due gruppi presi in esame. È superiore, nel biennio 1934-35, nei provenienti da parti multipli, del 1100 %, all'incirca, per la *nascita prematura* e per la *debolezza congenita*, cause che danno i massimi quozienti di mortalità neonatale; è ugualmente superiore nei provenienti da parti multipli di valori che vanno da 630 a 650 % per le *bronchiti* e le *morti improvvise*; di valori che oscillano fra il 209 e il 391 % per le *broncopolmoniti*, *conseguenze del parto*, *cause non specificate*, *convulsioni*, *enteriti*, *altre malattie speciali dell'infanzia*; e di valori al disotto del 200 % per le *rimanenti cause* e per i *vizi di conformazione congeniti*.

Lo stesso comportamento, all'incirca, si nota nel 1936, eccetto per le *bronchiti* in cui la differenza percentuale in più nei quozienti di mortalità neonatale nei provenienti da parti multipli è solo del 234 %, a confronto del 630 % del biennio 1934-35, per la *broncopolmonite* in cui è solo del 31 %, a confronto del 209 % del biennio 1934-35 e per la *morte improvvisa* in cui non si è avuto alcun decesso nel 1936 fra i provenienti da parti multipli.

**PROSPETTO 31. — Neonatimortalità e mortalità nel primo mese di vita per alcune cause, nel biennio 1934-35 (a) e nell'anno 1936, secondo il genere del parto.**

(Per 10 000 nati vivi da parti dello stesso genere).

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	MORTALITÀ DA 0 A 6 GIORNI				MORTALITÀ NEL 1° MESE DI VITA			
		tra i nati da							
		parti semplici		parti multipli		parti semplici		parti multipli	
		1934- 1935	1936	1934- 1935	1936	1934- 1935	1936	1934- 1935	1936
	<b>Complesso . . .</b>	<b>160.44</b>	<b>163.28</b>	<b>1443.93</b>	<b>1401.55</b>	<b>308.58</b>	<b>310.53</b>	<b>2284.07</b>	<b>2188.15</b>
86	Convulsioni . . . . .	5.37	6.05	21.98	20.74	13.03	14.29	51.95	52.47
106	Bronchiti . . . . .	1.45	1.22	10.59	4.07	8.42	8.75	37.56	32.94
107	Broncopolmoniti (compr. la bronch. e piil.)	3.36	4.03	10.39	5.24	19.01	21.03	53.55	44.74
119	Enteriti . . . . .	2.58	2.51	11.39	14.64	25.67	22.25	91.71	85.00
157	Vizi di conformazione congeniti (b) . . . . .	9.50	10.45	23.58	26.03	16.00	17.51	37.56	39.45
158	Debolezza congenita . . . . .	45.26	43.09	568.02	506.37	79.00	76.16	895.89	802.05
159	Nascita prematura (b) . . . . .	52.80	54.50	621.57	673.93	72.44	75.21	802.18	860.62
160	Conseguenze del parto (b) . . . . .	6.54	8.46	21.58	21.15	6.56	8.90	22.38	21.56
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	28.35	27.05	134.06	112.66	46.00	44.24	234.16	198.89
199	Morte improvvisa . . . . .	0.08	0.23	0.60	—	0.22	0.53	1.40	1.22
200	Cause non specificate o mal definite . . . . .	1.70	2.66	6.79	9.35	2.21	3.04	8.74	10.17
	Rimanenti cause . . . . .	3.44	2.92	7.94	7.32	19.02	18.61	46.95	39.05

(a) Media annuale. (b) Non compresi i nati morti.

Nel biennio 1934-35 si nota, all'incirca, analogo andamento a quello verificatosi per la neonatimortalità, per ciò che riguarda le differenze percentuali dei quozienti di mortalità nel primo mese di vita nei bambini provenienti da parti multipli a confronto di quelle dei bambini provenienti da parti semplici, quantunque esse differenze, eccetto per le *altre malattie speciali dell'infanzia* e per le *rimanenti cause*, siano meno accentuate.

Nel 1936 analogo andamento a quello verificatosi per la neonatimortalità si nota nelle differenze percentuali fra i quozienti di mortalità nel primo mese di vita fra i provenienti da parti multipli a confronto dei provenienti da parti semplici, dimostrandosi però queste differenze più accentuate di quelle della neonatimortalità per ciò che riguarda le *convulsioni*, le *bronchiti*, le *broncopolmoniti* e le *altre malattie speciali dell'infanzia*.

Nel complesso si verifica che mentre la neonatimortalità e la mortalità nel primo mese di vita sono lievemente aumentate nel 1936, a confronto del biennio 1934-35, nei provenienti da parti semplici, esse sono diminuite, anche se non notevolmente, nei provenienti da parti multipli.

**§ 6. — Morti dopo atto operatorio, nell'anno 1936.** — Dall'anno 1931 è stata redatta una tavola in cui i morti sono classificati secondo le cause, con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno. Nel prospetto 32 sono calcolate, per il Regno, le cifre proporzionali dei morti dopo atti operatori, distintamente, per cause, su 1000 morti per la stessa causa. Con questi rapporti non si vuol naturalmente misurare la letalità per atti operatori, ma piuttosto ottenere, con le dovute riserve, un indice della frequenza degli atti operatori nelle varie malattie.

Nel 1936 hanno dato le più alte percentuali di morti dopo atto operatorio sul totale dei morti, *l'appendicite* (409,5 su 1000 morti per la stessa causa), *i tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato* (286,6), *le altre malattie della gravidanza, parto e puerperio* (253,5), *le altre malattie dell'apparato digerente* (195,9),

PROSPETTO 32. — Morti nel Regno per cause, dopo atto operatorio, nel 1936.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	SU 1000 MORTI PER CIASCUNA CAUSA	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	SU 1000 MORTI PER CIASCUNA CAUSA	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	SU 1000 MORTI PER CIASCUNA CAUSA
<b>Complesso (b)</b>	<b>17.4</b>				
		59	18.4	121	409.5
		dal 60 al 74,		dal 124 al 127	51.2
1. 2	7.6	76, 77	9.0	dal 115 al 118,	
10	51.0	80, 83	1.7	122, 123, 128, 129	195.9
11	0.6	82	0.2	130, 131, 132	0.7
23	1.5	78, 79, 81,		dal 133 al 139	109.6
dal 24 al 32	16.5	dall'84 all'89	18.3	140, 145	98.9
34	2.8	dal 90 al 95	0.3	dal 141 al 144,	253.5
38	2.3	dal 96 al 103	7.3	dal 146 al 150	
4, 5, 12, 13, dal 15		105	0.2	dal 151 al 156	157.8
al 22, 33, 35, 36,	11.7	107, 108, 109	0.2	dal 157 al 161	3.9
37, dal 39 al 44		104, 105,		dal 163 al 171	7.6
dal 45 al 53	47.4	dal 110 al 114	56.8	dal 172 al 175	68.5
54, 55	286.6	119, 120	0.6	dal 176 al 198	31.4

(a) Non sono citati i numeri corrispondenti alle voci dell'Elenco nosologico per le quali, nell'anno 1936, non furono registrati casi di morte dopo atto operatorio.

(b) Complesso dei morti dopo atto operatorio sul complesso dei morti per tutte le cause.

le malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione (157,8) e le altre malattie dell'apparato genito urinario (109,6).

La percentuale dei morti dopo atto operatorio sul totale dei morti è notevole nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale e Centrale, mentre diminuisce nettamente nei Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare (v. prospetto 33) e ciò concorda con la constatazione (\*\*) della più vasta organizzazione ospedaliera esistente nell'Italia Settentrionale e Centrale dove affluisce un maggior numero di ammalati per sottoporsi ad intervento chirurgico. Nel 1936, la massima percentuale di morti dopo atto operatorio si è avuta nell'Emilia (31,5 su 1000 morti); la minima nella Lucania (3,1), con comportamento pressochè analogo a quello verificatosi negli anni dal 1931 al 1935.

PROSPETTO 33. — Morti dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno, nel 1936.  
(Cifre proporzionali a 1000 morti in ciascun gruppo di cause).

COMPARTIMENTI E REGNO	GRUPPI DI CAUSE (*)												COM- PLESSO
	I (a)	II (b)	III-IV V (c)	VI (d)	VII (e)	VIII (f)	IX (g)	X (h)	XI (i)	XII- XIII (l)	XIV- XV (m)	XVII (n)	
Piemonte . . . . .	8.9	85.4	15.5	5.5	2.8	8.6	130.7	51.0	195.3	165.9	5.6	39.7	29.4
Liguria . . . . .	6.3	35.4	3.4	2.6	0.9	4.3	107.3	16.4	210.5	161.9	7.7	25.6	18.2
Lombardia . . . . .	7.4	65.9	14.4	5.3	2.1	7.2	70.7	38.3	200.0	156.2	4.4	29.3	22.8
Venezia Tridentina . . . . .	3.0	52.3	8.8	2.0	2.3	2.4	113.0	40.1	152.2	175.0	2.0	43.1	21.6
Veneto . . . . .	12.7	66.2	11.9	7.9	2.3	7.9	138.6	56.7	216.5	208.5	5.9	25.9	29.3
Venezia G. e Zara . . . . .	4.6	65.6	9.6	12.0	1.7	4.3	87.7	63.4	84.5	228.6	4.7	24.6	23.9
Emilia . . . . .	8.9	72.0	13.3	6.3	2.4	7.5	167.6	59.3	304.3	195.6	5.3	26.5	31.5
Toscana . . . . .	9.5	42.4	10.9	4.7	1.3	5.5	127.0	31.0	274.0	253.6	4.1	30.5	23.3
Marche . . . . .	8.7	57.0	7.1	2.0	1.7	5.4	135.3	20.5	211.3	195.9	5.3	37.9	23.8
Umbria . . . . .	20.7	48.0	9.4	1.2	0.7	7.4	151.8	43.1	181.8	301.9	8.2	46.8	26.8
Lazio . . . . .	6.0	54.5	16.2	4.2	2.3	7.3	76.5	37.8	100.0	157.4	1.8	15.1	21.3
Abruzzi e Molise . . . . .	1.7	37.4	7.2	0.6	0.6	2.1	16.3	14.6	155.6	81.6	3.0	18.5	8.2
Campania . . . . .	3.0	48.7	9.1	1.4	0.6	3.2	20.4	8.3	192.2	186.8	5.4	30.9	10.1
Puglie . . . . .	4.6	35.6	5.3	1.0	1.2	3.5	18.2	12.5	184.8	79.4	1.9	36.3	9.3
Lucania . . . . .	—	4.4	4.9	—	—	0.9	7.0	3.0	113.6	23.3	1.4	9.1	3.1
Calabrie . . . . .	2.1	13.4	5.3	1.1	—	0.6	9.9	5.6	178.3	43.5	2.1	23.1	5.3
Sicilia . . . . .	4.0	32.5	9.4	1.3	1.0	2.7	15.7	15.1	183.0	100.9	1.8	27.8	9.5
Sardegna . . . . .	1.1	28.6	6.9	1.7	2.2	2.8	15.4	15.4	58.8	80.0	1.2	12.9	7.0
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>6.7</b>	<b>57.6</b>	<b>10.7</b>	<b>3.7</b>	<b>1.7</b>	<b>5.1</b>	<b>57.9</b>	<b>28.7</b>	<b>190.1</b>	<b>157.8</b>	<b>3.9</b>	<b>28.7</b>	<b>18.9</b>

(\*) Non sono stati indicati quei gruppi per i quali, nell'anno 1936, non furono registrati casi di morte dopo atto operatorio, quindi la percentuale del complesso, nel Regno, non può coincidere con quella indicata nel prospetto 32 (v. nota (b) a pag. 44\*).

(a) Malattie infettive e parassitarie. (b) Tumori (neoplasie). (c) Malattie reumatiche, della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali, del sangue e degli organi ematopoietici, avvelenamenti cronici e intossicazioni. (d) Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi. (e) Malattie dell'apparato circolatorio. (f) Malattie dell'apparato respiratorio. (g) Malattie dell'apparato digerente. (h) Malattie dell'apparato urinario e genitale. (i) Malattie della gravidanza, parto e puerperio. (l) Malattie della pelle e del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione. (m) Vizi di conformazione congeniti e malattie dell'infanzia. (n) Morti violente e accidentali.

Le più elevate percentuali di morti dopo atto operatorio si osservano nel Regno ed in genere in tutti i Compartimenti, per i gruppi costituiti dalle *malattie della gravidanza, parto e puerperio*; dalle *malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione*; dalle *malattie dell'apparato digerente*; dai *tumori (neoplasie)*.

(\*\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica degli Ospedali e degli altri Istituti pubblici e privati di assistenza ospedaliera nell'anno 1932-XI* — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII.



PROSPETTO 34. — Quozienti di letalità, nel Regno, per le sottoindicate

ANNI (a)	MORBILLO			SCARLATTINA			FEBBRE TIPOIDEA ED INFEZIONI PARATIFICHE (b)			DIFTERITE E CROUP		
	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.
1888.	221 130	20 961	9.5	44 532	9 050	20.3	59 651	23 869	40.0	41 912	25 683	61.3
1889.	133 700	13 800	10.3	30 916	6 444	20.8	55 502	23 071	41.6	28 839	19 915	69.1
1890.	131 397	14 396	11.0	27 429	7 344	26.8	53 797	20 118	37.4	25 723	15 059	58.5
1891.	173 968	19 551	11.2	29 826	7 294	24.5	54 480	19 207	35.3	24 985	16 747	67.0
1892.	114 305	12 399	10.8	29 447	7 890	26.8	45 753	15 619	34.1	24 254	16 634	68.6
1893.	132 417	12 953	9.8	25 817	6 596	25.5	46 847	15 065	32.2	26 827	17 783	66.3
1894.	109 506	9 001	8.2	18 482	4 511	24.4	37 260	13 639	36.6	23 896	15 585	65.2
1895.	97 880	11 322	11.6	14 643	3 814	26.0	45 208	15 590	34.5	22 106	11 466	51.9
1896.	143 600	11 499	8.0	13 080	3 234	24.7	47 656	16 397	34.4	21 375	9 286	43.4
1897.	88 625	6 156	6.9	13 224	3 907	29.5	44 023	15 557	35.3	22 924	8 881	38.7
1898.	82 377	5 429	6.6	14 369	4 492	31.3	63 449	17 412	27.4	20 639	7 808	37.8
1899.	137 291	7 433	5.4	18 639	4 487	24.1	47 531	14 963	31.5	19 987	6 893	34.5
1900.	139 219	8 827	6.3	8 950	1 483	16.6	49 425	15 060	30.5	18 220	5 790	31.8
1901.	101 166	5 562	5.5	7 859	1 185	15.1	39 313	11 748	29.9	18 233	5 444	29.9
1902.	172 751	9 961	5.8	9 839	1 338	13.6	39 001	11 358	29.1	18 207	4 514	24.8
1903.	112 191	7 283	6.5	14 103	1 991	14.1	43 849	11 671	26.6	17 820	4 064	22.8
1904.	97 916	5 332	5.4	12 560	1 611	12.8	45 768	12 239	26.7	19 727	4 519	22.9
1905.	133 398	6 738	5.1	10 674	1 689	15.8	45 699	10 896	23.8	18 153	4 255	23.4
1906.	186 600	9 726	5.2	15 903	2 724	17.1	44 799	9 424	21.0	17 446	4 253	24.4
1907.	115 412	8 184	7.1	21 542	2 940	13.6	34 647	8 614	24.9	21 951	5 634	25.7
1908.	168 347	11 740	7.0	30 636	3 464	11.3	31 365	9 287	29.6	25 612	5 921	23.1
1909.	158 908	11 043	6.9	32 010	2 703	8.4	34 969	9 741	27.9	25 265	5 781	22.9
1910.	143 796	9 897	6.9	24 082	2 903	12.1	33 643	8 948	26.6	19 766	4 828	24.4
1911.	124 031	8 573	6.9	17 052	2 515	14.7	37 474	9 537	25.4	15 498	3 682	23.8
1912.	139 290	7 278	5.2	20 460	2 964	14.5	30 558	7 743	25.3	15 887	3 642	22.9
1913.	179 640	10 340	5.8	30 408	5 513	18.1	34 119	7 964	23.3	15 820	3 482	22.0
1914.	124 038	6 378	5.1	23 512	3 637	15.5	29 141	6 954	23.9	19 409	4 038	20.8
1921.	96 725	4 311	4.5	11 079	1 759	15.9	35 527	10 116	28.5	12 081	3 027	25.1
1922.	46 471	3 023	6.5	11 965	2 524	21.1	25 316	8 331	32.9	11 347	2 700	23.8
1923.	75 024	5 164	6.9	13 418	2 359	17.6	27 626	8 271	29.9	11 183	2 749	24.6
1924.	98 279	5 489	5.6	18 871	2 742	14.5	28 074	7 649	27.2	15 883	3 240	20.4
1925.	164 484	8 665	5.3	16 733	2 752	16.4	29 300	7 476	25.5	15 383	2 893	18.8
1926.	98 158	5 942	6.1	16 062	2 648	16.5	42 360	8 695	20.5	14 923	2 746	18.4
1927.	100 195	4 056	4.0	19 949	2 691	13.5	44 471	8 686	19.5	18 879	3 035	16.1
1928.	114 979	5 214	4.5	17 515	2 324	13.3	37 334	7 907	21.2	19 247	3 142	16.3
1929.	99 609	4 533	4.6	21 114	1 721	8.2	36 349	6 933	19.1	24 035	3 318	13.8
1930.	133 883	5 890	4.4	21 171	1 813	8.6	32 785	6 376	19.4	30 050	3 496	11.6
1931.	84 371	3 410	4.0	19 107	1 903	10.0	29 129	6 160	21.1	24 872	3 182	12.8
1932.	88 944	3 045	3.4	20 786	1 619	7.8	38 570	6 272	16.3	25 749	3 066	11.9
1933.	77 956	3 090	4.0	20 064	1 340	6.7	27 758	4 721	17.0	29 016	3 243	11.2
1934.	107 545	3 479	3.2	16 657	962	5.8	30 675	4 868	15.9	27 797	2 838	10.2
1935.	104 350	2 420	2.3	19 300	1 220	6.3	38 710	5 228	13.5	26 061	2 916	11.2
1936.	72 629	1 966	2.7	14 969	571	3.8	27 751	3 839	13.8	25 571	2 571	10.1

(a) I dati per gli anni 1915-1920 risultano incompleti, a causa del perturbamento portato dalla guerra, e quindi sono stati omissi nel presente  
 (b) Negli anni anteriori al 1924 venivano compresi nei morti per febbre tifoidea ed infezioni paratifiche, anche i decessi dovuti a febbre miliare.  
 (c) A partire dal 1932, il numero delle donne decedute per febbre puerperale, per l'adozione della nuova nomenclatura nosologica, è stato ottenuto

malattie infettive soggette a denuncia, durante gli anni dal 1888 al 1936.

ANNI (a)	PERTOSSE			INFLUENZA EPIDEMICA			FEBBRE PUERPERALE			MALARIA (in tutte le sue forme)		
	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunciati	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunciati	Morti	Morti per 100 casi denunz.
1888.	—	—	—	—	—	—	9 046	2 451	27.1	—	—	—
1889.	—	—	—	—	—	—	7 588	2 106	27.8	—	—	—
1890.	—	—	—	—	—	—	6 013	1 682	28.0	—	—	—
1891.	—	—	—	—	—	—	4 884	1 633	33.4	—	—	—
1892.	—	—	—	—	—	—	3 866	1 530	39.6	—	—	—
1893.	—	—	—	—	—	—	4 050	1 774	43.8	—	—	—
1894.	—	—	—	—	—	—	3 094	1 604	51.8	—	—	—
1895.	—	—	—	—	—	—	2 963	1 514	51.1	—	—	—
1896.	—	—	—	—	—	—	2 490	1 292	51.9	—	—	—
1897.	—	—	—	—	—	—	2 520	1 199	47.6	—	—	—
1898.	—	—	—	—	—	—	2 479	1 214	49.0	—	—	—
1899.	—	—	—	—	—	—	2 603	1 302	50.0	—	—	—
1900.	—	—	—	—	—	—	2 158	1 033	47.9	—	—	—
1901.	—	—	—	—	—	—	2 119	994	46.9	—	—	—
1902.	—	—	—	—	—	—	2 871	1 037	36.1	177 946	9 908	5.6
1903.	—	—	—	—	—	—	3 023	1 112	36.8	183 802	8 517	4.6
1904.	—	—	—	—	—	—	3 002	1 082	36.0	266 940	8 463	3.2
1905.	—	—	—	—	—	—	2 609	977	37.4	323 312	7 845	2.4
1906.	—	—	—	—	—	—	2 441	1 021	41.8	230 798	4 871	2.1
1907.	—	—	—	—	—	—	2 546	1 147	45.1	197 771	4 231	2.1
1908.	—	—	—	—	—	—	2 734	1 245	45.5	172 862	3 478	2.0
1909.	—	—	—	—	—	—	2 518	1 242	49.3	178 028	3 533	2.0
1910.	—	—	—	—	—	—	2 099	1 011	48.2	201 247	3 621	1.8
1911.	—	—	—	—	—	—	1 782	929	52.1	185 747	4 420	2.4
1912.	—	—	—	—	—	—	1 911	899	47.0	167 008	3 161	1.9
1913.	—	—	—	—	—	—	1 888	1 037	54.9	157 152	2 664	1.7
1914.	—	—	—	—	—	—	1 937	1 036	53.5	129 482	2 045	1.6
1921.	—	—	—	—	—	—	1 652	1 139	68.9	267 589	4 848	1.8
1922.	—	—	—	—	—	—	1 551	1 094	70.5	234 656	4 085	1.7
1923.	—	—	—	—	—	—	1 820	1 170	64.3	188 937	3 307	1.8
1924.	—	—	—	—	—	—	2 141	1 361	63.6	250 911	4 036	1.6
1925.	23 750	3 189	13.4	64 736	8 808	13.6	2 110	1 133	53.7	283 109	3 589	1.3
1926.	31 282	4 066	13.0	184 499	13 575	7.4	1 678	922	54.9	220 602	2 683	1.2
1927.	34 737	3 525	10.1	119 635	8 950	7.5	1 871	995	53.2	192 738	2 562	1.3
1928.	30 823	3 914	12.7	76 669	10 166	13.3	1 879	1 007	53.6	244 650	2 925	1.2
1929.	19 386	2 908	15.0	279 444	19 536	7.0	1 991	957	48.1	206 590	2 706	1.3
1930.	23 411	2 322	9.9	27 486	7 052	25.7	1 991	966	48.5	203 590	2 781	1.4
1931.	25 331	2 972	11.7	140 344	13 287	9.5	1 748	919	52.6	202 557	3 101	1.5
1932.	27 884	2 948	10.6	113 333	13 346	11.8	1 829	(c) 989	54.1	203 219	3 171	1.6
1933.	29 338	2 842	9.7	175 166	12 048	6.9	1 851	(c) 937	50.6	175 213	1 956	1.1
1934.	25 950	2 189	8.4	27 464	8 277	30.1	1 782	(c) 894	50.2	222 171	2 238	1.0
1935.	21 938	1 922	8.8	99 157	11 704	11.8	1 969	(c) 1 065	54.1	163 668	1 693	1.0
1936.	30 229	2 372	7.8	47 661	10 675	22.4	1 847	(c) 1 006	54.5	135 340	1 291	1.0

prospetto.

a calcolo, supponendo che esso stia, a confronto del complesso delle malattie settiche puerperali, nella stessa proporzione che nel periodo 1924-31.

## CAPO II.

NOTIZIE SULLE MORTI VIOLENTE  
E SULLE MORTI CAUSATE DA AVVELENAMENTI CRONICI,  
ACCIDENTALI O PROFESSIONALI.

**§ 1. — Morti per causa violenta, ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1936.** — Diamo, nel seguente prospetto, il numero dei morti nel Regno per *causa violenta accidentale*, per *omicidio* e *infanticidio* e per *suicidio*, distinti per sesso, nei decenni dal 1887 al 1916, nei settenni dal 1917 al 1930 e nei singoli anni dal 1931 al 1936.

PROSPETTO 35. — Morti per causa violenta, distinti secondo il sesso.

PERIODI	CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE (a)			OMICIDIO E INFANTICIDIO (b)			SUICIDIO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
1887-96 (media annuale)	6 749	3 398	10 147	1 295	199	1 494	1 365	327	1 692
1897-906    "    "	7 104	3 634	10 738	1 192	202	1 394	1 638	443	2 081
1907-16    "    "	13 328	8 981	(c) 22 309	1 021	215	1 236	2 112	752	2 864
1917-23    "    "	8 544	3 154	11 698	1 630	284	1 914	2 005	782	2 787
1924-30    "    "	9 929	3 527	(d) 13 456	1 010	276	1 286	2 870	985	3 855
1931 . . . . .	10 425	3 510	13 935	799	278	1 077	3 142	999	4 141
1932 . . . . .	10 456	3 596	14 052	779	263	1 042	3 035	1 023	4 058
1933 . . . . .	10 167	3 429	(e) 13 596	712	257	969	2 795	917	3 712
1934 . . . . .	10 587	3 482	14 069	621	228	849	2 703	983	3 686
1935 . . . . .	11 287	3 780	(f) 15 067	611	210	821	2 379	888	3 267
1936 . . . . .	10 327	3 386	(g) 13 713	625	236	861	2 520	879	3 399

(a) Compresi i decessi per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

(b) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e avvenuti in duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente (in conformità al Codice penale).

(c) La media annuale dei morti nel periodo 1907-16 tiene conto delle vittime dei terremoti avvenuti il 28 dicembre 1908 (77283) e il 13 gennaio 1915 (30476).

(d) La media annuale dei morti nel periodo 1924-30 tiene conto delle vittime dei terremoti avvenuti il 23 luglio e il 30 ottobre 1930 (1427).

(e) Comprese le vittime del terremoto avvenuto il 26 settembre 1933 (12).

(f) Comprese le vittime dovute ad alluvione (141).

(g) Comprese le vittime del terremoto avvenuto il 18 ottobre 1936 (18) e 1 decesso dovuto a nubifragio.

**§ 2. — Notizie sulle morti per causa violenta accidentale.** — *Regno.* Dal prospetto 36, in cui sono calcolati i numeri indici della mortalità per *causa violenta accidentale* fino al 1936, facendo uguale a 100 quella del quinquennio 1887-91, si rileva come, fatta astrazione delle vittime causate dai terremoti avvenuti negli anni 1908, 1915 e 1930 e di quelle causate da alluvione nel 1935, la mortalità, per tutti gli anni del periodo preso in esame, ad eccezione del 1909 e del 1918, si è mantenuta ad un livello inferiore a quello del periodo base, toccando il minimo valore negli anni 1921 e 1923. Nel 1936 si è avuta una diminuzione della mortalità a confronto di quella dell'anno precedente.

PROSPETTO 36. — Morti per causa violenta accidentale negli anni dal 1887 al 1936.

PERIODI	MORTI PER CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE (a)	PER 1000000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)	PERIODI	MORTI PER CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE (a)	PER 1000000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (media ann.)	10 581	353	100	1921	11 247	305	86
1892-96 »	9 713	313	89	1922	11 172	306	87
1897-901 »	10 310	321	91	1923	11 252	305	86
1902-06 »	11 165	338	96	1924	12 827	331	94
1907	11 442	341	97	1925	13 463	344	97
1908	(b) 89 170	2 636	747	1926	12 659	321	91
	(c) 11 887	351	99	1927	12 925	325	92
1909	12 943	380	108	1928	13 513	336	95
1910	11 006	320	91	1929	13 672	337	95
1911	11 088	320	91	1930	(b) 15 137	370	105
1912	10 979	313	89		(c) 13 710	335	95
1913	11 244	317	90	1931	13 935	338	96
1914	11 456	319	90	1932	14 052	338	96
1915	(b) 42 178	1 159	328	1933	(b) 13 596	324	92
	(c) 11 702	322	91		(c) 13 584	323	92
1916	11 581	315	89	1934	14 069	332	94
1917	12 357	348	99	1935	(b) 15 067	352	100
1918	12 921	365	103		(c) 14 926	349	99
1919	11 622	322	91	1936	(b) 13 713	319	90
1920	11 318	311	88		(c) 13 624	319	90

(a) Vedi la nota (a) a pagina precedente. (b) Compresi i morti per cataclisma. (c) Esclusi i morti per cataclisma.

PROSPETTO 37. — Mortalità per causa violenta accidentale (1) (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932 (*)	1936 (**)	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910-1912	1920-1922	1930-1932	1936	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1936	
Piemonte . . . . .	36.1	33.0	34.9	37.3	35.7	91	97	103	99	112	104	115	111	112	
Liguria . . . . .	35.1	31.6	35.6	32.8	32.6	90	102	93	93	109	99	118	97	102	
Lombardia . . . . .	32.6	34.2	32.5	38.0	35.7	105	100	117	110	101	108	107	113	112	
Venezia Trid. (a) . . . . .	—	—	—	50.0	54.6	—	—	—	—	—	—	—	148	171	
Veneto . . . . .	29.1	30.3	33.2	32.0	31.3	104	114	110	107	90	95	110	95	98	
Venezia G. e Zara (a) . . . . .	—	—	—	42.2	49.6	—	—	—	—	—	—	—	125	156	
Emilia . . . . .	29.8	31.0	31.4	34.8	32.0	104	105	117	107	92	97	104	103	101	
Toscana . . . . .	28.4	27.5	29.7	30.4	29.1	97	105	107	102	88	87	98	90	91	
Marche . . . . .	33.1	33.4	32.7	36.4	30.9	101	99	110	93	103	105	108	108	97	
Umbria . . . . .	36.9	36.9	33.5	37.6	38.8	100	91	102	105	114	116	111	111	122	
Lazio . . . . .	34.5	32.8	32.1	35.8	34.8	95	93	104	101	107	103	106	106	109	
Abruzzi e Molise . . . . .	35.7	33.7	30.2	33.6	32.4	94	84	94	91	111	106	100	100	102	
Campania . . . . .	34.6	36.1	30.2	31.6	29.3	104	87	91	85	107	114	100	94	92	
Puglie . . . . .	29.7	29.4	25.4	27.6	25.5	99	86	93	86	92	92	84	82	80	
Lucania . . . . .	46.5	42.1	36.8	40.7	32.0	91	79	88	69	144	132	121	121	101	
Calabria . . . . .	34.3	34.5	27.6	32.3	28.1	101	80	94	82	106	109	91	96	88	
Sicilia . . . . .	28.7	26.4	20.9	26.5	23.1	92	73	92	80	89	83	69	78	72	
Sardegna . . . . .	29.5	27.2	25.0	33.2	27.5	92	85	113	93	91	86	83	98	86	
REGNO { vecchi confini.	32.3	31.8	30.3			99	94	103	96	100	100	100			
{ attuali confini.				33.8	31.5								100	100	

(1) Cfr. la nota (a) a pagina precedente.

(\*) Esclusi i morti nei terremoti avvenuti il 23 luglio e il 30 ottobre 1930. (\*\*) Esclusi i morti nel terremoto avvenuto il 18 ottobre 1936 ed un morto per alluvione. (a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

*Compartimenti.* — Dall'esame del prospetto 37 si rileva che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *causa violenta accidentale*, nel 1936, ha subito una diminuzione del 4 % a confronto di quella del periodo base 1900-02.

Nei singoli Compartimenti si nota, nell'anno 1936 a confronto del triennio base 1900-02, un aumento di detta mortalità per la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, la Toscana, l'Umbria e il Lazio e una diminuzione per i restanti Compartimenti; hanno, nel 1936, superato la mortalità media del Regno, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia e Zara, l'Emilia, l'Umbria, il Lazio, gli Abruzzi e Molise e la Lucania.

*Età e sesso.* — Solo in corrispondenza degli anni intorno ai censimenti è possibile calcolare, con sufficiente esattezza, i quozienti specifici di mortalità per età e sesso, il che è stato fatto anche per la mortalità per *causa violenta accidentale* nei trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22 e 1930-32 (\*). Per il 1936, invece, è stata calcolata, per ciascun sesso, la ripartizione percentuale dei morti per la suddetta causa nelle singole classi di età (prospetto 38), dalla quale risulta che la maggiore frequenza nei maschi (215 per mille) si riscontra nel gruppo di età da 15 a 29 anni e, nelle femmine (262), nel gruppo di età da 1 a 4 anni, con comportamento analogo a quello del 1933, 1934 e 1935. I casi di morte complessivamente e per i singoli gruppi di età sono di gran lunga più frequenti nel sesso maschile, e ciò può essere messo, generalmente, in relazione al fatto che le femmine attendono ad attività che le espone a rischi molto più limitati in confronto a quelli dei maschi.

PROSPETTO 38. — Morti per causa violenta accidentale (a), nell'anno 1936, classificati secondo il sesso e l'età alla morte.

ETÀ ALLA MORTE	CIFRE ASSOLUTE			% DEL TOTALE (b)		
	M	F	M F	M	F	M F
fino a 1 anno . . . . .	116	77	193	11.3	22.9	14.2
1-4 anni . . . . .	1 097	880	1 977	107.1	261.7	145.3
5-14 " . . . . .	1 063	435	1 498	103.8	129.4	110.1
15-29 " . . . . .	2 201	291	2 492	214.9	86.6	183.2
30-39 " . . . . .	1 262	160	1 422	123.2	47.6	104.5
40-49 " . . . . .	1 146	188	1 334	111.9	55.9	98.1
50-59 " . . . . .	1 183	253	1 436	115.5	75.3	105.6
60-69 " . . . . .	1 098	339	1 437	107.2	100.8	105.6
70-100 " . . . . .	1 074	739	1 813	104.9	219.8	133.3
Ignota . . . . .	6	1	7			
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>10 246</b>	<b>3 363</b>	<b>13 609</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>

(a) Esclusi i morti per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.  
 (b) Esclusi i morti di età ignota.

*Cause.* — Fra le cause più frequenti delle *morti accidentali*, sia nei maschi sia nelle femmine, durante gli anni 1935 e 1936, si notano le lesioni da caduta, schiacciamento e frana, gli annegamenti e le ustioni, queste ultime specialmente nel sesso femminile.

(\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932* — Parte I - Introduzione - Roma, Tipografia Operaia Romana, 1935-XIII, pag. 91\*.

**PROSPETTO 39. — Morti per causa violenta accidentale,  
secondo il sesso e la specie dell'infortunio.**

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI (a)	MORTI PER CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE (b)				%00 DEL TOTALE			
	1935		1936		1935		1936	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .	4	6	8	6	0.4	1.6	0.8	1.8
Avvelenamento da alimenti guasti . . . . .	24	30	51	39	2.1	8.0	5.0	11.6
Absorbimento di gas irrespirabili o tossici . . . . .	126	59	95	36	11.2	15.7	9.3	10.7
Altri avvelenam. acuti (esclusi quelli da gas) . . . . .	93	74	79	46	8.3	19.7	7.7	13.7
Per incendio . . . . .	34	31	48	27	3.0	8.2	4.7	8.0
Per ustioni (escluse quelle per incen- dio) . . . . .	843	1017	838	914	75.0	270.1	81.8	271.8
Per soffocazione meccanica . . . . .	65	37	72	37	5.8	9.8	7.0	11.0
Per annegamento . . . . .	1 440	393	1 390	399	128.2	104.4	135.7	118.6
Per trauma da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra) . . . . .	184	27	186	30	16.4	7.2	18.2	8.9
Per trauma da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra) . . . . .	40	12	37	7	3.6	3.2	3.6	2.1
Per lesioni da caduta, schiacciamento, frana . . . . .	6 747	1 663	5 900	1 593	600.5	441.7	575.8	473.7
Per cataclisma (c) . . . . .	59	82	10	9	5.3	21.8	1.0	2.7
Per violenze di animali . . . . .	179	23	184	24	15.9	6.1	18.0	7.1
Per freddo eccessivo . . . . .	201	30	101	20	17.9	8.0	9.9	5.9
Per caldo eccessivo . . . . .	312	110	76	31	27.8	29.2	7.4	9.2
Per fulmine . . . . .	92	32	116	42	8.2	8.5	11.3	12.5
Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . . .	214	9	220	5	19.0	2.4	21.5	1.5
Per altri accidenti:								
a) corpi estranei . . . . .	15	14	15	9	1.3	3.7	1.5	2.7
b) altri . . . . .	563	116	820	89	50.1	30.8	80.0	26.5
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>11 235</b>	<b>3 765</b>	<b>10 246</b>	<b>3 363</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>

(a) Delle morti accidentali in istato d'ubbrichezza, che nelle statistiche a tutto l'anno 1923 venivano comprese in una sola voce, a partire dal 1924, si è fatta la distinzione di quelle avvenute per avvelenamento acuto da alcool, da quelle per infortunio causato dall'ubbrichezza. Le prime sono state comprese nella voce « alcoolismo acuto » (n. 180 dell'Elenco nosologico adottato dal 1924 al 1930), e nella voce « alcoolismo acuto e cronico » (n. 75 del nuovo Elenco nosologico adottato dal 1931), non facendo così più parte del gruppo delle *morti violente accidentali*; le seconde sono state classificate secondo la specie dell'infortunio, come è indicato qui appresso:

**Morti per infortunio causato dall'ubbrichezza.  
(Compresi nelle cifre rispettive del prospetto soprastante)**

SPECIE DELL'INFORTUNIO	1935		1936	
	M	F	M	F
Per soffocazione meccanica . . . . .	3	—	1	—
Annegamento . . . . .	1	—	3	—
Freddo . . . . .	8	—	3	—
Caldo . . . . .	—	—	1	—
Caduta . . . . .	10	—	21	3
Ustioni, escluse le morti per incendio . . . . .	—	—	1	—
Per altri accidenti . . . . .	1	—	2	1

(b) Esclusi i decessi per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

(c) Alluvione.

*Infortuni sul lavoro.* — A cominciare dall'anno 1926, si è fatto lo spoglio dei casi di morte per *causa violenta accidentale*, per determinare il numero delle morti che il medico denunciante ha dichiarato come dovute ad *infortunio sul lavoro*.

Tale notizia fu richiesta esplicitamente sulle schede a partire dal 1931 (a). Dallo spoglio di queste, dal 1931 al 1936, si desumono i seguenti dati. Nel 1931, le morti dichiarate come avvenute per *infortunio sul lavoro* rappresentavano, nei maschi, il 22 % dei casi di morte per *causa violenta accidentale*, nel 1932 e 1934 tale proporzione è stata del 25 %, nel 1933 del 24 %, nel 1935 del 26 % e nel 1936 del 28 %. Nelle femmine, come è ovvio, la proporzione è molto più bassa; essa, negli anni dal 1931 al 1934, rappresenta soltanto il 5 %, nel 1935 il 7 % e nel 1936 il 4 %.

Le cause più frequenti delle morti per *infortuni sul lavoro*, per i maschi, sono, in genere, le lesioni da caduta, schiacciamento e frana, gli accidenti dovuti a corrente elettrica, le violenze di animali, l'annegamento, le ustioni e l'assorbimento di gas irrespirabili o tossici.

PROSPETTO 40. — Morti per causa violenta accidentale, indicate come dipendenti da infortunio sul lavoro.

SPECIE DELL'INFORTUNIO	1934		1935		1936	
	M	F	M	F	M	F
Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .	2	1	—	—	1	—
Assorbimento di gas irrespirabili o tossici . . . . .	35	3	48	3	39	—
Altri avvelenamenti acuti (esclusi quelli da gas) . . . . .	4	—	5	—	3	—
Per incendio . . . . .	13	3	4	1	19	2
Per ustioni (escluse quelle per incendio) . . . . .	64	6	51	12	56	2
Per soffocazione meccanica . . . . .	8	—	3	—	4	—
Per annegamento . . . . .	84	16	106	8	86	5
Per trauma da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra) . . . . .	6	—	8	—	17	—
Per trauma da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra) . . . . .	17	1	22	5	17	1
Per lesioni da caduta, schiacciamento, frana . . . . .	1 844	120	2 047	122	1 795	90
Per violenze di animali . . . . .	109	5	83	6	93	6
Per freddo eccessivo . . . . .	6	—	6	1	2	—
Per caldo eccessivo . . . . .	3	—	64	26	12	1
Per fulmine . . . . .	43	12	43	6	51	12
Per accidenti dovuti alla corrente elettrica . . . . .	106	—	123	1	132	—
Per altri accidenti:						
a) corpi estranei . . . . .	1	—	—	—	2	—
b) altri . . . . .	226	12	322	54	511	15
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>2 571</b>	<b>179</b>	<b>2 935</b>	<b>245</b>	<b>2 840</b>	<b>134</b>

*Morti per cause violente accidentali avvenute in miniere o cave o causate da macchine.* — Dal 1931 le *morti violente accidentali* avvenute nelle suddette circostanze sono state classificate distintamente, e la loro frequenza assoluta e relativa a 100 morti per il complesso delle cause violente accidentali risulta dal prospetto 41.

Le *morti violente accidentali in miniere o cave o causate da macchine* sono, per ragioni ovvie, rare nel sesso femminile. Nel sesso maschile le percentuali delle *morti violente accidentali avvenute in miniere o cave* sul totale delle morti violente accidentali sono andate progressivamente aumentando dal 1931 al 1936 con un minimo del 0,7 % nel 1931 e 1932 ed un massimo dell'1,5 % nel 1936:

(a) Per gli anni dal 1926 al 1930, sebbene la notizia non fosse richiesta sulle schede di morte, in alcune era aggiunta: si ritenne per ciò opportuno di esaminare a parte tali schede, pur riconoscendo che esse rappresentavano solo una piccola parte delle morti che possono essere considerate come dipendenti da *infortuni sul lavoro*.

le percentuali delle *morti violente accidentali causate da macchine* si sono invece aggirate nel sessennio 1931-36 intorno all'1,2 %.

PROSPETTO 41. — **Morti per cause violente accidentali**

A N N I	IN MINIERE O CAVE						DETERMINATE DA MACCHINE					
	Cifre assolute			% morti da causa violenta accidentale (a)			Cifre assolute			% morti da causa violenta accidentale (a)		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
1931	70	2	72	0.7	0.1	0.5	94	10	104	0.9	0.3	0.8
1932	72	7	79	0.7	0.2	0.6	133	9	142	1.3	0.3	1.0
1933	94	—	94	0.9	—	0.7	118	13	131	1.2	0.4	1.0
1934	100	—	100	1.0	—	0.7	119	4	123	1.1	0.1	0.9
1935	140	—	140	1.3	—	0.9	146	11	157	1.3	0.3	1.1
1936	156	2	158	1.5	0.1	1.2	117	8	125	1.1	0.2	0.9

(a) Esclusi i morti per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta ed i morti per cataclisma.

*Infortunati causati da mezzi di trasporto.* — Con l'anno 1911 si incominciarono le ricerche sul numero dei morti per infortunati dovuti ad automobili e biciclette, e, negli anni successivi, tali ricerche furono estese a tutti i mezzi meccanici di trasporto.

La mortalità per *infortunati derivati da mezzi meccanici di trasporto*, che è andata diminuendo dal 1919 al 1923 (da 31,11 morti per ogni milione di abitanti nel 1919 a 17,33 nel 1923), tende a risalire notevolmente dal 1924 in poi e segna il massimo nel 1934 (88,69). Nel 1935 la mortalità è stata dell'85,18 per ogni milione di abitanti e nel 1936, con una notevole diminuzione, del 61,71.

PROSPETTO 42. — **Morti per infortunio causato da mezzi meccanici di trasporto (\*)**

MEZZI DI TRASPORTO	1919		1929		1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Automobile	249	57	762	204	962	252	1091	233	1164	287	1342	300	1525	348	1432	302	914	212
Bicicletta	16	5	137	19	181	29	219	35	258	38	256	46	287	39	282	67	286	48
Motocicletta	16	3	176	13	236	39	220	40	282	42	360	44	465	53	439	56	284	40
Ferrovie	385	33	351	55	378	91	328	75	351	59	322	79	291	68	289	60	261	59
Tramvia	144	27	142	53	154	37	134	29	133	31	140	30	115	34	148	39	115	46
Autocarro	115	20	182	26	193	37	193	31	276	39	301	61	394	54	429	64	206	31
Ascensore	1	1	3	1	7	—	2	—	3	—	3	—	5	1	5	—	7	1
Velivolo	50	—	59	1	74	3	76	1	92	3	33	—	67	—	44	—	133	2
di cui per precipitazioni	48	—	57	—	72	1	71	—	79	1	31	—	61	—	42	—	93	1
Teleferica	—	—	8	—	10	1	5	—	4	1	4	1	14	—	7	—	5	—
Funicolare	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—
Motoscafo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
Sommergibile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
<b>In complesso</b>	<b>976</b>	<b>146</b>	<b>1820</b>	<b>372</b>	<b>2196</b>	<b>490</b>	<b>2269</b>	<b>444</b>	<b>2563</b>	<b>500</b>	<b>2821</b>	<b>561</b>	<b>3165</b>	<b>597</b>	<b>3059</b>	<b>588</b>	<b>2214</b>	<b>439</b>
	<b>1122</b>		<b>2192</b>		<b>2686</b>		<b>2713</b>		<b>3063</b>		<b>3382</b>		<b>3762</b>		<b>3647</b>		<b>2653</b>	
Numeri indici (1919 = 100)	100		195		239		242		273		301		335		325		236	
Cifre proporzionali ad un milione di abitanti	31.11		54.06		65.69		65.89		73.59		80.50		88.69		85.18		61.71	
Numeri indici (proporzioni dei morti ad un milione di abit. nel 1919 = 100)	100		174		211		212		237		259		285		274		165	

Negli anni dal 1929 al 1935 si nota un forte aumento nelle morti causate dall'uso delle automobili, biciclette, motociclette e autocarri, in confronto agli anni

(\*) Per i dati riguardanti gli anni dal 1920 al 1928 vedi: *Statistica delle Cause di morte nell'anno 1933* — Parte I — Introduzione — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1936-XIV, pag. 65\*.

precedenti. Nel 1936 si nota una notevole diminuzione del numero di morti causato dall'uso delle automobili, motociclette ed autocarri (1687 morti contro 2702 registrati nel 1935), probabilmente dovuta al minor impiego di questi mezzi di locomozione, causato dalle sanzioni.

*Sostanze che determinarono gli avvelenamenti.* — Per le morti dovute ad *avvelenamento acuto accidentale*, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze che produssero la morte. Nel prospetto 43 sono riportati i casi avvenuti negli anni 1934, 1935 e 1936.

PROSPETTO 43 — Morti per avvelenamento acuto accidentale (\*), classificati per sesso e secondo la sostanza.

SOSTANZE (a)	1934		1935		1936		SOSTANZE (a)	1934		1935		1936	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Acido acetico . . . . .	—	2	1	—	—	1	Luminal . . . . .	1	—	—	—	—	—
Acido cianidrico:							Mercurio:						
<i>acido cianidrico o cianuri (senza altra indicazione).</i>	1	—	1	—	2	1	<i>sublimato corrosivo, altri sali e preparati non specificati.</i>	3	4	2	6	2	5
<i>ingestione di mandorle amare o semi di pesche . . . . .</i>	1	—	—	—	2	1	Morfina . . . . .	—	1	—	1	1	3
Acido cloridrico . . . . .	3	2	3	1	2	2	Nicotina . . . . .	—	—	1	—	2	—
Acido fenico . . . . .	—	1	2	—	—	—	Opio . . . . .	—	—	—	1	1	—
Acido formico . . . . .	—	1	—	—	—	—	Ossido di carbonio:						
Acido nitrico . . . . .	2	—	1	—	—	—	<i>ossido di carbonio (senza altra indicazione)</i>	34	15	42	22	12	7
Acido solfidrico:							<i>bracieri di carbone, caloriferi o da combustione di legna . . . . .</i>	2	1	3	—	8	4
<i>acido solfidrico (senza altra indicazione)</i>	4	—	1	—	—	—	<i>gas illuminante . . . . .</i>	12	22	14	16	27	14
<i>in pozzi o fogne . . . . .</i>	11	4	5	1	1	1	<i>in miniere o cave . . . . .</i>	—	—	13	—	2	—
<i>in miniere o cave . . . . .</i>	—	—	4	—	3	—	<i>alti forni . . . . .</i>	—	—	—	—	2	—
Acido solforico . . . . .	13	8	6	7	12	5	<i>incendio . . . . .</i>	—	—	—	—	3	3
Adalina . . . . .	—	—	—	—	—	1	Permanganato potassico . . . . .	2	—	—	—	—	1
Alcool . . . . .	1	1	1	—	—	—	Petrolio . . . . .	—	1	2	—	1	—
Ammoniaca . . . . .	—	—	—	1	1	—	Piombo e suoi derivati . . . . .	1	—	—	—	—	—
Anafilassi . . . . .	—	—	1	2	—	—	Rame:						
Anafilassi da siero . . . . .	3	—	2	1	—	—	<i>solfato . . . . .</i>	2	3	2	3	4	2
Anidride carbonica (fermentazione di mosto).	1	—	16	4	14	2	<i>altri preparati e sali non specificati . . . . .</i>	4	3	—	—	2	1
Anidride solforosa . . . . .	1	—	—	—	2	—	Ricino (semi e ricinina) . . . . .	—	—	—	2	—	—
Anilina . . . . .	—	—	3	—	1	—	Soda e potassa . . . . .	5	8	5	5	6	1
Antimonio . . . . .	1	—	—	—	—	—	Solfuro di carbonio . . . . .	1	—	—	—	—	—
Apiolo . . . . .	—	—	—	1	—	—	Solfuro di potassio . . . . .	—	—	—	—	—	1
Arsenico e suoi preparati.	4	2	6	2	4	1	Sostanze alimentari:						
Aspirina . . . . .	—	—	—	—	—	1	<i>funghi velenosi . . . . .</i>	26	24	20	25	42	27
Belladonna e Atropina . . . . .	—	1	2	—	1	—	<i>carne insaccata o guastata . . . . .</i>	5	1	2	3	6	6
Benzina . . . . .	1	—	1	—	4	—	<i>altre sostanze alimentari alterate . . . . .</i>	7	3	2	2	3	6
Calciclanamide . . . . .	—	—	1	—	1	—	Sostanze ipnotiche non specificate . . . . .	—	1	—	1	—	—
Chinina (sali di) . . . . .	20	16	26	31	16	13	Stramonio . . . . .	2	—	—	1	—	1
Cicuta . . . . .	—	1	—	1	2	—	Stricnina . . . . .	—	2	—	—	1	1
Clorato di potassio . . . . .	2	—	—	—	1	—	Strofantio . . . . .	—	—	—	1	—	—
Cloro . . . . .	—	—	3	—	—	—	Tetracloruro di carbonio.	—	—	—	—	1	—
Cloruro di bario . . . . .	—	—	1	—	—	—	Varecchina . . . . .	—	—	—	—	1	—
Creolina . . . . .	1	—	2	—	—	—	Verberna . . . . .	—	—	—	—	—	1
Eroina . . . . .	—	1	—	—	—	—	Veronal . . . . .	1	1	4	—	—	—
Fenilcloroarsina . . . . .	—	—	1	—	—	—	Veleni non specificati:						
Formalina . . . . .	—	1	—	—	1	—	<i>preparati e sostanze varie non ben precisati . . . . .</i>	2	6	15	1	2	3
Fosforo . . . . .	—	1	—	—	—	—	<i>sostanze non indicate.</i>	2	5	3	3	5	1
Fosforo di zinco . . . . .	—	1	—	1	3	—	Morsi o punture di animali velenosi:						
Fosgene . . . . .	1	—	—	—	—	—	<i>api . . . . .</i>	—	—	—	1	—	—
Gardenal . . . . .	1	—	—	—	—	—	<i>vespe o insetti velenosi non specificati . . . . .</i>	1	—	2	1	4	1
Gas irrespirabili o tossici (non specificati):							<i>vipera o serpenti velenosi non specificati . . . . .</i>	6	3	1	4	4	5
<i>gas irrespirabili o tossici (non specificati).</i>	14	2	20	16	6	2	<i>non specificati . . . . .</i>	1	—	1	—	—	—
<i>di miniera . . . . .</i>	6	—	1	—	2	—	<b>In complesso . . . . .</b>	<b>213</b>	<b>150</b>	<b>247</b>	<b>169</b>	<b>233</b>	<b>127</b>
<i>pozzi neri, letamai e cisterne . . . . .</i>	—	—	—	—	8	2							
<i>da scoppio di granata asfissiante . . . . .</i>	1	—	1	—	—	—							
Iprite e gas vescicatori . . . . .	—	—	—	—	4	—							
<i>laudano . . . . .</i>	—	—	1	1	1	—							

(\*) Compresa le morti da gas irrespirabili.

(a) Sono state indicate tutte le sostanze che erano specificate nelle schede di morte.



Poichè è di comune constatazione che alcuni avvelenamenti accidentali, quali, ad esempio, quelli per ossido di carbonio, per acido solfidrico, ecc., possono verificarsi in circostanze diverse, si è tenuto conto, a cominciare dall'anno 1928, negli spogli delle schede di morte, delle notizie che a tale riguardo figuravano nelle schede stesse. E per quanto tali circostanze siano state annotate solo raramente, tuttavia risulta che, nel complesso del triennio 1934-36, nel quale si verificarono 9 casi di avvelenamento per acido cianidrico, per 4 di essi venne indicato, sulle schede, che la morte fu dovuta a ingestione di mandorle amare o semi di pesche; sopra 34 avvelenamenti per acido solfidrico, durante il suddetto triennio, 22 avvennero in fogne o pozzi, 7 in miniere o cave e per 5 non venne data alcuna notizia; sopra 278 avvelenamenti per ossido di carbonio, le circostanze diverse in cui essi si verificarono vennero specificate soltanto per 146 casi, e cioè: 18 per gas esalato da braci di carbone, da caloriferi o da combustione di legna; 105 per fughe di gas illuminante, 15 in miniere o cave, 2 in alti forni e 6 per incendio; su 210 avvelenamenti per sostanze alimentari, soltanto 23 furono dovuti a botulismo o a carne guasta, 164 a ingestioni di funghi velenosi e 23 ad altre sostanze alimentari alterate.

È da notare la frequenza, in tutti e tre gli anni, delle morti per inalazione di ossido di carbonio, di gas irrespirabili o tossici non specificati, per avvelenamento da alimenti guasti e da funghi, da sostanze medicinali, quali i sali di chinina, i sali o preparati di mercurio e di rame e quella per sostanze largamente adoperate per uso domestico, come l'acido cloridrico, la soda e la potassa. Le sostanze e i preparati medicinali ad azione ipnotica (morfina, oppio, ecc.) non danno, invece, un numero elevato di morti *accidentali per avvelenamento*.

*Professioni.* — Per calcolare correttamente i quozienti di mortalità per *causa violenta accidentale* in ciascuna categoria professionale, si dovrebbe mettere in rapporto il numero dei morti per detta causa, distinti secondo la professione, al numero totale dei viventi della stessa categoria professionale, ma, dati i criteri diversi coi quali sono classificati secondo le singole professioni tanto i viventi censiti quanto i morti in ciascun anno, non è possibile istituire tale rapporto.

In mancanza di tali quozienti, e con ogni riserva nei riguardi del diverso grado di esposizione al rischio degli appartenenti alle varie categorie professionali, si può avere un'idea delle pericolosità di una data professione, in maniera molto meno corretta, cercando di conoscere quanti morti per *causa violenta accidentale* vi siano in una data categoria professionale su 1000 morti per ogni causa, della stessa categoria professionale.

Nel prospetto seguente sono riportate le dette proporzioni per i maschi, in età da 15 anni in poi, morti nel Regno per *causa violenta accidentale*, dalle quali appare che gli infortuni mortali sono stati, nel 1936, molto frequenti nei sottufficiali e soldati di terra, di mare e d'aria, compresa la Regia Guardia di Finanza e le varie Milizie; negli Ufficiali delle forze armate di terra, di mare e d'aria; nei minatori e cavaatori; negli addetti alle industrie chimiche e manifatture dei tabacchi; nei ferrovieri, tramvieri, conduttori di automobili, addetti ai trasporti aerei; nei cocchieri e carrettieri; nei metallurgici, meccanici, elettricisti, ecc.; negli studenti; negli operai non specificati; nei muratori, imbianchini, manovali, braccianti, ecc. Un andamento quasi analogo si è verificato anche negli anni precedenti.

A complemento delle notizie già date, circa la mortalità per *causa violenta accidentale*, aggiungiamo che essa, negli anni dal 1931 al 1936, è stata, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, superiore a quella degli altri Comuni.

PROSPETTO 44. — Maschi, in età da 15 anni in poi, morti per causa violenta accidentale, classificati per professione o condizione.

CLASSE (a)	CATEGORIA (a)	SOTTOCATEGORIA (a)	PROFESSIONE O CONDIZIONE	MORTI PER CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE (b)		CIFRE PROPORZIONALI A 1000 MASCHI MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI DELLA STESSA PROFESSIONE (c)	
				1935	1936	1935	1936
1	1	1 c 2	Agricoltori di ogni specie . . . . .	3 361	3 050	34.8	32.7
2	1	1 c 2	Industriali, commercianti . . . . .	194	165	32.2	28.1
3	1	0	Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate . . . . .	122	75	36.0	23.7
3	2	0	Esercenti . . . . .	26	24	24.9	22.3
3	3	0	Commissionari, rappresentanti . . . . .	73	51	40.1	28.1
4	1	0	Minatori, cavaatori, ecc. . . . .	147	167	140.7	150.7
4	2	0	Falegnami, verniciatori, ecc. . . . .	245	221	44.7	40.5
4	3	1-2-3-4	Addetti alla macellazione e conservazione delle carni, ai forni, ai pastifici, alla lavorazione del latte e alle industrie alimentari . . . . .	113	121	44.7	47.3
4	4	1 c 2	Conciatori, pellai, calzolari, guantari, ecc. . . . .	120	96	26.5	21.2
4	5	1 c 2	Metallurgici, meccanici, elettricisti, ecc. . . . .	550	503	88.2	79.1
4	6	0	Argentieri, orefici, ecc. . . . .	16	5	37.1	13.5
4	7	1 c 2	Asfaltisti, fornai, ceramisti, vetrai, ecc. . . . .	36	20	47.3	28.1
4	8	1 c 2	Muratori, imbianchini, manovali, braccianti, ecc. . . . .	1 110	961	76.2	69.1
4	9	1 e 2	Addetti all'industria tessile e a manifatture tessili . . . . .	33	31	30.1	31.0
4	10	1 c 2	Addetti all'industria del vestiario e all'arredamento . . . . .	40	44	20.4	22.2
4	11	1 c 2	Addetti alle industrie chimiche e manifattura tabacchi . . . . .	29	17	188.3	121.4
4	12	1 e 2	Addetti alle industrie poligrafiche e della carta . . . . .	30	29	46.9	48.8
4	13	0	Operai non specificati . . . . .	410	398	83.0	76.3
5	1	0	Cocchieri, carrettieri, ecc. . . . .	214	224	76.9	86.3
5	2	0	Ferrovieri, tramvieri, conduttori di automobili, addetti ai trasporti aerei . . . . .	281	206	138.8	107.3
5	3	0	Marinai, barcaioi, pescatori, ecc. . . . .	90	77	53.6	46.7
6	1	1 c 2	Addetti alla cura e alla acconciatura della persona . . . . .	39	30	30.8	24.3
6	2 e 3	0	Addetti ai servizi domestici, garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici . . . . .	133	109	48.7	39.0
6	4	1	Facchini, spazzini, cantonieri . . . . .	117	100	57.7	47.9
6	4	2	Venditori ambulanti, saltimbanchi, venturieri . . . . .	82	66	48.7	41.5
7	1	0	Personale subalterno dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . .	39	43	47.6	50.6
8	1 c 2	0	Esercito, marina, aeronautica, guardie di finanza e milizia (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	220	192	197.3	189.3
8	3	0	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	16	18	40.7	45.9
9	1	1 c 2	Culto cattolico e altri culti . . . . .	30	28	18.2	18.1
9	2	1	Insegnanti . . . . .	17	20	29.5	34.3
9	2 c 4	2	Professioni liberali e arti belle . . . . .	75	69	20.1	28.0
9	3	0	Arti sanitarie . . . . .	23	20	22.3	21.9
10	1-2-3	1 e 2	Ufficiali delle forze armate di terra, di mare e d'aria . . . . .	31	60	117.9	182.9
10	4	0	Impiegati pubblici e privati . . . . .	182	156	33.3	28.3
10	5	0	Pensionati . . . . .	147	161	11.7	11.0
11	1	0	Proprietari e benestanti . . . . .	118	113	14.1	12.5
12	1	0	Studenti . . . . .	97	86	86.3	78.0
12 c 0	3 c 4	1 a 5	Disoccupati, invalidi, ricoverati, mendicanti, professione ignota . . . . .	163	199	20.4	15.4
			<b>In complesso . . . . .</b>	<b>8 769</b>	<b>7 964</b>	<b>41.5</b>	<b>37.1</b>

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Nomenclatura professionale* - II Edizione - Roma, Tipografia I. Falli, 1935-XIII.  
 (b) Esclusi i decessi per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (c) Escluse le morti per cause non determinate (classe XVIII) del nuovo Elenco nosologico adottato dal 1931.

### § 3. — Morti causate da avvelenamenti cronici e intossicazione. —

Giova ricordare che tra le morti per malattie ordinarie sono comprese, a partire dall'anno 1924, anche quelle causate da *avvelenamento cronico* da *sostanze minerali* e da *sostanze organiche* (escluso l'*alcoolismo cronico*).

Per l'importanza che può avere una conoscenza più profonda della frequenza degli *avvelenamenti cronici* e delle caratteristiche che li accompagnano, si è ritenuto opportuno approfondirne l'esame, ed, a cominciare dall'anno 1926, essi sono stati classificati anche secondo l'età, la professione o condizione dei morti e la natura della sostanza tossica.

Dal prospetto seguente risulta la frequenza degli *avvelenamenti cronici*, per il sessennio 1926-31 e per gli anni dal 1932 al 1936.

PROSPETTO 45. — **Morti per avvelenamento cronico e intossicazione.**

NUMERI DELL'VELENO TOSOLOGICO	AVVELENAMENTO CRONICO	1926-31 (Media annua)		1932		1933		1934		1935		1936	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
		76	da sostanze organiche ( <i>escluso l'alcoolismo cronico</i> ) . . . . .	8	7	21	3	3	5	3	5	11	3
77	da sostanze minerali	33	1	30	—	29	2	20	1	45	2	20	2

Gli *avvelenamenti cronici* da *sostanze minerali*, che furono in numero di 34, come media annua nel periodo 1926-31, sono discesi a 21 nel 1934 e saliti notevolmente nel 1935 (47 casi). Nel 1936 i casi registrati sono stati 22.

In quanto all'età la maggiore frequenza assoluta dei morti per *avvelenamento cronico da sostanze minerali* appare negli anni dal 1934 al 1936, al disopra dei 39 anni, il che è facilmente spiegabile con la natura delle lesioni determinate dagli avvelenamenti per piombo, che sono compatibili con la vita, quando esse si siano limitate ad organi non vitali e cessi l'esposizione all'avvelenamento (prospetto 46).

Il piombo risulta come causa prevalente degli *avvelenamenti cronici* mortali e questi sono quasi in totalità imputabili a cause professionali.

PROSPETTO 46. — **Morti per avvelenamento cronico da sostanze minerali, secondo l'età alla morte, la natura del veleno ed il sesso (\*).**

ETÀ ALLA MORTE (a)	1934				1935				1936																				
	Piombo		Sostanze non specific.		Piombo		Anidride solforosa		Piombo		Anidride solforosa		Arseno Benzolo																
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F															
Da 25 a 29 anni	<b>Totale</b> . . . . .														1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	di cui indicati come professionali . .														1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 30 a 39 »	<b>Totale</b> . . . . .														2	—	1	—	1	2	1	—	2	—	—	—	—	1	—
	di cui indicati come professionali . .														2	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
» 40 a 49 »	<b>Totale</b> . . . . .														5	1	1	—	10	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . .														3	—	1	—	9	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—
» 50 a 59 »	<b>Totale</b> . . . . .														5	—	—	—	12	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . .														5	—	—	—	12	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—
» 60 a 69 »	<b>Totale</b> . . . . .														4	—	—	—	12	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . .														4	—	—	—	11	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
» 70-00	<b>Totale</b> . . . . .														1	—	—	—	6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	di cui indicati come professionali . .														1	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
<b>In complesso</b>	<b>Totale</b> . . . . .														18	1	2	—	44	2	1	—	19	1	1	—	—	—	1
	di cui indicati come professionali . .														16	—	2	—	41	—	1	—	18	1	1	—	—	—	—

(\*) Sono state indicate tutte le sostanze che erano specificate nelle schede di morte.  
(a) Nei gruppi di età da 15 a 19 anni e da 20 a 24, non si verificò alcun caso di morte.

Il numero dei morti per *avvelenamento cronico da sostanze organiche* che fu, in media, di 15 nel sessennio 1926-31 è sensibilmente aumentato nel 1932 e diminuito notevolmente nel 1933 e 1934; è risalito nel 1935 e 1936 (14 casi) rispetto agli ultimi due anni.

Gli *avvelenamenti cronici da sostanze organiche* si riscontrano, generalmente, dopo il 15° o il 20° anno di età e diventano più frequenti dopo il 30° anno, presumibilmente in rapporto alla lentezza con cui queste sostanze determinano nell'organismo umano alterazioni tali da condurre a morte e alla maggior frequenza con la quale nelle età avanzate si verificano malattie a lungo decorso, che inducono gli ammalati all'uso dell'oppio e dei suoi derivati. Rari sono gli avvelenamenti da sostanze organiche provocati da cause professionali e nel triennio 1934-36 ne sono registrati tre casi, dovuti a benzolo, in una femmina nel gruppo di età da 20 a 24 anni, ed in due maschi nei gruppi di età da 15 a 19 e da 40 a 44 anni. L'avvelenamento più frequente è dovuto alla morfina (prospetto 47).

PROSPETTO 47. — Morti per avvelenamento cronico da sostanze organiche, secondo la natura del veleno ed il sesso.

ANNI	SOSTANZE												IN COMPLESSO	
	Morfina		Eroina		Nicotina		Benzolo		Oppio		Sostanze ipnotiche barbituriche		M	F
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1934 . . . . .	2	3	I	—	—	—	—	(a) I	—	—	—	I	3	5
1935 . . . . .	II	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II	3
1936 . . . . .	3	4	I	—	3	—	(a) 2	—	—	I	—	—	9	5

(a) Per causa professionale.

Gli *avvelenamenti cronici da sostanze minerali* (prospetto 48) sono rari nel sesso femminile: prevale il saturnismo che è l'avvelenamento professionale classico degli operai e specie di alcune categorie (verniciatori, tipografi, vasai, ecc.).

PROSPETTO 48. — Morti per avvelenamento cronico da sostanze minerali, secondo il sesso e la professione o condizione.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	1934		1935		1936		PROFESSIONE O CONDIZIONE	1934		1935		1936	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Contadini . . . . .	2	—	I	I	2	—	Gassisti . . . . .	—	—	—	—	2	—
Commercianti . . . . .	—	—	I	—	I	—	Fornaciaci . . . . .	—	—	—	—	I	—
Salumieri . . . . .	—	—	I	—	—	—	Operai non specificati	I	—	I	—	2	—
Minatori . . . . .	I	—	I	—	—	—	Ferrovieri . . . . .	—	—	—	—	I	—
Braccianti . . . . .	—	—	I	—	—	—	Magazzinieri e mediatori	—	—	—	—	I	—
Fonditori . . . . .	I	—	—	—	—	—	Portieri . . . . .	I	—	—	—	—	—
Verniciatori . . . . .	2	—	IO	—	—	—	Preti . . . . .	—	—	(b) I	—	—	—
Operai chimici . . . . .	—	—	I	—	—	—	Pittori . . . . .	3	—	2	—	I	—
Vasai, ceramisti e stovigliai . . . . .	4	—	5	—	3	—	Proprietari . . . . .	I	—	—	—	—	—
Tipografi . . . . .	2	—	IO	—	2	—	Pensionati . . . . .	—	—	2	—	—	—
Pittori di stanze e decoratori . . . . .	2	—	5	—	3	—	Inabili e ricoverati . . . . .	—	—	I	—	—	—
Meccanici . . . . .	—	—	2	—	—	—	Casalinghe . . . . .	—	I	—	I	—	2
Calzolari . . . . .	—	—	—	—	I	—	<b>In complesso . . . . .</b>	<b>20</b>	<b>I</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>

(b) Era anche tipografo.

Lo scarso numero di casi per *avvelenamento cronico da sostanze organiche* non può dar luogo a nessuna considerazione.

PROSPETTO 49. — Morti per avvelenamento cronico da sostanze organiche, secondo il sesso e la professione o condizione.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	1934		1935		1936		PROFESSIONE O CONDIZIONE	1934		1935		1936	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Contadini . . . . .	—	—	I	—	4	—	Architetti . . . . .	—	—	I	—	—	—
Industriali e commer- cianti . . . . .	I	—	—	—	I	—	Medici . . . . .	—	—	I	—	—	—
Negozianti . . . . .	—	—	2	—	—	—	Pubblicisti . . . . .	—	—	—	—	I	—
Fornai . . . . .	—	—	I	—	—	—	Monache . . . . .	—	—	—	I	—	—
Braccianti . . . . .	—	—	I	—	—	—	Ufficiali . . . . .	I	—	—	—	—	—
Calzolai . . . . .	—	—	—	—	I	—	Impiegati . . . . .	—	—	—	—	I	I
Meccanici . . . . .	I	—	—	—	—	—	Proprietari e benestan- ti . . . . .	—	—	I	—	—	I
Operai calzature . . . . .	—	I	—	—	—	—	Pensionati . . . . .	—	—	I	I	—	—
Operai non specificati	—	—	I	—	—	—	Attendenti a casa . . . . .	—	4	—	I	—	3
Carrettieri . . . . .	—	—	I	—	—	—	<b>In complesso . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
Magazzinieri . . . . .	—	—	—	—	I	—							

§ 4. — **Omicidi e infanticidi.** — Dal prospetto 50 si rileva che la mortalità per *omicidio ed infanticidio* (I), per tutti gli anni del periodo preso in esame, ad eccezione del quadriennio 1920-23, si è mantenuta uguale o al disotto del numero indice base, toccando i minimi nel 1916, nel 1918 e dal 1927 al 1936, nei quali anni il numero indice ha oscillato fra 59 e 39. Nel quadriennio 1920-23, il numero indice salì: a 149 nel 1920, a 153 nel 1921, a 137 nel 1922 e a 102 nel 1923, diminuendo sensibilmente negli anni successivi. Il 1935 segna il minimo numero indice della serie considerata (39).

PROSPETTO 50. — Morti per omicidio e infanticidio dal 1887 al 1936.

A N N I	OMICIDI E INFANTICIDI	PER I 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)	A N N I	OMICIDI E INFANTICIDI	PER I 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (*) . . . . .	I 473	49	100	1920 . . . . .	2 661	73	149
1892-96 (*) . . . . .	I 515	49	100	1921 . . . . .	2 750	75	153
1897-901 (*) . . . . .	I 446	45	92	1922 . . . . .	2 459	67	137
1902-06 (*) . . . . .	I 342	41	84	1923 . . . . .	I 851	50	102
1907 . . . . .	I 283	38	78	1924 . . . . .	I 786	46	94
1908 . . . . .	I 528	45	92	1925 . . . . .	I 767	45	92
1909 . . . . .	I 375	40	82	1926 . . . . .	I 252	32	65
1910 . . . . .	I 158	34	69	1927 . . . . .	I 141	29	59
1911 . . . . .	I 090	31	63	1928 . . . . .	989	25	51
1912 . . . . .	I 113	32	65	1929 . . . . .	967	24	49
1913 . . . . .	I 215	34	69	1930 . . . . .	I 099	27	55
1914 . . . . .	I 360	38	78	1931 . . . . .	I 077	26	53
1915 . . . . .	I 290	35	71	1932 . . . . .	I 042	25	51
1916 . . . . .	947	26	53	1933 . . . . .	969	23	47
1917 . . . . .	I 060	30	61	1934 . . . . .	849	20	41
1918 . . . . .	983	28	57	1935 . . . . .	821	19	39
1919 . . . . .	I 633	45	92	1936 . . . . .	861	20	41

(1) Cfr. la nota (\*) a pag. 61\*.

(\*) Media annuale.

PROSPETTO 51. — **Mortalità per omicidio e infanticidio** (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte . . . . .	2.7	1.8	4.2	1.8	1.4	65	153	68	52	68	55	59	71	71	
Liguria . . . . .	2.2	2.6	5.1	1.6	1.0	118	233	74	46	55	80	73	62	51	
Lombardia. . . . .	1.4	1.3	4.2	1.4	1.0	91	296	102	71	36	40	60	56	50	
Venezia Trid. (a) . .	—	—	—	1.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	46	82	
Veneto . . . . .	1.1	1.0	3.3	1.2	1.2	95	299	110	106	28	32	47	46	58	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	3.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	116	153	
Emilia . . . . .	1.9	1.6	6.6	1.7	1.0	84	352	90	51	47	49	93	64	48	
Toscana . . . . .	2.4	1.7	5.7	1.5	0.9	72	242	64	37	59	52	80	57	44	
Marche . . . . .	3.2	1.5	4.6	1.7	1.5	45	143	52	46	81	45	66	65	74	
Umbria . . . . .	2.8	2.5	4.8	2.1	1.8	88	169	73	63	71	78	68	79	89	
Lazio . . . . .	6.5	4.9	8.1	2.8	1.6	76	125	42	24	162	153	115	105	79	
Abruzzi e Molise . .	5.5	3.5	4.9	3.8	2.6	64	88	70	48	138	109	69	148	131	
Campania . . . . .	7.0	5.1	7.3	4.3	3.4	73	104	61	48	175	158	103	163	167	
Puglie. . . . .	5.3	3.5	6.4	2.7	2.4	67	121	51	46	132	110	90	103	121	
Lucania . . . . .	5.6	5.3	7.5	6.1	5.0	95	132	108	88	141	165	106	234	248	
Calabrie. . . . .	8.0	6.7	10.6	7.3	5.8	84	133	92	72	200	207	150	281	287	
Sicilia. . . . .	7.8	7.9	19.6	3.7	2.8	102	251	47	36	195	245	277	140	140	
Sardegna . . . . .	4.8	4.7	4.4	5.1	4.2	97	92	105	86	121	145	63	195	208	
REGNO { vecchi confini.	4.0	3.2	7.1			81	177	66	50	100	100	100			
REGNO { attuali confini.				2.6	2.0								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

Nel prospetto 51, in analogia a quanto è stato fatto per le altre principali cause di morte, è data la mortalità per *omicidio* e *infanticidio* in ciascun Compartimento e nel Regno, durante i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22, 1930-32 e nell'anno 1936.

Nel 1936, nel Regno, nei vecchi confini, la mortalità è diminuita del 50 % ed anche nei singoli Compartimenti, eccettuato il Veneto in cui si è avuto un aumento del 6 %, essa è diminuita, con un minimo del 12 % nella Lucania ed un massimo del 76 % nel Lazio, a confronto del periodo base 1900-02. In detto anno hanno superato la mortalità media del Regno, in ordine decrescente, i seguenti Compartimenti: Calabrie, Lucania, Sardegna, Campania, Venezia Giulia e Zara, Sicilia, Abruzzi e Molise e Puglie, cioè tutti i Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare ed un Compartimento dell'Italia Settentrionale.

Nel prospetto seguente diamo, per gli anni 1934, 1935 e 1936, il numero dei morti per *omicidio* e *infanticidio*, classificati secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione, escludendo i morti in conflitto con la forza pubblica.

PROSPETTO 52. — Morti per omicidio e infanticidio,  
secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione (\*).

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	1934			1935			1936		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
Arma da fuoco . . . . .	300	80	380	283	73	356	291	84	375
Arma da punta e da taglio . .	185	70	255	193	80	273	179	71	250
Arma o corpo contundente . .	86	23	109	92	21	113	93	32	125
Ustioni . . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	—
Assideramento . . . . .	2	—	2	—	1	1	—	1	1
Strappamento o mancata lega- tura del cordone ombelicale .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbandono sulla pubbl. strada	—	1	1	1	1	2	1	—	1
Annegamento . . . . .	2	6	8	7	7	14	8	5	13
Precipitazione o caduta . . .	10	3	13	8	—	8	9	—	9
Schiacciamento . . . . .	1	1	2	—	1	1	—	—	—
Avvelenamento . . . . .	(a) 4	—	4	(b) 1	(c) 1	2	(d) 2	—	2
Strangolamento . . . . .	18	32	50	14	20	34	26	33	59
Impiccamento . . . . .	1	3	4	1	—	1	1	2	3
Soffocamento (senza specifica- zione). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Violenza carnale. . . . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—
Mancanza di cure e di nutrizione	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altri mezzi o modi . . . . .	3	1	4	2	4	6	2	6	8
Non indicati . . . . .	4	7	11	6	—	6	11	2	13
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>(e) 617</b>	<b>228 (e)</b>	<b>845 (f)</b>	<b>609</b>	<b>210 (f)</b>	<b>819 (g)</b>	<b>623</b>	<b>236 (g)</b>	<b>859</b>

(\*) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava dagli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta palesemente di un delitto, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano o no dolosi. Soltanto l'Autorità giudiziaria, spesso dopo lunghe e accurate ricerche, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Si spiega pertanto come i risultati delle due statistiche differiscano specialmente nel numero degli infanticidi e degli omicidi per avvelenamento, per i quali occorrono indagini che occupano molto tempo per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

(a) Di cui, uno avvelenato con veronal, uno con acido fenico, uno con stricnina ed uno con sublimato. (b) Avvelenato con caustico non specificato. (c) Avvelenato con acido acetico. (d) Di cui, uno avvelenato con sublimato corrosivo ed uno con sostanza non indicata.

(e), (f), (g) Esclusi, rispettivamente, 4, 2 e 2 omicidi avvenuti in conflitto con la forza pubblica.

Nell'anno 1936, fra gli 859 (h) individui uccisi, 623 erano maschi e 236 femmine, e cioè, per ogni 100 omicidi si contarono 73 maschi e 27 femmine; nel 1935 la proporzione per sesso è risultata di 74 maschi e 26 femmine.

Le armi da fuoco, da punta o da taglio e quelle contundenti sono i mezzi più frequenti coi quali, sia nei maschi sia nelle femmine, fu procurata la morte dei colpiti, durante il suddetto triennio.

(h) Esclusi 2 omicidi avvenuti in conflitto con la forza pubblica.

Gli *infanticidi* sono stati classificati, separatamente dagli *omicidi*, secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione, per gli anni dal 1934 al 1936, come è indicato nel prospetto seguente.

PROSPETTO 53. — Morti per infanticidio (a),  
secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione.

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	1934			1935			1936		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
Arma da fuoco . . . . .	—	—	—	—	I	I	I	—	I
Arma da punta o da taglio . . . . .	I	—	I	2	—	2	I	I	2
Arma o corpo contundente . . . . .	—	—	—	I	—	I	—	—	—
Assideramento . . . . .	2	—	2	—	I	I	—	I	I
Strappamento o mancata legatura del cordone ombelicale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbandono sulla pubbl. strada . . . . .	—	I	I	I	I	2	I	—	I
Annegamento . . . . .	I	2	3	3	2	5	I	2	3
Precipitazione o caduta . . . . .	—	I	I	I	—	I	—	—	—
Schiacciamento . . . . .	I	I	2	—	—	—	—	—	—
Avvelenamento . . . . .	—	—	—	—	(b) I	I	—	—	—
Strangolamento ed impiccamento . . . . .	9	7	16	3	3	6	10	10	20
Soffocamento (senza specificazione) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mancanza di cure e di nutrizione . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Altri mezzi o modi . . . . .	—	I	I	I	2	3	I	3	4
Non indicati . . . . .	I	4	5	2	—	2	4	I	5
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>37</b>

(a) Nel primo anno di vita.

(b) Avvelenata con acido acetico.

Aggiungiamo, infine, che la mortalità per *omicidio* e *infanticidio*, nel 1936, al contrario di ciò che si è verificato nel 1935, è stata, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, lievemente inferiore a quella degli altri Comuni.

§ 5. — **Notizie sui morti per suicidio.** — *Regno.* — Le morti per *suicidio* sono venute crescendo dal 1887 in poi (vedi prospetto 54). Infatti, il numero indice, da 100 nel periodo base 1887-91 salì costantemente, salvo lievi oscillazioni, a 171 nel 1914. Nel periodo bellico e nel quinquennio dopo guerra, dette morti diminuirono sensibilmente rispetto all'anno 1914, e la diminuzione maggiore si osserva nei due anni 1916 e 1917, nei quali il numero indice discese a 133; ma esse risalirono notevolmente negli anni dal 1924 al 1927, nel quale ultimo anno il numero indice è il più alto fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi. Dal 1928 al 1936 notasi nel comportamento della mortalità per *suicidio* un andamento oscillante.



PROSPETTO 54. — Morti per suicidio dal 1887 al 1936.

A N N I	SUICIDI	PER 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)	A N N I	SUICIDI	PER 1 000 000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (*)	1 570	52	100	1920	2 664	73	140
1892-96 (*)	1 813	58	112	1921	2 885	78	150
1897-901(*)	2 005	62	119	1922	3 030	83	160
1902-06 (*)	2 157	65	125	1923	3 222	87	167
1907	2 445	73	140	1924	3 778	97	187
1908	2 693	80	154	1925	3 674	94	181
1909	2 969	87	167	1926	3 871	98	188
1910	2 880	84	162	1927	4 210	106	204
1911	2 754	79	152	1928	3 903	97	187
1912	2 986	85	163	1929	3 636	90	173
1913	3 107	88	169	1930	3 915	96	185
1914	3 185	89	171	1931	4 141	101	194
1915	3 092	85	163	1932	4 058	97	187
1916	2 531	69	133	1933	3 712	88	169
1917	2 439	69	133	1934	3 686	87	167
1918	2 642	75	144	1935	3 267	76	146
1919	2 630	73	140	1936	3 399	79	152

(\*) Media annuale.

PROSPETTO 55. — Mortalità per suicidio (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100 000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1936	
Piemonte	9.3	12.3	11.3	14.5	12.4	132	121	156	133	150	149	146	148	157	
Liguria	8.9	16.0	13.3	14.9	11.6	180	149	167	130	143	193	172	152	147	
Lombardia	6.5	9.3	8.4	10.4	7.8	143	129	160	120	104	112	108	106	98	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	12.1	9.7	—	—	—	—	—	—	—	124	123	
Veneto	6.6	8.4	7.6	8.9	6.7	127	115	135	102	106	101	99	91	85	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	19.6	17.9	—	—	—	—	—	—	—	200	226	
Emilia	9.6	10.9	11.2	15.3	12.2	114	116	159	127	155	132	145	156	154	
Toscana	7.7	9.4	8.7	10.1	8.6	122	112	131	111	124	114	113	103	108	
Marche	7.0	7.3	7.9	9.2	6.8	104	113	131	97	113	88	103	94	86	
Umbria	7.5	8.0	7.1	11.2	9.4	106	95	149	124	121	97	93	115	118	
Lazio	9.7	12.2	10.9	8.5	6.1	126	113	88	63	155	147	142	86	77	
Abruzzi e Molise	4.0	4.6	4.3	7.0	5.6	115	108	175	141	64	55	56	71	71	
Campania	3.9	6.0	6.4	6.6	5.7	156	166	169	147	62	73	84	67	72	
Puglie	3.7	4.1	4.4	5.8	5.5	113	119	158	150	59	50	57	59	70	
Lucania	3.0	4.6	5.1	6.1	3.5	153	171	204	117	48	55	66	62	44	
Calabria	2.1	2.3	2.5	3.7	2.8	107	119	172	133	34	27	33	37	36	
Sicilia	3.6	5.9	4.9	7.0	6.4	167	137	196	180	57	72	63	71	81	
Sardegna	4.8	6.1	4.5	8.4	5.9	129	95	176	124	77	74	59	85	75	
REGNO } vecchi confini.	6.2	8.3	7.7			133	124	153	123	100	100	100			
REGNO } attuali confini.				9.8	7.9								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5\*.

*Compartimenti.* — Nel prospetto 55, in analogia a quanto è stato fatto per le altre principali cause di morte, è data la mortalità per *suicidio*, in ciascun Compartimento e nel Regno, durante i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22, 1930-32 e nell'anno 1936.

Nel Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *suicidio* è stata, nel 1936, superiore del 23 % a quella del periodo base 1900-02 ; anche nei singoli Compartimenti la mortalità è risultata superiore a quella del periodo base, eccettuati le Marche ed il Lazio.

Nel 1936 ha segnato il massimo della mortalità la Venezia Giulia e Zara ed il minimo le Calabrie. Nel 1936, la Toscana e l'Umbria e tutti i Compartimenti dell'Italia Settentrionale, tranne la Lombardia ed il Veneto, hanno segnato una mortalità superiore a quella media del Regno.

*Sesso, stato civile ed età.* — Si rimanda il lettore, per notizie più precise sulla mortalità per *suicidio* secondo il sesso, lo stato civile e l'età, a quanto è detto nella Introduzione alla Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932 (\*).

Nei due prospetti seguenti sono dati soltanto rapporti di composizione, e dal primo di essi risulta che, nel 1936, su 100 morti per *suicidio*, 74 erano maschi ; e

PROSPETTO 56. — Morti per suicidio, secondo il sesso e lo stato civile (1936).

STATO CIVILE	SUICIDI			% DEL MEDESIMO STATO CIVILE		% DEL TOTALE (a)
	M	F	MF	M	F	
Celibi e nubili . . . . .	874	362	I 236	70.7	29.3	36.5
Coniugati . . . . .	I 311	373	I 689	77.6	22.4	49.9
Vedovi . . . . .	320	138	458	69.9	30.1	13.5
Ignoto . . . . .	13	I	14			
<b>In complesso . . .</b>	<b>2 518</b>	<b>879</b>	<b>3 397</b>	<b>74.1</b>	<b>25.9</b>	<b>100.0</b>

(a) Esclusi i suicidi di stato civile ignoto.

PROSPETTO 57. — Morti per suicidio, secondo il sesso e l'età (1936).

ETÀ ALLA MORTE	SUICIDI		% DEL TOTALE	
	M	F	M	F
Fino a 15 anni . . . . .	12	8	4.8	9.1
Da 15 a 19 anni . . . . .	60	55	23.8	62.6
» 20 » 29 » . . . . .	401	215	160.4	244.6
» 30 » 39 » . . . . .	387	153	153.7	174.1
» 40 » 49 » . . . . .	402	146	159.7	166.1
» 50 » 59 » . . . . .	516	137	204.9	155.9
» 60 » 69 » . . . . .	413	90	164.0	102.4
» 70 » 79 » . . . . .	274	64	108.8	72.8
» 80- <sup>(a)</sup> . . . . .	50	11	19.9	12.5
<b>In complesso . . .</b>	<b>2 518</b>	<b>879</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>

(\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932*, Parte I — Introduzione — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1935-XIII, pagine 108\* e 109\*.

che i maschi celibi su 100 *suicidi* del medesimo stato civile, erano in numero di 71, i coniugati di 78 e i vedovi di 70. Inoltre, su 100 persone di ambo i sessi morte per *suicidio*, 50 erano coniugate.

In quanto all'età alla morte (prospetto 57), la maggior frequenza fra le donne che si tolsero la vita, nel 1936, si osserva nel gruppo d'età da 20 a 29 anni (245 ‰ del totale), quando cioè cominciano le prime disillusioni e le prime avversità della esistenza. Anche nei maschi si osserva, in detto gruppo, una forte proporzione di *suicidi*; il massimo, però, si ha nell'età da 50 a 59 (205 ‰).

*Mezzi o modi di suicidio.* — Rispetto ai mezzi o modi adoperati per togliersi la vita, distinguiamo i *suicidi* in nove categorie.

PROSPETTO 58. — *Suicidi, secondo i mezzi o modi adoperati e il sesso.*

MEZZI O MODI DEL SUICIDIO	SUICIDI (*)									‰ DEL TOTALE					
	1934			1935			1936			1934		1935		1936	
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	M	F	M	F
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	202	223	425	157	161	318	149	163	312	74.7	226.9	66.0	181.3	59.1	185.4
Per assorbimento di gas tossici . . . . .	56	35	91	58	27	85	60	34	94	20.7	35.6	24.4	30.4	23.8	38.7
Per impiccamento o strangolamento . . . . .	768	188	956	708	195	903	746	192	938	284.1	191.3	297.6	219.6	296.0	218.4
Per annegamento . . . . .	416	278	694	357	224	581	419	247	666	153.9	282.8	150.1	252.3	166.5	281.0
Con arma da fuoco . . . . .	697	39	736	597	44	641	602	39	641	257.9	39.7	250.9	49.5	238.9	44.4
Con arma da punta o da taglio . . . . .	112	23	135	105	17	122	130	28	158	41.4	23.4	44.1	19.1	51.6	31.9
Per precipitazione dall'alto . . . . .	239	150	389	248	163	411	229	132	361	88.4	152.6	104.2	183.6	90.9	150.2
Per schiacciamento . . . . .	196	39	235	134	49	183	168	39	207	72.5	39.7	56.3	55.2	66.7	44.4
Con altri mezzi o con mezzi non determinati . . . . .	17	8	25	15	8	23	17	5	22	6.3	8.1	6.3	9.0	6.7	5.7
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>2703</b>	<b>983</b>	<b>3686</b>	<b>2379</b>	<b>888</b>	<b>3267</b>	<b>2520</b>	<b>879</b>	<b>3399</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>1000.0</b>

(\*) Fra i suicidi degli anni 1934, 1935 e 1936 ne sono compresi, rispettivamente 48 (maschi 32 e femmine 16), 40 (maschi 23 e femmine 17) e 66 (maschi 37 e femmine 29), compiuti in istato di malattia per *psicopatia* e *sindromi nevraleniche*.

Si nota che, in tutti e tre gli anni presi in esame, per i maschi, predominano i *suicidi* per impiccamento o strangolamento, con arma da fuoco e per annegamento; per le femmine, invece, predominano i *suicidi* per annegamento, mentre quelli per arma da fuoco hanno una non notevole frequenza.

*Sostanze che determinarono gli avvelenamenti.* — Anche per le morti dovute ad *avvelenamento acuto* volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le

sostanze che produssero la morte, ed i relativi dati sono riportati nel prospetto seguente, per gli anni dal 1934 al 1936.

I veleni maggiormente usati, nel 1936, sono, in ordine decrescente: l'ossido di carbonio, la soda e la potassa, il sublimato corrosivo, l'acido cloridrico, il veronal, il solfato ed altri sali di rame, l'acido solforico, ecc.; nel triennio 1933-35 si nota, all'incirca, lo stesso andamento.

Ciò, probabilmente, è in rapporto con la maggiore facilità con la quale tali mezzi si possono avere a disposizione.

PROSPETTO 59. — Suicidi per avvelenamento acuto (\*),  
classificati per sesso e secondo la sostanza.

SOSTANZE (a)	1934		1935		1936		SOSTANZE (a)	1934		1935		1936	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Acido acetico . . . . .	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1
» cianidrico . . . . .	2	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—
» cloridrico . . . . .	21	25	12	15	22	13	13	1	2	1	1	1	—
» fenico . . . . .	8	4	6	4	6	7	—	—	—	—	—	—	—
» nitrico . . . . .	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
» salicilico . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» solforico . . . . .	4	9	10	12	6	10	—	—	—	—	—	—	—
Ammoniaca . . . . .	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Anidride solforosa . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arsenico e suoi preparati . . . . .	5	1	6	3	4	6	—	—	—	—	—	—	—
Alcool denaturato . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcool etilico . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Atropina e belladonna . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Bicromato potassico . . . . .	3	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Chinina (sali di) . . . . .	5	5	2	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—
Cloroformio . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cocaina . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Creolina . . . . .	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Dial . . . . .	—	7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Digitale . . . . .	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Fernet . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Formalina . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fosforo . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Gardal . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas irrespirabili o tossici (non specificati) . . . . .	1	1	5	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—
Guaiaacolo . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Idrochinone . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Infuso di foglie di olean- dro . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ingestione di più sostanze ve- lenose . . . . .	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insulina . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Iodio . . . . .	—	1	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—
Ipnocici barbiturici non spe- cificati . . . . .	4	4	3	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—
Ipnocici non specificati . . . . .	8	7	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—
Lysoformio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Luminal . . . . .	1	2	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—
Mercurio : sublimato corrosivo . . . . .	34	41	29	29	17	27	—	—	—	—	—	—	—
altri sali . . . . .	2	2	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Morfina . . . . .	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nicotina . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nitrato di argento . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nitrato di sodio . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oppio . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ossido di carbonio : ossido di carbonio (senza altra indicazione) . . . . .	25	19	25	13	25	13	—	—	—	—	—	—	—
braciere di carbone o stufa gas illuminante . . . . .	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—
Permanganato potassico . . . . .	28	15	27	13	31	17	—	—	—	—	—	—	—
Petrolio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salicilato di metile . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sedival . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soda e potassa . . . . .	16	46	18	25	17	36	—	—	—	—	—	—	—
Solfato ed altri sali di rame . . . . .	12	18	5	9	13	9	—	—	—	—	—	—	—
Solfuro di carbonio . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stricnina . . . . .	10	4	12	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—
Stupefacenti non specificati . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veramon . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veronal . . . . .	31	10	24	19	22	10	—	—	—	—	—	—	—
Zinco : fosforo di zinco . . . . .	3	1	1	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—
solfuro di zinco . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
altri sali . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veleni non specificati : sostanze varie non ben pre- cisate . . . . .	6	7	8	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—
sostanze non indicate . . . . .	10	11	8	6	9	7	—	—	—	—	—	—	—
<b>In complesso . . . . .</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>215</b>	<b>188</b>	<b>209</b>	<b>197</b>							

(\*) Comprese le morti da gas irrespirabili.

(a) Sono state indicate tutte le sostanze che erano specificate nelle schede di morte.

È da notare che mentre, come si è visto, sono piuttosto rare le *morti accidentali* dovute ad avvelenamento per sostanze o preparati medicinali ad azione ipnotica, sono molto frequenti le morti per *suicidio* dovute a tali sostanze, il che farebbe supporre che in molti casi può trattarsi di individui ammalati, i quali, in un momento di sconforto, hanno voluto porre termine alle loro sofferenze.

*Mesi in cui avvennero i suicidi.* — Dal prospetto seguente si rileva che il maggior numero dei *suicidi* si nota, di solito, nella primavera e nella estate, il minore, nell'autunno e nell'inverno.

PROSPETTO 60. — *Suicidi secondo il mese in cui avvennero.*

M E S I	S U I C I D I			MEDIA	NUMERI	MEDIA	NUMERI	MEDIA	NUMERI
	1934	1935	1936	GIORNA-	INDICI	GIORNA-	INDICI	GIORNA-	INDICI
				LIERA		LIERA		LIERA	
				1934		1935		1936	
Gennaio . . . . .	250	234	252	8.06	80	7.55	84	8.13	88
Febbraio . . . . .	273	216	213	9.75	97	7.71	86	7.34	79
Marzo . . . . .	345	308	298	11.13	110	9.94	111	9.61	103
Aprile . . . . .	358	304	326	11.93	118	10.13	113	10.87	117
Maggio . . . . .	409	336	352	13.19	131	10.84	121	11.35	122
Giugno . . . . .	377	376	344	12.57	124	12.53	140	11.47	123
Luglio . . . . .	373	350	391	12.03	119	11.29	126	12.61	136
Agosto . . . . .	288	272	315	9.29	92	8.77	98	10.16	109
Settembre . . . . .	282	238	234	9.40	93	7.93	89	7.80	84
Ottobre . . . . .	232	239	234	7.48	74	7.71	86	7.55	81
Novembre . . . . .	235	204	220	7.83	78	6.80	76	7.33	79
Dicembre . . . . .	264	190	220	8.52	84	6.13	68	7.10	76
Anno . . . . .	3 686	3 267	3 399	10.10	100	8.95	100	9.29	100

*Professioni.* — Le cifre del prospetto 61 non possono dare un corretto criterio per giudicare sulla influenza della professione nella frequenza dei *suicidi*. Come è stato già detto, a proposito della mortalità per *cause accidentali*, i quozienti di mortalità per ciascuna categoria professionale, si dovrebbero calcolare mettendo in rapporto il numero totale dei morti, distinti secondo la professione, al totale dei viventi della stessa categoria professionale, ma, dati i criteri diversi coi quali sono classificati secondo le singole professioni tanto i viventi censiti quanto i morti in ciascun anno, non è possibile istituire tale rapporto.

Pertanto, in mancanza degli elementi necessari per il calcolo, si espone, nel citato prospetto, il per mille che i morti per *suicidio*, di una data classe professionale, rappresentano sul totale dei morti per ogni causa della stessa classe professionale.

Infine, a complemento delle notizie già date circa la mortalità per *suicidio*, aggiungiamo che essa, nel 1936, come nel quadriennio 1932-35, è stata maggiore nel complesso dei Comuni capiloghi di Provincia in confronto a quella del complesso degli altri Comuni; e che fra i Comuni aventi una popolazione residente superiore a 100 000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, raggiunge il massimo in Trieste (2,6 su 10 000 abitanti) e il minimo in Reggio di Calabria (0,3).

PROSPETTO 61. — Maschi morti per suicidio in età da 15 anni in poi,  
secondo la professione o condizione.

CLASSE (a)	CATEGORIA (a)	SOTTOCATEGORIA (a)	PROFESSIONE O CONDIZIONE	SUICIDI		CIFRE PROPORZIONALI A 1000 MASCHI MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI E DELLA STESSA PROFESSIONE (b)	
				1935	1936	1935	1936
1	I	I e 2	Agricultori di ogni specie . . . . .	809	859	8.4	9.2
2	I	o	Industriali, commercianti . . . . .	137	93	22.7	15.3
3	I	o	Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate . . . . .	56	64	16.5	20.2
3	2	o	Esercenti . . . . .	13	18	13.4	16.8
3	3	o	Commissionari, rappresentanti . . . . .	42	32	23.1	17.6
4	I	o	Minatori e cavaatori . . . . .	16	11	15.3	10.5
4	2	o	Falegnami, verniciatori, ecc. . . . .	57	78	10.4	14.3
4	3	I-2-3-4	Addetti alla macellazione e conservazione delle carni, ai forni, ai pastifici, alla lavorazione del latte e alle industrie alimentari . . . . .	44	36	17.4	17.1
4	4	I e 2	Conciatori, pellai, calzolai, guantai, ecc. . . . .	53	76	11.7	16.8
4	5	I e 2	Metallurgici, meccanici, elettricisti, ecc. . . . .	94	118	15.1	18.6
4	6	o	Argentieri, orefici, ecc. . . . .	3	2	7.0	5.4
4	7	I e 2	Asfaltisti, fornai, ceramisti, vetrai, ecc. . . . .	9	15	11.8	21.0
4	8	I e 2	Muratori, imbianchini, manovali, braccianti, ecc. . . . .	186	179	12.8	12.9
4	9	I e 2	Addetti all'industria tessile e a manifatture tessili . . . . .	16	9	14.6	9.0
4	10	I e 2	Addetti all'industria del vestiario e all'arredamento . . . . .	25	28	12.7	14.1
4	11	I	Addetti alle industrie chimiche . . . . .	1	3	6.7	22.1
4	11	2	Addetti alla manifattura tabacchi . . . . .	—	—	—	—
4	12	I e 2	Addetti alle industrie poligrafiche e della carta . . . . .	15	9	23.4	15.2
4	13	o	Operai non specificati . . . . .	74	77	15.0	14.8
5	I	o	Cocchieri, carrettieri, ecc. . . . .	23	25	8.3	9.6
5	2	o	Ferrovieri, tramvieri, conduttori di automobili, addetti a trasporti aerei . . . . .	31	44	15.3	22.9
5	3	o	Marinai, barcaiuoli, pescatori, ecc. . . . .	7	19	4.2	11.5
6	I	I e 2	Addetti alla cura e alla acconciatura della persona . . . . .	22	29	17.4	23.4
6	2 e 3	o	Addetti ai servizi domestici, garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici . . . . .	45	39	16.5	14.3
6	4	I	Facchini, spazzini, cantonieri . . . . .	17	23	8.4	11.0
6	4	2	Venditori ambulanti, saltimbanchi, venturieri . . . . .	23	27	13.6	17.0
7	I	o	Personale subalterno dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . .	11	14	13.4	16.5
8	I e 2	o	Esercito, marina, aeronautica, guardie di finanza e milizia (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	64	56	57.4	55.2
8	3	o	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici (esclusi gli Ufficiali) . . . . .	7	12	17.8	30.6
9	I	I e 2	Culto cattolico e altri culti . . . . .	7	4	4.2	2.6
9	2	I	Insegnanti . . . . .	6	14	10.4	24.0
9	2 e 4	2	Professioni liberali e arti belle . . . . .	57	44	22.1	17.8
9	3	o	Arti sanitarie . . . . .	21	16	20.4	17.5
10	1-2-3	I e 2	Ufficiali delle forze armate di terra, di mare e d'aria . . . . .	9	14	33.3	42.7
10	4	o	Impiegati pubblici e privati . . . . .	134	148	24.5	26.8
10	5	o	Pensionati . . . . .	83	97	6.6	6.6
11	I	o	Proprietari e benestanti . . . . .	82	86	9.8	9.5
12	I	o	Studenti . . . . .	22	21	19.6	19.0
12 e o	3 e 4	I a 5	Disoccupati, invalidi, ricoverati, mendicanti, professione ignota . . . . .	48	67	6.0	5.2
			<b>In complesso . . . . .</b>	<b>2 369</b>	<b>2 566</b>	<b>11.2</b>	<b>11.7</b>

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Nomenclatura professionale* - II Edizione - Roma, Tipografia I. Failli, 1935-XIII.

(b) Escluse le morti per cause non determinate (classe XVIII) del nuovo Elenco nosologico adottato dal 1931.

## CAPO III.

## LE CAUSE DI NATIMORTALITÀ NEL SESSENNIO 1931-36

Nelle schede di nascita, a datare dal 1931, sono indicate le cause di natimortalità. È ovvia l'importanza dello studio delle cause di natimortalità dal punto di vista sociale, essendo alcune di esse favorevolmente influenzabili da provvedimenti assistenziali.

Nei due prospetti seguenti sono stati calcolati i quozienti di natimortalità per cause, nella media annua del sessennio 1931-36, al fine di avere cifre più significative, ritratte, cioè, dall'osservazione di un maggior numero di casi.

Il sesso, la legittimità dei natali, il genere del parto (semplice o plurimo), l'ordine di generazione e l'età delle madri, sono circostanze che influiscono sulla frequenza della natimortalità.

Nei riguardi del sesso, le cause di natimortalità nel sessennio 1931-36 agiscono con maggiore intensità nei maschi, e la sola eccezione a questo comportamento è data dalle *malformazioni incompatibili con la vita*.

In quanto alla filiazione, i quozienti di natimortalità sono superiori negli illegittimi, per quasi tutte le cause e principalmente per quelle del primo gruppo (nel corso della gestazione) - (Cfr. Prosp. 62). Fra queste, particolarmente alto appare, in confronto dei legittimi, il quoziente per *sifilide ed altre affezioni croniche*, mentre per le rimanenti cause la differenza è molto minore.

Nel secondo gruppo di cause (per espulsione prematura), il quoziente di natimortalità ad eccezione di quello dovuto ad infezioni acute è più alto negli illegittimi ed in specie per le *infezioni croniche in particolare la sifilide*.

Fra le cause del terzo gruppo (nel corso del parto), i quozienti negli illegittimi sono superiori a quelli dei legittimi, fatta eccezione soltanto della natimortalità per *presentazioni viziose e procidenza del cordone*, che è stata leggermente superiore nei legittimi.

Nei riguardi del genere del parto, la natimortalità nei parti semplici è molto inferiore a quella dei parti multipli, sia nel complesso, sia nei singoli gruppi di cause, sia ancora nelle singole cause di ciascun gruppo. La differenza più accentuata si riscontra per il complesso delle morti avvenute per *espulsione prematura*.

Circa l'ordine di generazione nei legittimi (Cfr. Prosp. 63), la natimortalità dei primogeniti, nei parti semplici, è superiore a quella dei non primogeniti in ciascun gruppo di cause, specialmente per quelle che determinano la morte del feto nel corso del parto, e fra queste, principalmente, per *l'ostacolo all'espulsione del feto*. Per quanto concerne i parti multipli, pure essendo nei primogeniti la natimortalità superiore a quella dei non primogeniti, non si nota per le cause che determinano la morte del feto nel corso del parto per *ostacolo all'espulsione del feto*, quella prevalenza che si è notata precedentemente per i parti semplici.

Nei riguardi dell'età della madre, non tenendo conto dell'ordine di generazione e dell'età inferiore a 21 anni, si nota che nei parti semplici la natimortalità è minima nella classe di età 21-29 e cresce coll'aumentare delle età: questo aumento è dovuto, in maggior proporzione, alle cause che agiscono nel corso della gestazione e del parto.

PROSPETTO 62. — Nati morti secondo le cause, la specie del parto, la filiazione

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	NATI MORTI DA PARTI SEMPLICI									NATI		
	legittimi			illegittimi			Totale			legittimi		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
<b>Complesso . . .</b>	<b>338.2</b>	<b>288.9</b>	<b>314.2</b>	<b>434.3</b>	<b>388.6</b>	<b>412.0</b>	<b>343.0</b>	<b>293.9</b>	<b>319.1</b>	<b>991.6</b>	<b>832.3</b>	<b>913.0</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . .</b>	<b>73.8</b>	<b>72.9</b>	<b>73.4</b>	<b>114.5</b>	<b>115.4</b>	<b>114.9</b>	<b>75.8</b>	<b>75.0</b>	<b>75.5</b>	<b>197.2</b>	<b>175.5</b>	<b>186.5</b>
1 Sifilide ed altre affez. croniche di cui per sifilide . . .	18.1	16.8	17.5	44.7	43.2	43.9	19.4	18.1	18.8	33.3	28.9	31.1
2 Tossemie gravidiche . . .	17.1	15.8	16.5	19.5	20.1	19.8	17.2	16.0	16.6	42.7	40.4	41.6
3 Malform. incomp. con la vita	20.1	24.2	22.1	23.2	27.9	25.5	20.3	24.4	22.3	49.0	48.1	48.6
4 Altre cause . . .	13.3	11.6	12.5	18.3	16.1	17.2	13.6	11.8	12.7	53.5	43.9	48.7
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	5.1	4.5	4.8	8.8	8.1	8.5	5.3	4.7	5.0	18.6	14.3	16.5
<b>II. - Per espulsione prematura . . .</b>	<b>98.7</b>	<b>88.6</b>	<b>93.8</b>	<b>131.2</b>	<b>120.2</b>	<b>125.9</b>	<b>100.3</b>	<b>90.2</b>	<b>95.4</b>	<b>405.8</b>	<b>341.3</b>	<b>374.0</b>
5 Strapazzo materno . . .	44.6	40.1	42.4	46.3	42.1	44.3	44.7	40.2	42.5	155.3	130.4	143.0
6 Trauma determ. parto premat.	6.8	6.0	6.4	8.4	6.6	7.5	6.9	6.1	6.5	18.1	16.6	17.4
7 Inserzione viziosa . . .	7.8	6.5	7.2	7.4	7.3	7.3	7.8	6.6	7.2	27.4	22.2	24.8
8 Infezioni acute . . .	5.3	5.0	5.1	5.0	5.2	5.1	5.3	5.0	5.1	18.0	15.9	17.0
9 Infezioni croniche di cui per sifilide . . .	2.6	2.5	2.6	9.6	9.9	9.7	3.0	2.9	2.9	6.2	5.0	5.6
10 Altre cause . . .	8.7	8.1	8.4	13.5	14.2	13.8	8.9	8.4	8.7	40.1	31.0	35.6
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	19.1	16.9	18.0	37.1	31.3	34.3	20.4	17.6	18.8	127.6	107.5	117.7
<b>III. - Nel corso del parto . . .</b>	<b>163.2</b>	<b>125.0</b>	<b>144.7</b>	<b>181.7</b>	<b>147.2</b>	<b>164.9</b>	<b>164.2</b>	<b>126.2</b>	<b>145.7</b>	<b>375.2</b>	<b>304.0</b>	<b>340.1</b>
11 Present. viziose e procid. cord.	75.8	58.1	67.2	71.3	60.5	66.0	75.6	58.2	67.1	172.6	143.7	158.3
12 Ostacoli all'espulsione del feto	33.8	24.3	29.2	36.1	29.2	32.7	33.9	24.6	29.4	66.8	53.2	60.1
13 Altre cause . . .	52.5	41.6	47.2	72.9	56.3	64.8	53.5	42.3	48.1	131.7	103.6	117.9
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	1.2	1.0	1.1	1.5	1.3	1.4	1.2	1.0	1.1	4.1	3.6	3.8
Cause non indicate . . .	2.4	2.3	2.4	6.8	5.8	6.3	2.6	2.5	2.6	13.4	11.5	12.5

PROSPETTO 63. — Nati morti legittimi (1931-36), da madri che presumibilmente non ebbero figli prima dell'attuale

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	NATI MORTI DA PARTI SEMPLICI —								
	— 21			21-29			30-39		
	Primo- geniti	Cadetti	Totale	Primo- geniti	Cadetti	Totale	Primo- geniti	Cadetti	Totale
<b>Complesso . . .</b>	<b>320.4</b>	<b>213.4</b>	<b>296.6</b>	<b>365.2</b>	<b>212.9</b>	<b>268.2</b>	<b>686.5</b>	<b>308.4</b>	<b>337.3</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . .</b>	<b>70.9</b>	<b>53.9</b>	<b>67.1</b>	<b>78.0</b>	<b>51.1</b>	<b>60.9</b>	<b>147.0</b>	<b>73.8</b>	<b>79.4</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche di cui per sifilide . . .	13.9	18.8	15.0	16.3	12.6	14.0	37.2	18.2	19.7
2 Tossemie gravidiche . . .	17.0	7.5	14.9	18.9	10.1	13.3	39.2	16.0	17.8
3 Malformaz. incompatib. con la vita	25.2	16.4	23.3	24.5	16.8	19.6	36.8	21.9	23.0
4 Altre cause . . .	10.5	8.1	10.0	12.3	8.5	9.8	23.6	13.0	13.8
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	4.2	3.0	3.9	6.0	3.3	4.3	10.2	4.7	5.1
<b>II. - Per espulsione prematura . . .</b>	<b>108.3</b>	<b>91.5</b>	<b>104.6</b>	<b>96.9</b>	<b>72.4</b>	<b>81.3</b>	<b>153.7</b>	<b>93.4</b>	<b>98.0</b>
5 Strapazzo materno . . .	52.7	41.3	50.2	43.3	33.2	36.8	60.8	42.3	43.7
6 Trauma determ. parto prematuro.	7.0	5.8	6.7	6.6	4.8	5.5	10.8	6.5	6.8
7 Inserzione viziosa . . .	6.9	5.2	6.5	7.1	5.4	6.0	13.0	7.7	8.1
8 Infezioni acute . . .	6.5	5.2	6.2	5.7	3.7	4.4	10.3	4.9	5.4
9 Infezioni croniche di cui per sifilide . . .	2.7	3.0	2.7	2.4	2.2	2.3	4.0	2.5	2.7
10 Altre cause . . .	7.2	8.4	7.5	8.4	6.2	7.0	15.9	8.5	9.1
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	22.2	19.5	21.6	20.6	14.1	16.4	32.9	16.9	18.1
<b>III. - Nel corso del parto . . .</b>	<b>139.2</b>	<b>65.9</b>	<b>122.9</b>	<b>187.9</b>	<b>87.8</b>	<b>124.1</b>	<b>382.2</b>	<b>139.1</b>	<b>157.7</b>
11 Presentaz. viziose e procid. cordone	65.4	34.5	58.5	80.5	44.2	57.4	141.2	67.4	73.0
12 Ostacoli all'espulsione del feto . .	28.2	9.9	24.2	44.1	15.7	26.0	101.8	24.9	30.8
13 Altre cause . . .	44.8	21.0	39.5	62.0	27.3	39.9	136.4	45.7	52.7
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	0.8	0.4	0.8	1.2	0.6	0.8	2.7	1.1	1.2
Cause non indicate . . .	2.0	2.2	2.0	2.5	1.5	1.9	3.7	2.0	2.2

(\*) Nomenclatura nosologica stabilita dalla IV Conferenza internazionale. (a) Nati vivi e nati morti. (b) Per il biennio 1931-32 vennero esclusi

ed il sesso, nel sessennio 1931-36 (media annuale per 10 000 nascite) (a).

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	MORTI DA PARTI MULTIPLI						IN COMPLESSO								
	illegittimi			Totale			legittimi			illegittimi			Totale		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
<b>Complesso . . .</b>	<b>1228.1</b>	<b>1113.0</b>	<b>1170.0</b>	<b>1001.6</b>	<b>844.6</b>	<b>924.0</b>	<b>355.6</b>	<b>303.8</b>	<b>330.4</b>	<b>452.0</b>	<b>405.8</b>	<b>429.5</b>	<b>360.4</b>	<b>309.0</b>	<b>335.4</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . .</b>	<b>283.0</b>	<b>281.0</b>	<b>282.0</b>	<b>200.8</b>	<b>180.2</b>	<b>190.6</b>	<b>77.1</b>	<b>75.7</b>	<b>76.4</b>	<b>118.3</b>	<b>119.3</b>	<b>118.8</b>	<b>79.2</b>	<b>77.9</b>	<b>78.6</b>
1 Sifilide ed altre affez. croniche di cui per sifilide . . .	62.3	94.6	78.6	34.5	31.8	33.2	18.5	17.1	17.8	45.1	44.4	44.7	19.8	18.5	19.2
2 Tossemie gravidiche . . .	45.3	55.6	50.5	42.8	41.1	42.0	17.8	16.5	17.2	20.1	21.0	20.5	17.9	16.7	17.3
3 Malform. incomp. con la vita	79.2	58.4	68.7	50.3	48.5	49.4	20.9	24.9	22.8	24.4	28.7	26.5	21.1	25.0	23.0
4 Altre cause . . .	70.7	66.8	68.7	54.2	44.9	49.6	14.4	12.5	13.5	19.5	17.3	18.4	14.7	12.7	13.7
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	25.5	5.6	15.4	18.9	13.9	16.4	5.5	4.8	5.1	9.2	8.0	8.6	5.7	4.9	5.3
<b>II. - Per espulsione prematura . . .</b>	<b>492.4</b>	<b>456.3</b>	<b>474.2</b>	<b>409.4</b>	<b>346.3</b>	<b>378.3</b>	<b>106.9</b>	<b>95.6</b>	<b>101.4</b>	<b>139.3</b>	<b>128.2</b>	<b>133.9</b>	<b>108.5</b>	<b>97.2</b>	<b>103.0</b>
5 Strapazzo materno . . .	155.6	128.0	141.7	155.4	130.3	143.0	47.6	42.6	45.1	48.8	44.2	46.5	47.6	42.6	45.2
6 Trauma determ. parto premat.	28.3	25.0	26.7	18.6	16.9	17.8	7.1	6.3	6.7	8.8	7.1	8.0	7.2	6.4	6.8
7 Inserzione viziosa . . .	42.4	30.6	36.5	28.1	22.6	25.3	8.4	7.0	7.7	8.2	7.8	8.0	8.4	7.0	7.7
8 Infezioni acute . . .	17.0	22.3	19.6	18.0	16.2	17.1	5.6	5.3	5.5	5.3	5.6	5.4	5.6	5.3	5.5
9 Infezioni croniche di cui per sifilide . . .	31.1	36.2	33.7	19.6	18.5	19.1	6.8	6.3	6.5	13.8	14.2	14.0	7.1	6.7	6.9
10 Altre cause . . .	34.0	36.2	35.1	39.8	31.2	35.6	9.5	8.7	9.1	13.9	14.7	14.3	9.7	9.0	9.4
10 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	183.9	178.1	181.0	130.0	110.6	120.4	22.0	19.4	20.7	40.4	34.8	37.6	22.9	20.2	21.6
<b>III. - Nel corso del parto . . .</b>	<b>435.8</b>	<b>356.1</b>	<b>395.6</b>	<b>377.8</b>	<b>306.3</b>	<b>342.5</b>	<b>168.9</b>	<b>130.0</b>	<b>150.0</b>	<b>187.4</b>	<b>152.2</b>	<b>170.2</b>	<b>169.8</b>	<b>131.1</b>	<b>151.0</b>
11 Present. viziose e procid. cord.	206.6	178.1	192.2	174.0	145.2	159.8	78.4	60.4	69.7	74.3	63.3	68.9	78.2	60.6	69.6
12 Ostacoli all'espulsione del feto	62.3	50.1	56.1	66.6	53.0	59.9	34.6	25.1	30.0	36.7	29.7	33.2	34.7	25.4	30.2
13 Altre cause . . .	158.5	122.4	140.3	132.9	104.5	118.8	54.6	43.3	49.1	74.8	57.9	66.5	55.6	44.0	50.0
13 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	8.5	5.6	7.0	4.3	3.7	4.0	1.3	1.1	1.2	1.6	1.4	1.5	1.3	1.1	1.2
Cause non indicate . . .	17.0	19.5	18.2	13.6	11.8	12.7	2.7	2.6	2.6	7.1	6.1	6.6	2.9	2.7	2.8

matrimonio (b), per cause, età della madre al parto, ordine di generazione (media annuale per 10 000 nascite) (a).

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	ETÀ DELLA MADRE AL PARTO						NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI			IN COMPLESSO		
	40-49			In complesso			Primo- geniti	Cadetti	Totale	Primo- geniti	Cadetti	Totale
	Primo- geniti	Cadetti	Totale	Primo- geniti	Cadetti	Totale						
<b>Complesso . . .</b>	<b>1233.1</b>	<b>500.1</b>	<b>518.6</b>	<b>400.9</b>	<b>284.5</b>	<b>313.9</b>	<b>1380.8</b>	<b>814.3</b>	<b>917.2</b>	<b>420.0</b>	<b>300.1</b>	<b>330.2</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . .</b>	<b>277.2</b>	<b>125.0</b>	<b>128.8</b>	<b>86.2</b>	<b>68.7</b>	<b>73.1</b>	<b>288.0</b>	<b>164.3</b>	<b>186.7</b>	<b>90.1</b>	<b>71.5</b>	<b>76.2</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche di cui per sifilide . . .	70.1	30.2	31.2	18.7	17.0	17.4	45.9	28.6	31.8	19.2	17.3	17.8
2 Tossemie gravidiche . . .	56.1	21.6	22.5	14.7	12.8	13.3	37.3	18.2	21.7	15.2	13.0	13.5
3 Malformaz. incompatib. con la vita	71.1	31.6	32.6	21.3	14.8	16.5	81.4	32.3	41.2	22.5	15.3	17.1
4 Altre cause . . .	59.1	32.9	33.5	26.3	20.7	22.1	67.8	44.8	49.0	27.1	21.4	22.8
4 <sup>bis</sup> Male indicate . . .	18.0	7.5	7.8	6.3	4.3	4.8	24.4	14.7	16.5	6.6	4.6	5.1
<b>II. - Per espulsione prematura . . .</b>	<b>283.3</b>	<b>147.3</b>	<b>150.8</b>	<b>106.7</b>	<b>89.6</b>	<b>93.9</b>	<b>610.0</b>	<b>324.5</b>	<b>376.3</b>	<b>116.5</b>	<b>96.5</b>	<b>101.5</b>
5 Strapazzo materno . . .	112.1	69.4	70.5	47.4	41.0	42.6	217.0	127.5	143.8	50.7	43.5	45.3
6 Trauma determ. parto prematuro.	19.0	10.4	10.6	7.3	6.1	6.4	29.8	14.6	17.4	7.7	6.4	6.7
7 Inserzione viziosa . . .	18.0	11.1	11.3	7.8	7.0	7.2	38.4	22.0	24.9	8.4	7.5	7.7
8 Infezioni acute . . .	15.0	7.4	7.6	6.4	4.7	5.1	28.3	14.6				



ALLEGATO

MOD. B (Valido per il 1936)  
(recto)

# SCHEDA DI MORTE

per maschio (\*)

AVVERTENZE. - La presente scheda deve corrispondere all'atto di morte **formato nel Comune o ricevuto in originale** a mente dell'art. 396 C.C.

**Comune di** ..... **Provincia di** .....

**Numero d'ordine del Registro degli atti di morte** ..... **Parte** ..... **Serie** .....

*compilato dall'Ufficio di* .....

**Per i bambini nati vivi, ma morti prima della denuncia di nascita, indicare il numero d'ordine del Registro degli**

**atti di nascita** ..... **Parte** .....

*compilato dall'Ufficio di* .....



**Firma dell'Ufficiale di stato civile**

## NOTE:

(\*) Nelle Schede per le femmine, modello *B-bis*, stampate in inchiostro rosso, è anche richiesto, nel caso di morte per *infezione puerperale*, se trattasi di primipara o pluripara e nel caso di morte per *malattia puerperale*, se trattasi di parto multiplo.

(d) Aggiungere il numero corrispondente della « Nomenclatura professionale », tenendo presente che la stessa voce deve essere indicata con un numero diverso a seconda della diversa posizione occupata nella professione, per esempio: *Macellaio* (venditore di carni macellate) = 3/01/0/01; *Macellaio* (operaio addetto alla mattazione) = 4/03/1/01; *Fornaio* (venditore di pane) = 3/01/0/01; *Fornaio* (operaio addetto alla fabbricazione del pane) = 4/03/3/03; *Cappellaio* (venditore di cappelli) = 3/01/0/10; *Cappellaio* (operaio addetto alla fabbricazione dei cappelli) = 4/09/2/02; ecc.

AVVERTENZA. — I quadralini  e i numeri che li seguono debbono essere lasciati scoperti da scrittura; essi servono solo per le elaborazioni che l'Istituto Centrale di Statistica compie sulle schede.

Notizie fornite dal Medico.

Cognome e nome		.....			
Luogo dove avvenne il decesso	<input type="checkbox"/> 1	abitazione (a).....	<input type="checkbox"/> 5	luogo di pena (a).....	
	<input type="checkbox"/> 2	osped., casa di cura (a).....	<input type="checkbox"/> 6	orfanotrofio (a).....	
	<input type="checkbox"/> 3	brefotrofio (a).....	<input type="checkbox"/> 7	comunità religiose (a).....	
	<input type="checkbox"/> 4	ricovero, ospizio, (a).....	<input type="checkbox"/> 8	altri luoghi (indicare quali)	
<p>Dichiaro che la causa della morte del soprannominato, secondo la mia scienza e coscienza, fu la sottoindicata:</p>					
Cause della morte e circostanze in cui essa avvenne	Morte naturale	malattia iniziale .....			
		successioni morbose o complicanze .....			
	Morte da causa violenta	Specie della morte		malattia terminale .....	
		} accidentale (a) ..... } suicidio (a) ..... } omicidio (a) .....			
Morte sopravenuta dopo atto operativo	mezzo o modo col quale la morte fu procurata o avvenne		} (b) ..... }		
	Relazione fra infortunio e professione		Se la morte violenta è avvenuta per infortunio, dire se questo può considerarsi come avvenuto sul lavoro (a) .....		
<input type="checkbox"/> 8					
<input type="checkbox"/> 9	malattia o lesione che ha causato l'intervento chirurgico .....				
<input type="checkbox"/> 1	operazione praticata .....				
<input type="checkbox"/> 1	per i bambini morti nel primo mese di vita, dire se provengono da parto multiplo (a) .....				
Firma e qualifica del Medico .....					

Notizie fornite dall'Ufficiale di stato civile.

Data di morte	Anno .....	mese .....	giorno .....
Dimora del defunto	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Aveva dimora stabile nel Comune? (a) .....	
Luogo di nascita	Comune di .....		
	Provincia di .....		
Data di nascita e Età	Anno .....		
	per bambini che non superano un mese.		giorni compiuti .....
	per bambini che non superano i 12 mesi.		mesi compiuti .....
	per tutti gli altri.		anni compiuti .....
Filiazione (per i bambini morti nel primo anno di vita)	<input type="checkbox"/> 1	Legittimo (a) .....	
	<input type="checkbox"/> 2	Illegittimo riconosciuto (a) .....	
	<input type="checkbox"/> 3	Illegittimo non riconosciuto (a) .....	
Stato civile	<input type="checkbox"/> 1 Celibe (a) .....	<input type="checkbox"/> 2	Coniugato (a) .....
	<input type="checkbox"/> 3 Vedovo (a) .....	<input type="checkbox"/> 4	Divorziato (a) .....
Data di matr.	Anno .....	Mese .....	Giorno .....
	(per i soli coniugati)		
Professione o condizione del defunto	Ultima professione esercitata dal defunto (c) .....		
	N.ro della nomencl. profes. (d) .....		

NOTE:

- (a) Rispondere *sì* o *no* a seconda del caso.  
 (b) Si indichi chiaramente il mezzo o modo con cui fu procurata la morte violenta, ad es.: *arma da fuoco, caduta, investimento da treno, impiccamento, avvelenamento da....* ecc. In caso di avvelenamento, indicare il veleno usato, es.: *per avvelenamento da sublimato corrosivo, da acido fenico, ecc.*  
 (c) Indicare chiaramente la *professione* o la *condizione*, servendosi delle voci contenute nella «Nomenclatura professionale».

(Per la nota (d) vedi nel recto)



# TAVOLE

TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1936, A. — Per Province

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE (a)', 'PIEMONTE' (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, TOTALE M F di cui F), and 'LIGURIA' (Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Tor M F). Rows include 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', and various specific diseases like 'Febbre tifoide e paratifi', 'Difterite', 'Influenza', etc.

distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for 'LOMBARDIA' (ALE di cui F, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, TOTALE M F di cui F), 'VENEZIA TRIDENTINA' (Belluno, Treviso, Udine, PADOVA, Rovigo, TOTALE M F di cui F), and 'VENETO' (Belluno, FRIULI (Udine), PADOVA, Rovigo, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO). Rows include 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', and various specific diseases like 'Febbre tifoide e paratifi', 'Difterite', 'Influenza', etc.

(a) Durante l'anno 1936, non si verificarono nel Regno casi di morte per: febbre ricorrente (N. 4 dell'Elenco nosologico), vaiolo (N. 6-a), vaioloide, peste non specificata (N. 14-d), febbre gialla (N. 37), poliomielite non specificata (N. 109), per fame o sete (N. 189), per esecuzione di civili da parte eccettuata. (c) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali. (f) non puerperali.

alastrim (N. 6-b), vaiolo non specificato (N. 6-c), colera (N. 12), peste bubbonica (N. 14-a), peste polmonare (N. 14-b), peste setticemica (N. 14-c), di armate belligeranti (N. 197). (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale



Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Province

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (ALESSANDRIA, AOSTA, ASTI, CUNEO, NOVARA, TORINO, VERCELLI, TOTALE, GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA, TOR). Rows include various medical conditions like Anemie, Leucemie, Malattie della milza, etc.

1936, distinti secondo 200 cause di morte e Compartimenti.

Table with columns for provinces (ALESSANDRIA, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, MANTOVA, MILANO, PAVIA, SONDRIO, VARESE, TOTALE, BOLZANO, TRENTO, TOTALE, BELLUNO, FRIULI (UDINE), PADOVA, ROVIGO) and causes of death. Rows include various medical conditions like Anemie, Leucemie, Malattie della milza, etc.

a) Veggasi la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti. A. — Per Province

Table with columns for Cause di Morte (a) and provinces: Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Tor. Includes rows for various diseases like Cangrena, Altre malattie delle arterie, Bronchite, Polmonite, etc.

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for Cause di Morte (a) and provinces: ALE, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Frituli (Udine), Padova, Rovigo. Includes rows for various diseases like Cangrena, Altre malattie delle arterie, Bronchite, Polmonite, etc.

a) Veggasi la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali

dell'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (f) e dell'apparato genitale.



Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno  
A. — Per Provincie

NUMERI DELL'ELENCO nosologico	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE							LIGURIA					Tor	
		Alessandria	Aosta	Asti	Cuneo	Novara	Torino	Vercelli	TOTALE		Genova	Imperia	La Spezia		Savona
									M	F					
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b)	10	2	6	13	15	43	11	100	52	18	3	5	3	29
	a) pielite . . . . .	4	2	2	4	8	21	5	46	24	16	2	4	1	23
	b) altre . . . . .	6	—	4	9	7	22	6	54	28	2	1	—	6	
134	Calcolosi delle vie urinarie	12	3	1	3	6	10	1	36	12	8	—	—	9	
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori	9	1	1	1	3	6	1	21	11	7	—	—	8	
	b) calcolosi della vescica . . . . .	3	2	—	2	3	4	—	15	1	—	—	—	1	
	c) calcolosi senza altre indicazioni . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori.	15	2	7	22	17	43	11	117	26	28	6	8	8	50
	a) cistite . . . . .	13	1	5	22	14	40	11	106	24	23	5	8	4	40
	b) altre . . . . .	2	1	2	—	3	3	—	11	2	5	1	—	4	
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	2	1	—	4	2	6	1	16	—	7	1	3	1	12
	a) stenosi uretrale . . . . .	1	1	—	4	1	4	1	11	—	4	1	2	1	7
	b) altre . . . . .	1	—	—	—	1	2	—	5	—	3	—	1	5	
137	Malattie della prostata . . . . .	35	18	13	45	13	98	32	254	—	72	13	17	24	126
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c)	—	1	—	1	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—
139	Mal. organi genitali della donna (c)	7	2	1	3	4	17	7	41	41	7	—	5	3	15
	a) ovaie, trombe e parametri . . . . .	5	1	1	3	3	12	7	29	29	5	—	2	3	10
	b) utero . . . . .	2	1	—	—	1	4	—	11	11	2	—	—	—	3
	c) mammelle . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) altre . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
	<b>XI. - Malattie gravid., parto e puerp.</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>13</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>76</b>
140	Aborto con condizioni settiche . . . . .	—	3	—	3	—	4	4	14	14	11	2	3	1	17
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d)	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1
142	Gestazione ectopica . . . . .	2	—	1	—	2	8	—	13	13	4	—	1	1	6
143	Altri accidenti della gravidanza (e)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale . . . . .	2	3	4	9	4	4	1	27	27	10	2	4	3	19
	a) da placenta previa . . . . .	1	2	—	3	1	1	—	8	8	4	1	2	2	9
	b) altre emorragie . . . . .	1	1	4	6	3	3	—	19	19	6	1	2	1	10
145	Setticemia e infezioni puerperali (f)	7	7	5	17	2	20	3	61	61	6	4	5	3	18
	a) setticemia e piemia puerperali . . . . .	7	7	5	17	2	20	3	61	61	6	4	5	3	18
	b) tetano puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerper.	3	2	—	8	2	8	2	25	25	2	2	1	—	5
147	Altre forme di tossiemia della grav.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g)	1	2	1	2	2	6	—	14	14	2	—	1	—	3
	a) phlegmasia alba dolens e trombose . . . . .	1	2	1	2	2	6	—	13	13	2	—	1	—	3
	b) embolia o morte improvvisa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
149	Altri accidenti del parto . . . . .	—	1	—	2	3	2	—	8	8	4	1	1	1	7
150	Altre malattie non definite (h)	—	—	—	1	1	1	—	3	3	—	—	—	—	—
	<b>XII. - Malattie della pelle e del tessuto cellulare</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>152</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>74</b>
151	Foruncoli . . . . .	1	—	6	4	6	7	2	26	8	3	1	—	1	5
152	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	9	7	6	14	15	37	10	98	36	33	2	14	5	54
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i)	6	—	—	7	3	11	1	28	18	9	—	3	3	15
	<b>XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
154	Osteomielite infettiva acuta . . . . .	2	1	1	4	6	15	4	33	16	16	—	2	3	21
155	Altre malattie delle ossa (l)	1	1	—	4	1	11	3	21	11	5	—	1	—	6
156	Mal. articolazioni, ecc. (m)	1	1	—	3	1	9	2	17	6	4	—	—	—	4
	a) articolaz. (eccett. la tbc. e il reumatismo) . . . . .	1	1	—	3	1	8	2	16	6	4	—	—	—	4
	b) altri organi della locomozione . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>160</b>	<b>71</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>67</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (n)	16	8	2	45	13	59	17	160	71	39	2	18	8	67
	a) idrocefalia . . . . .	1	1	1	4	—	4	1	12	2	2	1	1	1	5
	b) spina bifida e meningocele . . . . .	1	—	—	1	8	8	—	19	11	7	—	7	14	
	c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	12	4	—	25	5	32	8	86	39	20	—	6	6	32
	d) mostruosità . . . . .	—	—	—	—	—	3	1	6	4	1	—	2	3	
	e) altri . . . . .	2	3	—	8	7	12	5	37	15	9	1	2	1	13
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia</b>	<b>130</b>	<b>91</b>	<b>81</b>	<b>316</b>	<b>152</b>	<b>369</b>	<b>138</b>	<b>1277</b>	<b>538</b>	<b>239</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>455</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	39	14	19	97	26	58	34	287	114	46	19	25	17	107
159	Nascita prematura (n)	60	34	28	129	76	208	64	599	270	121	27	35	32	215

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come improvvisa puerperale (non specificata come settica). (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare.

1936, distinti secondo 200 cause di morte.  
e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO nosologico	ALE	LOMBARDIA										VENEZIA TRIDENTINA			VENEZIA				NUMERI DELL'ELENCO nosologico			
		di cui F	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Varese	TOTALE		Bolzano	Trento	TOTALE		Belluno		Frituli (Udine)	Padova	Rovigo
												M	F			M	F					
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b)	15	13	13	16	3	6	55	10	1	5	122	70	15	8	23	10	5	24	5	2	133
	a) pielite . . . . .	10	9	9	10	1	3	36	4	1	1	74	48	9	4	13	7	1	12	2	1	a
	b) altre . . . . .	5	4	4	6	2	3	19	6	—	4	48	28	6	4	10	3	4	12	3	1	b
134	Calcolosi delle vie urinarie	1	4	5	1	1	4	28	6	1	3	53	22	—	1	1	—	1	4	4	2	134
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori	1	4	5	1	1	4	22	3	1	2	39	21	—	1	1	—	1	3	3	2	a
	b) calcolosi della vescica . . . . .	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	12	1	—	—	—	—	—	1	1	—	b
	c) calcolosi senza altre indicazioni . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori.	11	21	24	12	15	8	65	20	2	14	181	57	3	14	17	4	8	18	14	5	135
	a) cistite . . . . .	9	19	22	11	15	8	56	19	2	12	164	54	3	11	14	4	6	15	14	4	a
	b) altre . . . . .	2	2	2	1	—	—	9	1	—	2	17	3	—	3	—	—	2	3	—	—	b
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	—	5	5	1	3	4	20	4	—	1	43	2	1	1	2	—	—	4	5	—	136
	a) stenosi uretrale . . . . .	—	5	5	1	3	4	15	3	—	1	19	—	—	—	—	—	—	3	3	—	a
	b) altre . . . . .	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	24	—	—	—	—	—	—	1	2	—	b
137	Malattie della prostata . . . . .	—	23	23	31	16	30	110	41	10	22	306	—	22	26	48	—	23	58	39	21	137
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	138
139	Mal. organi genitali della donna (c)	15	5	4	4	2	3	24	3	1	7	53	53	4	1	5	5	9	5	4	1	139
	a) ovaie, trombe e parametri . . . . .	10	2	4	3	2	2	13	2	—	5	33	33	3	—	3	3	5	1	1	1	a
	b) utero . . . . .	3	3	—	—	—	—	10	1	—	1	18	18	1	—	1	1	3	4	3	—	b
	c) mammelle . . . . .																					

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno

A. — Per Provincie

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE							LIGURIA							
		Alessandria	Aosta	Asti	Cuneo	Novara	Torino	Vercelli	TOTALE		Genova	Impèria	La Spèzia	Savona	Tot	
									M	F					M	F
160	Conseguenze del parto (b) . . . . .	3	10	4	18	9	22	7	73	26	22	1	9	9	41	
	a) con indicazione di operazione cesarea . . . . .															
	b) senza indicazione di operazione cesarea . . . . .	3	10	4	18	9	22	7	72	26	22	1	9	9	41	
161	Altre malatt. speciali dell'infanzia . . . . .	28	33	30	72	41	81	33	318	128	50	6	14	22	92	
	a) ateletasia . . . . .															
	b) ittero dei neonati . . . . .	7	3	5	14	5	8	7	49	18	5	2	4	11		
	c) sclerema e altre . . . . .	21	27	21	56	36	69	25	255	106	43	6	12	14	75	
	XVI. - Senilità . . . . .	611	397	287	398	401	784	313	3191	1786	366	163	126	83	738	
162	Senilità . . . . .	611	397	287	398	401	784	313	3191	1786	366	163	126	83	738	
	a) con demenza senile . . . . .	22		8	4	26	43	1	104	62	49	2	3	3	57	
	b) senza demenza senile . . . . .	589	397	279	394	375	741	312	3087	1724	317	161	123	80	681	
	XVII. - Morti violente e accidentali . . . . .	203	155	109	280	199	611	182	1739	387	363	96	92	112	663	
163	a) Suicidi: . . . . .	46	38	23	68	38	175	47	435	109	89	27	25	29	170	
171	per ingestione di veleni (c) . . . . .	5	3	—	4	2	13	3	30	10	7	2	1	—	10	
163	con gas tossici . . . . .	—	—	1	—	—	18	1	20	7	4	—	—	—	4	
164	per impiccamento o strangol. . . . .	12	15	3	28	12	43	25	138	32	19	5	5	2	31	
165	per annegamento . . . . .	17	12	6	15	9	25	5	89	31	5	3	5	3	16	
166	con arma da fuoco . . . . .	5	4	7	5	5	29	6	61	2	15	9	4	8	36	
167	con arma da punta e da taglio . . . . .	2	1	2	4	6	6	3	24	4	4	3	1	2	10	
168	per precipitaz. da luogo elev. . . . .	2	—	1	6	—	22	3	34	15	25	3	6	6	40	
169	per schiacciamento . . . . .	3	2	3	5	4	18	—	35	8	9	2	3	8	22	
170	con altri mezzi . . . . .	—	1	—	1	—	1	1	4	—	1	—	—	—	1	
172	a) Omicidi . . . . .	3	4	2	12	5	17	7	50	12	7	3	2	3	15	
175	Infanticidio (— un anno) . . . . .	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	
	a) subito dopo la nascita . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	
	b) altri, prima d'un anno . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
173	Omicidi con arma da fuoco (d) . . . . .	2	3	—	2	1	6	3	17	5	2	1	1	1	5	
174	Omicidi arma da tagli. e da punta (d) . . . . .	1	1	1	4	2	5	2	16	4	4	2	1	1	8	
175	Omicidi con altri mezzi (d) . . . . .	—	—	1	6	2	3	2	14	2	1	—	—	1	2	
176	a) Morti accidentali: . . . . .	154	113	84	199	153	415	125	1243	266	266	65	64	80	475	
194	Morsi o punture d'animali velenosi . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
176	Avvelenamenti da alimenti guasti . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	2	
177	Assorbimento di gas tossici . . . . .	2	3	—	—	—	—	—	7	1	10	—	1	2	13	
178	Altri avvelenam. accident. acuti (e) . . . . .	2	1	—	—	2	2	2	9	2	3	—	—	—	3	
180	Per incendio . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	4	1	—	—	—	—	3	
181	Per ustioni accidentali (f) . . . . .	7	3	4	19	17	23	7	80	43	16	4	5	13	38	
182	Per soffocazione meccanica accid. . . . .	1	—	—	2	—	8	1	12	7	2	—	—	1	3	
183	Per annegamento accidentale . . . . .	20	19	13	39	21	54	18	184	46	13	7	10	8	38	
184	Per trauma acc. arma da fuoco (g) . . . . .	1	1	1	2	1	5	1	12	2	1	—	2	1	4	
185	Per trauma acc. arma pun. o tagli. (g) . . . . .	—	—	—	3	—	1	—	4	1	2	—	—	1	3	
186	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h) . . . . .	91	59	51	102	92	266	79	740	140	188	46	36	43	313	
187	Per cataclisma (i) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
188	Per violenze di animali . . . . .	3	2	—	3	1	7	1	17	3	1	1	2	1	5	
190	Per freddo eccessivo . . . . .	3	3	4	5	3	1	2	21	3	2	1	1	1	4	
191	Per caldo eccessivo . . . . .	—	1	2	2	1	—	—	8	2	—	—	—	—	1	
192	Per fulmine . . . . .	2	—	1	—	—	4	1	8	2	—	—	—	—	1	
193	Per accidenti dovuti a corr. elettr. . . . .	5	6	—	4	2	10	4	31	1	8	—	—	2	10	
194	Per altri accidenti . . . . .	16	14	7	16	13	30	7	103	11	20	5	5	7	37	
	a) corpi estranei . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
	b) altri . . . . .	16	14	7	15	13	29	7	102	10	19	5	5	7	36	
195	Morte violenta, ecc. (l) . . . . .	—	—	—	1	3	3	3	10	—	—	—	—	—	3	
196	Per ferite di guerra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
198	Per esecuzione giudiziaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XVIII. - Cause di morte non determn. . . . .	63	66	23	104	61	271	82	670	265	105	20	38	37	200	
199	Morte improvvisa . . . . .	57	56	19	92	55	257	80	616	234	99	19	36	33	187	
200	Cause non specific. o mal definite . . . . .	6	10	4	12	6	14	2	54	31	6	1	2	4	13	

(a) Veggasi la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (h) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.

1936, distinti secondo 200 cause di morte.

e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	LOMBARDIA										VENEZIA TRIDENTINA				VENEZIO				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
	ALE di cui F	Bèrgamo	Brèscia	Como	Cremona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Varese	TOTALE		Bolzano	Trento	TOTALE		Belluno	Favilli (Udine)		Padova	Rovigo
											M	F			M	F					
160	17	35	21	10	13	6	66	2	6	12	171	72	15	20	35	11	6	20	16	3	160
	17	35	21	10	13	6	66	2	6	12	171	72	15	20	35	11	6	20	16	3	160
161	43	154	139	68	53	35	224	33	31	43	780	330	66	45	111	52	39	85	78	62	161
	43	154	139	68	53	35	224	33	31	43	780	330	66	45	111	52	39	85	78	62	161
	7	11	29	12	8	4	27	10	3	7	111	50	8	4	12	4	6	8	7	6	161
	34	138	105	52	42	30	192	21	28	36	644	269	53	39	92	44	31	73	71	55	161
	415	323	411	361	326	288	905	327	148	285	3374	1890	211	472	683	378	244	697	452	289	162
162	415	323	411	361	326	288	905	327	148	285	3374	1890	211	472	683	378	244	697	452	289	162
	36	11	10	11	11	9	105	11	2	2	171	99	3	7	10	5	13	9	20	5	162
	379	312	401	350	315	279	800	316	147	283	3203	1791	208	465	673	373	231	688	432	284	162
	127	265	388	231	148	154	932	222	86	171	2597	575	236	205	441	92	111	318	206	112	163
163	36	24	34	45	24	43	195	49	10	29	453	119	34	31	65	18	22	61	36	29	163
	36	24	34	45	24	43	195	49	10	29	453	119	34	31	65	18	22	61	36	29	163
171	6	—	—	5	3	1	26	3	1	2	43	21	2	—	2	—	1	—	2	1	171
163	6	—	—	5	3	1	26	3	1	2	43	21	2	—	2	—	1	—	2	1	171
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	2	5	8	15	3	15	30	18	2	11	107	18	11	6	17	5	9	21	9	10	165
165	2	5	8	15	3	15	30	18	2	11	107	18	11	6	17	5	9	21	9	10	165
166	7	7	9	10	5	14	24	17	3	2	91	34	3	11	14	4	3	13	10	7	166
167	2	6	8	6	5	7	44	6	2	4											

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno  
A. — Per Province

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segue: VENEZIA				VENEZIA GIULIA E ZARA							Totale		
		Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	TOTALE		Carnaro (Fiume)	Gorizia	Istria (Pola)	Trieste	Zara		Tot	
						M	F							M	F
	<b>Complesso . . .</b>	<b>6336</b>	<b>7076</b>	<b>7120</b>	<b>6927</b>	<b>50925</b>	<b>24573</b>	<b>1393</b>	<b>2804</b>	<b>4029</b>	<b>4767</b>	<b>411</b>	<b>13404</b>		
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie. . .</b>	<b>864</b>	<b>1055</b>	<b>1016</b>	<b>987</b>	<b>7145</b>	<b>3501</b>	<b>224</b>	<b>389</b>	<b>592</b>	<b>915</b>	<b>54</b>	<b>2174</b>		
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi . . .	44	76	82	43	403	218	5	16	15	10	3	49		
1	Febbre tifoidea (tifo addominale) . . .	43	75	77	38	381	206	5	13	15	10	3	46		
2	Paratifo . . . . .	1	1	5	5	22	12	—	3	—	—	—	3		
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	Febbre ondulante . . . . .	—	1	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—		
6	Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	a) vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	b) vaioloide, alastrim . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	c) non specificato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	Morbillo . . . . .	2	1	9	14	57	24	4	—	54	52	7	117		
8	Scarlattina . . . . .	6	4	5	5	26	11	—	—	—	1	1	2		
9	Tosse convulsa . . . . .	30	32	26	77	319	176	6	6	11	17	—	40		
10	Difterite . . . . .	55	52	22	45	277	131	—	15	8	29	1	53		
11	Influenza . . . . .	92	76	219	139	906	423	9	28	44	71	2	154		
	a) con complicazioni respiratorie indicate . . . . .	79	67	169	119	719	325	6	19	35	58	1	119		
	b) senza complicazioni respiratorie indicate . . . . .	13	9	50	20	187	98	3	9	9	13	1	35		
13	Dissenteria . . . . .	1	1	3	2	13	5	1	—	10	2	—	13		
	a) amebica . . . . .	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	2		
	b) bacillare . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	c) non specificata o dovuta ad altre cause . . . . .	1	1	2	1	9	3	—	—	—	—	—	3		
15	Risipola . . . . .	16	27	27	11	134	70	1	2	8	6	—	17		
16	Poliomielite a., polioencefalite acuta . . . . .	9	2	7	8	44	20	—	1	4	1	—	6		
17	Encefalite letargica o epidemica . . . . .	3	4	7	10	63	36	—	1	1	—	—	2		
18	Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	1	2	1	1	17	9	—	4	1	4	1	10		
19	Morva e Farcino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
20	Pustola maligna e carbonchio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	Rabbia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	Tetano . . . . .	20	12	15	9	82	24	2	5	9	9	1	26		
23 a 32	<b>Tubercolosi:</b>	<b>501</b>	<b>626</b>	<b>524</b>	<b>541</b>	<b>4185</b>	<b>2067</b>	<b>180</b>	<b>287</b>	<b>394</b>	<b>623</b>	<b>32</b>	<b>1516</b>		
23	dell'apparato respiratorio (b) . . . . .	370	404	400	382	2994	1430	148	230	321	501	26	1226		
24	delle meningi e sist. nervoso centr. degli intestini e del peritoneo (c) . . . . .	84	111	61	61	555	293	13	22	22	60	4	121		
25	della colonna vertebrale . . . . .	10	19	21	20	158	104	2	7	14	8	—	31		
26	delle ossa e delle articolazioni (d) . . . . .	11	21	10	10	95	45	1	3	5	3	—	12		
27	della pelle e sottocutaneo . . . . .	6	24	7	12	96	52	5	11	9	10	1	36		
28	del sistema linfatico (e) . . . . .	—	—	—	2	6	5	—	1	2	—	—	3		
29	dell'apparato genito-urinario . . . . .	1	5	—	3	20	9	1	—	2	1	—	4		
30	Altre localizzazioni della tubercolosi . . . . .	4	15	9	8	72	26	2	2	3	6	1	14		
31	Tubercolosi disseminata . . . . .	14	27	16	43	188	102	8	11	16	34	—	69		
	a) acuta . . . . .	8	22	8	21	100	55	4	5	8	21	—	38		
	b) cronica . . . . .	—	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—		
	c) non specificata . . . . .	6	4	8	22	85	45	4	6	8	13	—	31		
33	Lebbra . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1		
34	Sifilide . . . . .	18	20	7	9	90	30	9	5	8	48	—	70		
	a) congenita . . . . .	3	8	2	3	35	16	2	3	8	9	—	22		
	b) acquisita . . . . .	15	12	5	6	55	14	7	2	—	39	—	48		
	c) non specificata . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
35	Infez. gonococcica e altre m. veneree . . . . .	1	3	2	1	8	6	—	1	—	1	—	2		
36	Infez. purulenta e setticemia (f) . . . . .	49	99	56	60	416	212	6	12	21	32	1	72		
	a) setticemia . . . . .	46	92	51	51	367	196	5	12	15	27	1	60		
	b) piemia . . . . .	3	7	5	9	48	15	1	—	6	5	—	12		
	c) gangrena gassosa . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
38	Malaria . . . . .	5	8	—	1	30	13	—	—	2	3	2	7		
	a) febbre malarica . . . . .	4	3	—	—	17	8	—	—	1	3	—	4		
	b) cachessia palustre . . . . .	1	5	—	1	13	5	—	—	—	—	—	3		
39	Altre mal. dovute a protozoi paras. . . . .	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—		

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	EMILIA										TOSCANA						NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO			
	ALE	Bologna	Ferrara	Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'Emilia	TOTALE		Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca		Massa e Carrara	Pisa	Pistoia
										M	F									
	<b>6299</b>	<b>8917</b>	<b>4352</b>	<b>5378</b>	<b>5806</b>	<b>4914</b>	<b>3734</b>	<b>3390</b>	<b>4681</b>	<b>41172</b>	<b>19395</b>	<b>3985</b>	<b>10165</b>	<b>1992</b>	<b>2978</b>	<b>4331</b>	<b>2273</b>	<b>4121</b>	<b>2571</b>	
	<b>979</b>	<b>1240</b>	<b>655</b>	<b>701</b>	<b>720</b>	<b>487</b>	<b>423</b>	<b>385</b>	<b>569</b>	<b>5180</b>	<b>2583</b>	<b>476</b>	<b>1357</b>	<b>254</b>	<b>483</b>	<b>530</b>	<b>316</b>	<b>609</b>	<b>348</b>	
1 e 2	20	46	36	30	37	19	20	15	30	233	132	32	30	12	14	26	14	13	12	1 e 2
1	20	42	36	28	35	16	18	15	27	217	123	29	27	11	13	21	13	12	12	1
2	—	4	—	2	2	3	2	—	3	16	9	3	3	1	1	5	1	1	—	2
3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
5	—	6	4	—	1	5	—	—	7	23	10	2	3	3	6	4	5	2	5	0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
7	51	7	8	17	5	23	14	—	4	78	37	12	8	2	13	10	11	—	7	
8	1	5	1	2	2	5	—	1	2	18	10	7	10	1	2	2	1	—	8	
9	22	37	19	9	32	24	21	5	21	168	87	19	39	20	15	14	21	22	14	9
10	23	22	16	18	34	17	13	9	29	158	82	23	32	13	13	20	5	11	11	10
11	80	116	99	122	99	52	42	56	97	683	325	50	119	30	56	78	25	91	49	11
	60	98	79	87	86	41	34	48	80	553	262	48	106	22	48	65	17	76	42	a
	20	18	20	35	13	11	8	8	17	130	63	2	13	8	13	8	13	8	15	b
	5	2	1	2	1	2	3	2	1	12	5	1	3	1	1	1	1	1	—	13
	2	2	—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	a
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	2	—	—	—	—	—	—	b
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	c
15	9	27	8	14	16	22	15	13	10	125	61	12	36	11	4	10	5	12	12	15
16	5	3	3	7	1	2	1	1	2	20	6	3	3	—	3	1	2	5	1	16
17	2	8	6	7	10	5	3	2	7	48	24	3	7	—	3	1	2	4	2	17
18	3																			

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. A. — Per Provincie e Compartimenti.

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces/compartments (VENETO, VENEZIA GIULIA E ZARA, EMILIA, TOSCANA). Rows list various medical conditions like Anchilostomiasi, Cancro, and Reumatismo.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari).

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. A. — Per Province e Compartimenti.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE (a)', 'VENETO', 'VENÈZIA GIULIA E ZARA', 'EMILIA', and 'TOSCANA'. It contains detailed mortality statistics for various causes of death across these regions in 1936.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) ecettuate le malattie delle arterie coronarie.

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte.  
A. — Per Province e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segue: VENETO				VENEZIA GIULIA E ZARA							EMILIA										TOSCANA							NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO				
		Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	TOTALE		Carnaro (Fiume)	Gorizia	Istria (Pola)	Trieste	Zara	Tor ALE		Bologna	Ferrara	Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'Emilia	TOTALE		Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca		Massa e Carrara	Pisa	Pistoia	
						M F	di cui F						M F	di cui F									M F	di cui F										M F
93	Cangrena . . . . .	34	33	23	22	209	97	6	7	11	16	2	42	14	67	27	13	29	21	24	25	26	232	96	20	21	3	13	16	6	18	9	93	
	a) senile . . . . .	9	2	5	3	40	19	1	—	—	1	1	3	1	15	10	2	9	4	4	6	10	60	25	1	—	—	—	—	2	1	1	93	
	b) altre . . . . .	25	31	18	19	169	78	5	7	11	15	1	39	13	52	17	11	20	17	20	19	16	172	71	19	21	3	13	16	6	16	8	93	
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	8	24	14	6	83	42	1	3	—	6	1	11	8	20	8	8	9	9	5	4	4	65	31	3	16	1	6	—	3	5	2	99	
100	Mal. vene: varici, emorr., flebite, ecc. . . . .	10	9	10	6	63	33	2	4	—	7	—	13	8	11	7	5	6	7	2	1	4	43	23	2	—	—	2	7	4	7	5	100	
101	Mal. sist. linfatico, linfangioite, ecc. . . . .	2	3	5	1	15	8	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	1	8	3	—	4	—	2	1	1	2	2	101	
102	Anomalie idiopatiche press. sanguig. . . . .	—	—	—	—	6	4	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	7	4	—	1	—	—	—	—	—	2	2	102
103	Altre mal. dell'apparato circolatorio . . . . .	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	103
	<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio</b>	<b>1166</b>	<b>1319</b>	<b>1200</b>	<b>1499</b>	<b>8991</b>	<b>4038</b>	<b>218</b>	<b>478</b>	<b>678</b>	<b>832</b>	<b>96</b>	<b>2302</b>	<b>1007</b>	<b>1450</b>	<b>712</b>	<b>918</b>	<b>1096</b>	<b>985</b>	<b>657</b>	<b>578</b>	<b>828</b>	<b>7222</b>	<b>3366</b>	<b>774</b>	<b>1907</b>	<b>318</b>	<b>560</b>	<b>729</b>	<b>421</b>	<b>636</b>	<b>448</b>		
104	Malattie delle fosse nasali e annessi . . . . .	1	4	1	—	8	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	2	—	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	104
105	Malattie della laringe . . . . .	10	4	3	7	32	15	—	—	—	1	—	2	—	5	4	4	2	2	2	3	1	23	10	1	—	1	—	5	—	—	—	1	105
106	Bronchite . . . . .	136	127	165	175	1207	581	28	92	146	64	1	331	143	160	72	199	124	162	89	83	110	999	557	109	256	74	57	140	60	114	109	106	
	a) acuta . . . . .	19	22	14	34	181	79	2	21	15	15	—	53	29	30	22	34	12	17	19	9	8	151	87	18	34	7	13	19	8	17	7	106	
	b) cronica . . . . .	62	45	72	65	496	237	10	41	67	36	1	155	67	37	23	105	41	84	23	46	43	432	242	47	109	31	23	59	19	47	51	107	
	c) non specificata . . . . .	55	60	79	76	530	265	16	30	64	13	—	123	60	63	27	60	71	61	47	28	59	416	228	44	113	36	21	63	33	50	51	107	
107	Polmonite, tutte le forme . . . . .	903	1062	933	1164	6772	3097	155	341	462	643	92	1693	760	1118	575	629	888	757	509	427	646	5549	2463	604	1489	209	440	512	319	463	296	107	
109	Broncopolm., compr. la bronch. capil. . . . .	628	788	703	865	4999	2336	105	245	312	396	41	1999	518	815	434	450	667	559	363	308	471	4067	1889	442	1031	151	287	382	208	374	201	109	
108	Polmonite lobare . . . . .	275	274	230	299	1773	761	50	96	150	217	51	594	242	303	141	179	221	198	146	119	175	1482	574	162	458	58	153	130	111	89	95	108	
110	Pleuriti . . . . .	27	34	34	39	255	94	4	8	9	27	—	48	25	61	17	24	26	13	17	14	18	190	87	19	49	5	22	28	6	14	15	110	
111	Congestione, edema, ecc. del polm. (b) . . . . .	13	16	11	21	113	52	4	6	11	8	—	29	11	22	6	9	15	6	8	7	13	86	33	5	39	13	9	10	3	11	5	111	
112	Asma . . . . .	29	19	23	36	255	106	16	14	26	18	—	74	34	51	17	26	30	21	20	35	21	222	115	17	23	11	12	23	16	25	15	112	
113	Enfisema polmonare . . . . .	16	6	6	13	70	27	2	9	12	50	1	74	23	6	2	12	5	6	4	2	2	39	17	6	7	1	3	2	—	1	1	1	113
114	Altre mal. app. respiratorio (c) . . . . .	31	47	24	44	279	62	9	8	12	20	1	50	11	26	19	15	6	16	7	4	15	108	23	10	44	4	12	13	16	6	5	114	
	a) polmonite interstiziale cronica (d) . . . . .	2	4	7	6	34	14	1	1	1	2	—	5	—	4	1	—	—	1	—	—	1	7	3	3	1	—	—	—	—	—	—	2	114
	b) altre, compresa cangrena polmonare . . . . .	29	43	17	38	245	48	8	7	11	18	1	45	11	22	18	15	6	15	7	4	14	101	20	7	43	4	10	13	14	6	3	114	
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente</b>	<b>541</b>	<b>644</b>	<b>556</b>	<b>561</b>	<b>4235</b>	<b>1853</b>	<b>139</b>	<b>183</b>	<b>489</b>	<b>325</b>	<b>50</b>	<b>1186</b>	<b>501</b>	<b>588</b>	<b>349</b>	<b>461</b>	<b>420</b>	<b>356</b>	<b>283</b>	<b>199</b>	<b>381</b>	<b>3037</b>	<b>1229</b>	<b>288</b>	<b>577</b>	<b>152</b>	<b>321</b>	<b>279</b>	<b>235</b>	<b>270</b>	<b>158</b>		
115	Malattie della cavità boccale, ecc. (e) . . . . .	14	13	15	14	102	54	2	4	7	10	2	25	10	13	13	10	9	13	14	5	9	86	42	5	18	3	6	7	4	10	1	115	
116	Malattie dell'esofago . . . . .	—	—	1	—	4	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	116
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . . . . .	52	39	32	34	318	71	14	40	32	46	—	132	22	51	19	42	23	29	19	25	31	239	35	22	71	17	26	32	9	38	11	117	
	a) stomaco . . . . .	36	21	26	25	219	60	11	33	27	29	—	100	19	24	8	35	16	18	14	15	26	156	27	17	53	15	17	25	7	28	6	117	
	b) duodeno . . . . .	16	18	6	9	99	11	3	7	5	17	—	32	3	27	11	7	7	11	5	10	5	83	8	5	21	2	9	7	2	10	5	117	
118	Altre mal. dello stom. (cancro eccett.) . . . . .	9	8	8	13	74	37	2	3	8	1	—	14	8	10	1	13	19	9	11	4	6	73	34	3	9	1	—	4	6	7	2	118	
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . . . .	197	270	219	244	1732	780	69	52	305	100	28	555	254	97	156	160	131	86	87	37	142	896	406	114	69	45	46	67	111	33	23	119	
120	Enteriti e ulcera intest. (2 anni e più) . . . . .	32	66	58	39	369	185	12	7	53	28	7	107	51	55	22	47	27	35	39	21	37	283	133	28	45	16	27	37	33	49	29	120	
	a) enterite . . . . .	29	59	58	37	344	179	12	7	52	22	6	99	48	51	21	42	24	32	38	18	36	262	128	27	41	14	27	34	32	46	25	120	
	b) ulcera intestinale . . . . .	3	7	—	2	25	6	—	—	1	6	1	8	3	4	1	5	3	3	1	3	1	21	5	1	4	—	—	3	1	3	1	120	
121	Appendicite . . . . .	39	37	41	31	275	118	4	8	16	27	3	58	24	66	27	52	36	35	11	20	25	272	100	13	64	10	25	13	12	17	12	121	
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	48	57	50	48	355	170	10	20	24	36	2	92	44	80	29	39	48	35	30	28	38	327	142	21	96	12	25	37	16	33	26	122	
	a) ernia . . . . .	20	24	23	19	147	63	3	9	12	18	2	44	11	37	13	16	19	20	9	11	11	136	40	4	29	7	11	14	7	15	9	122	
	b) occlusione intestinale . . . . .	28	33	27	29	208	107	7																										



Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti. A. — Per Province

Table with columns for provinces (Veneto, Venezia Giulia e Zara) and causes of death (160-200). Includes sub-headers for 'CAUSE DI MORTE (a)', 'TAVOLA I.', and 'A. — Per Province'.

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti. B. — Per Compartimenti

Table with columns for regions (Emilia, Toscana) and causes of death (160-200). Includes sub-headers for 'EMILIA', 'TOSCANA', and 'B. — Per Compartimenti'.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno e più. (e) eccettuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (l) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno e più. (e) eccettuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (l) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.



Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (TOSCANA, MARCHE, UMBRIA). Rows include categories like 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', and 'Tubercolosi'.

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (LAZIO, ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA). Rows include categories like 'Complesso', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', and 'Tubercolosi'.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna

vertebrale eccettuata. (e) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali. (f) non puerperali.



Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno

A. — Per Province

Table with columns for Cause di Morte (a), Province (Toscana, Marche, Umbria), and Mortality counts (M, F, Total). Rows include Anemie, Leucemie e aleucemie, Malattie della milza, V.-Avvelenamenti cronici e intossicaz., Alcoolismo, Avvelenam. cronici da sost. organ., Avvelenam. cronici da sost. minerali, VI. - Malattie del sistema nervoso, ecc. (b), VII. - Malattie dell'apparato circolatorio, and Malattie del cuore.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

1936, distinti secondo 200 cause di morte.

e Compartimenti.

Table with columns for Cause di Morte (a), Compartimenti (Lazio, Abruzzi e Molise, Campania), and Mortality counts (M, F, Total). Rows include Anemie, Leucemie e aleucemie, Malattie della milza, V.-Avvelenamenti cronici e intossicaz., Alcoolismo, Avvelenam. cronici da sost. organ., Avvelenam. cronici da sost. minerali, VI. - Malattie del sistema nervoso, ecc. (b), VII. - Malattie dell'apparato circolatorio, and Malattie del cuore.

90 a 95  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. A. — Per Provincie

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for Cause di Morte (a), Provincia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania), and Numeri dell'elenco nosologico. Rows list various medical conditions like Congrenza, Altre malattie delle arterie, Bronchite, etc., with corresponding mortality counts.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali

dell'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (f) e dell'apparato genitale.

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. A. — Per Provincie e Compartimenti.

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE (a)), provinces (e.g., TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA), and mortality counts (M F, di cui F). Includes sub-headers like 'Segue: TOSCANA' and 'Totale' for each region.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come improvvisa puerperale (non specificata come settica). (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare.

veneree. (d) ma comprese le emorragie. (e) non comprese le emorragie. (f) non specificate come conseguenza d'aborto. (g) embolia o morte (i) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli altri organi della locomozione. (n) non compresi i nati morti.

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. A. — Per Provincie e Compartimenti.

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for provinces (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania) and various causes of death (e.g., Consequenze del parto, Altre malattie speciali dell'infanzia, Senilità, Morti violente e accidentali, Suicidi, Omicidi, Morti accidentali, Morsi o punture d'animali velenosi, etc.).

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno e più. (e) eccettuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte. A. — Per Provincie

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PUGLIE						LUCANIA				CALABRIE				SICILIA										SARDEGNA					NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO				
		Bari	Brindisi	Foggia	Jonio (Taranto)	Lecce	TOTALE		Matera	Potenza	TOTALE		Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	TOTALE		Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	TOTALE		Cagliari	Nuoro		Sassari	TOTALE		
							M	F			di cui F	M				F	M										F	di cui F					M	F	di cui F
	<b>Complesso . . .</b>	<b>16899</b>	<b>4269</b>	<b>8561</b>	<b>4741</b>	<b>8567</b>	<b>43037</b>	<b>21180</b>	<b>3123</b>	<b>6439</b>	<b>9562</b>	<b>4841</b>	<b>4961</b>	<b>7914</b>	<b>7889</b>	<b>25264</b>	<b>12941</b>	<b>6258</b>	<b>4050</b>	<b>10411</b>	<b>3586</b>	<b>8555</b>	<b>13095</b>	<b>2964</b>	<b>3857</b>	<b>4761</b>	<b>57447</b>	<b>23569</b>	<b>7364</b>	<b>3114</b>	<b>4236</b>	<b>14714</b>	<b>7938</b>		
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie . . .</b>	<b>1933</b>	<b>446</b>	<b>1005</b>	<b>573</b>	<b>1306</b>	<b>5263</b>	<b>2673</b>	<b>301</b>	<b>585</b>	<b>886</b>	<b>447</b>	<b>1020</b>	<b>738</b>	<b>676</b>	<b>2434</b>	<b>1229</b>	<b>578</b>	<b>350</b>	<b>890</b>	<b>221</b>	<b>856</b>	<b>1602</b>	<b>286</b>	<b>324</b>	<b>452</b>	<b>5559</b>	<b>2892</b>	<b>1304</b>	<b>577</b>	<b>757</b>	<b>2639</b>	<b>1409</b>		
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi . . . . .	134	21	58	61	20	294	156	21	40	61	38	30	48	51	129	69	44	24	95	14	37	134	25	37	28	438	235	27	14	16	57	32	1 e 2	
1	Febbre tifoidea (tifo addominale) . . . . .	133	16	54	56	17	276	148	15	31	46	28	19	47	37	103	58	41	19	93	13	23	129	24	31	27	400	216	19	9	13	41	23	1	
2	Paratifo . . . . .	1	5	4	5	3	18	8	6	9	15	10	11	1	14	26	11	3	5	2	1	14	1	6	1	38	19	8	5	3	16	9	2		
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
5	Febbre ondulante . . . . .	5	—	4	—	2	11	9	—	1	1	—	5	—	3	8	3	8	1	13	3	10	—	—	6	—	51	22	3	7	1	11	6	5	
6	Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	a) vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) vaioloide, alastrim . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	c) non specificato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
7	Morbillo . . . . .	88	64	123	56	252	583	279	42	96	138	57	74	36	—	110	47	1	2	15	8	71	2	—	1	—	100	42	41	8	14	63	28	7	
8	Scarlattina . . . . .	2	2	11	3	1	19	9	2	13	15	8	4	1	5	10	2	5	2	6	3	9	5	3	1	1	35	19	24	19	4	47	27	8	
9	Tosse convulsa . . . . .	15	6	7	26	13	67	49	3	27	30	19	81	7	19	107	59	8	3	29	7	32	6	1	5	123	70	59	19	13	91	56	9		
10	Difterite . . . . .	43	7	22	20	21	113	57	16	7	23	7	20	28	25	73	32	18	10	20	7	24	75	8	9	22	193	79	21	11	26	53	20	10	
11	Influenza . . . . .	724	60	226	29	151	1190	546	45	79	124	57	205	152	107	464	239	79	68	61	30	58	191	22	15	48	572	275	181	79	85	345	159	11	
	a) con complicazioni respiratorie indicate . . . . .	565	48	164	27	122	926	413	23	56	79	38	153	118	75	346	171	43	28	47	27	44	142	14	12	37	394	182	138	66	69	273	126	a	
	b) senza complicazioni respiratorie indicate . . . . .	159	12	62	2	29	264	133	22	23	45	19	52	34	32	118	68	36	40	14	3	14	49	8	3	17	78	93	43	16	72	33	b		
13	Dissenteria . . . . .	5	—	—	2	1	8	3	1	3	4	1	6	4	7	17	9	16	3	14	2	10	22	1	1	1	70	33	13	4	3	20	9	13	
	a) amebica . . . . .	—	—	—	2	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	11	1	7	2	4	11	1	1	1	39	18	1	—	—	—	—	a	
	b) bacillare . . . . .	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	3	1	1	1	1	—	2	2	—	—	—	6	2	3	—	—	5	2	b	
	c) non specificata o dovuta ad altre cause . . . . .	3	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	5	2	6	13	7	4	1	7	—	4	9	—	—	—	25	13	9	2	3	14	7	c	
15	Risipola . . . . .	34	13	38	16	29	130	68	4	13	17	6	23	15	20	58	37	10	8	7	5	16	25	5	4	6	86	43	12	3	13	28	12	15	
16	Poliomielite a., polioencefalite acuta . . . . .	7	—	8	4	4	23	15	2	3	5	2	8	6	7	21	10	12	2	—	5	6	21	1	2	13	62	32	6	7	2	15	6	16	
17	Encefalite letargica o epidemica . . . . .	4	—	2	—	1	7	4	—	—	—	—	8	2	4	14	8	2	—	1	1	3	3	—	—	11	5	5	—	2	7	2	17		
18	Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	2	1	—	1	—	4	3	—	2	—	—	1	1	2	4	3	2	—	6	—	—	17	—	—	3	28	11	4	2	1	7	2	18	
19	Morva e farcino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
20	Pustola maligna e carbonchio . . . . .	5	—	5	1	1	12	5	2	11	13	6	6	1	4	11	5	1	2	1	—	1	6	—	2	3	16	8	5	6	—	11	4	20	
21	Rabbia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
22	Tetano . . . . .	17	1	2	—	8	28	4	1	1	2	1	6	2	11	19	7	4	5	13	2	8	13	1	—	8	54	22	9	3	2	14	3	22	
23 a 32	<b>Tubercolosi:</b>	<b>695</b>	<b>189</b>	<b>335</b>	<b>287</b>	<b>632</b>	<b>2138</b>	<b>1175</b>	<b>85</b>	<b>206</b>	<b>291</b>	<b>165</b>	<b>337</b>	<b>305</b>	<b>277</b>	<b>919</b>	<b>489</b>	<b>181</b>	<b>131</b>	<b>444</b>	<b>79</b>	<b>387</b>	<b>836</b>	<b>146</b>	<b>202</b>	<b>244</b>	<b>2650</b>	<b>1519</b>	<b>645</b>	<b>291</b>	<b>463</b>	<b>1399</b>	<b>846</b>	<b>23 a 32</b>	
23	dell'apparato respiratorio (b) . . . . .	490	135	237	197	448	1507	838	56	119	175	102	335	207	218	660	375	133	102	337	43	309	662	128	149	180	2043	1170	431	173	330	934	587	23	
24	delle meningi e sist. nervoso centr. . . . .	98	35	51	48	93	325	164	9	19	28	14	41	27	18	86	37	13	13	54	8	31	81	11	29	23	263	141	67	47	67	181	93	24	
25	degli intestini e del peritoneo (c) . . . . .	50	4	29	18	42	143	91	4	30	34	19	24	21	12	57	23	12	6	17	11	21	29	4	13	13	126	93	43	23	24	90	55	25	
26	della colonna vertebrale . . . . .	9	—	3	6	11	29	14	5	5	10	6	8	13	9	30	17	9	1	5	3	4	14	1	7	9	53	24	12	9	7	28	17	26	
27	delle ossa e delle articolazioni (d) . . . . .	25	2	6	6	7	46	23	4	7	11	8	15	15	12	42	20	6	3	11	6	7	15	2	2	7	59	31	23	18	7	48	28	27	
28	della pelle e sottocutaneo . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	2	1	4	3	—	2	1	1	—	—	—	—	1	6	3	—	2	4	3	28		
29	del sistema linfatico (e) . . . . .	4	1	1	—	4	10	4	1	9	10	2	1	4	2	7	—	2	—	2	2	3	3	—	1	2	15	9	13	4	3	20	13	29	
30	dell'apparato genito-urinario . . . . .	2	—	1	1	3	7	6	2	2	4	3	—	4	—	4	1	1	2	1	—	1	8	—	—	4	17	7	1	1	3	5	4	30	
31	Altre localizzazioni della tubercolosi . . . . .																																		





Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Province

1936, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PUGLIE					LUCANIA				CALABRIE					SICILIA								SARDEGNA				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO										
		Bari	Brindisi	Foggia	Jonio (Taranto)	Lecce	TOTALE			Matera	Potenza	TOTALE		Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	TOTALE		Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani		TOTALE		Cagliari	Nuoro	Sassari	TOTALE				
							M	F	di cui F			M	F				di cui F	M											F	di cui F				M	F	di cui F	M	F
71	Anemie a) anemia pernicioso progressiva b) altre	23 11 12	6 4 2	18 7 11	9 3 6	46 20 26	102 45 57	59 26 33	6 1 5	13 7 6	19 8 11	13 6 7	17 8 9	28 12 16	30 14 16	75 34 41	48 26 22	22 12 10	17 6 11	11 7 4	19 8 11	37 19 18	23 4 19	12 5 7	26 15 11	203 90 113	128 61 67	27 8 19	15 6 9	9 5 4	51 19 32	29 15 14	71 15 14					
72	Leucemie e aleucemie a) leucemie vere b) aleucemie	22 14 8	6 4 2	13 10 3	12 7 5	16 11 5	69 46 23	38 27 11	4 3 1	11 6 5	15 7 6	5 2 3	16 8 8	15 8 7	13 9 4	44 25 19	20 15 5	11 8 3	3 3 1	27 22 5	2 1 1	17 10 7	15 7 5	11 7 4	4 2 2	97 69 28	50 37 13	14 1 1	9 3 6	24 17 7	10 5 5	72 17 5						
73	Malattie della milza	1	—	—	1	4	8	2	—	4	3	7	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73		
74	Altre mal. sangue e org. ematopoietici.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74		
	V. - Avvelenamenti cronici e intossicaz.	5	1	1	—	7	14	1	2	3	5	1	2	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2	7	4	2	13	4	—	—			
75	Alcoolismo a) acuto b) cronico	5 — —	1 — —	1 — —	— — —	6 — 6	13 2 11	1 — 1	2 — 2	3 — 1	5 — 3	1 — 1	2 — —	1 — —	1 — —	4 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	75			
76	Avvelenam. cronici da sost. organ. a) professionali b) altri	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	76		
77	Avvelenam. cronici da sost. minerali. a) professionali b) altri	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	77		
	VI. - Malattie del sistema nervoso, ecc. (b)	1999	406	952	551	878	4786	2291	331	714	1045	529	1100	939	735	2774	1340	635	355	1129	339	939	1322	363	594	627	6213	3043	624	198	343	1165	568	—	—			
78	Encefalite (non epidemica) a) ascesso del cervello b) altre	12 2 10	1 — —	2 — 2	6 4 4	8 4 21	29 8 10	11 1 10	2 — 1	2 — 2	4 1 3	2 — 2	11 2 9	3 — 3	3 1 2	17 3 14	6 — 6	6 1 5	2 — 1	4 — 4	1 — 1	3 — 3	8 3 5	6 4 2	1 1 1	32 9 23	15 5 10	9 3 3	5 — 4	17 4 13	12 2 10	78 4 10						
79	Meningite semplice	47	22	54	31	68	222	109	18	16	34	16	47	16	56	119	49	17	12	39	6	24	38	6	8	4	154	72	51	16	31	98	45	—	—			
80	Atassia locomotrice progressiva	11	3	1	3	2	20	2	1	5	6	4	3	10	2	15	5	2	—	2	3	2	2	—	—	—	1	12	1	4	1	5	—	—	—	80		
81	Altre malattie del midollo spinale	8	6	8	6	10	38	16	5	5	10	4	16	10	11	37	13	9	3	16	6	19	10	4	8	13	88	34	9	5	6	20	10	—	—			
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebr. a) emorragia cerebrale b) embolia e trombosi cerebrale c) emiplegia ed altre paralisi (c)	1467 1151 222	325 254 57	697 574 97	415 318 79	610 487 102	3514 1344 557	1718 1067 296	233 167 56	483 338 102	716 505 158	377 264 86	661 486 126	677 490 151	526 414 79	1864 1390 356	924 682 181	488 405 48	292 232 26	951 730 147	293 255 19	764 634 78	1105 928 88	295 220 40	430 361 27	564 466 46	5182 4231 519	2605 2098 289	469 333 67	145 95 19	255 193 21	869 621 107	429 297 55	— — —	— — —	— — —	— — —	82
83	Paralisi progressiva degli alienati	15	3	—	—	13	32	10	1	2	1	1	9	1	3	13	5	9	—	6	1	9	2	1	—	—	5	53	7	3	1	3	7	—	—	—		
84	Demenza precoce e altre psicosi a) demenza precoce b) altre psicosi	15 2 13	— — —	— — —	— — —	9 2 9	26 2 24	13 2 11	2 — 2	6 — 4	8 — 6	3 — 2	23 10 13	5 2 3	11 2 2	39 14 25	21 6 15	10 5 5	2 — 1	10 4 6	1 — 1	9 3 6	33 4 29	3 3 7	10 3 2	80 20 60	44 14 30	7 1 6	2 — 2	4 2 10	13 3 5	6 1 5	— — —	— — —	— — —	— — —	84	
85	Epilessia	34	7	12	2	19	74	27	5	26	31	19	39	22	20	81	33	10	9	19	4	22	22	8	7	13	114	47	19	10	11	40	15	—	—			
86	Convulsioni (bambini — 5 anni)	343	19	131	78	110	681	308	55	142	197	83	252	155	73	480	231	62	20	45	15	57	38	23	30	10	300	134	21	6	3	30	16	—	—			
87	Altre malattie del sistema nervoso a) corea b) nevrite c) paralisi agitante d) sclerosi a placche e) altre	31 2 1 13 15	15 — — — —	30 3 — — —	3 — — — —	20 5 3 7 45	99 4 3 7 28	58 4 2 5 11	8 4 2 2 2	25 6 2 7 13	33 10 7 3 8	18 6 3 3 13	26 1 3 9 13	35 1 1 7 20	25 1 1 7 14	86 4 3 10 24	39 3 2 8 6	18 — — — —	6 — — — —	21 — — — —	6 — — — —	25 — — — —	29 — — — —	11 — — — —	3 — — — —	133 8 5 55 57	61 6 2 16 34	19 2 — 7 9	8 — — 2 6	19 — — 9 23	19 — — 11 11	46 4 1 18 23	24 2 — 11 11	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	87
88	Malattie degli organi della vista	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	Mal. dell'orecchio e del seno mastoideo a) otite b) altre	16 9 7	6 3 3	12 11 1	7 5 2	9 7 15	50 35 15	19 15 4	1 1 —	2 2 —	3 3 —	1 — —	13 11 2	5 4 3	5 2 3	23 18 5	14 13 1	4 4 —	9 7 —	15 12 3	4 3 1	4 2 2	4 3 3	16 13 4	5 3 3	6 3 1	64 49 15	27 18 9	13 11 2	2 2 —	5 4 1	20 17 3	8 8 —	— — —	— — —	— — —	— — —	89
	VII. - Malattie dell'apparato circolatorio	1883	481	735	443	774	4316	2430	265	799	1064	649	1838	1025	937	3050	1793	746	326	1138	380	1206	1756	342	388	642	6924	3372	682	338	372	1392	752	—	—			
90 a 95	Malattie del cuore:	1521	399	651	373	612	3556	2077	215	707	922	574	851	879	790	2520	1534	561	239	866	343	994	1268	245	315	390	5221	3009	559	293	318	1170	654	90 a 95				
90	Pericardite	1	—	1	3	1	6	2	4	7	11	5	1	3	2	6	1	—	1	1	1	3	2	—	3	1	12	4	—	3	3	6	3	—	—			
91	Endocardite acuta	11	3	7	1	10	32	20	1	2	3	3	7	6	2	15	9	4	2	8	4	6	9	2	1	1	37	23	2	6	10	7	—	—				
92	Endocardite cr., comp. le aff. valvol.	700	182	290	155	272	1599	980	87	353	440	282	426	408	296	1130	723	246	99	347	153	350	103	142	135	1918	1187	239	134	126	499	295	—	—				
93	Malattie del miocardio a) miocardite acuta b) miocardite cron. e degeneraz. del miocardio c) non specificate	452 5 200	147 — 90	174 7 72	132 2 52	196 1 138	1101 15 319	646 9 35	83 1 35	178 2 86	261 3 121	164 3 76	183 1 101	204 3 96	262 6 293	649 6 181	391 3 29	71 2 13	40 2 29	190 3 13	33 — 19	279 2 150	217 1 110	44 1 22	89 1 49	59 1 18	1022 13 492	553 5 268	149 4 97	95 2 60	104 5 52	348 11 209	187 7 112	— — —	— — —	— — —	— — —	93
94	Mal. arterie coronarie e angina pect.	70	21	41	20	22	174	55	6	37	43	20	52	44	25	121	43	26	20	55	15	44	84	19	23	25	311											

## Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno

A. — Per Province

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PUGLIE					LUCANIA					
		Bari	Brindisi	Foggia	Jonio (Taranto)	Lecce	TOTALE		Matera	Potenza	TOTALE	
							M F	di cui F			M F	di cui F
98	Cangrena . . . . .	30	4	12	6	23	75	37	1	9	10	6
	a) senile . . . . .	3	—	1	1	5	10	6	—	—	6	—
	b) altre . . . . .	27	4	11	5	18	65	31	1	9	4	6
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	20	8	3	8	16	55	24	2	5	7	4
100	Mal. vene: varici, emorr., flebite, ecc.	7	—	2	1	1	11	5	—	1	1	1
101	Mal. sist. linfatico, linfangioite, ecc.	2	—	2	2	5	11	7	—	1	1	1
102	Anomalie idiopatiche press. sanguig.	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
103	Altre mal. dell'apparato circolatorio	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	<b>VIII. — Malattie dell'apparato respiratorio</b>	<b>4198</b>	<b>1061</b>	<b>2031</b>	<b>1050</b>	<b>1901</b>	<b>10241</b>	<b>4762</b>	<b>775</b>	<b>1381</b>	<b>2156</b>	<b>984</b>
104	Malattie delle fosse nasali e annessi .	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—
105	Malattie della laringe . . . . .	9	2	11	1	4	27	13	4	10	14	9
106	Bronchite . . . . .	665	179	325	177	272	1618	784	188	379	567	294
	a) acuta . . . . .	138	79	65	44	61	387	185	55	94	149	75
	b) cronica . . . . .	221	52	90	66	120	549	275	51	91	142	87
	c) non specificata . . . . .	306	48	170	67	91	682	324	82	194	276	132
107	<i>Polmonite, tutte le forme . . . . .</i>	<i>3274</i>	<i>836</i>	<i>1609</i>	<i>800</i>	<i>1512</i>	<i>8031</i>	<i>3755</i>	<i>541</i>	<i>919</i>	<i>1460</i>	<i>621</i>
107	Broncopolm., compr. la bronch. capil.	2634	641	1110	612	1095	6092	2900	440	759	1199	521
108	Polmonite lobare . . . . .	640	195	499	188	417	1939	855	101	160	261	100
110	Pleuriti . . . . .	106	15	30	21	32	204	84	17	26	43	25
111	Congestione, edema, ecc. del polm. (b)	16	5	9	8	15	53	19	1	5	6	2
112	Asma . . . . .	59	10	21	18	37	145	60	11	25	36	20
113	Enfisema polmonare . . . . .	17	4	2	2	14	39	13	4	7	11	2
114	Altre mal. app. respiratorio (c) . . . .	51	9	24	23	15	122	33	9	10	19	11
	a) polmonite interstiziale cronica (d)	8	—	8	4	1	21	8	2	4	6	4
	b) altre, compresa cangrena polmonare .	43	9	16	19	14	101	25	7	6	13	7
	<b>IX. — Malattie dell'apparato digerente .</b>	<b>2435</b>	<b>803</b>	<b>1814</b>	<b>938</b>	<b>1602</b>	<b>7592</b>	<b>3687</b>	<b>697</b>	<b>1164</b>	<b>1861</b>	<b>912</b>
115	Malattie della cavità boccale, ecc. (e)	27	8	15	15	14	79	32	8	18	26	11
116	Malattie dell'esofago . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno . .	47	12	19	21	37	136	36	3	24	27	9
	a) stomaco . . . . .	34	10	14	13	28	99	25	2	19	21	6
	b) duodeno . . . . .	13	2	5	8	9	37	11	1	5	6	3
118	Altre mal. dello stom. (cancro eccett.)	38	5	39	6	23	111	60	12	11	23	13
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . . .	1621	562	1239	651	1073	5146	2538	507	815	1322	650
120	Enteriti e ulcera intest. (2 anni e più)	310	120	290	115	233	1068	551	86	152	238	129
	a) enterite . . . . .	305	119	287	114	232	1057	549	85	149	234	127
	b) ulcera intestinale . . . . .	5	1	3	1	1	11	2	1	3	4	2
121	Appendicite . . . . .	50	13	29	31	24	147	63	5	12	17	9
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	106	25	60	30	61	282	111	29	46	75	29
	a) ernia . . . . .	54	15	28	18	31	146	52	15	22	37	14
	b) occlusione intestinale . . . . .	52	10	32	12	30	136	59	14	24	38	15
123	Altre malattie dell'intestino . . . . .	9	7	2	4	6	23	17	2	2	4	1
124	Cirrosi del fegato . . . . .	99	19	63	29	67	277	105	19	39	58	22
	a) alcoolica . . . . .	1	1	1	1	1	5	1	1	1	2	—
	b) non indicata come alcoolica . . . .	98	18	62	28	66	272	105	18	38	56	22
125	Altre mal. fegato (comp. atrofia gialla)	32	8	14	6	10	70	35	6	8	14	6
126	Calcolosi biliare . . . . .	13	6	4	6	8	37	25	2	8	10	8
127	Altre m. della vescichetta e vie biliari	24	8	16	13	15	76	44	8	5	13	6
128	Malattie del pancreas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Peritonite senza causa indicata . . . .	59	10	24	11	31	135	70	10	21	31	18
	<b>X. — Malattie dell'apparato urinario, ecc. (f)</b>	<b>716</b>	<b>148</b>	<b>259</b>	<b>196</b>	<b>277</b>	<b>1596</b>	<b>681</b>	<b>110</b>	<b>221</b>	<b>331</b>	<b>163</b>
130	<i>Nefrite:</i>	<i>606</i>	<i>125</i>	<i>203</i>	<i>162</i>	<i>225</i>	<i>1321</i>	<i>630</i>	<i>84</i>	<i>183</i>	<i>267</i>	<i>146</i>
130	acuta . . . . .	219	46	59	48	81	453	193	34	66	100	52
131	cronica . . . . .	199	47	68	60	87	461	238	28	57	85	48
132	non specificata . . . . .	188	32	76	54	57	407	194	22	60	82	46

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombotici. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali

## 1936, distinti secondo 200 cause di morte.

e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CALABRIE				SICILIA								SARDEGNA				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO					
	Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	TOTALE		Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	TOTALE			Cagliari	Nuoro	Sassari	TOTALE	
				M F	di cui F										M F	di cui F					M F	di cui F
98	22	17	10	49	31	10	4	19	2	9	28	8	8	14	102	41	13	3	13	29	10	98
	7	4	4	15	10	1	2	3	1	1	3	2	5	1	19	9	1	1	1	3	2	10
	15	13	6	34	21	9	2	16	1	8	25	6	3	13	83	32	12	2	12	26	8	8
99	19	6	17	42	21	1	1	34	2	10	16	6	5	14	89	45	3	1	3	7	5	99
100	2	7	1	10	5	—	—	2	—	2	4	1	1	4	16	7	2	1	1	4	1	100
101	2	1	2	5	3	1	1	2	2	1	9	—	1	1	18	8	3	1	—	4	3	101
102	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	102
103	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	1	—	—	7	3	—	1	1	2	2	103
	<b>2004</b>	<b>1518</b>	<b>1736</b>	<b>5258</b>	<b>2555</b>	<b>1238</b>	<b>761</b>	<b>1945</b>	<b>793</b>	<b>1692</b>	<b>2312</b>	<b>477</b>	<b>706</b>	<b>802</b>	<b>10726</b>	<b>4998</b>	<b>1512</b>	<b>547</b>	<b>800</b>	<b>2359</b>	<b>1184</b>	<b>104</b>
104	—	2	1	3	—	1	1	2	1	—	2	—	—	—	7	4	1	—	—	1	—	104
105	9	19	11	39	12	9	4	9	3	9	3	2	2	4	45	21	3	3	5	11	4	105
106	327	366	354	1047	564	189	135	349	161	207	283	98	92	115	1635	813	185	91	82	358	186	106
	48	74	38	160	89	45	27	53	21	39	57	19	8	29	208	151	23	10	14	47	26	a
	82	94	55	231	131	63	43	105	50	78	105	39	25	33	541	267	69	46	37	152	80	b
	197	198	261	656	344	81	66	191	90	90	126	40	59	53	796	395	93	35	31	159	80	c
107	1568	1037	1263	3868	1824	969	563	1448	583	1362	1803	341	575	632	8276	3739	1216	425	671	2312	921	107
109	352	326	406	1084	513	304	220	442	214	338	658	93	180	164	2623	1145	379	156	209	744	252	108
110	30	24	29	83	43	18	14	47	10	42	76	11	10	21	249	112	35	8	15	58	24	110
111	14	7	11	32	9	9	3	9	3	17	34	3	7	5	90	39	6	3	4	13	8	111
112	31	45	47	123	70	30	31	49	26	31	61	16	12	19	275	139	33	10	15	58	26	112
113	8	9	3	20	13	2	3	7	3	6	3	3	—	—	27	9	7	2	3	12	2	113
114	17	9	17	43	20	11	6	25	3	18	42	3	8	6	122	32	26	5	5	36	13	114
	6	2	4	12	10	3	2	2	—	2	2	1	—	—	12	6	13	2	2	17	5	a
	11	7	13	31	10	8	4	23	3	16	40	2	8	6	110	26	13	3	3	19	8	b

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno

A. — Per Province

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PUGLIE					LUCANIA					
		Bari	Brindisi	Foggia	Jonio (Taranto)	Lecce	TOTALE		Matera	Potenza	TOTALE	
							M	F			M	F
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b) . . . . .	19	6	14	7	12	58	20	3	8	11	5
	a) pielite . . . . .	6	2	5	6	7	26	8	4	4	4	3
	b) altre . . . . .	13	4	9	1	5	32	12	3	4	7	2
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	10	2	4	3	6	25	7	2	1	3	1
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori . . . . .	7	1	4	3	5	20	7	1	1	3	1
	b) calcolosi della vescica . . . . .	3	1	—	—	1	5	—	—	—	—	—
	c) calcolosi senza altre indicazioni . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori . . . . .	29	8	16	11	13	77	10	7	12	19	3
	a) cistite . . . . .	27	5	16	9	11	68	9	6	10	16	2
	b) altre . . . . .	2	3	—	2	2	9	1	1	2	3	1
136	Mal. dell'uretra, accesso urinoso, ecc. . . . .	8	—	3	2	2	15	—	—	3	3	—
	a) stenosi uretrale . . . . .	4	—	2	2	1	9	—	—	3	3	—
	b) altre . . . . .	4	—	1	—	1	6	—	—	—	—	—
137	Malattie della prostata . . . . .	41	2	15	8	18	84	11	9	20	—	—
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c) . . . . .	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
139	Mal. organi genitali della donna (c) . . . . .	2	4	4	3	1	14	14	3	5	8	8
	a) ovale, trombe e parametri . . . . .	1	1	1	1	—	4	4	1	4	5	5
	b) utero . . . . .	1	1	2	1	—	5	5	1	1	2	2
	c) mammelle . . . . .	—	2	1	1	—	4	4	—	—	—	—
	d) altre . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
	<b>XI. — Malattie gravidanza, parto e puerp.</b>	<b>72</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
140	Aborto con condizioni settiche . . . . .	5	—	1	2	1	9	9	—	—	—	—
141	Aborto, senza ind. di cond. settiche (d) . . . . .	4	1	1	—	1	7	7	—	—	—	—
142	Gestazione ectopica . . . . .	4	1	2	1	—	8	8	1	1	1	1
143	Altri accidenti della gravidanza (e) . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1
144	Emorragia puerperale . . . . .	14	5	13	10	11	53	53	5	9	14	14
	a) da placenta previa . . . . .	3	3	3	3	5	16	16	1	4	5	5
	b) altre emorragie . . . . .	11	2	10	7	6	37	37	4	5	9	9
145	Setticemia e infezioni puerperali (f) . . . . .	19	5	23	8	13	68	68	4	8	12	12
	a) setticemia e piemia puerperali . . . . .	19	5	23	8	13	68	68	4	8	12	12
	b) tetano puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerperale . . . . .	17	9	4	7	5	42	42	3	4	7	7
147	Altre forme di tossiemia della grav. . . . .	1	—	1	—	1	3	3	2	—	2	2
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g) . . . . .	3	—	2	3	2	10	10	—	1	1	1
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . .	3	—	1	—	1	5	5	—	—	—	—
	b) embolia o morte improvvisa . . . . .	—	—	1	3	1	5	5	—	1	1	1
149	Altri accidenti del parto . . . . .	5	—	—	1	4	10	10	1	5	6	6
150	Altre malattie non definite (h) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XII. — Malattie della pelle e del tessuto cellulare</b>	<b>84</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>203</b>	<b>93</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>17</b>
151	Foruncoli . . . . .	17	2	4	1	5	29	12	2	4	2	2
152	Flemmone, accesso caldo . . . . .	59	14	34	22	26	155	69	8	12	20	8
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i) . . . . .	8	4	1	1	5	19	12	1	11	12	7
	<b>XIII. — Malattie delle ossa e degli organi della locomozione</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
154	Osteomielite infettiva acuta . . . . .	10	4	4	4	13	35	10	3	1	4	3
155	Altre malattie delle ossa (l) . . . . .	2	1	3	—	1	7	6	—	2	2	1
156	Mal. articolazioni, ecc. (m) . . . . .	2	—	1	3	1	7	1	—	1	1	1
	a) articolazioni (eccett. la tbc. e il reumatismo) . . . . .	2	—	1	3	1	7	1	—	1	1	1
	b) altri organi della locomozione . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XIV. — Vizi di conformazione congeniti</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>199</b>	<b>87</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>81</b>	<b>35</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (n) . . . . .	62	17	36	21	63	199	87	23	58	81	35
	a) idrocefalia . . . . .	9	3	8	4	8	32	12	4	4	8	2
	b) spina bifida e meningocele . . . . .	15	3	9	9	10	46	22	10	14	24	11
	c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	20	5	8	5	25	63	31	3	25	28	12
	d) mostrosità . . . . .	2	1	—	—	3	3	2	—	2	2	—
	e) altri . . . . .	16	5	11	3	20	55	20	6	13	19	10
	<b>XV. — Malattie dell'infanzia</b>	<b>919</b>	<b>218</b>	<b>488</b>	<b>313</b>	<b>438</b>	<b>2376</b>	<b>1050</b>	<b>199</b>	<b>431</b>	<b>630</b>	<b>297</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	519	134	301	174	223	1351	611	128	192	320	156
159	Nascita prematura (n) . . . . .	168	44	93	47	83	435	196	33	121	154	71

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come improvvisa puerperale (non specificata come settica). (d) o condizioni non specificate del puerperio. (e) dei suoi annessi e del tessuto cellulare.

1936, distinti secondo 200 cause di morte.

e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CALABRIE										SICILIA										SARDEGNA				
	Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	TOTALE		Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	TOTALE		Cagliari	Nuoro	Sassari	TOTALE					
				M	F										M	F				M	F				
133	18	10	8	36	18	15	11	13	4	34	32	8	4	20	141	69	7	5	9	21	11	133			
	6	5	4	15	8	8	6	11	4	22	16	5	3	15	90	42	5	1	2	8	6	a			
	12	5	4	21	10	7	5	2	—	12	16	3	1	5	51	27	2	4	4	13	5	b			
134	5	2	5	12	4	8	10	22	4	18	27	10	15	19	133	33	10	6	4	20	4	134			
	4	2	4	10	4	4	4	17	2	8	10	6	8	11	70	30	6	2	2	9	4	a			
	1	—	1	2	—	4	4	5	2	10	14	3	7	7	56	2	4	4	3	11	—	b			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	c			
135	14	27	19	60	6	19	6	45	11	32	41	10	16	23	203	45	8	1	8	17	1	135			
	14	23	17	54	6	17	4	43	11	24	26	9	16	18	168	30	6	1	7	14	1	a			
	—	4	2	6	—	2	2	2	—	8	15	1	—	5	35	15	2	—	1	3	—	b			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	3	1	1	5	—	c			
136	3	—	4	7	—	—	—	3	—	3	1	1	1	2	16	1	3	1	1	5	—	136			
	1	—	3	4	—	—	—	2	—	1	3	1	1	2	8	1	2	1	1	3	—	a			
	2	—	1	3	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	8	—	—	—	—	2	—	b			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	c			
137	18	21	13	52	—	21	14	45	9	31	47	14	18	24	223	—	29	12	25	66	—	137			
	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	138			
138	8	5	4	17	17	1	—	5	3	—	7	1	1	2	20	20	2	1	1	4	4	139			
	1	2	2	5	5	1	—	2	3	—	4	1	1	1	13	13	1	—	—	1	1	a			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	b			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d			
	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>73</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>85</b>	<b>85</b>				
140	2	2	1	5	5	—	1	3	—	—	3	1	3	2	13	13	—	—	2	2	2	140			
141	1	—	1	2	2	—	1	1	1	1	1	—	—	2	8	8	2	1	3	6	6	141			
142	—																								

Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno

1936, distinti secondo 200 cause di morte.

A. — Per Provincie

e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PUGLIE					LUCANIA				CALABRIE			SICILIA										SARDEGNA				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO						
		Bari	Brindisi	Foggia	Jonio (Taranto)	Lecce	TOTALE		Matera	Potenza	TOTALE		Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	TOTALE		Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	TOTALE		Cagliari	Nuoro	Sassari	TOTALE		
							M	F			di cui F	M				F	M										F					di cui F	M	F
160	Conseguenze del parto (b)	7	2	6	4	16	35	12	3	3	6	2	8	12	6	26	9	—	6	6	4	7	13	3	2	4	45	13	10	1	6	17	4	160
	a) con indicazione di operazione cesarea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
	b) senza indicazione di operazione cesarea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Altre malattie speciali dell'infanzia	225	38	88	88	116	555	231	35	115	150	68	102	76	113	291	143	47	11	95	24	53	78	28	34	17	417	192	83	42	49	174	75	161
	a) atelectasia	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
	b) Ittero dei neonati	10	—	10	9	15	46	18	4	17	21	9	5	13	6	24	10	8	4	18	3	6	9	4	6	3	61	13	18	4	5	27	7	161
	c) sclerema e altre	211	36	75	79	100	501	209	31	91	122	56	93	57	104	254	124	36	37	74	21	47	69	24	28	13	349	174	65	32	43	140	67	161
162	XVI. - Senilità	1449	318	581	241	613	3202	1803	179	536	715	424	936	750	789	2475	1385	571	497	962	420	980	1666	276	400	527	6302	3446	565	399	377	1341	730	162
	a) con demenza senile	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
	b) senza demenza senile	1443	318	578	241	613	3202	1803	179	536	715	424	929	748	783	2460	1371	495	956	420	979	1653	273	398	523	6268	3426	557	398	373	1328	724	162	
	XVII. - Morti violente e accidentali	337	100	196	185	143	881	231	66	154	220	74	205	194	251	650	225	138	79	241	81	215	296	50	81	116	1297	328	202	97	99	389	87	163
163	a) Suicidi:	61	16	27	20	21	145	48	4	15	19	7	17	19	14	50	10	28	12	53	14	47	48	15	14	26	257	76	27	17	17	61	11	163
171	per ingestione di veleni (c)	8	1	10	1	3	23	13	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	con gas tossici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	per impiccamento o strangolam.	10	3	4	2	2	21	3	1	8	9	3	6	5	4	15	3	16	5	13	5	19	12	7	3	11	91	24	8	9	5	22	5	165
166	per annegamento.	26	7	10	12	7	62	26	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166
167	con arma da fuoco	7	3	1	2	4	17	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167
168	con arma da punta e da taglio	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	per precipitazione da luogo elev.	3	—	—	1	3	7	4	—	2	2	1	3	2	2	7	4	—	—	6	1	2	6	—	1	—	16	10	—	1	1	2	1	169
170	per schiacciamento	5	2	1	—	2	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	con altri mezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	a) Omicidi	16	12	22	6	8	64	12	5	22	27	8	31	28	43	102	22	18	9	14	6	13	32	2	6	12	112	25	16	15	12	43	8	172
175	Infanticidio (— un anno)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
172	a) subito dopo la nascita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172
	b) altri, prima d'un anno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172
173	Omicidi con arma da fuoco (d)	4	4	11	1	3	23	2	3	8	11	4	14	9	20	43	8	13	4	6	2	7	22	—	2	10	66	12	4	8	5	17	2	173
174	Omicidi arma da taglio e da punta (d)	7	5	5	3	4	24	6	2	7	9	1	11	7	18	36	5	—	3	5	3	4	5	1	2	—	23	7	5	3	—	8	1	174
175	Omicidi con altri mezzi (d)	4	3	6	2	1	16	4	—	6	6	3	6	12	5	23	9	4	2	3	1	2	5	—	2	2	21	5	7	4	7	18	5	175
176	a) Morti accidentali:	257	70	145	77	114	663	168	57	115	172	59	154	147	193	494	193	91	56	172	61	153	212	33	61	76	915	226	159	64	58	281	67	176
194	Morsi o punture d'animali velenosi.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194
176	Avvelenamenti da alimenti guasti.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
177	Assorbimento di gas tossici	3	3	1	1	—	8	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	2	—	—	—	—	177
178	Altri avvelenam. accident. acuti (e)	3	1	1	—	1	6	3	2	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	3	1	—	—	—	178
179	Per incendio	13	—	—	—	—	14	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	1	—	—	—	—	179
180	Per ustioni accidentali (f)	45	16	42	6	22	131	60	12	39	51	29	46	56	41	143	84	21	9	29	11	26	35	7	9	15	162	88	26	13	14	53	31	180
181	Per soffocazione meccanica accid.	1	—	3	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	181
182	Per annegamento accidentale	20	10	14	5	8	57	13	2	17	19	5	9	10	14	33	13	2	3	15	8	12	12	2	10	4	68	8	16	4	6	26	4	182
183	Per trauma accid. d'arma da fuoco (g)	4	—	4	4	2	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	4	2	2	—	—	183
184	Per traumaacc. arma punta o taglio (g)	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	184
185	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h)	145	29	54	50	45	323	63	27	37	64	18	66	55	98	219	64	39	23	89	15	80	116	14	28	43	447	93	75	34	22	131	18	185
186	Per cataclisma (i)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186
187	Per violenze di animali	1	1	7	3	4	16	3	2	2	4	—	2	3	1	6	—	6	3	5	5</													

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte.

B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRION.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
	<b>Complesso . . .</b>	<b>261534</b>	<b>94216</b>	<b>161725</b>	<b>72161</b>	<b>303721</b>	<b>285915</b>	<b>589636</b>
	<b>I. — Malattie infettive e parassitarie .</b>	<b>33139</b>	<b>12164</b>	<b>17333</b>	<b>8197</b>	<b>35819</b>	<b>35014</b>	<b>70833</b>
1 e 2	<i>Febbre tifoide e paratifi . . . . .</i>	1661	534	1149	495	1748	2091	3839
1	Febbre tifoidea (tifo addominale).	1571	493	1012	441	1592	1925	3517
2	Paratifo . . . . .	90	41	137	54	156	166	322
3	Tifo petecchiale . . . . .	2	—	—	1	2	1	3
5	Febbre ondulante . . . . .	47	39	38	62	108	78	186
6	Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	a) vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	380	206	1217	163	1046	920	1966
8	Scarlattina . . . . .	95	121	273	82	293	278	571
9	Tosse convulsa . . . . .	1175	454	529	214	1018	1354	2372
10	Difterite . . . . .	1270	511	539	251	1373	1198	2571
11	Influenza . . . . .	4595	1616	3547	917	5539	5136	10675
	a) con complicazioni respiratorie indicate.	3636	1362	2726	667	4453	3938	8391
	b) senza complicazioni respirator. indicate	959	254	821	250	1086	1198	2284
13	Dissenteria . . . . .	89	16	76	90	150	121	271
	a) amebica . . . . .	13	2	15	40	40	30	70
	b) bacillare . . . . .	19	4	12	11	27	19	46
	c) non specificata o dovuta ad altre cause.	57	10	49	39	83	72	155
15	Risipola . . . . .	652	279	361	114	703	703	1406
16	Poliomielite a., polioencefalite ac. .	134	140	88	77	240	199	439
17	Encefalite letargica o epidemica .	238	75	32	18	193	170	363
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	93	46	19	35	116	77	193
19	Morva e farcino . . . . .	—	—	1	—	—	1	1
20	Pustola maligna e carbonchio . . .	28	38	43	27	92	44	136
21	Rabbia . . . . .	—	—	1	—	—	1	1
22	Tetano . . . . .	321	71	137	68	411	186	597
23 a 32	<b>Tubercolosi :</b>	<b>19669</b>	<b>6863</b>	<b>6915</b>	<b>4049</b>	<b>18494</b>	<b>19002</b>	<b>37496</b>
23	dell'apparato respiratorio (b) .	14832	5115	4932	2977	13901	13955	27856
24	delle meningi e sist. nerv. centr.	1993	694	808	444	1973	1966	3939
25	degli intest. e del peritoneo (c).	681	309	480	216	654	1032	1686
26	della colonna vertebrale . . . . .	360	113	138	81	321	371	692
27	delle ossa e delle articolaz. (d).	469	156	178	107	428	482	910
28	della pelle e sottocutaneo . . . . .	33	4	18	10	23	42	65
29	del sistema linfatico (e) . . . . .	65	24	49	35	84	89	173
30	dell'apparato genito-urinario . . .	239	71	51	22	216	167	383
31	Altre localizzazioni della tuberc. .	10	2	5	1	9	9	18
32	Tubercolosi disseminata . . . . .	987	375	256	156	885	889	1774
	a) acuta . . . . .	496	168	101	67	401	431	832
	b) cronica . . . . .	6	3	2	1	7	5	12
	c) non specificata . . . . .	485	204	153	88	477	453	930
33	Lebbra . . . . .	10	1	12	7	22	8	30
34	Sifilide . . . . .	593	309	653	204	1096	653	1759
	a) congenita . . . . .	189	110	335	99	385	348	733
	b) acquisita . . . . .	1	—	4	1	4	2	6
	c) non specificata . . . . .	403	199	314	104	707	313	1020
35	Inf. gonococcica e altre mal. ven. .	23	5	17	8	27	26	53
36	Infesz. purulenta e setticemia (f) .	1673	645	723	502	1785	1758	3543
	a) setticemia . . . . .	1495	580	592	437	1516	1588	3104
	b) piemia . . . . .	174	60	128	63	259	166	425
	c) gangrena gassosa . . . . .	4	5	3	2	10	4	14
38	Malaria . . . . .	78	75	553	585	797	494	1291
	a) febbre malarica . . . . .	51	59	339	406	534	321	855
	b) cachessia palustre . . . . .	27	16	214	179	263	173	436
39	Altre mal. dovute a protozoi paras.	8	2	29	56	(g) 55	(h) 40	95

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale eccettuata. (e) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali. (f) non puerperali. (g) di cui 47 morti per Leishmaniosi, 3 per morbo di Weil, 4 per spirochetosi senza altra indicazione e 1 per febbre bottonosa. (h) di cui 38 morti per Leishmaniosi, 1 per morbo di Weil, 1 per Sodoku.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte.  
B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRION.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
40	Anchilostomiasi . . . . .	3	1	3	—	2	5	7
41	Cisti idatica . . . . .	26	33	31	45	73	62	135
	a) del fegato . . . . .	11	24	20	27	42	40	82
	b) altre localizzazioni . . . . .	15	9	11	18	31	22	53
42	Altre malattie dovute a elminti . . . . .	137	38	214	46	(d) 206	(e) 229	435
43	Micosi . . . . .	68	14	52	16	95	55	150
44	Altre mal. infettive e parassitarie . . . . .	71	32	81	65	(f) 135	(g) 114	249
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>23022</b>	<b>7714</b>	<b>4411</b>	<b>2552</b>	<b>17765</b>	<b>19934</b>	<b>37699</b>
45 a 53	<b>Cancro e altri tumori maligni . . . . .</b>	<b>22117</b>	<b>7396</b>	<b>4172</b>	<b>2402</b>	<b>17295</b>	<b>18792</b>	<b>36087</b>
45	Tumori maligni della bocca e faringe . . . . .	859	300	218	100	1205	272	1477
46	Tumori maligni tubo dig. e peritoneo . . . . .	12745	4339	1583	1056	10901	8822	19723
	a) esofago . . . . .	711	154	25	18	705	203	908
	b) stomaco e duodeno . . . . .	7914	2780	736	539	6823	5146	11969
	c) retto . . . . .	624	222	118	52	549	467	1016
	d) fegato e vie biliari . . . . .	2030	698	513	327	1721	1847	3568
	e) pancreas . . . . .	350	116	38	27	304	227	531
	f) peritoneo . . . . .	123	54	31	23	72	159	231
	g) altri organi . . . . .	993	315	122	70	727	773	1500
47	Tumori maligni dell'app. respirat. . . . .	811	232	135	71	893	356	1249
48	— dell'utero . . . . .	1718	597	631	299	—	3245	3245
49	— degli altri org. genit. della donna . . . . .	329	101	53	36	—	519	519
50	— delle mammelle . . . . .	1304	454	407	208	24	2349	2373
51	— degli org. genito-urin. dell'uomo . . . . .	874	314	189	86	1463	—	1463
52	— della pelle . . . . .	529	147	223	130	581	448	1029
53	— di altri org. o di org. non spec. . . . .	2948	912	733	416	2228	2781	5009
54	Tumori non maligni . . . . .	782	262	213	122	384	995	1379
	a) organi genitali della donna . . . . .	442	119	97	62	—	720	720
	b) altri organi . . . . .	340	143	116	60	384	275	659
55	Tumori a carat. maligno non spec. . . . .	123	56	26	28	86	147	233
	a) organi genitali della donna . . . . .	14	7	4	6	—	31	31
	b) altri organi . . . . .	109	49	22	22	86	116	202
	<b>III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b) . . . . .</b>	<b>4863</b>	<b>1826</b>	<b>2325</b>	<b>1226</b>	<b>4673</b>	<b>5567</b>	<b>10240</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	1124	378	651	195	1107	1241	2348
57	Reumatismo cronico, osteo-artrite . . . . .	624	180	294	127	429	796	1225
58	Gotta . . . . .	43	20	58	27	106	42	148
59	Diabete mellito . . . . .	2021	965	738	564	1991	2297	4288
60	Scorbuto . . . . .	18	3	14	6	27	14	41
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . . . .	5	1	7	1	10	4	14
	b) scorbuto . . . . .	13	2	7	5	17	10	27
61	Beriberi . . . . .	—	—	1	—	1	—	1
62	Pellagra . . . . .	68	2	1	—	33	38	71
63	Rachitismo . . . . .	198	52	173	79	260	242	502
64	Osteomalacia . . . . .	12	4	6	6	6	22	28
65	Mal. ghiand. pituitaria (ipofisi) . . . . .	11	5	4	2	8	14	22
66	Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi . . . . .	365	62	104	37	178	390	568
	a) gozzo semplice . . . . .	49	4	12	7	14	58	72
	b) gozzo esofaltmico . . . . .	189	24	32	16	34	227	261
	c) mixedema e cretinismo . . . . .	21	3	13	2	19	20	39
	d) tetania . . . . .	82	28	44	11	95	69	165
	e) altre . . . . .	24	3	3	1	15	16	31
67	Malattie del timo . . . . .	178	60	42	28	180	128	308
68	Mal. ghiand. o capsule surren. (c) . . . . .	109	51	52	19	101	130	231
69	Altre malattie generali . . . . .	92	44	187	136	246	213	459
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .</b>	<b>1325</b>	<b>476</b>	<b>770</b>	<b>459</b>	<b>1525</b>	<b>1505</b>	<b>3030</b>
70	Stati emorragipari . . . . .	180	54	156	67	234	223	457
	a) porpora primitiva . . . . .	100	36	117	44	148	149	297
	b) emofilia . . . . .	80	18	39	23	86	74	160

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari). (d) di cui 176 morti per elminti non specificati e 30 per *Ascaris lumbricoides*. (e) di cui 197 morti per elminti non specificati, 28 per *Ascaris lumbricoides* e 4 per *Oxyris vermicularis*. (f) di cui 68 morti per tossinfezione, 17 per varicella, 12 per infezioni viscerali, 12 per parotite epidemica, 9 per infezione vaccinnica, 8 per febbre ittero-ematurica, 1 per febbre miliare, 1 per febbre ghiandolare, 5 per febbre senz'altra indicazione, 1 per morbo di Brill, 1 per parassiti intestinali non specificati. (g) di cui 59 morti per tossinfezioni, 20 per varicella, 10 per infezioni viscerali, 9 per parotite epidemica, 3 per infezione vaccinnica, 2 per febbre ittero-ematurica, 1 per febbre ghiandolare, 9 per febbre senz'altra indicazione, 1 per parassiti intestinali non specificati.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte.  
B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRION.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE.
71	Anemie . . . . .	420	137	316	254	499	628	1127
	a) anemia perniciosa progressiva . . . . .	292	94	135	109	283	347	630
	b) altre . . . . .	128	43	181	145	216	281	497
72	Leucemie e aleucemie . . . . .	650	256	255	121	708	574	1282
	a) leucemie vere . . . . .	384	149	170	86	422	367	789
	b) aleucemie . . . . .	266	107	85	35	286	207	493
73	Malattie della milza . . . . .	61	24	39	14	72	66	138
74	Altre mal. sangue e org. ematop. . . . .	14	5	4	3	12	14	26
	<b>V. - Avvelenamenti cronici e intossicaz.</b>	<b>365</b>	<b>115</b>	<b>85</b>	<b>31</b>	<b>510</b>	<b>86</b>	<b>596</b>
75	Alcoolismo . . . . .	345	111	76	28	481	79	560
	a) acuto . . . . .	21	8	7	—	28	8	36
	b) cronico . . . . .	324	103	69	28	453	71	524
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	10	2	1	1	9	5	14
	a) professionali . . . . .	2	—	—	—	2	—	2
	b) altri . . . . .	8	2	1	1	7	5	12
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali	10	2	8	2	20	2	22
	a) professionali . . . . .	9	2	7	2	19	1	20
	b) altri . . . . .	1	—	1	—	1	1	2
	<b>VI. - Mal. del sistema nervoso, ecc. (b).</b>	<b>32487</b>	<b>14037</b>	<b>19456</b>	<b>7378</b>	<b>38608</b>	<b>34750</b>	<b>73358</b>
78	Encefalite (non epidemica) . . . . .	321	97	94	49	311	250	561
	a) ascesso del cervello . . . . .	77	30	29	13	95	54	149
	b) altre . . . . .	244	67	65	36	216	196	412
79	Meningite semplice . . . . .	1485	422	700	252	1604	1255	2859
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	182	37	87	17	238	85	323
81	Altre malattie del midollo spinale.	400	137	188	108	471	362	833
82	Emorragia, embolia e tromb. cer.	26398	11644	13826	6051	29903	28011	57919
	a) emorragia cerebrale . . . . .	19272	8098	9544	4852	21856	19910	41766
	b) embolia e trombos. cerebrale . . . . .	4672	2305	3479	626	5347	5735	11082
	c) emiplegia ed altre paralisi (c) . . . . .	2454	1241	803	573	2705	2366	5071
83	Paralisi progressiva degli alienati.	452	140	172	60	658	166	824
84	Demenza precoce e altre psicosi . . . . .	622	212	350	93	605	678	1283
	a) demenza precoce . . . . .	142	40	68	23	128	145	273
	b) altre psicosi . . . . .	486	172	282	70	477	533	1010
85	Epilessia . . . . .	630	232	460	154	855	621	1476
86	Convulsioni (bambini — 5 anni).	849	691	2949	330	2649	2170	4819
87	Altre malattie del sistema nervoso.	675	276	459	179	798	791	1589
	a) corea . . . . .	32	9	31	12	26	58	84
	b) nevrite . . . . .	53	14	25	6	54	44	98
	c) paralisi agitante . . . . .	280	150	163	73	338	328	666
	d) sclerosi a placche . . . . .	111	25	29	8	98	75	173
	e) altre . . . . .	199	78	211	80	282	286	568
88	Malattie degli organi della vista . . . . .	9	2	6	1	9	9	18
89	Mal. orecchio e del seno mastoideo.	458	147	165	84	502	352	854
	a) otite . . . . .	250	94	115	66	296	229	525
	b) altre . . . . .	208	53	50	18	206	123	329
	<b>VII. - Malattie dell'appar. circolatorio.</b>	<b>44319</b>	<b>13679</b>	<b>20035</b>	<b>8316</b>	<b>39134</b>	<b>47215</b>	<b>86349</b>
90 a 95	<b>Malattie del cuore:</b>	<b>35794</b>	<b>10683</b>	<b>16412</b>	<b>6391</b>	<b>30092</b>	<b>39188</b>	<b>69280</b>
90	Pericardite . . . . .	132	35	46	18	131	100	231
91	Endocardite acuta . . . . .	292	110	102	47	229	322	551
92	Endocardite cr., comp. le aff. valv.	10018	4130	6762	2417	9567	13760	23327
93	Malattie del miocardio . . . . .	15245	3123	5423	1370	10806	14355	25161
	a) miocardite acuta . . . . .	173	74	53	24	150	174	324
	b) miocardite cr. e degeneraz. del miocar.	7485	1653	2593	701	5337	7095	12432
	c) non specificate . . . . .	7587	1396	4777	645	5319	7086	12405
94	Mal. arterie coron. e angina pect.	1720	659	1039	354	2507	1265	3772
95	Altre malattie del cuore . . . . .	8387	2626	3040	2185	6852	9386	16238
	a) malattie funzionali del cuore . . . . .	495	143	121	100	386	473	859
	b) altre e non specificate . . . . .	7892	2483	2919	2085	6466	8913	15379
96	Aneurisma, eccet. l'aneur. del cuore	471	88	128	43	516	214	730
97	Arteriosclerosi (d) . . . . .	6046	2379	2807	1599	6658	6173	12831

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2.  
malattie delle arterie coronarie.

(b) e degli organi dei sensi.

(c) senza indicazione della causa.

(d) eccettuate le

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte.

B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRION.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
98	Cangrena . . . . .	1072	255	289	131	960	787	1747
	a) senile . . . . .	237	43	59	22	199	162	361
	b) altre . . . . .	835	212	230	109	761	625	1386
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	513	138	280	96	566	461	1027
100	Mal. vene: varici, emorr., fleb., ecc.	291	87	65	20	199	264	463
101	Mal. sist. linfat., linfangioite, ecc.	60	26	40	22	83	65	148
102	Anomalie idiopatiche press. sang.	55	20	6	5	42	44	86
103	Altre mal. dell'appar. circolatorio.	17	3	8	9	18	19	37
	<b>VIII. - Mal. dell'apparato respiratorio.</b>	<b>47389</b>	<b>16699</b>	<b>35839</b>	<b>13585</b>	<b>61270</b>	<b>52242</b>	<b>113512</b>
104	Malattie delle fosse nasali e annessi.	28	10	14	8	41	19	60
105	Malattie della laringe . . . . .	133	32	132	56	207	146	353
106	Bronchite . . . . .	6535	2564	6059	1993	8482	8669	17151
	a) acuta . . . . .	929	396	1199	345	1432	1437	2869
	b) cronica . . . . .	2644	1139	1953	693	3146	3283	6429
	c) non specificata . . . . .	2962	1029	2907	955	3904	3949	7853
107	Polmonite, tutte le forme . . . . .	36002	12587	27502	10588	46928	39751	86679
a								
109								
107	Broncop., compr. la bronch. capil.	25150	8789	20777	7221	32862	29075	61937
108	Polmonite lobare . . . . .	10852	3798	6725	3367	14066	10676	24742
110	Pleuriti . . . . .	1359	455	640	307	1632	1129	2761
111	Congest., edema, ecc. del polm. (b)	631	237	195	103	650	516	1166
112	Asma . . . . .	1216	420	704	333	1459	1214	2673
113	Enfisema polmonare . . . . .	400	110	146	39	434	261	695
114	Altre mal. app. respiratorio (c) . . . . .	1085	284	447	158	1437	537	1974
	a) polmonite interstiziale cronica (d) . . . . .	156	30	96	29	172	139	311
	b) altre, compresa cangrena polmonare . . . . .	929	254	351	129	1265	398	1663
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	<b>23653</b>	<b>8229</b>	<b>26581</b>	<b>12273</b>	<b>38448</b>	<b>32288</b>	<b>70736</b>
115	Mal. della cavità boccale, ecc. (e) . . . . .	513	172	353	149	639	548	1187
116	Malattie dell'esofago . . . . .	28	11	16	7	38	24	62
117	Ulcera dello stom. e del duodeno.	1474	662	642	295	2369	704	3073
	a) stomaco . . . . .	1057	414	443	234	1611	537	2148
	b) duodeno . . . . .	417	248	199	61	758	167	925
118	Altre mal. stomaco (cancro eccett.).	533	136	381	174	630	594	1224
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . . . .	9653	3314	17395	7545	19800	18107	37907
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni e più)	2166	849	3707	2070	4343	4449	8792
	a) enterite . . . . .	2064	809	3669	2053	4211	4384	8595
	b) ulcera intestinale . . . . .	102	40	38	17	132	65	197
121	Appendicite . . . . .	1575	521	461	210	1619	1148	2767
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	1988	690	1183	515	2494	1882	4376
	a) ernia . . . . .	900	317	593	303	1294	819	2113
	b) occlusione intestinale . . . . .	1088	373	590	212	1200	1063	2263
123	Altre malattie dell'intestino . . . . .	253	98	152	87	303	287	590
124	Cirrosi del fegato . . . . .	2758	803	1109	567	3705	1532	5237
	a) alcoolica . . . . .	215	32	27	12	239	47	286
	b) non indicata come alcoolica . . . . .	2543	771	1082	555	3466	1485	4951
125	Altre mal. feg. (comp. atrof. gialla).	528	181	271	171	649	502	1151
126	Calcolosi biliare . . . . .	495	174	140	73	216	666	882
127	Altre m. della vescichetta e vie bil.	544	219	298	166	507	720	1227
128	Malattie del pancreas . . . . .	47	28	8	7	57	33	90
129	Peritonite senza causa indicata . . . . .	1098	371	465	237	1079	1092	2171
	<b>X. - Malattie dell'app. urinario, ecc. (f).</b>	<b>9152</b>	<b>3846</b>	<b>6990</b>	<b>3563</b>	<b>13172</b>	<b>10379</b>	<b>23551</b>
130	Nefrite:	6314	2774	5725	2691	8484	9020	17504
a								
132								
130	acuta . . . . .	871	455	1501	681	1739	1769	3508
131	cronica . . . . .	3068	1274	2255	983	3575	4005	7580
132	non specificata . . . . .	2375	1045	1969	1027	3170	3246	6416

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprende le malattie professionali dell'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (f) e dell'apparato genitale.



Segue: TAVOLA I. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte.  
B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO MOROLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRION.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b) .	432	188	277	162	554	505	1059
	a) pielite . . . . .	236	119	151	98	304	300	604
	b) altre . . . . .	196	69	126	64	250	205	455
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	167	102	93	153	357	158	515
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori . . . . .	121	65	74	79	194	145	339
	b) calcolosi della vescica . . . . .	43	34	19	67	153	10	163
	c) calcolosi senza altre indicazioni . . . . .	3	3	—	7	10	3	13
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori. . . . .	594	249	366	220	1104	325	1429
	a) cistite . . . . .	521	213	316	182	947	285	1232
	b) altre . . . . .	73	36	50	38	157	40	197
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. . . . .	106	52	68	21	240	7	247
	a) stenosi uretrale . . . . .	55	21	32	11	117	2	119
	b) altre . . . . .	51	31	36	10	123	5	128
137	Malattie della prostata . . . . .	1324	413	379	289	2405	—	2405
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c) . . . . .	12	8	5	3	28	—	28
139	Mal. organi genitali della donna (c) . . . . .	203	60	77	24	—	364	364
	a) ovaie, trombe e parametri . . . . .	126	32	28	14	—	200	200
	b) utero . . . . .	66	20	37	9	—	132	132
	c) mammelle . . . . .	3	1	9	1	—	14	14
	d) altre . . . . .	8	7	3	—	—	18	18
	<b>XI. - Malattie gravid., parto e puerper.</b>	<b>1148</b>	<b>462</b>	<b>871</b>	<b>402</b>	<b>—</b>	<b>2883</b>	<b>2883</b>
140	Aborto con condizioni settiche . . . . .	117	31	36	15	—	199	199
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d) . . . . .	12	10	25	14	—	61	61
142	Gestazione ectopica . . . . .	70	29	22	9	—	130	130
143	Altri accidenti della gravidanza (e) . . . . .	7	2	3	3	—	15	15
144	Emorragia puerperale . . . . .	195	65	181	60	—	501	501
	a) da placenta previa . . . . .	72	15	59	12	—	158	158
	b) altre emorragie . . . . .	123	50	122	48	—	343	343
145	Setticemia e infezioni puerperali (f) . . . . .	376	150	304	154	—	984	984
	a) setticemia e pleimia puerperali . . . . .	376	150	304	154	—	984	984
	b) tetano puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerper. . . . .	204	103	162	76	—	545	545
147	Altre forme di tossiemia della grav. . . . .	11	4	9	5	—	29	29
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g) . . . . .	64	25	46	22	—	157	157
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . .	9	8	4	3	—	24	24
	b) embolia o morte improvvisa . . . . .	55	17	42	19	—	133	133
149	Altri accidenti del parto . . . . .	81	37	81	41	—	240	240
150	Altre malattie non definite (h) . . . . .	11	6	2	3	—	22	22
	<b>XII. - Malattie della pelle e del tessuto cellulare.</b>	<b>928</b>	<b>372</b>	<b>734</b>	<b>322</b>	<b>1401</b>	<b>955</b>	<b>2356</b>
151	Foruncoli . . . . .	141	40	82	54	203	114	317
152	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	614	278	552	230	1018	656	1674
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i) . . . . .	173	54	100	38	180	185	365
	<b>XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione.</b>	<b>519</b>	<b>222</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>640</b>	<b>381</b>	<b>1021</b>
154	Osteomielite infettiva acuta . . . . .	294	141	136	53	394	230	624
155	Altre malattie delle ossa (l) . . . . .	105	25	35	13	108	70	178
156	Mal. articolazioni, ecc. (m) . . . . .	120	56	29	14	138	81	219
	a) articolaz. (eccett. la tbc. e il reumatismo) . . . . .	113	55	28	13	133	76	209
	b) altri organi della locomozione . . . . .	7	1	1	1	5	5	10
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti.</b>	<b>1093</b>	<b>498</b>	<b>930</b>	<b>417</b>	<b>1616</b>	<b>1322</b>	<b>2938</b>
157	Vizi di conformazione congeniti (n) . . . . .	1093	498	930	417	1616	1322	2938
	a) idrocefalia . . . . .	107	50	112	38	187	120	307
	b) spina bifida e meningocele . . . . .	177	97	228	137	276	363	639
	c) malformazioni congenite del cuore . . . . .	523	216	313	127	667	512	1179
	d) mostruosità . . . . .	55	23	17	12	47	60	107
	e) altri . . . . .	231	112	260	103	439	267	706
	<b>XV. - Malattie dell'infanzia.</b>	<b>11130</b>	<b>4055</b>	<b>7715</b>	<b>3266</b>	<b>14363</b>	<b>11803</b>	<b>26166</b>
158	Debolezza congenita . . . . .	3468	1265	3839	1746	5539	4779	10318
159	Nascita prematura (n) . . . . .	4818	1909	1934	867	5164	4364	9528

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) ma comprese le emorragie. (e) non comprese le emorragie. (f) non specificate come conseguenza d'aborto. (g) embolia o morte improvvisa puerperale (non specificata come settica). (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli altri organi della locomozione. (n) non compresi i nati morti.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1936, distinti secondo 200 cause di morte.

## B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELERCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRION.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
160	Conseguenze del parto (b) . . . . .	505	179	144	62	588	302	890
	a) con indicazione di operazione cesarea.	3	—	1	—	3	1	4
	b) senza indicazione di operazione cesarea	502	179	143	62	585	301	886
161	Altre mal. speciali dell'infanzia. . . . .	2339	702	1798	591	3072	2358	5430
	a) atelectasia . . . . .	87	23	66	14	107	83	190
	b) ittero dei neonati . . . . .	343	107	226	88	472	292	764
	c) sclerema e altre . . . . .	1909	572	1506	489	2493	1983	4476
	<b>XVI. — Senilità . . . . .</b>	<b>15065</b>	<b>5834</b>	<b>12517</b>	<b>7643</b>	<b>18127</b>	<b>22932</b>	<b>41059</b>
162	Senilità . . . . .	15065	5834	12517	7643	18127	22932	41059
	a) con demenza senile . . . . .	517	168	146	47	375	503	878
	b) senza demenza senile . . . . .	14548	5666	12371	7596	17752	22429	40181
	<b>XVII. — Morti violente e accidentali. . . . .</b>	<b>9339</b>	<b>3135</b>	<b>3823</b>	<b>1686</b>	<b>13482</b>	<b>4501</b>	<b>17983</b>
163	a) <b>Suicidi:</b> . . . . .	1994	572	515	318	2520	879	3399
171	per ingestione di veleni (c) . . . . .	142	47	97	26	149	163	312
164	con gas tossici . . . . .	76	13	5	—	60	34	94
165	per impiccamento o strangol. . . . .	562	158	105	113	746	192	938
166	per annegamento . . . . .	390	107	112	57	419	247	666
167	con arma da fuoco . . . . .	341	111	104	85	602	39	641
168	con arma da punta e da taglio. . . . .	116	20	18	4	130	28	158
169	per precipitaz. da luogo elev. . . . .	194	92	57	18	229	132	361
170	per schiacciamento . . . . .	161	20	15	11	168	39	207
171	con altri mezzi . . . . .	12	4	2	4	17	5	22
172	a) <b>Omicidi . . . . .</b>	247	100	359	155	625	236	861
175	Infanticidio (— un anno) . . . . .	23	4	8	2	19	18	37
172	a) subito dopo la nascita . . . . .	19	4	5	1	15	14	29
	b) altri, prima d'un anno . . . . .	4	—	3	1	4	4	8
173	Omicidi con arma da fuoco (d) . . . . .	98	40	153	83	290	84	374
174	Omicidi arma da taglio e punta (d) . . . . .	68	33	116	31	178	70	248
175	Omicidi con altri mezzi (d) . . . . .	58	23	82	39	138	64	202
176	a) <b>Morti accidentali:</b> . . . . .	7049	2444	2920	1196	10246	3363	13609
194	Morsi o punture d'animali velenosi. . . . .	5	5	4	—	8	6	14
176	Avvelenamenti da alimenti guasti . . . . .	24	12	25	29	51	39	90
178	Assorbimento di gas tossici . . . . .	68	21	27	15	95	36	131
179	Altri avvelenam. accident. acuti (e) . . . . .	49	22	41	13	79	46	125
180	Per incendio . . . . .	26	5	32	12	48	27	75
181	Per ustioni accidentali (f) . . . . .	598	264	675	215	838	914	1752
182	Per soffocazione meccanica accid. . . . .	65	16	20	8	72	37	109
183	Per annegamento accidentale . . . . .	1179	273	243	94	1390	399	1789
184	Per trauma acc. d'arma da fuoco (g) . . . . .	88	46	57	25	186	30	216
185	Per trauma acc. arm. punt. o tagl. (g) . . . . .	26	5	9	4	37	7	44
186	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h) . . . . .	3998	1490	1427	578	5900	1593	7493
187	Per cataclisma (i) . . . . .	18	—	—	1	10	9	19
188	Per violenze di animali . . . . .	88	26	51	43	184	24	208
190	Per freddo eccessivo . . . . .	73	8	23	17	101	20	121
191	Per caldo eccessivo . . . . .	33	16	39	19	76	31	107
192	Per fulmine . . . . .	36	31	67	24	116	42	158
193	Per accidenti dovuti a corr. elettr. . . . .	130	43	34	18	220	5	225
194	Per altri accidenti . . . . .	545	161	146	81	835	98	933
	a) corpi estranei . . . . .	16	4	1	3	15	9	24
	b) altri . . . . .	529	157	145	78	820	89	909
195	Morte violenta, ecc. (l) . . . . .	46	19	27	12	81	23	104
196	Per ferite di guerra . . . . .	1	—	2	—	3	—	3
198	Per esecuzione giudiziaria . . . . .	2	—	—	5	7	—	7
	<b>XVIII. — Cause di morte non determin.</b>	<b>2598</b>	<b>853</b>	<b>1110</b>	<b>765</b>	<b>3168</b>	<b>2158</b>	<b>5326</b>
199	Morte improvvisa . . . . .	2317	740	784	478	2647	1672	4319
200	Cause non specific. o mal definite . . . . .	281	113	326	287	521	486	1007

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno e più. (e) eccettuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (l) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.

TAVOLA 2. — Morti, nell'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei Comuni

capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA		VENETO		VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>12996</b>	<b>35350</b>	<b>10339</b>	<b>7555</b>	<b>21737</b>	<b>58364</b>	<b>1404</b>	<b>8288</b>	<b>11410</b>	<b>39515</b>	<b>6046</b>	<b>7358</b>	<b>12342</b>	<b>28830</b>	<b>11715</b>	<b>24119</b>	<b>2640</b>	<b>13799</b>	<b>2128</b>	<b>7336</b>	
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	68	158	75	30	187	397	31	30	124	279	32	17	80	153	71	100	21	70	10	39	1, 2
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	Morbillo . . . . .	21	21	10	4	17	45	4	6	9	48	59	58	23	55	23	39	1	71	8	15	7
8	Scarlattina . . . . .	5	14	1	3	7	13	—	6	10	16	2	—	9	9	5	19	3	4	—	—	8
9	Tosse convulsa . . . . .	31	54	41	8	112	367	8	27	61	258	16	24	43	125	64	115	16	81	6	15	9
10	Difterite . . . . .	49	80	43	20	283	275	3	29	69	208	30	23	55	103	50	91	30	73	20	64	10
11	Influenza . . . . .	275	742	88	167	307	1149	14	110	120	786	67	87	161	522	127	419	34	255	66	163	11
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1306	1251	830	314	1475	2587	124	607	900	2094	728	498	916	1202	1132	1212	174	454	152	258	23
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	208	421	208	122	385	881	41	170	311	880	156	134	347	573	268	428	56	242	42	142	dal 24 al 32
34	Sifilide . . . . .	42	36	42	5	117	94	4	15	43	47	64	6	57	21	58	16	4	19	6	11	34
38	Malaria . . . . .	2	5	3	—	3	14	—	—	4	26	4	3	1	13	5	11	1	4	—	4	38
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre mal. infettive e parassitarie	177	318	129	81	375	697	21	94	277	575	87	79	263	448	219	348	43	188	34	102	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	1323	2831	1092	575	2306	4339	126	674	1190	2718	599	399	1358	2587	1326	2491	194	831	112	375	dal 45 al 53
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	86	114	74	11	104	159	5	17	70	99	24	15	55	72	60	63	13	32	13	21	54, 55
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	34	100	30	30	39	114	1	22	31	120	10	23	27	86	17	76	5	34	4	7	57, 58
59	Diabete mellito . . . . .	147	245	179	92	220	307	11	44	108	231	76	45	120	196	130	230	36	106	23	45	59
75	Alcolismo acuto e cronico . . . . .	15	61	10	15	32	60	4	18	25	32	9	10	15	39	19	13	8	23	1	9	75
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre mal. gener. e avvel. cronici . . . . .	191	432	130	109	305	723	11	115	176	619	53	88	191	374	144	291	38	171	34	89	56, dal 60 al 74, 76, 77
80, 83	Atassia locom. e paral. progr. alien.	57	90	56	22	71	122	1	9	49	28	43	5	36	45	38	30	5	6	8	3	80, 83
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	1148	3958	1055	820	1880	6213	107	700	939	3904	353	394	1320	3507	1111	3156	349	2153	295	1187	82
78, 79, 81, dall'84 all'89	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c)	305	616	188	146	450	1367	24	176	260	796	122	163	307	535	260	468	82	386	79	137	78, 79, 81, dall'84 all'89
dal 90 al 95	Malattie del cuore . . . . .	1613	6399	1553	1306	2718	8027	201	1336	1083	5217	627	746	1333	3635	1269	3027	265	1567	214	910	dal 90 al 95
dal 96 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio . . . . .	425	1251	327	240	657	1494	27	204	605	1378	202	147	555	1013	444	811	61	420	65	183	dal 96 al 103
106	Bronchiti . . . . .	293	1045	170	235	324	1663	28	240	192	1015	69	262	268	731	286	740	64	441	50	259	106
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	1581	4789	1372	1092	3471	8482	188	1013	1356	5416	787	906	1564	3985	1579	3113	309	1673	291	1016	107, 108, 109
104, 105, dal 110 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	288	621	225	157	435	982	26	154	269	743	136	142	240	434	233	356	52	216	26	103	104, 105, dal 110 al 114
119, 120	Enteriti . . . . .	310	1012	167	203	683	5169	27	306	306	1795	199	463	222	957	234	633	90	571	35	287	119, 120
121	Appendicite . . . . .	149	203	57	34	200	273	17	37	85	190	43	15	108	164	74	121	23	67	20	40	121
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari . . . . .	340	650	225	134	459	852	35	139	206	491	97	69	232	396	211	324	48	191	25	71	dal 124 al 127
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	338	807	323	181	505	1151	29	180	338	824	155	145	365	593	310	557	70	270	55	152	122, 123, 128, 129
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	329	868	301	189	692	1338	22	206	348	857	135	156	309	564	401	586	70	393	56	214	130, 131, 132
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urinario	208	360	153	88	297	465	18	78	181	379	81	54	204	272	178	220	37	135	28	73	dal 133 al 139
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	24	51	26	9	52	96	1	19	31	50	20	12	41	61	26	32	3	18	10	12	140, 145
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. gravid., parto e puerp.	30	64	25	16	61	116	6	20	46	104	26	13	59	69	36	52	11	39	10	23	dal 141 al 144, dal 146 al 150
dal 151 al 156	Malattie della pelle, ecc. (d) . . . . .	93	130	80	25	171	258	6	34	126	229	42	28	93	132	80	129	25	72	16	37	dal 151 al 156
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (e) . . . . .	390	1047	284	238	834	2807	55	433	556	2673	219	420	433	1834	364	1095	93	842	106	379	dal 157 al 161
162	Senilità . . . . .	398	2793	297	441	446	2928	83	600	369	2709	324	1293	383	2001	379	1738	183	1160	105	583	162
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	153	282	85	85	204	249	9	56	81	208	100	75	142	265	86	169	16	71	19	49	dal 163 al 171
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	14	36	8	7	26	33	6	5	12	38	11	19	14	18	5	21	2	17	2	11	dal 172 al 175
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (f) . . . . .	328	926	287	191	593	1492	69	296	340	1020	230	256	343	727	282	584	69	326	69	213	dal 176 al 198
199, 200	Morte improv. e cause non specificate o mal definite . . . . .	202	468	90	110	234	566	11	63	104	415	9	66	47	213	111	186	31	98	13	35	199, 200

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre

Segue: TAVOLA 2. — Morti, nell'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE	
		capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni
	<b>Complesso . . .</b>	<b>15077</b>	<b>17420</b>	<b>2973</b>	<b>21247</b>	<b>17537</b>	<b>42105</b>	<b>7193</b>	<b>35844</b>
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	89	134	18	161	149	337	104	190
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	16	33	10	150	66	160	60	523
8	Scarlattina . . . . .	32	58	3	22	30	174	4	15
9	Tosse convulsa . . . . .	100	57	3	49	73	200	14	53
10	Difterite . . . . .	105	78	23	127	90	90	27	86
11	Influenza . . . . .	314	238	56	460	535	718	595	595
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1334	399	168	534	1015	873	406	1101
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	329	241	68	237	262	410	152	479
34	Sifilide . . . . .	162	33	9	43	200	147	50	89
38	Malaria . . . . .	14	36	1	16	22	68	30	174
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre mal. infettive e parassitarie	336	205	35	218	228	492	87	429
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	1270	797	122	621	585	876	197	924
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	92	24	4	29	39	59	16	42
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	19	38	5	78	28	87	7	54
59	Diabete mellito . . . . .	241	154	14	90	151	185	48	124
75	Alcolismo acuto e cronico . . . . .	22	16	8	15	1	30	1	12
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre mal. gener. e avvel. cronici . . . . .	187	187	46	301	143	473	83	419
80, 83	Atassia locom. e paral. progr. alien.	79	8	12	22	92	45	21	31
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	1322	2071	312	2486	1437	3497	509	3005
78, 79, 81, dall'84 all'89	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c).	325	479	96	637	561	1654	160	1060
dal 90 al 95	Malattie del cuore . . . . .	1352	2079	283	2363	1866	4902	494	3062
dal 96 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio.	434	578	69	518	655	949	185	575
106	Bronchiti . . . . .	244	480	63	704	504	1556	167	1451
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	2208	2398	360	2740	2959	8084	1084	6947
104, 105, dal 110 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	339	223	52	328	288	546	133	459
119, 120	Enteriti . . . . .	598	1715	303	2748	1358	5478	897	5317
121	Appendicite . . . . .	119	57	14	49	84	91	54	93
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari . . . . .	260	247	36	255	260	452	86	374
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	448	306	77	388	442	760	137	634
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	473	581	100	662	880	1603	244	1077
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urinario	260	141	32	165	229	314	91	184
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	47	33	16	67	44	65	17	60
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. gravid., parto e puerp.	54	56	13	84	108	90	42	92
dal 151 al 156	Malattie della pelle, ecc. (d) . . . . .	146	89	24	74	167	213	62	190
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (e) . . . . .	697	972	110	1211	501	2101	434	2141
162	Senilità . . . . .	287	1399	270	1854	878	3123	269	2933
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	100	62	18	72	114	97	30	115
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	16	26	4	38	40	84	9	55
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (f) . . . . .	412	508	85	433	358	729	152	520
199, 200	Morte improv. e cause non specificate o mal definite . . . . .	195	184	31	198	95	293	35	160

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (e) escluso il suicidio e l'omicidio.

Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	TOTALE	
	<b>792</b>	<b>8770</b>	<b>2893</b>	<b>22371</b>	<b>16722</b>	<b>40725</b>	<b>2742</b>	<b>11972</b>	<b>158686</b>	<b>430950</b>	<b>589636</b>	
1, 2	4	57	15	114	182	256	17	40	1277	2562	3839	1, 2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	8	130	1	109	60	40	26	37	422	1544	1966	7
8	—	15	4	9	4	31	7	40	123	448	571	8
9	3	27	6	101	71	52	29	62	697	1675	2372	9
10	1	22	10	63	77	116	15	43	980	1591	2571	10
11	2	122	33	431	173	399	77	268	3044	7631	10675	11
23	16	159	164	496	1149	894	278	656	12267	15589	27856	23
dal 24 al 32	23	93	42	217	260	347	112	353	3270	6370	9640	dal 24 al 32
34	1	22	18	74	64	105	9	26	950	809	1759	34
38	2	73	9	158	28	263	25	269	154	1137	1291	38
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	9	97	37	326	365	623	63	185	2785	5505	8290	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
dal 45 al 53	32	177	91	547	637	1265	122	378	12682	23405	36087	dal 45 al 53
54, 55	4	13	5	28	59	67	11	13	734	878	1612	54, 55
57, 58	1	16	6	70	16	92	4	42	284	1089	1373	57, 58
59	—	27	26	73	200	284	23	57	1753	2535	4288	59
75	1	4	—	4	2	13	2	11	175	385	560	75
56, dal 60 al 74, 76, 77	9	148	46	346	154	521	57	238	2001	5644	7645	56, dal 60 al 74, 76, 77
80, 83	1	7	4	24	32	33	6	6	611	536	1147	80, 83
82	53	663	180	1684	1327	3855	203	666	13900	44019	57919	82
78, 79, 81, dall'84 all'89	15	306	109	773	331	635	51	233	3725	10567	14292	78, 79, 81, dall'84 all'89
dal 90 al 95	68	854	274	2246	1580	3641	200	970	16993	52287	69280	dal 90 al 95
dal 96 al 103	13	129	60	470	573	1130	49	173	5406	11663	17069	dal 96 al 103
106	29	538	70	977	287	1348	44	314	3152	13999	17151	106
107, 108, 109	148	1312	468	3400	2281	5995	360	1952	22366	64313	86679	107, 108, 109
104, 105, dal 110 al 114	10	119	53	290	283	532	43	146	3131	6551	9682	104, 105, dal 110 al 114
119, 120	114	1446	390	3051	1961	6132	226	1296	8120	38579	46699	119, 120
121	2	15	11	48	63	119	15	13	1138	1629	2767	121
dal 124 al 127	13	82	37	223	224	524	50	179	2844	5653	8497	dal 124 al 127
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	18	171	83	490	373	798	71	229	4137	8636	12773	dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
130, 131, 132	21	246	90	802	612	1630	80	369	5163	12341	17504	130, 131, 132
dal 133 al 139	12	52	26	160	239	499	36	98	2310	3737	6047	dal 133 al 139
140, 145	1	11	6	53	61	73	13	22	439	744	1183	140, 145
dal 141 al 144, dal 146 al 150	6	26	18	52	70	113	39	632	1068	1700	1700	dal 141 al 144, dal 146 al 150
dal 151 al 156	8	35	21	140	131	196	23	52	1314	2063	3377	dal 151 al 156
dal 157 al 161	72	639	142	1294	772	2045	131	735	6198	22906	29104	dal 157 al 161
162	44	671	220	2255	1474	4828	127	1214	6536	34523	41059	162
dal 163 al 171	3	16	8	42	76	181	13	48	1257	2142	3399	dal 163 al 171
dal 172 al 175	3	24	9	93	22	90	8	35	211	650	861	dal 172 al 175
dal 176 al 198	22	152	53	445	287	641	79	206	4058	9665	13723	dal 176 al 198
199, 200	—	54	51	193	162	319	26	258	1447	3879	5326	199, 200

delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo).

(e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre

TAV. 3. — Morti nel 1936, classificati per cause e classi di Comuni (\*).

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	COMUNI CON ABITANTI:							COM- PLESSO
		meno di 2 000	da 2 000 a 4 999	da 5 000 a 9 999	da 10 000 a 19 999	da 20 000 a 49 999	da 50 000 a 99 999	da 100 000 e più	
	<b>Complesso . . .</b>	<b>41443</b>	<b>124176</b>	<b>110467</b>	<b>87152</b>	<b>79013</b>	<b>41492</b>	<b>105893</b>	<b>589636</b>
1, 2	Feb. tifoidea (tifo add.) e parat.	221	665	660	597	573	317	806	3839
3	Tifo petecchiale	1	1	1	—	—	—	—	3
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	115	536	402	278	276	83	276	1966
8	Scarlattina . . . . .	44	218	104	56	38	28	83	571
9	Tosse convulsa . . . . .	163	675	412	285	220	119	498	2372
10	Difterite . . . . .	139	425	387	349	374	220	677	2571
11	Influenza . . . . .	808	2400	1929	1417	1133	700	2288	10675
23	Tubercolosi dell'app. resp. (a)	1338	3935	3866	3552	3983	2098	8184	27856
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	506	1769	1687	1344	1312	861	2161	9640
34	Sifilide . . . . .	43	196	167	172	282	154	745	1759
38	Malaria . . . . .	93	387	266	236	197	40	72	1291
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44, dal 45 al 53	Altre mal. infettive e parass.	414	1517	1420	1219	1127	716	1877	8290
54, 55	Cancro e altri tumori maligni.	2398	6751	6153	4649	4199	3243	8694	36087
57, 58	Tumori non maligni (b) . . . .	96	197	241	182	211	180	505	1612
59	Reumatismo cronico e gotta . . .	120	399	250	177	166	77	184	1373
75	Diabete mellito . . . . .	240	678	624	567	553	395	1231	4288
56, dal 60 al 74, 76, 77, 80, 83	Alcoolismo acuto e cronico . . .	36	115	105	65	93	68	78	560
82	Altre mal. gener. e avvel. cr.	586	1742	1455	1106	965	525	1265	7645
78, 79, 81, dall'84 all'89	Atassia locom. e par. prog. alien.	43	94	174	112	164	148	412	1147
dal 90 al 95	Emorragia, emb. e tromb. cer.	4290	12423	11827	8702	7786	4179	8712	57919
dal 96 al 103	Altre mal. del sist. nerv., ecc. (c)	854	2970	2747	2275	2075	1079	2292	14292
104, 105, dal 110 al 114	Malattie del cuore . . . . .	6182	15802	13360	9618	8586	4304	11428	69280
119, 120	Altre mal. dell'appar. circolat.	1138	3283	3109	2160	2231	1414	3734	17069
121	Bronchiti . . . . .	1434	4397	3616	2597	2240	954	1913	17151
dal 124 al 127	Polmoniti . . . . .	5605	17599	16255	13348	12242	6090	15540	86679
dal 115 dal 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. app. resp., escl. tbc.	678	1909	1653	1314	1233	776	2119	9682
130, 131, 132	Enteriti . . . . .	3056	10944	9549	8420	7149	2127	5454	46699
dal 141 al 144	Appendicite . . . . .	136	371	394	407	431	265	763	2767
dal 146 al 150	Mal. fegato e vie biliari . . . .	575	1608	1468	1085	1183	643	1935	8497
dal 151 al 156	Altre mal. dell'appar. digerente	883	2332	2124	1888	1756	1099	2691	12773
dal 157 al 161	Nefriti . . . . .	1002	3401	3099	2629	2467	1299	3607	17504
162	Altre mal. dell'app. genito-urin.	368	974	893	832	886	559	1535	6047
dal 163 al 171	Setticemia e infezioni puerperali	73	202	167	175	152	137	277	1183
dal 172 al 175	Altre mal. grav., parto e puerp.	86	248	262	265	281	169	389	1700
dal 176 al 198	Mal. della pelle, ecc. (d) . . . .	152	501	528	462	537	317	880	3377
199, 200	Debolezza congenita, ecc. (e) . .	2047	6893	6088	4697	3762	1675	3942	29104
	Senilità . . . . .	3661	10762	8817	6770	5117	1892	4040	41059
	Suicidio . . . . .	215	578	547	456	446	287	870	3399
	Omicidio . . . . .	49	183	173	136	132	50	138	861
	Morte violenta e accidentale (f)	966	2736	2510	1937	1988	1051	2535	13723
	Morte improvvisa e cause non specif. o mal definite . . . . .	589	1360	978	616	467	253	1063	5326

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

(\*) La classe: meno di 2000 comprende 2433 Comuni con 3 007 844 abitanti  
 » da 2000 a 4999 » 2915 » » 9 302 017 »  
 » » 5000 » 9999 » 1257 » » 8 440 571 »  
 » » 10000 » 19999 » 478 » » 6 326 125 »  
 » » 20000 » 49999 » 185 » » 5 432 578 »  
 » » 50000 » 99999 » 43 » » 2 830 912 »  
 » » 100000 » più » 22 » » 7 659 555 »  
 residenti, censiti al 21 aprile 1936, nella circoscrizione territoriale al 31 dicembre 1936, tenuto conto delle variazioni effettuate fino alla detta data.

#### **TAVOLA 4.**

**Morti, durante l'anno 1936, nei Comuni con più di 100000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, classificati secondo le cause di morte.**

TAVOLA 4. — Morti, durante l'anno 1936, nei Comuni con più

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	ROMA	MILANO	NAPOLI	GENOVA	TORINO	PALERMO	FIRENZE	BOLOGNA
	<b>Complesso . . .</b>	<b>13633</b>	<b>13316</b>	<b>15604</b>	<b>7966</b>	<b>8426</b>	<b>6413</b>	<b>4374</b>	<b>4015</b>
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat. .	75	69	128	52	47	83	18	25
3	Tifo petecchiale. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	15	9	50	10	13	—	2	6
8	Scarlattina . . . . .	31	4	19	1	5	3	2	3
9	Tosse convulsa . . . . .	92	60	67	22	26	19	15	13
10	Difterite . . . . .	100	172	87	29	32	52	13	8
11	Influenza . . . . .	291	210	485	49	175	109	26	57
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a) . .	1271	779	988	657	894	501	440	334
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi . .	311	229	221	167	153	123	101	114
34	Sifilide . . . . .	155	94	184	29	32	14	29	26
38	Malaria . . . . .	10	1	21	3	1	8	—	—
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44, dal 45 al 53	Altre mal. infettive e parassitarie .	312	196	205	90	112	147	73	108
54, 55	Cancri e altri tumori maligni . . .	1196	1523	531	882	945	227	613	487
57, 58	Tumori non maligni (b) . . . . .	91	69	35	62	64	26	15	16
59	Reumatismo cronico e gotta . . . .	12	22	25	25	22	5	3	12
75	Diabete mellito . . . . .	230	147	136	145	95	76	44	55
56, dal 60 al 74, 76, 77	Alcoolismo acuto e cronico . . . .	18	10	1	10	5	1	5	4
80, 83	Altre mal. gener. e avvel. cronici . .	168	165	125	98	121	47	58	72
82	Atassia locom. e paralisi progr. alien.	74	27	91	51	21	19	12	12
78, 79, 81, dall'84 all'89	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	1099	1098	1257	811	747	537	325	401
dal 90 al 95	Altre malattie del sist. nervoso, ecc. (c)	288	188	500	150	180	115	70	122
dal 96 al 103	Malattie del cuore . . . . .	1187	1726	1656	1226	976	604	494	481
106	Altre mal. dell'appar. circolatorio . .	376	462	595	245	268	297	156	183
107, 108, 109	Bronchiti . . . . .	216	169	430	117	194	64	76	45
104, 105, dal 110 al 114	Polmoniti . . . . .	2066	2312	2619	1069	964	785	693	462
119, 120	Altre mal. app. respir., escl. la tbc. .	314	261	246	162	188	123	91	92
121	Enteriti . . . . .	505	332	1201	115	216	601	26	42
dal 124 al 127	Appendicite . . . . .	110	127	76	41	109	27	31	43
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Malattie del fegato e vie biliari. . .	234	324	235	180	225	71	82	79
130, 131, 132, dal 133 al 139	Altre mal. dell'apparato digerente .	418	305	377	251	227	141	119	111
140, 145	Nefriti . . . . .	429	428	790	238	226	200	151	120
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. dell'app. genito-urinario .	231	194	200	103	141	92	72	80
dal 151 al 156	Setticemia e infezioni puerperali . .	47	21	35	17	15	21	10	19
dal 157 al 161	Altre mal. della gravid., parto e puerp.	48	26	92	17	20	29	10	16
162	Malattie della pelle, ecc. (d) . . . .	140	97	140	56	60	58	19	30
dal 163 al 171	Debolezza congenita, ecc. (e) . . . .	619	486	407	205	247	336	93	92
dal 172 al 175	Senilità . . . . .	212	280	814	251	172	624	175	59
dal 176 al 198	Suicidio . . . . .	92	156	109	65	114	26	36	55
199, 200	Omicidio . . . . .	16	22	37	5	8	9	1	4
	Morte violenta e accidentale (f) . . .	350	336	307	193	197	112	104	122
	Morte improv. e cause non specificate o mal definite . . . . .	184	180	82	67	169	81	71	5

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

di 100 000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, classificati secondo le cause di morte.

VENEZIA	TRIESTE	CATANIA	BARI	MESSINA	VERONA	PADOVA	LIVORNO	BRESCIA	REGGIO DI CALABRIA	FERRARA	TARANTO	CAGLIARI	LA SPEZIA	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
<b>3227</b>	<b>3489</b>	<b>3740</b>	<b>2952</b>	<b>2961</b>	<b>2057</b>	<b>2012</b>	<b>1627</b>	<b>2290</b>	<b>1505</b>	<b>1570</b>	<b>1788</b>	<b>1708</b>	<b>1220</b>	
35	9	56	56	12	20	26	8	24	8	12	20	9	14	1, 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	50	1	16	58	5	—	2	—	—	1	12	26	—	7
1	1	—	1	1	3	—	1	1	1	—	2	3	—	8
16	11	18	3	30	8	13	12	23	1	3	7	25	14	9
22	22	4	10	10	5	17	11	52	4	3	8	7	9	10
20	56	11	552	12	44	24	29	39	12	20	2	50	15	11
221	420	254	67	160	96	163	164	186	69	151	103	163	103	23
111	91	62	60	31	32	65	34	46	13	58	41	74	24	dal 24 al 32
14	46	23	19	15	6	7	9	11	4	5	10	5	8	34
1	2	7	2	2	—	—	1	—	1	—	3	9	—	38
96	41	71	27	98	48	47	31	49	16	25	19	43	23	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44, dal 45 al 53
350	379	145	82	106	197	208	192	192	52	162	38	77	110	dal 54 al 55
13	19	19	9	5	14	17	6	7	2	3	2	6	5	54, 55
11	7	3	2	2	6	5	3	5	4	4	2	2	2	57, 58
23	48	47	17	21	27	18	17	21	15	6	12	15	16	59
5	3	—	—	—	5	2	—	6	—	2	—	1	—	75
51	24	45	26	25	21	31	19	39	25	15	26	43	21	56, dal 60 al 74, 76, 77
14	30	4	5	4	6	4	4	17	3	7	1	3	3	80, 83
260	198	242	239	202	209	157	142	200	84	145	103	123	133	82
58	55	62	35	71	43	59	22	85	41	49	49	33	17	78, 79, 81, dall'84 all'89
313	362	277	205	399	222	155	191	238	154	188	113	109	152	dal 90 al 95
222	136	102	113	46	74	102	81	45	32	102	27	38	32	dal 96 al 103
48	40	112	51	38	46	32	35	22	34	17	75	28	24	106
361	473	477	323	599	293	234	234	380	241	206	356	238	155	107, 108, 109
70	92	62	55	42	35	48	39	39	30	27	43	32	28	104, 105, dal 110 al 114
106	90	629	322	302	69	49	41	107	226	27	267	151	30	119, 120
24	25	17	18	5	17	7	17	15	5	10	20	11	8	121
69	56	67	38	34	27	35	35	33	14	23	23	29	22	dal 124 al 127
73	85	87	51	55	47	57	37	57	39	37	39	45	33	dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
134	76	126	119	108	54	55	57	63	44	39	69	51	30	130, 131, 132
44	43	55	37	32	46	25	17	21	12	23	21	21	25	dal 133 al 139
5	10	8	7	12	7	8	—	11	2	3	2	10	7	140, 145
10	9	14	15	8	12	10	4	9	6	9	13	7	5	dal 141 al 144, dal 146 al 150
37	20	31	27	15	21	29	16	13	10	10	20	13	15	dal 151 al 156
150	130	166	185	93	105	122	41	109	60	62	109	79	46	dal 157 al 161
69	159	317	78	234	76	102	17	24	164	66	72	48	27	162
27	65	23	10	8	6	16	11	6	4	16	7	8	10	dal 163 al 171
1	3	5	3	2	4	4	1	1	6	1	3	—	2	dal 172 al 175
103	99	64	65	51	72	49	43	74	40	31	35	54	34	dal 176 al 198
39	4	24	2	13	29	10	3	20	27	2	14	19	18	199, 200

cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura







Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classi-

NUMERI DELL'ELENCO NOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
71	Anemie . . . . .	—	—	145	70	127	62	38	21	16	9
	a) anemia pernicioso progressiva . . . . .	—	—	21	11	32	20	10	4	8	3
	b) altre . . . . .	—	—	124	59	95	42	28	17	8	6
72	Leucemie e aleucemie . . . . .	—	—	47	30	49	21	36	18	30	14
	a) leucemie vere . . . . .	—	—	43	27	47	20	31	17	25	12
	b) aleucemie . . . . .	—	—	4	3	2	1	5	1	5	2
73	Malattie della milza . . . . .	—	—	3	1	4	2	3	1	—	—
74	Altre mal. sangue e org. ematop. . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
	<b>V. - Avvelenamenti cronici e intossicaz.</b>	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
75	Alcoolismo . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
	a) acuto . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
	b) cronico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Avvelenam. cronici da sost. organ. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) professionali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) professionali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (b)</b>	1528	644	3133	1388	1147	542	540	251	324	161
78	Encefalite (non epidemica) . . . . .	—	—	39	17	29	13	19	8	20	9
	a) ascesso del cervello . . . . .	—	—	5	1	6	3	3	1	2	1
	b) altre . . . . .	—	—	34	16	23	10	16	7	18	8
79	Meningite semplice . . . . .	41	20	764	319	375	164	166	85	103	44
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Altre malattie del midollo spinale . . . . .	1	1	7	2	8	1	6	—	4	4
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb. . . . .	3	1	28	7	7	3	8	6	6	3
	a) emorragia cerebrale . . . . .	—	—	14	4	3	2	2	2	1	1
	b) embolia e trombosi cerebrale . . . . .	—	—	2	1	3	2	2	2	1	1
	c) emiplegia ed altre paralisi (c) . . . . .	3	1	12	2	1	—	6	4	5	2
83	Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Demenza precoce e altre psicosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) demenza precoce . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre psicosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Epilessia . . . . .	2	—	23	7	12	5	9	5	9	4
86	Convulsioni (bambini — 5 anni) . . . . .	1470	615	2158	975	653	327	302	133	153	78
87	Altre malattie del sistema nervoso . . . . .	4	3	12	9	21	11	12	6	6	4
	a) corea . . . . .	—	—	3	2	10	6	1	—	1	—
	b) nevrite . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	c) paralisi agitante . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) sclerosi a placche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e) altre . . . . .	4	3	9	7	11	5	10	5	5	4
88	Malattie degli organi della vista . . . . .	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1
89	Mal. dell'orecch. e del seno mastoid. . . . .	7	4	101	51	41	18	17	7	22	14
	a) otite . . . . .	5	2	83	42	28	11	12	5	18	12
	b) altre . . . . .	2	2	18	9	13	7	5	2	4	2
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio . . . . .</b>	24	12	144	67	91	55	64	31	64	37
90 a 95	Malattie del cuore :	13	9	97	43	46	29	34	16	47	25
90	Pericardite . . . . .	—	—	4	2	4	4	3	—	2	1
91	Endocardite acuta . . . . .	1	1	8	4	5	4	6	3	8	5
92	Endocard. cr., comp. le afl. valvol. . . . .	—	—	26	13	16	6	16	9	20	11
93	Malattie del miocardio . . . . .	4	3	21	8	8	4	3	2	9	6
	a) miocardite acuta . . . . .	—	—	3	1	2	1	1	1	4	4
	b) miocardite cr. e degeneraz. del miocardio . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificate . . . . .	4	3	17	7	6	3	2	1	5	2
94	Mal. arterie coron. e angina pect. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Altre malattie del cuore . . . . .	8	5	38	16	13	11	6	2	8	2
	a) malattie funzionali del cuore . . . . .	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—
	b) altre e non specificate . . . . .	8	5	32	16	13	11	6	2	8	2
96	Aneurisma, eccet. l'aneur. del cuore . . . . .	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1
97	Arteriosclerosi (d) . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
71	Anemie . . . . .	15	6	46	22	31	23	29	15	31	20	42	35	27	16	39	31
	a) anemia pernicioso progressiva . . . . .	4	1	17	7	19	14	18	11	19	14	32	26	16	9	28	21
	b) altre . . . . .	11	5	29	15	12	9	11	4	12	6	10	9	11	7	11	10
72	Leucemie e aleucemie . . . . .	18	8	75	23	73	31	44	25	61	33	73	38	71	28	97	54
	a) leucemie vere . . . . .	12	7	52	17	52	22	31	17	27	17	36	19	30	13	54	32
	b) aleucemie . . . . .	6	1	23	6	21	9	13	8	34	16	37	19	41	15	43	22
73	Malattie della milza . . . . .	1	1	11	5	3	1	5	2	11	4	7	5	4	1	14	8
74	Altre mal. sangue e org. ematop. . . . .	—	—	2	2	3	1	1	—	4	2	1	—	—	1	1	1
	<b>V. - Avvelenamenti cronici e intossicaz.</b>	1	—	3	2	1	—	1	—	3	—	6	—	24	6	49	6
75	Alcoolismo . . . . .	1	—	3	2	1	—	—	—	3	—	6	—	22	4	46	6
	a) acuto . . . . .	1	—	3	2	1	—	—	—	3	—	6	—	2	4	5	1
	b) cronico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4	41	5
76	Avvelenam. cronici da sost. organ. . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—
	a) professionali . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
	a) professionali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
	b) altri . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (b)</b>	206	97	666	344	474	200	409	153	565	231	544	232	633	274	940	404
78	Encefalite (non epidemica) . . . . .	13	8	44	24	33	15	22	8	27	8	33	14	44	16	32	23
	a) ascesso del cervello . . . . .	5	2	14	7	11	6	7	2	7	1	11	3	18	4	11	8
	b) altre . . . . .	8	6	30	17	22	9	15	6	20	7	22	11	26	12	21	15
79	Meningite semplice . . . . .	69	29	302	162	190	79	101	36	137	54	86	41	64	30	81	41
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Altre malattie del midollo spinale . . . . .	1	1	7	2	8	1	6	—	4	2	5	3	5	3	15	1
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb. . . . .	3	1	25	14	33	14	45	19	74	35	93	41	140	73	307	131
	a) emorragia cerebrale . . . . .	—	—	13	8	10	5	19	9	35	14	51	21	83	43	201	80
	b) embolia e trombosi cerebrale . . . . .	—	—	4	2	8	3	9	5	25	17	28	14	39	23	64	39
	c) emiplegia ed altre paralisi (c) . . . . .	3	1	8	4	15	6	17	5	14	4	14	6	18	7	42	12
83	Paralisi progressiva degli alienati . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Demenza precoce e altre psicosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) demenza precoce . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre psicosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Epilessia . . . . .	8	5	58	20	86	29										

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classificate secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		98	Cangrena . . . . .	4	2	10	8	23	14	22	11
	a) senile . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre . . . . .	4	2	10	8	23	14	22	11	12	8
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	—	—	2	1	1	1	1	1	—	—
100	Mal. vene: varici, emorr., fleb., ecc.	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—
101	Mal. sist. linfat., linfangioite, ecc.	5	—	29	11	19	9	5	2	4	3
102	Anomalie idiopatiche press. sang.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Altre mal. dell'appar. circolatorio	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio.</b>	<b>3331</b>	<b>1340</b>	<b>20799</b>	<b>9655</b>	<b>11746</b>	<b>5507</b>	<b>3436</b>	<b>1660</b>	<b>1624</b>	<b>770</b>
104	Malattie delle fosse nasali e annessi	9	6	8	3	—	—	2	—	—	—
105	Malattie della laringe . . . . .	29	11	80	36	68	29	24	9	15	7
106	Bronchite . . . . .	902	369	2841	1316	1049	517	268	124	108	58
	a) acuta . . . . .	308	130	847	398	320	161	86	37	33	24
	b) cronica . . . . .	—	—	30	12	43	17	12	9	10	5
	c) non specificata . . . . .	594	239	1964	906	686	339	170	78	65	29
107	a) Polmonite, tutte le forme . . . . .	2362	942	17646	7611	10275	4827	2993	1465	1423	674
109	Broncop., compr. la bronch. capil.	2083	822	14800	6368	8463	3979	2431	1218	1127	545
108	Polmonite lobare . . . . .	279	120	2846	1243	1812	848	562	247	296	129
110	Pleuriti . . . . .	3	3	122	50	263	94	111	43	47	19
111	Congest., edema, ecc. del pulm. (b)	20	7	51	20	23	17	8	4	4	1
112	Asma . . . . .	2	—	21	9	13	6	5	4	2	1
113	Enfisema polmonare . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
114	Altre mal. app. respiratorio (c). . . . .	4	2	29	10	55	17	25	11	23	9
	a) polmonite interstiziale cronica (d) . . . . .	—	—	6	2	15	5	4	2	4	2
	b) altre, compresa cangrena polmonare	4	2	23	8	40	12	21	9	19	7
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	<b>2498</b>	<b>1093</b>	<b>28924</b>	<b>12583</b>	<b>9840</b>	<b>5006</b>	<b>1794</b>	<b>894</b>	<b>643</b>	<b>322</b>
115	Mal. della cavità boccale, ecc. (e)	41	16	112	53	93	47	54	22	52	25
116	Malattie dell'esofago . . . . .	3	—	1	—	1	—	2	1	1	—
117	Ulcera dello stom. e del duodeno.	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—
	a) stomaco . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
	b) duodeno . . . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
118	Altre mal. stomaco (cancro eccett.)	71	27	256	129	59	34	27	13	17	8
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . . . .	2296	1022	26102	12235	9509	4850	—	—	—	—
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni e più)	—	—	—	—	—	—	1599	808	475	244
	a) enterite . . . . .	—	—	—	—	—	—	1598	807	474	244
	b) ulcera intestinale . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
121	Appendicite . . . . .	1	1	5	3	11	5	17	9	27	12
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	45	10	157	45	54	16	24	10	13	3
	a) ernia . . . . .	9	—	58	2	22	1	7	—	2	—
	b) occlusione intestinale . . . . .	36	10	99	43	32	15	17	10	11	3
123	Altre malattie dell'intestino . . . . .	8	5	44	17	12	4	4	2	4	—
124	Cirrosi del fegato . . . . .	1	1	5	1	10	5	3	—	—	—
	a) alcoolica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) non indicata come alcoolica . . . . .	1	1	5	1	10	5	3	—	—	—
125	Altre m. fegato (comp. atrof. gialla)	6	3	44	20	21	10	12	5	5	2
126	Calcolosi biliare . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Altre m. della vescich. e vie biliari	8	1	55	21	15	5	17	5	4	3
128	Malattie del pancreas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Peritonite senza causa indicata . . . . .	18	7	141	58	54	28	34	19	44	24
	<b>X. - Mal. dell'apparato urinario, ecc. (f)</b>	<b>89</b>	<b>33</b>	<b>637</b>	<b>303</b>	<b>578</b>	<b>301</b>	<b>397</b>	<b>191</b>	<b>268</b>	<b>129</b>
130	a) Nefrite: . . . . .	72	26	544	247	540	273	381	183	259	125
132	acuta . . . . .	72	26	533	242	505	254	355	167	241	117
131	cronica . . . . .	—	—	10	4	33	18	23	14	14	6
132	non specificata . . . . .	—	—	1	1	2	1	3	2	4	2

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombotici. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	98	9	5	9	6	3	1	5	4	10	5	8	3	9	4	7
	9	5	9	6	3	1	5	4	10	5	8	3	9	4	7	5
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	2	1	3	1	1	1	3	—	5	1	8	6	12	9	14	10
101	3	2	3	2	1	—	3	1	4	1	2	1	4	1	2	—
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	—	—	3	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2
	<b>899</b>	<b>446</b>	<b>1911</b>	<b>994</b>	<b>970</b>	<b>502</b>	<b>1212</b>	<b>509</b>	<b>1836</b>	<b>723</b>	<b>1724</b>	<b>822</b>	<b>1962</b>	<b>886</b>	<b>2219</b>	<b>910</b>
104	—	—	—	—	2	1	7	1	4	—	1	—	4	3	4	1
105	9	5	33	16	9	3	2	—	5	2	7	3	5	1	10	6
106	55	29	118	70	61	45	55	31	82	38	86	47	92	48	110	47
	16	8	25	19	15	12	15	6	13	6	4	1	8	4	9	5
	3	3	75	42	30	22	26	12	29	14	35	18	21	11	28	12
107	795	394	1632	845	791	403	1010	418	1516	595	1380	655	1602	719	1794	747
109	624	307	1149	612	515	261	545	249	787	360	696	364	797	407	872	394
108	171	87	483	233	276	142	465	169	729	235	684	291	805	312	922	353
110	23	10	85	40	72	35	87	42	126	49	123	60	108	57	112	53
111	4	1	11	9	5	3	7	2	11	7	20	12	11	6	22	10
112	7	3	6	3	1	—	3	2	8	4	16	11	19	10	35	18
113	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	14	6
114	6	4	25	11	29	12	41	13	84	28	88	33	119	42	118	22
	2	2	—	—	2	1	4	4	4	3	7	6	10	6	7	2
	4	2	25	11	27	11	37	9	80	25	81	27	109	36	111	20
	<b>404</b>	<b>206</b>	<b>1294</b>	<b>651</b>	<b>797</b>	<b>348</b>	<b>698</b>	<b>231</b>	<b>822</b>	<b>357</b>	<b>967</b>	<b>388</b>	<b>1101</b>	<b>431</b>	<b>1250</b>	<b>492</b>
115	34	18	161	87	55	37	44	20	80	31	59	23	55	24	51	21
116	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	1	—	2	1	3	2
117	2	1	4	—	9	4	31	11	77	19	172	24	232	33	302	44
	2	1	3	—	8	4	14	6	50	15	120	17	179	20	192	32
	—	—	1	—	1	—	17	5	27	4	52	7	113	13	110	12
118	11	4	12	6	8	5	4	3	10	7	14	6	13	9	24	4
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	257	128	506	249	210	101	123	48	113	73	125	58	121	64	119	65
	257	128	506	249	210	101	123	48	113	73	125	58	121	64	119	65
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	28	11	273	133	327	121	250	81	257	87	228	94	219	101	185	78
122	11	7	63	28	37	10	36	9	53	14	85	36	77	25	118	47
	2	—	7	—	3	—	8	—	12	1	21	6	25	1	35	11
	9	7	56	28	34	10	28	9	41	13						

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		133	Altre malattie dei reni, ecc. (b). a) pielite . . . . . b) altre . . . . .	4	—	34	17	20	13	9	4
134	Calcolosi delle vie urinarie. a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori b) calcolosi della vescica c) calcolosi senza altre indicazioni . . . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori. a) cistite . . . . . b) altre . . . . .	3	—	48	34	17	14	7	4	5	1
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc. a) stenosi uretrale . . . . . b) altre . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Malattie della prostata . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c). . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
139	Mal. organi genitali della donna (c) a) ovaie, trombe e parametri . . . . . b) utero . . . . . c) mammelle . . . . . d) altre . . . . .	7	7	5	5	1	1	—	—	—	—
140	<b>XI. — Mal. gravidanza, parto e puerp.</b> Aborto con condizioni settiche. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Gestazione ectopica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Altri accidenti della gravidanza (e) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale a) da placenta previa . . . . . b) altre emorragie . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Setticemia e infezioni puerperali (f) a) setticemia e piemia puerperali . . . . . b) tetano puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerper. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Altre forme di tossiemia della grav. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g). a) phlegmasia alba dolens e trombosi . . . . . b) embolia o morte improvvisa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Altri accidenti del parto . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Altre malattie non definite (h) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	<b>XII. — Malattie della pelle e del tessuto cellulare</b> . . . . .	88	45	304	140	138	67	47	23	41	16
152	Foruncoli . . . . .	4	2	32	11	16	6	4	3	3	3
153	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	64	35	179	90	95	47	32	15	35	11
154	Altre malattie della pelle, ecc. (i) . . . . .	20	8	93	39	27	14	11	5	3	2
155	<b>XIII. — Malattie delle ossa e degli organi della locomozione</b> . . . . .	3	1	51	23	31	12	25	14	27	11
156	Osteomielite infettiva acuta. . . . .	1	—	27	9	20	9	19	12	22	11
157	Altre malattie delle ossa (l) . . . . .	1	1	9	3	5	1	3	2	3	—
158	Mal. articolazioni, ecc. (m) . . . . .	1	—	15	11	6	2	3	—	2	—
159	a) articolaz. (eccett. la tbc. e il reumatismo) b) altri organi della locomozione . . . . .	1	—	14	10	6	2	2	—	2	—
160	<b>XIV. — Vizi di conformazione congeniti</b> . . . . .	1740	774	768	346	142	65	59	28	31	19
161	Vizi di conformazione congeniti (n) a) idrocefalia . . . . . b) spina bifida e meningocele . . . . . c) malformazioni congenite del cuore . . . . . d) mostrosità . . . . . e) altri . . . . .	1740	774	768	346	142	65	59	28	31	19
162	<b>XV. — Malattie dell'infanzia.</b> Debolezza congenita . . . . .	23815	10650	2351	1153	—	—	—	—	—	—
163	Nascita prematura (n) . . . . .	9171	4177	357	187	—	—	—	—	—	—

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) del bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come improvvisa puerperale (non specificata come settica). (d) o condizioni non specificate del puerperio. (e) dei suoi annessi e del tessuto cellulare.

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	133	4	2	17	12	13	5	14	5	27	16	38	18	40	24	60
134	2	1	9	8	2	—	4	1	14	11	25	12	26	17	33	19
135	—	—	2	—	—	—	3	—	9	5	13	6	19	7	27	9
136	—	—	1	—	—	—	1	—	5	2	12	4	14	6	23	10
137	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	17	6	22	9
138	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—
139	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	7	—	8	4	15	3
140	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	22	5	12	4	22	2
141	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	—	2	2	2	2
142	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
143	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	3	—
144	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
145	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
146	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—
147	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	17	7	17	7	32	32
148	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	10	10	11	11	10	10
149	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	4	4
151	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	76	76	476	476	677	677
152	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	37	37	56	56	49	49
153	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	13	13	13	13	19	19
154	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	25	25	42	42	36	36
155	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	3	3
156	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	59	59	106	106	97	97
157	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	24	24	40	40	46	46
158	—	—	—	—	—	—	—	—	47	47	82	82	57	57	100	100
159	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	31	31	206	206	216	216
160	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	206	206	262	262	216	216
161	—	—	—	—	—	—	—	—	107	107	123	123	101	101	104	104
162	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5	9	9	8	8
163	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	33	33	44	44	34	34
164	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	3	7	7	5	5
165	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	35	35	37	37	29	29
166	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24	40	40	67	67	73	73
167	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	8	8	4	4	2	2
168	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	59	59	106	106	97	97
169	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	24	24	40	40	46	46
170	—	—	—	—	—	—	—	—	47	47	82	82	57	57	100	100
171	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	31	31	206	206	216	216
172	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	206	206	262	262	216	216
173	—	—	—	—	—	—	—	—	107	107	123	123	101	101	104	104
174	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5	9	9	8	8
175	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	33	33	44	44	34	34
176	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	3	7	7	5	5
177	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	35	35	37	37	29	29
178	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24	40	40	67	67	73	73
179	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	8	8	4	4	2	2
180	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	59	59	106	106	97	97
181	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	24	24	40	40	46	46
182	—	—	—	—	—	—	—	—	47	47	82	82	57	57	100	100
183	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	31	31	206	206	216	216
184	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	206	206	262	262	216	216
185	—	—	—	—	—	—	—	—	107	107	123	123	101	101	104	104
186	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5	9	9	8	8
187	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	33	33	44	44	34	34
188	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	3	7	7	5	5
189	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	35	35	37	37	29</	

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
160	Conseguenze del parto (b)	888	301	2	1	—	—	—	—	—	—
	a) con indicazione di operazione cesarea	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) senza indicazione di operazione cesarea	884	300	2	1	—	—	—	—	—	—
161	Altre mal. speciali dell'infanzia	4639	1967	791	391	—	—	—	—	—	—
	a) atelectasia	182	79	8	4	—	—	—	—	—	—
	b) ittero dei neonati	715	275	49	17	—	—	—	—	—	—
	c) sclerema e altre	3742	1613	734	370	—	—	—	—	—	—
162	XVI - Senilità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Senilità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) con demenza senile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) senza demenza senile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	XVII. - Morti violente e accidentali	50	24	180	71	686	293	636	294	407	175
a	Suicidi:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	per ingestione di veleni (c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	con gas tossici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	per impiccamento o strangol.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	per annegamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	con arma da fuoco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	con arma da punta e da taglio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	per precipitaz. da luogo elev.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	per schiacciamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	con altri mezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Omicidi	33	17	4	1	4	1	3	—	—	—
175	Infanticidio (- un anno)	33	17	4	1	—	—	—	—	—	—
	a) subito dopo la nascita	29	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri, prima d'un anno.	4	3	4	1	—	—	—	—	—	—
173	Omicidi con arma da fuoco (d)	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
174	Omicidi arma da taglio e punta (d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Omicidi con altri mezzi (d)	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—
176	Morti accidentali:	17	7	176	70	682	292	632	293	406	175
194	Morsi o punture d'animali velenosi	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1
176	Avvelenamenti da alimenti guasti	—	—	—	—	1	1	7	4	4	1
177	Assorbimento di gas tossici	—	—	3	1	3	2	1	5	2	—
178	Altri avvelenam. accident. acuti (e)	—	—	7	4	15	4	24	9	2	—
179	Per incendio	1	—	1	—	—	—	2	2	3	2
180	Per ustioni accidentali (f)	4	1	77	27	326	136	352	168	220	109
181	Per soffocazione meccanica accid.	6	3	37	15	26	11	5	5	1	—
182	Per annegamento accidentale	1	—	9	6	201	88	128	55	22	—
183	Per trauma acc. d'arma da fuoco (g)	—	—	1	—	—	—	6	1	2	1
184	Per trauma acc. arma punta o tag. (g)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
185	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h)	2	1	32	13	88	38	86	43	85	27
186	Per cataclisma (i)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
187	Per violenze di animali	—	—	—	—	2	1	4	1	1	—
188	Per freddo eccessivo	2	1	3	2	1	—	2	—	1	1
189	Per caldo eccessivo	—	—	2	2	3	3	5	3	3	1
190	Per fulmine	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—
191	Per accidenti dovuti a corr. elettr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	Per altri accidenti	1	1	1	—	15	7	9	7	10	4
193	a) corpi estranei	—	—	—	—	4	3	1	1	2	2
194	b) altri	1	1	1	—	11	4	8	6	8	2
195	Morte violenta, ecc. (l)	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
196	Per ferite di guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Per esecuzione giudiziaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	XVIII. - Cause di morte non determinate	363	163	195	95	60	27	38	11	20	11
199	Morte improvvisa	53	26	111	58	28	12	13	2	9	4
200	Cause non specif. o mal definite	310	137	84	37	32	15	25	9	11	7

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di (e) tutte le morti attribuite a un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (f) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	263	122	807	308	759	146	839	168	1377	262	1289	201	1065	176	1093	196
a	—	—	1	—	19	8	115	55	316	126	303	89	245	70	295	83
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	—	—	—	—	2	2	17	15	47	33	35	20	30	18	32	17
164	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	5	2	12	5	16	4
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a	6	2	17	5	25	5	45	15	94	29	114	23	110	32	73	21
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	2	—	10	3	11	1	27	10	60	17	55	11	55	10	35	8
174	2	1	1	1	7	2	8	3	21	8	42	6	36	12	25	9
175	2	1	6	1	7	2	10	2	13	4	17	6	19	10	13	4
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a	257	120	785	302	713	133	675	97	956	105	861	89	707	72	715	88
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	2	1	14	4	8	4	3	2	6	4	7	4	5	1	6	2
178	3	2	4	3	4	—	8	1	14	3	15	4	8	2	9	—
179	1	—	14	8	4	1	2	—	4	3	4	2	4	2	5	2
180	6	2	9	4	4	2	—	—	1	—	5	1	4	1	3	1
181	121	67	145	108	27	15	21	9	32	12	29	9	19	8	20	13
182	1	—	8	2	2	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—
183	28	14	145	24	145	25	161	14	173	20	88	13	68	6	65	14
184	7	5	19	7	21	4	33	4	33	2	30	1				

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 40 A 44 ANNI		DA 45 A 49 ANNI		DA 50 A 54 ANNI		DA 55 A 59 ANNI		DA 60 A 64 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		<b>Complesso . . .</b>	<b>14566</b>	<b>6949</b>	<b>16940</b>	<b>7915</b>	<b>21043</b>	<b>9700</b>	<b>26785</b>	<b>12095</b>	<b>35656</b>
<b>I. - Malattie infettive e parassitarie .</b>	<b>3485</b>	<b>1546</b>	<b>3142</b>	<b>1324</b>	<b>2978</b>	<b>1216</b>	<b>2633</b>	<b>1113</b>	<b>2435</b>	<b>1048</b>	
1 e 2 Febbre tifoide e paratifi . . . . .	129	82	118	74	106	57	82	44	82	35	
1 Febbre tifoidea (tifo addominale)	121	77	106	68	98	52	68	37	69	30	
2 Paratifo . . . . .	8	5	12	6	8	5	14	7	13	5	
3 Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 Febbre ondulante . . . . .	12	7	19	7	17	5	13	6	15	5	
6 Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
a) vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) vaioloide, alastrim . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) non specificato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7 Morbillo . . . . .	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	
8 Scarlattina . . . . .	1	1	3	—	—	—	2	—	1	1	
9 Tosse convulsa . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
10 Difterite . . . . .	5	4	2	2	4	4	3	2	2	1	
11 Influenza . . . . .	234	109	290	116	351	149	406	197	576	274	
a) con complicazioni respiratorie indicate	188	84	231	85	273	114	326	153	476	225	
b) senza complicazioni respirator. indicate	46	25	59	31	78	35	80	44	100	49	
13 Dissenteria . . . . .	10	3	14	4	4	2	7	2	10	3	
a) amebica . . . . .	6	2	4	—	1	1	4	—	4	2	
b) bacillare . . . . .	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	
c) non specificata o dovuta ad altre cause	3	1	9	3	2	1	2	1	5	1	
15 Risipola . . . . .	57	29	64	29	74	36	73	35	76	30	
16 Poliomielite a., polioencefalite ac.	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	
17 Encefalite letargica o epidemica . . . . .	34	19	34	15	28	10	30	15	32	13	
18 Meningite cerebro-spinale epidem.	3	—	1	—	5	2	2	—	1	1	
19 Morva e farcino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20 Pustola maligna e carbonchio . . . . .	10	3	7	3	15	2	6	1	8	2	
21 Rabbia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22 Tetano . . . . .	26	11	25	6	35	8	20	4	37	9	
23 a 32 <b>Tubercolosi :</b>	<b>2652</b>	<b>1170</b>	<b>2234</b>	<b>947</b>	<b>1952</b>	<b>808</b>	<b>1596</b>	<b>664</b>	<b>1229</b>	<b>537</b>	
23 dell'apparato respiratorio (b) . . . . .	2240	933	1872	760	1620	630	1334	521	970	388	
24 delle meningi e sist. nerv. centr.	57	31	37	24	42	25	25	13	21	11	
25 degli intest. e del peritoneo (c) . . . . .	105	73	86	53	78	47	59	36	49	27	
26 della colonna vertebrale . . . . .	42	23	52	34	37	24	42	27	25	15	
27 delle ossa e delle articolaz. (d) . . . . .	56	31	53	23	55	30	44	25	75	50	
28 della pelle e sottocutaneo . . . . .	3	2	3	2	7	5	2	2	7	3	
29 del sistema linfatico (e) . . . . .	5	5	5	4	4	1	6	4	1	1	
30 dell'apparato genito-urinario . . . . .	34	16	40	12	24	11	21	9	14	7	
31 Altre localizzazioni della tuberc.	4	2	1	—	—	—	2	1	3	2	
32 Tubercolosi disseminate . . . . .	106	54	85	35	85	35	61	26	64	33	
a) acuta . . . . .	42	19	41	13	34	15	20	9	15	10	
b) cronica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) non specificata . . . . .	64	35	43	22	50	19	41	17	49	23	
33 Lebbra . . . . .	3	2	5	2	4	1	2	—	3	—	
34 Sifilide . . . . .	104	27	140	40	138	40	152	44	112	34	
a) congenita . . . . .	2	1	1	1	1	1	3	—	—	—	
b) acquisita . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
c) non specificata . . . . .	102	26	138	39	134	38	149	41	112	34	
35 Inf. gonococcica e altre m. veneree	2	3	3	1	1	—	2	—	2	—	
36 Infecz. purulenta e setticemia (f) . . . . .	112	53	104	47	154	61	143	65	159	72	
a) setticemia . . . . .	96	50	83	37	128	53	123	57	135	60	
b) piemia . . . . .	16	3	20	10	23	8	19	8	23	12	
c) gangrena gassosa . . . . .	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	
38 Malaria . . . . .	64	13	53	19	67	22	70	21	65	24	
a) febbre malarica . . . . .	43	10	35	10	38	13	41	12	31	10	
b) cachessia palustre . . . . .	21	3	18	9	29	9	29	9	34	14	
39 Altre mal. dovute a protozoi paras.	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 65 A 69 ANNI		DA 70 A 74 ANNI		DA 75 A 79 ANNI		DA 80 A 84 ANNI		DA 85 A 89 ANNI		DA 90 E PIÙ		ETÀ IGNOTA		TOTALI		
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	MF
	<b>Complesso . . .</b>	<b>46822</b>	<b>22580</b>	<b>61190</b>	<b>30146</b>	<b>62903</b>	<b>31810</b>	<b>48710</b>	<b>25235</b>	<b>23594</b>	<b>12840</b>	<b>6959</b>	<b>4172</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>303721</b>	<b>285915</b>
1 e 2 Febbre tifoide e paratifi . . . . .	2398	1112	2144	1076	1745	942	1235	669	524	313	121	80	5	—	35819	35014	70833
1 Febbre tifoidea (tifo addominale)	53	30	37	19	15	11	6	3	—	—	—	—	—	—	1748	2091	3839
2 Paratifo . . . . .	44	26	26	13	14	10	5	2	—	—	—	—	—	—	1592	1925	3517
3 Tifo petecchiale . . . . .	9	4	11	6	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	156	166	322
5 Febbre ondulante . . . . .	18	6	8	5	5	3	3	2	—	—	—	—	—	—	108	78	186
6 Vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) vaiolo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) vaioloide, alastrim . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) non specificato . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Morbillo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1046	920	1966
8 Scarlattina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293	278	571
9 Tosse convulsa . . . . .	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1018	1354	2372
10 Difterite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1373	1198	2571
11 Influenza . . . . .	798	395	983	513	996	533	781	421	349	210	86	54	35	—	5539	5136	10675
a) con complicazioni respiratorie indicate	632	302	795	406	778	399	557	294	253	152	56	30	19	—	4453	3938	8391
b) senza complicazioni respirator. indicate	166	93	188	107	218	134	224	127	96	58	30	19	—	—	1086	1198	2284
13 Dissenteria . . . . .	11	3	22	11	19	3	2	1	—	—	—	—	—	—	150	121	271
a) amebica . . . . .	5	3	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	30	70
b) bacillare . . . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	19	46
c) non specificata o dovuta ad altre cause	5	3	16	2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	72	155
15 Risipola . . . . .	114	54	113	50	93	43	55	28	27	16	7	4	—	—	703	703	1400
16 Poliomielite a., polioencefalite ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240	199	439
17 Encefalite letargica o epidemica . . . . .	27	10	14	7	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	193	170	363
18 Meningite cerebro-spinale epidem.	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	77	193
19 Morva e farcino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 Pustola maligna e carbonchio . . . . .	13	4	11	4	8	2	5	—	—	—	—	—	—	—	92	44	136
21 Rabbia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 Tetano . . . . .	26	6	20	2	11	6	9	1	2	—	—	—	—	—	411	186	597
23 a 32 <b>Tubercolosi :</b>	<b>929</b>	<b>425</b>	<b>578</b>	<b>295</b>	<b>253</b>	<b>142</b>	<b>99</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>18494</b>	<b>19002</b>	<b>37496</b>
23 dell'apparato respiratorio (b) . . . . .	724	313	405	193	175	88	64	28	14	6	3	1	1	—	13901	13955	27856
24 delle meningi e sist. nerv. centr.	5	2	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1973	1966	3939
25 degli intest. e del peritoneo (c) . . . . .	34	15	32	18	14	11	3	—	2	1	—	—	—	—	654	1032	1686
26 della colonna vertebrale . . . . .	44	28	26	18	8	5	3	—	—	—</							

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Da 40 A 44 ANNI		Da 45 A 49 ANNI		Da 50 A 54 ANNI		Da 55 A 59 ANNI		Da 60 A 64 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		40	Anchilostomiasi . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1
41	Cisti idatica . . . . .	16	8	13	9	9	3	13	5	8	2
	a) del fegato . . . . .	11	6	7	5	4	2	6	4	6	2
	b) altre localizzazioni . . . . .	5	2	6	4	5	1	7	1	2	—
42	Altre malattie dovute a elminti . . . . .	—	—	1	—	2	1	3	3	—	—
43	Micosi . . . . .	4	1	1	—	4	1	1	—	4	1
44	Altre mal. infettive e parassitarie . . . . .	4	1	5	1	5	3	4	3	12	3
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>1753</b>	<b>1182</b>	<b>2486</b>	<b>1588</b>	<b>3403</b>	<b>2033</b>	<b>4467</b>	<b>2348</b>	<b>5272</b>	<b>2603</b>
45 a 53	Cancro e altri tumori maligni . . . . .	1548	1000	2275	1406	3280	1940	4350	2267	5164	2531
45	Tumori maligni della bocca e faringe . . . . .	32	13	88	20	119	17	158	26	213	31
46	Tumori maligni tubo dig. e peritoneo . . . . .	556	258	941	417	1560	715	2413	1013	3055	1285
	a) esofago . . . . .	17	5	35	13	87	13	141	22	158	30
	b) stomaco e duodeno . . . . .	313	145	559	223	944	414	1407	563	1887	751
	c) retto . . . . .	43	19	57	29	85	46	149	73	121	52
	d) fegato e vie biliari . . . . .	104	53	184	99	271	154	441	213	566	304
	e) pancreas . . . . .	15	6	33	11	37	13	71	32	91	38
	f) peritoneo . . . . .	14	7	12	10	26	20	40	28	27	17
	g) altri organi . . . . .	50	23	61	32	110	55	164	82	205	93
47	Tumori maligni dell'app. respirat. . . . .	75	14	107	24	139	44	170	47	204	64
48	— dell'utero . . . . .	315	315	431	431	494	494	484	484	405	405
49	— degli altri org. genit. della donna . . . . .	48	48	60	60	62	62	61	61	62	62
50	— delle mammelle . . . . .	188	188	258	258	317	315	304	301	321	319
51	— degli org. genito-urin. dell'uomo . . . . .	34	—	49	—	73	—	122	—	199	—
52	— della pelle . . . . .	20	6	26	8	45	18	75	25	103	36
53	— di altri org. o di org. non spec. . . . .	280	158	315	188	471	275	563	310	602	329
54	Tumori non maligni . . . . .	179	164	191	167	110	83	95	69	83	56
	a) organi genitali della donna . . . . .	141	141	147	147	65	65	53	53	35	35
	b) altri organi . . . . .	38	23	44	20	45	18	42	16	48	21
55	Tumori a caratt. maligno non spec. . . . .	26	18	20	15	13	10	22	12	25	16
	a) organi genitali della donna . . . . .	6	6	6	6	1	1	4	4	3	3
	b) altri organi . . . . .	20	12	14	9	12	9	18	8	22	13
	<b>III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b) . . . . .</b>	<b>286</b>	<b>178</b>	<b>398</b>	<b>253</b>	<b>572</b>	<b>344</b>	<b>780</b>	<b>413</b>	<b>1063</b>	<b>587</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	98	61	109	65	115	67	120	62	122	61
57	Reumatismo cronico, osteo-artrite . . . . .	18	15	40	30	53	37	79	45	137	95
58	Gotta . . . . .	2	—	4	1	4	3	9	4	11	1
59	Diabete mellito . . . . .	90	53	157	95	308	172	470	231	706	379
60	Scorbuto . . . . .	3	2	2	1	—	—	3	—	1	—
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) scorbuto . . . . .	3	2	2	1	—	—	3	—	1	—
61	Beriberi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Pellagra . . . . .	7	6	5	4	6	1	6	3	10	4
63	Rachitismo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Osteomalacia . . . . .	—	—	3	3	2	2	1	1	3	3
65	Mal. ghiandola pituitaria (ipofisi) . . . . .	1	—	4	2	2	1	1	—	1	1
66	Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi . . . . .	33	23	46	35	46	44	48	42	39	33
	a) gozzo semplice . . . . .	5	3	6	6	6	6	5	4	5	4
	b) gozzo esoftalmico . . . . .	22	16	35	27	33	33	39	35	29	26
	c) mixedema e cretinismo . . . . .	2	1	3	1	3	2	2	1	2	1
	d) tetania . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e) altre . . . . .	4	1	2	2	4	3	2	2	3	2
67	Malattie del timo . . . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
68	Mal. ghiand. o capsule surren. (c) . . . . .	28	14	19	12	21	10	26	18	21	14
69	Altre malattie generali . . . . .	6	4	8	4	15	7	15	7	12	6
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici . . . . .</b>	<b>157</b>	<b>90</b>	<b>191</b>	<b>92</b>	<b>154</b>	<b>70</b>	<b>223</b>	<b>120</b>	<b>183</b>	<b>87</b>
70	Stati emorragici . . . . .	14	11	19	9	8	3	25	17	16	10
	a) porpora primitiva . . . . .	9	7	10	7	6	2	19	12	12	7
	b) emofilia . . . . .	5	4	9	2	2	1	7	5	4	3

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari).

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	Da 65 A 69 ANNI		Da 70 A 74 ANNI		Da 75 A 79 ANNI		Da 80 A 84 ANNI		Da 85 A 89 ANNI		Da 90 e più		ETÀ IGNOTA		TOTALE			
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	MF	
	40	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
41	9	5	4	2	1	—	4	2	1	—	—	—	—	—	73	62	135	
	6	3	4	2	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	42	40	82	
	3	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	31	22	53	
42	2	1	1	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	206	229	435	
43	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	55	150	
44	9	2	5	3	12	10	4	1	5	4	—	—	—	—	135	114	249	
	5718	2732	5707	2758	3847	1906	1666	865	526	307	85	61	3	1	17765	19934	37699	
45 a 53	5577	2641	5589	2690	3744	1844	1600	830	515	303	82	59	3	1	17295	18792	36087	
45	263	40	234	49	164	28	96	15	36	9	7	2	—	—	1205	272	1477	
46	3547	1521	3581	1607	2275	1085	858	443	246	154	24	19	3	1	10901	8822	19723	
	160	29	151	38	104	29	39	14	6	5	—	—	—	—	705	203	908	
	2242	937	2227	975	1395	637	502	261	151	92	20	16	2	1	6823	5146	11969	
	166	61	163	71	119	59	36	16	9	4	—	—	—	—	549	467	1016	
	622	304	640	319	420	233	156	83	46	30	2	1	—	—	1721	1847	3568	
	84	45	96	35	49	19	21	12	9	3	—	—	—	—	304	227	531	
	39	30	29	19	12	9	5	2	1	1	—	—	—	—	72	159	231	
	234	115	275	150	176	99	55	24	19	2	2	1	—	—	727	773	1500	
	166	52	129	37	78	19	26	5	8	3	1	—	—	—	893	356	1249	
	307	307	292	292	154	154	59	59	21	21	3	3	—	—	—	3245	3245	48
	59	59	41	41	40	40	22	22	3	3	—	—	—	—	—	519	519	49
	273	269	240	234	171	167	102	99	34	34	11	11	—	—	24	2349	2373	50
	249	—	283	—	225	—	99	—	28	—	2	—	—	—	1463	—	1463	51
	120	52	178	74	185	95	157	76	70	33	27	18	—	—	581	448	1029	52
	593	341	611	356	452	256	181	111	69	46	7	6	—	—	2228	2781	5009	53
54	115	73	101	59	89	51	57	28	10	3	2	1	—	—	384	995	1379	54
	38	38	36	36	34	34	17	17	2	2	1	1	—	—	—	720	720	—
	77	35	65	23	55	17	40	11	8	1	1	—	—	—	384	275	659	—
55	26	18	17	9	14	11	9	7	1	1	1	—	—	—	86	147	233	55
	3	3	3	3	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	31	31	—
	23	15	14	6	13	10	7	5	1	1	1	—	—	—	86	116	202	—
56	1244	713	1227	679	912	589	418	236	115	61	28	18	—	—	4673	5567	10240	—
57	140	81	148	74	124	63	49	31	22	12	7							

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 40 A 44 ANNI		DA 45 A 49 ANNI		DA 50 A 54 ANNI		DA 55 A 59 ANNI		DA 60 A 64 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		71	Anemie	45	35	64	42	61	32	92	57
	a) anemia pernicioso progressiva	30	22	54	34	46	21	68	40	57	28
	b) altre	15	13	10	8	15	11	24	17	14	9
72	Leucemie e aleucemie	82	36	94	37	77	30	94	37	83	35
	a) leucemie vere	46	24	54	27	50	17	60	24	50	20
	b) aleucemie	36	12	40	10	27	13	34	13	33	15
73	Malattie della milza	13	5	14	4	8	5	9	7	11	3
74	Altre mal. sangue e org. ematop.	3	3	—	—	—	—	2	2	2	2
	<b>V. — Avvelenamenti cronici e intossicaz.</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>5</b>	<b>73</b>	<b>8</b>
75	Alcoolismo	55	12	52	11	56	9	78	5	69	8
	a) acuto	2	—	3	—	3	—	1	—	3	—
	b) cronico	53	12	49	11	53	9	77	5	66	7
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	1	—	—	—	2	1	2	—	2	—
	a) professionali	1	—	—	—	2	1	2	—	2	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali	3	—	2	—	5	1	2	—	2	—
	a) professionali	3	—	2	—	4	1	2	—	2	—
	b) altri	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	<b>VI. — Malattie del sist. nervoso, ecc. (b)</b>	<b>1171</b>	<b>513</b>	<b>1705</b>	<b>846</b>	<b>2622</b>	<b>1255</b>	<b>3987</b>	<b>1885</b>	<b>6149</b>	<b>2956</b>
78	Encefalite (non epidemica)	26	13	28	13	34	14	38	11	27	11
	a) accesso del cervello	6	2	10	2	10	3	10	3	5	3
	b) altre	20	11	18	11	24	11	28	8	22	8
79	Meningite semplice	61	21	73	35	49	21	63	25	44	19
80	Atassia locomotrice progressiva	17	4	26	6	48	15	37	4	52	15
81	Altre malattie del midollo spinale	44	15	45	27	62	29	78	33	88	37
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	550	264	1108	591	1952	973	3308	1608	5461	2666
	a) emorragia cerebrale	378	177	806	427	1480	714	2486	1208	4056	1974
	b) embolia e trombosi cerebrale	107	60	203	118	298	176	536	275	959	503
	c) emiplegia ed altre paralisi (c)	65	27	99	46	174	83	286	125	446	189
83	Paralisi progressiva degli alienati	139	22	111	24	123	21	90	21	70	18
84	Demenza precoce e altre psicosi	110	68	112	69	128	67	143	80	142	75
	a) demenza precoce	33	20	30	16	26	13	22	12	20	12
	b) altre psicosi	77	48	82	53	102	54	121	68	122	63
85	Epilessia	116	54	98	41	94	52	76	28	71	29
86	Convulsioni (bambini — 5 anni)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Altre malattie del sistema nervoso	70	38	72	33	84	38	110	58	148	68
	a) corea	3	1	3	1	2	—	2	1	2	2
	b) nevrite	6	2	4	2	7	3	9	5	19	6
	c) paralisi agitante	20	11	22	8	32	15	67	37	79	35
	d) sclerosi a placche	15	9	16	7	17	7	7	3	17	5
	e) altre	26	15	27	15	26	13	25	12	31	20
88	Malattie degli organi della vista	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
89	Mal. dell'orecch. e del seno mastoid.	37	14	32	7	47	24	44	17	46	18
	a) otite	25	8	20	5	25	11	30	11	23	9
	b) altre	12	6	12	2	22	13	14	6	23	9
	<b>VII. — Malattie dell'app. circolatorio</b>	<b>1573</b>	<b>677</b>	<b>2154</b>	<b>1173</b>	<b>3100</b>	<b>1648</b>	<b>4712</b>	<b>2413</b>	<b>7546</b>	<b>3942</b>
90 a 95	Malattie del cuore:	1441	824	1940	1092	2751	1504	4163	2201	6475	3524
90	Pericardite	13	2	10	2	20	10	12	2	15	5
91	Endocardite acuta	33	23	24	11	13	8	28	13	18	10
92	Endocard. cr., comp. le aff. valvol.	684	442	862	527	1058	632	1515	852	2136	1234
93	Malattie del miocardio	297	166	461	268	791	448	1316	715	2294	1278
	a) miocardite acuta	10	6	16	11	13	8	32	16	33	14
	b) miocardite cr. e degeneraz. del miocardio	104	54	169	95	329	196	555	307	1120	619
	c) non specificate	183	106	276	162	449	244	729	392	1141	645
94	Mal. arterie coron. e angina pect.	127	30	183	45	275	65	381	109	585	180
95	Altre malattie del cuore	287	161	400	239	594	341	911	510	1427	817
	a) malattie funzionali del cuore	13	9	21	18	33	19	43	23	56	31
	b) altre e non specificate	274	152	379	221	561	322	868	487	1371	786
96	Aneurisma, eccet. l'aneur. del cuore	38	9	59	13	77	19	88	20	113	28
97	Arteriosclerosi (d)	19	8	37	14	124	55	274	114	647	258

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)												ETÀ IGNOTA	T O T A L E			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
	DA 65 A 69 ANNI		DA 70 A 74 ANNI		DA 75 A 79 ANNI		DA 80 A 84 ANNI		DA 85 A 89 ANNI		DA 90 E PIÙ			M	F	M F		
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F						
71	86	38	76	34	34	19	8	3	4	1	—	—	—	—	499	628	1127	71
	67	28	55	21	21	9	6	3	2	—	—	—	—	—	283	347	630	a
	19	10	21	13	13	10	2	—	—	—	—	—	—	—	210	281	497	b
72	71	31	55	18	36	20	15	7	1	—	—	—	—	—	708	574	1282	72
	35	15	35	11	14	8	5	—	—	—	—	—	—	—	422	367	789	a
	36	16	20	7	22	12	10	—	—	—	—	—	—	—	286	207	493	b
73	8	6	5	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	72	66	138	73
74	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14	26	74
	78	11	56	4	28	5	8	4	5	—	—	—	—	—	510	86	596	
75	75	11	52	3	27	4	7	3	5	—	—	—	—	—	481	79	560	75
	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	28	8	36	a
	72	11	49	3	26	4	6	2	5	—	—	—	—	—	453	71	524	b
76	—	—	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	9	5	14	76
	—	—	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	a
	—	—	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	7	5	12	b
77	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	22	77
	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1	20	a
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	b
	8161	4366	12809	6154	12778	6879	8108	3921	3051	1507	594	342	13	5	38608	34750	73358	
78	16	9	15	7	16	7	5	1	1	—	—	—	—	—	311	250	561	78
	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	54	149	a
	14	7	14	7	11	7	5	1	1	—	—	—	—	—	216	196	412	b
79	38	11	27	9	11	4	10	4	3	—	—	—	—	—	1604	1255	2859	79
80	57	13	31	8	20	10	8	3	2	—	—	—	—	—	238	85	323	80
81	83	32	99	44	63	34	33	16	13	—	—	—	—	—	471	362	833	81
82	8531	4124	12359	5898	12385	5882	7910	3834	2989	1483	585	335	10	5	29908	28011	57919	82
	6275	2987	8920	4214	8883	4123	5620	2666	2057	1020	305	208	6	3	21856	19910	41766	a
	1581	821	2310	1164	2437	1245	1684	838	667	334	164	93	4	2	5347	5735	11082	b
	675	316	1129	520	1065	514	656	330	265	129	56	34	—	—	2705	2366	5071	c
	53	11	19	5	11	3	4	1	—	—	—	—	—	—	658	166	824	83
83	53	11	19	5	11	3	4	1	—	—	—	—	—	—	605	678	1283	84
84	117	55	88	50	67	30	39	20	13	4	2							



Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE), age groups (DA 40 A 44 ANNI to DA 90 e più), sex (M, F, M F), and total (TOTALE). Rows include various medical conditions like pneumonia, heart disease, and cancer.

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali dell'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (f) e dell'apparato genitale.



Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1936, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 40 A 44 ANNI		DA 45 A 49 ANNI		DA 50 A 54 ANNI		DA 55 A 59 ANNI		DA 60 A 64 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		160	Conseguenze del parto (b)	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) con indicazione di operazione cesarea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) senza indicazione di operazione cesarea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Altre mal. speciali dell'infanzia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) atelectasia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) ittero dei neonati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) sclerema e altre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	XVI. — Senilità	—	—	—	—	—	—	—	—	327	196
	Senilità	—	—	—	—	—	—	—	—	327	196
	a) con demenza senile	—	—	—	—	—	—	—	—	42	27
	b) senza demenza senile	—	—	—	—	—	—	—	—	285	169
	XVII. — Morti violente e accidentali	953	164	1058	207	1099	215	1107	195	1066	217
163	a) Suicidi:	251	63	297	83	343	84	310	53	276	45
171	per ingestione di veleni (c)	27	12	26	14	25	7	23	10	21	5
164	con gas tossici	8	6	9	3	12	7	7	1	9	—
165	per impiccamento o strangol.	63	22	75	14	107	26	99	14	97	9
166	per annegamento	35	9	63	31	71	24	61	15	55	17
167	con arma da fuoco	60	3	54	2	48	1	60	1	45	2
168	con arma da punta e da taglio.	13	3	21	6	19	2	14	1	8	—
169	per precipitaz. da luogo elev.	30	7	30	10	40	13	25	8	25	8
170	per schiacciamento	12	1	17	1	19	4	17	2	15	3
171	con altri mezzi	3	—	2	2	—	—	4	1	1	1
172	a) Omicidi	54	16	57	18	55	6	46	11	42	13
175	Infanticidio (— un anno)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) subito dopo la nascita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri, prima d'un anno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Omicidi con arma da fuoco (d)	23	4	24	6	21	1	12	3	16	5
174	Omicidi arma da taglio e punta (d)	19	5	17	6	17	1	13	5	12	4
175	Omicidi con altri mezzi (d)	12	7	16	6	17	4	21	3	14	4
176	a) Morti accidentali:	639	84	695	104	695	123	741	130	742	156
194	Morsi o punture d'animali velenosi	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1
176	Avvelenamenti da alimenti guasti	3	1	4	2	5	4	3	1	3	1
177	Assorbimento di gas tossici	6	—	7	—	8	4	9	2	5	—
178	Altri avvelenam. accident. acuti (e)	6	2	6	3	1	1	5	—	1	1
179	Per incendio	4	—	5	4	1	—	1	—	—	—
180	Per ustioni accidentali (f)	19	11	21	12	18	8	25	15	38	24
181	Per soffocazione meccanica accid.	3	1	4	1	1	—	2	1	2	—
182	Per annegamento accidentale	54	9	55	11	56	12	88	8	76	10
183	Per trauma acc. d'arma da fuoco (g)	5	—	8	—	11	—	5	1	3	—
184	Per trauma acc. arma punta o tag. (g)	1	—	—	—	2	—	2	—	3	—
185	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h)	437	53	476	68	470	80	494	92	515	113
186	Per cataclisma (i)	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
187	Per violenze di animali	4	1	12	—	21	2	18	1	18	—
188	Per freddo eccessivo	7	2	7	1	12	4	10	1	13	—
189	Per caldo eccessivo	8	1	5	1	6	1	7	1	7	1
190	Per fulmine	4	—	13	1	11	2	11	2	—	—
191	Per accidenti dovuti a corr. elettr.	15	—	14	1	5	—	11	2	3	—
192	Per altri accidenti	61	2	57	2	62	5	50	3	49	5
	a) corpi estranei	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—
	b) altri	59	2	56	2	60	5	48	3	48	5
195	Morte violenta, ecc. (l)	9	1	9	2	6	2	10	1	6	3
196	Per ferite di guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Per esecuzione giudiziaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVIII. — Cause di morte non determinate	203	66	228	81	325	115	406	144	480	176
199	Morte improvvisa	190	60	197	64	285	92	339	108	448	160
200	Cause non specif. o mal definite	13	6	31	17	40	23	67	36	32	16

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno e più. (e) eccettuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (l) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 65 A 69 ANNI		DA 70 A 74 ANNI		DA 75 A 79 ANNI		DA 80 A 84 ANNI		DA 85 A 89 ANNI		DA 90 E PIÙ		ETÀ IGNOTA		TOTALE			
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	M F	
	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	588	302	890
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	a
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	585	301	886	b
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3072	2358	5430	161
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	83	190	a
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472	292	764	b
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2493	1983	4476	c
	1116	632	4002	2264	9247	5081	13455	7342	9300	5221	3610	2196	2	—	18127	22932	41059	
162	1116	632	4002	2264	9247	5081	13455	7342	9300	5221	3610	2196	2	—	18127	22932	41059	162
	106	64	202	103	236	144	196	106	82	49	14	10	—	—	375	503	878	a
	1010	568	3800	2161	9011	4937	13259	7236	9218	5172	3596	2186	2	—	17752	22429	40181	b
	956	232	927	285	723	267	420	186	178	78	32	18	13	1	13482	4501	17983	
163	227	45	211	40	127	24	39	7	20	4	2	—	2	—	2520	879	3399	163
a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
171	10	4	8	3	7	2	2	1	—	—	—	—	—	—	149	163	312	171
163	3	1	5	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	60	34	94	163
164	88	15	55	4	31	2	12	1	7	1	—	—	—	—	746	192	938	164
165	52	10	56	19	27	10	10	3	4	1	—	—	—	—	419	247	666	165
166	25	1	31	—	22	—	6	—	3	—	—	—	—	—	602	39	641	166
167	12	2	14	5	10	—	3	—	1	—	—	—	—	—	130	28	158	167
168	27	11	30	6	24	9	4	2	5	2	1	—	—	—	229	132	361	168
169	9	—	10	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	168	39	207	169
170	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5	22	170
171	30	4	29	8	11	6	7	3	2	—	—	—	—	—	625	236	861	171
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	18	37	172
a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29	a
175	8	2	9	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	b
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290	84	374	173
173	13	1	10	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	178	70	248	174
174	9	1	10	3	6	3	5	2	1	—	—	—	—	—	138	64	202	175
175	695	183	679	236	576	236	372	175	156	74	30	18	7	1	10246	3363	13609	176
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	14	a
176	2	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	39	90	176
177	6	3	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	36	131	177
178	2	1	1	—	4	—	—	—	—									

TAVOLA 6. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DI 1 MESE		DI 2 MESI		DI 3 MESI		DI 4 MESI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	<b>Complesso . . .</b>	<b>34511</b>	<b>15182</b>	<b>8390</b>	<b>3705</b>	<b>6523</b>	<b>2906</b>	<b>5779</b>	<b>2539</b>	<b>5645</b>	<b>2535</b>
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e paratifo	—	—	1	—	2	2	—	—	1	1
7	Morbillo . . . . .	6	3	7	3	5	2	6	4	19	10
8	Scarlattina . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1
9	Tosse convulsa . . . . .	51	27	144	84	130	80	100	52	94	40
10	Difterite . . . . .	3	1	6	1	5	3	9	4	5	2
11	Influenza . . . . .	150	58	174	72	141	54	126	51	126	38
23	Tubercolosi dell'appar. respirat. (b).	4	4	5	1	6	3	5	2	18	10
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi . .	13	3	22	8	38	20	46	14	57	27
34	Sifilide . . . . .	232	100	96	41	70	33	55	31	27	12
38	Malaria . . . . .	2	1	8	5	3	2	8	2	6	4
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44 dal 45 al 53	Altre mal. infettive e parassitarie .	375	149	175	69	134	69	78	40	90	37
34, 55	Cancro e altri tumori maligni . . .	4	2	2	2	2	1	1	1	1	—
59	Tumori non maligni (c) . . . . .	1	1	2	—	1	—	1	1	1	1
56, dal 60 al 74, 76, 77, 82	Diabete mellito . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78, 79, 81, dal 84 all'89 dal 90 al 95 dal 96 al 103	Altre mal. gener. e avvel. cronici .	141	54	76	41	73	39	76	32	66	23
106	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	3	1	7	3	5	2	1	—	3	1
107, 108, 109	Altre malatt. del sist. nervoso, ecc. (d)	1525	643	468	207	375	148	320	146	309	138
104, 105, dal 110 al 114 119, 120	Malattie del cuore . . . . .	13	9	15	9	10	6	9	3	7	2
121	Altre mal. dell'appar. circolatorio .	11	3	9	6	3	2	3	2	4	2
dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Bronchiti . . . . .	902	369	545	231	335	160	300	133	258	138
130, 131, 132 dal 133 al 139 dal 151 al 156 dal 157 al 161 dal 172 al 175 dal 176 al 198	Polmoniti . . . . .	2362	942	1989	798	1566	627	1423	579	1477	661
199, 200	Altre mal. appar. resp., esclusa la tbc.	67	29	33	11	25	14	20	9	18	5
	Enteriti . . . . .	2296	1022	2469	1094	2533	1126	2864	1292	2788	1259
	Appendicite . . . . .	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	Malattie del fegato e vie biliari . .	15	5	16	4	15	5	16	6	10	4
	Altre mal. dell'apparato digerente .	186	63	117	49	88	38	75	26	56	20
	Nefriti . . . . .	72	26	48	21	51	23	31	11	50	22
	Altre mal. dell'app. genito-urinario.	17	7	10	5	6	5	9	8	7	3
	Malattie della pelle, ecc. (e) . . . .	91	46	63	35	34	14	36	19	23	14
	Debolezza congenita, ecc. (f) . . . .	25555	11424	1824	879	829	411	112	49	87	42
	Omicidio . . . . .	33	17	—	—	1	—	—	—	—	—
	Morte violenta e accidentale (g) . .	17	7	17	7	12	6	14	5	13	7
	Morte improv. e cause non specificate o mal definite . . . . .	363	163	41	19	23	11	35	17	22	11

(a) In questo elenco sono indicate quelle voci per le quali, nell'anno 1936, si verificarono casi di morte. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali, esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (c) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati

l'anno 1936, classificati secondo le cause, l'età, ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DI 5 MESI		DI 6 MESI		DI 7 MESI		DI 8 MESI		DI 9 MESI		DI 10 MESI		DI 11 MESI		NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	M F	
	<b>5352</b>	<b>2438</b>	<b>5219</b>	<b>2299</b>	<b>5303</b>	<b>2456</b>	<b>5253</b>	<b>2399</b>	<b>5137</b>	<b>2445</b>	<b>4940</b>	<b>2360</b>	<b>4628</b>	<b>2232</b>	<b>53184</b>	<b>43496</b>	<b>96680</b>	
1, 2	—	—	3	1	2	2	3	—	—	—	—	—	3	1	8	7	15	1, 2
7	22	5	20	12	41	19	70	34	60	32	68	32	86	27	227	183	410	7
8	2	1	5	1	3	1	8	5	3	3	9	4	9	7	20	23	43	8
9	89	53	106	60	115	56	105	58	116	63	116	65	119	71	576	709	1285	9
10	9	5	14	7	29	11	42	18	28	9	46	20	43	14	144	95	239	10
11	155	65	161	65	157	62	150	65	149	63	160	71	134	64	1055	728	1783	11
23	14	10	9	4	14	5	17	9	15	7	15	9	14	5	67	69	136	23
dal 24 al 32	72	37	70	27	48	26	74	27	66	30	53	25	60	30	315	274	619	dal 24 al 32
34	35	15	28	10	16	8	28	13	21	11	11	9	12	5	343	288	631	34
38	7	4	9	6	13	7	17	10	13	7	14	6	11	2	55	56	111	38
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44 dal 45 al 53	102	50	94	50	85	39	76	31	64	40	71	30	62	22	780	626	1406	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44 dal 45 al 53
34, 55	4	3	3	—	2	1	3	2	3	2	1	1	4	3	12	18	30	54, 55
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
56, dal 60 al 74, 76, 77, 82	69	35	67	25	71	31	79	33	86	39	65	31	76	28	534	411	945	56, dal 60 al 74, 76, 77
78, 79, 81, dal 84 all'89 dal 90 al 95 dal 96 al 103	2	—	1	—	1	—	3	—	1	—	3	1	1	—	23	8	31	78, 79, 81, dall'84 all'89 dal 90 al 95 dal 96 al 103
106	264	120	235	106	289	124	239	99	238	115	176	83	192	95	2606	2024	4630	106
107, 108, 109	9	4	6	1	14	7	5	1	7	3	7	4	8	3	58	52	110	107, 108, 109
104, 105, dal 110 al 114 119, 120	4	1	4	2	5	3	3	2	3	1	5	1	4	2	31	27	58	104, 105, dal 110 al 114 119, 120
121	217	104	223	108	207	95	196	89	207	93	173	75	180	85	2058	1685	3743	121
dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	1388	598	1577	622	1578	680	1695	750	1694	781	1688	784	1571	731	11455	8553	20008	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
130, 131, 132 dal 133 al 139 dal 151 al 156 dal 157 al 161 dal 172 al 175 dal 176 al 198	19	9	23	10	29	11	32	16	43	17	36	12	34	14	222	157	379	130, 131, 132 dal 133 al 139 dal 151 al 156 dal 157 al 161 dal 172 al 175 dal 176 al 198
199, 200	2647	1224	2344	1032	2363	1166	2205	1053	2120	1039	1990	990	1779	910	15141	13257	28398	199, 200
	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	4	6	121
	8	3	10	3	5	3	4	2	3	3	9	5	8	4	72	47	119	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
	52	23	50	19	60	32	59	20	50	23	51	27	55	26	531	368	899	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
	54	20	37	19	53	24	51	18	55	28	58	28	56	33	343	273	616	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
	7	6	6	3	9	4	8	5	7	4	10	3	14	10	47	63	110	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
	27	11	36	19	28	14	17	4	30	7	28	12	33	14	237	209	446	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
	53	21	52	25	33	12	40	21	31	13	39	18	19	8	15751	12323	28674	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	19	18	37	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
	10	4	10	3	18	7	12	6	17	3	27	11	26	11	116	77	193	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
	10	6	15	8	14	5	12	8	4	3	8	2	11	5	300	258	558	dal 124 al 127 dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129

(c) o il cui carattere maligno non è specificato. (d) e degli organi dei sensi. (e) del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

TAVOLA 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 0 A 6 GIORNI			DA 7 A 13 GIORNI		
		legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>17629</b>	<b>1125</b>	<b>18754</b>	<b>6188</b>	<b>397</b>	<b>6585</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie . . . . .</b>	<b>146</b>	<b>22</b>	<b>168</b>	<b>177</b>	<b>25</b>	<b>202</b>
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi . . . . .	—	—	—	—	—	—
1	Febbre tifoidea (tifo addominale) . . . . .	—	—	—	—	—	—
2	Paratifo . . . . .	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	—	—	—	4	—	4
8	Scarlattina . . . . .	—	—	—	—	—	—
9	Tosse convulsa . . . . .	—	—	—	1	—	1
10	Difterite . . . . .	—	—	—	—	—	—
11	Influenza . . . . .	1	—	1	—	—	—
	a) con complicazioni respiratorie indicate . . . . .	—	—	—	44	4	48
	b) senza complicazioni respiratorie indicate . . . . .	—	—	—	37	2	39
13	Dissenteria . . . . .	—	—	—	7	2	9
	a) amebica . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) bacillare . . . . .	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata o dovuta ad altre cause . . . . .	—	—	—	—	—	—
15	Risipola . . . . .	—	—	—	—	—	—
16	Poliomielite anteriore acuta, polioencefalite acuta . . . . .	14	—	14	22	3	25
18	Meningite cerebro-spinale epidemica . . . . .	—	—	—	2	—	2
20	Pustola maligna e carbonchio . . . . .	—	—	—	—	—	—
22	Tetano . . . . .	—	—	—	—	—	—
23 a 32	Tubercolosi : . . . . .	23	1	24	47	1	48
	dell'apparato respiratorio (b) . . . . .	—	—	—	2	1	3
	delle meningi e sistema nervoso centrale degli intestini e del peritoneo (c) . . . . .	—	—	—	1	1	2
	della colonna vertebrale . . . . .	—	—	—	1	—	1
	delle ossa e delle articolazioni (d) . . . . .	—	—	—	—	—	—
	del sistema linfatico (e) . . . . .	—	—	—	—	—	—
32	Tubercolosi disseminata . . . . .	—	—	—	—	—	—
	a) acuta . . . . .	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata . . . . .	—	—	—	—	—	—
34	Sifilide . . . . .	106	19	125	23	14	37
	a) congenita . . . . .	106	—	106	—	—	—
	c) non specificata . . . . .	—	19	19	23	14	37
35	Infezione gonococcica e altre malattie veneree . . . . .	—	—	—	1	1	2
36	Infezione purulenta e setticemia . . . . .	—	—	—	—	—	—
	a) setticemia . . . . .	1	2	3	7	1	8
	b) piemia . . . . .	—	—	—	5	1	6
38	Malaria . . . . .	—	—	—	—	—	—
	a) febbre malarica . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) cachessia palustre . . . . .	—	—	—	2	—	2
39	Altre malattie dovute a protozoi parassitari . . . . .	—	—	—	—	—	—
42	Altre malattie dovute a elminti . . . . .	—	—	—	—	—	—
43	Micosi . . . . .	—	—	—	—	—	—
44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	1	—	1	24	—	24
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
45 a 53	Cancro e altri tumori maligni . . . . .	—	—	—	1	—	1
45	Tumori maligni della bocca e faringe . . . . .	—	—	—	—	—	—
46	Tumori maligni tubo digerente e peritoneo . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) stomaco e duodeno . . . . .	—	—	—	—	—	—
	d) fegato e vie biliari . . . . .	—	—	—	—	—	—
	g) altri organi . . . . .	—	—	—	—	—	—

(\*) Compresi 990 morti nel 1° anno di vita, per i quali non venne indicata la filiazione e che dalle notizie contenute nelle schede poteva presu-  
(a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1936, si verificarono casi di morte. (b) compresi i  
bronchiali, mesenterici e retroperitoneali.

1936, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 14 A 29 GIORNI			A MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE	legittima (*)	illegittima (**)	TOTALE	
	<b>8514</b>	<b>658</b>	<b>9172</b>	<b>32331</b>	<b>2180</b>	<b>34511</b>	<b>58742</b>	<b>3427</b>	<b>62169</b>	<b>91073</b>	<b>5607</b>	<b>96680</b>	
	417	49	466	740	96	836	5282	560	5842	6022	656	6678	
	—	—	—	—	—	—	15	—	15	15	—	15	1 e 2
	—	—	—	—	—	—	11	—	11	11	—	11	1
	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	2
	2	—	2	6	—	6	380	24	404	386	24	410	7
	—	—	—	—	—	—	40	3	43	40	3	43	8
	48	2	50	49	2	51	1146	88	1234	1195	90	1285	9
	2	—	2	3	—	3	215	21	236	218	21	239	10
	95	7	102	139	11	150	1532	101	1633	1671	112	1783	11
	74	6	80	111	8	119	1272	80	1352	1383	88	1471	a
	21	1	22	28	3	31	260	21	281	288	24	312	a
	—	—	—	—	—	—	53	—	53	53	—	53	13
	—	—	—	—	—	—	7	—	7	7	—	7	a
	—	—	—	—	—	—	8	—	8	8	—	8	b
	—	—	—	—	—	—	38	—	38	38	—	38	c
	117	5	122	153	8	161	241	31	272	394	39	433	15
	5	—	5	7	—	7	100	7	107	107	7	114	16
	1	—	1	1	—	1	45	2	47	46	2	48	18
	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	20
	12	—	12	82	2	84	7	—	7	89	2	91	22
	13	1	14	15	2	17	699	39	738	714	41	755	23 a 32
	3	1	4	3	1	4	123	9	132	126	10	136	23
	7	—	7	8	1	9	451	21	472	459	22	481	24
	3	—	3	4	—	4	46	2	48	50	2	52	25
	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	26
	—	—	—	—	—	—	20	1	21	20	1	21	27
	—	—	—	—	—	—	23	1	24	23	1	24	29
	—	—	—	—	—	—	34	5	39	34	5	39	32
	—	—	—	—	—	—	27	5	32	27	5	32	a
	—	—	—	—	—	—	7	—	7	7	—	7	c
	47	23	70	176	56	232	258	141	399	434	197	631	34
	46	23	69	175	56	231	246	139	385	421	195	616	a
	1	—	1	1	—	1	12	2	14	13	2	15	5
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	35
	32	6	38	40	9	49	318	94	412	358	103	461	36
	13	5	18	19	8	27	244	85	329	263	93	356	a
	19	1	20	21	1	22	74	9	83	95	10	105	b
	2	—	2	2	—	2	107	2	109	109	2	111	38
	—	—	—	—	—	—	82	—	82	84	—	84	a
	—	—	—	—	—	—	25	2	27	25	2	27	b
	—	—	—	—	—	—	8	—	8	8	—	8	39
	2	—	2	2	—	2	40	2	42	42	2	44	42
	37	3	40	62	3	65	41	1	42	103	4	107	43
	2	—	2	2	—	2	33	4	37	35	4	39	44
	3	—	3	5	—	5	33	2	35	38	2	40	
	3	—	3	4	—	4	24	2	26	28	2	30	45 a 53
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	45
	2	—	2	2	—	2	6	—	6	8	—	8	46
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	3	b
	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	d
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	g

mersi fossero legittimi. (\*\*\*) Compresi 2007 morti nel 1° anno di vita, per i quali fu dichiarata ignota la filiazione.  
(a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1936, si verificarono casi di morte. (b) compresi i  
bronchiali, mesenterici e retroperitoneali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale eccettuata. (e) eccettuati i gangli

Segue: TAVOLA 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 0 A 6 GIORNI			DA 7 A 13 GIORNI		
		legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE
		51	Tumori maligni organi genito-urinari dell'uomo . . .	—	—	—	—
52	— tumori maligni della pelle . . .	—	—	—	—	—	—
53	— di altri organi o di organi non specificati . . .	—	—	—	1	—	1
54	Tumori non maligni . . .	1	—	1	—	—	—
	b) altri organi . . .	1	—	1	—	—	—
	<b>III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b)</b> . . .	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>43</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . .	—	—	—	—	—	—
59	Diabete mellito . . .	—	—	—	—	—	—
60	Scorbuto . . .	—	—	—	—	—	—
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . .	—	—	—	—	—	—
63	Rachitismo . . .	—	—	—	4	—	4
66	Malattie della ghiandola tiroide e delle paratiroidi . . .	13	—	13	19	1	20
	a) gozzo semplice . . .	—	—	—	1	—	1
	c) mixedema e cretinismo . . .	—	—	—	1	—	1
	d) tetania . . .	—	—	—	—	—	—
67	Malattie del timo . . .	13	—	13	17	1	18
68	Malattie delle ghiandole o capsule surrenali (c) . . .	20	1	21	15	1	16
69	Altre malattie generali . . .	—	—	—	3	—	3
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici</b> . . .	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>7</b>
70	Stati emorragici . . .	3	1	4	7	—	7
	a) porpora primitiva . . .	1	—	1	3	—	3
	b) emofilia . . .	2	1	3	4	—	4
71	Anemie . . .	—	—	—	—	—	—
	a) anemia perniciosa progressiva . . .	—	—	—	—	—	—
	b) altre . . .	—	—	—	—	—	—
72	Leucemie e aleucemie . . .	—	—	—	—	—	—
	a) leucemie vere . . .	—	—	—	—	—	—
	b) aleucemie . . .	—	—	—	—	—	—
73	Malattie della milza . . .	—	—	—	—	—	—
74	Altre malattie del sangue e organi ematopoietici . . .	—	—	—	—	—	—
	<b>VI. - Malattie del sistema nervoso, ecc. (d)</b> . . .	<b>595</b>	<b>24</b>	<b>619</b>	<b>366</b>	<b>13</b>	<b>383</b>
78	Encefalite (non epidemica) . . .	—	—	—	—	—	—
	a) ascesso del cervello . . .	—	—	—	—	—	—
	b) altre . . .	—	—	—	—	—	—
79	Meningite semplice . . .	—	—	—	16	—	16
81	Altre malattie del midollo spinale . . .	—	—	—	—	—	—
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebrale . . .	—	—	—	—	—	—
	a) emorragia cerebrale . . .	—	—	—	—	—	—
	b) embolia e trombosi cerebrale . . .	—	—	—	—	—	—
	c) emiplegia ed altre paralisi (e) . . .	—	—	—	—	—	—
85	Epilessia . . .	—	—	—	—	—	—
86	Convulsioni . . .	—	—	—	—	—	—
87	Altre malattie del sistema nervoso . . .	595	24	619	362	13	375
	a) corea . . .	—	—	—	—	—	—
	e) altre . . .	—	—	—	—	—	—
88	Malattie degli organi della vista . . .	—	—	—	—	—	—
89	Malattie dell'orecchio e del seno mastoideo . . .	—	—	—	2	—	2
	a) otite . . .	—	—	—	1	—	1
	b) altre . . .	—	—	—	1	—	1
	<b>VII. - Malattie dell'apparato circolatorio</b> . . .	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>8</b>
90 a 95	Malattie del cuore . . .	—	—	—	5	—	5
90	Pericardite . . .	—	—	—	—	—	—
91	Endocardite acuta . . .	—	—	—	1	—	1
92	Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari . . .	—	—	—	—	—	—
93	Malattie del miocardio . . .	—	—	—	1	—	1
	a) miocardite acuta . . .	—	—	—	—	—	—
	b) miocardite cronica e degenerazione miocardio . . .	—	—	—	—	—	—
	c) non specificate . . .	—	—	—	1	—	1
95	Altre malattie del cuore . . .	—	—	—	3	—	3
	a) malattie funzionali del cuore . . .	—	—	—	—	—	—
	b) altre e non specificate . . .	—	—	—	—	—	—

(\*) Vedi la nota (\*) a pag. 88. (\*\*) Vedi la nota (\*\*) a pag. 88.  
 (a) Veggasi la nota (a) a pag. 88. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali.

(c) malattia d'Addison (non indicate come tuber

l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 14 A 29 GIORNI			A MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE	legittima (*)	illegittima (**)	TOTALE	
		51	Tumori maligni organi genito-urinari dell'uomo . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
52	— tumori maligni della pelle . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	52
53	— di altri organi o di organi non specificati . . .	—	—	—	—	—	—	14	2	16	16	2	18	53
54	Tumori non maligni . . .	1	—	1	2	—	2	9	—	9	10	—	10	54
	b) altri organi . . .	—	—	—	1	—	1	9	—	9	10	—	10	54
	<b>III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b)</b> . . .	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>112</b>	<b>10</b>	<b>122</b>	<b>520</b>	<b>25</b>	<b>545</b>	<b>632</b>	<b>35</b>	<b>667</b>	
56	Reumatismo articolare acuto . . .	—	—	—	—	—	—	9	3	12	9	3	12	56
59	Diabete mellito . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	59
60	Scorbuto . . .	—	—	—	—	—	—	8	—	8	8	—	8	60
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow) . . .	—	—	—	—	—	—	8	—	8	8	—	8	60
63	Rachitismo . . .	8	2	10	12	2	14	196	10	206	208	12	220	63
66	Malattie della ghiandola tiroide e delle paratiroidi . . .	12	1	13	44	2	46	73	3	76	117	5	122	66
	a) gozzo semplice . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	66
	c) mixedema e cretinismo . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	66
	d) tetania . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	66
67	Malattie del timo . . .	12	1	13	42	2	44	69	3	72	111	5	116	67
68	Malattie delle ghiandole o capsule surrenali (c) . . .	15	4	19	50	6	56	160	7	167	210	13	223	68
69	Altre malattie generali . . .	1	—	1	1	—	1	3	—	3	4	—	4	68
	<b>IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici</b> . . .	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>69</b>
70	Stati emorragici . . .	6	2	8	16	3	19	254	7	261	270	10	280	70
	a) porpora primitiva . . .	1	—	1	3	—	3	61	4	65	77	7	84	70
	b) emofilia . . .	5	2	7	13	3	19	41	1	42	49	2	51	70
71	Anemie . . .	2	1	3	8	2	10	20	3	23	28	5	33	71
	a) anemia perniciosa progressiva . . .	—	—	—	—	—	—	144	1	145	144	1	145	71
	b) altre . . .	—	—	—	—	—	—	21	—	21	21	—	21	71
72	Leucemie e aleucemie . . .	—	—	—	—	—	—	123	1	124	123	1	124	72
	a) leucemie vere . . .	—	—	—	—	—	—	45	2	47	45	2	47	72
	b) aleucemie . . .	—	—	—	—	—	—	42	1	43	42	1	43	72
73	Malattie della milza . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	73
74	Altre malattie del sangue e organi ematopoietici . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	74
	<b>VI. - Malattie del sistema nervoso, ecc. (d)</b> . . .	<b>490</b>	<b>26</b>	<b>516</b>	<b>1465</b>	<b>63</b>	<b>1528</b>	<b>2970</b>	<b>163</b>	<b>3133</b>	<b>4435</b>	<b>226</b>	<b>4661</b>	
78	Encefalite (non epidemica) . . .	—	—	—	—	—	—	39	—	39	39	—	39	78
	a) ascesso del cervello . . .	—	—	—	—	—	—	5	—	5	5	—	5	78
	b) altre . . .	—	—	—	—	—	—	34	—	34	34	—	34	78
79	Meningite semplice . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
81	Altre malattie del midollo spinale . . .	24	1	25	40	1	41	727	37	764	767	38	805	81
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebrale . . .	1	—	1	1	—	1	7	—	7	8	—	8	82
	a) emorragia cerebrale . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	82
	b) embolia e trombosi cerebrale . . .	—	—	—	—	—	—	13	1	14	13	1	14	82
	c) emiplegia ed altre paralisi (e) . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	82
85	Epilessia . . .	3	—	3	3	—	3	12	—	12	15	—	15	85
86	Convulsioni . . .	2	—	2	2	—	2	23	—	23	25	—	25	85
87	Altre malattie del sistema nervoso . . .	452	24	476	1409	61	1470	2043	115	2158	3452	176	3628	86
	a) corea . . .	4	—	4	4	—	4	12	—	12	16	—	16	87
	e) altre . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	87
88	Malattie degli organi della vista . . .	—	—	—	—	—	—	9	—	9	13	—	13	88
89	Malattie dell'orecchio e del seno mastoideo . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	88
	a) otite . . .	—	—	—	—	—	—	91	10	101	97	11	108	89
	b) altre . . .	—	—	—	—	—	—	75	8	83	80	8	88	89
	<b>VII. - Malattie dell'apparato circolatorio</b> . . .	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>138</b>	<b>6</b>	<b>144</b>	<b>159</b>	<b>9</b>	<b>168</b>	
90 a 95	Malattie del cuore . . .	5	3	8	10	3	13	92	5	97	102	8	110	90 a 95
90	Pericardite . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90
91	Endocardite acuta . . .	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	91
92	Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari . . .	—	—											

Segue: TAVOLA 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 0 A 6 GIORNI			DA 7 A 13 GIORNI		
		legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE
96	Aneurisma, eccettuato l'aneurisma del cuore . . . . .	—	—	—	—	—	—
98	Cangrena . . . . .	—	—	—	1	—	1
	b) altre . . . . .	—	—	—	1	—	1
99	Altre malattie delle arterie . . . . .	—	—	—	—	—	—
100	Malattie vene: varici, emorroidi, flebite, ecc. . . . .	—	—	—	—	—	—
101	Malattie sistema linfatico, linfangioite, ecc. . . . .	—	—	—	2	—	2
103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .	1	—	1	—	—	—
	<b>VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio . . . . .</b>	<b>501</b>	<b>29</b>	<b>530</b>	<b>885</b>	<b>36</b>	<b>921</b>
104	Malattie delle fosse nasali e annessi . . . . .	2	—	2	3	—	3
105	Malattie della laringe . . . . .	6	—	6	11	—	11
106	Bronchite . . . . .	120	4	124	256	5	261
	a) acuta . . . . .	47	1	48	86	2	88
	b) cronica . . . . .	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata . . . . .	73	3	76	170	3	173
(1)	Polmonite, tutte le forme . . . . .	366	25	391	607	31	638
107	Broncop., compresa la bronchite capillare . . . . .	366	25	391	503	26	529
108	Polmonite lobare . . . . .	—	—	—	104	5	109
110	Pleuriti . . . . .	—	—	—	2	—	2
111	Congestione, edema, ecc. del polmone (b). . . . .	6	—	6	4	—	4
112	Asma . . . . .	—	—	—	—	—	—
113	Enfisema polmonare . . . . .	—	—	—	—	—	—
114	Altre mal. apparato respiratorio (eccettuata la tbc.). . . . .	1	—	1	2	—	2
	a) polmonite interstiziale cronica . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) altre, compresa la cangrena del polmone . . . . .	1	—	1	2	—	2
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente . . . . .</b>	<b>282</b>	<b>18</b>	<b>300</b>	<b>566</b>	<b>33</b>	<b>599</b>
115	Malattie della cavità boccale, ecc. (c) . . . . .	2	—	2	15	—	15
116	Malattie dell'esofago . . . . .	2	—	2	—	1	1
117	Ulcera stomaco o duodeno . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) duodeno . . . . .	—	—	—	—	—	—
118	Altre malattie dello stomaco (cancro eccettuato) . . . . .	7	1	8	25	1	26
119	Enteriti . . . . .	254	17	271	508	30	538
121	Appendicite . . . . .	—	—	—	—	—	—
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	11	—	11	9	—	9
	a) ernia . . . . .	2	—	2	1	—	1
	b) occlusione intestinale . . . . .	9	—	9	8	—	8
123	Altre malattie dell'intestino . . . . .	2	—	2	2	—	2
124	Cirrosi del fegato . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) non indicata come alcoolica . . . . .	—	—	—	—	—	—
125	Altre malattie del fegato (comp. atrofia gialla) . . . . .	—	—	—	3	—	3
127	Altre malattie della vescich. e vie biliari. . . . .	—	—	—	2	—	2
129	Peritonite senza causa indicata . . . . .	4	—	4	2	1	3
	<b>X. - Malattie dell'apparato urinario e genitale. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
(2)	Nefrite: . . . . .	—	—	—	29	1	30
130	acuta . . . . .	—	—	—	29	1	30
131	cronica . . . . .	—	—	—	—	—	—
132	non specificata . . . . .	—	—	—	—	—	—
133	Altre malattie dei reni, ecc. (d) . . . . .	—	—	—	1	—	1
	a) pielite . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) altre . . . . .	—	—	—	1	—	1
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	—	—	—	—	—	—
	a) calcolosi dei reni e delle vie urinarie superiori . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) calcolosi della vescica . . . . .	—	—	—	—	—	—
135	Malattie della vescica, esclusi i tumori . . . . .	—	—	—	—	—	—
	a) cistite . . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) altre . . . . .	—	—	—	—	—	—
136	Malattie uretra, ascesso urinoso, ecc. . . . .	—	—	—	—	—	—
	b) altre . . . . .	—	—	—	—	—	—

(\*) Vedi la nota (\*) a pag. 88. (\*\*) Vedi la nota (\*\*) a pag. 88. (1) Compresi i numeri dell'Elenco dal 107 al 109. (2) Compresi i numeri (a) Veggasi la nota (a) a pag. 88. (b) embolia, infarto emorragico e trombosì. (c) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le

l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 14 A 29 GIORNI			A MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE	legittima (*)	illegittima (**)	TOTALE	
96	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	96
98	3	—	3	4	—	4	10	—	10	14	—	14	98
	3	—	3	4	—	4	10	—	10	14	—	14	b
99	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	2	99
100	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	100
101	3	—	3	5	—	5	29	—	29	34	—	34	101
103	1	—	1	2	—	2	3	—	3	5	—	5	103
	<b>1785</b>	<b>95</b>	<b>1880</b>	<b>3171</b>	<b>160</b>	<b>3331</b>	<b>19816</b>	<b>983</b>	<b>20799</b>	<b>22987</b>	<b>1143</b>	<b>24130</b>	
104	4	—	4	9	—	9	7	—	7	16	—	16	104
105	11	1	12	28	1	29	78	2	80	106	3	109	105
106	503	14	517	879	23	902	2732	109	2841	3611	132	3743	106
	169	3	172	302	6	308	810	37	847	1112	43	1155	a
	—	—	—	—	—	—	29	—	29	30	—	30	b
	334	11	345	577	17	594	1893	71	1964	2470	88	2558	c
(1)	1255	78	1333	2228	134	2362	16791	855	17646	19019	989	20008	(1)
107	1093	70	1163	1962	121	2083	14054	746	14800	16016	867	16883	107
108	162	8	170	266	13	279	2737	109	2846	3003	122	3125	108
110	1	—	1	3	—	3	115	7	122	118	7	125	110
111	8	2	10	18	2	20	46	5	51	64	7	71	111
112	2	—	2	2	—	2	17	4	21	19	4	23	112
113	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	113
114	1	—	1	4	—	4	29	—	29	33	—	33	114
	1	—	1	—	—	—	6	—	6	6	—	6	a
	1	—	1	4	—	4	23	—	23	27	—	27	b
	<b>1474</b>	<b>125</b>	<b>1599</b>	<b>2322</b>	<b>178</b>	<b>2498</b>	<b>25561</b>	<b>1363</b>	<b>26924</b>	<b>27883</b>	<b>1539</b>	<b>29422</b>	
115	24	—	24	41	—	41	110	2	112	151	2	153	115
116	—	—	—	2	1	3	—	1	1	2	2	4	116
117	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	117
	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	b
118	36	1	37	68	3	71	245	11	256	313	14	327	118
119	1368	119	1487	2130	166	2296	24776	1326	26102	26906	1492	28398	119
121	1	—	1	1	—	1	4	—	4	5	—	5	121
122	23	2	25	43	2	45	151	6	157	194	8	202	122
	6	—	6	9	—	9	55	3	58	64	3	67	a
	17	2	19	34	2	36	96	3	99	130	5	135	b
123	4	—	4	8	—	8	42	2	44	50	2	52	123
124	1	—	1	1	—	1	5	—	5	6	—	6	124
	1	—	1	1	—	1	5	—	5	6	—	6	b
125	3	—	3	6	—	6	44	—	44	50	—	50	125
127	6	—	6	8	—	8	53	2	55	61	2	63	127
129	8	3	11	14	4	18	129	12	141	143	16	159	129
	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>598</b>	<b>39</b>	<b>637</b>	<b>684</b>	<b>42</b>	<b>726</b>	
(2)	41	1	42	70	2	72	515	29	544	585	31	616	(2)
130	41	1	42	70	2	72	504	29	533	574	31	605	130
131	—	—	—	—	—	—	10	—	10	10	—	10	131
132	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	132
133	3	—	3	4	—	4	30	4	34	34	4	38	133
	—	—	—	—	—	—	18	4	22	18	4	22	a
	3	—	3	4	—	4	12	—	12	16	—	16	b
134	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	134
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	a
	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	b
135	3	—	3	3	—	3	43	5	48	46	5	51	135
	1	—	1	1	—	1	31	2	33	32	2	34	a
	2	—	2	2	—	2	12	3	15	14	3	17	b
136	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	136
	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	b

dell'Elenco dal 130 al 132. vegetazioni adenoidi. (d) dei bacineti e degli ureteri.

Segue: TAVOLA 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 0 A 6 GIORNI			DA 7 A 13 GIORNI			DA 14 A 29 GIORNI			A MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima (*)	illegit-tima (**)	TOTALE	
		138	Malattie organi genitali dell'uomo (b)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	2	—	—	
139	Malattie organi genitali della donna (b)	—	—	—	2	—	2	4	1	5	6	1	7	4	1	5	10	2	12	139
	c) mammelle	—	—	—	1	—	1	3	1	4	4	1	5	3	—	3	7	1	8	c
	d) altre	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	2	1	—	1	3	1	4	d
	<b>XII. — Malattie della pelle e del tessuto cellulare</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>63</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>285</b>	<b>19</b>	<b>304</b>	<b>366</b>	<b>26</b>	<b>392</b>	
151	Foruncoli	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	29	3	32	33	3	36	151
152	Flemmone, ascesso caldo	3	1	4	14	1	15	42	3	45	59	5	64	168	11	179	227	16	243	152
153	Altre malattie della pelle, ecc. (c)	1	—	1	4	1	5	13	1	14	18	2	20	88	5	93	106	7	113	153
	<b>XIII. — Malattie delle ossa e organi della locomozione</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	
154	Osteomielite infettiva acuta	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	23	4	27	24	4	28	154
155	Altre malattie delle ossa (eccettuata la tbc.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	9	—	9	10	—	10	155
156	Malattie delle articolazioni, ecc. (d)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	13	2	15	14	2	16	156
	a) articolazioni (eccettuata la tbc. e il reumatismo)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	12	2	14	13	2	15	a
	b) altri organi della locomozione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	b
	<b>XIV. — Vizi di conformazione congeniti</b>	<b>999</b>	<b>45</b>	<b>1044</b>	<b>295</b>	<b>21</b>	<b>316</b>	<b>364</b>	<b>16</b>	<b>380</b>	<b>1658</b>	<b>82</b>	<b>1740</b>	<b>736</b>	<b>32</b>	<b>768</b>	<b>2394</b>	<b>114</b>	<b>2508</b>	
157	Vizi di conformazione congeniti (e)	999	45	1044	295	21	316	364	16	380	1658	82	1740	736	32	768	2394	114	2508	157
	a) idrocefalia	51	2	53	6	1	7	13	2	15	70	5	75	119	8	127	189	13	202	a
	b) spina bifida e meningocele	168	7	175	90	2	92	127	3	130	385	12	397	193	3	198	580	15	595	b
	c) malformazioni congenite del cuore	388	19	407	116	12	128	117	7	124	621	38	659	275	15	290	896	53	949	c
	d) mostruosità	97	2	99	2	—	2	3	—	3	102	—	104	2	—	2	104	2	106	d
	e) altri	295	15	310	81	6	87	104	4	108	480	25	505	145	6	151	625	31	656	e
	<b>XV. — Malattie dell'infanzia</b>	<b>14768</b>	<b>950</b>	<b>15718</b>	<b>3751</b>	<b>260</b>	<b>4011</b>	<b>3761</b>	<b>325</b>	<b>4086</b>	<b>22280</b>	<b>1535</b>	<b>23815</b>	<b>2153</b>	<b>198</b>	<b>2351</b>	<b>24433</b>	<b>1733</b>	<b>26166</b>	
158	Debolezza congenita	5033	254	5287	1739	95	1834	1886	110	1996	8658	459	9117	1118	83	1201	9776	542	10318	158
159	Nascita prematura (e)	6254	516	6770	1180	108	1288	996	117	1113	3430	741	9171	393	54	357	8733	795	9528	159
160	Conseguenze del parto (e)	803	43	846	24	5	29	10	3	13	837	51	888	2	—	2	839	51	890	160
	a) con indicazione di operazione cesarea	4	—	4	—	—	—	10	—	4	—	—	4	—	—	4	—	4	4	a
	b) senza indicazione di operazione cesarea	799	43	842	24	5	29	869	3	964	833	51	884	2	—	2	835	51	886	b
161	Altre malattie speciali dell'infanzia	2678	137	2815	808	52	860	869	95	964	4355	284	4639	730	61	791	5085	345	5430	161
	a) ateletasia	134	9	143	23	2	25	13	1	14	170	12	182	8	—	8	178	12	190	a
	b) ittero del neonati	346	15	361	203	13	216	148	10	158	677	38	715	46	3	49	723	41	764	b
	c) sclerema e altre	2218	113	2331	582	37	619	708	84	792	3508	234	3742	676	56	734	4184	292	4476	c
	<b>XVII. — Morti violente e accidentali</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>170</b>	<b>10</b>	<b>180</b>	<b>195</b>	<b>35</b>	<b>230</b>	
(1)	Omicidi	11	20	31	1	1	2	—	—	—	12	21	33	2	4	14	23	37	37	(1)
172	Infanticidio (— un anno)	11	20	31	1	1	2	—	—	—	12	21	33	2	4	14	23	37	37	172
	a) subito dopo la nascita	9	20	29	—	—	—	—	—	—	9	20	29	—	—	9	20	29	29	a
	b) altri, prima di un anno	2	—	2	1	1	2	—	—	—	3	1	4	2	—	4	3	8	8	b
(2)	Morti accidentali:	2	2	4	1	1	2	10	1	11	13	4	17	168	8	176	181	12	193	(2)
176	Morsi o punture di animali velenosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	176
178	Assorbimento di gas tossici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	3	178
179	Altri avvelenamenti accidentali acuti (f)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—	—	7	179
180	Per incendio	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	2	—	—	2	180
181	Per ustioni accidentali (g)	1	—	1	—	—	—	2	1	3	3	1	4	71	6	77	74	7	81	181
182	Per soffocazione meccanica accidentale	1	1	2	—	—	—	4	—	4	5	1	6	36	1	37	41	2	43	182
183	Per annegamento accidentale	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	9	—	9	10	—	10	183
184	Per trauma accid. arma da fuoco (escl. ferite guerra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	184
185	Per trauma acc. arma punta e taglio (escl. fer. guerra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	185
186	Per lesioni accidentali da caduta, ecc. (h)	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	2	32	—	32	33	1	34	186
190	Per freddo eccessivo	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	2	2	—	3	4	1	5	190
191	Per caldo eccessivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	191
194	Per altri accidenti	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	194
	b) altri	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	b
	<b>XVIII. — Cause di morte non determinate</b>	<b>283</b>	<b>12</b>	<b>295</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>346</b>	<b>17</b>	<b>363</b>	<b>181</b>	<b>14</b>	<b>195</b>	<b>527</b>	<b>31</b>	<b>558</b>	
199	Morte improvvisa	21	1	22	10	—	10	18	3	21	49	4	53	103	8	111	152	12	164	199
200	Cause non specificate o mal definite	262	11	273	15	2	17	20	—	20	297	13	310	78	6	84	375	19	394	200

(\*) Vedi la nota (\*) a pag. 88. (\*\*) Vedi la nota (\*\*) a pag. 88. (1) Compresi i numeri dell'Elenco dal 172 al 175. (2) Compresi i numeri dell'Elenco dal 176 al 194. (a) Veggasi la nota (a) a pag. 88. (b) non indicate come veneree. (c) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (d) e degli altri organi della locomozione. (e) non compresi i nati morti. (f) eccettuati quelli da gas. (g) diverse da quelle per incendio. (h) schiacciamento, frangimento. (i) tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (j) di cui la natura (accidente, omicidio) è sconosciuta.



TAVOLA 8. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1936, nei singoli Compartimenti, distinti secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso.

CAUSE DI MORTE — COMPARTIMENTI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	ANNO
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>7182</b>	<b>7782</b>	<b>7837</b>	<b>6985</b>	<b>7254</b>	<b>8610</b>	<b>11636</b>	<b>9209</b>	<b>7289</b>	<b>7244</b>	<b>6869</b>	
Piemonte . . . . .	303	300	403	339	303	274	263	308	311	286	254	320	3664
Liguria . . . . .	105	114	119	116	99	79	90	99	92	72	104	133	1222
Lombardia . . . . .	949	961	975	870	894	924	1580	1543	1333	1012	779	1087	12907
Venezia Tridentina . .	92	128	133	103	87	84	88	104	128	94	113	123	1277
Veneto . . . . .	709	736	707	535	609	553	759	630	537	666	561	752	7754
Venezia Giulia e Zara .	162	172	164	156	131	113	168	143	134	119	105	185	1752
Emilia . . . . .	461	509	567	465	423	370	396	317	340	369	376	476	5069
Toscana . . . . .	288	326	273	250	281	244	247	214	222	252	244	302	3143
Marche . . . . .	158	257	258	172	144	139	193	165	165	153	152	266	2222
Umbria . . . . .	96	115	127	98	67	72	95	87	80	95	80	132	1144
Lazio . . . . .	432	417	405	394	353	484	764	545	340	349	393	528	5404
Abruzzi e Molise . . .	366	421	352	306	297	384	722	591	335	358	373	447	4952
Campania . . . . .	764	777	848	797	998	1452	1932	1258	758	708	803	968	12063
Puglie . . . . .	787	871	836	873	997	1318	1250	776	635	745	763	1089	10940
Lucania . . . . .	156	191	240	192	179	265	423	256	184	201	210	231	2728
Calabria . . . . .	407	441	416	378	344	505	882	715	452	474	483	548	6045
Sicilia . . . . .	780	847	795	759	893	1187	1552	1197	964	963	851	963	11751
Sardegna . . . . .	167	199	219	182	155	163	232	261	279	328	225	233	2643
<i>Mal. dell'app. respirat. (a)</i>	<i>2089</i>	<i>2502</i>	<i>2737</i>	<i>2250</i>	<i>2231</i>	<i>1975</i>	<i>1804</i>	<i>1331</i>	<i>1122</i>	<i>1381</i>	<i>1756</i>	<i>2952</i>	<i>24130</i>
Piemonte . . . . .	80	104	133	94	89	63	47	33	37	41	48	98	867
Liguria . . . . .	35	37	36	31	20	16	15	12	19	15	25	50	311
Lombardia . . . . .	330	327	324	263	321	258	191	182	133	180	217	449	3175
Venezia Tridentina . .	31	50	50	36	28	20	16	16	16	22	22	42	349
Veneto . . . . .	174	199	224	149	188	131	118	88	65	112	130	257	1835
Venezia Giulia e Zara .	42	41	45	46	29	17	14	13	15	23	17	65	367
Emilia . . . . .	102	154	202	132	105	93	71	57	50	56	87	150	1259
Toscana . . . . .	59	78	78	65	74	58	43	30	30	40	54	83	692
Marche . . . . .	25	55	82	43	45	31	27	17	13	20	26	67	451
Umbria . . . . .	22	26	31	23	14	18	19	8	13	14	17	38	243
Lazio . . . . .	138	137	128	131	117	118	105	65	57	70	85	187	1338
Abruzzi e Molise . . .	103	110	103	88	73	63	75	66	44	65	103	127	1020
Campania . . . . .	269	288	324	315	349	355	325	256	187	177	246	347	3438
Puglie . . . . .	210	287	319	292	322	294	316	177	152	167	243	384	3163
Lucania . . . . .	40	71	95	80	44	61	72	43	35	53	79	75	748
Calabria . . . . .	121	167	146	128	108	118	113	96	68	114	123	191	1498
Sicilia . . . . .	265	313	335	283	269	228	201	137	150	165	184	277	2807
Sardegna . . . . .	43	58	82	51	36	33	36	35	38	47	45	65	569

(a) dal 104 al 114.

Segue: TAVOLA 8. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1936, nei singoli Compartimenti, distinti secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso.

CAUSE DI MORTE — COMPARTIMENTI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	ANNO
<i>Mal. dell'app. digerente (a)</i>	1024	976	987	1167	1704	3568	6568	4895	3363	2378	1494	1298	29422
Piemonte . . . . .	45	35	39	46	51	68	102	133	144	101	54	45	863
Liguria . . . . .	10	11	13	14	10	13	22	33	31	18	14	19	208
Lombardia . . . . .	126	140	123	147	168	289	962	949	821	369	166	129	4389
Venèzia Tridentina . . . . .	8	12	12	13	14	19	30	47	49	21	22	15	262
Veneto . . . . .	73	77	65	57	85	138	302	252	187	154	88	73	1551
Venèzia Giulia e Zara.	27	23	24	16	22	32	103	72	71	30	13	18	451
Emilia . . . . .	50	33	58	51	53	88	104	82	112	84	55	53	823
Toscana . . . . .	25	29	26	19	31	42	81	73	76	42	26	29	499
Marche . . . . .	20	24	21	12	18	30	74	64	63	52	25	29	432
Umbria . . . . .	9	10	11	11	7	12	35	42	38	30	11	6	222
Lazio . . . . .	40	46	48	49	55	184	467	313	133	96	61	57	1549
Abruzzi e Molise . . . . .	67	77	46	50	71	197	485	397	173	105	83	83	1834
Campània . . . . .	106	66	97	124	287	723	1193	636	286	196	137	107	3958
Puglie . . . . .	135	140	158	227	361	666	633	351	237	271	182	180	3541
Lucania . . . . .	29	22	31	27	57	121	241	143	82	62	40	33	888
Calàbrie . . . . .	70	65	63	57	99	224	574	448	213	168	141	94	2216
Sicilia . . . . .	154	141	130	215	289	664	1048	738	500	441	313	275	4908
Sardegna . . . . .	30	25	22	32	26	58	112	122	147	138	63	53	828
<i>Restanti cause . . . . .</i>	4069	4304	4113	3568	3319	3067	3264	2983	2804	3485	3619	4533	43128
Piemonte . . . . .	178	161	231	199	163	143	114	142	130	144	152	177	1934
Liguria . . . . .	60	66	70	71	69	50	53	54	42	39	65	64	703
Lombardia . . . . .	493	494	528	460	405	377	427	412	379	463	396	509	5343
Venèzia Tridentina . . . . .	53	66	71	54	45	45	42	41	63	51	69	66	666
Veneto . . . . .	462	460	418	329	336	234	339	290	285	400	343	422	4368
Venèzia Giulia e Zara.	93	108	95	94	80	64	51	58	48	66	75	102	934
Emilia . . . . .	309	322	307	282	265	189	221	178	178	229	234	273	2987
Toscana . . . . .	204	219	169	166	176	144	123	111	116	170	164	190	1952
Marche . . . . .	113	178	155	117	81	78	92	84	89	81	101	170	1339
Umbria . . . . .	65	79	85	64	46	42	41	37	29	51	52	88	679
Lazio . . . . .	254	234	229	214	181	182	192	167	150	183	247	284	2517
Abruzzi e Molise . . . . .	196	234	203	168	153	124	162	128	118	188	187	237	2098
Campània . . . . .	389	423	427	358	362	374	414	366	285	335	420	514	4667
Puglie . . . . .	442	444	359	354	314	358	301	248	246	307	338	525	4236
Lucania . . . . .	87	98	114	85	78	83	110	70	67	86	91	123	1092
Calàbrie . . . . .	216	209	207	193	137	163	195	171	171	192	214	263	2331
Sicilia . . . . .	361	393	330	261	335	295	303	322	314	357	354	411	4036
Sardegna . . . . .	94	116	115	99	93	72	84	104	94	143	117	115	1246

(a) dal 115 al 129.

TAVOLA 9. — Bambini. nati da parti multipli, morti nel primo mese di vita, durante

l'anno 1936, classificati per alcune cause di morte, sesso, età e filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — SESSO	DA 0 A 6 GIORNI				DA 7 A 13 GIORNI				DA 14 A 29 GIORNI				TOTALE				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
		legittima	ille- gittima	non indicata	TOTALE	legittima	ille- gittima	non indicata	TOTALE	legittima	ille- gittima	non indicata	TOTALE	legittima	ille- gittima	non indicata	TOTALE		
	<b>Complesso . . . .</b>	Maschi . . . .	1784	82	16	1882	455	15	4	474	528	27	8	563	2767	124	28	2319	
		Femmine . . . .	1475	75	14	1564	417	12	6	435	440	18	4	462	2332	105	24	2461	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>3259</b>	<b>157</b>	<b>30</b>	<b>3446</b>	<b>872</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>909</b>	<b>968</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>1025</b>	<b>5099</b>	<b>229</b>	<b>52</b>	<b>5380</b>	
86	Convulsioni in bambini di meno di 5 anni . . . . .	Maschi . . . .	32	—	—	32	18	—	—	18	25	—	1	26	75	—	1	76	86
		Femmine . . . .	16	2	1	19	14	—	—	14	20	—	—	20	50	2	1	53	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>125</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>129</b>	
106	Bronchiti . . . . .	Maschi . . . .	8	—	—	8	17	1	—	18	29	—	—	29	54	1	—	55	106
		Femmine . . . .	2	—	—	2	8	—	—	8	16	—	—	16	26	—	—	26	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>45</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>81</b>	
107	Broncopolmonite (compresa la bronchite capillare) . . . . .	Maschi . . . .	5	—	—	5	22	—	—	22	40	2	—	42	67	2	—	69	107
		Femmine . . . .	8	—	—	8	14	—	—	14	19	—	—	19	41	—	—	41	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>61</b>	<b>108</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>110</b>	
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . . . .	Maschi . . . .	20	—	—	20	30	1	—	31	57	5	—	62	107	6	—	113	119
		Femmine . . . .	16	—	—	16	16	1	—	17	61	2	—	63	93	3	—	96	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>36</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>48</b>	<b>118</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>125</b>	<b>260</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>269</b>	
157	Vizi di conformazione congeniti (non compresi i nati morti) . . . . .	Maschi . . . .	35	—	1	36	9	—	—	9	9	—	—	9	53	—	1	54	157
		Femmine . . . .	26	1	1	28	5	—	1	6	9	—	—	9	40	1	2	43	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>97</b>	
158	Debolezza congenita . . . . .	Maschi . . . .	648	29	7	684	168	4	3	175	179	6	5	190	995	39	15	1049	158
		Femmine . . . .	535	22	4	561	184	6	2	192	162	6	2	170	881	34	8	923	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>1183</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>1245</b>	<b>352</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>367</b>	<b>341</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>360</b>	<b>1876</b>	<b>73</b>	<b>23</b>	<b>1972</b>	
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti) . . . . .	Maschi . . . .	824	46	4	874	112	7	—	119	109	8	—	117	1045	61	4	1110	159
		Femmine . . . .	736	44	3	783	121	4	1	126	87	9	1	97	944	57	5	1006	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>1560</b>	<b>90</b>	<b>7</b>	<b>1657</b>	<b>233</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>245</b>	<b>196</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>214</b>	<b>1989</b>	<b>118</b>	<b>9</b>	<b>2116</b>	
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti) . . . . .	Maschi . . . .	31	1	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	—	32	160
		Femmine . . . .	20	—	—	20	1	—	—	1	—	—	—	—	21	—	—	21	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>53</b>	
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	Maschi . . . .	156	6	3	165	60	2	1	63	56	4	—	60	272	12	4	288	161
		Femmine . . . .	103	5	4	112	45	1	1	47	41	—	1	42	189	6	6	201	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>259</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>277</b>	<b>105</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>110</b>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>461</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>489</b>	
199	Morte improvvisa . . . . .	Maschi . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	2	199
		Femmine . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	
200	Cause non specificate o mal definite . . . . .	Maschi . . . .	15	—	—	15	1	—	—	1	—	—	—	—	16	—	—	16	200
		Femmine . . . .	8	—	—	8	1	—	—	1	—	—	—	—	9	—	—	9	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>23</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>25</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>25</b>	
	Rimanenti cause . . . . .	Maschi . . . .	10	—	1	11	17	—	—	17	23	2	2	27	50	2	3	55	
		Femmine . . . .	5	1	1	7	7	—	1	8	25	1	—	26	37	2	2	41	
		<b>Totale . . . .</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>87</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	

TAVOLA 10. — Bambini morti nella prima settimana di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (*)	MENO DI 1 GIORNO		1 GIORNO		2 GIORNI	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
	<b>Complesso . . .</b>	<b>6640</b>	<b>2819</b>	<b>3290</b>	<b>1432</b>	<b>2790</b>	<b>1222</b>
10	Difterite . . . . .	1	—	—	—	—	—
15	Risipola . . . . .	1	1	2	1	—	—
22	Tetano . . . . .	2	—	2	1	1	—
34	Sifilide . . . . .	47	20	20	9	19	6
36	Infez. purulenta e setticemia, non puerperali .	1	1	—	—	—	—
43	Micosi . . . . .	—	—	—	—	—	—
54	Tumori non maligni . . . . .	—	—	—	—	—	—
66	Mal. della ghiand. tiroide e delle paratiroidi .	—	—	1	—	—	—
	<i>d) tetania</i> . . . . .	—	—	1	—	—	—
67	Malattie del timo . . . . .	7	3	4	2	3	2
70	Stati emorragipari . . . . .	—	—	2	1	—	—
86	Convulsioni . . . . .	60	22	87	37	117	42
103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . .	1	—	—	—	—	—
104	Malattie delle fosse nasali e annessi . . . . .	—	—	—	—	—	—
105	Malattie della laringe . . . . .	—	—	2	1	1	—
106	Bronchite . . . . .	7	4	17	5	16	5
	<i>a) acuta</i> . . . . .	3	2	7	2	8	3
	<i>c) non specificata</i> . . . . .	4	2	10	3	8	2
107	Broncopneumite, compr. la bronchite capillare.	24	15	48	19	69	25
111	Congestione, edema, ecc. del polmone ( <i>a</i> ) . . .	3	—	1	1	—	—
114	Altre mal. app. respiratorio (eccettuata tbc.) .	—	—	—	—	—	—
	<i>b) altre, compresa la cangrena del polmone</i> . . .	—	—	—	—	—	—
115	Malattie della cavità boccale, ecc. ( <i>b</i> ) . . . .	—	—	—	—	—	—
116	Malattie dell'esofago . . . . .	—	—	—	—	—	—
118	Altre mal. dello stomaco (cancro eccettuato) . .	1	—	—	—	—	—
119	Enteriti . . . . .	10	4	9	5	39	16
122	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	—	—	1	—	2	—
123	Altre malattie dell'intestino . . . . .	—	—	—	—	—	—
129	Peritonite senza causa indicata . . . . .	—	—	1	—	1	—
152	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	—	—	—	—	1	1
153	Altre malattie della pelle, ecc. ( <i>c</i> ) . . . . .	—	—	—	—	—	—
157	Vizi di conformazione congeniti ( <i>d</i> ) . . . . .	337	163	180	72	149	54
	<i>a) idrocefalia</i> . . . . .	31	16	5	2	4	2
	<i>b) spina bifida e meningocele</i> . . . . .	44	24	25	11	27	14
	<i>c) malformazioni congenite del cuore</i> . . . . .	111	45	88	37	68	22
	<i>d) mostruosità</i> . . . . .	71	44	17	9	8	4
	<i>e) altri</i> . . . . .	80	34	45	13	42	12
158	Debolezza congenita . . . . .	1473	643	971	443	891	391
159	Nascita prematura (non compr. i nati morti) .	2829	1201	1307	576	1024	502
160	Conseguenze parto (non compr. i nati morti) .	567	192	120	44	75	24
161	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	1182	513	460	185	339	134
	<i>a) ateletasia</i> . . . . .	44	19	35	14	28	10
	<i>b) ittero dei neonati</i> . . . . .	13	6	37	14	56	22
	<i>c) sclerema e altre</i> . . . . .	1125	488	388	157	255	102
172	Infanticidio . . . . .	29	14	—	—	1	1
	<i>a) subito dopo la nascita</i> . . . . .	29	14	—	—	—	—
	<i>b) altri, prima di un anno</i> . . . . .	—	—	—	—	1	1
181	Per ustioni acid. (diverse da quelle per incend.)	—	—	—	—	—	—
182	Per soffocazione meccanica accidentale . . . .	1	1	—	—	—	—
194	Per altri accidenti . . . . .	1	1	—	—	—	—
199	Morte improvvisa . . . . .	3	1	8	4	4	2
200	Cause non specificate o mal definite . . . . .	53	20	47	26	38	17

l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (*)	3 GIORNI		4 GIORNI		5 GIORNI		6 GIORNI		MORTI NELLA PRIMA SETTIMANA DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	M F	
	<b>Complesso . . .</b>	<b>2070</b>	<b>907</b>	<b>1439</b>	<b>645</b>	<b>1350</b>	<b>609</b>	<b>1175</b>	<b>545</b>	<b>10575</b>	<b>8179</b>	<b>18754</b>	
	Difterite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10
	Risipola . . . . .	1	—	—	—	5	1	5	3	8	6	14	15
	Tetano . . . . .	1	—	6	3	4	1	8	1	18	6	24	22
	Sifilide . . . . .	16	10	9	4	7	3	7	4	69	56	125	34
	Infez. purulenta e setticemia, non puerperali .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	3	36
	Micosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	43
	Tumori non maligni . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	54
	Mal. della ghiand. tiroide e delle paratiroidi .	2	—	3	1	4	1	3	1	10	3	13	66
	<i>d) tetania</i> . . . . .	2	—	3	1	4	1	3	1	10	3	13	66
	Malattie del timo . . . . .	1	1	1	—	1	—	4	2	11	10	21	67
	Stati emorragipari . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	4	70
	Convulsioni . . . . .	112	44	84	37	80	33	79	35	369	250	619	86
	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	103
	Malattie delle fosse nasali e annessi . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	2	104
	Malattie della laringe . . . . .	—	—	1	1	—	—	2	—	4	2	6	105
	Bronchite . . . . .	15	9	20	7	16	10	33	14	70	54	124	106
	<i>a) acuta</i> . . . . .	6	2	8	2	5	3	11	6	28	20	48	106
	<i>c) non specificata</i> . . . . .	7	7	12	5	11	7	22	8	42	34	76	106
	Broncopneumite, compr. la bronchite capillare.	64	29	54	18	59	24	73	28	233	158	391	107
	Congestione, edema, ecc. del polmone ( <i>a</i> ) . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	4	2	6	111
	Altre mal. app. respiratorio (eccettuata tbc.) .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	114
	<i>b) altre, compresa la cangrena del polmone</i> . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	114
	Malattie della cavità boccale, ecc. ( <i>b</i> ) . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	115
	Malattie dell'esofago . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	116
	Altre mal. dello stomaco (cancro eccettuato) . .	—	—	1	1	3	2	3	2	3	5	8	118
	Enteriti . . . . .	47	24	50	22	49	18	67	24	158	113	271	119
	Ernia, occlusione intestinale . . . . .	3	—	—	—	3	2	2	—	8	3	11	122
	Altre malattie dell'intestino . . . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	123
	Peritonite senza causa indicata . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	4	129
	Flemmone, ascesso caldo . . . . .	1	1	1	—	—	—	1	—	2	2	4	152
	Altre malattie della pelle, ecc. ( <i>c</i> ) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	153
	Vizi di conformazione congeniti ( <i>d</i> ) . . . . .	125	47	96	39	86	38	71	31	600	444	1044	157
	<i>a) idrocefalia</i> . . . . .	6	2	4	1	—	—	3	—	30	23	53	157
	<i>b) spina bifida e meningocele</i> . . . . .	14	14	23	15	17	9	15	8	80	95	175	157
	<i>c) malformazioni congenite del cuore</i> . . . . .	52	17	28	11	29	15	31	14	246	161	407	157
	<i>d) mostruosità</i> . . . . .	1	—	2	—	—	—	—	—	42	57	99	157
	<i>e) altri</i> . . . . .	42	14	39	12	40	14	22	9	202	108	310	157
	Debolezza congenita . . . . .	679	284	465	243	461	223	347	163	2897	2390	5287	158
	Nascita prematura (non compr. i nati morti) .	630	308	378	167	326	154	276	152	3710	3060	6770	159
	Conseguenze parto (non compr. i nati morti) .	33	11	20	6	15	5	16	3	561	285	846	160
	Altre malattie speciali dell'infanzia . . . . .	288	117	200	74	185	77	161	75	1640	1175	2815	161
	<i>a) ateletasia</i> . . . . .	10	5	9	2	10	5	7	2	86	57	143	161
	<i>b) ittero dei neonati</i> . . . . .	70	31	65	25	59	26	41	13	204	137	341	161
	<i>c) sclerema e altre</i> . . . . .	208	81	126	47	116	46	113	60	1350	981	2331	161
	Infanticidio . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	16	15	31	172
	<i>a) subito dopo la nascita</i> . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29	172
	<i>b) altri, prima di un anno</i> . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	172
	Per ustioni acid. (diverse da quelle per incend.)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	181
	Per soffocazione meccanica accidentale . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	182
	Per altri accidenti . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	194
	Morte improvvisa . . . . .	4	2	1	—	—	—	2	1	12	10	22	199
	Cause non specificate o mal definite . . . . .	44	17	42	20	41	16	8	3	154	119	273	200

(\*) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1936, si verificarono casi di morte.

(a) embolia, infarto emorragico e trombotici. (b) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (c) dei suoi

annessi e del tessuto cellulare. (d) non compresi i nati morti.

TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE		INDUSTRIALI, COMMERCianti		VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERICIVARIE E NON SPECIFICATE		ESERCENTI		COMMISSIONARI RAPPRESENTANTI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	<b>Complesso . . .</b>	<b>119677</b>	<b>24995</b>	<b>6247</b>	<b>290</b>	<b>3615</b>	<b>408</b>	<b>1272</b>	<b>191</b>	<b>1859</b>	<b>16</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie .</b>	<b>10408</b>	<b>2242</b>	<b>641</b>	<b>22</b>	<b>415</b>	<b>28</b>	<b>127</b>	<b>19</b>	<b>293</b>	<b>4</b>
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	702	208	22	4	23	5	6	2	12	—
3	Tifo petecchiale . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Scarlattina . . . . .	11	2	1	—	—	—	—	—	—	—
9	Tosse convulsa . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Difterite . . . . .	29	11	1	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza . . . . .	2061	458	129	6	45	9	21	4	36	—
13	Dissenteria . . . . .	54	11	—	—	1	—	—	—	—	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a).	4518	952	310	10	244	8	72	10	168	3
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	1247	306	56	1	45	2	9	2	26	1
34	Sifilide . . . . .	122	25	32	—	17	—	4	—	24	—
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	545	91	44	1	13	—	9	—	16	—
38	Malaria . . . . .	367	55	3	—	1	—	—	—	3	—
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	52	7	3	—	1	—	—	—	—	—
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	632	110	40	—	25	4	6	1	8	—
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>8691</b>	<b>1691</b>	<b>670</b>	<b>51</b>	<b>416</b>	<b>58</b>	<b>146</b>	<b>26</b>	<b>208</b>	<b>1</b>
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni .	8447	1603	652	46	404	53	145	26	203	1
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	244	88	18	5	12	5	1	—	5	—
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . .</b>	<b>1653</b>	<b>412</b>	<b>215</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>—</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . .	541	149	18	1	15	5	6	1	7	—
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . .	340	92	19	—	9	2	1	—	2	—
dal 60 al 64	Diabete mellito . . . . .	530	93	170	7	70	13	30	5	27	—
66	Avitaminosi . . . . .	40	7	—	—	1	—	—	—	—	—
65, 67, 68, 69	Mal. ghiand. tiroide e ghian. parat. Altre malattie generali . . . . .	73 129	34 32	1 7	1 —	1 1	— —	1 —	1 1	2 1	— —
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . .</b>	<b>477</b>	<b>108</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>—</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	170	48	11	—	3	—	4	2	3	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . . .	307	60	36	1	15	2	5	—	12	—
	<b>V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni</b>	<b>198</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>—</b>
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	192	7	4	—	11	—	4	1	5	—
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	6	—	2	—	—	—	—	—	2	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f).</b>	<b>19327</b>	<b>3790</b>	<b>889</b>	<b>36</b>	<b>516</b>	<b>57</b>	<b>186</b>	<b>24</b>	<b>259</b>	<b>1</b>
79	Meningite semplice . . . . .	242	41	9	—	5	1	3	1	4	—
80	Atassia locomotrice progressiva . .	69	7	10	—	1	—	3	—	6	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	17401	3390	763	33	454	50	163	19	213	1
83	Paralisi progressiva degli alienati.	107	11	31	2	14	—	2	—	14	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	267	63	16	1	10	3	3	1	4	—
85	Epilessia . . . . .	424	99	7	—	7	1	2	1	3	—
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	668	164	39	—	21	2	8	2	9	—
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi.	149	15	14	—	4	—	2	—	6	—
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio .</b>	<b>23376</b>	<b>5951</b>	<b>1224</b>	<b>71</b>	<b>651</b>	<b>102</b>	<b>237</b>	<b>43</b>	<b>327</b>	<b>5</b>
90	Pericardite . . . . .	63	8	6	2	1	1	1	—	2	—
91	Endocardite acuta . . . . .	68	23	6	2	2	—	1	—	7	1
92	Endocardite cr., compr. le aff. valv.	7099	2201	229	17	151	32	51	14	54	1
93	Malattie del miocardio . . . . .	6565	1657	329	20	177	30	68	14	99	3

ficati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

MINATORI, CAVATORI, ECC.	FALEGNAMI, VERNICIATORI, ECC.	ADDETTI ALLA MACELLAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARNI		ADDETTI AI FORNI E PASTIFICI		ADDETTI ALLA LAVORAZ. DEL LATTE E ALL'INDUSTR. ALIMENTARI		CONCIATORI, PELLAI		CALZOLAI, GUANTAI, ECC.		METALLURGICI		MECCANICI, ELETRICISTI, ECC.		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F			
1060	—	5599	73	335	6	2142	69	186	1	149	2	4497	69	241	—	6242	41	
188	—	958	17	56	2	318	10	25	—	20	—	687	31	36	—	1359	8	
8	—	42	1	1	—	13	—	4	—	1	—	24	1	1	—	54	1, 2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
16	—	73	2	4	—	26	3	4	—	2	—	43	—	1	—	115	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
127	—	647	12	33	—	208	3	9	—	13	—	462	24	27	—	929	4	
22	—	109	2	6	—	33	4	4	—	1	—	80	6	1	—	138	3	
1	—	16	—	1	—	10	—	—	—	—	—	24	—	1	—	39	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
3	—	9	—	2	—	4	—	—	—	—	—	8	—	—	—	13	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
7	—	28	—	5	1	6	—	2	—	1	—	20	—	1	—	23	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
62	—	531	8	35	—	176	3	17	—	16	—	320	3	23	—	541	6	
61	—	524	8	35	—	172	3	16	—	16	—	305	2	20	—	521	3	
1	—	7	—	—	—	4	—	1	—	—	—	15	1	3	—	20	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	dal 45 al 53
11	—	88	1	6	—	44	1	2	—	4	1	74	3	3	—	100	1	
6	—	26	1	1	—	8	—	2	—	1	—	14	2	1	—	31	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57, 58
4	—	40	—	4	—	24	—	—	—	—	—	42	—	1	—	55	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	dal 60 al 64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65, 67, 68, 69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
4	—	34	1	5	—	6	—	—	—	1	—	23	5	2	—	35	—	
2	—	10	1	1	—	2	—	—	—	—	—	11	—	—	—	9	—	
2																		

Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE		INDUSTRIALI, COMMERCianti		VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERCI VARIE E NON SPECIFICATE		ESERCENTI		COMMISSIONARI RAPPRESENTANTI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	715	96	198	3	65	5	26	2	48	—
95	Altre malattie del cuore . . . . .	4451	1174	160	15	112	18	38	10	41	—
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	162	19	34	—	12	1	4	—	7	—
97, 98	Arteriosclerosi (a) e cangrena . .	3896	702	218	9	114	10	43	2	57	—
dal 99 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio.	351	71	44	3	17	5	5	1	12	—
	<b>VIII. — Malattie dell'app. respiratorio.</b>	21629	4059	874	45	544	61	183	29	236	2
106	Bronchiti . . . . .	3759	871	98	6	67	8	27	4	25	—
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	15459	2814	639	36	380	42	130	19	165	2
110	Pleuriti . . . . .	535	67	30	2	29	4	6	—	11	—
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	1376	307	107	1	68	7	20	6	35	—
	<b>IX. — Malattie dell'apparato digerente.</b>	7554	1257	573	28	362	26	143	19	149	—
117	Ulcera dello stom. e del duodeno.	921	91	87	1	43	3	14	—	26	—
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre).	1919	408	46	5	31	3	14	1	16	—
121	Appendicite . . . . .	525	93	47	3	28	1	6	1	13	—
122	Ernia, occlusione intestinale . .	1261	168	70	4	43	8	14	5	15	—
124	Cirrosi del fegato . . . . .	1381	160	208	8	150	6	73	5	53	—
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (b).	574	129	63	3	25	4	13	4	10	—
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	973	208	52	4	42	1	9	3	16	—
	<b>X. — Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	5363	915	496	9	221	19	79	10	114	—
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	3548	826	320	4	143	14	53	7	64	—
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c) . .	187	23	20	2	13	3	6	3	5	—
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . .	132	11	22	1	9	1	4	—	1	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori.	445	19	46	—	13	1	6	—	15	—
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	59	—	7	—	9	—	—	—	8	—
137	Malattie della prostata . . . . .	948	—	79	—	34	—	10	—	21	—
138, 139	Malattie degli organi genitali (d).	44	36	2	2	—	—	—	—	—	—
	<b>XI. — Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	362	362	1	1	8	8	1	1	1	1
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . .	13	13	—	—	2	2	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale . . . . .	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	145	145	1	1	3	3	1	1	1	1
146, 147	Tossicemia della gravidanza, ecc. (e)	71	71	—	—	1	1	—	—	—	—
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	59	59	—	—	2	2	—	—	—	—
	<b>XII. — Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	479	73	30	—	19	2	4	—	15	—
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	479	73	30	—	19	2	4	—	15	—
	<b>XIII. — Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	147	18	9	—	7	—	2	—	5	—
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f)	147	18	9	—	7	—	2	—	5	—
	<b>XIV. — Vizi di conformazione congeniti.</b>	17	3	1	—	—	—	—	—	—	—
157	Vizi di conformazione congeniti . .	17	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVI. — Senilità.</b>	13789	3318	206	11	128	12	59	8	73	1
162	Senilità . . . . .	13789	3318	206	11	128	12	59	8	73	1
	<b>XVII. — Morti violente e accidentali.</b>	4761	565	281	5	156	8	47	2	89	1
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	952	93	95	2	66	2	18	—	33	1
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	365	54	16	—	9	1	4	1	5	—
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	3415	356	168	3	80	5	25	1	51	—
195	Altre morti violente (g) . . . . .	25	2	2	—	1	—	—	—	—	—
196, 197	Ferite di guerra (h) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Esecuzione giudiziaria . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVIII. — Cause di morte non determinate</b>	1452	284	84	1	46	5	7	—	29	—
199, 200	Morte impróvv. e cause non specific. o mal definite. . . . .	1452	284	84	1	46	5	7	—	29	—

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (h) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

MINATORI, CAVATORI, ECC.	FALEGNAMI, VERNICIATORI, ECC.	ADDETTI ALLA MACELLAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARNI		ADDETTI AI FORNI E PASTIFICI		ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL LATTE E ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE		CONCIATORI, PELLAI		CALZOLAI, GUANTAI, ECC.		METALLURGICI		MECCANICI, ELETTRICISTI, ECC.		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F			
2	—	55	—	6	—	19	—	1	—	1	—	73	—	—	—	63	94	
24	—	140	2	7	2	59	3	9	—	5	—	129	1	8	—	120	95	
1	—	17	—	1	—	9	1	—	—	—	—	10	—	—	—	21	96	
22	—	151	—	4	1	60	2	11	—	4	—	149	—	2	—	112	97, 98	
3	—	21	—	3	—	16	—	—	—	—	—	20	—	—	—	28	dal 99 al 103	
211	—	898	15	51	—	355	10	23	—	23	1	666	6	52	—	1068	10	
27	—	121	3	6	—	51	3	3	—	8	—	112	—	4	—	94	106	
143	—	619	12	37	—	252	7	19	—	11	1	453	5	45	—	795	8 107, 108, 109	
9	—	25	—	1	—	11	—	—	—	—	—	49	—	1	—	30	110	
32	—	133	—	7	—	41	—	1	—	4	—	52	1	2	—	149	104, 105, dal 111 al 114	
49	—	410	3	32	1	181	5	19	—	12	—	309	1	18	—	508	2	
7	—	80	—	1	—	31	—	1	—	—	—	51	—	3	—	116	117	
12	—	62	—	4	—	21	2	2	—	3	—	50	—	—	—	51	120	
5	—	37	—	8	1	15	1	4	—	1	—	17	—	1	—	71	121	
2	—	46	—	3	—	25	1	—	—	2	—	37	—	2	—	44	122	
16	—	104	1	14	—	54	—	8	—	4	—	90	—	6	—	129	124	
2	—	26	—	—	—	11	—	2	—	2	—	28	—	5	—	36	125, 126, 127	
5	—	55	2	2	—	24	1	2	—	—	—	36	1	1	—	61	115, 116, 118, 123, 128, 129	
36	—	292	5	19	—	102	6	9	—	9	—	277	5	8	—	260	2	
20	—	173	4	14	—	59	6	7	—	6	—	170	4	5	—	167	2 130, 131, 132	
6	—	15	—	—	—	7	—	—	—	1	—	17	—	—	—	17	133	
2	—	14	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9	—	—	—	15	134	
1	—	25	1	1	—	3	—	1	—	—	—	21	—	—	—	20	135	
1	—	6	—	1	—	5	—	—	—	—	—	7	—	—	—	8	136	
6	—	58	—	2	—	26	—	1	—	2	—	53	—	2	—	32	137	
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	138, 139	
—	—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—	4	4	—	—	3	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1 141, 142, 143	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140, 145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146, 147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148, 149, 150
3	—	21	—	1	—	10	—	—	—	2	—	16	2	1	—	22	—	
3	—	21	—	1	—	10	—	—	—	2	—	16	2	1	—	22	—	
2	—	12	—	1	—	2	—	—	—	—	—	8	—	2	—	15	—	
2	—	12	—	1	—	2	—	—	—	—	—	8	—	2	—	15	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151, 152, 153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154, 155, 156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
68	—	320	6	12	—	111	6	5	—	14	—	303	—	4	—	185	—	
68	—	320	6	12	—	111	6	5										



Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	ARGENTIERI, OREFICI, ECC.		ASFALTISTI, FORNACIAI, ECC.		CERAMISTI, VETRAI, ECC.		MURATORI, IMBIANCHINI, ECC.		MANOVALI, BRACCANTI, ECC.	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	6	—	2	—	3	—	65	—	59	—
95	Altre malattie del cuore . . . . .	9	1	14	—	4	—	211	1	215	2
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	—	—	2	—	—	—	11	—	17	—
97, 98	Arteriosclerosi (a) e cangrena . . .	13	—	6	—	7	—	194	—	192	—
dal 99 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio . .	—	—	2	—	1	—	29	—	15	—
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio.</b>	49	—	79	3	56	3	1137	1	1266	—
106	Bronchiti . . . . .	11	—	6	—	7	—	150	—	150	—
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	33	—	65	3	41	3	806	1	917	—
110	Pleuriti . . . . .	2	—	3	—	1	—	45	—	55	—
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	3	—	5	—	7	—	136	—	144	—
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	27	1	25	—	35	1	542	—	511	—
117	Ulcera dello stom. e del duodeno . .	4	—	6	—	7	—	106	—	108	—
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre).	3	—	3	—	4	—	78	—	90	—
121	Appendicite . . . . .	1	1	2	—	6	—	34	—	39	—
122	Ernia, occlusione intestinale . . .	3	—	3	—	7	—	69	—	70	—
124	Cirrosi del fegato . . . . .	6	—	7	—	5	—	145	—	95	—
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (b).	3	—	3	—	1	—	48	—	46	—
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	7	—	1	—	5	1	62	—	63	—
	<b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	23	—	21	—	12	—	331	—	330	1
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	10	—	12	—	8	—	195	—	202	—
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c) . . .	—	—	—	—	1	—	11	—	14	—
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . . .	—	—	2	—	1	—	13	—	8	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori.	2	—	1	—	—	—	29	—	22	—
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	1	—	—	—	—	—	6	—	10	—
137	Malattie della prostata . . . . .	10	—	6	—	2	—	75	—	73	—
138, 139	Malattie degli organi genitali (d) . .	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146, 147	Tossicemia della gravidanza, ecc. (e)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XII. - Mal. della pelle e del tess. celul.</b>	1	—	2	—	2	—	29	—	51	—
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	1	—	2	—	2	—	29	—	51	—
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	—	—	—	—	—	—	5	—	15	—
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f)	—	—	—	—	—	—	5	—	15	—
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti.</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
157	Vizi di conformazione congeniti . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	<b>XVI. - Senilità</b>	17	—	31	—	18	—	402	1	372	3
162	Senilità . . . . .	17	—	31	—	18	—	402	1	372	3
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali</b>	7	—	23	1	13	—	504	—	684	1
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	2	—	8	1	8	—	85	—	94	—
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	—	—	—	—	—	—	19	—	21	—
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	5	—	15	—	5	—	394	—	568	1
195	Altre morti violente (g) . . . . .	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—
196, 197	Ferite di guerra (h) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Esecuzione giudiziaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate</b>	3	—	2	—	2	—	109	—	99	—
199, 200	Morte improv. e cause non specific. o mal definite. . . . .	3	—	2	—	2	—	109	—	99	—

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (h) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE		ADDETTI A MANIFATTURE TESSILI		ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL VESTIARIO		ADDETTI ALL'ARREDA- MENTO		INDUSTRIE CHIMICHE		ADDETTI AI LABORATORI E MANIFAT. TABACCHI		ADDETTI ALLE INDUSTRIE POLI- GRAFICHE		ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA CARTA		OPERAI NON SPECIFICATI		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F		
94	11	—	1	—	21	3	2	1	3	—	—	—	8	—	2	—	50	—	94	
95	61	31	6	—	98	43	7	—	2	1	—	—	9	—	7	2	151	12	95	
96	2	—	1	—	5	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	96
97, 98	35	4	5	—	57	15	5	—	2	—	—	—	9	1	5	—	175	8	97, 98	
dal 99 al 103	3	2	2	2	12	5	5	—	—	—	—	—	2	—	4	1	16	—	dal 99 al 103	
	288	128	48	18	416	157	45	2	30	4	11	10	57	3	34	3	946	70		
106	28	8	4	1	57	12	5	—	5	—	—	—	6	—	2	—	106	6	106	
107, 108, 109	209	99	40	16	287	120	32	2	23	3	8	7	41	3	28	3	691	57	107, 108, 109	
110	14	6	1	1	26	11	2	—	1	1	2	2	4	—	2	—	46	2	110	
104, 105, dal 111 al 114	37	15	3	—	46	14	6	—	1	—	1	1	6	—	2	—	103	5	104, 105, dal 111 al 114	
	131	77	17	8	227	87	18	1	8	2	6	5	36	—	23	3	438	51		
117	13	5	5	1	26	6	3	—	4	1	1	1	12	—	3	—	89	3	117	
120	20	18	1	—	30	13	3	—	—	—	2	2	7	—	2	—	54	4	120	
121	27	21	2	2	33	17	1	—	1	1	—	—	1	—	2	—	57	18	121	
122	12	5	—	—	25	12	1	—	1	—	—	—	2	—	5	1	49	4	122	
124	19	4	2	—	50	11	6	—	—	—	—	—	9	—	7	—	75	—	124	
125, 126, 127	13	7	3	2	29	14	2	1	—	—	1	—	2	—	1	1	37	8	125, 126, 127	
115, 116, 118, 123, 128, 129	27	17	4	3	34	14	2	—	2	—	2	2	3	—	3	1	77	14	115, 116, 118, 123, 128, 129	
	70	36	11	7	179	54	8	1	8	1	4	3	22	1	8	1	279	33		
130, 131, 132	43	27	7	6	126	41	6	1	7	1	2	1	14	1	4	—	168	24	130, 131, 132	
133	5	2	1	—	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2	133	
134	1	1	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	7	1	134	
135	4	1	2	1	11	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	21	—	135	
136	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	136	
137	12	—	—	—	16	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	—	51	—	137	
138, 139	5	5	—	—	5	5	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	7	6	138, 139	
	31	31	2	2	27	27	—	—	1	1	4	4	—	—	—	—	28	28		
141, 142, 143	2	2	—	—	3	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	141, 142, 143	
144	4	4	—	—	8	8	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3	144	
140, 145	19	19	1	1	9	9	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	12	12	140, 145	
146, 147	3	3	1	1	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	146, 147	
148, 149, 150	3	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	148, 149, 150	
	7	3	1	1	12	7	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	35	4		
151, 152, 153	7	3	1	1	12	7	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	35	4	151, 152, 153	
	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9	1		
154, 155, 156	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9	1	154, 155, 156	
	—	—	—	—	—															



Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	COCCHIERI, CARRETTIERI, ECC.		FERROVIARI, TRAMVIARI, CONDUTTORI AUTOMOBILI, ADDETTI AI TRASP. AEREI		MARINAI, BARCAIUOLI, PESCATORI, ECC.		ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA		ADDETTI ALLA ACCONCIATURA DELLA PERSONA	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	<b>Complesso . . .</b>	<b>2640</b>	<b>4</b>	<b>1946</b>	<b>1</b>	<b>1671</b>	<b>—</b>	<b>347</b>	<b>147</b>	<b>1116</b>	<b>63</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie .</b>	269	—	436	—	196	—	89	42	321	44
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	9	—	21	—	8	—	18	14	7	—
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Scarlattina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Tosse convulsa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Difterite . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza . . . . .	28	—	27	—	21	—	3	2	13	—
13	Dissenteria . . . . .	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a).	150	—	293	—	115	—	49	15	241	39
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	27	—	36	—	16	—	8	4	30	3
34	Sifilide . . . . .	19	—	27	—	8	—	1	—	9	—
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	14	—	9	—	11	—	2	1	9	1
38	Malaria . . . . .	8	—	10	—	4	—	1	1	2	—
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	11	—	10	—	9	—	6	4	10	1
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>214</b>	<b>1</b>	<b>168</b>	<b>—</b>	<b>135</b>	<b>—</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>3</b>
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	208	1	165	—	133	—	36	18	76	3
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	6	—	3	—	2	—	3	2	3	—
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . . . . .</b>	<b>33</b>	<b>—</b>	<b>29</b>	<b>—</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>—</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	8	—	8	—	9	—	3	1	5	—
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	7	—	2	—	—	—	1	—	—	—
59	Diabete mellito . . . . .	15	—	17	—	11	—	3	—	17	—
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	2	—	1	—	2	—	—	—	1	—
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . . . . .</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>—</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . . . . .	9	—	9	—	4	—	3	1	4	—
	<b>V. - Avvelenam. cron. e Intossicazioni</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	8	—	5	—	6	—	—	—	2	—
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f) . . . . .</b>	<b>386</b>	<b>—</b>	<b>190</b>	<b>1</b>	<b>246</b>	<b>—</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>101</b>	<b>1</b>
79	Meningite semplice . . . . .	1	—	5	—	2	—	—	—	2	—
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	2	—	5	—	2	—	—	—	1	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	345	—	136	1	223	—	25	12	77	1
83	Paralisi progressiva degli alienati.	8	—	26	—	6	—	1	—	7	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	5	—	8	—	5	—	—	—	2	—
85	Epilessia . . . . .	5	—	2	—	1	—	—	—	4	—
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	15	—	7	—	4	—	2	—	6	—
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi.	5	—	1	—	3	—	2	1	2	—
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio . . . . .</b>	<b>468</b>	<b>—</b>	<b>217</b>	<b>—</b>	<b>288</b>	<b>—</b>	<b>54</b>	<b>18</b>	<b>133</b>	<b>3</b>
90	Pericardite . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Endocardite acuta . . . . .	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—
92	Endocardite cr., compr. le aff. valv.	109	—	50	—	66	—	6	2	50	1
93	Malattie del miocardio . . . . .	121	—	57	—	70	—	14	6	22	1

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI	GARZONI E CAMERIERI ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI	FACCHINI, SPAZZINI, CANTONIERI	VENDITORI AMBULANTI, SALTIMBANCHI, VENTURIERI	PERSONALE SUBALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBL.	ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA (escl. gli Uff.)	GUARDIE DI FINANZA E MILIZIA (escl. gli Uff.)	ALTRI CORPI ARM. DELLO STATO E DI ENTI PUBBL. (escl. gli Uff.)		CULTO CATTOLICO E ALTRI CULTI		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO						
							Tot.	di cui F	Tot.	di cui F		Tot.	di cui F				
3565	1984	1211	20	2288	168	1720	104	948	85	909	—	127	—	402	—	3196	1633
733	454	258	8	267	13	228	12	135	16	251	—	36	—	66	—	467	322
46	35	21	1	6	—	8	1	2	—	32	—	5	—	4	—	14	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	34	13	—	18	1	20	1	14	2	7	—	1	—	3	—	75	32
2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
452	274	170	5	181	7	138	5	95	11	96	—	26	—	44	—	255	195
92	72	30	2	25	2	15	1	12	2	75	—	2	—	7	—	82	66
20	5	5	—	15	1	21	2	5	—	2	—	—	—	3	—	—	—
24	15	7	—	10	1	5	1	2	—	14	—	1	—	3	—	25	13
6	4	3	—	2	—	5	—	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2
24	12	3	—	10	1	15	1	4	1	14	—	—	—	1	—	13	6
343	211	127	3	248	28	122	16	97	13	26	—	9	—	38	—	348	205
322	198	126	3	243	28	115	16	93	13	26	—	9	—	37	—	327	187
21	13	1	—	5	—	7	—	4	—	—	—	—	—	1	—	21	18
62	35	18	—	21	2	27	2	15	2	14	—	—	—	14	—	139	48
16	10	11	—	6	1	6	—	2	—	7	—	—	—	3	—	12	4
5	4	1	—	2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	16	9
30	11	5	—	11	—	16	2	10	1	6	—	—	—	8	—	99	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	7
4	3	1	—	2	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	3	1
22	13	4	—	10	1	4	—	11	1	7	—	1	—	3	—	21	12
7	3	1	—	3	1	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	13	8
15	10	3	—	7	—	2	—	8	1	6	—	1	—	3	—	8	4
8	2	5	—	18	—	9	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
8	2	5	—	18	—	9	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	216	146	2	321	25	247	11	128	12	53	—	8	—	53	—	461	178
11	6	3	—	4	—	5	—	4	—	14	—	1	—	1	—	5	1
4	1	1	—	6	—	6	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	1
337	177	120	2	266	23	198	11	107	9	17	—	6	—	40	—	409	160
20	3	4	—	14	—	9	—	4	—	5	—	—	—	3	—	1	—
17	10	2	—	7	1	10	—	2	—	4	—	1	—	1	—	12	5
10	5	3	—	10	1	7	—	1	—	1	—	—	—	1	—	7	1
15	8	7	—	9	—	8	—	6	2	4	—	—	—	3	—	21	7
7	6	6	—	5	—	4	—	3	1	7	—	—	—	2	—	4	3
594	335	169	3	395	35	328	28	143	13	29	—	5	—	54	—	566	276
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
6	4	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
131	87	52	1	97	11	85	9	36	7	5	—	1					

Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	COCCHIERI, CARRATTIERI, ECC.		FERROVIARI, TRAMVIARI, CONDUTTORI AUTOMOBILI, ADDETTI AI TRASP. ARREI		MARINAI, BARCAIUOLI, PESCATORI, ECC.		ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA		ADDETTI ALLA ACCONCIATURA DELLA PERSONA	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	28	—	34	—	24	—	7	1
95	Altre malattie del cuore . . . . .	98	—	22	—	49	—	10	5	16	1
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	9	—	12	—	8	—	3	—	3	—
97, 98	Arteriosclerosi (a) e cangrena . . .	87	—	25	—	61	—	11	4	20	—
dal 99 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio.	13	—	13	—	10	—	3	—	7	—
	<b>VIII. — Malattie dell'app. respiratorio.</b>	455	1	286	—	255	—	37	15	172	4
106	Bronchiti . . . . .	56	—	16	—	38	—	3	1	17	—
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	338	1	211	—	175	—	29	13	121	4
110	Pleuriti . . . . .	12	—	11	—	15	—	2	—	7	—
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	49	—	48	—	27	—	3	1	27	—
	<b>IX. — Malattie dell'apparato digerente.</b>	193	1	199	—	119	—	37	20	94	3
117	Ulcera dello stom. e del duodeno.	30	—	53	—	29	—	5	3	15	—
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre).	32	—	18	—	25	—	3	1	17	—
121	Appendicite . . . . .	11	—	25	—	4	—	6	5	7	1
122	Ernia, occlusione intestinale . . .	24	—	14	—	13	—	2	1	8	—
124	Cirrosi del fegato . . . . .	56	—	41	—	28	—	6	—	25	1
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (b).	19	1	14	—	14	—	8	5	6	—
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	21	—	34	—	6	—	7	5	16	1
	<b>X. — Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	128	—	72	—	94	—	21	5	54	2
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	82	—	46	—	60	—	15	4	40	2
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c).	6	—	2	—	5	—	—	—	1	—
134	Calcolosi delle vie urinarie . . . .	1	—	4	—	3	—	1	1	1	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori.	12	—	7	—	8	—	3	—	5	—
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	1	—	5	—	5	—	—	—	1	—
137	Malattie della prostata . . . . .	26	—	8	—	13	—	2	—	6	—
138, 139	Malattie degli organi genitali (d).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XI. — Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
146, 147	Tossiemia della gravidanza, ecc. (e)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	<b>XII. — Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	14	—	8	—	11	—	2	—	6	—
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	14	—	8	—	11	—	2	—	6	—
	<b>XIII. — Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	7	—	2	—	4	—	—	—	2	—
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f).	7	—	2	—	4	—	—	—	2	—
	<b>XIV. — Vizi di conformazione congeniti</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Vizi di conformazione congeniti . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVI. — Senilità.</b>	145	—	40	—	165	—	6	1	53	—
162	Senilità . . . . .	145	—	40	—	165	—	6	1	53	—
	<b>XVII. — Morti violente e accidentali.</b>	268	1	258	—	102	—	15	7	57	2
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	26	1	44	—	19	—	6	3	27	1
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	17	—	5	—	5	—	1	1	3	—
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	224	—	206	—	77	—	7	3	27	1
195	Altre morti violente (g) . . . . .	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—
196, 197	Ferite di guerra (h) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Esecuzione giudiziaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVIII. — Cause di morte non determinate</b>	41	—	26	—	22	—	4	—	12	—
199, 200	Morte improv. e cause non specific. o mal definite . . . . .	41	—	26	—	22	—	4	—	12	—

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (d) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI	GARZONI E CAMERIERI ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI	FACCHINI, SPAZZINI, CANTONIERI	VENDITORI AMBULANTI, SALTIMBANCHI, VENTURIERI	PERSONALE SUBALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBL.	ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA (escl. gli Uff.)	GUARDIE DI FINANZA E MILIZIA (escl. gli Uff.)	ALTRI CORPI ARM. DELLO STATO E DI ENTI PUBBL. (escl. gli Uff.)	CULTO CATTOLICO E ALTRI CULTI		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO			
									Tot.	di cui F		Tot.	di cui F	
									33	12		10	—	24
116	58	19	—	79	9	62	5	23	—	9	—	95	51	95
13	5	6	—	6	—	5	—	4	1	—	—	2	—	96
101	53	24	—	58	2	57	1	21	—	1	—	119	59	97, 98
16	9	6	—	8	—	11	1	4	—	—	—	15	4	dal 99 al 103
537	283	194	3	451	36	294	15	150	11	162	—	51	—	298
68	37	20	—	50	3	44	1	13	—	6	—	4	—	106
404	211	139	3	332	28	203	13	114	9	130	—	35	—	107, 108, 109
20	13	10	—	17	2	11	—	3	—	14	—	2	—	110
45	22	25	—	52	3	36	1	20	2	12	—	10	—	104, 105, dal 111 al 114
256	127	96	—	171	7	119	5	106	7	78	—	14	—	215
32	5	22	—	33	—	16	—	22	—	18	—	4	—	18
32	16	14	—	18	—	16	2	12	3	2	—	2	—	10
36	24	12	—	15	1	7	—	9	—	27	—	2	—	19
36	20	15	—	16	2	16	1	9	3	4	—	2	—	120
60	21	20	—	59	2	38	1	43	1	5	—	17	—	121
31	23	4	—	10	1	10	1	5	—	9	—	2	—	122
29	18	9	—	20	1	16	—	6	—	13	—	4	—	124
199	94	57	1	101	2	92	1	41	2	29	—	4	—	125, 126, 127
135	73	31	—	67	2	59	1	23	1	23	—	2	—	115, 116, 118, 123, 128, 129
8	5	6	1	7	—	4	—	3	—	3	—	1	—	26
5	1	3	—	2	—	5	—	2	—	1	—	—	—	94
13	3	5	—	4	—	7	—	3	1	1	—	—	—	85
3	—	1	—	3	—	5	—	1	—	1	—	—	—	130, 131, 132
22	—	11	—	17	—	12	—	9	—	—	—	—	—	3
13	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
22	22	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	6
3	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3
15	15	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
18	8	5	—	10	—	10	—	7	—	14	—	—	—	11
18	8	5	—	10	—	10	—	7	—	14	—	—	—	2
7	2	4	—	3	1	1	—	1	—	1	—	—	—	3
7	2	4	—	3	1	1	—	1	—	1	—	—	—	6
2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151, 152, 153
169	102	30	—	102	13	105	8	37	3	1	—	—	—	2
169	102	30	—	102	13	105	8	37	3	1	—	—	—	2
130	61	52	—	136	4	106	4	59	1	228	—	—	—	1
50	30	19	—	23	—	28	1	15	1	41	—	—	—	157
5	4	1	—	6	—	8	—	1	—	7	—	—	—	76
71	24	62	—	104	4	69	3	43	—	179	—	—	—	157
4	3	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
42	17	15	—	34	1	27	—	17	3	16	—	6	—	154, 155, 156
42	17	15	—	34	1	27	—	17	3	16	—	6	—	1
42	17	15	—	34	1	27	—	17	3	16	—	6	—	1

reni da gravidanza. (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) di

Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	INSEGNANTI		PROFESSIONI LIBERALI		ARTI SANITARIE		ARTI BELLE		UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE, DI TERRA, DI MARE E D'ARIA	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>1232</b>	<b>644</b>	<b>1725</b>	<b>20</b>	<b>1168</b>	<b>241</b>	<b>848</b>	<b>51</b>	<b>333</b>	<b>—</b>
	<b>I. - Malattie infettive e parassitarie . . . . .</b>	<b>191</b>	<b>113</b>	<b>228</b>	<b>8</b>	<b>131</b>	<b>32</b>	<b>150</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>—</b>
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	9	7	4	—	13	4	2	—	4	—
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Scarlattina . . . . .	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—
9	Tosse convulsa . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
10	Difterite . . . . .	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—
11	Influenza . . . . .	23	12	37	—	25	3	11	—	6	—
13	Dissenteria . . . . .	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	109	66	133	6	61	17	102	4	9	—
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	26	17	15	2	7	4	12	1	3	—
34	Sifilide . . . . .	2	1	8	—	4	1	13	1	1	—
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	9	1	13	—	11	1	3	—	1	—
38	Malaria . . . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	2	—
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	8	5	9	—	9	2	4	1	1	—
	<b>II. - Tumori (neoplasie) . . . . .</b>	<b>153</b>	<b>101</b>	<b>165</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>—</b>
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	136	86	157	2	135	38	90	7	24	—
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	17	15	8	—	8	3	1	—	1	—
	<b>III. - Malattie reumatiche, ecc. (c) . . . . .</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>—</b>
56	Reumatismo articolare acuto . . . . .	7	3	3	—	—	—	4	1	—	—
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	2	1	4	—	1	—	2	—	2	—
59	Diabete mellito . . . . .	30	10	45	1	43	14	8	1	2	—
dal 60 al 64	Avitaminosi . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
66	Mal. ghiand. tiroidee e ghian. parat.	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali . . . . .	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	<b>IV. - Malattie del sangue, ecc. (d) . . . . .</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>
71	Anemie perniciose ed altre . . . . .	3	1	2	—	1	—	2	—	—	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e) . . . . .	14	7	12	—	3	2	2	—	3	—
	<b>V. - Avvelenam. cron. e intossicazioni. . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
76, 77	Avvelenamenti cronici . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
	<b>VI. - Malattie del sist. nervoso, ecc. (f) . . . . .</b>	<b>143</b>	<b>72</b>	<b>224</b>	<b>—</b>	<b>163</b>	<b>29</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>—</b>
79	Meningite semplice . . . . .	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—
80	Atassia locomotrice progressiva . . . . .	3	1	5	—	—	—	2	—	—	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	117	55	181	—	146	28	81	4	28	—
83	Paralisi progressiva degli alienati.	2	1	13	—	2	—	11	—	—	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi.	6	5	2	—	2	1	6	2	4	—
85	Epilessia . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	11	8	19	—	10	—	6	3	1	—
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi.	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—
	<b>VII. - Malattie dell'app. circolatorio . . . . .</b>	<b>209</b>	<b>84</b>	<b>323</b>	<b>1</b>	<b>242</b>	<b>46</b>	<b>151</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>—</b>
90	Pericardite . . . . .	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—
91	Endocardite acuta . . . . .	7	6	4	—	1	—	4	—	—	—
92	Endocardite cr., compr. le aff. valv.	46	22	43	—	29	3	28	2	7	—
93	Malattie del miocardio . . . . .	52	22	84	1	73	20	37	4	10	—

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI	PENSIONATI E VETERANI	PROPRIETARI E BENESTANTI	STUDENTI	ATTENDENTI A CASA	DISOCCUPATI, INVALIDI, RICOVERATI, ECC.	PROFESSIONI IGNOTE	MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO							
							Tot.	F	M F								
<b>6162</b>	<b>546</b>	<b>18977</b>	<b>4180</b>	<b>12783</b>	<b>3642</b>	<b>1303</b>	<b>189</b>	<b>160044</b>	<b>160044</b>	<b>20142</b>	<b>7302</b>	<b>344</b>	<b>109</b>	<b>217170</b>	<b>211021</b>	<b>428191</b>	
<b>1320</b>	<b>225</b>	<b>1031</b>	<b>198</b>	<b>707</b>	<b>230</b>	<b>666</b>	<b>116</b>	<b>18146</b>	<b>18146</b>	<b>1328</b>	<b>445</b>	<b>86</b>	<b>25</b>	<b>24609</b>	<b>24294</b>	<b>49903</b>	
<b>55</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>1058</b>	<b>1058</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1178</b>	<b>1475</b>	<b>2653</b>	1, 2
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3	3
—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	1	—	—	1	16	17	33	7
—	—	2	—	—	—	—	—	15	15	—	—	—	—	25	20	45	8
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	3	4	9
—	—	—	2	1	2	2	2	27	27	1	—	—	—	37	47	84	10
<b>126</b>	<b>12</b>	<b>279</b>	<b>65</b>	<b>266</b>	<b>96</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>2615</b>	<b>2615</b>	<b>268</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3456</b>	<b>3508</b>	<b>6964</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>150</b>	<b>13</b>
<b>856</b>	<b>161</b>	<b>437</b>	<b>66</b>	<b>189</b>	<b>48</b>	<b>406</b>	<b>81</b>	<b>9969</b>	<b>9969</b>	<b>460</b>	<b>117</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>13475</b>	<b>13179</b>	<b>26654</b>	<b>23</b>
<b>149</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>130</b>	<b>20</b>	<b>2286</b>	<b>2286</b>	<b>184</b>	<b>67</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>2634</b>	<b>3163</b>	<b>5797</b>	dal 24 al 32
<b>40</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>695</b>	<b>313</b>	<b>1008</b>	<b>34</b>
<b>43</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>216</b>	<b>105</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>1172</b>	<b>1230</b>	<b>2402</b>	<b>36</b>
<b>10</b>	<b>—</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>493</b>	<b>253</b>	<b>746</b>	<b>38</b>
<b>1</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>88</b>	<b>78</b>	<b>166</b>	dal 39 al 42
<b>39</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>125</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1251</b>	<b>943</b>	<b>2194</b>	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
<b>592</b>	<b>54</b>	<b>1936</b>	<b>460</b>	<b>1307</b>	<b>491</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>15530</b>	<b>15530</b>	<b>1066</b>	<b>373</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>17542</b>	<b>19747</b>	<b>37289</b>	
<b>567</b>	<b>42</b>	<b>1879</b>	<b>439</b>	<b>1258</b>	<b>472</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>14686</b>	<b>14686</b>	<b>1041</b>	<b>361</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>17115</b>	<b>18650</b>	<b>35765</b>	dal 45 al 53
<b>25</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>427</b>	<b>1097</b>	<b>1524</b>	54, 55
<b>131</b>	<b>12</b>	<b>450</b>	<b>124</b>	<b>425</b>	<b>120</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>3606</b>	<b>3606</b>	<b>316</b>	<b>137</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3632</b>	<b>4671</b>	<b>8303</b>	
<b>22</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>813</b>	<b>937</b>	<b>1750</b>	<b>56</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>120</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>531</b>	<b>834</b>	<b>1365</b>	57, 58
<b>91</b>	<b>4</b>	<b>322</b>	<b>80</b>	<b>323</b>	<b>89</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>1862</b>	<b>1862</b>	<b>105</b>	<b>33</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1963</b>	<b>2273</b>	<b>4236</b>	<b>59</b>
—	—	2	—	1	1	—	—	49	49	14	8	—	—	53	67	120	dal 60 al 64
—	—	7	6	7	6	1	1	228	228	9	3	—	—	72	308	380	66
—	—	13	4	8	2	7	3	188	188	16	6	—	—	200	252	452	65, 67, 68, 69
<b>55</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>989</b>	<b>1031</b>	<b>2020</b>	
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>294</b>	<b>415</b>	<b>709</b>	<b>71</b>
<b>46</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<					

Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	INSEGNANTI		PROFESSIONI LIBERALI		ARTI SANITARIE		ARTI BELLE		UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE, DI TERRA, DI MARE E D'ARIA	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris.	35	2	70	—	57	5	20	1	9	—
95	Altre malattie del cuore . . . . .	32	20	42	—	30	5	23	1	7	—
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	4	1	9	—	4	—	3	1	2	—
97, 98	Arteriosclerosi (a) e cangrena . .	24	10	51	—	41	11	30	—	5	—
dal 99 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio.	8	1	18	—	6	1	6	—	3	—
	<b>VIII. - Malattie dell'app. respiratorio .</b>	<b>164</b>	<b>86</b>	<b>234</b>	<b>1</b>	<b>157</b>	<b>26</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>—</b>
106	Bronchiti . . . . .	15	7	27	—	13	4	15	—	2	—
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	126	69	162	1	126	17	106	5	31	—
110	Pleuriti . . . . .	5	2	11	—	5	2	7	1	3	—
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	18	8	34	—	13	3	12	—	9	—
	<b>IX. - Malattie dell'apparato digerente.</b>	<b>99</b>	<b>42</b>	<b>143</b>	<b>2</b>	<b>86</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>—</b>
117	Ulcera dello stom. e del duodeno.	19	3	20	—	19	3	14	—	8	—
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre).	11	6	11	1	15	4	10	1	6	—
121	Appendicite . . . . .	13	5	21	—	9	—	6	—	6	—
122	Ernia, occlusione intestinale . .	17	9	18	1	8	2	6	1	6	—
124	Cirrosi del fegato . . . . .	14	4	31	—	15	1	8	—	3	—
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari (b).	11	7	18	—	10	2	3	—	4	—
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	14	8	24	—	10	3	6	—	6	—
	<b>X. - Mal. dell'app. urinario e genitale.</b>	<b>79</b>	<b>41</b>	<b>164</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>—</b>
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	56	33	96	1	62	10	37	2	9	—
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c). .	5	3	12	—	3	—	3	—	3	—
134	Calcolosi delle vie urinarie . . .	1	—	10	—	3	1	1	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori.	7	2	14	—	8	—	5	—	2	—
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	—	—	4	—	2	—	1	—	—	—
137	Malattie della prostata . . . . .	7	—	27	—	14	—	8	—	2	—
138, 139	Malattie degli organi genitali (d).	3	3	1	—	1	1	—	—	—	—
	<b>XI. - Mal. della gravid., parto e puerp.</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza . . .	3	3	—	—	—	—	1	1	—	—
144	Emorragia puerperale . . . . .	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	13	13	—	—	1	1	—	—	—	—
146, 147	Tossicemia della gravidanza, ecc. (e).	7	7	1	1	—	—	—	—	—	—
148, 149, 150	Altre malattie puerperali . . . . .	6	6	—	—	1	1	1	1	—	—
	<b>XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>—</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	6	3	17	—	10	1	2	—	2	—
	<b>XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f)	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—
	<b>XIV. - Vizi di conformazione congeniti.</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
157	Vizi di conformazione congeniti .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	<b>XVI. - Senilità.</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>—</b>
162	Senilità . . . . .	32	21	50	—	34	15	22	1	12	—
	<b>XVII. - Morti violente e accidentali.</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>82</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>—</b>
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	22	8	33	3	17	1	16	2	14	—
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	1	1	1	—	2	1	—	—	1	—
dal 176 al 194	Morti accidentali . . . . .	26	6	48	—	22	2	22	1	60	—
195	Altre morti violente (g) . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
196, 197	Ferite di guerra (h) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Esecuzione giudiziaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>XVIII. - Cause di morte non determinate</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>—</b>
199, 200	Morte improv. e cause non specificate o mal definite. . . . .	12	7	24	—	13	—	11	—	5	—

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacini e degli ureteri (non comprese le malattie dei cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (h) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI	PENSIONATI E VETERANI	PROPRIETARI E BENESTANTI	STUDENTI	ATTENDENTI A CASA	DISOCCUPATI, INVALIDI, RICOVERATI, ECC.	PROFESSIONI IGNOTE	MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO							
							Tot.	F	M F								
190	8	321	44	250	55	—	—	996	936	73	18	1	—	2505	1264	3769	94
130	10	679	186	416	152	10	—	7113	7113	833	338	18	7	6759	9280	16039	95
32	—	54	3	32	9	1	—	162	162	22	6	—	—	514	210	724	96
132	1	989	198	634	180	—	—	5201	5201	1234	430	3	—	7581	6904	14485	97, 98
31	2	102	14	73	25	2	—	637	637	60	26	—	—	858	811	1659	dal 99 al 103
830	44	3007	689	2854	618	159	14	24146	24146	2926	1028	55	23	36825	31967	68792	
66	—	577	143	343	95	10	—	4620	4620	721	272	6	3	5608	6141	11749	106
603	36	2028	467	1447	466	115	9	17061	17061	1883	669	40	15	26169	22589	48758	107, 108, 109
35	2	81	10	58	11	18	3	657	657	63	14	3	2	1200	835	2035	110
126	6	321	49	206	46	16	2	1803	1803	259	73	6	3	3848	2402	6250	104, 105, dal 111 al 114
513	33	1097	177	850	230	107	12	8587	8587	829	231	24	8	15355	11185	26540	
116	1	116	13	93	16	5	—	519	519	42	12	—	—	2356	697	3053	117
34	3	187	48	139	46	8	—	2191	2191	368	121	4	1	2825	2919	5744	120
76	7	40	5	50	19	59	8	603	603	23	3	3	—	1225	853	2078	121
49	5	184	30	147	43	7	—	1392	1392	125	25	6	—	2219	1753	3972	122
107	4	329	25	199	23	—	—	1203	1203	122	25	4	—	3675	1515	5190	124
63	4	127	34	112	52	4	—	1435	1435	71	25	3	3	1224	1785	3009	125, 126, 127
68	9	114	22	110	31	24	4	1239	1239	78	20	4	4	1831	1663	3494	115, 116, 118, 123, 128, 129
384	21	1288	173	937	205	32	5	6933	6933	958	253	11	3	11692	8959	20651	
278	15	767	144	585	173	24	4	5978	5978	611	227	7	2	7096	7726	14822	130, 131, 132
18	2	61	19	44	14	5	—	356	356	29	4	2	1	506	449	955	133
13	—	21	2	33	5	—	—	126	126	10	—	—	—	348	158	506	134
21	—	113	4	89	9	2	—	206	206	105	19	—	—	1074	270	1344	135
11	—	24	—	14	1	—	—	5	5	20	1	1	—	239	7	246	136
38	—	296	—	168	—	—	—	—	—	179	—	1	—	2405	—	2405	137
5	4	6	4	4	3	1	1	262	262	4	2	—	—	24	349	373	138, 139
14	14	—	—	19	19	2	2	2297	2297	—	—	3	3	—	2881	2881	
2	2	—	—	3	3	1	1	167	167	—	—	—	—	—	206	206	141, 142, 143
—	—	—	—	4	4	—	—	399	399	—	—	—	—	—	501	501	144
7	7	—	—	2	2	1	1	939	939	—	—	2	2	—	1182	1182	140, 145
3	3	—	—	4	4	—	—	461	461	—	—	—	—	—	573	573	146, 147
2	2	—	—	6	6	—	—	331	331	—	—	1	1	—	419	419	148, 149, 150
46	4	67	8	45	11	12	1	458	458	44	12	1	—	989	601	1590	
46	4	67	8	45	11	12	1	458	458	44	12	1	—	989	601	1590	151, 152, 153
11	1	18	4	5	—	4	—	126	126	17	4	6	2	315	162	477	
11	1	18	4	5	—	4	—	126	126	17	4	6	2	315	162	477	154, 155, 156
2	—	—	—	—	—	3											

TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1936, per gruppi di età da 15 anni in poi,

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE - GRUPPI DI ETÀ, AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE, INDUSTRIALI, COMMERCianti, VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERCANTI VARIE E NON SPECIFICATE, ESERCENTI, COMMISSIONARI RAPPRESENTANTI, MINATORI, CAVATORI, ECC., FALEGNAMI, VERNICIATORI, ECC. Rows include Tubercolosi, Cancrid altri tumori maligni, Diabete mellito, Emorragia, embolia e trombosi cerebrale, Malattie dell'apparato circol.

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns: ADDETTI ALLA MACELLAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARNI, ADDETTI AI FORNI E PASTIFICI, ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL LATTE E ALL'INDUSTRIA ALIMENTARI, CONCIATORI, FELLAI, CALZOLAI, GUANTAI, ECC., METALLURGICI, MECCANICI, ELETTRICISTI, ECC., CAUSE DI MORTE - GRUPPI DI ETÀ. Rows include Tubercolosi, Cancrid altri tumori maligni, Diabete mellito, Emorragia, embolia e trombosi cerebrale, Malattie dell'apparato circol.

Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1936, per gruppi di età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE		INDUSTRIALI, COMMERCianti		VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERCI VARIE E NON SPECIFICATE		ESERCENTI		COMMISSIONARI RAPPRESENTANTI		MINATORI, CAVATORI, ECC.		FALEGNAMI, VERNICIATORI, ECC.	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		<p><i>dal 107 al 109 Polmoniti . . . . .</i> 15459 2814 639 36 380 42 130 19 165 2 143 — 619 12</p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . . 358 67 3 — 4 — 1 — 1 — 2 — 11 —</p> <p>» 20 » 24 » . . . . . 570 119 1 — 3 — — — 2 — 1 — 4 —</p> <p>» 25 » 29 » . . . . . 460 116 9 — 6 1 2 — 2 — 8 —</p> <p>» 30 » 34 » . . . . . 525 117 15 2 18 — 4 1 3 — 8 —</p> <p>» 35 » 39 » . . . . . 528 122 21 — 25 — 5 1 6 — 13 —</p> <p>» 40 » 44 » . . . . . 518 108 35 1 18 2 5 — 6 — 9 —</p> <p>» 45 » 49 » . . . . . 684 133 52 1 30 4 10 1 16 — 14 —</p> <p>» 50 » 54 » . . . . . 832 155 48 1 30 4 9 — 17 —</p> <p>» 55 » 59 » . . . . . 1140 190 64 6 39 6 14 3 17 — 19 —</p> <p>» 60 » 64 » . . . . . 1489 257 54 1 43 3 24 7 18 — 13 —</p> <p>» 65 » 69 » . . . . . 1983 336 92 11 50 6 13 1 18 — 11 —</p> <p>» 70 » 74 » . . . . . 2420 447 93 3 48 3 21 4 18 1 13 —</p> <p>» 75 » 79 » . . . . . 2151 303 82 6 43 9 12 — 18 6 —</p> <p>» 80 e più . . . . . 1801 290 70 4 23 4 10 1 22 — 6 —</p>													

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	ADDETTI ALLA MACELLAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARNI		ADDETTI AI FORNI E PASTIFICI		ADDETTI ALLA LAVORAZ. DEL LATTE E ALL'INDUSTR. ALIMENTARI		CONCIATORI, PELLAI		CALZOLAI, GUANTAI, ECC.		METALLURGICI		MECCANICI, ELETTRICISTI, ECC.	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	<p><i>dal 107 al 109 Polmoniti</i> 37 — 252 7 19 — 11 1 453 5 45 — 795 8</p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . . 2 — 5 — — — — — 9 — 2 — 38 1</p> <p>» 20 » 24 » . . . . . 1 — 8 — — — — — 18 — 1 — 51 2</p> <p>» 25 » 29 » . . . . . 3 — 10 1 — — — — 17 1 5 — 33 2</p> <p>» 30 » 34 » . . . . . 4 — 14 — — — — — 19 1 3 — 56 —</p> <p>» 35 » 39 » . . . . . 1 — 14 — — — — — 21 — 12 — 78 —</p> <p>» 40 » 44 » . . . . . 6 — 12 — — — — — 23 1 3 — 76 1</p> <p>» 45 » 49 » . . . . . 3 — 13 1 1 1 — — 32 1 5 — 72 1</p> <p>» 50 » 54 » . . . . . 3 — 13 1 1 1 — — 24 — 1 — 75 —</p> <p>» 55 » 59 » . . . . . 5 — 25 — — — — — 43 — 4 — 60 —</p> <p>» 60 » 64 » . . . . . 3 — 32 2 2 2 — — 35 — 3 — 61 1</p> <p>» 65 » 69 » . . . . . 3 — 30 — — — — — 51 — 3 — 61 —</p> <p>» 70 » 74 » . . . . . 2 — 30 2 3 3 — — 63 1 2 — 53 —</p> <p>» 75 » 79 » . . . . . 1 — 21 — — — — — 58 — — — 39 —</p> <p>» 80 e più . . . . . 1 — 25 1 1 — — — 40 — — — 42 —</p>													

<p><i>dal 104 al 114 Malattie dell'apparato respir.</i> 21629 4059 874 45 544 61 183 29 236 2 211 — 898 15</p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . . 410 83 3 — 4 — 1 — 1 — 2 — 11 —</p> <p>» 20 » 24 » . . . . . 657 131 2 — 6 — 1 — 1 — 4 — 38 —</p> <p>» 25 » 29 » . . . . . 535 140 12 — 10 2 3 1 3 10 — 36 —</p> <p>» 30 » 34 » . . . . . 614 135 20 2 21 5 1 5 — 12 — 40 1</p> <p>» 35 » 39 » . . . . . 628 140 28 — 30 1 8 2 9 15 — 40 1</p> <p>» 40 » 44 » . . . . . 635 132 43 1 26 2 5 — 11 — 14 —</p> <p>» 45 » 49 » . . . . . 845 161 65 1 38 5 10 1 28 — 19 —</p> <p>» 50 » 54 » . . . . . 1062 199 71 1 42 6 11 — 27 — 25 —</p> <p>» 55 » 59 » . . . . . 1480 246 81 8 51 8 17 4 22 — 25 —</p> <p>» 60 » 64 » . . . . . 2059 373 85 3 55 3 29 7 22 — 21 —</p> <p>» 65 » 69 » . . . . . 2753 509 124 12 73 9 24 5 28 — 22 —</p> <p>» 70 » 74 » . . . . . 3462 653 125 5 81 7 30 6 25 1 20 —</p> <p>» 75 » 79 » . . . . . 3311 613 111 7 66 12 21 — 23 — 10 —</p> <p>» 80 e più . . . . . 3178 544 104 5 41 6 18 2 31 — 12 —</p>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 130 al 132 Nefriti</i> 3548 826 320 4 143 14 53 7 64 — 20 — 173 4</p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . . 62 15 — — — — — — — 6 —</p> <p>» 20 » 24 » . . . . . 73 23 — — 1 — — — — 6 —</p> <p>» 25 » 29 » . . . . . 108 37 5 — 1 — — — — 5 —</p> <p>» 30 » 34 » . . . . . 85 27 7 — 5 — — — — 8 —</p> <p>» 35 » 39 » . . . . . 101 30 12 1 4 — — — — 4 —</p> <p>» 40 » 44 » . . . . . 94 29 14 1 10 1 1 3 — 8 —</p> <p>» 45 » 49 » . . . . . 122 36 22 1 8 1 4 4 — 11 —</p> <p>» 50 » 54 » . . . . . 159 49 29 — 16 3 4 — 3 — 14 —</p> <p>» 55 » 59 » . . . . . 239 65 33 — 16 2 4 — 6 — 16 1</p> <p>» 60 » 64 » . . . . . 368 91 41 — 18 3 10 2 12 — 4 — 20 1</p> <p>» 65 » 69 » . . . . . 483 101 44 1 15 1 9 2 9 — 2 — 20 —</p> <p>» 70 » 74 » . . . . . 627 114 49 — 25 2 7 1 11 — 5 — 24 —</p> <p>» 75 » 79 » . . . . . 572 115 28 — 14 1 7 1 5 — 2 — 13 2</p> <p>» 80 e più . . . . . 455 94 36 — 10 — — — — 2 — 18 —</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 176 al 194 Morti accidentali.</i> 3415 356 168 3 80 5 25 1 51 — 167 — 221 —</p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . . 214 26 3 — 2 — — — — 8 — 13 —</p> <p>» 20 » 24 » . . . . . 251 24 16 — 8 — — — — 12 — 27 —</p> <p>» 25 » 29 » . . . . . 230 17 14 — 7 — — — — 36 — 29 —</p> <p>» 30 » 34 » . . . . . 199 18 23 — 6 — — — — 18 — 17 —</p> <p>» 35 » 39 » . . . . . 190 15 15 — 8 — — — — 19 — 17 —</p> <p>» 40 » 44 » . . . . . 192 17 15 — 10 1 3 — — 19 — 17 —</p> <p>» 45 » 49 » . . . . . 213 20 22 — 5 — — — — 13 — 18 —</p> <p>» 50 » 54 » . . . . . 268 30 16 — 9 2 2 — — 16 — 10 —</p> <p>» 55 » 59 » . . . . . 303 24 13 — 6 — — — — 5 — 6 —</p> <p>» 60 » 64 » . . . . . 332 32 9 1 8 1 3 — — 9 — 9 —</p> <p>» 65 » 69 » . . . . . 329 32 8 1 4 — — — — 3 — 11 —</p> <p>» 70 » 74 » . . . . . 303 39 5 — 3 — — — — 5 — 6 —</p> <p>» 75 » 79 » . . . . . 212 29 5 — 3 1 — — — — 3 — 5 —</p> <p>» 80 e più . . . . . 179 33 4 — 1 — — — — 3 — 4 —</p>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 104 al 114 Malattie dell'apparato respir.</i> 51 — 355 10 23 — 23 1 666 6 52 — 1068 10</p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . . 3 — 6 — — — — — 11 — 2 — 48 1</p> <p>» 20 » 24 » . . . . . 2 — 9 — — — — — 26 — 1 — 61 3</p> <p>» 25 » 29 » . . . . . 5 — 12 1 — — — — 21 2 5 — 44 2</p> <p>» 30 » 34 » . . . . . 5 — 15 — — — — — 24 1 4 — 70 —</p> <p>» 35 » 39 » . . . . . 1 — 16 — — — — — 28 — 13 — 96 1</p> <p>» 40 » 44 » . . . . . 8 — 23 — — — — — 36 1 3 — 98 1</p> <p>» 45 » 49 » . . . . . 4 — 19 — — — — — 43 1 6 — 99 1</p> <p>» 50 » 54 » . . . . . 3 — 23 1 1 1 — — 36 — 4 — 104 —</p> <p>» 55 » 59 » . . . . . 6 — 35 — — — — — 60 — 5 — 78 —</p> <p>» 60 » 64 » . . . . . 5 — 42 2 2 2 — — 50 — 3 — 86 1</p> <p>» 65 » 69 » . . . . . 4 — 40 — — — — — 72 — 3 — 82 —</p> <p>» 70 » 74 » . . . . . 2 — 42 3 3 3 — — 95 1 2 — 78 —</p> <p>» 75 » 79 » . . . . . 2 — 29 — — — — — 94 — — — 61 —</p> <p>» 80 e più . . . . . 3 — 44 3 3 — — — 70 — — — 63 —</p>														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 130 al 132 Nefriti</i> 14 — 59 6 7 — 6 — 170 4 5 — 167 2</p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . . — — 1 — — — — — 2 — — 6 —</p> <p>» 20 » 24 » . . . . . 1 — 1 — — — — — 6 2 — 2 —</p> <p>» 25 » 29 » . . . . . 1 — 3 1 — — — — 6 — 1 — 9 —</p> <p>» 30 » 34 » . . . . . 1 — 3 — — — — — 6 — — — 9 —</p> <p>» 35 » 39 » . . . . . — — 3 — — — — — 5 — — — 14 —</p> <p>» 40 » 44 » . . . . . — — 3 1 — — — — 4 — — 1 — 5 1</p> <p>» 45 » 49 » . . . . . — — 4 — — — — — 8 — — 1 — 12 —</p> <p>» 50 » 54 » . . . . . 1 — 4 1 — — — — 13 1 — — 19 1</p> <p>» 55 » 59 » . . . . . 2 — 3 1 — — — — 14 — — — 13 —</p> <p>» 60 » 64 » . . . . . 2 — 7 1 2 — — — 23 — 3 — 20 —</p> <p>» 65 » 69 » . . . . . 2 — 8 — — — — — 20 — — — 24 —</p> <p>» 70 » 74 » . . . . . 2 — 9 1 — — — — 31 — — — 16 —</p> <p>» 75 » 79 » . . . . . 3 — 5 — — — — — 21 — — — 15 —</p> <p>» 80 e più . . . . . 1 — 5 — — — — — 11 — — — 3 —</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 176 al 194 Morti accidentali</i> 21 — 94 1 7 — 3 — 93 — 31 — 475 3</p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . . 2 — 9 — — 2 — — — — 3 — 2 — 62 —</p> <p>» 20 » 24 » . . . . . 8 — 13 — — 1 — — — — 12 — 4 — 69 1</p> <p>» 25 » 29 » . . . . . — — 14 1 1 — — — — 9 — 6 — 67 —</p> <p>» 30 » 34 » . . . . . 2 — 7 — — — — — 7 — 6 — 56 —</p> <p>» 35 » 39 » . . . . . 3 — 6 — — — — — 8 — 2 — 52 —</p> <p>» 40 » 44 » . . . . . 1 — 7 — — — — — 3 — 1 — 44 1</p> <p>» 45 » 49 » . . . . . 1 — 2 — — — — — 8 — 3 — 37 —</p> <p>» 50 » 54 » . . . . . — — 10 — — — — — 5 — 4 — 35 1</p> <p>» 55 » 59 » . . . . . — — 9 — — — — — 9 — — — 21 —</p> <p>» 60 » 64 » . . . . . 3 — 5 — — — — — 5 — 1 — 9 —</p> <p>» 65 » 69 » . . . . . — — 11 — — — — — 6 — — — 11 —</p> <p>» 70 » 74 » . . . . . 1 — 2 — — — — — 9 — 2 — 4 —</p> <p>» 75 » 79 » . . . . . — — 3 — — — — — 6 — — — 5 —</p> <p>» 80 e più . . . . . — — 4 — — — — — 3 — — — 3 —</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1936, per gruppi di età da 15 anni in poi,

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOBIOLOGICO	CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	ARGENTIERI, OREFICI, ECC.		ASFALTISTI, FORNACIAI, ECC.		CERAMISTI, VETRAI, ECC.		MURATORI, IMBANCHINI, ECC.		MANOVALI, BRACCIANI, ECC.		ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE		ADDETTI A MANIFATTURE TESSILI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		<p><i>dal 107 al 109 Polmoniti . . . . .</i></p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . .</p> <p>» 20 » 24 » . . . . .</p> <p>» 25 » 29 » . . . . .</p> <p>» 30 » 34 » . . . . .</p> <p>» 35 » 39 » . . . . .</p> <p>» 40 » 44 » . . . . .</p> <p>» 45 » 49 » . . . . .</p> <p>» 50 » 54 » . . . . .</p> <p>» 55 » 59 » . . . . .</p> <p>» 60 » 64 » . . . . .</p> <p>» 65 » 69 » . . . . .</p> <p>» 70 » 74 » . . . . .</p> <p>» 75 » 79 » . . . . .</p> <p>» 80 e più . . . . .</p>													

CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL VESTIARIO		ADDETTI ALL'ARREDAMENTO		INDUSTRIE CHIMICHE		ADDETTI AI LABORATORI E MANIFATTURA TABACCHI		ADDETTI ALLE INDUSTRIE POLIGRAFICHE		ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA CARTA		OPERAI NON SPECIFICATI		
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	
	<p><i>dal 107 al 109 Polmoniti</i></p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . .</p> <p>» 20 » 24 » . . . . .</p> <p>» 25 » 29 » . . . . .</p> <p>» 30 » 34 » . . . . .</p> <p>» 35 » 39 » . . . . .</p> <p>» 40 » 44 » . . . . .</p> <p>» 45 » 49 » . . . . .</p> <p>» 50 » 54 » . . . . .</p> <p>» 55 » 59 » . . . . .</p> <p>» 60 » 64 » . . . . .</p> <p>» 65 » 69 » . . . . .</p> <p>» 70 » 74 » . . . . .</p> <p>» 75 » 79 » . . . . .</p> <p>» 80 e più . . . . .</p>														

<p><i>dal 104 al 114 Malattie dell'apparato respir.</i></p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . .</p> <p>» 20 » 24 » . . . . .</p> <p>» 25 » 29 » . . . . .</p> <p>» 30 » 34 » . . . . .</p> <p>» 35 » 39 » . . . . .</p> <p>» 40 » 44 » . . . . .</p> <p>» 45 » 49 » . . . . .</p> <p>» 50 » 54 » . . . . .</p> <p>» 55 » 59 » . . . . .</p> <p>» 60 » 64 » . . . . .</p> <p>» 65 » 69 » . . . . .</p> <p>» 70 » 74 » . . . . .</p> <p>» 75 » 79 » . . . . .</p> <p>» 80 e più . . . . .</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 104 al 114 Malattie dell'apparato respir.</i></p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . .</p> <p>» 20 » 24 » . . . . .</p> <p>» 25 » 29 » . . . . .</p> <p>» 30 » 34 » . . . . .</p> <p>» 35 » 39 » . . . . .</p> <p>» 40 » 44 » . . . . .</p> <p>» 45 » 49 » . . . . .</p> <p>» 50 » 54 » . . . . .</p> <p>» 55 » 59 » . . . . .</p> <p>» 60 » 64 » . . . . .</p> <p>» 65 » 69 » . . . . .</p> <p>» 70 » 74 » . . . . .</p> <p>» 75 » 79 » . . . . .</p> <p>» 80 e più . . . . .</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 130 al 132 Nefriti . . . . .</i></p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . .</p> <p>» 20 » 24 » . . . . .</p> <p>» 25 » 29 » . . . . .</p> <p>» 30 » 34 » . . . . .</p> <p>» 35 » 39 » . . . . .</p> <p>» 40 » 44 » . . . . .</p> <p>» 45 » 49 » . . . . .</p> <p>» 50 » 54 » . . . . .</p> <p>» 55 » 59 » . . . . .</p> <p>» 60 » 64 » . . . . .</p> <p>» 65 » 69 » . . . . .</p> <p>» 70 » 74 » . . . . .</p> <p>» 75 » 79 » . . . . .</p> <p>» 80 e più . . . . .</p>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 130 al 132 Nefriti</i></p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . .</p> <p>» 20 » 24 » . . . . .</p> <p>» 25 » 29 » . . . . .</p> <p>» 30 » 34 » . . . . .</p> <p>» 35 » 39 » . . . . .</p> <p>» 40 » 44 » . . . . .</p> <p>» 45 » 49 » . . . . .</p> <p>» 50 » 54 » . . . . .</p> <p>» 55 » 59 » . . . . .</p> <p>» 60 » 64 » . . . . .</p> <p>» 65 » 69 » . . . . .</p> <p>» 70 » 74 » . . . . .</p> <p>» 75 » 79 » . . . . .</p> <p>» 80 e più . . . . .</p>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 176 al 194 Morti accidentali . . . . .</i></p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . .</p> <p>» 20 » 24 » . . . . .</p> <p>» 25 » 29 » . . . . .</p> <p>» 30 » 34 » . . . . .</p> <p>» 35 » 39 » . . . . .</p> <p>» 40 » 44 » . . . . .</p> <p>» 45 » 49 » . . . . .</p> <p>» 50 » 54 » . . . . .</p> <p>» 55 » 59 » . . . . .</p> <p>» 60 » 64 » . . . . .</p> <p>» 65 » 69 » . . . . .</p> <p>» 70 » 74 » . . . . .</p> <p>» 75 » 79 » . . . . .</p> <p>» 80 e più . . . . .</p>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><i>dal 176 al 194 Morti accidentali</i></p> <p>Da 15 a 19 anni . . . . .</p> <p>» 20 » 24 » . . . . .</p> <p>» 25 » 29 » . . . . .</p> <p>» 30 » 34 » . . . . .</p> <p>» 35 » 39 » . . . . .</p> <p>» 40 » 44 » . . . . .</p> <p>» 45 » 49 » . . . . .</p> <p>» 50 » 54 » . . . . .</p> <p>» 55 » 59 » . . . . .</p> <p>» 60 » 64 » . . . . .</p> <p>» 65 » 69 » . . . . .</p> <p>» 70 » 74 » . . . . .</p> <p>» 75 » 79 » . . . . .</p> <p>» 80 e più . . . . .</p>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1936, per gruppi di età da 15 anni in poi, classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with multiple columns: CAUSE DI MORTE, GRUPPI DI ETÀ, and various professional categories (Cocchieri, Marinai, Addetti alla cura della persona, etc.). Rows include Tuberculosis, Cancer, Diabetes, Hemorrhage, and Heart Disease, with data for age groups from 15-19 to 80+.

Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1936, per gruppi di età da 15 anni in poi,

Table with columns: CAUSE DI MORTE, GRUPPI DI ETÀ, COCCHIERI, CARRETTIERI, ECC., FERROVIARI, TRAMVIARI, CONDU... FERROVIARI, TRAMVIARI, CONDU... MARINAI, BARCAIUOLI, PESCATORI, ECC., ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA, ADDETTI ALLA ACCONCIATURA DELLA PERSONA, ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, GARZONI E CAMERIERI ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI. Rows include age groups (e.g., 15-19, 20-24) and categories like Polmoniti, Malattie dell'apparato respir., Nefriti, Morti accidentali.

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns: FACCHINI, SPAZZINI, CANTONIERI, VENDITORI AMBULANTI, SALTIMBANCHI, VENTURIERI, PERSONALE SUBALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA (escl. gli Uffic.), GUARDIE DI FINANZA E MILIZIA, ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI, CULTO CATTOLICO E ALTRI CULTI, CAUSE DI MORTE, GRUPPI DI ETÀ. Rows include age groups (e.g., 15-19, 20-24) and categories like Polmoniti, Malattie dell'apparato respir., Nefriti, Morti accidentali.

Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1936, per gruppi di età da 15 anni in poi,

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE - GRUPPI DI ETÀ, INSEGNANTI, PROFESSIONI LIBERALI, ARTI SANITARIE, ARTI BELLE, UFFICIALI DI TERRA, DI MARE E D'ARIA, IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI, PENSIONATI E VETERANI. Rows include Tuberculosis, Canceri ed altri tumori maligni, Diabete mellito, Emorragia, embolia e trombosi cerebrale, Malattie dell'apparato circol.

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns: PROPRIETARI E BENESTANTI, STUDENTI, ATTENDENTI A CASA, DISOCCUPATI, INVALIDI, RICOVERATI, ECC., PROFESSIONI IGNOTE, MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI, CAUSE DI MORTE - GRUPPI DI ETÀ. Rows include Tuberculosis, Canceri ed altri tumori maligni, Diabete mellito, Emorragia, embolia e trombosi cerebrale, Malattie dell'apparato circol.

Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1936, per gruppi di età da 15 anni in poi,

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE - GRUPPI DI ETÀ, INSEGNANTI, PROFESSIONI LIBERALI, ARTI SANITARIE, ARTI BELLE, UFFICIALI DI TERRA, DI MARE E D'ARIA, IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI, PENSIONATI E VETERANI. Rows include categories like Polmoniti, Malattie dell'apparato respir., Nefriti, and Morti accidentali.

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns: PROPRIETARI E BENESTANTI, STUDENTI, ATTENDENTI A CASA, DISOCCUPATI, INVALIDI, RICOVERATI, ECC., PROFESSIONI IGNOTE, MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI, CAUSE DI MORTE - GRUPPI DI ETÀ. Rows include categories like Polmoniti, Malattie dell'apparato respir., Nefriti, and Morti accidentali.

TAVOLA 13. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, con distin-

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA		VENEZIO		VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	
	<b>Complesso . . .</b>	<b>48346</b>	<b>1308</b>	<b>17894</b>	<b>309</b>	<b>80101</b>	<b>1732</b>	<b>9692</b>	<b>193</b>	<b>50925</b>	<b>1388</b>	<b>13404</b>	<b>280</b>	<b>41172</b>	<b>1215</b>	<b>35825</b>	<b>779</b>	<b>16430</b>	<b>356</b>	
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	226	—	105	—	584	4	61	—	403	9	49	2	233	1	171	3	91	—	1, 2
3	Tifo petecchiale . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	Morbillo . . . . .	42	—	14	—	62	—	10	—	57	—	117	—	78	—	62	—	72	—	7
8	Scarlattina . . . . .	19	—	4	—	20	—	6	—	26	—	2	—	18	—	24	—	7	—	8
9	Tosse convulsa . . . . .	85	—	49	—	479	—	35	—	319	—	40	—	168	—	179	—	97	—	9
10	Difterite . . . . .	129	9	63	2	558	16	32	—	277	41	53	1	158	14	141	20	103	7	10
11	Influenza . . . . .	1017	2	255	—	1456	1	124	—	906	—	154	—	683	—	516	—	289	—	11
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	2557	6	1144	2	4062	13	731	1	2994	2	1226	2	2118	5	2344	3	628	2	23
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	629	24	330	8	1266	23	211	1	1191	30	290	2	920	15	696	12	298	4	dal 24 al 32
34	Sifilide . . . . .	78	—	47	—	211	—	19	—	90	—	70	—	78	—	74	—	23	—	34
38	Malaria . . . . .	7	—	3	—	17	—	—	—	30	—	7	—	14	—	16	—	5	—	38
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre mal. infettive e parassitarie	495	6	210	2	1072	15	115	2	852	9	166	3	711	11	567	7	231	2	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	4154	285	1667	44	6645	366	800	39	3908	216	998	62	3945	232	3817	144	1025	49	dal 45 al 53
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	200	87	85	18	263	89	22	4	169	54	39	6	127	61	123	23	45	12	54, 55
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	134	—	60	—	153	—	23	—	151	—	33	—	113	—	93	—	39	—	57, 58
59	Diabete mellito . . . . .	392	6	271	1	527	9	55	—	339	3	121	2	316	7	360	7	142	2	59
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	76	—	25	—	92	—	22	—	57	—	19	—	54	—	32	—	31	—	75
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre mal. gener. e avvel. cronici . . . . .	623	13	239	1	1028	17	126	2	795	13	141	1	568	7	435	3	209	1	56, dal 60 al 74, 76, 77
80, 83	Atassia locom. e paral. progr. alien.	147	—	78	—	193	2	10	—	77	—	48	—	81	—	68	—	11	—	80, 83
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	5106	5	1875	—	8093	2	807	—	4843	1	747	—	4927	—	4267	—	2502	—	82
78, 79, 81, dal 84 all'89	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c) . . . . .	921	29	334	6	1817	50	200	2	1056	46	285	13	842	37	728	24	468	6	78, 79, 81, dal 84 all'89
dal 90 al 95	Malattie del cuore . . . . .	8012	9	2859	—	10745	2	1537	—	6300	1	1373	—	4968	1	4296	—	1832	1	dal 90 al 95
dal 96 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio . . . . .	1676	18	567	3	2151	25	231	4	1983	18	349	3	1568	15	1255	7	481	3	dal 96 al 103
106	Bronchiti . . . . .	1338	1	405	—	1987	1	268	—	1207	—	331	—	999	—	1026	—	505	—	106
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	6370	3	2404	—	11953	6	1201	—	6772	3	1693	2	5549	—	4692	—	1982	—	107, 108, 109
104, 105, dal 110 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc. . . . .	909	70	382	14	1417	103	180	4	1012	68	278	8	674	54	589	35	268	15	104, 105, dal 110 al 114
119, 120	Enteriti . . . . .	1322	2	370	2	5852	5	333	—	2101	7	662	—	1179	3	867	2	661	1	119, 120
121	Appendicite . . . . .	352	141	91	26	473	213	54	29	275	177	58	27	272	155	195	75	90	59	121
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari . . . . .	990	68	359	11	1311	65	174	8	697	65	166	14	628	52	535	34	239	16	dal 124 al 127
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente. . . . .	1145	287	504	103	1656	374	209	50	1162	338	300	63	958	299	867	202	340	104	122, 123, 128, 129
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	1197	2	490	—	2030	2	228	—	1205	1	291	1	873	1	987	—	463	—	130, 131, 132
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urinario. . . . .	568	88	241	12	762	105	96	13	560	99	135	26	476	79	398	43	172	13	dal 133 al 139
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali. . . . .	75	9	35	3	148	20	20	—	81	6	32	2	102	23	58	9	21	3	140, 145
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. gravid., parto e puerp. . . . .	94	24	41	13	177	45	26	7	150	44	39	4	128	47	88	31	50	12	dal 141 al 144, dal 146 al 150
dal 151 al 156	Malattie della pelle, ecc. (d) . . . . .	223	37	105	17	429	67	40	7	355	74	70	16	225	44	209	53	97	19	dal 151 al 156
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (e) . . . . .	1437	8	522	4	3641	16	488	1	3229	19	639	3	2267	12	1459	6	940	5	dal 157 al 161
162	Senilità . . . . .	3191	—	738	—	3374	—	683	—	3078	—	1617	—	2384	—	2117	—	1343	—	162
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	435	4	170	2	453	—	65	1	289	2	175	3	407	2	255	2	87	1	dal 163 al 171
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	50	4	15	2	59	5	11	1	50	4	30	1	32	—	26	2	19	2	dal 172 al 175
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (f) . . . . .	1254	61	478	13	2085	71	365	17	1360	38	486	13	1070	38	866	31	395	16	dal 176 al 198
199, 200	Morte improv. e cause non specificate o mal definite . . . . .	670	—	200	—	800	—	74	—	519	—	75	—	260	—	297	—	129	—	199, 200

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre

Segue: TAVOLA 13. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo le cause di morte, con distin-

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA	
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>9464</b>	<b>234</b>	<b>32497</b>	<b>648</b>	<b>24220</b>	<b>179</b>	<b>59642</b>	<b>559</b>
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	49	—	223	3	179	—	486	1
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo . . . . .	23	—	49	—	160	—	226	—
8	Scarlattina . . . . .	—	—	90	—	25	—	204	—
9	Tosse convulsa . . . . .	21	—	157	—	52	—	273	—
10	Difterite . . . . .	84	11	183	2	150	1	180	2
11	Influenza . . . . .	229	—	552	1	516	—	1253	2
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	410	—	1733	5	702	—	1888	—
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	184	9	570	9	305	1	672	7
34	Sifilide . . . . .	17	—	195	—	52	—	347	1
38	Malaria . . . . .	4	—	50	1	17	—	90	1
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre mal. infettive e parassitarie	136	4	541	5	253	2	720	5
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	487	15	2067	89	743	23	1461	54
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	34	10	116	30	33	6	98	22
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	11	—	57	—	83	—	115	—
59	Diabete mellito . . . . .	68	1	395	12	104	—	336	9
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	10	—	38	—	23	—	31	—
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre mal. gener. e avvel. cronici . . . . .	123	1	374	2	347	4	616	1
80, 83	Atassia locom. e paral. progr. alien.	11	—	87	—	34	—	137	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	1482	—	3393	1	2798	—	4934	—
78, 79, 81, dall'84 all'89	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c).	216	2	804	17	733	2	2215	10
dal 90 al 95	Malattie del cuore . . . . .	1124	—	3431	2	2646	1	6768	1
dal 96 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio . . . . .	248	1	1012	8	587	1	1604	4
106	Bronchiti . . . . .	309	—	724	1	767	—	2060	1
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	1307	1	4606	1	3100	—	11043	2
dal 104, 105, dal 110 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	129	12	562	41	380	9	834	41
119, 120	Enteriti . . . . .	322	1	2313	3	3051	—	6836	—
121	Appendicite . . . . .	60	27	176	84	63	14	175	32
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari . . . . .	96	12	507	29	291	7	712	16
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	207	64	754	171	465	42	1202	134
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	270	2	1054	1	762	—	2483	1
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urinario	101	14	491	54	197	14	543	24
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	22	1	80	5	83	7	109	8
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. gravid., parto e puerp.	33	9	110	14	97	21	198	51
dal 151 al 156	Malattie della pelle, ecc. (d) . . . . .	53	16	235	37	98	8	380	71
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (e) . . . . .	485	4	1669	3	1321	4	2602	14
162	Senilità . . . . .	688	—	1686	—	2124	—	4001	—
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	68	—	162	—	90	1	211	2
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	13	4	42	3	42	2	124	12
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (f) . . . . .	282	13	920	14	518	9	1087	30
199, 200	Morte improvvis. e cause non specificate o mal definite . . . . .	48	—	379	—	229	—	388	—

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PUGLIE		LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	
	<b>Complesso . . . . .</b>	<b>43037</b>	<b>370</b>	<b>9562</b>	<b>27</b>	<b>25264</b>	<b>120</b>	<b>57447</b>	<b>481</b>	<b>11714</b>	<b>92</b>	<b>589636</b>	<b>10270</b>	
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	294	5	61	—	129	—	438	1	57	—	3839	29	1, 2
3	Tifo petecchiale . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
6	Vaiolo, vaioloide, ecc. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	Morbillo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Scarlattina . . . . .	583	—	138	—	110	—	100	—	63	—	1966	—	8
9	Tosse convulsa . . . . .	19	—	15	—	10	—	35	—	47	—	571	—	9
10	Difterite . . . . .	67	—	30	—	107	—	123	—	91	—	2372	—	10
11	Influenza . . . . .	113	5	23	—	73	—	193	—	58	—	2571	131	11
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1190	—	124	—	464	—	572	—	345	—	10675	6	23
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	1507	1	175	—	660	—	2043	1	934	—	27856	43	dal 24 al 32
34	Sifilide . . . . .	631	4	116	—	259	2	607	7	465	1	9640	159	34
38	Malaria . . . . .	139	2	23	—	92	—	169	—	35	—	1759	5	38
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre mal. infettive e parassitarie	204	—	75	—	167	—	291	—	294	1	1291	3	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	516	7	106	—	363	3	988	13	248	1	8290	97	dal 45 al 53
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	1121	33	209	—	638	9	1902	44	500	7	36087	1711	54, 55
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	58	9	17	—	33	—	126	22	24	8	1612	462	57, 58
59	Diabete mellito . . . . .	61	—	17	—	76	—	108	—	46	—	1373	—	59
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	172	4	27	—	99	1	484	12	80	3	4288	79	75
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre mal. gener. e avvel. cronici . . . . .	13	—	5	—	4	—	15	—	13	—	560	—	56, dal 60 al 74, 76, 77
80, 83	Atassia locom. e paral. progr. alien.	502	—	157	—	392	2	675	—	295	—	7645	69	80, 83
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	52	—	8	—	28	—	65	—	12	—	1147	2	82
78, 79, 81, dall'84 all'89	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c).	3514	—	716	—	1864	—	5182	1	869	—	57919	10	78, 79, 81, dall'84 all'89
dal 90 al 95	Malattie del cuore . . . . .	1220	5	321	—	882	3	966	7	284	2	14292	261	dal 90 al 95
dal 96 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio . . . . .	3556	—	922	—	2520	—	5221	1	1170	—	69280	19	dal 96 al 103
106	Bronchiti . . . . .	760	5	142	—	530	—	1703	6	222	3	17069	124	106
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	1618	—	567	—	1047	—	1635	—	358	—	17151	4	107, 108, 109
dal 104, 105, dal 110 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	8031	1	1460	—	3868	—	8276	1	2312	—	86679	20	dal 104, 105, dal 110 al 114
119, 120	Enteriti . . . . .	592	35	129	2	343	3	815	28	189	8	9682	550	119, 120
121	Appendicite . . . . .	6214	2	1560	—	3441	1	8093	—	1522	—	46699	29	121
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari . . . . .	147	45	17	1	59	6	182	18	28	4	2767	1133	dal 124 al 127
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente.	460	13	95	—	260	1	748	22	229	2	8497	435	dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	771	78	189	12	573	35	1171	120	300	26	12773	2502	130, 131, 132
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urinario	1321	—	267	—	892	1	2242	1	449	—	17504	13	dal 133 al 139
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali.	275	20	64	1	186	5	738	44	134	9	6047	663	140, 145
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. gravid., parto e puerp.	77	6	12	1	59	5	134	8	35	1	1183	117	dal 141 al 144, dal 146 al 150
dal 151 al 156	Malattie della pelle, ecc. (d) . . . . .	131	33	32	4	70	18	183	50	50	4	1700	431	dal 151 al 156
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (e) . . . . .	252	20	43	1	161	7	327	33	75	6	3377	533	dal 157 al 161
162	Senilità . . . . .	2575	5	711	—	1436	3	2817	5	866	1	29104	114	162
dal 163 al 171	Suicidio . . . . .	3202	—	715	—	2475	—	6302	—	1341	—	41059	—	dal 163 al 171
dal 172 al 175	Omicidio . . . . .	145	4	19	—	50	1	257	—	61	1	3399	26	dal 172 al 175
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (f) . . . . .	64	7	27	1	102	7	112	1	43	1	861	59	dal 176 al 198
199, 200	Morte improvvis. e cause non specificate o mal definite . . . . .	672	21	174	1	498	7	928	35	285	3	13723	431	199, 200
		195	—	54	—	244	—	481	—	284	—	5326	—	

delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre

TAVOLA 14. — Morti, durante l'anno 1936, in età da 15 anni in

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
	<b>Complesso . . .</b>	<b>76326</b>	<b>36510</b>	<b>199082</b>	<b>77227</b>
I, 2	Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi . . .	1297	663	1220	714
3	Tifo petecchiale . . . . .	1	—	1	—
7	Morbillo . . . . .	18	4	15	13
8	Scarlattina . . . . .	20	8	24	11
9	Tosse convulsa . . . . .	—	—	1	—
10	Difterite . . . . .	50	28	29	14
11	Influenza . . . . .	1261	633	3374	1302
23	Tubercolosi dell'apparato respiratorio (a) . . .	12478	6334	12185	5661
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi . . . . .	2914	1496	2403	1309
34	Sifilide . . . . .	195	60	642	173
38	Malaria . . . . .	165	45	479	147
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre malattie infettive e parassitarie . . . . .	1300	580	2470	994
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni . . . . .	4122	2494	20799	9017
54, 55	Tumori non maligni (b) . . . . .	339	257	875	595
57, 58	Reumatismo cronico e gotta . . . . .	236	154	567	276
59	Diabete mellito . . . . .	581	280	2402	1088
75	Alcoolismo acuto e cronico . . . . .	144	11	308	40
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre malattie generali e avvelenamenti cronici .	1422	762	2513	1260
80, 83	Atassia locomotrice e paralisi progress. alienati .	271	53	706	112
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebrale . . .	6007	2958	26594	9394
78, 79, 81, dall'84 all'89	Altre malattie del sistema nervoso, ecc. (c) . . .	2532	1099	2844	1164
dal 90 al 95	Malattie del cuore . . . . .	9269	5142	30223	13369
dal 96 al 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio . . .	1875	935	6307	1761
106	Bronchiti . . . . .	1426	771	4632	1704
107, 108, 109	Polmoniti . . . . .	8244	3629	24121	8838
104, 105, dal 110 al 114	Altre malattie dell'app. respir., escl. la tbc. . .	1445	576	4513	1347
119, 120	Enteriti . . . . .	987	508	2441	953
121	Appendicite . . . . .	784	262	1104	462
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari . . . . .	1021	424	5270	1786
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Altre malattie dell'apparato digerente . . . . .	2067	820	5953	1850
130, 131, 132	Nefriti . . . . .	2138	1291	7596	3318
dal 133 al 139	Altre malattie dell'apparato genito-urinario . .	686	189	3335	671
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali . . . . .	116	116	1051	1051
dal 141 al 144	Altre mal. della gravid., parto e puerperio . .	109	109	1572	1572
dal 146 al 150	Malattie della pelle, ecc. (d) . . . . .	524	190	1124	345
dal 151 al 156	Debolezza congenita, ecc. (e) . . . . .	46	20	7	5
dal 157 al 161	Senilità . . . . .	4045	2404	9624	2953
162	Suicidio . . . . .	1216	354	1689	378
dal 163 al 171	Omicidio . . . . .	254	50	441	125
dal 172 al 175	Morte violenta e accidentale (f) . . . . .	3251	490	5177	792
dal 176 al 198	Morte improv. e cause non spec. o mal definite .	870	311	2148	663

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto tura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

poi, classificati secondo le cause di morte, lo stato civile ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VEDOVI		DIVORZIATI		STATO CIVILE IGNOTO		MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI		
	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	M F
	<b>152435</b>	<b>97146</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>296</b>	<b>121</b>	<b>217170</b>	<b>211021</b>	<b>428191</b>
I, 2	134	97	—	—	2	1	1178	1475	2653
3	1	1	—	—	—	—	2	1	3
7	18	4	—	—	—	—	16	17	33
8	20	8	—	—	—	—	25	20	45
9	—	—	—	—	—	—	1	3	4
10	3	3	—	—	—	—	37	47	84
11	5	5	—	—	—	—	3456	3508	6964
23	2325	1573	2	—	2	—	13475	13179	26654
dal 24 al 32	1976	1179	4	1	11	4	2634	3163	5797
34	475	354	—	—	5	4	695	313	1008
38	170	80	—	—	1	—	493	253	746
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	101	61	—	—	1	—	2597	2315	4912
dal 45 al 53	1141	741	—	—	—	—	17115	18650	35765
54, 55	10519	7130	5	2	20	7	427	1097	1524
57, 58	309	244	—	—	1	1	531	834	1365
59	562	404	—	—	—	—	1963	2273	4236
75	1251	904	—	—	—	—	477	76	553
56, dal 60 al 74, 76, 77	101	25	—	—	—	—	2156	2602	4758
80, 83	822	580	1	—	—	—	896	251	1147
82	162	82	2	1	6	3	29840	27957	57797
78, 79, 81, dall'84 all'89	25166	15586	8	4	22	15	3473	2910	6383
dal 90 al 95	1002	643	—	—	5	4	29550	38566	68116
dal 96 al 103	28569	20027	12	5	43	23	8953	7925	16878
106	8688	5224	—	—	8	5	6141	11749	17890
107, 108, 109	5686	3664	2	1	3	1	26169	22589	48758
104, 105, dal 110 al 114	16062	10111	5	1	26	10	5048	3237	8285
119, 120	2323	1312	1	1	1	1	2325	2919	5244
121	2315	1457	—	—	1	1	1225	853	2078
dal 124 al 127	188	128	1	1	1	—	4899	3300	8199
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	1903	1089	—	—	—	—	6406	4113	10519
130, 131, 132	1443	—	—	—	4	—	7096	7726	14822
dal 133 al 139	4775	3110	3	—	10	7	4596	1233	5829
140, 145	1806	373	—	—	2	2	—	1182	1182
dal 141 al 144	13	13	—	—	—	—	—	1699	1699
dal 146 al 150	17	17	—	—	1	1	1304	763	2067
dal 151 al 156	416	226	—	—	3	2	29	27	56
dal 157 al 161	3	2	—	—	—	—	18125	22932	41057
162	27353	17554	1	—	34	21	2506	871	3377
dal 163 al 171	458	138	—	—	14	1	564	205	769
dal 172 al 175	70	30	—	—	1	—	8045	1991	10036
dal 176 al 198	1565	706	4	—	39	3	2735	1805	4540
199, 200	1504	829	—	—	18	2	—	—	—

cellulare delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prema-





TAVOLA 16. — Madri morte durante l'anno 1936, per infezioni puerperali (\*), nei singoli Compartimenti e nel Regno, con distinzione di primipare e pluripare e classificate per gruppi di età.

COMPARTIMENTI		Gruppi di età									TOTALI	
		15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54		55-59
REGNO . . . . .	primipare . . . . .	—	28	110	100	54	24	6	2	—	—	324
	pluripare . . . . .	—	1	39	103	102	101	65	14	—	1	426
	non ind. . . . .	1	10	94	115	109	70	30	4	—	—	433
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>243</b>	<b>318</b>	<b>265</b>	<b>195</b>	<b>101</b>	<b>20</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1183</b>
Piemonte . . . . .	primipare . . . . .	—	—	3	10	4	3	—	—	—	—	20
	pluripare . . . . .	—	—	2	6	12	7	3	—	—	—	30
	non ind. . . . .	—	—	6	7	7	5	—	—	—	—	25
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>75</b>
Liguria . . . . .	primipare . . . . .	—	1	1	2	2	3	—	1	—	—	10
	pluripare . . . . .	—	—	—	1	1	3	3	—	—	—	8
	non ind. . . . .	—	—	1	3	5	6	2	—	—	—	17
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35</b>
Lombardia . . . . .	primipare . . . . .	—	4	10	7	9	2	—	—	—	—	32
	pluripare . . . . .	—	—	6	15	11	11	10	2	—	—	55
	non ind. . . . .	—	—	15	18	14	10	4	—	—	—	61
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>148</b>
Venèzia Trident. . . . .	primipare . . . . .	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	5
	pluripare . . . . .	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	7
	non ind. . . . .	—	—	2	3	2	—	1	—	—	—	8
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>20</b>
Vèneto . . . . .	primipare . . . . .	—	1	7	8	3	—	—	—	—	—	19
	pluripare . . . . .	—	—	1	4	8	12	6	1	—	—	32
	non ind. . . . .	—	2	7	10	7	2	2	—	—	—	30
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>81</b>
Venèzia Giulia e Zara . . . . .	primipare . . . . .	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	9
	pluripare . . . . .	—	—	—	2	1	2	4	—	—	—	9
	non ind. . . . .	—	—	3	5	5	—	1	—	—	—	14
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32</b>
Emilia . . . . .	primipare . . . . .	—	3	8	6	1	1	—	—	—	—	19
	pluripare . . . . .	—	—	3	12	8	7	2	1	—	—	33
	non ind. . . . .	—	3	13	6	12	11	5	—	—	—	50
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>102</b>
Toscana . . . . .	primipare . . . . .	—	1	10	8	1	1	—	—	—	—	21
	pluripare . . . . .	—	—	1	3	5	5	5	1	—	—	20
	non ind. . . . .	—	—	2	8	1	4	2	—	—	—	17
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>58</b>

(\*) Numeri 140 e 145 della Nomenclatura nosologica.

Segue: TAVOLA 16. — Madri morte durante l'anno 1936, per infezioni puerperali (\*), nei singoli Compartimenti e nel Regno, con distinzione di primipare e pluripare e classificate per gruppi di età.

COMPARTIMENTI	Gruppi di età										TOTALE	
	— 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		
Marche . . . . .	primipare . . . . .	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	5
	pluripare . . . . .	—	—	—	2	3	2	1	—	—	—	8
	non ind. . . . .	—	—	1	3	2	2	—	—	—	—	8
	<b>Totale . . . . .</b>	—	—	3	6	5	4	3	—	—	—	21
Umbria . . . . .	primipare . . . . .	—	—	3	3	1	3	1	—	—	—	11
	pluripare . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
	non ind. . . . .	—	2	1	5	1	—	—	—	—	—	9
	<b>Totale . . . . .</b>	—	2	4	8	3	4	1	—	—	—	22
Lazio . . . . .	primipare . . . . .	—	2	6	6	4	2	—	1	—	—	21
	pluripare . . . . .	—	—	1	8	6	5	4	—	—	—	24
	non ind. . . . .	—	—	12	8	10	3	2	—	—	—	35
	<b>Totale . . . . .</b>	—	2	19	22	20	10	6	1	—	—	80
Abruzzi e Molise . . . . .	primipare . . . . .	—	—	11	8	3	—	—	—	—	—	22
	pluripare . . . . .	—	—	3	9	7	11	8	1	—	—	39
	non ind. . . . .	—	1	5	8	3	5	—	—	—	—	22
	<b>Totale . . . . .</b>	—	1	19	25	13	16	8	1	—	—	83
Campania . . . . .	primipare . . . . .	—	1	8	15	5	—	1	—	—	—	30
	pluripare . . . . .	—	—	8	7	10	7	5	—	—	1	38
	non ind. . . . .	—	1	6	10	14	7	1	2	—	—	41
	<b>Totale . . . . .</b>	—	2	22	32	29	14	7	2	—	1	109
Puglie . . . . .	primipare . . . . .	—	2	11	6	3	3	—	—	—	—	25
	pluripare . . . . .	—	—	2	7	6	8	3	2	—	—	28
	non ind. . . . .	1	—	3	6	5	7	2	—	—	—	24
	<b>Totale . . . . .</b>	1	2	16	19	14	18	5	2	—	—	77
Lucania . . . . .	primipare . . . . .	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4
	pluripare . . . . .	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	6
	non ind. . . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
	<b>Totale . . . . .</b>	—	—	5	4	1	2	—	—	—	—	12
Calabria . . . . .	primipare . . . . .	—	—	13	2	4	2	1	—	—	—	22
	pluripare . . . . .	—	1	2	10	7	6	1	—	—	—	27
	non ind. . . . .	—	—	3	1	5	1	—	—	—	—	10
	<b>Totale . . . . .</b>	—	1	18	13	16	9	2	—	—	—	59
Sicilia . . . . .	primipare . . . . .	—	9	7	9	9	1	—	—	—	—	35
	pluripare . . . . .	—	—	7	12	12	8	7	1	—	—	47
	non ind. . . . .	—	—	11	13	15	5	6	2	—	—	52
	<b>Totale . . . . .</b>	—	9	25	34	36	14	13	3	—	—	134
Sardegna . . . . .	primipare . . . . .	—	4	5	2	1	1	1	—	—	—	14
	pluripare . . . . .	—	—	—	2	2	3	1	5	—	—	13
	non ind. . . . .	—	1	3	1	1	—	2	—	—	—	8
	<b>Totale . . . . .</b>	—	5	8	5	4	4	4	5	—	—	35

(\*) Numeri 140 e 145 della Nomenclatura nosologica.

TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERICION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
	<b>Complesso</b> . . . . .	<b>261534</b>	<b>94216</b>	<b>161725</b>	<b>72161</b>	<b>303721</b>	<b>285915</b>	<b>589636</b>
	Gennaio . . . . .	24042	8060	13005	5859	25999	24967	50966
	Febbraio . . . . .	25198	8727	13746	6058	27343	26386	53729
	Marzo . . . . .	25798	9202	13376	6155	27884	26647	54531
	Aprile . . . . .	20970	7519	12184	5632	24146	22159	46305
	Maggio . . . . .	20359	7295	12457	5630	23980	21760	45740
	Giugno . . . . .	19256	6940	13813	5605	23508	22106	45614
	Luglio . . . . .	19583	7197	16030	6510	25583	23737	49320
	Agosto . . . . .	19026	6796	13423	6053	23377	21921	45298
	Settembre . . . . .	18095	6195	11023	5455	21229	19539	40768
	Ottobre . . . . .	22134	7646	12097	6106	24554	23429	47983
	Novembre . . . . .	21127	7985	13466	5997	25037	23538	48575
	Dicembre . . . . .	25947	10654	17105	7101	31081	29726	60807
1 e 2	<i>Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi</i> . . . . .	1661	534	1149	495	1748	2091	3839
	Gennaio . . . . .	98	31	84	29	113	129	212
	Febbraio . . . . .	64	16	60	24	87	77	164
	Marzo . . . . .	78	21	46	23	78	90	168
	Aprile . . . . .	76	17	49	25	86	81	167
	Maggio . . . . .	76	24	58	23	71	110	181
	Giugno . . . . .	83	29	65	27	93	111	204
	Luglio . . . . .	141	50	126	66	181	202	383
	Agosto . . . . .	239	88	204	75	275	331	606
	Settembre . . . . .	265	84	144	67	247	313	560
	Ottobre . . . . .	284	77	134	59	251	303	554
	Novembre . . . . .	157	56	89	45	139	208	347
	Dicembre . . . . .	100	41	90	32	127	136	263
7	<i>Morbillo</i> . . . . .	380	206	1217	163	1046	920	1966
	Gennaio . . . . .	48	15	97	16	91	85	176
	Febbraio . . . . .	59	27	116	21	112	111	223
	Marzo . . . . .	46	21	113	18	121	77	198
	Aprile . . . . .	26	37	140	18	120	101	221
	Maggio . . . . .	36	36	113	13	100	98	198
	Giugno . . . . .	36	19	157	20	109	123	232
	Luglio . . . . .	34	21	193	19	148	119	267
	Agosto . . . . .	10	8	85	14	56	61	117
	Settembre . . . . .	18	—	32	8	30	28	58
	Ottobre . . . . .	13	3	36	1	27	26	53
	Novembre . . . . .	14	7	64	2	53	34	87
	Dicembre . . . . .	40	12	71	13	79	57	136
8	<i>Scarlattina</i> . . . . .	95	121	273	82	293	278	571
	Gennaio . . . . .	7	19	72	18	57	59	116
	Febbraio . . . . .	12	7	44	10	34	39	73
	Marzo . . . . .	7	16	31	3	35	22	57
	Aprile . . . . .	11	8	24	9	30	22	52
	Maggio . . . . .	7	10	22	8	27	20	47
	Giugno . . . . .	7	20	28	10	37	28	65
	Luglio . . . . .	10	9	7	10	18	18	36
	Agosto . . . . .	3	5	8	4	9	11	20
	Settembre . . . . .	5	6	9	2	15	7	22
	Ottobre . . . . .	5	8	9	4	12	14	26
	Novembre . . . . .	8	8	10	1	9	18	27
	Dicembre . . . . .	13	5	9	3	10	20	30

Segue: TAVOLA 17. — **Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.**

NUMERI DELL'ELENCO NOBIOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERICION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
9	<i>Tosse convulsa</i> . . . . .	1175	454	529	214	1018	1354	2372
	Gennaio . . . . .	110	17	32	17	73	103	176
	Febbraio . . . . .	119	39	35	12	110	95	205
	Marzo . . . . .	151	25	49	10	98	137	235
	Aprile . . . . .	104	41	55	19	101	118	219
	Maggio . . . . .	107	44	40	17	106	102	208
	Giugno . . . . .	99	63	68	16	112	134	246
	Luglio . . . . .	118	57	84	25	112	172	284
	Agosto . . . . .	130	45	69	26	104	166	270
	Settembre . . . . .	72	43	30	11	62	94	156
	Ottobre . . . . .	54	27	24	17	41	81	122
	Novembre . . . . .	43	25	13	14	36	59	95
	Dicembre . . . . .	68	28	30	30	63	93	156
10	<i>Difterite</i> . . . . .	1270	511	539	251	1373	1198	2571
	Gennaio . . . . .	161	52	59	30	171	131	302
	Febbraio . . . . .	137	51	52	23	142	121	263
	Marzo . . . . .	137	46	44	16	128	115	243
	Aprile . . . . .	89	39	38	18	91	93	184
	Maggio . . . . .	58	27	36	15	62	74	136
	Giugno . . . . .	40	22	35	13	66	44	110
	Luglio . . . . .	63	19	26	10	67	51	118
	Agosto . . . . .	61	37	27	16	76	65	141
	Settembre . . . . .	73	34	42	12	90	71	161
	Ottobre . . . . .	145	51	44	32	144	128	272
	Novembre . . . . .	129	54	64	37	152	132	284
	Dicembre . . . . .	177	79	72	29	184	173	357
11	<i>Influenza</i> . . . . .	4595	1616	3547	917	5539	5136	10675
	Gennaio . . . . .	553	118	294	58	523	500	1023
	Febbraio . . . . .	850	178	356	104	781	707	1488
	Marzo . . . . .	1108	331	394	195	1062	966	2028
	Aprile . . . . .	494	163	342	134	595	538	1133
	Maggio . . . . .	274	119	275	101	396	373	769
	Giugno . . . . .	119	55	235	58	251	216	467
	Luglio . . . . .	63	29	163	30	146	139	285
	Agosto . . . . .	49	30	154	26	129	130	259
	Settembre . . . . .	33	33	130	17	112	101	213
	Ottobre . . . . .	145	54	164	38	224	177	401
	Novembre . . . . .	200	96	336	55	349	338	687
	Dicembre . . . . .	707	410	704	101	971	951	1922
23	<i>Tubercolosi dell'apparato respi- ratorio (compresi i gangli tra- cheo-bronchiali)</i> . . . . .	14832	5115	4932	2977	13901	13955	27856
	Gennaio . . . . .	1231	433	391	242	1146	1151	2297
	Febbraio . . . . .	1243	432	410	223	1173	1135	2308
	Marzo . . . . .	1353	481	462	267	1328	1240	2568
	Aprile . . . . .	1352	440	431	249	1273	1199	2472
	Maggio . . . . .	1313	432	425	285	1278	1207	2485
	Giugno . . . . .	1215	425	404	243	1132	1155	2287
	Luglio . . . . .	1251	424	420	275	1151	1219	2370
	Agosto . . . . .	1212	396	407	248	1074	1189	2263
	Settembre . . . . .	1083	344	366	221	976	1038	2014
	Ottobre . . . . .	1214	405	387	254	1075	1185	2260
	Novembre . . . . .	1103	413	332	231	1075	1069	2144
	Dicembre . . . . .	1222	490	437	239	1220	1168	2388

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
<i>dal 24 al 32</i>	<i>Ogni altra forma di tubercolosi.</i>	4837	1748	1983	1072	4593	5047	9640
	Gennaio . . . . .	378	135	177	91	362	419	781
	Febbraio . . . . .	393	136	148	71	361	387	748
	Marzo . . . . .	430	155	162	101	399	449	848
	Aprile . . . . .	483	175	152	91	427	474	901
	Maggio . . . . .	478	196	195	118	477	510	987
	Giugno . . . . .	470	156	185	99	456	446	902
	Luglio . . . . .	422	153	216	91	411	471	882
	Agosto . . . . .	380	155	151	96	361	421	782
	Settembre . . . . .	352	111	141	80	336	348	684
	Ottobre . . . . .	372	114	149	83	330	388	718
	Novembre . . . . .	337	121	151	75	322	362	684
	Dicembre . . . . .	342	141	155	85	351	372	723
38	<i>Malaria . . . . .</i>	78	75	553	505	797	494	1291
	Gennaio . . . . .	9	4	37	21	45	26	71
	Febbraio . . . . .	2	4	37	34	51	26	77
	Marzo . . . . .	5	2	29	27	43	20	63
	Aprile . . . . .	5	1	31	21	32	26	58
	Maggio . . . . .	5	5	34	21	39	26	65
	Giugno . . . . .	5	5	27	26	35	23	63
	Luglio . . . . .	4	8	70	61	90	53	143
	Agosto . . . . .	4	14	91	115	137	87	224
	Settembre . . . . .	11	11	81	98	124	77	201
	Ottobre . . . . .	8	10	57	78	99	54	153
	Novembre . . . . .	11	7	35	46	53	46	99
	Dicembre . . . . .	9	4	24	37	49	25	74
<i>dal 45 al 53</i>	<i>Cancro e altri tumori maligni .</i>	22117	7396	4172	2402	17295	18792	36087
	Gennaio . . . . .	1688	575	311	176	1300	1450	2750
	Febbraio . . . . .	1732	578	336	187	1344	1489	2833
	Marzo . . . . .	1838	579	309	195	1402	1519	2921
	Aprile . . . . .	1727	573	336	184	1390	1430	2820
	Maggio . . . . .	1852	612	321	194	1473	1514	2987
	Giugno . . . . .	1876	604	366	206	1450	1602	3052
	Luglio . . . . .	1918	652	384	210	1551	1613	3164
	Agosto . . . . .	1891	621	350	225	1480	1607	3087
	Settembre . . . . .	1882	587	339	202	1396	1614	3010
	Ottobre . . . . .	1991	704	361	225	1581	1700	3281
	Novembre . . . . .	1796	630	371	197	1412	1582	2994
	Dicembre . . . . .	1926	681	380	201	1516	1672	3188
56	<i>Reumatismo articolare acuto . .</i>	1124	378	651	195	1107	1241	2348
	Gennaio . . . . .	117	39	58	13	123	109	232
	Febbraio . . . . .	93	38	46	18	93	97	190
	Marzo . . . . .	105	35	55	12	100	107	207
	Aprile . . . . .	72	38	53	19	76	106	182
	Maggio . . . . .	94	31	62	16	100	103	203
	Giugno . . . . .	98	27	46	13	71	113	184
	Luglio . . . . .	62	22	56	17	77	80	157
	Agosto . . . . .	75	21	49	14	75	84	159
	Settembre . . . . .	87	23	43	12	63	102	165
	Ottobre . . . . .	101	35	50	22	105	103	208
	Novembre . . . . .	108	44	57	13	96	126	222
	Dicembre . . . . .	112	30	76	21	128	111	239

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
79	<i>Meningite semplice.</i> . . . . .	1485	422	700	252	1604	1255	2859
	Gennaio . . . . .	124	32	59	28	135	108	243
	Febbraio . . . . .	107	37	57	22	123	95	223
	Marzo . . . . .	159	33	51	18	146	115	261
	Aprile . . . . .	119	31	54	23	130	97	227
	Maggio . . . . .	116	48	47	25	131	105	236
	Giugno . . . . .	140	43	69	21	155	118	273
	Luglio . . . . .	135	36	73	25	151	118	269
	Agosto . . . . .	154	37	86	18	173	122	295
	Settembre . . . . .	110	32	58	23	122	101	223
	Ottobre . . . . .	114	33	46	23	116	100	216
	Novembre . . . . .	102	27	52	14	111	84	195
	Dicembre . . . . .	105	33	48	12	106	92	198
82	<i>Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale</i> . . . . .	26398	11644	13826	6051	29908	28011	57919
	Gennaio . . . . .	2469	1068	1336	560	2791	2642	5433
	Febbraio . . . . .	2610	1159	1333	623	2979	2746	5725
	Marzo . . . . .	2487	1110	1321	560	2820	2658	5478
	Aprile . . . . .	2244	941	1136	524	2527	2318	4845
	Maggio . . . . .	2085	888	1091	475	2368	2171	4539
	Giugno . . . . .	2070	838	941	395	2176	2068	4244
	Luglio . . . . .	1809	805	936	426	1962	2014	3976
	Agosto . . . . .	1713	779	881	393	1914	1857	3771
	Settembre . . . . .	1728	706	869	401	1901	1803	3704
	Ottobre . . . . .	2271	1047	1113	451	2510	2372	4882
	Novembre . . . . .	2308	1018	1298	579	2708	2495	5203
	Dicembre . . . . .	2604	1285	1571	659	3252	2867	6119
92	<i>Endocardite cronica, comprese le afezioni valvolari</i> . . . . .	10018	4130	6762	2417	9567	13760	23327
	Gennaio . . . . .	894	325	624	230	860	1213	2073
	Febbraio . . . . .	960	424	632	221	883	1354	2237
	Marzo . . . . .	936	422	583	241	870	1312	2182
	Aprile . . . . .	790	334	551	151	757	1069	1826
	Maggio . . . . .	792	335	518	185	758	1072	1830
	Giugno . . . . .	815	305	491	186	729	1068	1797
	Luglio . . . . .	748	287	484	158	709	968	1677
	Agosto . . . . .	698	272	511	157	664	974	1638
	Settembre . . . . .	652	259	437	167	680	835	1515
	Ottobre . . . . .	916	342	537	193	817	1171	1988
	Novembre . . . . .	805	346	616	229	811	1185	1996
	Dicembre . . . . .	1012	479	778	299	1029	1539	2568
dal 90, 91, dal 93 al 95	<i>Altre malattie del cuore</i> . . . . .	25776	6553	9650	3974	20525	25428	45953
	Gennaio . . . . .	2525	610	850	408	1909	2484	4393
	Febbraio . . . . .	2452	637	1015	350	1900	2554	4454
	Marzo . . . . .	2394	641	893	341	1879	2390	4269
	Aprile . . . . .	2125	503	799	356	1745	2038	3783
	Maggio . . . . .	1951	483	745	294	1532	1941	3473
	Giugno . . . . .	1917	469	735	257	1550	1828	3378
	Luglio . . . . .	1828	461	671	282	1470	1772	3242
	Agosto . . . . .	1670	393	587	254	1363	1541	2904
	Settembre . . . . .	1663	382	552	256	1323	1530	2853
	Ottobre . . . . .	2293	598	788	344	1794	2229	4023
	Novembre . . . . .	2275	598	869	329	1855	2216	4071
	Dicembre . . . . .	2683	778	1146	503	2205	2905	5110

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MEDITERRANEA	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
<i>dal 96 al 103</i>	<i>Altre malattie dell'apparato circolatorio . . . . .</i>	8525	2996	3623	1925	9042	8027	17069
	Gennaio . . . . .	842	310	351	190	904	789	1693
	Febbraio . . . . .	807	275	342	207	877	754	1631
	Marzo . . . . .	843	307	333	167	860	790	1650
	Aprile . . . . .	704	246	291	162	712	691	1403
	Maggio . . . . .	704	246	302	147	731	668	1399
	Giugno . . . . .	654	214	296	150	667	647	1314
	Luglio . . . . .	598	195	265	131	649	540	1189
	Agosto . . . . .	623	207	210	129	624	545	1169
	Settembre . . . . .	502	156	225	123	553	453	1006
	Ottobre . . . . .	725	250	297	152	780	644	1424
	Novembre . . . . .	723	265	294	175	761	696	1457
	Dicembre . . . . .	800	325	417	192	924	810	1734
<i>106</i>	<i>Bronchiti . . . . .</i>	6535	2564	6059	1993	8482	8669	17151
	Gennaio . . . . .	761	228	565	178	856	876	1732
	Febbraio . . . . .	853	309	627	213	978	1024	2002
	Marzo . . . . .	867	344	608	237	969	1087	2056
	Aprile . . . . .	539	205	513	193	742	708	1450
	Maggio . . . . .	481	200	452	160	667	626	1293
	Giugno . . . . .	332	153	452	125	547	515	1062
	Luglio . . . . .	277	111	425	132	502	444	946
	Agosto . . . . .	243	99	342	105	394	395	789
	Settembre . . . . .	254	120	297	103	385	389	774
	Ottobre . . . . .	512	175	444	142	609	664	1273
	Novembre . . . . .	561	238	527	163	746	743	1489
	Dicembre . . . . .	855	382	806	212	1087	1198	2285
<i>107, 108, 109</i>	<i>Polmoniti . . . . .</i>	36002	12587	27502	10538	46928	39751	86679
	Gennaio . . . . .	4292	1144	2203	1002	4716	3925	8641
	Febbraio . . . . .	4746	1415	2609	1039	5227	4642	9869
	Marzo . . . . .	4631	1590	2696	1179	5490	4606	10096
	Aprile . . . . .	3025	1145	2302	1041	4120	3393	7513
	Maggio . . . . .	2869	974	2375	1004	4125	3097	7222
	Giugno . . . . .	1966	753	2221	842	3177	2605	5782
	Luglio . . . . .	1475	575	2054	653	2537	2220	4757
	Agosto . . . . .	1391	567	1676	583	2261	1956	4217
	Settembre . . . . .	1370	590	1556	568	2219	1865	4084
	Ottobre . . . . .	2573	777	1709	708	3025	2742	5767
	Novembre . . . . .	2998	1064	2440	821	3898	3425	7323
	Dicembre . . . . .	4666	1993	3661	1088	6133	5275	11408
<i>110</i>	<i>Pleuriti . . . . .</i>	1359	455	640	307	1632	1129	2761
	Gennaio . . . . .	109	36	41	22	110	98	208
	Febbraio . . . . .	121	47	44	25	144	93	237
	Marzo . . . . .	165	48	49	34	167	129	296
	Aprile . . . . .	121	51	63	24	173	86	259
	Maggio . . . . .	124	41	55	25	145	100	245
	Giugno . . . . .	116	43	73	27	144	115	259
	Luglio . . . . .	87	36	61	27	124	87	211
	Agosto . . . . .	86	31	43	23	115	68	183
	Settembre . . . . .	91	15	49	25	120	60	180
	Ottobre . . . . .	93	36	37	23	106	83	189
	Novembre . . . . .	114	30	64	24	131	101	232
	Dicembre . . . . .	132	41	61	28	153	109	262

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
119	<i>Enteriti al disotto di 2 anni.</i>	9653	3314	17395	7545	19800	18107	37907
	Gennaio . . . . .	368	108	550	241	681	586	1267
	Febbraio . . . . .	359	116	490	229	603	591	1194
	Marzo . . . . .	341	121	510	203	635	540	1175
	Aprile . . . . .	345	106	665	301	751	666	1417
	Maggio . . . . .	424	136	1196	374	1122	1008	2130
	Giugno . . . . .	698	315	2598	995	2309	2207	4516
	Luglio . . . . .	1816	810	4393	1515	4477	4057	8534
	Agosto . . . . .	1905	645	2945	1211	3466	3240	6706
	Settembre . . . . .	1692	406	1464	877	2303	2136	4439
	Ottobre . . . . .	896	277	1149	779	1629	1472	3101
	Novembre . . . . .	449	144	772	430	957	898	1855
	Dicembre . . . . .	360	130	663	420	867	706	1573
120	<i>Enteriti e ulcere intestinali (2 anni e oltre).</i>	2166	849	3707	2070	4343	4449	8792
	Gennaio . . . . .	162	53	184	160	297	262	559
	Febbraio . . . . .	138	44	185	102	216	253	469
	Marzo . . . . .	158	65	184	89	239	257	496
	Aprile . . . . .	141	45	188	91	260	205	465
	Maggio . . . . .	124	50	209	107	240	250	490
	Giugno . . . . .	178	60	369	135	354	388	742
	Luglio . . . . .	252	102	629	299	621	661	1282
	Agosto . . . . .	261	127	580	268	595	641	1236
	Settembre . . . . .	256	87	400	224	457	510	967
	Ottobre . . . . .	206	89	314	227	416	420	836
	Novembre . . . . .	134	67	244	194	325	314	639
	Dicembre . . . . .	156	60	221	174	323	288	611
130, 131, 132	<i>Nefriti . . . . .</i>	6314	2774	5725	2691	8484	9020	17504
	Gennaio . . . . .	556	244	504	211	694	821	1515
	Febbraio . . . . .	591	232	498	237	744	814	1558
	Marzo . . . . .	601	264	506	226	764	833	1597
	Aprile . . . . .	504	221	423	200	670	678	1348
	Maggio . . . . .	477	225	413	233	706	642	1348
	Giugno . . . . .	466	219	401	161	616	631	1247
	Luglio . . . . .	464	177	445	213	607	692	1299
	Agosto . . . . .	422	186	386	222	592	624	1216
	Settembre . . . . .	464	192	423	206	640	645	1285
	Ottobre . . . . .	583	225	499	232	732	807	1539
	Novembre . . . . .	568	258	529	240	740	855	1595
	Dicembre . . . . .	618	331	698	310	979	978	1957
dal 163 al 171	<i>Suicidi . . . . .</i>	1994	572	515	318	2520	879	3399
	Gennaio . . . . .	137	45	43	27	186	66	252
	Febbraio . . . . .	118	34	36	25	165	48	213
	Marzo . . . . .	181	49	44	24	215	83	298
	Aprile . . . . .	197	49	56	24	241	85	326
	Maggio . . . . .	206	72	44	30	254	98	352
	Giugno . . . . .	199	60	49	36	259	85	344
	Luglio . . . . .	212	77	71	31	289	102	391
	Agosto . . . . .	193	48	44	30	236	79	315
	Settembre . . . . .	147	31	32	21	170	64	234
	Ottobre . . . . .	135	40	35	21	173	61	234
	Novembre . . . . .	129	31	38	22	170	50	220
	Dicembre . . . . .	140	36	23	21	162	58	220



Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1936, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
<i>dal 176 al 194</i>	<i>Morti accidentali</i> . . . . .	7049	2444	2920	1196	10246	3363	13609
	Gennaio . . . . .	385	165	233	69	594	258	852
	Febbraio . . . . .	464	164	218	88	701	263	964
	Marzo . . . . .	521	155	204	85	722	243	965
	Aprile . . . . .	477	152	189	67	649	236	885
	Maggio . . . . .	547	184	209	94	759	275	1034
	Giugno . . . . .	660	244	252	106	986	276	1262
	Luglio . . . . .	794	249	320	130	1178	315	1493
	Agosto . . . . .	750	246	258	143	1092	305	1397
	Settembre . . . . .	680	246	275	132	1041	292	1333
	Ottobre . . . . .	684	212	239	104	940	299	1239
	Novembre . . . . .	568	229	229	93	846	273	1119
	Dicembre . . . . .	519	198	254	85	738	328	1066
199	<i>Morte improvvisa</i> . . . . .	2317	740	784	478	2647	1672	4319
	Gennaio . . . . .	225	72	56	44	251	146	397
	Febbraio . . . . .	223	70	83	38	247	167	414
	Marzo . . . . .	210	67	67	49	232	161	393
	Aprile . . . . .	186	63	66	51	227	139	366
	Maggio . . . . .	183	57	61	25	187	139	326
	Giugno . . . . .	161	56	58	35	177	133	310
	Luglio . . . . .	149	49	57	38	195	98	293
	Agosto . . . . .	160	54	50	32	197	105	302
	Settembre . . . . .	155	42	52	29	171	107	278
	Ottobre . . . . .	198	54	61	44	222	135	357
	Novembre . . . . .	222	60	61	39	242	140	382
	Dicembre . . . . .	245	96	106	54	299	202	501
200	<i>Cause non specificate o mal definite</i> . . . . .	281	113	326	287	521	486	1007
	Gennaio . . . . .	23	4	34	18	40	39	79
	Febbraio . . . . .	41	10	38	22	53	58	111
	Marzo . . . . .	29	4	24	24	47	34	81
	Aprile . . . . .	19	5	34	21	43	36	79
	Maggio . . . . .	23	6	19	23	46	25	71
	Giugno . . . . .	18	6	35	22	40	41	81
	Luglio . . . . .	23	9	30	25	47	40	87
	Agosto . . . . .	17	12	13	20	31	31	62
	Settembre . . . . .	18	13	12	17	30	30	60
	Ottobre . . . . .	22	9	18	33	43	39	82
	Novembre . . . . .	15	10	22	18	28	37	65
	Dicembre . . . . .	33	25	47	44	73	76	149
	<i>Altre cause</i> . . . . .	63498	23905	42046	20716	78762	71403	150165
	Gennaio . . . . .	5770	2178	3760	1755	6971	6492	13463
	Febbraio . . . . .	5994	2253	3869	1830	7210	6646	13856
	Marzo . . . . .	6012	2270	3609	1811	7035	6667	13702
	Aprile . . . . .	4995	1890	3203	1616	6178	5526	11704
	Maggio . . . . .	4922	1814	3132	1618	6080	5406	11486
	Giugno . . . . .	4818	1737	3156	1480	5810	5381	11191
	Luglio . . . . .	4830	1774	3370	1611	6113	5472	11585
	Agosto . . . . .	4686	1673	3210	1601	5884	5286	11170
	Settembre . . . . .	4432	1642	2965	1550	5663	4926	10589
	Ottobre . . . . .	5581	1994	3396	1814	6753	6032	12785
	Novembre . . . . .	5245	2139	3829	1851	7012	6052	13064
	Dicembre . . . . .	6303	2541	4547	2179	8053	7517	15570

TAVOLA 18. — Morti, durante l'anno 1936, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infornuto, il sesso e il mese in cui avvenne la morte.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO SESSO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Complesso .	Tot.	852	964	965	885	1034	1262	1493	1397	1333	1239	1119	1066	13609
	di cui F.	258	263	243	236	275	276	315	305	292	299	273	328	3363
176. . . . .	Tot.	—	—	1	—	—	1	4	4	3	1	—	—	14
	di cui F.	—	—	1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	6
177. . . . .	Tot.	3	—	3	17	14	2	3	3	2	22	21	—	90
	di cui F.	1	—	1	8	5	1	1	1	2	10	9	—	39
178. . . . .	Tot.	10	19	3	11	14	1	10	7	11	17	15	13	131
	di cui F.	3	11	1	3	4	—	3	—	2	4	1	4	36
179. . . . .	Tot.	5	10	8	7	15	16	7	11	18	7	14	7	125
	di cui F.	2	6	3	2	6	4	2	4	7	2	4	4	46
180. . . . .	Tot.	14	7	5	3	2	3	11	6	9	5	5	5	75
	di cui F.	1	4	2	2	—	1	5	2	2	3	2	3	27
181. . . . .	Tot.	186	200	179	98	87	102	91	104	115	140	205	245	1752
	di cui F.	104	102	97	57	49	41	41	53	53	70	105	142	914
182. . . . .	Tot.	10	17	10	2	10	9	10	6	8	11	6	10	109
	di cui F.	4	5	6	1	5	1	5	2	2	2	2	2	37
183. . . . .	Tot.	63	90	130	129	174	240	342	250	123	108	66	74	1789
	di cui F.	18	16	28	41	51	48	45	37	30	39	24	22	399
184. . . . .	Tot.	21	15	13	13	10	11	13	16	37	27	23	17	216
	di cui F.	1	2	1	1	4	1	4	2	5	4	3	2	30
185. . . . .	Tot.	4	4	3	6	8	5	3	4	2	1	3	1	44
	di cui F.	1	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	7
186. . . . .	Tot.	427	469	501	497	568	670	772	810	828	768	622	561	7493
	di cui F.	112	96	91	108	132	140	174	180	173	147	115	125	1593
187. . . . .	Tot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	19
	di cui F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	9
188. . . . .	Tot.	17	17	11	13	13	20	29	31	26	20	9	2	208
	di cui F.	1	3	3	3	1	3	5	3	2	—	—	—	24
190. . . . .	Tot.	20	39	10	3	1	—	3	—	3	10	11	21	121
	di cui F.	2	9	—	1	—	—	1	—	—	2	—	5	20
191. . . . .	Tot.	—	1	—	2	2	29	52	16	3	1	1	—	107
	di cui F.	—	—	—	—	1	10	15	3	2	—	—	—	31
192. . . . .	Tot.	1	5	2	3	31	39	11	23	29	11	3	—	158
	di cui F.	—	2	—	—	11	15	1	5	3	5	—	—	42
193. . . . .	Tot.	11	11	13	10	20	24	35	29	31	16	16	9	225
	di cui F.	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	5
194-a. . . . .	Tot.	2	—	2	3	4	3	3	2	2	1	1	1	24
	di cui F.	—	—	1	1	1	—	2	1	2	—	1	—	9
194-b. . . . .	Tot.	58	60	71	68	61	87	94	75	83	54	98	100	909
	di cui F.	7	5	7	7	5	10	7	8	6	2	7	18	89

TAV. 19. — Morti per suicidio, durante l'anno 1936, distinti per sesso, per mese in cui avvenne il decesso, per classi di Comuni, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE — MESI	COMUNI CON ABITANTI:														COMPLESSO	
	meno di 2 000		da 2 000 a 4 999		da 5 000 a 9 999		da 10 000 a 19 999		da 20 000 a 49 999		da 50 000 a 99 999		da 100 000 e più			
	Tor.	di cui F	Tor.	di cui F	Tor.	di cui F	Tor.	di cui F	Tor.	di cui F	Tor.	di cui F	Tor.	di cui F	Tor.	di cui F
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>215</b>	<b>65</b>	<b>579</b>	<b>127</b>	<b>547</b>	<b>130</b>	<b>455</b>	<b>104</b>	<b>446</b>	<b>121</b>	<b>287</b>	<b>69</b>	<b>870</b>	<b>263</b>	<b>3399</b>	<b>879</b>
Gennaio . . . . .	14	5	42	7	40	9	31	8	33	10	23	5	69	22	252	66
Febbraio . . . . .	9	3	30	6	34	7	33	5	23	7	24	7	60	13	213	48
Marzo . . . . .	22	11	52	15	50	15	43	7	32	9	29	4	70	22	298	83
Aprile . . . . .	24	6	49	7	45	12	44	7	51	15	29	13	84	25	326	85
Maggio . . . . .	22	11	59	15	62	15	40	11	44	10	27	8	98	28	352	98
Giugno . . . . .	21	4	53	11	74	16	52	13	48	11	21	3	75	27	344	85
Luglio . . . . .	31	8	78	22	56	13	50	11	56	16	34	8	86	24	391	102
Agosto . . . . .	13	4	55	12	44	13	44	11	38	5	29	6	92	28	315	79
Settembre . . . . .	11	3	36	9	31	9	34	9	34	11	24	4	64	19	234	64
Ottobre . . . . .	18	2	48	10	53	12	23	8	18	5	17	2	67	22	234	61
Novembre . . . . .	15	3	45	7	35	4	31	4	36	10	15	7	43	15	220	50
Dicembre . . . . .	15	5	42	6	23	5	30	10	33	12	15	2	62	18	220	58
<b>Italia Settentrionale.</b>	<b>168</b>	<b>50</b>	<b>377</b>	<b>77</b>	<b>324</b>	<b>73</b>	<b>216</b>	<b>56</b>	<b>197</b>	<b>48</b>	<b>176</b>	<b>42</b>	<b>536</b>	<b>151</b>	<b>1994</b>	<b>497</b>
Gennaio . . . . .	11	5	23	3	24	6	16	5	12	5	14	5	37	11	137	40
Febbraio . . . . .	4	2	18	5	19	5	17	2	10	3	19	4	31	6	118	27
Marzo . . . . .	18	8	34	6	33	11	23	4	15	3	18	2	40	12	181	46
Aprile . . . . .	18	5	39	5	24	6	22	3	26	6	14	6	54	16	197	47
Maggio . . . . .	19	9	32	6	40	10	17	7	20	5	13	4	65	18	206	59
Giugno . . . . .	16	3	37	9	40	7	24	4	21	2	14	2	47	16	199	43
Luglio . . . . .	23	5	48	13	28	5	16	6	24	6	17	5	56	16	212	56
Agosto . . . . .	11	3	37	8	28	9	21	8	19	2	19	3	58	14	193	47
Settembre . . . . .	10	2	22	7	17	4	20	5	18	5	19	3	41	9	147	35
Ottobre . . . . .	13	2	26	6	36	7	7	2	6	3	10	1	37	11	135	32
Novembre . . . . .	12	1	28	4	22	1	18	4	12	3	8	5	29	9	129	27
Dicembre . . . . .	13	5	33	5	13	2	15	6	14	5	11	2	41	13	140	38
<b>Italia Centrale . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>92</b>	<b>23</b>	<b>103</b>	<b>15</b>	<b>107</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>139</b>	<b>48</b>	<b>572</b>	<b>130</b>
Gennaio . . . . .	1	—	7	—	8	1	6	2	10	3	—	—	9	2	45	8
Febbraio . . . . .	2	—	4	—	4	—	6	1	5	—	1	—	12	2	34	3
Marzo . . . . .	—	—	8	4	6	1	7	1	9	4	6	2	13	6	49	18
Aprile . . . . .	3	1	3	—	8	3	13	—	5	2	5	—	12	3	49	9
Maggio . . . . .	2	2	10	1	11	2	9	2	12	1	7	1	21	8	72	17
Giugno . . . . .	1	1	9	1	13	3	11	3	12	1	3	—	11	6	60	14
Luglio . . . . .	1	—	8	3	14	4	17	1	14	2	10	2	13	3	77	15
Agosto . . . . .	2	1	6	1	5	1	10	—	8	—	6	1	11	5	48	9
Settembre . . . . .	—	—	2	1	3	3	—	7	4	3	—	—	11	4	31	12
Ottobre . . . . .	2	—	1	—	10	2	7	2	5	1	3	—	12	4	40	9
Novembre . . . . .	—	—	4	1	3	—	6	—	10	2	4	—	4	3	31	6
Dicembre . . . . .	—	—	—	—	5	3	8	3	10	2	3	—	10	2	36	10
<b>Italia Meridionale . . . . .</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>26</b>	<b>72</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>21</b>	<b>101</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>130</b>	<b>45</b>	<b>515</b>	<b>165</b>
Gennaio . . . . .	2	—	9	3	4	1	1	1	9	1	3	—	15	6	43	12
Febbraio . . . . .	2	—	1	—	8	2	4	—	4	3	2	1	15	4	36	10
Marzo . . . . .	2	1	8	4	4	—	9	2	5	1	3	—	13	4	44	12
Aprile . . . . .	2	—	4	1	11	3	5	3	17	6	5	4	12	4	56	21
Maggio . . . . .	1	—	11	5	7	2	5	1	8	3	4	3	8	1	44	15
Giugno . . . . .	2	1	6	—	8	2	10	4	12	6	2	—	9	4	49	17
Luglio . . . . .	5	2	15	5	8	3	13	3	15	7	3	1	12	3	71	24
Agosto . . . . .	—	—	7	2	7	2	6	1	9	2	3	2	12	5	44	14
Settembre . . . . .	1	1	8	1	4	1	6	3	5	—	1	1	7	4	32	11
Ottobre . . . . .	2	—	6	3	4	2	5	3	3	—	1	—	14	6	35	14
Novembre . . . . .	—	—	12	2	6	1	1	—	9	3	3	2	7	2	38	10
Dicembre . . . . .	1	—	5	—	1	—	4	—	5	3	1	—	6	2	23	5
<b>Italia Insulare . . . . .</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>59</b>	<b>15</b>	<b>67</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>19</b>	<b>318</b>	<b>87</b>
Gennaio . . . . .	—	—	3	1	4	—	8	—	2	1	2	—	8	3	27	6
Febbraio . . . . .	1	1	7	1	3	—	6	2	4	1	2	2	2	1	25	8
Marzo . . . . .	2	2	2	1	7	3	4	—	3	1	2	—	4	—	24	7
Aprile . . . . .	1	—	3	1	2	—	4	1	3	1	5	3	6	2	24	8
Maggio . . . . .	—	—	6	3	4	1	9	1	4	1	3	—	4	1	30	7
Giugno . . . . .	2	—	1	1	13	4	7	2	3	2	2	1	8	1	36	11
Luglio . . . . .	2	1	7	1	6	1	4	1	3	1	4	1	5	2	31	7
Agosto . . . . .	—	—	5	1	4	1	7	2	2	1	1	—	11	4	30	9
Settembre . . . . .	—	—	4	—	5	1	5	1	4	2	1	—	5	2	24	6
Ottobre . . . . .	1	—	5	1	3	1	4	1	4	1	3	—	4	1	24	6
Novembre . . . . .	3	2	1	—	4	2	6	—	5	2	—	—	3	1	22	7
Dicembre . . . . .	1	—	4	1	4	—	3	1	4	2	—	—	5	1	21	5

TAVOLA 20. — Morti per suicidio, durante l'anno 1936, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso.

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	CELIBI E NUBILI	CONIUGATI	VEDOVI	DIVORZIATI	STATO CIVILE IGNOTO	TOTALE
<b>Maschi e Femmine</b>						
<b>Complesso . . .</b>	<b>1 236</b>	<b>1 689</b>	<b>458</b>	<b>—</b>	<b>16</b>	<b>3 399</b>
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	145	143	24	—	—	312
Per assorbimento di gas tossici	35	43	16	—	—	94
Per impiccamento o strangolam.	272	513	152	—	1	938
Per annegamento . . . . .	224	338	99	—	5	666
Con arma da fuoco . . . . .	270	299	68	—	4	641
Con arma da punta e da taglio	41	90	26	—	1	158
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	142	167	49	—	3	361
Per schiacciamento . . . . .	100	83	22	—	2	207
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	7	13	2	—	—	22
<b>Maschi</b>						
<b>Complesso . . .</b>	<b>874</b>	<b>1 311</b>	<b>320</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>2 520</b>
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	56	80	13	—	—	149
Per assorbimento di gas tossici	20	35	5	—	—	60
Per impiccamento o strangolam.	223	403	119	—	1	746
Per annegamento . . . . .	133	230	51	—	5	419
Con arma da fuoco . . . . .	247	288	63	—	4	602
Con arma da punta e da taglio	34	76	20	—	—	130
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	82	113	31	—	3	229
Per schiacciamento . . . . .	72	77	17	—	2	168
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	7	9	1	—	—	17
<b>Femmine</b>						
<b>Complesso . . .</b>	<b>362</b>	<b>378</b>	<b>138</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>879</b>
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive . . . . .	89	63	11	—	—	163
Per assorbimento di gas tossici	15	8	11	—	—	34
Per impiccamento o strangolam.	49	110	33	—	—	192
Per annegamento . . . . .	91	108	48	—	—	247
Con arma da fuoco . . . . .	23	11	5	—	—	39
Con arma da punta e da taglio	7	14	6	—	1	28
Per precipitazione da un luogo elevato . . . . .	60	54	18	—	—	132
Per schiacciamento . . . . .	28	6	5	—	—	39
Con altro mezzo o con mezzo non determinato . . . . .	—	4	1	—	—	5

**TAV. 21 e 22.**

**Le cause di natimortalità nell'anno 1936.**

TAVOLA 21. — Nati morti distinti secondo le cause, la specie

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	NATI MORTI DA PARTI SEM							
	CAPILUOGHI DI PROVINCIA				ALTRI COMUNI			
	Totale		di cui illegittimi		Totale		di cui illegittimi	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>7 709</b>	<b>3 348</b>	<b>833</b>	<b>371</b>	<b>22 341</b>	<b>10 068</b>	<b>1 000</b>	<b>455</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . . . .</b>	<b>2 202</b>	<b>996</b>	<b>286</b>	<b>134</b>	<b>5 362</b>	<b>2 644</b>	<b>280</b>	<b>139</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche . . . . .	827	385	151	71	1 176	559	95	46
di cui per sifilide . . . . .	752	349	143	66	796	378	75	38
2 Tossemie gravidiche . . . . .	479	209	42	20	1 195	543	43	23
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	364	189	29	20	1 795	1 000	81	42
4 Altre cause . . . . .	375	152	33	14	911	419	43	20
4 bis Male indicate . . . . .	157	61	31	9	285	123	18	8
<b>II. - Per espulsione prematura . . . . .</b>	<b>1 854</b>	<b>827</b>	<b>209</b>	<b>97</b>	<b>7 163</b>	<b>3 273</b>	<b>357</b>	<b>155</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	505	215	33	11	3 518	1 602	158	73
6 Trauma determin. il parto prematuro . . . . .	84	40	11	5	593	273	26	11
7 Inserzione viziosa . . . . .	146	65	12	8	577	239	26	9
8 Infezioni acute . . . . .	66	35	8	5	348	169	10	5
9 Infez. croniche, in particolare sifilide di cui per sifilide . . . . .	122	54	22	9	338	164	24	10
di cui per sifilide . . . . .	93	43	21	8	172	89	17	6
10 Altre cause . . . . .	314	144	44	15	601	300	32	18
10 bis Male indicate . . . . .	617	274	79	44	1 188	526	81	29
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>3 549</b>	<b>1 477</b>	<b>324</b>	<b>130</b>	<b>9 563</b>	<b>4 028</b>	<b>335</b>	<b>148</b>
11 Presentaz. viziose e procid. cordone . . . . .	1 084	459	102	49	4 945	2 057	162	74
12 Ostacoli all'espulsione del feto . . . . .	547	209	42	18	1 695	715	65	25
13 Altre cause . . . . .	1 915	806	180	63	2 905	1 250	108	49
13 bis Male indicate . . . . .	3	3	—	—	18	6	—	—
Cause non indicate . . . . .	104	48	14	10	253	123	28	13

TAVOLA 22. — Nati morti legittimi, nell'anno 1936, da madri che presumibilmente non ebbero figli

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	NATI MORTI DA PARTI SEMPLICI —											
	- 21				21 - 29				30 - 39			
	Primo-geniti	Cadetti	Non indicato	Totale	Primo-geniti	Cadetti	Non indicato	Totale	Primo-geniti	Cadetti	Non indicato	Totale
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>1 011</b>	<b>291</b>	<b>2</b>	<b>1 214</b>	<b>5 924</b>	<b>5 864</b>	<b>6</b>	<b>11 794</b>	<b>1 927</b>	<b>9 409</b>	<b>4</b>	<b>11 340</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . . . .</b>	<b>224</b>	<b>53</b>	<b>—</b>	<b>277</b>	<b>1 364</b>	<b>1 490</b>	<b>2</b>	<b>2 856</b>	<b>447</b>	<b>2 384</b>	<b>—</b>	<b>2 831</b>
1 Sifil. e altre affez. cron. . . . .	56	25	—	81	326	372	—	698	129	610	—	739
di cui per sifilide . . . . .	42	20	—	62	261	282	—	543	99	460	—	559
2 Tossemie gravidiche . . . . .	47	8	—	55	335	281	1	617	119	535	—	654
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	82	13	—	95	406	482	—	888	98	693	—	791
4 Altre cause . . . . .	29	7	—	36	193	271	1	465	79	433	—	512
4 bis Male indicate . . . . .	10	—	—	10	104	84	—	188	22	113	—	135
<b>II. - Per espulsione prematura . . . . .</b>	<b>360</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>451</b>	<b>1 588</b>	<b>2 012</b>	<b>2</b>	<b>3 602</b>	<b>449</b>	<b>2 829</b>	<b>1</b>	<b>3 279</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	174	38	1	213	690	960	2	1 652	179	1 289	1	1 469
6 Trauma determin. il parto prematuro . . . . .	21	9	—	30	114	144	—	258	27	221	—	248
7 Inserzione viziosa . . . . .	25	4	—	29	123	142	—	265	42	247	—	289
8 Infezioni acute . . . . .	15	3	—	18	93	90	—	183	23	123	—	146
9 Infezioni croniche di cui per sifilide . . . . .	15	4	—	19	70	108	—	178	19	139	—	158
di cui per sifilide . . . . .	11	3	—	14	41	62	—	103	7	75	—	82
10 Altre cause . . . . .	25	18	—	43	161	190	—	351	52	270	—	322
10 bis Male indicate . . . . .	85	14	—	99	337	378	—	715	107	540	—	647
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>414</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>470</b>	<b>2 911</b>	<b>2 307</b>	<b>1</b>	<b>5 219</b>	<b>1 014</b>	<b>4 120</b>	<b>3</b>	<b>5 137</b>
11 Presentazioni viziose e procidenza del cordone . . . . .	194	35	—	229	1 243	1 149	—	2 392	385	1 973	1	2 359
12 Ostacoli all'espul. del feto . . . . .	71	2	—	73	601	352	—	953	231	622	—	853
13 Altre cause . . . . .	148	18	1	167	1 064	806	1	1 871	395	1 514	2	1 911
13 bis Male indicate . . . . .	1	—	—	1	3	—	—	3	3	11	—	14
Cause non indicate . . . . .	13	3	—	16	61	55	1	117	17	76	—	93

(\*) Nomenclatura nosologica stabilita dalla IV Conferenza internazionale.

del parto, la filiazione ed il sesso, nell'anno 1936.

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	SEMPLICI				NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI				IN COMPLESSO			
	REGNO				Totale		di cui illegittimi		Totale		di cui illegittimi	
	Totale		di cui illegittimi		MF		F		MF		F	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>30 050</b>	<b>13 416</b>	<b>1 833</b>	<b>826</b>	<b>2 179</b>	<b>1 022</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>32 229</b>	<b>14 438</b>	<b>1 945</b>	<b>883</b>
<b>I. - Nel corso della gestazione . . . . .</b>	<b>7 564</b>	<b>3 640</b>	<b>556</b>	<b>273</b>	<b>473</b>	<b>234</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>8 037</b>	<b>3 874</b>	<b>599</b>	<b>292</b>
1 Sifilide ed altre affezioni croniche . . . . .	2 003	944	246	117	109	52	16	11	2 112	996	262	128
di cui per sifilide . . . . .	1 548	727	218	104	79	35	16	11	1 627	762	234	115
2 Tossemie gravidiche . . . . .	1 674	752	85	43	87	46	5	2	1 761	798	90	45
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	2 159	1 189	110	62	116	70	8	5	2 275	1 239	118	67
4 Altre cause . . . . .	1 286	571	76	34	109	48	3	1	1 395	619	79	35
4 bis Male indicate . . . . .	442	184	49	17	52	18	1	—	494	202	50	17
<b>II. - Per espulsione prematura . . . . .</b>	<b>9 017</b>	<b>4 100</b>	<b>566</b>	<b>252</b>	<b>917</b>	<b>447</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>9 934</b>	<b>4 547</b>	<b>613</b>	<b>276</b>
5 Strapazzo materno . . . . .	4 023	1 817	191	84	379	180	16	8	4 402	1 997	207	92
6 Trauma determin. il parto prematuro . . . . .	677	313	37	16	38	23	2	1	715	336	39	17
7 Inserzione viziosa . . . . .	723	304	38	17	64	26	8	4	787	330	46	21
8 Infezioni acute . . . . .	414	204	18	10	40	23	—	—	454	227	18	10
9 Infez. croniche, in particolare sifilide di cui per sifilide . . . . .	460	218	46	19	25	15	4	2	485	233	50	21
di cui per sifilide . . . . .	265	132	38	14	6	3	—	—	271	135	40	14
10 Altre cause . . . . .	915	444	76	33	79	35	5	3	994	479	81	36
10 bis Male indicate . . . . .	1 188	800	160	73	292	145	12	6	2 097	945	172	79
<b>III. - Nel corso del parto . . . . .</b>	<b>13 112</b>	<b>5 505</b>	<b>659</b>	<b>278</b>	<b>745</b>	<b>321</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>13 857</b>	<b>5 826</b>	<b>689</b>	<b>290</b>
11 Presentaz. viziose e procid. cordone . . . . .	6 029	2 516	264	123	353	168	15	4	6 382	2 684	279	127
12 Ostacoli all'espulsione del feto . . . . .	2 242	924	107	43	95	42	2	1	2 337	966	109	44
13 Altre cause . . . . .	4 820	2 056	288	112	295	110	13	7	5 115	2 166	301	119
13 bis Male indicate . . . . .	21	9	—	—	2	1	—	—	23	10	—	—
Cause non indicate . . . . .	357	171	42	23	44	20	2	2	401	191	44	25

prima dell'attuale matrimonio, per cause, età della madre al parto e ordine di generazione.

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	ETÀ DELLA MADRE AL PARTO																NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI			
	40 - 49				non indicata				In complesso				Primo-geniti	Cadetti	Non indicato	Totale				
	Primo-geniti	Cadetti	Non indicato	Totale	Primo-geniti	Cadetti	Non indicato	Totale	Primo-geniti	Cadetti	Non indicato	Totale								
<b>Complesso . . . . .</b>	<b>223</b>	<b>2 976</b>	<b>3</b>	<b>3 202</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>118</b>	<b>9 107</b>	<b>18 492</b>	<b>69</b>	<b>27 668</b>	<b>578</b>	<b>1 448</b>	<b>—</b>	<b>2 026</b>				
<b>I. - Nel corso della gestazione . . . . .</b>	<b>47</b>	<b>802</b>	<b>—</b>	<b>849</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>20</b>	<b>2 089</b>	<b>4 742</b>	<b>2</b>	<b>6 833</b>	<b>140</b>	<b>293</b>	<b>—</b>	<b>433</b>				
1 Sifil. e altre affez. cron. . . . .	8	189	—	197	5	9	—	14	524	1 205	—	1 729	28	64	—	92				
di cui per sifilide . . . . .	5	128	—	133	5	9	—	14	412	899	—	1 311	25	37	—	62				
2 Tossemie gravidiche . . . . .	15	206	—	221	—	1	—	1	516	1 031	1	1 548	38	43	—	81				
3 Malformazioni incompatibili con la vita . . . . .	15	213	—	228	1	2	—	3	602	1 403	—	2 005	27	79	—	106				
4 Altre cause . . . . .	5	154	—	159	1	1	—	2	307	866	1	1 174	31	74	—	105				
4 bis Male indicate . . . . .	4	40	—	44	—	—	—	—	140	237	—	377	16	33	—	49				
<b>II. - Per espulsione prematura . . . . .</b>	<b>49</b>	<b>882</b>	<b>2</b>	<b>933</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>19</b>	<b>2 454</b>	<b>5 824</b>	<b>6</b>	<b>8 284</b>	<b>254</b>	<b>596</b>	<b>—</b>	<b>850</b>				
5 Strapazzo materno . . . . .	21	415	—	436	1	1	—	2	1 065	2 703	4	3 772	120	230	—	350				
6 Trauma determin. il parto prematuro . . . . .	7	73	—	80	1	—	—	1	170	447	—	617	18	17	—	35				
7 Inserzione viziosa . . . . .	3	82	2	87	—	1	—	1	193	476	2	671	9	44	—	53				
8 Infezioni acute																				

Fav. 23. — Popolazione residente censita al 21 aprile 1936 (a), nelle Provincie, nei Comuni capoluoghi di Provincia e negli altri Comuni di ciascun Compartimento e del Regno.

PROVINCIE E COMPARTI- MENTI	NELLA PROVINCIA	NEL CAPOLUOGO	NEGLI ALTRI COMUNI	PROVINCIE E COMPARTI- MENTI	NELLA PROVINCIA	NEL CAPOLUOGO	NEGLI ALTRI COMUNI
Alessandria .....	493 698	79 327	414 371	Ancona .....	372 229	89 198	283 031
Aosta .....	227 500	23 641	203 859	Ascoli Piceno .....	309 869	38 111	265 758
Asti .....	245 764	48 898	196 866	Macerata .....	290 057	26 708	263 349
Cuneo .....	608 912	35 321	573 591	Pesaro e Urbino .....	311 916	44 589	267 327
Novara .....	395 730	62 570	333 160	<b>Marche ...</b>	<b>1 278 071</b>	<b>198 606</b>	<b>1 079 465</b>
Torino .....	1 168 384	629 115	539 269	Perugia .....	534 359	82 407	451 952
Vercelli .....	366 146	38 956	327 190	Terni .....	194 559	68 890	122 669
<b>Piemonte ...</b>	<b>3 506 134</b>	<b>917 828</b>	<b>2 588 306</b>	<b>Umbria ...</b>	<b>725 918</b>	<b>151 297</b>	<b>574 621</b>
Genova .....	867 162	634 646	232 516	Frosinone .....	445 607	18 447	427 160
Imperia .....	158 565	28 540	130 025	Littoria .....	229 455	19 654	209 801
La Spèzia .....	222 080	106 119	115 961	Rieti .....	174 961	34 769	140 192
Savona .....	219 108	64 199	154 909	Roma .....	1 560 343	1 153 485	406 858
<b>Liguria ...</b>	<b>1 466 915</b>	<b>833 504</b>	<b>633 411</b>	Viterbo .....	236 722	36 123	200 599
Bergamo .....	605 810	86 043	519 767	<b>Lazio ...</b>	<b>2 647 088</b>	<b>1 262 478</b>	<b>1 384 610</b>
Brescia .....	744 571	123 332	621 239	Aquila degli Abr. ....	365 716	54 722	310 994
Como .....	501 752	53 210	448 542	Campobasso .....	399 095	29 573	369 522
Cremona .....	369 483	64 019	305 464	Chieti .....	374 727	30 266	344 461
Mantova .....	407 977	40 467	367 510	Pescara .....	211 561	51 808	159 753
Milano .....	2 175 568	1 115 848	1 059 920	Teramo .....	249 532	33 796	215 736
Pavia .....	492 166	51 741	440 425	<b>Abruzzi e M. ...</b>	<b>1 600 631</b>	<b>200 165</b>	<b>1 400 466</b>
Sondrio .....	142 919	11 672	131 247	Avellino .....	451 466	29 091	422 375
Varese .....	395 896	44 832	351 064	Benevento .....	349 707	37 865	311 842
<b>Lombardia ...</b>	<b>5 836 342</b>	<b>1 591 164</b>	<b>4 245 178</b>	Napoli .....	2 192 245	865 913	1 326 332
Bolzano .....	277 720	45 505	232 215	Salerno .....	705 277	67 069	638 208
Trento .....	391 309	56 017	335 292	<b>Campania ...</b>	<b>3 698 695</b>	<b>999 828</b>	<b>2 698 817</b>
<b>Venezia T. ...</b>	<b>669 029</b>	<b>101 522</b>	<b>567 507</b>	Bari .....	1 010 907	196 747	814 160
Belluno .....	216 333	25 547	190 786	Brindisi .....	254 062	41 699	212 363
Friuli (Udine) ..	721 670	63 098	658 572	Foggia .....	523 612	62 340	461 272
Pàdova .....	668 025	138 709	529 316	Jonio (Taranto) .....	321 888	117 722	204 166
Rovigo .....	336 807	39 954	296 853	Lecce .....	526 553	49 261	477 292
Treviso .....	570 580	53 886	516 694	<b>Puglia ...</b>	<b>2 637 022</b>	<b>467 769</b>	<b>2 169 253</b>
Venezia .....	629 123	264 027	365 096	Matera .....	166 776	22 069	144 707
Verona .....	585 893	153 708	432 185	Potenza .....	376 486	25 103	351 383
Vicenza .....	559 375	69 379	489 996	<b>Lucania ...</b>	<b>543 262</b>	<b>47 172</b>	<b>496 090</b>
<b>Veneto ...</b>	<b>4 297 866</b>	<b>808 308</b>	<b>3 479 488</b>	Catanzaro .....	606 364	45 400	560 964
Carnaro (Fiume) ..	109 018	53 896	55 122	Cosenza .....	587 025	40 032	546 993
Gorizia .....	200 152	46 640	153 512	Règgio di Calab. ....	578 262	119 804	458 458
Istria (Pola) .....	294 492	46 259	248 233	<b>Calàbria ...</b>	<b>1 771 651</b>	<b>205 236</b>	<b>1 566 415</b>
Trieste .....	351 595	248 379	103 216	Agriiento .....	418 265	32 951	385 314
Zara .....	22 000	20 055	1 945	Catanzaretta .....	256 687	50 467	206 220
<b>Ven. G. e Z. ...</b>	<b>977 257</b>	<b>415 229</b>	<b>562 028</b>	Catania .....	713 160	244 972	468 188
Bologna .....	714 705	269 637	445 018	Enna .....	218 294	23 817	194 477
Ferrara .....	381 299	119 265	262 034	Messina .....	627 093	192 051	435 042
Forlì .....	444 528	65 683	378 845	Palermo .....	890 752	411 879	478 873
Mòdena .....	467 355	96 337	371 018	Ragusa .....	223 086	49 530	173 556
Parma .....	381 771	71 858	309 913	Siracusa .....	277 572	53 166	224 406
Piacenza .....	294 785	64 210	230 575	Tràpani .....	375 169	63 540	311 629
Ravenna .....	279 127	81 086	198 041	<b>Sicilia ...</b>	<b>4 000 078</b>	<b>1 122 373</b>	<b>2 877 705</b>
Règgio nell'Em. ....	375 288	93 913	281 375	Cagliari .....	507 201	106 649	400 552
<b>Emilia ...</b>	<b>3 338 858</b>	<b>862 039</b>	<b>2 476 819</b>	Nuoro .....	124 643	11 459	213 184
Arezzo .....	316 380	60 284	256 096	Sassari .....	302 362	55 373	246 989
Firenze .....	853 032	322 535	530 497	<b>Sardegna ...</b>	<b>1 034 206</b>	<b>173 481</b>	<b>860 725</b>
Grosseto .....	185 801	26 428	159 373	REGNO ...	42 993 692	11 209 722	31 783 883
Livorno .....	249 468	124 963	124 505				
Lucca .....	352 205	82 300	269 905				
Massa e Carrara ..	196 716	41 819	154 897				
Pisa .....	341 428	72 468	268 960				
Pistòia .....	211 150	72 212	138 938				
Siena .....	268 459	48 604	219 795				
<b>Toscana ...</b>	<b>2 974 689</b>	<b>851 673</b>	<b>2 122 966</b>				

(a) Nella circoscrizione territoriale, quale era al 31 dicembre 1936, secondo le variazioni effettuate fino alla detta data.







* <i>Statistica delle cause di morte</i> in ciascuno degli anni dal 1919 al 1923		<i>Statistica delle cause di morte ne-</i> gli anni 1931 e 1932:	
<i>Statistica delle cause di morte</i> nell'anno 1924, L. 25		Parte I. - Introduzione,	L. 10
Id. id. 1925, L. 25		Parte II. - Tavole,	L. 20
Id. id. 1926, L. 30		<i>Statistica delle cause di morte nel-</i> l'anno 1933:	
Id. id. 1927, L. 30		Parte I. - Introduzione,	L. 5
Id. id. 1928, L. 30		Parte II. - Tavole,	L. 10
<i>Statistica delle cause di morte ne-</i> gli anni 1929 e 1930:		<i>Statistica delle cause di morte nel-</i> l'anno 1934:	
Parte I. - Introduzione,	L. 10	Parte I. - Introduzione,	L. 5
Parte II. - Tavole,	L. 25	Parte II. - Tavole,	L. 10
		<i>Statistica delle cause di morte nel-</i> l'anno 1935.	L. 15

**Altre pubblicazioni di Statistica Sanitaria  
curate dall'Istituto Centrale di Statistica**

<i>Nomenclature nosologiche per la statistica delle Cause di morte e dizionario delle malattie -</i> 5 <sup>a</sup> Edizione (Roma, 1936-XIV) . . . . .	L. 3
<i>Indagine sulla mortalità infantile nel Governatorato di Roma, a cura di C. Gini - L. De</i> <i>Berardinis - G. D'Ormea - M. Flamini - U. Giusti - L. Maroi (Roma, 1933-XI).</i>	L. 30
<i>Le malattie mentali in Italia - Alienati presenti nei luoghi di cura al 1<sup>o</sup> gennaio 1926</i> <i>(Roma, 1928-VI) . . . . .</i>	L. 15
<i>Movimento dei malati di mente negli Istituti di cura per gli anni 1929-1930-1931-1932-</i> <i>1933-1934-1935 (a) (Reggio Emilia, 1931-IX, 1932-X, 1933-XI, 1934-XII, 1935-XIII,</i> <i>1935-XIV, 1936-XV) (b) . . . . .</i>	—
<i>Statistica degli Ospedali e degli altri Istituti pubblici e privati di assistenza sanitaria</i> <i>ospedaliera nell'anno 1932 (Roma, 1934-XII) . . . . .</i>	L. 6

(a) Pubblicazione dell'ufficio statistico delle malattie mentali del Manicomio Provinciale di Ancona, in vendita presso l'Ufficio stesso.  
(b) Estratti dalla « Rivista Sperimentale di Freniatria ».