

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

STATISTICA
DELLE CAUSE DI MORTE
NELL'ANNO 1937



ROMA
TIPOGRAFIA FAILLI
1938 - ANNO XVII

A S.E. IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI
CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO

DUCE,

Ho l'onore di presentarVi il volume sulla Statistica delle cause di morte nell'anno 1937 che, oltre alle solite notizie, contiene, per le principali cause di morte, i quozienti specifici di mortalità per sesso e per età calcolati in base ai dati dei censimenti.

Roma, 21 dicembre 1938-XVII

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
FRANCO SAVORGNAN

INDICE

LETTERA DI PRESENTAZIONE A S. E. IL CAV. BENITO MUSSOLINI,
CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO Pag. III

AVVERTENZE » VI
NOTIZIE INEDITE » VII

INTRODUZIONE

CAPO I. — Cause delle morti :

§ 1. — Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1935, 1936 e 1937	» 1*
§ 2. — Intensità e frequenza di alcune cause di morte	» 4*
<i>Morbillo</i>	» 4*
<i>Scarlattina</i>	» 6*
<i>Febbre tifoidea e paratifo</i>	» 7*
<i>Difterite e croup</i>	» 9*
<i>Tosse convulsa</i>	» 10*
<i>Poliomielite anteriore acuta</i>	» 11*
<i>Influenza</i>	» 12*
<i>Sifilide</i>	» 13*
<i>Tubercolosi nelle sue varie forme e sedi</i>	» 13*
<i>Febbri da malaria e cachessia palustre</i>	» 26*
<i>Tumori maligni</i>	» 27*
<i>Diabete mellito</i>	» 32*
<i>Convulsioni nei bambini in età inferiore ai 5 anni</i>	» 35*
<i>Malattie del cuore</i>	» 36*
<i>Bronchite acuta e cronica</i>	» 38*
<i>Broncopolmonite acuta e polmonite lobare</i>	» 39*
<i>Enteriti al disotto di 2 anni</i>	» 40*
<i>Cirrosi alcoolica del fegato e alcoolismo cronico</i>	» 41*
<i>Malattie della gravidanza, parto e puerperio</i>	» 42*
<i>Mortalità nel primo anno di vita per alcune principali cause</i>	» 48*
<i>Marasma senile</i>	» 50*
§ 3. — Mortalità nel Regno dei bambini, durante il primo anno di vita, per cause, in relazione alla legittimità dei natali	» 51*
§ 4. — Bambini morti nel primo anno di vita secondo l'età alla morte	» 53*
§ 5. — Mortalità neonatale e nel primo mese di vita secondo il genere del parto, nel triennio 1934-36 e nell'anno 1937	» 55*
§ 6. — Morti dopo atto operatorio, nell'anno 1937	» 56*
Quozienti di letalità, nel Regno, per malattie infettive soggette a denuncia, durante gli anni dal 1888 al 1937	» 60*

CAPO II. — Notizie sulle morti violente e sulle morti causate da avvelenamenti cronici, accidentali o professionali :

§ 1. — Morti per causa violenta, ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1937	» 62*
§ 2. — Notizie sulle morti per causa violenta accidentale	» 62*
§ 3. — Avvelenamenti cronici e intossicazione	» 71*
§ 4. — Omicidi e infanticidi	» 74*
§ 5. — Notizie sui morti per suicidio	» 77*

CAPO III. — Le cause di natimortalità nel settennio 1931-37 » 84*

ALLEGATO :

Fac-simile della scheda individuale (modello B) per i morti (maschi) » 88*

TAVOLE

TAV. 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte :	
A) Per Provincie e Compartimenti	Pag. 2
B) Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.	» 50
» 2. — Morti, nell'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno	» 56
» 3. — Morti nel 1937, classificati per cause e classi di Comuni	» 60
» 4. — Morti, durante l'anno 1937, nei Comuni con più di 100.000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, classificati secondo le cause di morte	» 62
» 5. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso	» 64
» 6. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1937, classificati secondo le cause, l'età ed il sesso	» 88
» 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione	» 90
» 8. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1937, nei singoli Compartimenti, distinti secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso	» 98
» 9. — Bambini, nati da parti multipli, morti nel primo mese di vita, durante l'anno 1937, classificati per alcune cause di morte, sesso, età e filiazione	» 100
» 10. — Bambini, morti nella prima settimana di vita, durante l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso	» 102
» 11. — Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso	» 104
» 12. — Morti, durante l'anno 1937, per gruppi di età da 15 anni in poi, classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso	» 120
» 13. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno	» 136
» 14. — Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, lo stato civile ed il sesso	» 140
» 15. — Femmine morte nel Regno per tumori degli organi genitali e delle mammelle, nell'anno 1937, classificate per età e stato civile	» 142
» 16. — Madri morte durante l'anno 1937, per infezioni puerperali, nei singoli Compartimenti e nel Regno, con distinzione di primipare e pluripare e classificate per gruppi di età	» 143
» 17. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso	» 145
» 18. — Morti, durante l'anno 1937, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, il sesso e il mese in cui avvenne la morte	» 152
» 19. — Morti per suicidio, durante l'anno 1937, distinti per sesso, per mese in cui avvenne il decesso, per classi di Comuni, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno	» 153
» 20. — Morti per suicidio, durante l'anno 1937, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso	» 154
» 21. — Nati morti distinti secondo le cause, la specie del parto, la filiazione ed il sesso, nell'anno 1937	» 156
» 22. — Nati morti legittimi, nell'anno 1937, da madri che presumibilmente non ebbero figli prima dell'attuale matrimonio, per cause, età della madre al parto e ordine di generazione	» 156
» 23. — Popolazione residente calcolata alla metà dell'anno 1937 nelle Provincie, nei Comuni capiluoghi di Provincia e negli altri Comuni	» 158

AVVERTENZE

1. — Tutti i dati contenuti nel presente volume, a meno che non sia diversamente indicato, si riferiscono al Regno nei confini prebellici, fino a tutto l'anno 1923; dal 1924 in poi, i dati si riferiscono al Regno negli attuali confini.

2. — Nei prospetti e nelle tavole della presente pubblicazione sono adottati i seguenti segni convenzionali:

Due puntini (.), per i numeri relativi, quando non raggiungano la cifra significativa nell'ordine minimo considerato (0,001; 0,01; ecc.).

La linea (—), quando non è stato registrato alcun caso, oppure non si conoscono i dati.

3. — Nei prospetti, la somma delle cifre proporzionali non sempre dà, nel totale, cento o mille, ecc., a causa degli arrotondamenti.

4. — Gli Elenchi nosologici delle cause di morte adottati nel presente volume sono quelli stabiliti dalla IV Conferenza internazionale (tenuta a Parigi nell'ottobre 1929), costituiti da una nomenclatura dettagliata di 200 voci, una intermedia di 85 voci ed una abbreviata di 43 voci (a).

5. — I dati contenuti nel presente volume si riferiscono alla circoscrizione territoriale quale era al 31 dicembre degli anni considerati, secondo le variazioni effettuate a detta data (b).

6. — I quozienti di mortalità sono stati calcolati, generalmente, sulla popolazione presente alla metà di ciascun periodo (c). Per i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22 e 1930-32 sulla popolazione *presente* censita rispettivamente il 10 febbraio 1901, il 10 giugno 1911, il 1° dicembre 1921 e il 21 aprile 1931. Per il triennio 1935-37 i quozienti sono stati calcolati sulla popolazione *residente* censita al 21 aprile 1936. Per l'anno 1937 i quozienti sono stati calcolati sulla popolazione residente calcolata alla metà dell'anno.

7. — Si rimanda il lettore al volume sul *Movimento della popolazione nell'anno 1937* (pagina 10* e segg.), per quanto riguarda la mortalità generale del Regno, delle Province e dei Comuni capiluoghi di Provincia.

8. — Per le modalità di rilevazione dei dati, cfr.: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « *Statistica delle Cause di morte negli anni 1928, 1929 e 1930* ». I modelli di rilevazione o le indicazioni delle variazioni annuali sono riportati in allegato ai volumi. Per il 1937 cfr. pagg. 88* e 89*.

9. — Per i dati meteorologici mensili nel 1937, cfr.: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Annuario Statistico Italiano, Anno 1938-XVI*, IV Serie, Vol. V, pagg. 1-7.

10. — Per le notizie esistenti presso l'Istituto Centrale di Statistica e non pubblicate vedi l'elenco a pagina seguente.

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte e dizionario delle malattie* — 5ª edizione - Roma, Tipografia Ippolito Failli - 1936-XIV, pag. 44 e seguenti.

(b) Le notizie sulle variazioni territoriali delle circoscrizioni amministrative del Regno sono contenute in appositi volumi pubblicati periodicamente.

(c) I criteri e i metodi seguiti per calcolare la popolazione nell'intervallo fra i censimenti sono generalmente indicati nei volumi sul movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile.

NOTIZIE ESISTENTI PRESSO L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E NON PUBBLICATE
sulla Statistica delle «Cause di Morte» nell'anno 1937

L'Istituto Centrale di Statistica fornisce, dietro richiesta, le notizie non pubblicate, contro il semplice rimborso delle spese vive: di copiatura, di collazionatura, di eventuale elaborazione e di posta.

Nella colonna 3 sono indicate le Circostrizioni territoriali alle quali i dati si riferiscono. Per rendere più agevole la ricerca delle Circostrizioni territoriali, queste sono state contraddistinte con un numero progressivo secondo l'ordine indicato qui di seguito.

Numero d'ordine delle Circostrizioni territoriali


- | | |
|---|---|
| 1 — Singoli Comuni. | 9 — Compartimento. |
| 2 — Singoli Capiluoghi di Provincia. | 10 — Complesso dei 94 Comuni Capiluoghi di Provincia. |
| 3 — Complesso dei Comuni della Provincia (escluso il Capoluogo di Provincia). | 11 — Complesso dei Comuni del Regno (esclusi i Capiluoghi di Provincia). |
| 4 — Classi di Comuni della Provincia (a). | 12 — Singoli Comuni con oltre 100.000 abitanti. |
| 5 — Provincia. | 13 — Ripartizione geografica. |
| 6 — Complesso dei Capiluoghi di Prov. del Compartimento. | 13 bis — Complesso dei Capiluoghi e altri Comuni per Ripartizione geografica. |
| 7 — Complesso dei Comuni del Compartimento (esclusi i Capiluoghi di Provincia). | 14 — Classi di Comuni del Regno (a). |
| 8 — Classi di Comuni del Compartimento (a). | 15 — Regno. |

AVVERTENZA — Le notizie non pubblicate si riferiscono a tutti i dati contenuti nelle tavole.

1	2	3
N. Tavole	NOTIZIE CONTENUTE NELLE TAVOLE (*)	Circostrizioni territoriali (*)
1	Morti, distinti secondo 200 cause di morte	5 . . . 9 . . . 13 . 15
	con distinzione di sesso	5 . . . 9 . . . 13 . 15
2	Morti, classificati secondo le cause di morte (nom. abbreviata), nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno 6 7 . . 10 11 . . . 15
	con distinzione di sesso	2 3 . . 6 . . 10 . . . 15
3	Morti, classificati per cause (nom. abbreviata) e classi di Comuni con distinzione di sesso 5 14 15
4	Morti, nei Comuni con più di 100.000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, classificati secondo le cause di morte (nom. abbreviata) 12
	con distinzione di sesso 12
5	Morti, classificati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso 13 . 15
6	Bambini morti nel primo anno di vita classificati secondo le cause, l'età ed il sesso 13 . 15
7	Bambini, morti nel primo anno di vita, classificati secondo le cause di morte (nom. dettagliata), l'età e la filiazione 15
	con distinzione di sesso 13 . 15
8	Bambini, morti nel primo anno di vita, nei singoli Compartimenti, distinti secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso 9 15
	con distinzione di sesso 9 15
9	Bambini, nati da parti multipli, morti nel primo mese di vita, classificati per alcune cause di morte, sesso, età e filiazione 13 . 15
10	Bambini morti nella prima settimana di vita, classificati secondo le cause di morte (nom. dettagliata), l'età ed il sesso 13 . 15
11	Morti, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte (nom. intermedia), la professione o condizione ed il sesso 13 . 15
12	Morti, per gruppi di età da 15 anni in poi, classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso 13 . 15
13	Morti, classificati secondo le cause di morte (nom. abbreviata), con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno 9 15
	non distinzione di sesso 9 15
14	Morti, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte (nom. abbreviata), lo stato civile ed il sesso 13 . 15
17	Morti, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno 13 . 15
	con distinzione di sesso 13 . 15
18	Morti, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, il sesso e il mese in cui avvenne la morte 9 15
20	Morti per suicidio, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso 9 15
22	Nati morti legittimi, da madri che presumibilmente non ebbero figli prima dell'attuale matrimonio, per cause, età della madre al parto e ordine di generazione: 15
	da parti semplici 15
	con distinzione di sesso 13bis 15
	da parti multipli 15
	con distinzione di sesso 15

(*) Le notizie non pubblicate e i numeri corrispondenti alle Circostrizioni territoriali per le quali si hanno notizie inedite, sono in carattere neretto.

(a) Le classi di Comuni sono: 1) meno di 2.000 abit.; 2) da 2.000 a 4.999 abit.; 3) da 5.000 a 9.999 abit.; 4) da 10.000 a 19.999 abit.; 5) da 20.000 a 49.999 abit.; 6) da 50.000 a 99.999 abit.; 7) da 100.000 abit. e più.



INTRODUZIONE

CAPO I.

CAUSE DELLE MORTI.

§ 1. — **Cause delle morti avvenute nel Regno negli anni 1935, 1936 e 1937.** — Nel 1937 le cause delle morti furono specificate dai medici curanti o necroscopi per 614.501 casi e restarono ignote per 919, cioè 15 casi su 10.000. Il numero dei morti per causa non specificata, per la maggiore cura posta dai medici nel compilare la scheda e per la più accurata revisione fatta dall'Istituto Centrale di Statistica delle schede mod. *B* e *B-bis*, è andato notevolmente diminuendo dopo il 1925.

Nel prospetto I sono indicate, in cifre assolute e in cifre proporzionali ad un milione di abitanti, le morti avvenute nel Regno, negli anni 1935, 1936 e 1937, classificate secondo la nomenclatura nosologica intermedia stabilita a Parigi nel 1929. Le cifre contenute in detto prospetto e quelle relative agli anni 1931, 1932, 1933 e 1934 che si trovano nella Parte I dei rispettivi volumi della Statistica delle cause di morte, costituiscono una nuova serie di dati e sono comparabili alle analoghe, contenute nei volumi precedenti dal 1887 al 1930, solo per alcune voci. Il lettore, che vorrà rendersi un conto più esatto della comparabilità dei dati della nuova serie con quelli della serie dal 1924 al 1930, potrà consultare le tabelle allegate alla Introduzione sulla Statistica delle Cause di morte per gli anni 1931 e 1932 (*).

Dal prospetto I si rileva che le malattie che diedero, nel 1937, i più alti quozienti di mortalità, furono, in ordine decrescente: *polmoniti; emorragia, embolia e trombosi cerebrale; enteriti (al disotto di due anni); cancri ed altri tumori maligni; tubercolosi dell'apparato respiratorio; malattie del miocardio; endocarditi croniche; nefriti; bronchiti; altre malattie del cuore; morti accidentali; arteriosclerosi e gangrena; influenza; nascita prematura; debolezza congenita; enteriti ed ulceri intestinali (2 anni ed oltre); ogni altra forma di tubercolosi*; con andamento pressochè analogo a quello dell'anno precedente.

Si esclude la *senilità*, in quanto in essa possono addensarsi cause di morte non bene specificate.

(*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle cause di morte negli anni 1931 e 1932*, Parte I — Introduzione - Allegato I a pag. 133* e Allegato II a pag. 146* — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1935-XIII.

PROSPETTO 1. — Morti avvenute nel Regno (*), negli anni 1935, 1936 e 1937, classificate secondo le cause.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CIFRE ASSOLUTE			CIFRE PROPORZIONALI A 1.000.000 DI ABITANTI		
		1935	1936	1937	1935	1936	1937
	I. - Malattie infettive e parassitarie	75.686	70.833	74.240	1.768	1.649	1.711
1, 2	Febbre tifoidea e paratifi	5.228	3.839	5.111	122	89	118
3	Tifo petecchiale	3	3	2
6	Vaiolo, vaioloide, ecc.	1	—	1	..	—	..
7	Morbillo	2.420	1.966	2.137	57	46	49
8	Scarlattina	1.220	571	289	28	13	7
9	Tosse convulsa	1.922	2.372	2.740	45	55	63
10	Difterite	2.916	2.571	2.748	68	60	63
11	Influenza	11.704	10.675	12.110	273	248	279
13	Dissenteria	367	271	398	9	6	9
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	28.032	27.856	27.448	655	648	632
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	10.005	9.640	9.742	234	224	224
34	Sifilide	1.815	1.759	1.911	42	41	44
36	Infezione purul. e settic., non puerp.	3.693	3.543	4.014	86	82	92
38	Malaria	1.693	1.291	1.032	40	30	24
dal 39 al 42	Malattie dovute a protozoi od elminti	706	672	772	16	16	18
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre malattie infettive e parassitarie	3.961	3.804	3.785	93	88	87
	II. - Tumori (neoplasie)	36.429	37.699	38.941	851	877	897
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni	35.045	36.087	37.020	818	839	853
54, 55	Tumori non maligni (b)	1.384	1.612	1.921	32	37	44
	III. - Malattie reumatiche, (c)	10.511	10.240	10.772	245	238	248
56	Reumatismo articolare acuto	2.487	2.348	2.615	58	55	60
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	1.414	1.373	1.487	33	32	34
59	Diabete mellito	4.358	4.288	4.245	102	100	98
dal 60 al 64	Avitaminosi	634	643	714	15	15	16
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat.	582	568	613	14	13	14
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali	1.036	1.020	1.098	24	24	25
	IV. - Mal. del sangue e org. ematopoietici	2.953	3.030	3.202	69	70	74
71	Anemie perniciose ed altre	1.151	1.127	1.239	27	26	29
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie (d)	1.802	1.903	1.963	42	44	45
	V. - Avvelenamenti cronici e intossicaz.	601	596	634	14	14	15
75	Alcoolismo acuto e cronico	540	560	582	13	13	13
76, 77	Altri avvelenamenti cronici	61	36	52	1	1	1
	VI. - Mal. del sist. nervoso e org. dei sensi	73.144	73.358	73.922	1.708	1.706	1.703
79	Meningite semplice	2.683	2.859	2.691	63	66	62
80	Atassia locomotrice progressiva	294	323	299	7	8	7
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebrale	57.539	57.919	57.712	1.344	1.347	1.330
83	Paralisi progressiva degli alienati	792	824	769	18	19	18
84	Demenza precoce ed altre psicosi	1.253	1.283	1.567	29	30	36
85	Epilessia	1.555	1.476	1.413	36	34	33
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	8.132	7.802	8.482	190	181	195
88, 89	Mal. occhio, orecchio e annessi	896	872	989	21	20	23
	VII. - Malattie dell'apparato circolatorio	81.336	86.349	86.751	1.900	2.008	1.999
90	Pericardite	204	231	241	5	5	6
91	Endocardite acuta	518	551	541	12	13	12
92	Endocardite cronica, (e)	21.699	23.327	22.458	507	543	517
93	Malattie del miocardio	23.999	25.161	27.318	561	585	629
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris	3.566	3.772	3.807	83	88	88
95	Altre malattie del cuore	15.162	16.238	16.216	354	378	374
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	775	730	643	18	17	15
97, 98	Arteriosclerosi (f) e cangrena	13.618	14.578	13.585	318	339	313
dal 99 al 103	Altre mal. dell'apparato circolatorio	1.795	1.761	1.942	42	41	45

(*) Non compresi i militari e gli operai deceduti nell'Africa Orientale Italiana (A.O.I.) e nella Spagna (O.M.S.) il cui numero desunto dai bollettini pubblicati sui quotidiani è stato: nel 1935 di 390 militari e 259 operai in A.O.I.; nel 1936 di 3017 militari e 626 operai in A.O.I.; nel 1937 di 752 militari e 794 operai in A.O.I. e 1233 militari in O.M.S. Inoltre, nel numero dei morti del 1936 non sono compresi 37 morti (maschi) nel Comune di Anzio (Roma) nel periodo 21 aprile-31 dicembre, le cui schede di morte pervennero in ritardo.

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (d) ed altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici. (e) comprese le affezioni valvolari. (f) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

Segue: PROSPETTO 1. — Morti avvenute nel Regno (*), negli anni 1935, 1936 e 1937, classificate secondo le cause.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CIFRE ASSOLUTE			CIFRE PROPORZIONALI A 1.000.000 DI ABITANTI		
		1935	1936	1937	1935	1936	1937
	VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio	108.393	113.512	115.920	2.532	2.640	2.671
106	Bronchiti	16.484	17.151	18.412	385	399	424
107, 108, 109	Polmoniti	82.797	86.679	87.094	1.934	2.016	2.007
110	Pleuriti	2.696	2.761	2.990	63	64	69
104, 105, dal 111 al 114	Altre mal. dell'appar. respiratorio, (a)	6.416	6.921	7.424	150	161	171
	IX. - Malattie dell'apparato digerente	78.649	70.736	82.337	1.837	1.645	1.897
117	Ulcera dello stomaco e del duodeno	2.782	3.073	3.050	65	71	70
119	Enteriti al disotto di due anni	46.097	37.907	47.492	1.077	882	1.094
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni ed oltre)	9.365	8.792	9.752	219	204	225
121	Appendicite	2.800	2.767	2.981	65	64	69
122	Ernia, occlusione intestinale	4.436	4.376	4.619	104	102	106
124	Cirrosi del fegato	4.898	5.237	5.247	114	122	121
125, 126, 127	Altre mal. fegato e vie biliari, (b)	3.041	3.260	3.361	71	76	77
115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente	5.230	5.324	5.835	122	124	134
	X. - Mal. dell'apparato urinario e genit.	23.269	23.551	25.029	543	548	577
130, 131, 132	Nefriti	17.648	17.504	18.688	412	407	431
133	Altre malattie dei reni, (c)	1.028	1.059	1.189	24	25	27
134	Calcolosi delle vie urinarie	480	515	549	11	12	13
136	Mal. della vescica, esclusi i tumori	1.355	1.429	1.551	32	33	36
136	Mal. dell'uretra, ascesso urinoso, ecc.	187	247	199	4	6	5
137	Malattie della prostata	2.144	2.405	2.456	50	56	57
138, 139	Malattie degli organi genitali, (d)	427	392	397	10	9	9
	XI. - Mal. della gravid., parto e puerperio	3.017	2.883	2.725	70	67	63
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza	249	206	192	6	5	4
144	Emorragia puerperale	512	501	512	12	12	12
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali	1.253	1.183	1.052	29	28	24
146, 147	Tossiemia della gravidanza, (e)	564	574	531	13	13	12
148, 149, 150	Altre malattie puerperali	439	419	438	10	10	10
	XII. - Mal. pelle e del tessuto cellulare	2.381	2.356	2.521	56	55	58
151, 152, 153	Mal. pelle e del tessuto cellulare	2.381	2.356	2.521	56	55	58
	XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.	1.085	1.021	1.124	25	24	26
154, 155, 156	Mal. ossa e organi della locomoz. (f)	1.085	1.021	1.124	25	24	26
	XIV. - Vizi di conformazione congeniti	2.873	2.938	3.212	67	68	74
157	Vizi di conformazione congeniti (g)	2.873	2.938	3.212	67	68	74
	XV. - Malattie dell'infanzia	27.878	26.166	28.449	651	609	655
158	Debolezza congenita	11.203	10.318	10.565	262	240	243
159	Nascita prematura (g)	9.812	9.528	10.933	229	222	252
160	Conseguenze del parto (g)	814	890	1.096	19	21	25
161	Altre malattie speciali dell'infanzia	6.049	5.430	5.855	141	126	135
	XVI. - Senilità	40.726	41.059	42.092	951	955	970
162	Senilità	40.726	41.059	42.092	951	955	970
	XVII. - Morti violente o accidentali	19.159	17.983	18.581	447	418	428
dal 163 al 171	Suicidio	3.267	3.399	3.291	76	79	76
dal 172 al 175	Omicidio	821	861	769	19	20	18
dal 176 al 194	Morti accidentali	15.000	13.609	14.391	350	317	332
195	Altre morti violente (h)	67	104	114	2	2	3
196, 197	Ferite di guerra (i)	—	3	4	—	—	—
198	Esecuzione giudiziaria	4	7	12	—	—	—
	Totale dei morti per causa determinata	588.090	584.310	610.452	13.735	13.591	14.065
	XVIII. - Cause di morte non determinate	5.863	5.326	4.968	137	124	114
199, 200	Morte improv. e cause non spec. o mal definite	5.863	5.326	4.968	137	124	114
	TOTALE GENERALE	593.953	589.636	615.420	13.872	13.715	14.179

(*) Vedi la corrispondente nota (*) a pagina precedente.

(a) esclusa la tubercolosi. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria, eclampsia, ecc. (f) esclusa la tubercolosi ed il reumatismo. (g) esclusi i nati morti. (h) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (i) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

§ 2. — **Intensità e frequenza di alcune cause di morte.** — Come negli anni precedenti, viene illustrato l'andamento della mortalità per alcune principali cause di morte (vedi indice preposto al presente volume) e della maggior parte di esse, analogamente a ciò che è stato fatto nella parte I del volume sulla Statistica delle cause di morte negli anni 1931 e 1932, sono stati calcolati i quozienti specifici per sesso e per età (1). Si rimanda il lettore, per maggiori particolari (comparazione nel tempo e nello spazio della mortalità per le suddette cause) al volume riguardante la statistica delle cause di morte nell'anno 1933 (2), facendo notare che, nelle pagine che seguono, i commenti sono generalmente limitati, per brevità, al solo confronto, nel tempo, fra il triennio 1935-37 ed il periodo base 1900-02 e, nello spazio, per il solo triennio 1935-37.

Nel prospetto 53 risultano i quozienti di letalità per alcune malattie infettive soggette a denuncia, ottenuti mettendo a confronto il numero dei casi denunciati, comunicati dal *Ministero dell'Interno — Istituto di Sanità Pubblica — Sezione di epidemiologia*, col numero dei morti.

A proposito di tali quozienti, è bene tener presente che, in quei casi in cui la malattia assume un andamento benigno, il che particolarmente può avvenire per il morbillo, per la tosse convulsa, per l'influenza e per la malaria, fra le malattie qui considerate, può non essere richiesta l'opera del medico, nè mancano casi nei quali la denuncia non viene fatta. Ne deriva che le denunce registrate possono essere inferiori ai casi realmente verificatisi, e quindi la letalità indicata essere superiore alla reale.

Morbillo. — La mortalità nel Regno nei vecchi confini, prendendo a base quella del 1900-02, è diminuita nel triennio 1935-37 dell'80 %, ed anche nei singoli Compartimenti essa, nel 1935-37, è inferiore, in modo più o meno sensibile, a quella del periodo base.

La mortalità del triennio 1935-37 è stata superiore a quella media del Regno in 9 Compartimenti (Lombardia, Venezia Giulia e Zara, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Lucania, Calabrie e Sardegna).

Il *morbillo* dà il massimo numero delle morti nei primi dieci anni di vita. Nelle età successive i casi di morte si vanno facendo sempre più rari in relazione alla minore frequenza dei casi di malattia in tali età. Nell'anno 1937, la mortalità per questa infezione, nel primo anno di vita, è stata superiore negli illegittimi (7,5 su 10 000 nati vivi) in confronto ai legittimi (4,4). La letalità, ottenuta ragguagliando il numero delle morti attribuite a tale infezione al numero dei casi denunciati alle Autorità sanitarie, è stata, nel 1937, del 3,0 %, segnando un lieve aumento a confronto di quella dell'anno precedente (*).

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per età e sesso (prospetto 3), si nota che la mortalità per *morbillo* è particolarmente intensa fino all'età di quattro anni: nei primi tre anni di vita si presenta costantemente superiore nei maschi, mentre nelle età successive accade, generalmente, il contrario: nel complesso delle

(1) Nello stabilire i gruppi di età per il calcolo della mortalità, si è tenuto conto delle conoscenze acquisite circa la maggiore o minore frequenza delle singole cause di morte nelle varie età: ne consegue che la comparabilità dei quozienti di mortalità, relativi ai singoli gruppi di età, sussiste soltanto in corrispondenza a uno stesso intervallo di tempo o ad intervalli di tempo di eguale durata.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle Cause di morte nell'anno 1933*, Parte I - Introduzione — Roma, Tipografia Operaia Romana, 1936-XIV, pag. 7* e segg.

(*) Vedi a tale proposito quanto è detto nel 3° Capoverso del § 2.

età note, la mortalità dei maschi è sempre superiore a quella delle femmine, ed essa presenta una notevole diminuzione nei trienni 1920-22, 1930-32 e 1935-37 rispetto ai due primi periodi considerati, specialmente nei primi dieci anni di vita.

PROSPETTO 2. — **Mortalità per morbillo.**
(*medie annuali*)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	
Piemonte	22,7	12,6	5,1	3,9	1,5	55	23	17	7	91	51	51	39	31	
Liguria	23,9	12,4	4,1	2,5	1,4	52	17	10	6	96	50	41	25	27	
Lombardia	30,5	29,5	9,2	8,5	5,6	96	30	28	18	122	119	93	85	111	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	3,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	34	23	
Veneto	21,3	12,9	4,5	5,9	3,5	61	21	28	16	85	52	46	59	69	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	7,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	71	123	
Emilia	17,3	21,0	5,7	6,6	3,3	121	33	38	19	69	85	57	66	64	
Toscana	17,5	13,4	8,0	4,4	2,1	77	46	25	12	70	54	80	44	41	
Marche	19,4	11,1	6,6	4,8	4,2	57	34	25	21	78	45	66	48	82	
Umbria	16,2	12,8	8,1	3,0	2,9	79	50	19	18	65	52	81	30	57	
Lazio	44,9	38,9	18,2	13,7	7,3	87	41	31	16	180	157	182	137	144	
Abruzzi e Molise	24,7	23,7	11,4	11,1	7,1	96	46	45	29	99	96	115	111	140	
Campania	34,6	25,4	12,2	14,6	7,3	74	35	42	21	138	103	122	146	144	
Puglie	23,5	58,5	17,1	27,9	12,7	249	73	119	54	94	236	171	279	252	
Lucania	76,6	51,9	38,0	33,9	16,3	68	50	44	21	307	210	380	339	323	
Calabrie	28,3	34,3	21,3	9,5	7,4	121	75	34	26	113	139	213	95	146	
Sicilia	18,5	31,4	9,6	14,1	3,0	170	52	77	16	74	127	96	141	60	
Sardegna	10,7	22,3	17,4	13,9	5,5	208	162	130	51	43	90	174	139	108	
REGNO { vecchi confini	25,0	24,8	10,0			99	40	41	20	100	100	100			
{ attuali confini				10,0	5,1								100	100	

PROSPETTO 3. — **Quozienti specifici di mortalità per morbillo.**
(*Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso*)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (b)	155,9	136,2	146,3	129,1	123,2	126,2	66,8	61,0	63,4	87,7	75,4	81,7	50,7	42,1	46,5
1 anno	178,4	153,7	166,3	151,9	143,4	147,7	77,1	71,2	74,2	91,2	77,5	84,5	52,8	43,3	48,1
2 anni	330,3	293,3	312,2	361,4	324,3	343,2	138,7	134,5	136,7	187,4	168,8	178,3	110,7	90,1	100,6
3 »	194,0	187,0	190,6	200,8	200,6	200,7	108,5	99,4	104,1	84,6	89,3	82,5	40,4	38,8	39,6
4 »	109,9	113,0	111,4	116,9	120,6	118,7	63,0	64,0	63,5	37,0	39,0	38,0	19,4	21,3	20,3
5-9 »	70,2	74,6	72,4	69,9	70,0	70,0	39,4	43,6	41,4	21,5	21,4	21,4	12,3	11,5	11,9
10-14 »	20,8	22,1	21,4	18,4	20,1	19,3	10,4	11,5	10,5	5,5	7,2	6,3	3,9	3,7	3,8
15-19 »	2,8	3,1	3,0	2,0	2,7	2,5	1,8	1,8	1,8	1,3	1,4	1,3	0,6	0,7	0,6
20-24 »	1,1	1,7	1,4	0,7	1,1	0,9	1,2	0,7	1,0	0,4	0,8	0,6	0,4	0,5	0,4
25-44 »	1,2	1,2	1,2	1,4	0,9	1,1	1,3	0,6	1,0	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4
45-60 »	0,5	0,7	0,6	0,3	0,4	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45-60 »	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	..	0,1	0,1
TOTALE (c)	26,3	23,7	25,6	26,2	23,5	24,8	10,5	9,5	10,0	10,7	9,3	10,0	5,6	4,6	5,1

(a) Per la Venezia Tridentina e per la Venezia Giulia e Zara, si conosce il numero dei morti per le singole cause soltanto dal 1924 in poi.
 (b) Le cifre in carattere tondo sono state calcolate mettendo in rapporto il numero dei morti durante il triennio, in età a meno di 1 anno, con una media aritmetica ponderata dei nati vivi nel triennio e nell'anno precedente. La media ponderata si è ottenuta dando il peso uno ai nati vivi nell'anno precedente il triennio, il peso tre al primo e secondo anno del triennio, il peso due all'ultimo anno del triennio. Ciò, partendo dall'ipotesi che i morti in ciascun anno di calendario derivino per il 66,6% dai nati dell'anno osservato e per il 33,3% dai nati dell'anno precedente. Cfr., a tale proposito, *Movimento della popolazione* nell'anno 1932, a pag. 71* e seguenti.
 (c) Esclusa l'età ignota.

Scarlattina. — La mortalità nel Regno, nei vecchi confini, è diminuita del 60 % nel triennio 1935-37 in confronto a quella del periodo base 1900-02 e ciò è dovuto all'esiguo numero di casi di morte verificatisi nel 1936 e specie nel 1937 (1); però i singoli Compartimenti non presentano tutti una diminuzione, perchè nel Lazio, Campania e, specialmente, nella Sardegna, la mortalità del triennio 1935-37 è stata superiore a quella del periodo base, fatto che si deve attribuire a ricorsi epidemici di speciale gravità, avvenuti nel 1935 ed in misura minore nel 1936 in tali Compartimenti.

PROSPETTO 4. — Mortalità per scarlattina.
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	1,0	1,6	0,8	0,6	0,8	155	75	55	74	25	20	15	13	47	
Liguria	3,6	1,6	0,9	0,6	0,6	44	25	17	17	88	20	17	15	38	
Lombardia	0,7	1,7	2,9	0,7	0,5	225	389	93	67	18	21	55	16	31	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	2,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	61	56	
Veneto	2,6	3,1	0,7	1,1	0,5	117	26	43	18	64	39	13	26	29	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	59	36	
Emilia	2,0	3,2	1,4	0,8	0,5	159	68	40	23	50	40	26	19	29	
Toscana	4,4	1,9	0,9	0,7	0,5	43	20	17	20	106	23	17	17	54	
Marche	4,4	1,8	2,5	1,4	0,6	41	57	32	14	108	23	48	33	39	
Umbria	1,0	2,2	11,7	1,3	0,5	208	1.110	124	27	26	27	219	30	17	
Lazio	1,3	3,5	32,0	11,3	4,4	278	2.562	902	356	30	43	603	261	276	
Abruzzi e Molise	5,7	8,7	5,2	3,5	2,6	154	92	62	46	138	108	98	81	161	
Campania	5,1	8,1	4,0	4,2	6,1	158	79	82	120	124	100	76	97	380	
Puglie	11,9	11,1	15,0	5,9	0,8	94	126	49	6	289	138	283	136	47	
Lucania	14,9	11,4	6,2	22,7	2,1	77	42	153	14	362	141	117	526	134	
Calabria	16,3	31,1	5,8	22,2	0,8	191	35	137	5	396	386	108	514	53	
Sicilia	4,1	32,5	10,1	7,5	0,5	796	247	185	23	99	403	190	174	58	
Sardegna	0,3	0,2	0,1	16,1	7,3	92	48	6.452	2.928	6	3	2	373	455	
REGNO { vecchi confini	4,1	8,1	5,3			196	129	107	40	100	100	100			
REGNO { attuali confini				4,3	1,6								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag 5*.

In confronto della mortalità media del Regno nel triennio 1935-37, hanno segnato numeri indici superiori, i Compartimenti del Lazio, degli Abruzzi e Molise, della Campania, della Lucania e della Sardegna, e fra questi, in ispecial modo, la Campania e la Sardegna.

La scarlattina, come il morbillo, dà il massimo numero dei morti nei primi dieci anni di vita; la mortalità nel primo anno di vita, nel 1937, è stata lievemente superiore negli illegittimi (0,5 su 10.000 nati vivi) in confronto ai legittimi (0,2); infine, la letalità per tale infezione, nel Regno, è stata, nel 1937, dell'1,8 % (*).

(1) Le morti per scarlattina nel 1937 furono solo 289, di gran lunga inferiori a quelle del 1935 (1220) e del 1936 (571). Data tale diminuzione sono state eseguite ricerche speciali su una parte di schede di morte relativa alle *nefriti acute* senza che risultassero elementi che potessero giustificare l'ipotesi di un cambiamento di criterio nella classificazione. Nella impossibilità di estendere tali ricerche a tutto il materiale è necessario fare qualche riserva sulle cifre del 1937, tanto più che, come risulta dal prospetto 53, alla diminuzione del numero delle morti fa riscontro un aumento delle denunce.

(*) Cfr. la nota (*) a pag. 4*.

Esaminando i quozienti specifici per sesso ed età (prospetto 5), si rileva che i quozienti relativi ai primi cinque anni di vita, salvo rare eccezioni, sono notevolmente più alti che nelle età successive, nelle quali generalmente diminuiscono col crescere delle età. La mortalità nei maschi è, si può dire, costantemente superiore a quella delle femmine nei primi cinque anni di vita. In ogni classe di età, salvo da 45 anni in su, la mortalità nel triennio 1910-12, supera, sia per i maschi che per le femmine, quella degli altri periodi considerati.

Anche nel 1920-22 la mortalità si mantenne alta, quantunque inferiore a quella del 1910-12, in ogni classe di età, e fu superiore o uguale a quella del triennio 1930-32, salvo un'eccezione per i maschi da 25 a 44 anni. Nel 1935-37 la mortalità è diminuita, ed in modo specialmente notevole nei primi 10 anni di vita, per ciascun sesso ed in tutti i gruppi di età presi in considerazione, a confronto del triennio 1930-32, eccetto nei maschi di 45 anni ed oltre, in cui risulta uguale.

PROSPETTO 5. — Quozienti specifici di mortalità per scarlattina.
(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
menodi 1 anno (a)	11,4	10,1	10,8	17,7	15,1	16,4	15,3	12,8	14,1	11,8	8,3	10,1	4,3	4,7	4,5
1 anno	13,1	11,4	12,3	20,8	17,5	19,2	18,0	15,0	16,5	12,3	8,6	10,5	4,5	4,8	4,6
2 anni	26,4	24,1	25,2	52,2	43,0	47,6	41,5	33,1	37,4	36,9	30,5	33,8	12,7	11,7	12,2
3 »	26,0	22,0	24,0	57,5	49,0	53,3	54,5	45,4	50,0	34,8	34,8	34,8	12,6	10,8	11,7
4 »	25,9	20,9	23,4	52,9	48,6	50,8	48,3	46,9	47,7	30,1	30,5	30,3	10,5	9,8	10,1
5-9 »	23,7	22,4	23,1	40,3	39,7	40,0	37,7	33,3	35,5	23,0	22,5	22,8	10,3	8,6	9,5
10-14 »	9,1	8,9	9,0	16,7	17,9	17,3	12,1	13,1	12,6	8,6	9,4	9,0	3,8	4,3	4,1
15-19 »	2,1	2,3	2,2	4,2	5,3	4,8	2,6	2,8	2,7	1,7	2,8	2,2	0,9	1,3	1,1
20-24 »	0,8	0,9	0,9	2,4	2,4	2,4	1,1	1,6	1,4	0,9	1,2	1,0	0,5	0,5	0,5
25-44 »	0,5	0,7	0,6	1,7	1,3	1,5	0,5	1,0	0,8	0,5	0,9	0,7	0,2	0,3	0,2
45-60 »	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	0,5	0,2	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
45-60	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
TOTALE (b)	4,4	3,9	4,1	8,5	7,6	8,1	5,6	5,1	5,3	4,5	4,2	4,3	1,7	1,6	1,6

(a) Cfr. la nota (b) a pag. 5*.

(b) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

Febbre tifoidea e paratifo — La mortalità è diminuita, in misura più o meno notevole, nel triennio 1935-37 in confronto a quella del periodo base 1900-02, sia nel Regno nei vecchi confini, sia nei singoli Compartimenti. La diminuzione nel Regno è stata del 72 %.

Detta mortalità, inoltre, si dimostra, nel triennio 1935-37, nei Compartimenti della Lombardia, del Lazio, degli Abruzzi e Molise, della Campania, delle Puglie, della Lucania e della Sicilia, superiore a quella media del Regno.

La febbre tifoidea ed il paratifo danno nelle età giovanili da 10 a 24 anni il massimo numero delle morti che diminuisce notevolmente nelle età successive; nel 1937, fra gli illegittimi nel primo anno di vita, non si è verificato alcun caso di morte, mentre nei legittimi la mortalità è stata di 0,2 su 10.000 nati vivi.

La letalità per febbre tifoidea e paratifo nel Regno, è stata, nel 1937, del 13,6 per cento (*).

(*) Cfr. la nota (*) a pagina 4*.

Esaminando i quozienti specifici per sesso e per età (prospetto 7), si nota che la mortalità più alta — salvo un'eccezione per la classe di età 0-4 nel 1900-02 — si riscontra nelle classi di età da 15 a 24 anni: nel complesso delle età note è sempre superiore nelle femmine, così pure, in genere, nei singoli gruppi di età.

PROSPETTO 6. — Mortalità per febbre tifoidea e paratifo.

(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932 (*)	1935- 1937 (*)	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	18,6	15,6	19,6	10,9	7,5	84	105	58	40	47	62	78	71	68	
Liguria	16,0	15,0	17,2	13,2	6,7	94	108	82	42	41	59	68	86	61	
Lombardia	42,2	31,2	41,3	19,8	13,8	74	98	47	33	108	124	164	130	125	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	9,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	61	78	
Veneto	34,2	26,8	26,3	15,8	10,8	78	77	46	32	87	106	104	103	98	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	10,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	66	50	
Emilia	28,9	21,0	22,0	14,7	7,9	73	76	51	27	74	83	87	97	72	
Toscana	43,0	22,8	22,5	11,9	6,1	53	52	28	14	110	90	89	78	55	
Marche	34,3	25,4	27,8	16,5	10,2	74	81	48	30	88	101	110	108	93	
Umbria	40,0	37,1	32,9	22,5	9,8	93	82	56	24	102	147	131	148	89	
Lazio	41,1	29,5	22,8	13,0	16,2	72	55	32	39	105	117	91	86	147	
Abruzzi e Molise	45,0	32,6	28,3	22,4	14,5	72	63	50	32	115	129	112	147	132	
Campania	35,0	18,4	17,0	16,0	13,3	53	49	46	38	89	73	68	105	121	
Puglie	64,9	25,3	18,2	17,5	13,9	39	28	27	21	166	100	72	115	127	
Lucania	37,5	19,8	25,2	18,4	12,0	53	67	49	32	96	79	100	121	109	
Calabria	44,2	26,0	26,4	13,6	9,6	59	60	31	22	113	103	105	89	87	
Sicilia	61,9	35,7	23,5	14,0	12,7	58	38	23	20	158	141	93	92	115	
Sardegna	16,3	13,1	25,8	11,4	7,3	81	158	70	45	42	52	102	75	66	
REGNO { vecchi confini	39,2	25,2	25,2			64	64	39	28	100	100	100			
{ attuali confini				15,2	11,0								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

PROSPETTO 7. — Quozienti specifici di mortalità per febbre tifoidea e paratifo.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32 (*)			1935-37 (*)		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-4 anni	63,4	64,0	63,7	30,5	28,9	29,7	21,9	21,3	21,6	10,7	11,3	11,0	7,6	7,5	7,6
5-9 »	34,9	43,1	38,9	22,0	25,6	23,8	19,3	24,8	22,0	12,2	16,3	14,2	10,3	12,8	11,5
10-14 »	29,5	41,1	35,2	21,3	29,6	25,4	22,6	33,1	27,7	15,5	20,9	18,1	11,5	14,5	13,0
15-19 »	49,0	61,9	55,5	34,9	43,3	39,3	42,9	51,5	47,2	26,6	27,9	27,3	21,1	24,7	22,8
20-24 »	55,5	55,8	55,7	46,1	38,9	42,4	28,8	44,2	36,7	23,8	25,3	24,5	14,0	18,9	16,4
25-34 »	34,4	39,9	37,2	26,9	28,9	27,9	15,8	33,2	25,1	16,6	19,4	18,0	13,2	14,2	13,7
35-44 »	23,4	27,4	25,5	17,5	19,2	18,4	15,1	23,2	19,3	7,6	12,8	10,4	6,7	9,6	8,2
45-60	24,4	22,7	23,5	14,3	13,3	13,8	16,5	16,6	16,6	8,5	9,3	9,0	5,2	5,8	5,5
TOTALE (b)	37,2	41,1	39,2	24,5	26,0	25,3	21,5	28,8	25,2	14,1	16,3	15,2	10,1	11,8	11,0

(*) Non sono compresi i casi di morte per febbre miliare (3 nel 1930, 2 nel 1931, 1 nel 1932, 5 nel 1935, 1 nel 1936 e 4 nel 1937).

(b) Esclusa l'età ignota.

Nei riguardi della mortalità per sesso, si nota, prescindendo da quella del 1900-02 per l'età 0-4 anni, che il massimo si verifica per le femmine in età da 15 a 19 anni in tutti i periodi considerati, mentre, per i maschi, si riscontra nell'età 20-24 per i trienni 1900-02 e 1910-12 e nell'età 15-19 per i trienni 1920-22, 1930-32 e 1935-37 (1).

La mortalità complessiva dei maschi dal periodo 1900-02, rispetto a quella degli altri trienni successivi considerati, è diminuita progressivamente e in misura notevole; lo stesso dicasi per le femmine, per le quali, però, fa eccezione il triennio 1920-1922 in cui la mortalità è stata alquanto superiore a quella del triennio 1910-12. Nei singoli gruppi di età, sia dei maschi sia delle femmine, e salvo qualche eccezione, si ha un andamento analogo a quello sopra detto.

Difterite e croup. — La mortalità ha subito nel Regno nei vecchi confini, una diminuzione del 60 % nel 1935-37 in confronto del triennio base 1900-02; e anche nei singoli Compartimenti, fatta eccezione per gli Abruzzi e Molise e la Sardegna, essa è stata inferiore a quella del periodo base.

Inoltre, la mortalità supera nel 1935-37 quella media del Regno, nella Lombardia, nel Veneto, nelle Marche, nell'Umbria, nel Lazio e negli Abruzzi e Molise.

PROSPETTO 8. — **Mortalità per difterite e croup.**
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	
Piemonte	15,3	9,3	8,1	4,5	4,3	61	53	29	28	94	80	101	57	68	
Liguria	14,6	11,4	7,3	4,3	4,7	78	50	30	32	90	98	91	55	73	
Lombardia	33,9	13,5	7,4	8,7	10,6	40	22	26	31	210	116	93	110	167	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	10,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	137-98	
Veneto	18,9	13,5	11,9	10,2	7,2	71	63	54	38	117	115	150	129	114	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	9,9	5,8	—	—	—	—	—	—	—	126	91	
Emilia	17,0	13,4	9,3	7,3	4,6	79	55	43	27	105	115	117	92	72	
Toscana	21,5	7,9	8,4	6,1	4,2	37	39	28	20	133	68	105	78	67	
Marche	8,8	11,1	8,9	11,4	8,0	126	102	130	91	54	95	112	144	125	
Umbria	15,3	8,4	12,0	9,7	8,7	55	79	63	57	95	72	151	122	136	
Lazio	10,2	14,1	9,0	11,7	7,8	138	88	115	76	63	121	113	148	122	
Abruzzi e Molise	9,0	16,0	8,2	9,9	9,9	177	91	110	109	56	137	103	126	155	
Campania	8,7	10,8	6,6	8,9	5,5	124	76	103	63	54	92	83	113	86	
Puglie	12,2	10,0	6,1	4,0	4,4	82	50	33	36	75	85	76	51	70	
Lucania	9,0	10,9	7,1	7,6	5,2	121	79	84	58	56	93	89	97	82	
Calabrie	12,4	13,2	7,7	8,4	4,9	107	63	68	40	77	113	97	107	77	
Sicilia	10,3	12,0	5,2	6,4	4,7	116	50	62	46	64	103	65	82	74	
Sardegna	5,0	7,2	6,1	7,6	6,0	144	122	151	119	31	62	77	96	93	
REGNO { vecchi confini	16,2	11,7	8,0			72	49	48	40	100	100	100			
{ attuali confini				7,9	6,4								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

(1) Su tale fatto si ritiene opportuno richiamare particolarmente l'attenzione del lettore, dato che alcuni AA. hanno ritenuto di poter attribuire alcune variazioni nell'andamento della mortalità nei maschi in età superiore ai 20 anni in confronto delle femmine, alle vaccinazioni antiftiche ed antiparatiftiche eseguite sui militari chiamati alle armi. Nel nostro R. Esercito e nella R. Armata, tale vaccinazione fu resa obbligatoria dal R. D. L. 3 gennaio 1915, n. 18, convertito nella Legge 29 marzo 1917, n. 620.

Il massimo numero di morti si ha nei primi dieci anni di vita, dopo i quali i casi di morte si vanno facendo sempre più rari; nell'anno 1937, similmente ai tre anni precedenti, la mortalità dei bambini nel primo anno di vita è stata inferiore nei legittimi (2,6 su 10 000 nati vivi) a confronto degli illegittimi (4,4).

La letalità per *difterite e croup*, è stata, nel 1937, del 9,6 % (*).

PROSPETTO 9. — **Quozienti specifici di mortalità per difterite e croup.**
(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (a)	44,7	35,4	40,2	47,6	38,2	43,0	43,2	31,6	37,6	30,8	25,9	28,4	29,8	22,0	26,0
1 anno	127,3	103,4	115,6	130,1	95,8	113,5	88,0	71,9	80,2	91,9	73,4	82,8	80,6	67,5	74,2
2 anni	123,7	102,2	113,2	94,4	79,7	87,2	74,5	58,3	66,6	63,4	59,2	61,3	52,5	46,0	49,3
3 »	107,0	94,8	101,1	71,8	62,4	67,2	68,9	57,6	63,4	54,5	46,2	50,4	48,4	41,3	44,9
4 »	82,4	84,0	83,2	57,0	50,0	53,6	50,2	42,4	46,4	43,3	39,2	41,3	34,4	33,3	33,9
5-9 »	31,5	35,2	33,3	16,6	18,1	17,3	14,8	16,5	15,6	14,8	15,3	15,0	11,9	13,6	12,7
10-14 »	6,1	7,0	6,6	3,0	2,9	3,0	3,5	3,0	3,2	3,0	3,1	3,1	2,6	2,8	2,7
15-19 »	1,4	1,5	1,4	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9	0,8
20-24 »	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,3	0,6	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
25-44 »	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
45-60 »	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
TOTALE (b)	17,1	15,2	16,2	13,0	10,4	11,7	8,8	7,2	8,0	8,6	7,2	7,9	6,8	5,9	6,4

(a) Cfr. la nota (b) a pag. 5*.

(b) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

Esaminando i quozienti specifici per sesso e per età (prospetto 9), si nota che la mortalità per questa infezione è particolarmente elevata nelle classi di età da 1 a 4 anni: nei primi cinque anni di vita è più accentuata nel sesso maschile, eccettuato nell'età di 4 anni nel 1900-02, mentre, nelle età successive, salvo eccezioni, questo rapporto si inverte: nel complesso, la mortalità, nei periodi triennali considerati, si rivela superiore nel sesso maschile.

Il massimo della mortalità si riscontra costantemente nel secondo anno di vita, sia nei maschi sia nelle femmine.

L'andamento della mortalità complessiva per difterite e croup mostra, dal triennio 1900-02 in confronto ai trienni 1910-12 e 1920-22, una progressiva e notevole diminuzione, sia nei maschi che nelle femmine, mentre la mortalità del triennio 1930-1932 è rimasta quasi uguale a quella del triennio 1920-22; nel triennio 1935-37 si nota una nuova sensibile diminuzione della mortalità a confronto del triennio 1930-32.

I singoli gruppi di età, pur presentando delle irregolarità specialmente nei maschi, seguono un andamento analogo a quello detto sopra.

Tosse convulsa. — La mortalità è diminuita, in misura più o meno notevole, nel triennio 1935-37 in confronto a quella del periodo base 1900-02, sia nel Regno nei vecchi confini, sia nei singoli Compartimenti. La diminuzione nel Regno è stata del 74 %.

(*) Cfr. la nota (*) a pagina 4*.

Nella Lombardia, Venezia Tridentina, Veneto, Emilia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Calabrie e Sardegna, detta mortalità è stata, nel triennio 1935-37, superiore a quella media del Regno.

Il massimo numero di morti per *tosse convulsa* si riscontra nei primi cinque anni di vita: nelle successive età, rarissimi sono i casi di morte; nell'anno 1937, come nei quattro anni precedenti e nei bienni 1929-30 e 1931-32, la mortalità per tale malattia nei bambini nel primo anno di vita, è stata superiore negli illegittimi (23,8 su 10.000 nati vivi) in confronto ai legittimi (14,3).

La letalità per *tosse convulsa* nel Regno, è stata, nel 1937, del 9,1 % (*).

PROSPETTO 10. — Mortalità per tosse convulsa.

(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	
Piemonte	22,7	17,7	6,0	4,9	3,2	78	27	22	14	107	97	65	73	58	
Liguria	17,3	13,1	8,4	4,6	3,1	76	48	26	18	81	72	90	69	56	
Lombardia	27,6	22,9	10,6	9,2	6,7	83	39	33	24	130	125	114	137	124	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	8,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	130	132	
Veneto	30,9	32,0	14,7	9,1	7,5	103	47	29	24	146	175	158	137	137	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	5,7	4,4	—	—	—	—	—	—	—	86	80	
Emilia	28,3	23,4	12,8	6,9	5,6	83	45	24	20	133	128	138	104	102	
Toscana	23,1	18,7	8,6	6,0	4,0	81	37	26	17	109	103	92	90	74	
Marche	22,4	22,2	11,1	6,8	6,0	99	50	30	27	106	122	120	102	110	
Umbria	23,2	15,4	9,9	8,4	6,0	66	43	36	26	109	85	106	126	110	
Lazio	12,9	16,4	8,3	5,9	5,9	127	64	46	46	61	90	89	89	108	
Abruzzi e Molise	17,6	14,6	11,7	6,6	5,8	83	66	38	33	83	80	125	99	107	
Campania	10,8	8,1	5,3	5,2	4,9	75	49	48	46	51	45	57	78	90	
Puglie	11,1	10,6	8,0	5,5	3,8	95	72	50	34	52	58	86	83	69	
Lucania	13,5	16,9	6,0	8,3	5,0	126	44	61	37	63	93	64	124	91	
Calabrie	20,8	14,9	5,8	9,1	6,0	72	28	44	29	98	82	62	137	109	
Sicilia	15,6	11,6	6,0	3,2	4,1	75	38	20	26	73	64	64	48	76	
Sardegna	33,3	26,4	19,6	10,3	12,8	79	59	31	38	157	145	210	155	234	
REGNO { vecchi confini	21,2	18,2	9,3			86	44	31	26	100	100	100			
REGNO { attuali confini				6,7	5,5								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Poliomielite anteriore acuta. — La mortalità, nel Regno nei vecchi confini, ha subito nel triennio 1935-37 un aumento del 7% in confronto a quella del periodo base 1900-02; però i singoli Compartimenti non presentano tutti un aumento perchè nel Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Campania e Puglie, la mortalità del 1935-37 è stata inferiore a quella del periodo base.

La mortalità appare, nel 1935-37, più alta di quella media del Regno, nel Lazio, Abruzzi e Molise, Lucania, Calabrie, Sicilia e Sardegna ed in special modo nelle Marche e nell'Umbria, che dimostrano un addensamento maggiore della mortalità anche nei precedenti trienni presi in considerazione.

(*) Cfr. la nota (*) a pagina 4*.

PROSPETTO 11. — Mortalità per poliomielite anteriore acuta.
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	0,6	0,6	0,9	0,7	0,4	102	161	116	65	70	57	64	71	44	
Liguria	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4	65	58	71	60	80	42	26	49	46	
Lombardia	0,5	0,6	0,9	0,7	0,6	114	169	131	116	63	57	60	72	69	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	0,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	71	12	
Veneto	1,0	1,2	1,3	0,8	0,7	123	135	82	76	122	121	93	87	88	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	40	60	
Emilia	0,8	1,1	1,2	0,7	0,6	136	144	88	71	101	111	82	77	68	
Toscana	0,7	0,8	1,3	0,9	0,7	116	200	127	99	83	77	93	91	78	
Marche	1,3	1,5	3,0	3,4	2,5	111	224	261	189	163	145	206	371	294	
Umbria	1,3	1,5	3,9	2,2	2,3	108	291	160	170	167	144	273	232	271	
Lazio	1,2	1,0	2,2	0,9	1,6	85	185	76	92	144	98	151	96	185	
Abruzzi e Molise	0,7	1,1	1,2	1,1	1,0	162	172	155	151	85	111	83	115	122	
Campania	0,8	1,0	1,5	0,9	0,7	130	186	114	92	98	102	102	97	86	
Puglie	0,9	1,4	2,0	1,1	0,7	148	213	115	78	114	135	136	114	85	
Lucania	0,4	1,1	2,1	1,2	1,1	256	520	305	268.	51	104	148	134	129	
Calabrie	1,0	1,1	1,7	1,8	1,1	112	169	173	107	126	113	119	189	128	
Sicilia	0,9	1,3	1,5	0,7	1,0	134	161	78	111	115	124	104	78	121	
Sardegna	1,0	2,0	2,4	1,0	1,5	197	241	98	144	125	197	169	106	171	
REGNO { vecchi confini	0,8	1,0	1,4			125	178	117	107	100	100	100			
REGNO { attuali confini				0,9	0,8								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Influenza. — I massimi della mortalità, nel Regno, nel periodo di tempo corso dal 1887 al 1937, si verificarono negli anni seguenti: 1918 (morti 7743 per un milione di abitanti); 1919 (881); 1920 (672); 1892 (653); 1900 (535); 1929 (482) e 1894 (472). I minimi, negli anni 1891 (10 morti per un milione di abitanti); 1889 (17); 1887 (18); 1888 (20); 1910 (81); 1893 (88); 1912 (90) e 1914 (94). Nel 1937, la mortalità per detta causa è stata di 279 per un milione di abitanti con un aumento del 13 % a confronto del 1936.

I Compartimenti in cui la mortalità raggiunse il massimo furono, nel 1937, le Puglie (45,1 su 100 000 abitanti), l'Umbria (39,6), la Sardegna (37,1), il Piemonte (35,7), le Calabrie (33,8), la Campania (30,5) e la Venezia Tridentina (30,3); i minimi si osservarono nella Venezia Giulia e Zara (11,8) e Liguria (16,0). Il numero medio giornaliero delle morti nel Regno, per il 1937, risulta maggiore nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

L'influenza dà, in genere, il massimo numero delle morti nelle età avanzate e nei primi cinque anni di vita.

Nel 1937, la mortalità per influenza nei bambini nel primo anno di vita è stata superiore negli illegittimi (21,6 su 10.000 nati vivi) in confronto dei legittimi (18,5).

La letalità per influenza, nel 1937, è stata del 9,1 % (*). Nei tredici anni in cui si conosce il numero dei casi denunciati di influenza (dal 1925 al 1937), si notano forti sbalzi nei coefficienti di letalità (vedi prospetto 53) che debbono presumersi

(*) Cfr. la nota (*) a pag. 4*.

dipendenti da un duplice ordine di cause, forse anche concomitanti, e cioè, da un andamento più benigno assunto dall'*influenza* in alcuni anni, mentre in altri l'infezione si è dimostrata più grave anche per le più frequenti complicazioni, e da una maggiore diligenza da parte dei medici nel denunciare i casi constatati. Il minimo coefficiente di letalità (6,9) si è avuto nel 1933, il massimo nel 1934 (30,1).

Sifilide. — La *sifilide* è raramente indicata come causa diretta di morte negli adulti, e quindi sfugge, in gran parte, ad una esatta rilevazione.

La mortalità per questa infezione aumentò dal 1887 al 1893 (da 64 per ogni milione di abitanti nel 1887 a 77 nel 1893, anno, quest'ultimo, in cui si è avuto il massimo quoziente fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi).

Negli anni dal 1894 al 1899 la mortalità si mantenne ancora alta, ma, a partire dal 1900 fino al 1914, diminuì sensibilmente, oscillando, in questo periodo, fra un minimo di 46 per ogni milione di abitanti nel 1909 e un massimo di 65 nel 1900.

Negli anni bellici, il quoziente di mortalità (49) fu di poco inferiore a quello verificatosi nel triennio anteguerra (51); e negli anni dal 1919 al 1930 i quozienti si ridussero ancora, oscillando fra un minimo di 31 nel 1930 (il più piccolo quoziente fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi) e un massimo di 45 nel 1925.

Negli anni 1931 e 1932, il quoziente è stato di 33 per ogni milione di abitanti; è diminuito di un punto nel 1933, è salito a 37 nel 1934 ed a 42 e 41, rispettivamente, nel 1935 e 1936. Nel 1937 il quoziente di mortalità è risultato di 44 per ogni milione di abitanti.

I Compartimenti in cui la mortalità per *sifilide* raggiunse il massimo furono, nel 1937, la Campania (9,4 su 100.000 abitanti), il Lazio (7,9) e la Venezia Giulia e Zara (7,0); i minimi si osservarono nelle Marche (1,6), nella Sardegna (2,2), nella Toscana e Umbria (2,3), nell'Emilia (2,4) e nel Veneto (2,6).

Il numero dei maschi morti per *sifilide*, negli anni 1887, 1888, 1889, 1891 e 1893, è inferiore a quello delle femmine; nel 1890 si ha lo stesso numero nei due sessi, nel 1892 e dal 1894 al 1937 il numero dei maschi è maggiore di quello delle femmine, specialmente negli anni dal 1904 in poi.

La *sifilide* dà il massimo numero delle morti nel primo anno di vita e la mortalità dei bambini al disotto di un anno di età, nell'anno 1937, è assai più alta negli illegittimi (55,1 su 10.000 nati vivi) in confronto ai legittimi (4,8), con comportamento, in genere, analogo a quello degli anni precedenti.

Tubercolosi nelle sue varie forme e sedi. — Nell'andamento della mortalità per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, prendendo come base il triennio 1887-89 (*), si possono distinguere tre periodi (vedi prospetto 12):

il primo, nel quale l'andamento può considerarsi progressivamente decrescente, va dal triennio 1887-1889 all'anno 1914, in cui il numero indice da 100 discende a 68;

il secondo, nel quale l'andamento è progressivamente crescente, va dal 1915 al 1918: in questo periodo il numero indice risale fino a 82 nel 1917 e a 98 nel 1918,

(*) Nel formare i valori medi, si sono compresi fra i morti per *tubercolosi*, per tutti gli anni del periodo d'osservazione, anche i casi attribuiti al *morbo di Pott*, che nei volumi concernenti le statistiche degli anni dal 1887 al 1905 erano stati esclusi.

nel quale anno, in dipendenza della *pandemia influenzale*, tutte le cause di morte raggiunsero un limite superiore al normale;

il terzo va dal 1919 al 1937 ed in esso l'andamento, pur con delle irregolarità, torna ad assumere un carattere decrescente, tantochè i numeri indici degli anni 1936 e 1937 (41 e 40, rispettivamente) sono i più bassi fra tutti quelli dei periodi considerati.

Si può, quindi, concludere che la mortalità per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, eccetto che nel periodo bellico, abbia avuto un andamento decrescente.

PROSPETTO 12. — *Mortalità per tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi.*

PERIODI	CIFRE PROPORZIONALI A 1.000.000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (triennio 1887-89 = 100)	PERIODI	CIFRE PROPORZIONALI A 1.000.000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (triennio 1887-89 = 100)
1887-89 (media annuale)	(a) 2.128	100	1921.....	1.421	67
1890-92 »	(a) 1.995	94	1922.....	1.430	67
1893-95 »	(a) 1.909	90	1923.....	1.462	69
1896-98 »	1.809	85	1924.....	1.562	73
1899-901 »	1.796	84	1925.....	1.532	72
1902-04 »	1.629	77	1926.....	1.467	69
1905-07 »	1.706	80	1927.....	1.363	64
1908-10 »	1.655	78	1928.....	1.279	60
1911-13 »	1.567	74	1929.....	1.237	58
1914.....	1.449	68	1930.....	1.115	52
1915.....	1.576	74	1931.....	1.082	51
1916.....	1.664	78	1932.....	1.038	49
1917.....	1.749	82	1933.....	992	47
1918.....	2.090	98	1934.....	925	43
1919.....	1.725	81	1935.....	888	42
1920.....	1.598	75	1936.....	872	41
			1937.....	857	40

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895 venivano classificati assieme alle morti per *malattie delle ossa* in genere.

Diamo, nel prospetto 13, le cifre assolute dei morti, nel Regno, per *tubercolosi dell'apparato respiratorio*, delle *meningi* e del *sistema nervoso centrale*, per le *altre forme tubercolari* e per il complesso di tutte le *malattie tubercolari*, durante il periodo dal 1887 al 1937, con la distinzione del sesso e la proporzione dei maschi per 100 femmine.

Il numero assoluto dei maschi morti per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, è costantemente inferiore a quello delle femmine. Nel periodo anteguerra, la differenza, a favore dei maschi, si può, salvo rare eccezioni, considerare più elevata che negli anni di guerra e negli anni successivi.

Fra il numero dei maschi e delle femmine morti per alcune delle *forme tubercolari*, però, non esistono gli stessi rapporti che fra i morti di ciascun sesso per *tutte le forme tubercolari*.

Infatti, nei morti per *tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale*, il numero dei maschi supera costantemente quello delle femmine, eccetto nel 1931 in cui è uguale, nel 1933, 1934 e 1935 in cui è inferiore; nei morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio*, fatta eccezione per l'anno 1937, e per le *altre forme di tuber-*

colosi, il numero dei maschi è costantemente inferiore a quello delle femmine, e le differenze più sensibili, in genere, fino all'anno 1920, si notano nei riguardi delle morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio*. Anche le differenze fra il numero dei maschi e delle femmine, morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio*, sembrano essersi ridotte durante la guerra e sembra che tale riduzione si sia mantenuta anche nel dopo guerra.

Generalmente si può dire che la differenza del numero dei morti nei due sessi tende nel tempo a diminuire.

PROSPETTO 13. — Morti per le varie forme tubercolari e rapporto dei sessi.

PERIODI (media annuale)	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO RESPIRATORIO			TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE			ALTRE FORME TUBERCOLARI			COMPLESSO DELLE MALATTIE TUBERCOLARI		
	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F	M	F	M per 100 F
1887-89.....	14.067	17.856	79	3.039	2.534	120	11.970	14.039	85	29.076	34.429	84
1890-92.....	14.023	17.275	81	3.080	2.690	114	10.861	12.834	85	27.964	32.799	85
1893-95.....	14.296	16.762	85	2.857	2.570	111	10.604	12.243	87	27.757	31.575	88
1896-98.....	14.535	17.075	85	2.341	2.275	103	9.752	11.396	86	26.628	30.746	87
1899-901.....	16.890	20.005	84	3.061	2.795	110	7.089	8.222	86	27.040	31.022	87
1902-04.....	15.574	18.371	85	2.819	2.665	106	6.546	7.584	86	24.939	28.620	87
1905-07.....	15.886	18.856	84	2.931	2.811	104	7.447	8.955	83	26.264	30.622	86
1908-10.....	16.829	19.069	88	3.097	2.862	108	6.693	7.868	85	26.619	29.799	89
1911-14.....	15.798	18.234	87	3.067	2.949	104	6.598	7.547	87	25.463	28.730	89
1915-17.....	17.735	20.127	88	3.552	3.371	105	7.336	8.065	91	28.623	31.563	91
1918.....	23.576	25.788	91	3.580	3.387	106	8.648	8.965	96	35.804	38.140	94
1919-20.....	19.732	21.704	91	3.142	2.989	105	6.209	6.411	97	29.083	31.104	94
1921-23.....	17.747	19.595	91	2.922	2.774	105	4.679	5.130	91	25.348	27.499	92
1924-26.....	20.790	23.327	89	3.081	3.040	101	4.333	4.867	89	28.204	31.234	90
1927-30.....	17.385	19.762	88	2.737	2.647	103	3.630	4.198	86	23.752	26.607	89
1931.....	15.927	17.131	93	2.364	2.364	100	3.174	3.576	89	21.465	23.071	93
1932.....	15.456	16.542	93	2.353	2.256	104	3.068	3.536	87	20.877	22.334	93
1933.....	15.385	16.091	96	2.003	2.147	93	2.868	3.168	91	20.256	21.406	95
1934.....	14.259	15.109	94	1.995	2.028	98	2.674	3.160	85	18.928	20.297	93
1935.....	13.782	14.250	97	2.013	2.034	99	2.778	3.180	87	18.573	19.464	95
1936.....	13.901	13.955	100	1.973	1.966	100	2.620	3.081	85	18.494	19.002	97
1937.....	13.809	13.639	101	1.988	1.982	100	2.656	3.116	85	18.453	18.737	98

Dal prospetto 14 si rileva che la diminuzione della mortalità per le varie forme della *tubercolosi*, dal periodo 1887-89 all'anno 1937, è stata più notevole per la *scrofula* (95 %), *tabe mesenterica* e *tubercolosi intestinale* (91 %), *tubercolosi disseminata* (86 %), *meningite tubercolare* (51 %), che non per la *tubercolosi polmonare* e *tisi* (41%). Solamente la mortalità per *tubercolosi delle ossa, delle articolazioni e dei rimanenti organi o sistemi* è aumentata nel 1937 del 21 % a confronto del periodo 1887-89.

Il numero dei morti per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, è probabilmente superiore a quello indicato nei prospetti delle pagine precedenti, non essendovi compresi quei casi che, pur essendo di natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di *bronchite cronica*, di *meningite semplice*, di *pleurite* o di *peritonite*, senza specificare se fossero di natura tubercolare.

PROSPETTO 14. — Mortalità per le varie forme tubercolari.

(Cifre proporzionali a 1.000.000 di abitanti)

PERIODI	TUBERCOLOSI DISSEMINATA	TUBERCOLOSI PULMONARE, TISI	SCROFOLA DISSEMINATA E LUPUS	MENINGITE TUBER- COLARE E IDROCEFALO ACQUISITO	TABE MESENTERICA E TUBERCOLOSI INTESTINALE	ARTRITE E SINOVITE FUNGOSA, TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DI ALTRI ORGANI, MORBO DI POTT	COMPLESSO DELLE MALATTIE TUBERCOLARI
1887-89 (media annuale).....	307	1.070	103	187	422	(a) 39	2.128
1890-92 »	290	1.028	86	189	364	(a) 38	1.995
1893-95 »	290	999	67	175	335	(a) 43	1.909
1896-98 »	244	997	58	146	302	62	1.809
1899-901 »	97	1.141	45	181	269	63	1.796
1902-04 »	101	1.033	36	167	227	65	1.629
1905-07 »	190	1.042	35	172	193	74	1.706
1908-10 »	161	1.053	27	175	164	75	1.655
1911-13 »	139	978	23	175	173	79	1.567
1914-16 »	133	986	22	181	159	82	1.563
1917-19 »	153	1.226	21	186	169	100	1.855
1920-23 »	84	1.040	14	158	108	74	1.478
1924-27 »	50	1.097	12	154	95	72	1.480
1928-30 »	43	893	8	129	71	66	1.210
1931.....	40	803	6	115	57	60	1.082
1932.....	43	(b) 769	6	111	55	54	1.038
1933.....	40	(b) 749	5	99	46	52	992
1934.....	38	(b) 692	5	95	46	48	925
1935.....	42	(b) 655	5	95	45	47	888
1936.....	41	(b) 648	6	92	39	47	872
1937.....	42	(b) 632	5	91	39	47	857

(a) Non compresi i morti per *tubercolosi delle ossa*, che prima dell'anno 1895, venivano classificati assieme alle morti per *malattie delle ossa in genere*.

(b) Compresi i morti per *tubercolosi dei gangli tracheo-bronchiali*. Nell'anno 1931, i morti per detta causa furono in numero di 3.

Sembra utile, per ciò, vedere anche quale sia stato, nel tempo, l'andamento della mortalità per le malattie ora citate, perchè se la mortalità segna una diminuzione pari o maggiore a quella della *tubercolosi*, si può presumere che non debbano essere molti i casi di queste malattie che possano celare forme di natura tubercolare non dichiarate.

Non è possibile comparare per gli stessi periodi di tempo la diminuzione della *tubercolosi* con quella delle altre malattie ora citate: per queste, infatti, i criteri di classificazione sono mutati nel tempo, come è detto nelle note.

La diminuzione della mortalità per il *complesso delle malattie tubercolari*, dalla media del triennio 1887-89, a quella del decennio 1928-37, è stata del 52 %; durante lo stesso periodo, la mortalità per *meningite semplice* ha avuto una diminuzione dell'85 % e quella per *pleurite*, grosso modo (a), del 43 %. La mortalità per *bronchite cronica*, dalla media del triennio 1899-901 (b) a quella del decennio 1928-37

(a) Per ottenere la migliore comparabilità fra i dati relativi ai morti per *malattie della pleura* negli anni dal 1887 al 1923 e quelli dal 1924 al 1931, si è dovuto per quest'ultimo gruppo di anni unificare le voci « *malattie della pleura* (n. 105) », « *malattie del mediastino* (n. 111) » e « *altre malattie dell'apparato respiratorio* (n. 112) ». Negli anni dal 1932 al 1937 si sono unificate le voci « *Pleuriti* (n. 110) » e « *altre malattie dell'apparato respiratorio, compresa la cangrena del polmone* (n. 114-b) »: in queste voci, però, a confronto di quelle sopra menzionate, non sono compresi, i morti per *emotorace* e vi sono invece compresi i morti per *cangrena polmonare*.

(b) Negli anni precedenti, i morti per *bronchite cronica* non erano tenuti distinti da quelli per *bronchite acuta*.

è aumentata del 3 % (a); per tutte le forme tubercolari vi è stata una diminuzione del 43 %.

La mortalità per *peritonite*, dalla media del triennio 1908-10 (b) a quella del decennio 1928-37 è diminuita del 42 %; per tutte le forme tubercolari la diminuzione è stata del 38 %.

Anche mettendo a confronto i quozienti specifici di mortalità secondo il sesso e l'età per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi* (prospetto 15) con quelli per *bronchite cronica, meningite semplice, pleurite, peritonite senza causa indicata* (vedi i prospetti 16, 17, 18 e 19) si rileva che in genere, vi è stata diminuzione di mortalità per tutte le forme tubercolari nei singoli gruppi di età, in ciascun sesso e nel complesso, nel triennio 1935-37 a confronto del triennio base 1900-02 e che lo stesso comportamento, anzi quasi sempre in maggiore misura, si dimostra nella mortalità per le altre cause suddette. Nel triennio 1935-37 a confronto del 1930-32, invece, la mortalità per *bronchite cronica* nelle età giovanili e medie ed in ciascuno dei sessi (in genere dall'età di 1 anno a 49 anni), dimostra un aumento; però anche per le malattie dell'apparato respiratorio, esclusi i morti per *bronchite cronica* e per *bronchite non specificata* da 60 anni ed oltre, la mortalità, a partire dal 1934, dimostra un sensibile aumento.

Sembra quindi potersi ritenere che il miglioramento riscontrato nella mortalità per *malattie tubercolari* non subisca, o subisca in minima parte, l'influenza delle denunce delle morti per *pleurite, meningite e peritonite*, in cui non è stata indicata la natura tubercolare. Una certa influenza si deve ritenere abbiano sulla diminuzione del quoziente di mortalità per *malattie tubercolari* i casi di natura *tubercolare*, dichiarati dai medici come deceduti per *bronchite cronica*.

Esaminando i quozienti di mortalità specifici (prospetto 15 e grafico a pag. 19*) per tutte le forme tubercolari, possiamo notare quanto segue:

per i maschi, escludendo la classe di età a meno di 1 anno, il massimo della mortalità si riscontra, per i primi tre periodi considerati, nel gruppo 20-24 anni; per il 1930-32 nella classe da 25-29; per il 1935-37 nella classe da 40-44; il minimo, nella classe da 10-14 in tutti i periodi;

per le femmine, invece, il massimo della mortalità si nota nella classe di età da 20-24 anni per tutti i periodi; ed il minimo (escludendo il gruppo di età da 75 ed oltre), nella classe da 70 a 74 anni per il primo periodo e nella classe da 5 a 9 per gli altri 4 periodi.

I quozienti di mortalità sono superiori nei maschi, nelle classi di età da 0-4 anni e da 45-74, salvo alcune eccezioni.

Nei riguardi della diminuzione della mortalità fra il 1900-02 ed il 1935-37 si nota che, in complesso, essa si è ridotta, in un periodo di 35 anni, del 45 % per i maschi e del 52 % per le femmine e che la più sensibile diminuzione si è verificata dal 1920-22 in poi.

(a) Negli anni dal 1932 al 1937 nella voce « *bronchite cronica* (n. 106-b) » non sono compresi i morti per *catarro soffocante* e per *catarro bronchiale non specificato*, da 60 anni in poi.

Per rendere i quozienti di mortalità per *bronchite cronica* negli anni dal 1933 al 1937 comparabili con il quoziente del triennio 1899-1901, ai morti per *bronchite cronica* (n. 106-b) si sono aggiunti quelli per *bronchite non specificata* (n. 106-c) da 60 anni ed oltre: per il 1932 tale numero è stato ottenuto a calcolo, supponendo che esso fosse stato, a confronto del totale dei morti per *bronchite non specificata*, nella stessa proporzione verificatasi nel 1931.

(b) Negli anni precedenti, i morti per *peritonite* erano uniti a quelli per *appendicite*.

Per il sesso maschile la massima riduzione della mortalità si è avuta nel primo anno di vita (77 %) e per le femmine nei primi cinque anni di vita (78 %), la minima riduzione della mortalità si è verificata per i maschi nel gruppo di età 45-49 (13 %) e per il sesso femminile nei gruppi di età 65-69 e 70-74 (27 %).

PROSPETTO 15. — Quozienti specifici di mortalità per tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi.
(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (a)	341,4	313,5	327,8	278,6	238,2	258,9	199,9	174,2	187,4	121,2	103,5	112,6	84,7	76,2	80,5
1-4 anni	390,6	354,0	372,6	327,8	277,3	303,1	234,1	203,5	219,2	126,1	106,4	116,4	88,1	78,5	83,4
5-9 »	73,2	91,9	82,4	66,7	77,6	72,1	57,9	65,5	61,6	34,1	36,1	35,1	25,9	27,8	26,8
10-14 »	49,5	105,8	77,4	48,8	97,4	72,7	42,6	79,2	60,6	31,5	51,4	41,3	22,5	39,3	30,8
15-19 »	136,1	228,1	182,5	141,9	226,7	185,8	118,3	204,1	161,1	85,4	148,7	116,9	72,1	120,0	95,8
20-24 »	259,8	292,5	276,4	265,7	279,0	272,6	290,5	257,9	273,7	154,0	203,1	178,6	122,0	163,3	142,5
25-29 »	248,4	291,2	270,4	257,1	277,1	267,8	255,6	243,4	249,0	164,8	191,8	178,7	124,2	153,6	138,9
30-34 »	199,7	244,7	222,9	215,8	239,6	228,4	204,0	211,4	207,9	158,5	153,5	155,9	124,1	124,8	124,5
35-39 »	173,6	209,2	191,7	187,3	196,3	192,0	171,0	177,8	174,6	151,6	127,3	138,4	127,0	100,0	112,8
40-44 »	154,0	171,5	162,9	163,8	158,7	161,2	150,7	153,6	152,2	141,7	110,2	124,6	132,9	89,4	109,3
45-49 »	147,2	137,6	142,3	163,9	127,9	145,5	139,5	127,8	133,6	136,1	98,2	115,9	127,8	78,5	101,1
50-54 »	149,8	121,0	135,0	147,0	105,8	126,0	130,7	113,7	122,1	132,8	86,8	108,9	118,5	72,2	93,9
55-59 »	138,1	107,8	122,8	140,8	103,3	121,9	127,9	102,0	114,9	124,7	80,4	101,9	115,1	72,7	93,1
60-64 »	134,5	101,4	117,6	124,7	93,5	108,7	117,1	94,3	105,5	111,5	81,8	96,1	97,9	69,3	83,1
65-69 »	116,3	96,1	106,1	114,2	97,5	105,8	104,2	88,8	96,4	97,6	76,9	86,9	88,2	70,5	78,9
70-74 »	104,3	78,9	91,5	89,9	80,3	85,0	88,1	84,4	86,2	71,9	59,5	65,4	64,2	57,3	60,6
75-∞	67,5	70,1	68,8	64,5	65,7	65,1	60,2	66,8	63,6	42,1	44,4	43,4	38,5	37,2	37,8
TOTALE (b)	160,5	183,0	171,8	154,9	167,4	161,3	141,8	150,3	146,1	106,0	109,9	108,0	87,6	87,2	87,4

(a) Cfr. la nota (b) a pag. 5*.


PROSPETTO 16. — Quozienti specifici di mortalità per bronchite cronica (c).
(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,1	4,2
1-4 anni	5,0	4,2	4,6	20,7	23,5	22,1	9,9	10,5	10,2	1,4	1,3	1,3	2,7	2,4	2,5
5-9 »	3,2	4,9	4,0	2,0	3,1	2,5	0,9	1,2	1,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
10-14 »	2,2	2,9	2,5	0,8	2,3	1,5	0,7	1,0	0,8	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
15-19 »	1,5	2,4	2,0	2,1	4,7	3,4	1,2	2,2	1,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	0,7
20-24 »	2,3	3,1	2,7	4,1	6,0	5,1	2,3	3,0	2,7	0,6	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0
25-29 »	2,6	3,9	3,3	4,8	5,9	5,4	2,2	2,8	2,5	1,0	0,9	1,0	1,0	1,2	1,1
30-34 »	3,0	3,6	3,3	4,8	6,7	5,8	1,8	2,9	2,4	1,5	0,9	1,2	1,9	1,7	1,8
35-39 »	3,6	4,9	4,3	5,7	7,3	6,5	2,7	3,5	3,1	1,9	1,5	1,7	3,4	2,0	2,7
40-44 »	6,0	7,2	6,6	6,6	7,6	7,1	3,7	5,2	4,5	3,2	2,9	3,0	4,2	2,9	3,5
45-49 »	8,5	9,2	8,9	10,4	10,9	10,7	6,2	5,8	6,0	6,6	5,3	5,9	8,4	5,2	6,7
50-54 »	16,5	17,3	16,9	16,4	19,2	17,8	11,5	13,4	12,5	12,1	10,8	11,4	10,9	8,6	9,7
55-59 »	30,9	33,2	32,0	30,3	31,5	30,9	19,2	22,1	20,6	23,7	21,2	22,4	18,4	17,1	17,7
60-64 »	56,3	78,0	67,4	57,1	61,7	59,4	41,2	49,7	45,5	56,3	59,5	58,0	49,5	49,6	49,5
65-69 »	109,0	147,9	128,6	103,0	120,2	111,6	73,7	85,9	79,8	108,8	114,4	111,7	91,9	98,9	95,5
70-74 »	228,0	300,9	264,8	188,2	215,4	202,0	143,8	164,7	154,5	213,8	231,8	223,2	186,2	207,1	197,1
75-∞	490,4	588,9	539,8	384,1	422,7	403,8	287,0	306,4	297,0	589,0	576,6	582,4	547,5	538,0	542,4
TOTALE (b)	22,2	27,9	25,1	22,2	25,4	23,8	15,4	17,8	16,6	24,3	25,9	25,1	23,1	25,2	24,1

(b) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

(c) Fino al 1931 e per il 1935-37 i dati per i morti di 60 anni ed oltre comprendono anche i morti per bronchite non specificata: per il 1932 il numero di questi è stato ottenuto a calcolo ed aggiunto ai morti per bronchite cronica.

Grafico N. 1. — MORTALITÀ PER TUBERCOLOSI PER SESSO ED ETÀ (*). (Scala logaritmica).



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

(*) Mortalità per 100.000 coetanei censiti dello stesso sesso. Vedi anche la nota (I) a pagina 4*.

PROSPETTO 17. — Quozienti specifici di mortalità per meningite semplice.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (a)	340,3	271,2	306,7	296,3	255,3	276,3	160,7	132,5	147,0	72,7	64,5	68,7	80,9	64,4	72,9
1 anno	389,3	306,2	348,6	348,8	297,1	323,5	188,3	154,9	172,0	75,6	66,3	71,0	84,2	66,4	75,5
2 anni	245,6	225,6	235,8	223,5	203,9	213,8	95,7	82,5	89,3	40,2	30,7	35,5	43,5	35,3	39,5
3 »	151,4	136,0	143,8	122,5	108,1	115,5	64,7	51,2	58,1	22,4	21,6	22,0	19,8	18,0	18,9
4 »	110,0	105,5	107,8	92,2	88,3	90,3	51,0	48,0	49,5	15,3	14,4	14,9	15,4	12,5	14,0
1-4 »	93,0	92,3	92,7	72,2	73,4	72,8	40,3	33,9	37,2	11,1	10,9	11,0	11,3	9,5	10,4
5-9 »	151,9	141,5	146,8	129,2	119,6	124,5	67,8	57,9	62,9	22,4	19,5	21,0	22,6	18,9	20,8
10-14 »	51,4	52,4	51,9	37,8	39,8	38,8	21,8	21,5	21,7	7,8	7,0	7,4	7,0	6,5	6,7
15-19 »	26,2	26,6	26,4	19,6	20,0	19,8	12,1	12,1	12,1	5,4	4,9	5,1	4,5	4,2	4,3
20-24 »	21,4	22,4	21,9	15,8	17,8	16,9	10,7	10,6	10,7	4,7	3,7	4,2	4,4	3,3	3,8
25-29 »	18,9	17,2	18,0	14,5	12,8	13,6	8,6	8,2	8,4	3,4	2,9	3,1	3,4	2,6	3,0
30-34 »	13,3	14,6	14,0	9,6	11,5	10,6	5,5	6,9	6,2	3,0	2,4	2,7	2,6	2,2	2,4
35-39 »	10,9	12,4	11,7	8,5	9,7	9,2	6,1	5,1	5,6	3,1	2,4	2,7	2,4	2,1	2,2
40-44 »	12,5	12,2	12,3	8,6	9,8	9,2	5,7	5,5	5,6	2,8	2,4	2,6	2,8	2,1	2,4
45-49 »	13,4	11,9	12,6	8,8	7,9	8,3	5,3	4,3	4,8	2,6	2,3	2,4	2,9	1,7	2,2
50-54 »	14,2	10,0	12,1	10,4	7,8	9,1	5,9	4,8	5,4	3,2	2,4	2,8	4,1	2,8	3,4
55-59 »	14,6	10,3	12,4	9,9	7,8	8,9	6,4	5,0	5,7	3,7	2,6	3,1	3,2	2,5	2,8
60-64 »	17,2	11,5	14,3	10,3	7,9	9,1	6,1	4,4	5,3	3,7	2,6	3,2	3,8	2,2	2,9
65-69 »	16,8	12,0	14,4	9,9	6,9	8,4	6,6	4,4	5,5	3,2	2,4	2,8	3,4	2,2	2,8
70-74 »	18,5	14,5	16,5	11,1	9,4	10,2	6,7	4,6	5,6	3,9	2,3	3,1	4,2	2,2	3,2
75-79 »	25,3	17,9	21,6	12,6	7,7	10,1	6,9	5,1	6,0	3,4	2,6	3,0	3,6	2,1	2,8
75-80 »	26,6	18,6	22,5	15,3	11,3	13,3	7,5	3,8	5,6	3,8	2,4	3,1	2,8	1,6	2,1
TOTALE (b)	46,1	40,2	43,1	36,8	32,6	34,7	18,4	15,5	16,9	7,6	6,2	6,9	7,2	5,6	6,4

PROSPETTO 18. — Quozienti specifici di mortalità per pleurite.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02 (*)			1910-12 (*)			1920-22 (*)			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (a)	17,0	14,7	15,9	14,9	11,7	13,4	16,1	10,0	13,2	13,3	9,9	11,6	15,9	12,0	14,0
1-4 anni	19,5	16,6	18,1	17,6	13,6	15,7	18,9	11,7	15,4	13,8	10,2	12,0	16,6	12,3	14,5
5-9 »	12,4	9,5	11,0	15,5	11,2	13,4	16,5	11,2	13,9	14,7	10,1	12,4	17,8	11,2	14,5
10-14 »	3,2	2,7	3,0	3,2	3,0	3,1	2,8	3,1	2,9	2,2	2,1	2,1	2,4	1,9	2,1
15-19 »	2,4	2,6	2,5	1,7	2,1	1,9	2,2	1,8	2,0	1,6	1,8	1,7	1,4	1,4	1,4
20-24 »	4,2	3,1	3,6	4,0	3,5	3,7	4,9	3,5	4,2	3,3	2,8	3,0	3,1	2,4	2,8
25-29 »	9,0	4,9	6,9	9,5	4,8	7,1	10,1	5,8	7,9	5,1	3,1	4,1	4,2	3,1	3,6
30-34 »	8,3	5,5	6,8	7,4	5,5	6,4	6,6	5,2	5,9	4,0	3,4	3,7	3,5	3,2	3,3
35-39 »	7,0	6,2	6,6	7,6	4,9	6,2	6,6	5,5	6,0	3,9	3,6	3,8	3,6	3,8	3,7
40-44 »	7,9	7,2	7,6	6,5	5,7	6,1	6,6	5,1	5,8	4,8	3,6	4,1	4,8	3,5	4,1
45-49 »	10,4	6,8	8,6	8,6	5,8	7,1	7,3	5,2	6,2	6,0	4,2	5,1	5,4	3,8	4,6
50-54 »	12,3	7,2	9,7	11,6	6,1	8,8	9,6	7,0	8,3	7,7	4,5	6,0	7,6	4,1	5,7
55-59 »	15,2	8,5	11,8	14,5	7,0	10,7	12,9	6,7	9,8	9,6	5,5	7,5	10,0	5,4	7,6
60-64 »	19,5	10,5	14,9	17,3	8,6	12,9	15,2	7,6	11,4	13,4	7,7	10,5	13,5	7,5	10,4
65-69 »	26,6	16,7	21,5	21,8	12,4	17,0	21,8	11,3	16,5	17,1	9,8	13,3	18,3	9,7	13,8
70-74 »	31,4	18,6	25,0	23,4	14,3	18,8	28,4	13,2	20,8	23,1	14,0	18,4	24,0	11,1	17,3
75-79 »	35,5	24,0	29,7	28,6	16,9	22,7	29,6	17,2	23,3	26,9	15,7	21,0	28,3	15,8	21,8
75-80 »	42,2	31,8	37,0	35,7	19,0	27,2	31,4	22,0	26,5	27,7	16,8	21,9	30,2	18,2	23,7
TOTALE (b) ...	10,8	7,5	9,2	10,1	6,6	8,3	9,8	6,4	8,0	7,8	5,3	6,5	8,0	5,2	6,5

(*) Dal 1900 al 1922 nella voce malattie della pleura sono comprese le malattie del mediastino, le altre malattie dell'apparato respiratorio (tracheostenosi, pleuraginia, pneumopatia, ecc.) e l'emotorace.

(a) Cfr. la nota (b) a pag. 5*.

(b) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

PROSPETTO 19. — Quozienti specifici di mortalità per peritonite, senza causa indicata.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali									M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (a)	27,6	21,8	24,8	28,1	21,7	25,0	11,6	8,2	10,0	19,0	12,8	16,0
1-4 anni	32,5	25,4	29,0	32,9	25,3	29,2	12,1	8,4	10,3	19,7	13,2	16,5
5-9 »	11,4	11,8	11,6	10,1	9,6	9,9	4,4	4,4	4,4	5,5	6,2	5,8
10-14 »	7,6	7,8	7,7	7,7	7,9	7,8	3,8	4,6	4,2	4,0	5,2	4,6
15-19 »	6,7	6,1	6,4	6,3	6,5	6,4	3,2	2,8	3,0	2,6	2,9	2,8
20-24 »	7,6	7,9	7,7	8,2	6,9	7,6	3,6	3,6	3,6	3,4	2,6	3,0
25-29 »	7,9	11,6	9,8	6,9	10,4	8,7	3,3	5,1	4,2	2,2	3,7	2,9
30-34 »	6,8	14,5	10,9	6,1	14,2	10,4	3,7	6,6	5,2	3,4	4,3	3,9
35-39 »	6,5	14,3	10,6	5,7	12,5	9,3	3,9	6,2	5,1	3,7	4,2	4,0
40-44 »	6,6	14,1	10,5	6,0	12,4	9,4	4,0	7,2	5,8	4,3	4,9	4,6
45-49 »	8,6	12,7	10,7	7,4	11,5	9,5	4,8	6,0	5,5	4,7	4,6	4,7
50-54 »	9,3	9,6	9,5	9,1	10,0	9,6	5,1	5,7	5,4	4,7	4,2	4,4
55-59 »	9,3	9,3	9,3	10,5	8,8	9,6	6,9	6,3	6,6	5,8	5,4	5,6
60-64 »	11,6	9,0	10,3	10,0	10,0	10,0	8,3	6,5	7,4	8,1	5,9	6,9
65-69 »	14,0	13,1	13,6	13,9	11,7	12,8	8,3	7,9	8,1	9,9	7,8	8,8
70-74 »	16,4	16,4	16,4	15,4	15,1	15,2	10,8	8,6	9,6	12,4	9,2	10,7
75-79 »	18,7	19,7	19,2	17,2	16,2	16,7	12,5	10,8	11,6	15,9	10,2	12,9
75-ω	20,0	20,8	20,4	19,0	18,9	19,0	12,8	11,8	12,3	14,6	12,6	13,5
TOTALE (b)...	9,7	11,5	10,6	9,2	10,7	9,9	5,1	5,8	5,5	5,3	5,2	5,3

(a) Cfr. la nota (b) a pag. 5*.

(b) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

Esaminiamo ora, nei tre prospetti seguenti, la mortalità :

1) per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* — 2) per *tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale* — 3) per le *restanti forme tubercolari*.

La mortalità per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* nel Regno nei vecchi confini (prosp. 20), è discesa nel triennio 1935-37, a confronto del 1900-02, del 44 %. In tutti i Compartimenti, nel 1935-37, la mortalità è diminuita più o meno notevolmente, a confronto del periodo base 1900-02, con un minimo del 15 % nella Sardegna ed un massimo del 53 % nella Liguria e Lombardia.

Inoltre, appare evidente, nel 1935-37, una maggiore intensità delle morti per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale (esclusa l'Emilia), nella Toscana e nella Sardegna, a confronto della mortalità media del Regno.

La mortalità per *tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale* (prosp. 21) in confronto del triennio base 1900-02, è diminuita nel 1935-37, per il Regno nei vecchi confini, del 48 %, ed è anche diminuita in tutti i Compartimenti, fatta eccezione per la Sardegna.

Esaminando la mortalità dei Compartimenti, si nota che la Venezia Tridentina, il Veneto, la Venezia Giulia e Zara, l'Emilia, il Lazio, le Puglie e la Sardegna, hanno, nel 1935-37, una mortalità superiore a quella del Regno. L'Italia Settentrionale appare, così, quella che ha il maggior numero di Compartimenti con mortalità superiore alla media del Regno.

PROSPETTO 20. — Mortalità per tubercolosi dell'apparato respiratorio.
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	136,7	123,5	122,3	86,9	71,5	90	89	64	52	122	122	119	109	111	
Liguria	171,0	152,4	146,0	100,5	80,6	89	85	59	47	153	150	142	126	125	
Lombardia	147,9	128,4	126,1	92,9	69,8	87	85	63	47	133	127	123	116	108	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	125,9	111,1	—	—	—	—	—	—	—	158	172	
Veneto	116,9	116,0	124,4	89,3	68,8	99	106	76	59	105	114	121	112	107	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	145,2	122,8	—	—	—	—	—	—	—	182	190	
Emilia	118,0	101,9	99,2	74,9	60,8	86	84	63	52	106	101	96	94	94	
Toscana	139,2	126,4	120,6	95,7	76,8	91	87	69	55	125	125	117	120	119	
Marche	82,6	73,4	84,3	63,5	49,3	89	102	77	60	74	72	82	79	76	
Umbria	83,3	84,8	97,5	69,5	55,4	102	117	83	67	75	84	95	87	86	
Lazio	117,0	113,6	111,0	74,4	64,6	97	95	64	55	105	112	108	93	100	
Abruzzi e Molise	69,8	66,6	65,9	52,6	42,3	95	94	75	61	63	66	64	66	65	
Campania	81,4	72,2	72,6	55,3	50,9	89	89	68	63	73	71	71	69	79	
Puglie	94,0	84,3	91,5	72,5	58,8	90	97	77	63	84	83	89	91	91	
Lucania	52,2	52,1	60,6	41,4	29,5	100	116	79	57	47	51	59	52	46	
Calabria	69,6	58,0	65,5	48,8	37,9	83	94	70	55	62	57	64	61	59	
Sicilia	85,6	70,7	70,8	60,2	51,9	83	83	70	61	77	70	69	75	80	
Sardegna	118,6	121,6	149,9	123,7	100,7	102	126	104	85	106	120	146	155	156	
REGNO { vecchi confini	111,6	101,3	102,9	—	—	91	92	69	56	100	100	100	—	—	
{ attuali confini	—	—	—	79,8	64,6	—	—	—	—	—	—	—	100	100	

PROSPETTO 21. — Mortalità per tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale.
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	13,7	13,6	10,9	9,1	7,2	99	79	67	53	78	77	71	79	78	
Liguria	25,3	23,1	15,8	11,3	8,8	91	62	45	35	144	131	103	98	95	
Lombardia	24,4	22,3	19,1	12,9	9,3	92	78	53	38	138	127	124	111	100	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	10,6	10,3	—	—	—	—	—	—	—	91	111	
Veneto	26,6	26,6	26,6	17,5	12,8	100	100	66	48	151	151	173	151	138	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	15,6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	134	137	
Emilia	21,2	20,2	20,0	12,3	10,6	95	94	58	50	120	115	130	106	114	
Toscana	16,5	18,2	14,5	10,1	7,7	110	88	61	47	94	104	94	87	83	
Marche	16,0	14,1	13,6	9,6	7,8	88	85	60	49	91	80	89	83	84	
Umbria	12,2	13,1	14,2	10,4	8,7	107	116	85	71	69	74	92	90	94	
Lazio	28,4	27,3	22,6	14,5	11,2	96	80	51	39	161	155	147	125	121	
Abruzzi e Molise	16,3	15,6	12,9	10,3	7,8	96	79	63	48	93	89	84	88	84	
Campania	15,5	13,3	10,1	7,7	7,3	85	65	50	47	88	75	66	66	79	
Puglie	16,1	19,5	15,4	14,5	11,9	121	96	90	74	91	111	100	125	128	
Lucania	9,2	11,6	7,6	6,2	7,2	126	82	68	78	52	66	49	54	78	
Calabria	10,5	8,4	7,8	6,2	5,2	80	75	59	49	60	48	51	54	56	
Sicilia	7,3	8,2	8,2	7,7	6,6	113	98	106	90	41	47	47	67	71	
Sardegna	13,2	19,5	18,3	20,1	17,2	147	139	152	130	75	111	119	174	186	
REGNO { vecchi confini	17,6	17,6	15,4	—	—	100	87	65	52	100	100	100	—	—	
{ attuali confini	—	—	—	11,6	9,3	—	—	—	—	—	—	—	100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

La mortalità per *malattie tubercolari esclusa la tubercolosi, dell'apparato respiratorio e la tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale* (prosp. 22), nel triennio 1935-37, in confronto del periodo base 1900-02, è diminuita sia nel Regno nei vecchi confini, sia nei singoli Compartimenti: nel Regno, la diminuzione è stata del 69 % e nei Compartimenti essa va da un minimo di 39 % nella Sardegna ad un massimo di 81 per cento nelle Puglie.

Inoltre, la Venezia Tridentina, il Veneto, la Venezia Giulia e Zara, l'Emilia, la Toscana, le Marche, l'Umbria, la Lucania e la Sardegna hanno avuto, nel 1935-37, una mortalità superiore a quella media del Regno.

PROSPETTO 22. — *Mortalità per malattie tubercolari, esclusa la tubercolosi dell'apparato respiratorio e la tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale.*

(*medie annuali*)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	27,1	29,6	21,0	13,7	11,0	109	77	50	41	62	71	76	83	81	
Liguria	32,3	35,4	21,3	14,1	12,4	110	66	44	38	74	84	77	85	92	
Lombardia	44,1	44,6	30,0	16,3	13,5	101	68	37	31	101	106	108	99	100	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	22,5	18,6	—	—	—	—	—	—	—	136	138	
Veneto	46,2	50,7	34,3	21,1	16,0	110	74	46	35	106	121	123	128	118	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	19,5	17,2	—	—	—	—	—	—	—	118	127	
Emilia	48,4	44,7	28,4	17,4	16,5	92	59	36	34	111	107	102	106	122	
Toscana	44,0	47,7	35,3	19,7	16,7	109	80	45	38	101	114	127	119	123	
Marche	42,8	39,5	31,6	17,5	14,8	92	74	41	35	98	94	114	106	110	
Umbria	49,1	41,1	31,2	19,1	15,8	84	63	39	32	112	98	112	116	117	
Lazio	54,5	38,1	24,6	13,3	10,9	70	45	24	20	125	91	88	80	81	
Abruzzi e Molise	56,6	43,6	28,7	17,6	12,7	77	51	31	22	129	104	103	106	94	
Campania	53,4	43,3	26,9	13,8	10,9	81	50	26	20	122	103	97	84	80	
Puglie	68,3	49,5	35,1	19,1	12,8	73	51	28	19	156	118	126	116	94	
Lucania	40,7	36,9	25,6	15,9	14,1	91	63	39	35	93	88	92	96	104	
Calabrie	32,2	32,8	21,5	12,9	10,8	102	67	40	33	74	78	77	78	80	
Sicilia	29,8	31,6	15,9	10,8	9,3	106	53	36	31	68	75	57	66	69	
Sardegna	41,6	66,6	43,8	28,3	25,3	160	105	68	61	95	159	158	171	187	
REGNO { vecchi confini	43,7	41,9	27,8			96	64	37	31	100	100	100			
REGNO { attuali confini				16,5	13,5								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Più significativi, in quanto non influenzati dalla composizione per età e sesso della popolazione, sono i confronti nel tempo dei quozienti specifici di mortalità, riportati nei prospetti 23 e 24.

PROSPETTO 23. — Quozienti specifici di mortalità per tubercolosi disseminata e polmonare.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32 (*)			1935-37 (*)		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
meno di 1 anno (a)	43,0	44,1	43,6	58,6	55,6	57,2	45,2	38,2	41,8	32,9	26,5	29,8	19,0	17,7	18,4
5-9 »	49,2	49,8	49,5	69,0	64,8	66,9	52,9	44,6	48,9	34,2	27,2	30,8	19,8	18,2	19,0
1-4 anni	44,0	47,5	45,7	40,0	40,5	40,2	33,6	32,0	32,8	18,7	17,7	18,2	12,5	12,0	12,2
10-14 »	24,1	67,3	45,5	20,3	59,0	39,4	17,5	47,0	32,0	11,5	29,0	20,1	8,4	21,8	15,0
15-19 »	110,8	189,1	150,3	111,6	186,8	150,5	91,7	168,8	130,1	65,5	125,2	95,2	54,8	98,7	76,5
20-24 »	232,1	260,0	246,2	229,1	243,0	236,4	250,0	225,9	237,6	131,5	179,0	155,3	104,3	143,1	123,6
25-29 »	226,4	259,9	243,6	230,0	244,2	237,6	228,6	216,3	222,0	146,2	171,5	159,2	109,9	136,5	123,2
30-34 »	181,6	217,6	200,1	193,6	209,1	201,8	181,6	187,4	184,7	143,8	136,0	139,6	111,8	110,4	111,1
35-39 »	155,9	183,7	170,1	168,2	169,6	169,0	150,6	156,1	153,5	136,4	111,3	122,7	114,6	86,5	99,8
40-44 »	139,7	148,1	144,0	146,4	135,5	140,8	134,2	132,7	133,4	126,5	94,5	109,1	121,1	75,8	96,5
45-49 »	132,3	118,6	125,4	144,7	108,1	126,0	123,4	108,8	116,0	122,3	83,2	101,5	116,1	65,5	88,7
50-54 »	131,8	100,7	115,9	128,3	87,5	107,5	115,8	92,5	104,0	119,2	71,1	94,2	106,9	60,2	82,0
55-59 »	120,1	89,0	104,4	122,7	82,9	102,7	112,0	82,3	97,1	110,0	63,0	85,8	103,6	59,0	80,4
60-64 »	113,5	78,2	95,4	105,3	73,9	89,3	101,0	72,2	86,3	97,2	63,9	80,0	86,0	54,9	69,9
65-69 »	89,9	71,9	80,8	92,5	75,1	83,8	87,1	64,7	75,8	82,2	58,1	69,8	76,3	53,6	64,4
70-74 »	77,4	55,5	66,5	72,3	55,9	64,0	68,3	58,0	63,1	57,6	44,4	50,7	52,6	41,0	46,5
75-∞	44,4	40,7	42,5	46,2	43,8	45,0	45,9	39,5	42,6	31,2	27,1	29,0	29,9	22,9	26,1
TOTALE (b)	109,4	128,5	119,0	110,2	121,6	116,0	106,7	114,3	110,6	82,4	85,8	84,1	69,6	68,0	68,8

(*) Cfr. la nota (b) a pag. 16*.

(a) Cfr. la nota (b) a pag. 5*.

(b) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

Tali quozienti per la *tubercolosi disseminata e polmonare* (a) (prospetto 23), mostrano come nel complesso delle età, la mortalità sia più accentuata nel sesso femminile, fatta eccezione per il triennio 1935-37. Questa caratteristica si nota, in genere, anche nei singoli gruppi di età fino al 39° anno. Invece nelle successive età, eccetto il gruppo 40-44, nel triennio 1900-02, la mortalità si dimostra nettamente e costantemente superiore nel sesso maschile.

Nei maschi di ogni età la mortalità è discesa da 109,4 a 69,6 fra i periodi estremi, però, si nota prima un lieve aumento tra il 1900-02 e il 1910-12 e poi una diminuzione del 3 % nel 1920-22, del 25 % nel 1930-32 e del 36 % nel 1935-37 rispetto al 1° periodo. Per le femmine, di ogni età, è discesa da 128,5 a 68,0 fra il primo e l'ultimo periodo, del 5 % fra il primo e il secondo, dell'11 % fra il primo ed il terzo, del 33 % fra il primo e il quarto e del 47 % fra il primo e il più recente. La diminuzione della mortalità nel sesso femminile è ben più manifesta che nel sesso maschile, salvo per i gruppi di età da 15 a 29 anni e da 70 a 74, in cui la diminuzione nei maschi è superiore a quella delle femmine.

Nel 1935-37, si nota che l'altezza dei quozienti di mortalità dei maschi scende al valore minimo nell'età 5-9 anni, valore che aumenta di poco nel gruppo succes-

(a) Nel prospetto 23 è data la mortalità complessiva per *tubercolosi dell'apparato respiratorio* e per *tubercolosi disseminata*, perchè nella statistica delle Cause di morte fino a tutto l'anno 1924, i morti per le due forme di *tubercolosi*, classificati secondo l'età, non sono tenuti distinti.

sivo di età, 10-14 anni e sale ai massimi valori nelle età da 40 a 49 anni; nelle femmine il minimo valore si nota nell'età da 5 a 9 anni ed i massimi nelle età da 20 a 29 anni.

I quozienti specifici di mortalità per le *altre forme tubercolari* (esclusa la *tubercolosi disseminata e polmonare*) secondo il sesso e l'età (prospetto 24), mostrano come la mortalità sia stata, nel complesso delle età, costantemente superiore, sia pure in modo non sensibile, nel sesso femminile. Questo comportamento, salvo alcune eccezioni, si verifica anche nei singoli gruppi di età.

La mortalità si dimostra molto accentuata nei primi cinque anni di vita a confronto delle età successive, sia nei maschi sia nelle femmine, specie nei trienni anteriori al 1930-32; diminuisce notevolmente nelle età seguenti fino a 39 o 44 anni, tocca i minimi, in genere, da 45 a 54 anni e nelle età avanzate subisce, in genere, un lieve aumento.

Inoltre, essa dimostra una progressiva e notevole diminuzione, più accentuata nelle femmine che nei maschi; per i maschi di ogni età è discesa, da 51,0 a 18,0; e per le femmine di ogni età, da 54,5 a 19,2, con una diminuzione, per i maschi, del 12 % fra il primo e il secondo periodo, del 31 % fra il primo ed il terzo, del 54 % fra il primo ed il quarto e del 65 % fra il primo ed il più recente; per le femmine, rispettivamente, del 16 %, del 34 %, del 56 % e del 65 %. Anche nei singoli gruppi di età considerati, si rileva lo stesso comportamento, eccetto nelle età avanzate (in genere al disopra dei 50 anni) in cui la diminuzione è sensibilmente più accentuata nel sesso maschile.

PROSPETTO 24. — Quozienti specifici di mortalità per le altre forme tubercolari (esclusa la tubercolosi disseminata e polmonare).

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
menodi l'anno (a)	298,3	269,4	284,3	220,0	182,6	201,8	154,7	136,0	145,6	88,4	77,0	82,8	65,6	58,5	62,2
	341,3	304,1	323,1	258,9	212,6	236,2	181,3	158,9	170,4	91,9	79,2	85,6	68,3	60,3	64,4
1-4 anni	187,2	185,8	186,5	131,3	125,7	128,6	101,4	93,3	97,4	56,5	52,6	54,6	42,9	40,0	41,5
5-9 »	51,0	55,7	53,3	48,7	51,2	49,9	42,5	42,9	42,7	26,4	26,2	26,3	20,5	20,2	20,3
10-14 »	25,5	38,5	31,9	28,5	38,3	33,3	25,1	32,2	28,6	19,9	22,4	21,1	14,0	17,5	15,7
15-19 »	25,3	39,0	32,2	30,3	39,9	35,3	26,6	35,3	30,9	19,9	23,5	21,7	17,3	21,3	19,3
20-24 »	27,8	32,4	30,1	36,5	36,0	36,3	40,5	32,0	36,1	22,5	24,1	23,3	17,7	20,2	18,9
25-29 »	21,9	31,3	26,8	27,1	32,9	30,2	27,0	27,1	27,1	18,6	20,4	19,5	14,2	17,1	15,7
30-34 »	18,1	27,1	22,7	22,2	30,5	26,6	22,4	24,0	23,2	14,8	17,5	16,2	12,3	14,3	13,3
35-39 »	17,6	25,5	21,6	19,0	26,7	23,0	20,4	21,7	21,1	15,2	16,0	15,6	12,4	13,6	13,0
40-44 »	14,3	23,4	18,5	17,4	23,2	20,4	16,5	20,9	18,8	15,3	15,7	15,5	11,8	13,6	12,8
45-49 »	14,9	19,0	16,9	19,2	19,8	19,5	16,2	19,0	17,6	13,7	15,0	14,4	11,8	12,9	12,4
50-54 »	18,0	20,3	19,2	18,6	18,3	18,5	14,9	21,3	18,1	13,6	15,7	14,7	11,7	12,0	11,9
55-59 »	18,0	18,8	18,4	18,1	20,4	19,3	15,9	19,8	17,8	14,8	17,4	16,1	11,5	13,8	12,7
60-64 »	21,0	23,3	22,2	19,3	19,5	19,4	16,1	22,2	19,2	14,4	17,9	16,2	11,9	14,4	13,2
65-69 »	26,4	24,2	25,3	21,6	22,3	22,0	17,1	24,1	20,6	15,4	18,8	17,1	11,9	16,9	14,5
70-74 »	26,8	23,5	25,1	17,6	24,4	21,0	19,7	26,3	23,1	14,2	15,1	14,7	11,6	16,4	14,1
75-80	23,2	29,4	26,3	18,3	21,9	20,1	14,3	27,3	21,0	10,9	17,3	14,3	8,6	14,3	11,7
TOTALE (b)	51,0	54,5	52,8	44,7	45,8	45,3	35,1	36,0	35,5	23,6	24,1	23,9	18,0	19,2	18,6

(a) Cfr. la nota (b) a pag. 5*.

(b) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

Chiudiamo questi cenni sulla mortalità per *tubercolosi in tutte le sue varie forme e sedi*, col dire che, nel 1937, la mortalità dei bambini nel primo anno di vita è stata maggiore negli illegittimi (10,5 su 10.000 nati vivi) che nei legittimi (8,0), come negli anni precedenti, dal 1929 in poi.

Febbri da malaria e cachessia palustre. — Una forte diminuzione si è avuta nei morti per *malaria e cachessia palustre*; ed infatti, mentre nel 1887 si verificarono nel Regno 21 033 decessi per tale morbo, pari a 710 per un milione di abitanti, nel triennio 1912-14 morirono, in media, soltanto 2 623 persone, e cioè, 74 per un milione di abitanti. Il quoziente di mortalità, durante gli anni bellici, è stato peraltro più alto di quello verificatosi nell'ora detto triennio, ma se si pensa alle condizioni eccezionali create dalla guerra, si può affermare che il servizio di profilassi della *malaria* è stato molto accurato, essendosi riusciti a frenare l'inevitabile aggravamento di essa. Un miglioramento della mortalità si iniziò subito dopo la guerra e si accentuò nel 1923, nel quale anno le morti diedero un quoziente di 89 per un milione di abitanti. Nel 1924 si ebbe una leggera recrudescenza rispetto all'anno antecedente, però, dal 1925 al 1937 (24 per ogni milione di abitanti in questo ultimo anno), i quozienti, pure attraverso oscillazioni, mostrano una tendenza alla diminuzione.

Il Compartimento in cui la mortalità raggiunse il massimo fu, nel 1937, la Sardegna (20,3 su 100.000 abitanti) a cui seguono: le Calabrie (10,7) e la Lucania (10,5). I minimi si osservarono nella Venezia Tridentina e nelle Marche (0,1), nella Venezia Giulia e Zara (0,2), nel Piemonte, Lombardia, Emilia e Umbria (0,3), nella Toscana (0,4) e nella Liguria (0,5).

Il numero medio giornaliero delle morti nel Regno, per il 1937, risulta maggiore nei mesi di agosto, settembre, ottobre e luglio; ed anche nelle singole Ripartizioni geografiche si nota, all'incirca, analogo andamento.

Si verifica un notevole numero di morti per malaria nei primi dieci anni di vita.

Nel 1937, la mortalità nei bambini legittimi (1,0 su 10.000 nati vivi), nel primo anno di vita, è stata inferiore a quella degli illegittimi (1,2), contrariamente a ciò che si è verificato nel 1934 e nel biennio 1931-32; mentre un comportamento analogo si è verificato nel 1935 e 1933.

La letalità per *malaria* nel Regno ha oscillato, nel periodo dal 1925 al 1937, da un minimo di 1,0 % nel 1934, 1935, 1936 e 1937 ad un massimo di 1,6 % nel 1932 (*).

Esaminando i quozienti specifici di mortalità, secondo il sesso e l'età, per *malaria e cachessia palustre* (prospetto 25) si nota, che, nel complesso, la mortalità è costantemente superiore nel sesso maschile, probabilmente in relazione al maggior rischio che hanno i maschi di contrarre l'infezione per ragioni di lavoro. Questo comportamento si verifica anche nei singoli gruppi di età, eccetto, nel 1900-02, nell'età da 0 a 4 anni, in cui la mortalità delle femmine è superiore a quella dei maschi.

La mortalità per *malaria* incide maggiormente nei primi cinque anni di vita, diminuisce, in genere, sensibilmente nelle età successive, fino a 24 anni, per poi dimostrare una tendenza all'aumento.

La mortalità per *malaria* ha subito una notevole diminuzione nel triennio 1935-1937 a confronto del 1900-02, e tale diminuzione è risultata maggiore nelle femmine che nei maschi. Un comportamento analogo si osserva nei singoli gruppi di età.

(*) Cfr. la nota (*) a pagina 4*.

PROSPETTO 25. — Quozienti specifici di mortalità per malaria e cachessia palustre.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-4 anni.....	138,0	144,2	141,1	40,5	39,6	40,1	44,8	41,8	43,4	22,7	22,1	22,4	9,0	7,8	8,4
5-9 ».....	36,4	34,5	35,5	10,1	8,6	9,4	10,1	9,0	9,6	6,8	5,5	6,2	3,0	2,5	2,7
10-14 ».....	19,2	13,6	16,4	4,4	3,5	4,0	6,4	4,7	5,6	4,9	3,0	4,0	2,1	1,1	1,6
15-24 ».....	17,5	10,7	14,1	4,9	3,1	4,0	8,7	3,9	6,3	4,0	2,6	3,3	2,1	1,0	1,6
25-34 ».....	17,8	13,5	15,6	4,7	4,0	4,3	8,2	5,1	6,5	4,0	3,1	3,6	2,1	1,3	1,7
35-44 ».....	24,3	16,4	20,3	6,2	4,4	5,3	9,3	5,1	7,1	6,1	3,9	4,9	3,3	1,7	2,4
45-54 ».....	35,9	19,5	27,6	9,2	5,2	7,1	11,1	5,7	8,4	8,7	4,0	6,2	4,1	1,6	2,8
55-64 ».....	49,9	32,1	40,8	13,5	8,1	10,8	15,6	9,7	12,6	11,8	6,5	9,1	6,2	2,9	4,5
65-6.....	72,6	60,5	66,5	17,8	11,9	14,8	22,5	16,2	19,3	13,8	9,4	11,5	7,0	3,4	5,1
TOTALE (a)	44,0	36,7	40,3	12,1	9,5	10,8	13,8	9,7	11,8	8,5	6,2	7,3	3,9	2,4	3,1

(a) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

Tumori maligni.—È noto come i quozienti di mortalità per *tumori maligni* possano essere fortemente influenzati dalla diversa composizione per età della popolazione, perchè questa affezione è rara nelle età giovanili. Ci serviamo, tuttavia, di questi quozienti per un grossolano esame dell'andamento di detta mortalità, nel tempo e nello spazio, per poi esaminare più correttamente con quozienti di mortalità per età, l'andamento di essa attraverso il tempo nel Regno.

PROSPETTO 26. — Morti per tumori maligni nei periodi sotto indicati.

PERIODI	SEDE DEI TUMORI MALIGNI				TOTALE	PER 100.000 ABITANTI	NUMERI INDICI (triennio 1887-89 = 100)
	utero, vagina, ovaia	mammelle	stomaco ed esofago	disseminati in più organi, altri organi o sede non specificata			
1887-89 (media annuale)...	2.403	1.013	3.341	5.969	12.726	42,7	100
1890-92 » ».....	2.375	862	3.739	6.051	13.027	42,8	100
1893-95 » ».....	2.322	874	4.021	6.837	14.054	45,2	106
1896-98 » ».....	2.469	908	4.510	8.040	15.927	50,2	118
1899-901 » ».....	2.548	910	4.697	8.743	16.898	52,3	122
1902-04 » ».....	2.555	918	5.154	9.462	18.089	55,0	129
1905-07 » ».....	2.679	997	6.154	10.398	20.223	60,7	142
1908-10 » ».....	2.746	1.034	6.846	11.459	22.085	64,8	152
1911-13 » ».....	2.604	1.045	7.175	12.333	23.157	66,1	155
1914-16 » ».....	2.724	1.066	7.597	12.788	24.175	66,6	156
1917-19 » ».....	2.599	1.082	7.370	12.861	23.912	67,1	157
1920-22 » ».....	2.607	1.143	8.274	13.423	25.447	69,5	163
1923-25 » ».....	2.720	1.514	20.923		25.157	65,9	154
1926-28 » ».....	2.666	1.510	19.851		24.027	60,3	141
1929-31 » ».....	2.979	1.798	23.728		28.505	69,7	163
1931.....	3.070	1.892	10.819	14.561	30.342	73,7	173
1932.....	3.147	2.000	11.049	13.994	30.190	72,5	170
1933.....	3.221	2.053	11.519	15.563	32.356	77,0	180
1934.....	3.419	2.147	11.988	16.674	34.228	80,7	189
1935.....	3.533	2.378	12.457	16.677	35.045	81,8	192
1936.....	3.764	2.373	12.877	17.073	36.087	83,9	196
1937.....	3.837	2.539	13.146	17.498	37.020	85,3	200

L'esame dei numeri indici mostra come la mortalità per *tumori maligni* sia gradualmente aumentata dal triennio 1887-89 al triennio 1920-22. Essa diminuisce nei successivi trienni 1923-25 e 1926-28 e risale poi, segnando il massimo nel 1937.

È da notare, però, che per gli anni 1924 e 1925 fu condotta una indagine particolare sui morti per *tumori maligni* a mezzo di una speciale scheda di rilevazione, e la diminuzione della mortalità riscontratasi dal 1924 al 1928 è forse da attribuirsi ad una maggiore accuratezza nella rilevazione, potendosi supporre che i medici non abbiano dichiarato come morti per *tumori maligni* individui in cui la causa di morte non fosse perfettamente accertata.

PROSPETTO 27. — **Mortalità per tumori maligni.**
(medie annuali)

SEDE DEI TUMORI MALIGNI	PER 100.000 ABITANTI DELLO STESSO SESSO										NUMERI INDICI (triennio 1900-02 = 100)							
	1900-02		1910-12		1920-22		1930-32		1935-37		1910-12		1920-22		1930-32		1935-37	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Utero, vagina, ovaia . . .	—	15,64	—	14,97	—	13,84	—	14,64	—	16,97	—	96	—	88	—	91	—	106
Mammelle	0,13	5,47	0,10	5,76	0,12	5,95	0,13	8,94	0,12	11,00	77	105	92	109	100	162	92	199
Stomaco ed esofago . . .	17,08	12,52	22,96	17,38	26,19	18,47					134	139	153	148				
Disseminati in più organi, di altri organi o di sede non specificata	28,52	26,61	35,73	34,34	37,50	34,82	70,06	50,56	81,53	58,01	125	129	131	131	152	127	176	147
REGNO { vecchi confini	45,72	60,23	58,80	72,45	63,81	73,08					129	120	140	121	151	121	176	141
{ attuali confini							70,19	74,15	81,65	85,98								

Dall'esame dei dati contenuti nel prospetto 27, in cui è considerata la mortalità per *tumori maligni* secondo il sesso e la sede del tumore, riferendo i morti maschi e femmine rispettivamente alla popolazione maschile e femminile, si nota un andamento diverso, nel tempo, della mortalità per tumori delle varie sedi, e cioè: un comportamento oscillante con un aumento del 6 % nel triennio 1935-37 a confronto del triennio 1900-02 per i *tumori maligni dell'utero, vagina ed ovaia*; un aumento nel sesso femminile per i *tumori maligni delle mammelle*, specialmente nei trienni 1930-32 e 1935-37; e pure un aumento, in ambedue i sessi, per i *tumori maligni dello stomaco, dell'esofago e degli altri organi*, eccetto che per le femmine nei trienni 1930-32, nel quale, la mortalità per l'insieme di queste localizzazioni, pur superando notevolmente la mortalità del triennio 1900-02, è inferiore a quella dei trienni 1910-12, 1920-22 e 1935-37.

Dal prospetto 28 si rileva che la mortalità per *tumori maligni*, nel Regno, nei vecchi confini, ha subito, nel triennio 1935-37, un aumento del 56 % a confronto del periodo base 1900-02; anche nei singoli Compartimenti si nota, nel 1935-37, un aumento rispetto al 1900-02, da un minimo del 4% nella Campania ad un massimo del 137 % nella Sardegna.

Nel triennio 1935-37, la mortalità più elevata, in confronto alla mortalità media del Regno, è data, in ordine decrescente, dalla Toscana, Venezia Tridentina, Emilia, Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezia Giulia e Zara e Veneto. È da notarsi inoltre che il massimo della mortalità nei trienni presi in considerazione, eccettuato il 1930-32, è dato dalla Toscana.

PROSPETTO 28. — Mortalità per tumori maligni.

(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	
Piemonte	52,5	73,3	81,7	94,7	115,7	140	156	180	220	99	111	119	131	138	
Liguria	63,0	76,6	84,1	92,6	112,9	121	133	147	179	119	116	123	128	135	
Lombardia	70,5	85,5	93,6	95,7	113,2	121	133	136	161	133	130	137	132	135	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	120,7	125,2	—	—	—	—	—	—	—	167	149	
Veneto	55,9	65,8	64,5	76,8	87,7	118	115	137	157	106	100	94	106	105	
Venezia G. Zara (a)	—	—	—	84,3	102,8	—	—	—	—	—	—	—	117	123	
Emilia	77,7	94,5	97,9	102,7	117,6	122	126	132	151	147	144	143	142	140	
Toscana	83,5	97,4	105,9	112,7	131,0	117	127	135	157	157	148	155	156	156	
Marche	61,7	70,6	72,1	70,5	80,1	114	117	114	130	116	107	105	98	96	
Umbria	47,9	58,1	58,3	64,2	70,3	121	122	134	147	90	88	85	89	84	
Lazio	55,4	68,4	76,1	70,0	79,4	124	137	126	143	104	104	111	97	95	
Abruzzi e Molise	37,2	47,7	47,2	45,0	48,0	128	127	121	129	70	73	69	62	57	
Campania	39,1	46,0	44,9	35,7	40,8	118	115	91	104	74	70	66	49	49	
Puglie	33,2	41,3	38,6	36,4	43,0	124	116	110	130	63	63	56	50	51	
Lucania	32,0	40,4	41,0	33,7	37,1	126	128	105	116	60	61	60	47	44	
Calabria	30,2	38,1	38,6	33,8	35,9	126	128	112	119	57	58	56	47	43	
Sicilia	33,9	44,4	41,6	38,7	47,6	131	123	114	140	64	68	61	54	57	
Sardegna	20,9	34,0	36,6	40,1	49,6	163	175	192	237	39	52	53	56	59	
REGNO } vecchi confini	53,0	65,7	68,5			124	129	134	156	100	100	100			
REGNO } attuali confini				72,2	83,9								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

PROSPETTO 29. — Quozienti specifici di mortalità per tumori maligni.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-4 anni	3,5	3,2	3,3	3,7	4,4	4,0	4,1	4,2	4,1	3,7	2,7	3,2	3,7	3,0	3,4
5-14 »	1,4	1,2	1,3	2,4	2,2	2,3	2,0	1,9	1,9	2,5	1,9	2,2	2,4	1,7	2,1
15-29 »	3,5	4,7	4,1	5,8	5,4	5,6	5,0	5,0	5,0	5,4	4,8	5,1	5,6	5,5	5,6
30-39 »	15,3	29,4	22,5	18,4	31,2	25,1	17,2	27,7	22,8	18,2	27,6	23,3	19,1	28,7	24,1
40-44 »	33,4	72,3	53,2	42,3	76,2	59,8	40,1	70,6	55,7	42,9	69,5	57,3	48,4	74,9	62,8
45-49 »	55,6	110,9	83,6	70,7	125,3	98,6	71,8	116,1	94,2	77,3	111,0	95,2	87,1	119,0	104,4
50-54 »	97,3	149,6	124,1	116,4	177,1	147,4	122,4	168,5	145,7	134,5	159,0	147,3	143,0	174,2	159,6
55-59 »	144,7	191,2	168,1	181,3	224,2	202,9	197,1	224,8	211,0	208,4	214,3	211,4	243,3	245,7	244,5
60-64 »	220,0	245,3	232,9	263,7	289,1	276,7	288,5	298,2	293,5	315,3	285,4	299,9	356,2	320,2	337,6
65-69 »	288,7	299,0	293,9	360,2	377,6	368,9	389,8	391,9	390,9	430,1	378,3	403,4	504,6	418,8	459,9
70-74 »	337,7	349,1	343,5	421,5	457,3	439,7	471,4	455,3	463,2	530,7	452,5	490,0	616,6	530,8	571,8
75-79 »	351,7	389,1	370,2	474,7	504,1	489,4	500,6	515,1	507,8	536,1	493,1	513,5	689,6	581,3	632,0
80-∞ »	295,2	372,5	334,9	378,4	467,2	424,5	402,4	427,7	416,0	432,9	455,1	445,1	564,2	543,2	552,5
TOTALE (a)	45,7	60,2	53,0	59,0	72,6	65,9	64,0	73,2	68,6	70,2	74,2	72,2	81,7	86,0	83,9

(a) Cfr. la nota (c) a pag. 5*.

PROSPETTO 30. — Quozienti specifici di mortalità per tumori maligni,
distinti per sede nel triennio 1935-37.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	CAVITÀ BOCCALE, STOMACO, FEGATO, PERITONEO E INTESTINO			ORGANI GENITALI			MAMMELLA			PELLE			CARCINOMATOSI E SAR- COMATOSI DIFFUSA, TUMORI MALIGNI DI ALTRI ORGANI E DI ORGANI NON SPECI- FICATI		
	M	F	MF	M (b)	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F (b)	MF
0-4 anni	0,78	0,48	0,63	0,93	0,06	0,50	—	—	—	0,02	0,09	0,05	1,98	2,37	2,17
5-14 »	0,42	0,19	0,31	0,17	0,08	0,13	—	0,02	0,01	0,04	0,02	0,03	1,77	1,40	1,59
15-29 »	1,50	1,34	1,42	0,63	1,13	0,88	—	0,28	0,14	0,09	0,05	0,07	3,41	2,72	3,07
30-39 »	9,60	7,75	8,65	1,45	9,39	5,54	0,01	5,48	2,83	0,33	0,14	0,23	7,76	5,94	6,82
40-44 »	29,28	19,81	24,14	2,93	26,71	15,83	0,06	15,22	8,29	0,84	0,43	0,62	15,27	12,77	13,91
45-49 »	59,35	36,83	47,17	4,85	41,32	24,58	0,03	21,24	11,51	1,81	0,82	1,28	21,07	18,83	19,85
50-54 »	102,36	65,72	82,87	7,80	50,48	30,51	0,28	28,56	15,33	2,88	1,33	2,06	29,66	28,07	28,81
55-59 »	179,71	114,80	145,92	14,52	57,03	36,65	0,32	34,40	18,06	5,58	2,44	3,95	43,21	36,99	39,97
60-64 »	268,19	172,80	218,81	24,57	56,18	40,93	0,59	39,62	20,80	7,99	3,53	5,68	54,90	48,09	51,38
65-69 »	381,47	245,82	310,75	42,93	59,23	51,43	0,68	43,27	22,88	12,23	7,85	9,95	67,29	62,66	64,88
70-74 »	454,32	326,65	387,73	60,42	65,33	62,98	1,22	47,89	25,56	20,60	14,53	17,43	80,01	76,36	78,10
75-79 »	491,14	352,21	417,20	76,66	57,61	66,52	0,83	52,84	28,51	31,66	29,79	30,66	89,30	88,86	89,06
80-89	351,77	291,56	318,32	71,11	47,33	57,90	1,33	64,17	36,24	65,23	62,20	63,55	74,72	77,97	76,52
TOTALE (a)	57,40	41,81	49,47	6,80	16,97	11,97	0,12	11,00	5,65	2,80	2,04	2,31	14,73	14,16	14,44

(a) Vedi la nota (c) a pag. 5*.

(b) Sono compresi anche i tumori maligni del sistema urinario.

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per tumori maligni secondo il sesso e l'età (prospetto 29 e grafico a pag. 34*), si rileva, come, per il complesso delle età, essa sia costantemente superiore nelle femmine: ciò si verifica, in genere, anche nei singoli gruppi di età per i trienni anteriori al 1930-32; negli ultimi due trienni, invece, ed a cominciare, principalmente, dall'età 60-64 anni, la mortalità nei maschi supera quella delle femmine.

La mortalità nell'età da 5 a 14 anni è notevolmente inferiore a quella dell'età 0-4, aumenta poi gradatamente nei gruppi di età successivi, per raggiungere il massimo nell'età da 75-79 anni: questo comportamento si verifica anche in ciascun sesso, separatamente, e in tutti i periodi.

Se si escludono i quozienti di mortalità delle classi di età inferiori a 30 anni, quozienti che offrono ampie oscillazioni dovute presumibilmente allo scarso numero dei casi, si può notare che, in tutte le successive classi di età, la mortalità segna, per i maschi, dal 1900-02 al 1935-37, un aumento, molto più accentuato che nelle femmine; per queste, invece, nel 1930-32, si nota una diminuzione a confronto del 1920-22, salvo che nelle età di 80 anni ed oltre; ma nel 1935-37, a confronto del triennio precedente 1930-32, si nota di nuovo nel sesso femminile un aumento della mortalità in tutte le classi di età da 30 anni in su.

Per il triennio 1935-37 si sono calcolati anche i quozienti specifici di mortalità per tumori maligni, distinti per sede, secondo il sesso e l'età (prospetto 30). Per qualunque localizzazione, considerata in detto prospetto, eccetto che per i neoplasmi della mammella e per i tumori maligni degli organi genitali, si nota che, la mortalità è sem-

pre superiore nel sesso maschile, al contrario, in genere, di ciò che si verifica, come sopra è detto, quando si considerano i quozienti specifici di mortalità per *tumori maligni* nel loro insieme. Da ciò si deduce che sensibilmente incide nella mortalità femminile la mortalità per *tumori maligni degli organi genitali e delle mammelle*, tanto da rendere superiore a quella dei maschi la mortalità del complesso dei *tumori maligni* nel sesso femminile. Dallo stesso prospetto ancor meglio si nota come i *tumori maligni* siano affezioni delle età avanzate, poichè, per tutte le localizzazioni, la mortalità, risulta sensibilmente più accentuata nelle età non inferiori ai 65 anni e minima fino al 40° anno.

Nel prospetto 31 sono riportati i quozienti di mortalità, nel triennio 1935-37, per *tumori degli organi genitali e delle mammelle* nelle femmine, distintamente per sede e natura del tumore, per età e stato civile, per 100.000 femmine censite della stessa età e stato civile.

Poichè alcuni di tali quozienti derivano da uno scarso numero di casi (cfr. tavole relative) deve essere fatta espressa riserva circa le deduzioni che se ne volessero trarre.

Nelle ultime colonne sono riportati i quozienti per gruppi più ampi di età, stabiliti col criterio della nota maggiore frequenza con cui si verificano casi di *tumori* nell'età più avanzata.

PROSPETTO 31. — Mortalità femminile, nel triennio 1935-37, per tumori degli organi genitali e delle mammelle, secondo l'età e lo stato civile.

(Cifre proporzionali a 100.000 femmine, censite al 21 aprile 1936, della stessa età e stato civile)

CAUSE DI MORTE STATO CIVILE	GRUPPI DI ETÀ												TOTALE	
	-25	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	25-39	40-79		40-69
Complesso...	0,41	4,17	11,74	26,89	52,89	75,20	86,04	96,81	100,88	115,90	13,44	87,11	88,16	31,41
Nubili	0,28	3,53	10,52	24,04	58,94	86,82	101,03	126,90	130,72	173,32	9,63	105,83	108,22	9,56
Con., Ved. e Divorz.	2,18	4,57	12,13	27,55	51,72	73,34	83,94	92,84	97,22	109,43	14,92	84,41	85,29	55,93
Tumori maligni dell'utero (N. 48 Elenco)	0,08	1,65	4,87	11,61	23,53	36,34	44,98	50,15	49,50	48,85	5,68	41,71	41,55	14,60
Nubili	0,04	1,37	2,96	8,09	19,91	26,03	37,70	45,75	42,79	46,70	3,17	34,28	34,37	3,01
Con., Ved. e Divorz.	0,61	1,85	5,48	12,42	24,22	37,99	46,01	50,73	50,33	49,09	6,65	42,78	42,57	27,62
Tumori maligni degli altri organi genitali femmi- nili (N. 49 Elenco)	0,14	0,78	0,95	1,64	3,18	4,96	5,50	6,89	6,64	10,34	1,07	6,30	6,44	2,36
Nubili	0,13	0,61	1,39	1,69	3,92	10,33	9,05	10,03	8,95	14,66	1,05	9,09	9,25	0,93
Con., Ved. e Divorz.	0,30	0,80	0,81	1,62	3,04	4,10	5,01	6,48	6,36	9,85	1,08	5,90	6,04	3,98
Tumori maligni delle mam- melle (N. 50 Elenco)	0,03	0,67	2,87	8,20	15,20	21,24	28,57	34,41	39,39	49,16	3,67	39,68	31,73	10,99
Nubili	0,02	0,61	2,26	7,97	17,09	31,99	42,73	60,79	66,91	99,07	2,56	48,00	49,98	4,10
Con., Ved. e Divorz.	0,25	0,71	3,06	8,36	14,83	19,52	26,58	30,93	36,23	43,54	4,10	28,18	29,12	18,72
Tumori non maligni degli organi genitali femmi- nili (N. 54-a Elenco)	0,15	1,09	2,99	5,25	10,73	12,42	6,93	5,10	4,98	7,23	2,95	8,20	8,22	3,36
Nubili	0,09	0,94	3,74	6,28	17,71	18,28	11,31	10,03	11,67	12,51	2,80	14,19	14,31	1,49
Con., Ved. e Divorz.	1,01	1,18	2,75	5,01	9,42	11,48	6,31	4,45	4,16	6,64	3,01	7,34	7,35	5,46
Tumori degli organi geni- tali femminili il cui ca- rattere maligno o non maligno non è specifi- cato (N. 55-a Elenco)	0,04	0,06	0,11	0,23	0,25	0,06	0,26	0,17	0,32	0,07	0,22	0,22	0,09
Nubili	—	0,17	—	0,31	0,20	0,25	0,31	0,39	0,39	0,05	0,27	0,30	0,03
Con., Ved. e Divorz.	—	0,06	0,03	0,14	0,21	0,25	0,04	0,25	0,14	0,31	0,08	0,21	0,21	0,15

La mortalità per il complesso dei *tumori di qualsiasi natura degli organi genitali e delle mammelle* appare notevolmente più alta nelle coniugate, vedove e divorziate che non nelle nubili; ma se si esaminano i quozienti per grandi gruppi di età, questa prevalenza si nota solo, in lieve misura, per la mortalità delle coniugate, vedove e divorziate da 25 a 39 anni.

I *tumori* che danno la massima mortalità nelle donne di ogni stato civile sono quelli *maligni dell'utero*: per le coniugate, vedove e divorziate, in ogni grande gruppo di età, essa, per i *tumori maligni dell'utero* raggiunge i valori più alti.

Al contrario, per i *tumori maligni degli altri organi genitali femminili*, si ha nelle nubili una mortalità maggiore che nelle coniugate, in tutti i grandi gruppi di età considerati, fatta eccezione della classe di età 25-39.

Analogo andamento si ha per i *tumori non maligni degli organi genitali femminili*, con la stessa eccezione nell'età da 25 a 39 anni, in cui la mortalità è lievemente superiore nelle coniugate, vedove e divorziate.

Per i *tumori maligni delle mammelle*, invece, si ha una mortalità minore nelle nubili solo nel gruppo di età 25-39 anni, mentre nei gruppi 40-79 e 40-∞ la mortalità nelle nubili è superiore di oltre il 70 % a quella delle coniugate, vedove e divorziate.

Per i *tumori degli organi genitali femminili il cui carattere maligno o non maligno non è specificato* si nota una maggiore mortalità delle coniugate, nell'età da 25 a 39 anni, e delle nubili nell'età 40-79 e 40-∞, ma è da osservare che i casi registrati sono poco numerosi (19 nel 1935, 31 nel 1936 e 8 nel 1937).

La mortalità per *tumori maligni*, è stata, nel 1937, come nel sessennio 1931-36, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, sensibilmente superiore a quella degli altri Comuni, il che può dipendere dall'affluenza nei luoghi di cura di tali Comuni, dei malati del territorio circostante.

Fra i Comuni che al censimento del 21 aprile 1936, contavano una popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, i massimi della mortalità per *tumori maligni* si ebbero nel 1937 in Firenze (20,6 su 10.000 abitanti), Brescia (17,0), Livorno (16,5), Bologna (16,3), Trieste (15,8), Torino (14,9) e Padova (14,0); i minimi in Taranto (3,8), Bari e Reggio di Calabria (4,8), Catania (5,9) e Palermo (6,0), con comportamento, all'incirca, uguale a quello verificatosi negli anni dal 1931 al 1936.

I decessi per *tumori maligni* sono più numerosi nelle femmine che nei maschi, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1937.

Sembra che le stagioni non abbiano nessuna influenza sul numero di questi decessi.

I *tumori maligni* danno il maggior numero di morti nell'età avanzate: più della metà dei morti nel 1937, come negli otto anni dal 1929 al 1936, era in età da 60 a 79 anni.

Diabete mellito. — Si è presa in particolare considerazione la mortalità per *diabete mellito*, perchè sull'aumento dei casi di questa malattia viene, da qualche tempo, richiamata l'attenzione degli studiosi. Bisogna, però, considerare che l'aumento, che si riscontra studiando le cifre, può essersi accentuato anche per la maggiore frequenza di diagnosi di tale malattia, dovuta al diffondersi dell'uso di mezzi più moderni di indagine clinica.

Dall'esame del prospetto 32 appare come la mortalità per *diabete mellito*, nel Regno, nei vecchi confini, sia aumentata, nel 1935-37, a confronto del triennio base

1900-02, del 195 %, ed anche in tutti i Compartimenti essa è notevolmente aumentata, da un massimo del 320 % nel Piemonte ad un minimo del 57 % nella Lucania. Inoltre, nel 1935-37, hanno superato la mortalità media del Regno, in ordine progressivo decrescente, i seguenti Compartimenti: Liguria, Lazio, Sicilia, Piemonte, Venezia Giulia e Zara, Toscana e Campania.

PROSPETTO 32. — Mortalità per diabete mellito.

(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902 (*)	1910- 1912 (*)	1920- 1922 (*)	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	2,9	5,1	4,9	9,9	12,1	178	169	341	420	85	107	100	114	122	
Liguria	5,7	8,3	8,3	16,0	17,6	147	146	282	310	167	173	169	185	176	
Lombardia	2,8	4,2	4,4	7,6	8,8	149	157	271	313	83	87	90	88	88	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	5,7	7,6	—	—	—	—	—	—	—	66	76	
Veneto	2,7	4,1	3,6	6,7	8,3	151	130	245	301	81	86	73	78	83	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	8,3	11,7	—	—	—	—	—	—	—	96	117	
Emilia	3,0	4,0	4,3	8,1	9,4	133	143	270	313	89	84	88	94	94	
Toscana	4,0	5,6	5,0	8,9	11,3	139	125	222	281	118	116	103	103	113	
Marche	3,5	4,7	4,6	8,8	9,2	132	130	250	262	104	97	94	102	92	
Umbria	3,5	4,2	5,7	10,4	9,7	118	160	294	274	105	87	116	121	97	
Lazio	5,2	8,5	8,0	12,5	14,4	164	154	241	278	153	177	163	144	144	
Abruzzi e Molise	3,1	4,2	4,7	6,5	7,6	134	152	209	244	92	87	97	76	76	
Campania	3,9	5,1	5,7	9,9	10,1	131	147	255	260	114	106	116	114	101	
Puglia	3,0	3,2	3,6	5,9	6,5	107	119	197	216	88	67	73	68	65	
Lucania	3,1	2,4	3,0	5,1	4,9	77	96	164	157	92	50	61	59	49	
Calabria	2,7	3,4	3,1	5,6	5,7	128	117	210	217	78	71	63	65	57	
Sicilia	3,7	5,2	5,6	9,8	12,2	140	151	265	330	109	108	114	114	123	
Sardegna	4,0	5,5	6,0	7,6	7,6	137	151	191	189	118	114	123	89	76	
REGNO { vecchi contini	3,4	4,8	4,9			141	145	256	295	100	100	100			
{ attuali contini				8,6	10,0								100	100	


(*) Sono compresi i morti per diabete insipido (cifre trascurabili). (a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Dato il concetto predominante, che il *diabete mellito* sia una malattia in certo modo legata alle condizioni di alimentazione e di vita della civiltà moderna, specialmente nei grandi centri, si sono calcolati, sui dati della Tav. 2 (V. pag. 56) e per gli anni antecedenti sui dati delle rispettive analoghe tavole, quozienti di mortalità nel complesso dei capiluoghi di Provincia e degli altri Comuni di ciascun Compartimento. Nel periodo di osservazione di 9 anni (1929-1937), la mortalità per *diabete mellito* risulta sensibilmente più accentuata nei capiluoghi di Provincia che negli altri Comuni: fanno eccezione, nel 1929, l'Umbria; nel 1930, la Lucania; nel 1931, la Venezia Tridentina; nel 1935 l'Umbria e la Lucania e nel 1936 la Lucania in cui non si è verificato alcun decesso nel complesso dei capiluoghi di Provincia.

La mortalità per *diabete mellito*, nei 22 Comuni che al censimento del 21 aprile 1936 contavano più di 100.000 abitanti, raggiunge, nell'anno 1937, i massimi nei Comuni di: Genova (2,1 su 10.000 abitanti) e Catania (2,0); i minimi in Cagliari (0,6), Bari e Ferrara (0,7) e Taranto (0,8).

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per *diabete mellito* secondo il sesso e l'età (prospetto 33 e grafico a pagina 34*), si nota come, nei periodi considerati,

Grafico N. 2. — MORTALITÀ PER TUMORI MALIGNI E DIABETE MELLITO PER SESSO ED ETÀ (*). (Scala logaritmica).



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

(*) Rispettivamente per 100.000 e per 1.000.000 di coetanei censiti dello stesso sesso. Vedi anche la nota (I) a pag. 4*.

eccettuato il triennio 1935-37, la mortalità sia costantemente superiore nel sesso maschile e lo stesso comportamento, in generale, si verifica anche nei singoli gruppi di età considerati. La mortalità aumenta gradatamente fino al 44° anno e poi si accentua sensibilmente nei gruppi di età successivi, sia nei maschi che nelle femmine.

Nel triennio 1935-37 a confronto del 1900-02, la mortalità per singoli gruppi di età considerati si presenta, in generale, aumentata, specialmente, e in maggior misura, nel sesso femminile, nel quale, in alcuni gruppi delle età avanzate, è giunta a superare quella dei maschi. Fanno eccezione i gruppi di età 25-34 e 35-44, nei maschi, e 15-24 nelle femmine, in cui la mortalità, nel 1935-37 a confronto del 1900-02 risulta diminuita.

PROSPETTO 33. — Quozienti specifici di mortalità per diabete mellito.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02 (*)			1910-12 (*)			1920-22 (*)			1930-32			1935-37		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-9 anni.....	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
10-14 »	0,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
15-24 »	1,4	0,9	1,1	1,4	0,9	1,2	1,2	0,7	1,0	1,3	0,9	1,1	1,5	0,8	1,1
25-34 »	2,2	1,2	1,7	2,3	1,6	1,9	2,0	1,4	1,7	2,5	1,5	1,9	2,1	1,5	1,8
35-44 »	3,4	2,0	2,7	3,9	2,5	3,2	3,4	2,5	2,9	4,0	3,2	3,6	3,0	3,0	3,0
45-54 »	7,1	3,7	5,3	9,1	5,3	7,1	7,8	6,2	7,0	11,9	10,2	11,0	10,6	10,9	10,8
55-64 »	15,1	9,2	12,1	22,0	14,4	18,1	20,1	15,8	17,9	32,1	32,1	32,1	35,9	36,4	36,2
65-69.....	23,7	11,8	17,7	33,5	21,3	27,3	33,7	23,8	28,7	58,5	53,6	56,0	68,4	71,8	70,2
TOTALE (a) ...	4,3	2,4	3,4	5,8	3,8	4,8	5,6	4,2	4,9	8,9	8,4	8,6	9,6	10,4	10,0

(*) Vedi la nota (*) a pag. 33*.

(a) Vedi la nota (c) a pag. 5*.

Convulsioni nei bambini in età inferiore ai 5 anni. — Il quoziente di mortalità per *convulsioni* nei bambini, in età inferiore ai 5 anni, nel Regno, è diminuito progressivamente e sensibilmente dall'anno 1925 (1) (291 per un milione di abitanti) al 1937 (120).

Poichè spesso, con la voce *convulsioni* viene indicato l'episodio finale della malattia, è da ritenere che, almeno in parte, la diminuzione della mortalità sia dovuta ad una più esatta specificazione della malattia prima, e della quale lo stato eclamptico ha rappresentato l'accidente terminale.

È da notare, inoltre, che dal 1924 furono tenute distinte dalle *malattie delle ghiandole tiroidi, paratiroidi e del timo*, quelle delle *ghiandole paratiroidi* delle quali, in massima parte, lo stato spasmofilico è l'espressione.

Forti differenze si osservano nella mortalità fra i singoli Compartimenti: nel 1937, dai massimi di 40,7 su 100 000 abitanti nella Lucania, di 33,6 nella Campania e di 31,2 nelle Calabrie, si scende a cifre minime di 2,2 nel Piemonte, di 2,5 nella Liguria e di 3,0 nella Toscana.

Mettendo a confronto la mortalità dei Compartimenti e del Regno, nel 1937, con quella degli anni dal 1931 al 1936, si nota: 1° che, in generale, i massimi ed i

(1) La comparabilità dei dati per le *convulsioni* nei bambini, in età inferiore ai 5 anni, si può fare per gli anni dal 1925 in poi, perchè, da tale anno, i morti per detta causa, in età non inferiore ai 5 anni, non furono più compresi in questa voce, mentre precedentemente vi erano compresi i morti di età non superiore ai 15 anni.

minimi della mortalità si sono verificati negli stessi Compartimenti; 2° che nel Regno, fino al 1936, vi è una costante e progressiva diminuzione della mortalità per *convulsioni* nei bambini in età inferiore ai 5 anni, fatto che, in genere, si verifica anche nella maggior parte dei Compartimenti; 3° che nel 1937 a confronto dell'anno precedente si verificò nel Regno e nei Compartimenti della Liguria, Lombardia, Venezia Giulia e Zara, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Lucania, Calabrie, Sicilia e Sardegna un lieve aumento della mortalità.

PROSPETTO 34. — Quozienti specifici di mortalità per convulsioni nei bambini in età inferiore ai cinque anni.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

S E S S O	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32	1935-37
	medie annuali				
Maschi	431,7	371,5	356,2	142,6	122,1
Femmine	371,1	327,8	312,1	123,3	106,1
TOTALE	402,0	350,1	334,7	133,1	114,2

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per convulsioni nei bambini in età inferiore ai 5 anni, secondo il sesso (prospetto 34), si rileva come la mortalità sia andata sempre diminuendo e subisce nel 1935-37 la notevole riduzione del 72 % a confronto del 1900-02, cui forse non sono estranei e le accennate variazioni della nomenclatura nosologica ed una maggiore esattezza di diagnosi.

La mortalità si presenta nei trienni considerati costantemente superiore nel sesso maschile.

Malattie del cuore (*). — Dal prospetto seguente, appare che la mortalità per le *malattie del cuore* per il Regno nei vecchi confini, è diminuita, nel triennio 1935-37 del 12 % a confronto di quella del periodo base 1900-02 e lo stesso comportamento si nota nei singoli Compartimenti, fatta eccezione del Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna che hanno segnato nel 1935-37 un aumento oscillante dall'1 al 17 %.

Inoltre, nel 1935-37, si riscontra, in ordine progressivo decrescente, una mortalità maggiore a quella media del Regno nei seguenti Compartimenti: Piemonte, Venezia Tridentina, Liguria, Lombardia, Campania, Abruzzi e Molise e Lucania. È importante notare che il numero dei maschi morti per *malattie del cuore* è inferiore a quello delle femmine, come risulta in tutti gli anni dal 1887 al 1937, fatto, in parte, dovuto forse alla maggiore predisposizione delle donne a contrarre affezioni reumatiche; infatti, in questi 51 anni di osservazioni, solamente in 11, e cioè nel 1907, dal 1909 al 1917 e nel 1919, il numero dei maschi morti per *reumatismo articolare acuto* è stato maggiore di quello delle femmine.

Le *malattie del cuore* danno assai più della metà dei morti in età da 60 a 79 anni, mentre pochi sono i casi di morte nell'età infantile.

(*) Numeri 91, 92, 93 e 95 dell'Elenco nosologico.

PROSPETTO 35. — Mortalità per malattie del cuore.
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	210,8	238,2	235,1	215,9	212,6	113	112	102	101	124	131	132	140	142	
Liguria	181,5	196,6	201,0	190,1	188,4	108	111	105	104	107	108	113	124	126	
Lombardia	196,6	206,5	198,7	170,9	171,6	105	101	87	87	116	114	112	111	115	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	196,9	207,6	—	—	—	—	—	—	—	—	128	
Veneto	157,0	167,3	157,8	141,6	135,7	107	100	90	86	92	92	89	92	91	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	117,8	126,8	—	—	—	—	—	—	—	—	77	
Emilia	165,2	167,7	161,2	144,2	131,5	102	98	87	80	97	92	91	94	88	
Toscana	182,4	158,5	166,0	141,0	131,7	87	91	77	72	107	87	93	92	88	
Marche	190,0	195,5	193,7	140,4	127,8	103	102	74	67	112	107	109	91	85	
Umbria	179,1	188,7	185,6	150,3	141,8	105	104	84	79	105	104	104	98	95	
Lazio	148,5	154,9	148,3	127,2	118,4	104	100	86	80	87	85	83	83	79	
Abruzzi e Molise	172,6	191,8	193,9	173,0	159,3	111	112	100	92	102	105	109	113	106	
Campania	209,0	210,1	194,5	167,2	162,6	101	93	80	78	123	115	109	109	109	
Puglie	137,2	158,0	152,4	138,7	135,0	115	111	101	98	81	87	86	90	90	
Lucania	180,8	193,2	205,4	162,4	155,1	107	114	90	86	106	106	115	106	104	
Calabrie	144,8	161,0	178,1	137,8	141,2	111	123	95	98	85	89	100	90	94	
Sicilia	107,3	141,5	145,3	122,5	125,4	132	135	114	117	63	78	82	80	84	
Sardegna	94,4	130,5	122,0	99,2	107,5	138	129	105	114	56	72	69	65	72	
REGNO { vecchi confini	169,8	181,9	178,0			107	105	91	88	100	100	100			
{ attuali confini				153,7	149,8								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

PROSPETTO 36. — Quozienti specifici di mortalità per malattie del cuore.
(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1931-32 (*)			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
0-4 anni	21,3	18,4	19,9	26,8	23,7	25,5	34,3	29,0	31,7	6,8	7,1	6,9	7,0	6,7	6,9
5-9 »	13,0	15,5	14,2	12,3	13,1	12,7	12,8	14,2	13,5	7,0	7,7	7,4	7,0	8,3	7,7
10-14 »	14,1	19,2	16,0	14,1	18,0	16,0	15,5	19,5	17,5	10,8	14,0	12,4	10,4	13,2	11,8
15-24 »	22,5	27,1	24,8	24,8	27,4	26,1	24,4	23,5	23,5	15,0	17,4	16,2	14,1	16,9	15,5
25-34 »	30,9	50,2	40,8	33,4	47,7	41,0	32,0	38,4	35,4	20,7	28,8	24,9	19,0	29,5	24,2
35-44 »	56,7	88,1	72,6	65,5	87,9	77,2	53,9	72,1	63,4	40,6	53,4	47,6	37,2	51,5	44,8
45-54 »	125,8	163,5	144,9	134,4	166,0	150,5	122,4	149,8	136,2	89,4	118,5	104,7	86,1	106,1	96,8
55-64 »	355,6	481,0	419,2	363,1	472,6	418,7	335,4	430,7	383,5	273,6	347,1	311,5	258,7	317,1	289,0
65-ω	1384,7	1830,7	1609,5	1469,7	1927,7	1701,4	1441,2	1843,9	1645,8	1320,3	1603,9	1468,3	1235,3	1536,8	1394,4
TOTALE (b)	144,6	194,7	169,8	159,3	204,6	182,3	157,0	198,1	177,8	135,9	174,8	155,8	127,9	170,9	149,8

(b) Vedi la nota (c) a pag. 5*.

(*) Non si sono dati i quozienti specifici per il triennio 1930-32, perchè nella tavola in cui i morti nel 1930 sono classificati per età, le malattie del cuore si trovano unite a quelle del pericardio. Nel biennio 1931-32 e nel triennio 1935-37 vi sono compresi i decessi per malattie di Hodgson, di Adams-Stokes e per Tachicardia.

Esaminando i quozienti specifici di mortalità secondo il sesso e l'età (prospetto 36), si rileva che, nel complesso, in tutti i periodi considerati, la mortalità risulta sensibilmente superiore nel sesso femminile. Ciò si verifica anche nei singoli gruppi di età, eccetto nell'età 0-4 anni nei trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22 e 1935-37 e nella età 15-24 nel triennio 1920-22.

La mortalità per *malattie del cuore*, dopo aver subito nei trienni 1900-02, 1910-12 e 1920-22 una diminuzione nell'età 5-9 a confronto dell'età 0-4, comincia nei gruppi di età successivi ad aumentare gradualmente, per raddoppiarsi, all'incirca, nell'età 45-54 a confronto dell'età 35-44 e aumentare rapidamente nei gruppi di età successivi. Lo stesso comportamento si ha nel biennio 1931-32 e nel triennio 1935-37, però, non si nota una diminuzione della mortalità nell'età 5-9 a confronto dell'età 0-4, ma già il principio del graduale andamento suindicato.

Nel 1935-37, a confronto del triennio 1900-02, si dimostra una diminuzione percentuale del 12 % della mortalità per *malattie del cuore*. Questa diminuzione, che è uguale nei due sessi, si verifica in tutte le classi di età ed è particolarmente manifesta nell'età da 0 a 9 anni, in cui, però, il numero dei casi caduti sotto osservazione non è notevole.

Bronchite acuta e cronica (*). — La mortalità per *bronchiti (acuta e cronica)* nel Regno, è stata nel 1937 di 424 per ogni milione di abitanti. Essa, attraverso oscillazioni più o meno ampie nel tempo ed un accentuatissimo aumento (1733 morti su 1.000.000 di abitanti) verificatosi nel 1918 in rapporto con la *pandemia influenzale*, ha, a partire dal 1887, un andamento decrescente con un massimo del triennio 1890-92 (2611) ed un minimo nel 1934 (369), con una diminuzione dell'83 % a confronto del triennio 1887-89. Dal 1935 in poi si nota una certa tendenza all'aumento della mortalità per queste cause. Per un esatto criterio di comparazione nel tempo, occorre ricordare che nel 1924 furono mutati i criteri di classificazione, perchè le morti per *bronchite capillare*, non furono più comprese fra le *bronchiti acute*, ma fra le *bronco polmoniti*.

Volendosi considerare le morti per *bronchite acuta* separatamente da quelle per *bronchite cronica*, è bene tener presente che, negli anni anteriori al 1931, i morti per *bronchite (senz'altra indicazione sulla scheda)* al di sopra di 60 anni erano classificati fra i decessi per *bronchite cronica* e quelli fino a 60 anni fra i decessi per *bronchite acuta*.

Nella nuova nomenclatura nosologica, invece, i morti per *bronchite senza altra indicazione*, dal 1931 in poi, sono stati classificati in una voce separata, e quindi le proporzioni per 100.000 abitanti, qui appresso indicate, per il 1937, per le due specie di *bronchiti*, non sono comparabili con quelle date nelle statistiche degli anni anteriori al 1931.

I Compartimenti in cui la mortalità per *bronchite acuta* raggiunse il massimo furono, nel 1937, la Lucania (21,4 per ogni 100.000 abitanti), le Puglie (13,7), le Calabrie (12,6) e la Sicilia (10,4); i minimi si ebbero nella Venezia Giulia e Zara (3,6) e nella Toscana (3,7).

I Compartimenti in cui la mortalità per *bronchite cronica* raggiunse i massimi furono, nel 1937, la Lucania (31,6 su 100.000 abitanti), le Puglie (23,1), gli Abruzzi e Molise (22,9) e le Marche (21,5); i minimi si ebbero nella Liguria (10,5), nella Venezia Tridentina (11,4) e nel Veneto (11,5).

Il maggior numero medio giornaliero di morti, per il complesso delle *bronchiti*, si ha nei mesi freddi, ed infatti, nel 1937, i massimi si notarono in gennaio, febbraio,

(*) Nella nomenclatura nosologica usata dall'Istituto per gli anni dal 1924 al 1930, le morti per *bronchiti* comprendono anche quelle per *catarro soffocante* (7 casi nel 1931), che invece a cominciare dal 1931 sono comprese nella voce «*congestione, edema, embolia, infarto emorragico e trombosi del polmone*». Vedi, a tale proposito, *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932* — Parte I - Introduzione - Allegato I, a pag. 139*.

dicembre e marzo, verificandosi nelle singole Ripartizioni geografiche, all'incirca, lo stesso comportamento; i morti per *bronchite acuta* appartengono, per la maggior parte, a bambini in età da 0 a 2 anni; nel 1937 la mortalità per il complesso delle *bronchiti* nei bambini nel primo anno di vita, è stata di poco superiore nei legittimi (41,5 su 10.000 nati vivi) a confronto degli illegittimi (41,0).

Esaminando i quozienti specifici di mortalità per *bronchite cronica* secondo il sesso e l'età (prospetto 16), si rileva come nel complesso la mortalità nei periodi triennali considerati, sia superiore nel sesso femminile. Questo comportamento si verifica, salvo rare eccezioni, anche nei singoli gruppi di età per i primi tre trienni considerati. Nei trienni 1930-32 e 1935-37, invece, ciò si verifica solo in alcuni gruppi di età, il che può forse essere anche in relazione al diverso metodo di classificazione adoperato per i morti per *bronchite*, cui si è già accennato.

In genere, la mortalità minima per *bronchite cronica* si ha nell'età da 10 a 19 anni e la massima nelle età avanzate.

Nel tempo, dal triennio 1900-02 al 1920-22, la mortalità per *bronchite cronica* mostra una diminuzione, che si rileva notevolmente più accentuata nel sesso femminile, mentre nei trienni 1930-32 e 1935-37 detta mortalità è, in genere, alquanto risalita.

Broncopolmonite acuta e polmonite lobare. — A) *Broncopolmonite acuta.* —

Nelle statistiche delle cause di morte, i decessi per *bronchite capillare* furono classificati, fino a tutto il 1923, fra le *bronchiti acute*, e, dal 1924 in poi, fra le *broncopolmoniti*; per tale fatto, la comparazione nel tempo della mortalità per *broncopolmonite* è possibile solo dal 1924. Essa ha una tendenza alla diminuzione, con riesacerbazioni nel 1926 e nel 1929, nei quali anni anche la mortalità per *influenza* ha avuto notevoli aumenti in confronto agli anni contigui, onde è a presumersi che gli aumenti bruschi della mortalità per *broncopolmonite*, verificatisi in detti anni, siano principalmente dovuti a forme di origine *influenzale* e per le quali tale natura non era indicata, chè altrimenti sarebbero state classificate fra le morti dovute ad *influenza*. Nel 1930 il quoziente di mortalità fu di 1231 per un milione di abitanti, risalì nel 1931 (1358) e nel 1932 (1416), per ridiscendere nel 1933 (1290) e nel 1934 (1223). Nel 1935 e 1936 la mortalità si rivela in aumento (1348 e 1441, rispettivamente, per un milione di abitanti). Nel 1937 il quoziente di mortalità è stato di 1440 per un milione di abitanti.

La mortalità nei singoli Compartimenti oscilla, nel 1937, fra un minimo di 83,4 su 100.000 abitanti nella Venezia Tridentina ed un massimo di 219,6 nelle Puglie: i più alti quozienti si riscontrano, in genere, nell'Italia Meridionale ed Insulare.

B) *Polmonite lobare.* — Solo dal 1899 i morti per *polmonite lobare* furono distinti dai morti per *broncopolmonite*. La mortalità media annua per *polmonite lobare* dal 1899 al 1907, desunta da medie triennali, fu superiore a quella per *broncopolmonite*; nei trienni 1908-10 e 1911-13 e negli anni successivi essa fu sempre inferiore, sino a distanziarsene, in questi ultimi anni, di più della metà.

Poichè non si è modificato con l'andar del tempo il criterio di classificazione dei dati e poichè le oscillazioni annue della mortalità per *polmonite lobare* sono generalmente sincrone con quelle della mortalità per *broncopolmonite*, è a supporre una reale diminuzione di essa.

Nel settennio 1931-37 il minimo della mortalità per *polmonite lobare* si è ri-

scontrato nel 1934 (547 morti su un milione di abitanti), con comportamento analogo a quello della *broncopolmonite*.

La mortalità nei singoli Compartimenti oscilla, nel 1937, fra un minimo di 35,5 su 100.000 abitanti (Veneto) ed un massimo di 81,2 (Sicilia). La mortalità più intensa per *polmonite lobare* si riscontra, in genere, nei Compartimenti dell'Italia Meridionale e Insulare.

Il maggior numero medio giornaliero di morti per *broncopolmonite* e *polmonite lobare*, nel Regno, si verifica nei mesi freddi: nel 1937, i massimi si ebbero in gennaio, febbraio, dicembre e marzo; i minimi in agosto, settembre, luglio e ottobre, con andamento, all'incirca, analogo a quello degli anni dal 1931 al 1936.

Un andamento quasi analogo si osserva nelle singole Ripartizioni geografiche.

Nei primi due anni di vita, e particolarmente a meno di un anno, si ha un forte numero di bambini morti per questo gruppo di cause; il numero dei morti diminuisce nelle età della fanciullezza e giovinezza ed incomincia, in genere, ad accentuarsi a partire dall'età di 30 anni, per subire un graduale aumento col passare alle età avanzate.

Nel 1937, la mortalità per *broncopolmonite* e *polmonite lobare* nei bambini nel primo anno di vita, è stata inferiore nei legittimi (204,5 su 10.000 nati vivi) a confronto degli illegittimi (269,7), analogamente a ciò che si è verificato nei tre anni precedenti.

Enteriti al disotto di 2 anni (a). — Dal 1924, le morti per *enteriti*, nei bambini in età inferiore ai 2 anni, sono state tenute distinte, per tutte le classificazioni, da quelle avvenute, per la stessa causa, in individui di età superiore a 2 anni.

Nel periodo 1924-37 si nota, nel Regno, nella mortalità per *enteriti* nei bambini al disotto di 2 anni, un aumento fino all'anno 1926 ed una tendenza alla diminuzione dal 1927 in poi; ed infatti, tale mortalità, da 1611, per ogni milione di abitanti nel 1924, salì a 1716 nel 1926, e negli anni dal 1927 al 1936 oscillò fra un minimo di 882 nel 1936 e un massimo di 1682 nel 1928. Nel 1937, il quoziente di mortalità fu di 1094 per ogni milione di abitanti.

Il numero medio giornaliero dei morti nel Regno, durante il 1937, comincia a salire nel mese di giugno, raggiunge i massimi in luglio e agosto, per poi discendere nei mesi successivi; anche negli anni dal 1929 al 1936 si ha un andamento, all'incirca, analogo, il che conferma, quanto era già noto sulla maggiore frequenza delle malattie del tubo digerente nei mesi estivi. Un andamento poco differente si osserva nelle singole Ripartizioni geografiche.

Nel 1937, con lo stesso comportamento verificatosi nei bienni 1929-30, 1931-32 e negli anni dal 1933 al 1936, la mortalità dei bambini per *enteriti* nel primo anno di vita, è stata maggiore fra gli illegittimi (448,9 su 10.000 nati vivi) che fra i legittimi (348,3).

Esaminando i quozienti specifici di detta mortalità, dati nel prospetto 37, notasi come essa, nel Regno, sia diminuita notevolmente nel 1935-37 a confronto del 1900-02,

(a) Nella nomenclatura nosologica, usata dall'Istituto Centrale di Statistica dal 1924 al 1930, in questa voce non erano comprese l'*infezione intestinale* e l'*enterocolite muco-membranosa* al disotto di 2 anni.

pur dimostrando, nel 1920-22, un discreto aumento rispetto al triennio 1910-12. La mortalità è sempre, nei cinque trienni considerati, superiore nel sesso maschile.

PROSPETTO 37. — Quozienti specifici di mortalità per enteriti (al disotto di due anni).

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

S E S S O	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32	1935-37
	medie annuali				
Maschi	4106,7	2974,4	3306,6	2871,9	2461,4
Femmine	4035,9	2885,5	3139,9	2787,4	2384,7
TOTALE	4072,0	2930,8	3225,3	2830,5	2423,7

Esaminando poi i quozienti specifici per Compartimenti (prospetto 38) si rileva nel 1935-37, a confronto del 1930-32, in tutti i Compartimenti una più o meno notevole diminuzione della mortalità, che va da un massimo del 47 % nell'Umbria ad un minimo del 4 % negli Abruzzi e Molise; fanno eccezione solamente le Calabrie e la Campania in cui si nota un lieve aumento della mortalità, rispettivamente del 3 % e 4 %. In genere la mortalità ha segnato quozienti di notevole altezza, nei due trienni considerati, nei Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare, però anche nella Lombardia si notano alti quozienti di mortalità (3668,3 e 2908,5 per 100.000 abitanti, rispettivamente nel 1930-32 e 1935-37); i minimi quozienti di mortalità, sia nel 1930-32 che nel 1935-37, si sono avuti nella Liguria, Toscana ed Emilia.

PROSPETTO 38. — Quozienti specifici di mortalità per enteriti (al disotto di due anni).

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età)

COMPARTIMENTI (a)	1930-1932 (*)	1935-1937 (*)	COMPARTIMENTI (a)	1930-1932 (*)	1935-1937 (*)	COMPARTIMENTI (a)	1930-1932 (*)	1935-1937 (*)
Liguria	1124,8	693,4	Venezia G. e Zara .	1871,5	1728,9	Campania	3358,2	3496,9
Toscana	1235,2	702,4	Venezia Tridentina .	2027,5	1569,5	Lombardia	3668,3	2908,5
Emilia	1416,2	792,7	Umbria	2125,9	1133,4	Abruzzi e Molise .	3676,5	3546,5
Marche	1734,7	1228,0	Lazio	2130,2	1908,8	Puglie	4106,0	3836,7
Piemonte	1797,1	1149,5	Sardegna	2966,8	2715,2	Sicilia	4287,7	3829,5
Veneto	1850,3	1090,0	Calabrie	3092,4	3170,5	Lucania	5428,3	4515,5

(a) In ordine crescente della mortalità 1930-32.

(*) Media annuale.

Cirrosi alcoolica del fegato e alcoolismo cronico. — Per compilare il prospetto 39 si sono dovuti dedurre a calcolo i morti per *cirrosi alcoolica del fegato* nei trienni 1900-02, 1910-12 e 1920-22, essendo essi inclusi in un'unica voce (*epatite e cirrosi*): il calcolo è stato eseguito, supponendo che i morti per *cirrosi epatica*

stessero al totale dei morti per *malattie epatiche* nella stessa proporzione verificatasi per il settennio 1924-30.

La mortalità per *cirrosi alcolica del fegato ed alcoolismo cronico* nel Regno, nei vecchi confini, ha avuto nel 1935-37 una diminuzione del 5 % rispetto al periodo base 1900-02; fra i singoli Compartimenti hanno dimostrato una mortalità superiore a quella del periodo base, gli Abruzzi e Molise (59 %), il Piemonte (42 %), l'Umbria (39 %), la Campania (34 %), l'Emilia (28 %), la Lucania (21 %), la Toscana (18 %) e le Marche (7 %).

Inoltre, nel 1935-37, superano la mortalità media del Regno, in ordine decrescente, i seguenti Compartimenti: la Venezia Giulia e Zara, il Piemonte, le Marche, la Liguria, la Venezia Tridentina, l'Umbria, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia e la Sardegna, cioè, tutti i Compartimenti dell'Italia Settentrionale, due della Centrale e uno dell'Insulare.

PROSPETTO 39. — **Mortalità per cirrosi alcolica del fegato ed alcoolismo cronico.**
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	2,7	3,5	2,7	3,9	3,8	132	101	145	142	146	131	143	203	210	
Liguria	3,3	4,1	3,6	2,0	2,7	122	108	59	82	182	152	191	103	151	
Lombardia	2,8	3,4	2,2	2,3	2,3	122	79	84	82	151	126	116	123	126	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	2,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	132	146	
Veneto	3,9	5,5	3,9	2,4	2,0	143	102	61	52	210	206	206	123	112	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	2,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	107	215	
Emilia	1,5	2,4	2,1	2,1	1,9	158	141	139	128	82	89	112	110	107	
Toscana	1,1	1,9	1,3	1,6	1,5	169	115	141	118	62	72	69	84	74	
Marche	2,8	5,2	3,0	3,4	3,0	184	108	120	107	154	194	161	177	167	
Umbria	1,6	2,9	2,3	3,1	2,3	176	139	189	139	90	108	121	163	127	
Lazio	1,7	3,5	2,1	1,5	1,5	207	126	89	87	91	129	111	77	81	
Abruzzi e Molise	1,0	1,9	1,5	1,7	1,6	182	148	161	159	57	70	81	87	91	
Campania	0,7	1,1	0,9	1,3	1,0	158	119	175	134	40	43	46	67	54	
Puglie	0,8	0,9	0,7	0,5	0,4	116	84	71	55	42	33	34	29	23	
Lucania	0,6	0,8	0,4	0,8	0,7	138	70	130	121	33	31	23	41	41	
Calabrie	0,8	1,5	0,9	0,8	0,7	188	108	100	91	43	56	45	42	40	
Sicilia	0,6	0,7	0,4	0,7	0,5	125	74	119	89	31	26	22	36	28	
Sardegna	2,3	3,5	1,6	1,8	1,8	155	71	81	81	123	131	85	97	102	
REGNO } vecchi confini	1,8	2,7	1,9			146	103	103	95	100	100	100			
REGNO } attuali confini				1,9	1,8								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Malattie della gravidanza, parto e puerperio. — La mortalità per *malattie della gravidanza, parto e puerperio* (prospetto 40) dal triennio 1887-89 al quinquennio 1900-04, ha subito una progressiva e notevole diminuzione: nel 1900-04 la diminuzione raggiunta è del 54 % in confronto al periodo base. Dopo un lieve rialzo nel quinquennio 1905-09, la mortalità ha raggiunto un minimo nel 1910-14 (23,6 per 10.000 parti) e poi, può dirsi, stabilizzata intorno al 28 per 10.000 parti.

La mortalità per *malattie della gravidanza, parto e puerperio* può scindersi in due componenti: la prima, dovuta alla *setticemia ed infezioni puerperali*, la seconda alle *altre malattie della gravidanza, parto e puerperio*.

La mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali* è discesa del 74 % dal 1887-89 al 1910-14; negli anni successivi essa è tornata leggermente ad aumentare, e sembra, dal 1925 al 1934, essersi stabilizzata intorno al 10,5 per 10.000 parti; nel 1935 essa è stata di 12,3 e nel 1936 e 1937 essa è diminuita rispettivamente a 12,1 e 10,4 su 10.000 parti.

La mortalità per *setticemia ed altre infezioni puerperali* (decremento nel 1937 del 73 % a confronto del 1887-89) ha risentito molto di più che la mortalità per le *altre malattie della gravidanza, parto e puerperio* (decremento del 7 %), delle migliorate condizioni di assistenza e profilassi.

PROSPETTO 40. — Mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio.

PERIODI	PARTI SEMPLICI E MULTIPLI (a)	MORTE PER SETTICEMIA E INFEZIONI PUERPERALI (b)			ALTRE MALATTIE DELLA GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERO			IN COMPLESSO		
		cifre assolute	su 10.000 parti	Numeri indici (triennio 1887-89 = 100)	cifre assolute	su 10.000 parti	Numeri indici (triennio 1887-89 = 100)	cifre assolute	su 10.000 parti	Numeri indici (triennio 1887-89 = 100)
1887-89 (*)	1.169.631	4.560	39,0	100	2.083	17,8	100	6.643	56,8	100
1890-94 (*)	1.142.089	2.458	21,5	55	1.597	14,0	79	4.055	35,5	63
1895-99 (*)	1.122.575	1.883	16,8	43	1.553	13,8	78	3.436	30,6	54
1900-04 (*)	1.103.114	1.375	12,5	32	1.497	13,6	76	2.872	26,0	46
1905-09 (*)	1.130.538	1.402	12,4	32	1.699	15,0	84	3.101	27,4	48
1910-14 (*)	1.156.212	1.194	10,3	26	1.536	13,3	75	2.730	23,6	42
1915-19 (*)	845.166	1.001	11,8	30	1.292	15,3	86	2.293	27,1	48
1920-24 (*)	1.165.070	1.409	12,1	31	1.705	14,6	82	3.114	26,7	47
1925-29 (*)	1.110.646	1.170	10,5	27	1.788	16,1	90	2.958	26,6	47
1930-32 (*)	1.059.112	1.126	10,6	27	1.801	17,0	96	2.927	27,6	49
1933	1.016.965	1.102	10,8	28	1.744	17,1	96	2.846	28,0	49
1934	1.013.636	1.052	10,4	27	1.656	16,3	92	2.708	26,7	47
1935	1.016.538	1.253	12,3	32	1.764	17,4	98	3.017	29,7	52
1936	981.452	1.183	12,1	31	1.700	17,3	97	2.883	29,4	52
1937	1.010.567	1.052	10,4	27	1.673	16,6	93	2.725	27,0	48

(*) Media annuale. (a) Nel numero dei parti sono compresi anche quelli di nati morti. (b) Compreso l'aborto settico.

Dagli indici contenuti nel prospetto 41-A risulta che, nel Regno (nei vecchi confini), la mortalità in complesso è aumentata nel 1935-37, a confronto del 1900-02, del 9 %.

La mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali* ha avuto, nel 1935-37 una lieve diminuzione (5 %); mentre le *altre malattie della gravidanza, parto e puerperio* sono aumentate del 22 %; a confronto del triennio base 1900-02.

Osservando poi la mortalità nel triennio 1935-37 nei singoli Compartimenti, in confronto a quella del periodo 1900-02, si rileva che essa, nel complesso delle malattie in esame, è diminuita in 4 Compartimenti (Veneto, Lucania, Calabrie e Sardegna).

PROSPETTO 41. — Mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio.

(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 10.000 PARTI														
	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
Piemonte	12,9	17,3	30,2	14,0	15,7	29,7	13,2	13,9	27,1	13,0	18,3	31,3	15,3	16,5	31,8
Liguria	13,9	14,2	28,2	12,5	15,2	27,4	13,2	11,9	25,0	10,8	18,7	29,5	16,0	22,6	38,6
Lombardia	13,7	13,0	26,8	10,5	13,2	23,6	14,0	14,6	28,6	11,9	16,4	28,3	13,1	16,8	29,9
Venezia Trid. (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	24,3	38,7	14,4	23,9	38,3
Veneto	9,3	12,7	22,0	6,0	11,9	17,9	7,2	11,1	18,3	9,3	14,3	23,6	8,2	13,5	21,7
Venezia G. e Z. (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	16,2	31,8	17,6	18,1	35,7
Emilia	13,4	15,9	29,3	9,0	13,9	22,9	12,8	14,1	26,8	11,8	18,1	29,9	13,6	18,5	32,1
Toscana	9,7	12,0	21,7	8,3	13,1	21,4	12,0	13,4	25,4	10,7	17,5	28,0	12,3	17,8	30,2
Marche	10,0	13,1	23,1	8,3	13,3	21,7	10,2	13,3	23,4	8,5	13,9	22,3	7,4	16,6	24,0
Umbria	12,5	16,0	28,6	14,5	14,8	29,3	15,4	14,3	29,6	10,7	18,0	28,6	14,9	20,7	35,7
Lazio	14,0	12,9	26,9	10,3	12,3	22,6	14,5	13,4	28,0	12,6	18,2	30,7	12,1	16,4	28,5
Abruzzi e Molise	12,8	17,3	30,1	11,2	19,2	30,4	13,0	19,3	32,4	10,2	21,2	31,4	12,9	20,2	33,2
Campania	10,5	12,3	22,8	8,7	13,4	22,1	10,4	14,3	24,7	9,6	18,5	28,1	9,9	17,7	27,6
Puglie	12,0	10,9	22,8	9,2	11,7	21,0	8,9	12,2	21,0	7,8	14,9	22,7	8,1	16,0	24,1
Lucania	14,4	17,3	31,8	11,8	12,9	24,7	13,3	19,1	32,4	11,5	17,7	29,2	8,4	18,2	26,6
Calabrie	15,7	15,8	31,5	14,3	15,4	29,8	13,4	16,2	29,5	11,5	15,8	27,2	11,8	14,8	26,6
Sicilia	10,0	11,1	21,1	9,9	9,4	19,3	9,1	13,4	22,5	9,1	15,6	24,7	12,2	17,3	29,5
Sardegna	19,4	25,6	44,9	14,9	22,5	37,3	16,8	18,5	35,4	11,7	20,7	32,4	11,6	17,8	29,4
REGNO	vecchi conf.	12,1	13,9	25,9	10,0	13,4	23,4	11,4	14,0	25,4					
	attuali conf.									10,6	17,0	27,6	11,6	17,1	28,7

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

La mortalità per *setticemia e infezioni puerperali* è diminuita, nel 1935-37, nei seguenti Compartimenti: Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Campania, Puglie, Lucania, Calabrie e Sardegna; mentre quella per le *restanti malattie della gravidanza, parto e puerperio* è diminuita soltanto nel Piemonte, nelle Calabrie e nella Sardegna.

Nel 1935-37, superano la mortalità media del Regno, per il complesso delle malattie prese in esame (vedi prosp. 41-B), in ordine decrescente, la Liguria, la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia e Zara, l'Umbria, gli Abruzzi e Molise, la Emilia, il Piemonte, la Toscana, la Lombardia, la Sicilia e la Sardegna.

Un analogo esame della mortalità per *setticemia ed infezioni puerperali* ci fa notare che nella Venezia Giulia e Zara, Liguria, Piemonte, Umbria, Venezia Tridentina, Emilia, Lombardia, Abruzzi e Molise, Toscana, Lazio, Sicilia e Calabrie, essa ha superato, nel 1935-37, quella media del Regno e lo stesso fatto si verifica per la mortalità delle *altre malattie della gravidanza, parto e puerperio* negli stessi Compartimenti, (eccettuati il Piemonte, la Lombardia, il Lazio e le Calabrie) sebbene in ordine diverso ed ai quali si aggiungono la Campania, la Lucania e la Sardegna.

A complemento delle predette notizie, aggiungiamo che, secondo lo stato civile, le 2725 donne morte nel 1937, in età da 15 a 54 anni, per *malattie della gravidanza, parto e puerperio (comprese le infezioni puerperali)* si ripartivano così: nubili 202 coniugate 2496 e vedove 27.

PROSPETTO 41-A. — Numeri indici della mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	TRIENNIO 1900-02 = 100											
	1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
Piemonte	108	91	98	102	81	90	101	106	104	115	96	105
Liguria	88	107	97	94	84	85	77	132	105	115	159	137
Lombardia	76	101	88	102	112	107	87	126	106	96	129	112
Veneto	65	94	82	78	88	83	100	115	107	85	106	99
Emilia	68	87	78	95	85	91	88	114	102	101	117	109
Toscana	85	109	98	123	112	117	110	144	125	127	149	139
Marche	83	102	94	102	102	101	85	106	97	74	127	104
Umbria	116	92	102	123	85	104	86	112	100	119	130	125
Lazio	74	95	84	104	104	104	90	141	114	87	127	106
Abruzzi e Molise	88	111	101	102	111	108	79	122	104	101	117	110
Campania	83	108	97	95	116	108	92	150	123	94	144	121
Puglie	77	108	92	74	112	92	65	137	106	67	147	105
Lucania	82	75	78	92	110	102	79	102	92	58	105	84
Calabria	91	97	95	85	103	94	73	100	86	75	94	85
Sicilia	98	85	91	91	121	107	90	141	117	122	156	140
Sardegna	77	88	85	87	72	79	60	81	72	60	70	66
REGNO (vecchi confini).	83	97	96	95	101	98	87	123	106	95	122	109

PROSPETTO 41-B. — Numeri indici della mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio (medie annuali).

COMPARTIMENTI E REGNO	MORTALITÀ DEL REGNO = 100														
	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso	setticemia ed infez. puerperali	altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	In complesso
Piemonte	107	125	116	139	117	127	114	100	106	123	107	113	132	97	111
Liguria	116	102	109	123	113	117	115	85	99	120	110	107	138	133	135
Lombardia	114	94	103	104	98	101	122	104	113	112	97	102	113	98	104
Venezia Trid. (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	143	140	124	140	133
Veneto	76	92	85	60	89	77	63	80	72	87	84	85	71	79	76
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	95	115	152	106	124
Emilia	111	115	113	90	104	98	111	101	106	111	106	108	117	109	112
Toscana	81	87	84	83	98	91	104	96	100	101	102	101	106	104	105
Marche	83	94	89	83	100	93	88	95	92	80	82	81	64	97	84
Umbria	103	115	110	144	110	125	134	102	117	101	106	104	129	121	124
Lazio	116	93	104	104	92	97	126	96	110	118	107	111	105	96	99
Abruzzi e Molise	106	125	116	113	143	130	114	138	127	96	124	113	111	119	116
Campania	87	89	88	87	100	94	90	102	97	91	109	102	85	104	96
Puglie	100	79	88	92	88	90	77	88	83	73	88	82	70	94	84
Lucania	120	125	123	118	97	106	116	137	127	108	104	106	72	107	93
Calabria	130	114	121	144	115	127	117	116	116	108	93	98	102	87	93
Sicilia	83	80	81	98	70	82	79	96	89	85	92	89	105	101	103
Sardegna	161	185	173	149	168	160	146	132	139	110	122	117	100	104	103
REGNO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
vecchi confini	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
attuali confini	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Esaminando i quozienti ottenuti riferendo le donne morte alle donne censite nelle rispettive classi di età (prospetto 42), si nota che la mortalità nelle donne per il complesso delle malattie della gravidanza, parto e puerperio è venuta scemando dal triennio 1900-02 al triennio 1935-37, e che la diminuzione maggiore si riscontra nell'età da 45 a 54 anni (50 %). In tutti i periodi considerati, il massimo della mortalità si osserva nell'età da 25 a 34 anni.

Le partorienti negli anni dal 1930 al 1937 sono state classificate secondo l'età e lo stato civile. Mettendo, invece, in rapporto il numero delle donne morte per malattie della gravidanza, parto e puerperio, distinte per classi di età, col numero delle partorienti della stessa età (prospetto 42, ultime quattro colonne), si rileva che la maggiore mortalità si verifica nell'età da 45 a 54 anni. Inoltre, nel 1937, rispetto al triennio 1930-32, si nota che la mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio ha segnato una diminuzione del 2 %. Nei singoli gruppi di età, però, presi in considerazione, la diminuzione della mortalità, si è verificata solo nell'età da 15 a 24 anni (15 %), mentre si è avuto un aumento del 2 %, di meno dell'1 % e del 54 %, rispettivamente, nelle età da 25 a 34, da 35 a 44 e da 45 a 54.

Esaminando poi i quozienti specifici di mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio, ottenuti negli anni dal 1930 al 1937, mettendo in rapporto il numero delle donne morte per tali malattie, in età da 15 a 54 anni, distinte secondo il loro stato civile, con il numero delle partorienti classificate anch'esse secondo lo stato civile (prospetto 43), si rileva che nel complesso, la mortalità tende ad aumentare fino al 1936, dimostrando in questo anno un aumento del 6 % a confronto del

PROSPETTO 42. — Quozienti specifici di mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio.

GRUPPI DI ETÀ	SU 100.000 DONNE CENSITE DELLA STESSA ETÀ					SU 10.000 PARTORIENTI (a)			
	1900-02	1910-12	1920-22	1930-32	1935-37	1930-32	1933-35	1936	1937
	medie annuali								
15-24 anni	20,8	19,8	17,3	16,3	15,9	22,94	23,40	23,15	19,59
25-34 »	55,9	47,9	48,9	40,1	39,2	23,64	24,56	25,30	24,02
35-44 »	51,0	43,4	41,4	36,7	33,2	41,42	40,96	44,54	41,61
45-54 »	4,2	3,1	3,5	2,1	2,1	58,02	63,21	80,52	89,52
TOTALE . . .	33,3	29,1	28,7	24,7	23,9	27,64	28,12	29,34	26,97

(a) Il numero delle partorienti di età ignota è stato distribuito, a calcolo, per età, in proporzione dell'ammontare delle partorienti di età nota.

PROSPETTO 43. — Quozienti specifici di mortalità per malattie della gravidanza, parto e puerperio, nelle donne da 15 a 54 anni, distinte secondo lo stato civile.

STATO CIVILE	SU 10.000 PARTI			
	1930-32	1933-35	1936	1937
Nubili, vedove e divorziate .	50,40	48,48	56,97	53,96
Coniugate	26,37	27,03	27,99	25,79
TOTALE	27,61	28,11	29,31	26,97

triennio 1930-32. Nel 1937 vi è una diminuzione dell'8 % a confronto dell'anno precedente.

La mortalità fra le donne nubili, vedove e divorziate è molto più accentuata di quella verificatasi fra le coniugate, ed essa, nel 1937 a confronto del 1930-32, è aumentata fra le nubili, vedove e divorziate del 7 %, mentre fra le coniugate è diminuita del 2 %.

Per gli anni 1936 e 1937 si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità per *malattie ed infezioni puerperali* secondo l'età ed il genere del parto (vedi prospetto 44, parte B).

Prendendo in esame i quozienti di mortalità che si riferiscono all'epoca della attività genetica femminile, si nota quanto segue: la mortalità per il *complesso delle malattie puerperali (escluse le infezioni)* nelle donne da 20 a 49 anni di età è molto più accentuata in conseguenza di parti multipli che non di parti semplici; infatti, nel 1936 e 1937 la mortalità per le donne decedute in seguito a parti multipli è più che doppia a confronto di quella delle donne che hanno avuto un parto semplice. La mortalità per *infezioni puerperali*, sia nelle donne che hanno avuto parto sem-

PROSPETTO 44. — Madri morte nel Regno, negli anni 1936 e 1937, in seguito a *malattie ed infezioni puerperali*, classificate per gruppi di età e genere del parto.

GRUPPI DI ETÀ	1936 (*)						1937 (*)					
	Parti semplici			Parti multipli			Parti semplici			Parti multipli		
	(a)	(b)	TOTALE	(a)	(b)	TOTALE	(a)	(b)	TOTALE	(a)	(b)	TOTALE

A) — Cifre assolute

-15 anni	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 »	35	39	74	1	—	1	50	41	91	1	—	1	1
20-24 »	192	236	428	4	7	11	158	184	342	7	5	12	12
25-29 »	276	309	585	12	9	21	248	293	541	7	10	17	17
30-34 »	254	253	507	5	12	17	274	223	497	12	5	17	17
35-39 »	294	188	482	11	7	18	250	183	433	9	8	17	17
40-44 »	178	97	275	6	4	10	163	82	245	3	2	5	5
45-49 »	13	19	32	1	1	2	28	13	41	—	—	—	—
20-49 »	1.207	1.102	2.309	39	40	79	1.121	978	2.099	38	30	68	68
50-60	2	1	3	1	—	1	1	3	4	—	—	—	—
TOTALE . . .	1.245	1.143	2.388	41	40	81	1.172	1.022	2.194	39	30	69	69

B) — Cifre proporz. a 10.000 parti in donne della stessa età

-15 anni	75,19	75,19	150,38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 »	13,53	15,07	28,60	68,49	—	68,49	17,22	14,12	31,34	61,73	—	61,73	—
20-24 »	9,12	11,21	20,33	21,68	37,94	59,62	7,20	8,38	15,58	36,94	26,39	63,32	63,32
25-29 »	9,39	10,51	19,91	34,45	25,84	60,29	8,04	9,49	17,53	18,45	26,36	44,81	44,81
30-34 »	11,51	11,47	22,98	13,68	32,84	46,52	12,09	9,84	21,92	31,75	13,23	44,97	44,97
35-39 »	19,66	12,57	32,23	35,74	22,74	58,48	17,07	12,49	29,56	29,30	26,04	55,34	55,34
40-44 »	28,89	15,74	44,63	57,47	38,31	95,79	26,86	13,51	40,37	30,46	20,30	50,76	50,76
45-49 »	22,61	33,04	55,65	196,08	196,08	392,16	50,09	23,26	73,35	—	—	—	—
20-49 »	12,81	11,70	24,51	29,63	39,41	69,05	11,39	10,11	21,50	28,02	22,12	50,13	50,13
50-60	126,58	63,29	189,87	5000,00	—	5000,00	142,86	428,57	571,43	—	—	—	—
TOTALE . . .	12,86	11,81	24,67	30,82	30,07	60,89	11,76	10,25	22,01	28,41	21,85	50,27	50,27

(*) Vedi nota (a) a pagina precedente.

(a) *Malattie puerperali, escluse le infezioni* (nn. 141, 144 a-b, 146, 148 a-b e 150 dell'Elenco nosologico).

(b) *Infezioni puerperali* (nn. 140 e 145 a-b dell'Elenco nosologico).

plice sia in quelle che hanno avuto parto multiplo, è inferiore a quella per le *altre malattie puerperali* fatta eccezione nel 1936, nel quale anno si verificò il fatto contrario fra le donne che hanno avuto parto multiplo.

È da osservare che lo scarso numero di donne, morte per *malattie puerperali* in seguito a parti multipli, può dar ragione di queste sensibili variazioni e di quelle che si notano nei quozienti di mortalità per le altre singole età.

Mortalità nel primo anno di vita per alcune principali cause.

A) *Malattie dell'apparato respiratorio.* — Dal prospetto 45 si rileva che questo gruppo di malattie incide, sia nel 1936 che nel 1937, in considerevole misura nella mortalità dei bambini nel primo anno di vita (250,7 e 253,0, rispettivamente, per 10.000 nati vivi), in modo, però, sensibilmente minore delle *malattie dell'apparato digerente*. La mortalità per *malattie dell'apparato respiratorio* raggiunge, in questi due anni, in genere, i suoi massimi nei Compartimenti dell'Italia Meridionale, nella Lombardia e nella Sicilia; i minimi, nella Toscana, nella Liguria, nell'Umbria e nelle Marche. La mortalità per questo gruppo di malattie ha avuto, nel Regno, nel 1937 un aumento dell'1 % a confronto dell'anno precedente.

Su 18 compartimenti solamente in 7 (Piemonte, Venezia Giulia e Zara, Marche, Umbria, Calabrie, Sicilia e Sardegna) si nota un aumento della mortalità nel 1937 a confronto dell'anno precedente.

PROSPETTO 45. — Mortalità per malattie dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente nei bambini nel primo anno di vita, negli anni 1936 e 1937.

(per 10.000 nati vivi)

COMPARTIMENTI	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (a)		MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (b)		COMPARTIMENTI	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (a)		MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (b)	
	1936	1937	1936	1937		1936	1937	1936	1937
Piemonte	174,3	195,0	173,5	234,2	Lazio	218,3	211,5	252,7	276,7
Liguria	153,8	149,1	102,9	144,5	Abruzzi e Molise	240,5	205,6	432,4	520,5
Lombardia	277,2	263,7	383,2	494,9	Campania	328,9	293,0	378,7	420,7
Venezia Trid.	258,8	216,0	194,3	315,5	Puglie	399,5	383,6	447,2	488,3
Veneto	183,9	175,1	155,4	201,2	Lucania	422,1	360,8	501,1	538,0
Venezia G. e Zara	202,2	210,9	248,5	260,1	Calabrie	276,6	321,4	409,2	493,8
Emilia	206,3	199,5	134,9	135,3	Sicilia	271,1	356,2	474,1	561,0
Toscana	138,7	121,9	100,0	131,9	Sardegna	191,8	283,0	279,1	438,0
Marche	160,1	167,8	153,4	202,9					
Umbria	160,6	169,7	146,7	206,8	REGNO	250,7	253,0	305,6	364,9

(a) dal 104 al 114 dell'Elenco nosologico.

(b) dal 115 al 129 dell'Elenco nosologico.

Il maggior numero medio giornaliero di morti si è verificato, nel 1937, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre; il minor numero, in agosto, settembre, ottobre e luglio. La mortalità per *malattie dell'apparato respiratorio* dei bambini illegittimi (317,1 per 10.000 nati vivi) è, nel 1937, superiore a quella dei legittimi (250,2), con comportamento analogo a quella del quadriennio precedente.

B) *Malattie dell'apparato digerente.* — Fra queste malattie figura, per la massima parte dei casi (97 % nel 1935, 1936 e 1937), l'*enterite*, cosicchè si può ritenere che la notevole mortalità dovuta a questo gruppo di malattie (305,6 su 10.000 nati vivi, nel 1936, e 364,9 nel 1937) sia da attribuirsi, nella quasi totalità, alla suddetta causa.

Nel 1937, a confronto dell'anno precedente, la mortalità per questo gruppo di malattie ha avuto nel Regno un sensibile aumento (19 %), comportamento che si verifica anche nei singoli Compartimenti.

La mortalità è notevolmente più alta, in genere, nei Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare e nella Lombardia. Il più basso quoziente si riscontra, nel 1937, nella Toscana (131,9), il più alto invece nella Sicilia (561,0).

Il maggior numero medio giornaliero di morti si è verificato, nel 1937, nei mesi di luglio, giugno, agosto e settembre, il minore, nei mesi di marzo, aprile, dicembre, febbraio e gennaio, dimostrandosi così la non favorevole influenza dei calori estivi sulle condizioni dell'apparato digerente infantile.

La mortalità degli illegittimi (461,3 su 10.000 nati vivi) risulta superiore a quella dei legittimi (360,7), con analogo comportamento a quello verificatosi nel quadriennio precedente.

C) *Malattie della prima infanzia e vizi di conformazione congeniti.* — Le voci della vecchia nomenclatura, riguardanti le *malattie della prima infanzia* e i *vizi di conformazione congeniti*, sono state raggruppate con altri criteri nella nuova nomenclatura (1): inoltre, come è stato altra volta accennato (2), non si è sempre seguito lo stesso criterio nella classificazione di alcune voci di questa rubrica, cosicchè sulla comparabilità delle cifre relative a tali voci e specie di quelle relative ai morti per *asfissia ed apoplezia nel parto* è necessario fare delle riserve. Si è ritenuto, quindi, più opportuno, a partire dall'anno 1931, di raggruppare in un'unica voce ciò che era trattato, nei volumi precedenti fino al 1930, in tre distinti paragrafi (*asfissia e apoplezia nel parto*; *malattie fetali e vizi congeniti*; *debolezza congenita, immaturità e malattie speciali dei neonati*).

Analogamente a quanto è stato fatto per altre malattie, si sono messi in confronto i dati per Compartimenti e per il Regno per i trienni 1910-12, 1920-22, 1930-1932 e 1935-37: si è dovuto escludere il triennio 1900-02, perchè dalle statistiche del tempo non risultano i dati dei morti per le suddette malattie nel 1° anno di vita, nei singoli Compartimenti del Regno.

Dal prospetto 46 si rileva che la mortalità per *malattie della prima infanzia e per vizi di conformazione congeniti*, nel Regno (nei vecchi confini), è diminuita nel 1935-37 del 17 % a confronto del triennio base 1910-12. Analogo andamento si nota, in genere, nei singoli Compartimenti, eccetto nella Campania, nelle Puglie e nella Lucania, in cui la mortalità è aumentata a confronto del triennio base 1910-1912, rispettivamente, del 10 %, dell'11 % e del 25 %. Nel 1935-37, hanno supe-

(1) Cfr. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — *Statistica delle Cause di morte negli anni 1931 e 1932* - Parte I - Introduzione — Allegato II, pagine 156* e 157*.

(2) Cfr. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Statistica delle Cause di morte negli anni 1929 e 1930* - Parte I - Introduzione, nota (b), pagina 63*.

rato la mortalità media del Regno, in ordine crescente, i seguenti Compartimenti: Toscana, Veneto, Abruzzi e Molise, Lombardia, Umbria, Marche, Puglie, Venezia Tridentina, Venezia Giulia e Zara, Emilia e Lucania.

PROSPETTO 46. — Mortalità per malattie della prima infanzia e per vizi di conformazione congeniti, nel primo anno di vita.

(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 10.000 NATI VIVI				NUMERI INDICI							
	1910-12	1920-22	1930-32	1935-37	Triennio 1910-12 = 100			Mortalità del Regno = 100				
					1920-22	1930-32	1935-37	1910-12	1920-22	1930-32	1935-37	
Piemonte	324,2	242,8	269,9	278,9	75	83	86	88	83	88	91	
Liguria	285,5	205,7	232,2	256,9	72	81	90	78	71	76	84	
Lombardia	369,4	202,9	323,4	324,2	79	88	88	101	100	105	106	
Venezia Trid. (a)	—	—	360,9	359,7	—	—	—	—	—	118	118	
Veneto	435,0	318,5	314,6	315,0	73	72	72	119	109	103	103	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	456,6	359,8	—	—	—	—	—	149	118	
Emilia	513,4	381,6	382,5	366,8	74	74	71	140	131	125	120	
Toscana	406,7	288,4	301,0	308,2	71	74	76	111	99	98	101	
Marche	456,3	360,3	360,9	333,1	79	79	73	124	124	118	109	
Umbria	458,6	349,3	342,2	324,9	76	75	71	125	120	112	106	
Lazio	344,0	222,8	277,9	272,5	65	81	79	94	76	91	89	
Abruzzi e Molise	371,7	325,1	334,3	315,1	87	90	85	101	112	109	103	
Campania	228,6	209,8	237,8	252,4	92	104	110	62	72	78	83	
Puglie	306,6	302,1	350,3	339,3	99	114	111	84	104	114	111	
Lucania	308,1	281,5	354,6	385,1	91	115	125	84	97	116	126	
Calabria	276,0	231,1	243,1	272,9	84	88	99	75	79	79	89	
Sicilia	379,1	323,6	285,9	282,2	85	75	74	103	111	93	92	
Sardegna	345,1	291,4	290,3	291,7	84	84	85	94	100	95	95	
REGNO { vecchi confini	367,0	291,5			79	83	83	100	100	100	100	
{ attuali confini			306,8	305,5								

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Marasma senile. — I quozienti di mortalità per *marasma senile* sono saliti da 962, per ogni milione di abitanti nella media del triennio 1887-89, a 1382 nel quinquennio 1919-23, a 1456 nel 1924 e a 1604 nel 1925. Dal 1926, la mortalità è andata diminuendo, fino ad un minimo di 896 morti per un milione di abitanti nel 1934: nel 1937 la mortalità per *marasma senile* è risultata di 970 per un milione di abitanti.

È da notare che sotto la voce « *marasma senile* » è presumibile vadano compresi molti casi di morte relativi a individui, che, giunti ad una età avanzata, muoiono con sintomi marantici che possono essere la conseguenza di malattie di organi interni, difficilmente diagnosticabili, come potrebbero, ad esempio, essere le forme lente di sclerosi polmonare di natura tubercolare, o carcinomi di organi interni e specialmente dell'*apparato digerente*, che, senza dare disturbi di canalizzazione, hanno portato a un progressivo decadimento generale dell'organismo.

Una maggiore esattezza nelle diagnosi, facilitata dal progressivo miglioramento dei mezzi di indagine diagnostica, può influire sull'abbassamento del quoziente di mortalità per *marasma senile*: inoltre, l'insistente opera di propaganda che l'Istituto Centrale di Statistica ha fatto direttamente e indirettamente, affinché i medici segnalassero, con la maggiore accuratezza possibile, la causa che determinò la morte dell'infermo, può avere anche influito sulla diminuzione notevole che si riscontra nei quozienti di mortalità per *marasma senile* dal 1926 in poi.

I Compartimenti in cui la mortalità per *marasma senile* raggiunse il massimo furono, nel 1937, la Sicilia (172,7 per ogni 100.000 abitanti), la Venezia Giulia e Zara (169,6) le Calabrie (160,0), la Lucania (142,6), la Sardegna (135,1) e gli Abruzzi e Molise (134,0). I minimi, si verificarono nella Liguria (48,0), nella Lombardia (55,6) e nel Lazio (60,4).

§ 3. — **Mortalità nel Regno dei bambini, durante il primo anno di vita, per cause, in relazione alla legittimità dei natali.** — I bambini morti prima di aver compiuto il primo anno di vita sono stati divisi in due gruppi: nel primo mese di vita e da un mese a meno di un anno di età, e per ciascun gruppo si è rilevata la loro nascita legittima od illegittima.

PROSPETTO 47. — **Bambini d'ambo i sessi morti nel Regno, nel primo anno di vita, distinti secondo la filiazione, negli anni 1935, 1936 e 1937.**

ANNI FILIAZIONE (a)	NATI VIVI	MORTI		SU 1000 NATI VIVI DELLA MEDESIMA FILIAZIONE MORIRONO :			
		nel primo mese di vita	da un mese a meno di un anno	nel primo mese di vita	da un mese a meno di un anno	nel primo anno di vita	
1935	Legittimi	949.337	34.211	60.447	36,04	63,67	99,71
	Illegittimi	47.371	2.509	3.709	52,96	78,30	131,26
	TOTALE	996.708	36.720	64.156	36,84	64,37	101,21
1936	Legittimi	919.260	32.331	58.742	35,17	63,90	99,07
	Illegittimi	43.426	2.180	3.427	50,20	78,92	129,12
	TOTALE	962.686	34.511	62.169	35,85	64,58	100,43
1937	Legittimi	950.676	35.177	66.396	37,00	69,84	106,84
	Illegittimi	41.191	2.311	3.993	56,10	96,94	153,04
	TOTALE	991.867	37.488	70.389	37,80	70,97	108,76

La mortalità nel primo anno di vita nel 1937 è salita a 108,76 per 1000 nati vivi con un aumento di 8 punti in confronto all'anno precedente, quella dei legittimi è aumentata di 8 punti e quella degli illegittimi di 24 punti: analogamente, la mortalità nel primo mese di vita è salita di 2 punti per il complesso, di 2 punti per i legittimi e di 6 per gli illegittimi; la mortalità da un mese a meno di un anno è, invece, salita, per il complesso di 6 punti, per i legittimi di 6 e per gli illegittimi di 18 punti. Vi è stato quindi un aumento sia nei complessi, che nelle rispettive componenti.

Le cifre indicate nel prospetto 47 e quelle riportate nei volumi degli anni precedenti possono essere, prudenzialmente, esaminate nei riguardi dei risultati ottenuti dalla assistenza alla maternità illegittima, tenendo anche conto delle cause che hanno determinato la morte. Infatti la mortalità nel primo mese di vita è, in gran parte, dovuta a cause che hanno agito durante la gravidanza o nel parto o nell'im-

(a) Nelle cifre dei legittimi sono compresi per gli anni 1935, 1936 e 1937 rispettivamente, 857, 990 e 893 morti nel 1° anno di vita (1% del totale dei bambini morti nel 1° anno di vita per il 1937), per i quali non venne indicata la filiazione e che dalle notizie contenute nelle schede, poteva presumersi fossero legittimi.

Nelle cifre degli illegittimi sono compresi per gli anni sopraindicati, rispettivamente, 2216, 2007 e 2248 morti nel 1° anno di vita per i quali fu dichiarata ignota la filiazione.

PROSPETTO 48. — Mortalità dei bambini d'ambo i sessi, nel primo anno di vita, nel 1937.

(Cifre proporzionali a 10.000 nati vivi)

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	Legittimi		Illegittimi		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	Legittimi		Illegittimi	
	(b)	(b)	(b)	(b)		(b)	(b)		
Complesso . . .	1068,4	1530,4							
I. - Mal. infet. e parassitarie	68,4	100,7			VIII. - Mal. dell'apparato re- spiratorio	260,2	317,1		
1, 2	0,2	—			106	41,5	41,0		
7	4,4	7,5			107, 108, 109	204,5	269,7		
8	0,2	0,5			110	1,4	2,9		
9	14,3	23,8			104, 105 dal 111 al 114	2,8	3,4		
10	2,6	4,4			IX. - Mal. dell'apparato dige- rente	360,7	461,3		
11	18,5	21,6			119	348,3	448,9		
13	0,8	0,7			121	0,1	0,2		
23	1,4	2,7			122	2,6	2,2		
dal 24 al 32	6,6	7,8			124	0,1	—		
34	4,8	55,1			125, 126, 127	1,3	1,9		
36	4,4	25,2			115, 116, 118, 123, 128, 129	8,4	8,0		
38	1,0	1,2			X. - Mal. dell'apparato uri- nario e genitale	9,4	8,6		
dal 39 al 42	0,6	1,0			130, 131, 132	8,0	5,1		
4, 5, 12 dal 15 al 22	8,5	18,2			133	0,5	1,5		
33, 35, 37, 43, 44					135	0,7	1,5		
II. - Tumori (neoplasie) . .	0,6	0,9			138, 139	0,2	0,5		
dal 45 al 53	0,3	—			XII. - Mal. della pelle e del tessuto cellulare	4,4	11,9		
54, 55	0,2	0,2			151, 152, 153	4,4	11,9		
III. - Malattie reumatiche (c)	7,9	10,4			XIII. - Mal. delle ossa e or- gani della locomozione.	0,6	1,2		
56	0,1	—			154, 155, 156	0,6	1,2		
59	—	—			XIV. - Vizi di conformazione congeniti.	27,6	27,2		
dal 60 al 64	2,5	4,1			157	27,5	27,2		
66	1,5	1,7			XV. - Malattie dell'infanzia .	280,5	432,4		
65, 67, 68, 69	3,1	4,6			158	105,8	122,6		
IV. - Mal. del sangue e degli organi ematopoietici. . .	3,4	2,9			159	105,7	214,9		
71	1,8	1,0			160	11,0	12,9		
70, 72, 73, 74	1,6	1,9			161	58,0	82,1		
VI. - Mal. del sistema nervo- so e organi dei sensi. . .	47,1	68,9			XVII. - Morti violente o acci- dentali	9,9	8,0		
79	7,0	12,9			dal 172 al 175	0,2	4,1		
82	0,1	0,2			dal 176 al 194	2,0	3,2		
85	0,2	—			195	—	0,7		
78, 81, 86, 87	38,5	52,4			XVIII. - Cause di morte non determinate	4,2	7,3		
88, 8	1,3	3,4			199, 200	4,2	7,3		
VII. - Mal. dell'app. circol. .	2,0	3,4							
90	0,1	—							
91	0,2	—							
92	0,5	1,2							
93	0,3	0,5							
95	0,5	0,2							
97, 98	0,1	0,5							
dal 99 al 103	0,4	1,0							

(a) Non sono citati i numeri corrispondenti alle voci dell'Elenco nosologico per le quali, nell'anno 1937, non furono registrati casi di morte in bambini nel primo anno di vita.

(b) Cfr. la nota (a) a pagina precedente.

(c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali.

mediato postpartum (a); quelle che agiscono nell'ulteriore periodo, invece, dipendono in gran parte dal modo di allevamento del bambino e dalle condizioni ambientali in cui esso avviene. Ora, l'eccedenza della mortalità dei bambini illegittimi nel primo mese di vita, a confronto dei bambini legittimi, ha avuto il seguente andamento negli anni dal 1928 al 1937: punti 29; 26; 23; 21; 21; 20; 16; 17; 15; 19.

La mortalità da un mese a meno di un anno mostra, rispettivamente, negli anni suddetti la seguente eccedenza assoluta: punti 20; 14; 18; 13; 11; 12; 14; 15; 15; 27.

Le eccedenze ora notate per la mortalità nel primo mese di vita, a prescindere dall'aumento verificatosi nel 1937, tanto nei legittimi quanto negli illegittimi, possono considerarsi progressivamente decrescenti, cosicchè, si può presumere che, sia l'assistenza prenatale e natale alle madri di prole illegittima, sia l'assistenza ai bambini illegittimi nel primo mese di vita, abbia effettivamente influito su tale miglioramento. Non altrettanto sembra potersi presumere dall'andamento delle eccedenze della mortalità degli illegittimi sui legittimi da un mese a meno di un anno, perchè esso indica una tendenza alla diminuzione dal 1928 al 1932 e, viceversa, ad un aumento negli anni successivi.

Nel 1937, la mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di vita (1530 morti su 10.000 nati vivi illegittimi) è assai più elevata di quella dei legittimi (1068 morti su 10.000 nati vivi legittimi) e la maggiore mortalità nell'infanzia di nascita illegittima è, più specialmente, dovuta alle *malattie della prima infanzia* (432 morti illegittimi, su 10.000 nati vivi della stessa categoria, contro 281 legittimi); alla *sifilide* (55 illegittimi, contro 5 legittimi); alle *enteriti* (449 dei primi e 348 dei secondi) e all'*infezione purulenta e setticemia* (25 e 4, rispettivamente).

Non si sono calcolati i quozienti specifici di mortalità dei bambini illegittimi di oltre un anno, perchè fra questi sono numerose le legittimazioni per susseguente matrimonio dei genitori, e i bambini morti dopo essere stati legittimati sono segnati nella scheda di morte come legittimi, mentre nella statistica dei nati vennero iscritti fra gli illegittimi, il che può avvenire del resto, ma in misura presumibilmente minore, anche per i morti sotto un anno.

§ 4. — **Bambini morti nel primo anno di vita secondo l'età alla morte.**

Nei volumi precedenti, l'età alla morte dei bambini deceduti a zero anni era specificata, in combinazione con le cause, per due periodi: nel primo mese, con sottodistinzioni, e nei restanti undici mesi senza ulteriori sottodistinzioni.

A cominciare dal 1936, i morti in questo secondo periodo sono stati classificati per singoli mesi di età.

La distribuzione percentuale, nell'anno 1937, dei morti a zero anni nelle singole età alla morte per tutte le cause, segna il massimo, oltre il 34 %, nel primo mese di vita: la percentuale si abbassa all'8,6 % nel secondo mese e tende a diminuire nei mesi di età successivi, segnando il minimo nell'11° mese di età (4,8 %) e stabilizzandosi intorno al 5,5 % nell'età da 5 a 10 mesi incluso.

(a) Cfr. WILLIAM A. BREND, *Health and the State*, Londra 1917; FRANCO SAVORGAN, *Demografia di guerra ed altri saggi*, pagg. 72 e segg. — Edizione Zanichelli, Bologna — Vedi anche: L. DE BERARDINIS, *Alcune caratteristiche della natimortalità e della mortalità infantile* — Appendice al « Compendio Statistico Italiano », per l'anno 1932-XI, dell'Istituto Centrale di Statistica. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1932-XI, pag. 323 e « Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile per gli anni 1929 e segg. » dell'Istituto Centrale di Statistica.

PROSPETTO 49. — Bambini morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1937,
per cause di morte e mesi di età.

A) — su 1.000 morti per ciascuna causa.

NUMERI NOMENCLATURA ABBREVIATA	CAUSE DI MORTE	ETÀ ALLA MORTE, IN MESI											IN COM- PLESSO	
		meno di 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Dall'1 al 14	Malattie infettive e parassitarie	135	107	77	68	71	67	70	74	82	83	87	78	1.000
22 e 23	Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale e altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi . . .	318	108	86	73	63	62	60	51	54	47	41	37	1.000
26, 27, 28	Malattie dell'apparato respiratorio	153	115	84	72	67	66	71	71	76	76	78	71	1.000
Dal 29 al 32	Malattie dell'apparato digerente	77	76	83	101	101	92	88	81	81	80	76	65	1.000
38	Debolezza congenita, vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti) . . .	888	67	31	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1.000
41, 42	Morti violente ed accidentali	244	45	50	54	62	70	66	62	54	99	87	107	1.000
43	Cause di morte non specificate o mal definite	508	100	72	61	63	47	37	26	28	14	26	19	1.000
	Restanti cause	150	97	82	74	74	68	75	65	87	79	75	74	1.000
	Complesso	348	86	68	62	60	56	56	53	56	55	54	48	1.000

B) — su 1.000 morti in ciascuna età (*).

Dall'1 al 14	Malattie infettive e parassitarie	26	83	76	74	79	80	84	93	99	101	109	110	67
22 e 23	Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale, altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi . . .	41	55	56	53	47	49	47	42	43	38	34	34	44
26, 27, 28	Malattie dell'apparato respiratorio	103	312	289	273	260	274	296	311	318	324	338	350	234
Dal 29 al 32	Malattie dell'apparato digerente	74	295	415	552	569	553	528	513	491	488	474	457	337
38	Debolezza congenita, vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti) . . .	743	224	131	16	11	10	8	7	7	9	6	4	290
41, 42	Morti violente ed accidentali .	2	1	2	2	2	3	3	3	2	4	4	5	2
	Restanti cause	11	29	31	31	32	31	34	31	40	37	36	40	26
	Complesso	1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1.000

(*) Esclusi i decessi per cause di morte non specificate o mal definite.

La frequenza con la quale le cause di morte incidono nei diversi mesi di età del primo anno di vita varia sensibilmente: a meno di un mese di età, circa i $\frac{3}{4}$ dei bambini (74,3 %) muoiono per *vizi di conformazione congeniti, debolezza congenita, prematurità ed altre malattie speciali dell'infanzia*, mentre il secondo posto, a notevole distanza (10,3 %), spetta alle *malattie dell'apparato respiratorio*.

Le percentuali dei morti per *vizi di conformazione congeniti, debolezza congenita, ecc.* scendono al 22 e al 13 % nelle età di mesi 1 e 2, rispettivamente, per poi divenire trascurabili. Nelle età da 2 a 11 mesi la maggiore frequenza dei casi di morte spetta costantemente alle *malattie dell'apparato digerente* che nelle età da 3 a 7 mesi si riscontrano con frequenze superiori al 50 %: i casi di morte per *malattie dell'apparato respiratorio*, che da 1 mese a 8 mesi di età si aggirano intorno al 29 %, nei mesi successivi raggiungono percentuali più alte, fino ad un massimo del 35 % nei bambini di 11 mesi di età.

§ 5. — Mortalità neonatale e nel primo mese di vita secondo il genere del parto, nel triennio 1934-36 e nell'anno 1937. — Nel prospetto 50 sono calcolati i quozienti di mortalità neonatale (morti da 0 a 6 giorni per 10.000 nati vivi da parti dello stesso genere) e nel primo mese di vita, per alcune cause, distintamente per i morti derivanti da nati da parti semplici e per quelli derivanti da nati da parti multipli. Le cause di morte prese in considerazione sono quelle per le quali si verifica un maggior numero di decessi.

Il quoziente di mortalità neonatale per i provenienti da parti multipli è del 786 % e del 731 % più alto di quello dei provenienti da parti semplici rispettivamente nel triennio 1934-36 e nell'anno 1937. Tale quoziente, se riferito alle singole cause prese in considerazione, mostrò differenze percentuali molto diverse fra i due gruppi presi in esame. È superiore, nel triennio 1934-36, nei provenienti da parti multipli,

PROSPETTO 50. — Neonatimortalità e mortalità nel primo mese di vita per alcune cause, nel triennio 1934-36 (a) e nell'anno 1937, secondo il genere del parto.

(Per 10.000 nati vivi da parti dello stesso genere)

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	MORTALITÀ DA 0 A 6 GIORNI				MORTALITÀ NEL 1° MESE DI VITA			
		tra i nati da							
		parti semplici		parti multipli		parti semplici		parti multipli	
		1934- 1936	1937	1934- 1936	1937	1934- 1936	1937	1934- 1936	1937
	Complesso . . .	161,33	173,90	1.429,97	1.444,43	309,21	327,88	2.252,47	2.275,86
86	Convulsioni	5,39	5,90	21,57	27,85	13,44	13,67	52,12	59,61
106	Bronchiti	1,38	1,19	8,44	3,92	8,53	9,36	36,04	30,20
107	Broncopolmoniti (compr. la bronchite capill.)	3,58	4,89	8,71	13,73	19,67	24,18	50,64	49,02
119	Enteriti	2,56	2,19	12,46	12,94	24,55	23,62	89,50	97,26
157	Vizi di conformazione congeniti (b)	9,81	12,12	24,65	22,35	16,49	19,47	38,18	34,12
158	Debolezza congenita	44,55	41,42	547,71	467,49	78,14	73,88	864,97	786,34
159	Nascita prematura (b)	53,35	63,47	638,82	713,39	73,68	85,13	821,43	903,99
160	Conseguenze del parto (b)	7,17	10,11	21,44	25,49	7,59	10,58	22,11	26,28
161	Altre malattie speciali dell'inf.	27,93	27,66	130,36	139,62	45,43	45,10	222,54	232,96
199	Morte improvvisa	0,13	0,23	0,40	1,18	0,32	0,50	1,34	1,18
200	Cause non specific. o mal definite	2,02	1,17	7,64	4,71	2,48	1,58	9,24	5,49
	Rimanenti cause	3,27	3,54	7,77	11,77	18,89	20,79	44,35	49,42

(a) Media annuale. (b) Non compresi i nati morti.

del 1129 % e del 1097 % rispettivamente, per la *debolezza congenita* e per la *nascita prematura*, cause che danno i massimi quozienti di mortalità neonatale; è superiore nei provenienti da parti multipli del 512 % per le *bronchiti*; è ugualmente superiore nei provenienti da parti multipli di valori che vanno da 367 a 387 % per le *altre malattie speciali dell'infanzia* e le *enteriti*; di valori che oscillano fra il 208 e il 286 % per la *morte improvvisa, cause non specificate, convulsioni*; e di valori al disotto del 200 % per le *conseguenze del parto* per i *vizi di conformazione congeniti*, per le *broncopolmoniti* e per le rimanenti cause.

Lo stesso comportamento, all'incirca, si nota nel 1937, eccetto per le *bronchiti* in cui la differenza percentuale in più nei quozienti di mortalità neonatale nei provenienti da parti multipli è solo del 229 % a confronto del 512 % del triennio 1934-1936, per la morte improvvisa in cui è del 413 % a confronto del 208 % del triennio 1934-36 e per le *enteriti* in cui è del 491 % a confronto del 387 % del triennio 1934-36.

Le differenze percentuali dei quozienti di mortalità nel primo mese di vita nei bambini provenienti da parti multipli a confronto di quelle dei bambini provenienti da parti semplici, presentano nel triennio 1934-36, analogo andamento a quello verificatosi per la neonatimortalità, quantunque esse differenze (eccetto che per le *convulsioni, broncopolmoniti, altre malattie speciali dell'infanzia e morte improvvisa*) siano meno accentuate.

Nel 1937, le differenze percentuali fra i quozienti di mortalità nel primo mese di vita per i provenienti da parti multipli a confronto dei provenienti da parti semplici, hanno un andamento analogo a quello verificatosi per la neonatimortalità: però queste differenze sono più accentuate di quelle della neonatimortalità per ciò che riguarda le *altre malattie speciali dell'infanzia*.

Nel complesso, si verifica che la neonatimortalità e la mortalità nel primo mese di vita sono lievemente aumentate (1 %) nel 1937, a confronto del triennio 1934-36, nei provenienti da parti multipli ed in misura più accentuata nei provenienti da parti semplici (8 % e 6 % rispettivamente per la neonatimortalità e per la mortalità nel 1° mese di vita).

§ 6. — Morti dopo atto operatorio, nell'anno 1937. — Dall'anno 1931 è stata redatta una tavola in cui i morti sono classificati secondo le cause, con distinzione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno. Nel prospetto 51 sono calcolate, per il Regno, le cifre proporzionali dei morti dopo atti operatori, distintamente, per cause, su 1.000 morti per la stessa causa. Con questi rapporti non si vuol naturalmente misurare la letalità per atti operatori, ma piuttosto ottenere, con le dovute riserve, un indice della frequenza degli atti operatori nelle varie malattie.

Nel 1937 hanno dato le più alte percentuali di morti dopo atto operatorio sul totale dei morti, *l'appendicite* (447,8 su 1.000 morti per la stessa causa), *i tumori non maligni o il cui carattere maligno non è specificato* (295,2), *le altre malattie della gravidanza, parto e puerperio* (281,5), *le altre malattie dell'apparato digerente* (209,3), *le malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione* (159,1) e *le altre malattie dell'apparato genito urinario* (110,1).

La percentuale dei morti dopo atto operatorio sul totale dei morti è notevole nei Compartimenti dell'Italia Settentrionale e Centrale, mentre diminuisce netta-

PROSPETTO 51. — Morti nel Regno per cause, dopo atto operatorio, nel 1937.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	Su 1.000 MORTI PER CIASCUNA CAUSA	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	Su 1.000 MORTI PER CIASCUNA CAUSA	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO (a)	Su 1000 MORTI PER CIASCUNA CAUSA
Complesso	18,9	54, 55 57, 58 59	295,2 1,3 18,4	dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	209,3
1,2	10,6	56, dal 60 al 74, 76, 77	10,7	130, 131, 132	0,9
7	0,5	80, 83	0,9	dal 133 al 139	110,1
9	0,7	82	0,2	140, 145	80,8
10	46,2	78, 79, 81, dall'84 all'89	19,5	dal 141 al 144, dal 146 al 150	281,5
11	0,8	dal 90 al 95	0,1	dal 151 al 156	159,1
23	1,3	dal 96 al 103	12,8	dal 157 al 161	3,8
dal 24 al 32	17,9	106	0,1	162	..
34	2,6	107, 108, 109	0,2	dal 163 al 171	10,0
38	2,9	104, 105, dal 110 al 114	66,6	dal 172 al 175	80,6
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	15,2	119, 120	0,5	dal 176 al 198	34,8
dal 45 al 53	50,3	121	447,8	199, 200	0,2
		dal 124 al 127	59,6		

(a) Non sono citati i numeri corrispondenti alle voci dell'Elenco nosologico per le quali, nell'anno 1937, non furono registrati casi di morte dopo atto operatorio.

PROSPETTO 52. — Morti dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno, nel 1937.

(Cifre proporzionali a 1.000 morti in ciascun gruppo di cause)

COMPARTIMENTI E REGNO	GRUPPI DI CAUSE														COMPLESSO
	I. (a)	II (b)	III-IV V (c)	VI (d)	VII (e)	VIII (f)	IX (g)	X (h)	XI (i)	XII- XIII (l)	XIV- XV (m)	XVI (n)	XVII (o)	XVIII (p)	
Piemonte	9,4	89,1	16,3	5,3	2,7	6,0	118,9	46,2	197,2	225,5	8,5	—	45,0	—	26,9
Liguria	9,9	64,6	16,1	5,7	1,7	6,5	113,1	37,2	253,3	185,5	6,6	—	27,1	—	25,4
Lombardia	8,0	63,5	15,8	5,0	4,0	10,6	63,9	35,3	231,6	169,3	6,1	—	33,6	—	23,2
Venezia Trid.	6,0	49,7	26,3	2,2	2,9	7,5	117,6	27,4	245,3	161,3	—	—	37,0	—	24,7
Veneto	13,0	76,5	12,5	5,6	3,7	10,4	116,4	41,7	250,0	244,6	3,4	0,3	32,3	—	28,0
Venezia G. Zara	5,8	86,9	23,1	13,7	4,7	5,4	110,0	79,6	207,3	166,7	2,8	—	28,9	—	28,4
Emilia	11,7	69,0	10,7	6,3	4,9	11,3	180,7	57,9	257,7	177,9	3,4	—	25,0	—	31,8
Toscana	8,9	51,3	12,8	4,9	2,9	7,5	130,8	28,4	219,5	240,2	5,4	—	36,6	—	25,1
Marche	4,9	55,7	—	5,4	2,8	6,8	109,1	37,7	309,9	178,6	2,9	—	32,9	—	22,6
Umbria	18,1	74,7	12,9	3,0	3,0	7,4	128,6	51,3	196,4	275,4	5,6	—	54,3	—	29,0
Lazio	9,2	75,4	21,4	6,9	1,6	10,9	91,7	39,1	215,6	196,3	5,3	—	26,2	2,6	26,8
Abruzzi e Molise	2,5	26,0	6,9	0,6	—	2,5	18,1	15,7	119,3	67,2	4,3	—	28,0	—	7,5
Campania	2,8	57,7	11,5	1,9	1,0	2,9	25,5	11,5	187,7	134,1	4,0	—	38,6	—	10,7
Puglie	4,6	27,9	4,9	2,2	0,6	3,0	15,1	17,8	240,6	103,9	1,4	0,3	35,3	—	8,3
Lucania	1,2	23,4	—	—	2,0	—	4,9	2,8	148,9	—	—	—	25,4	—	3,3
Calabria	2,1	17,4	—	0,3	0,3	1,0	9,9	2,3	107,4	97,0	1,3	—	23,4	—	4,5
Sicilia	5,0	30,1	4,7	2,8	0,8	2,6	17,5	20,0	147,9	82,7	2,9	—	27,8	—	8,6
Sardegna	1,1	26,5	6,3	4,3	2,8	2,9	13,1	6,1	126,6	24,7	—	—	8,2	—	5,9
REGNO	7,4	62,4	11,6	4,2	2,5	6,1	57,1	28,5	204,0	159,1	3,8	..	32,3	0,2	18,9

(a) Malattie infettive e parassitarie. (b) Tumori (neoplasie). (c) Malattie reumatiche, della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre malattie generali, del sangue e degli organi ematopoietici, avvelenamenti cronici e intossicazioni. (d) Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi. (e) Malattie dell'apparato circolatorio. (f) Malattie dell'apparato respiratorio. (g) Malattie dell'apparato digerente. (h) Malattie dell'apparato urinario e genitale. (i) Malattie della gravidanza, parto e puerperio. (l) Malattie della pelle e del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione. (m) Vizi di conformazione congeniti e malattie dell'infanzia. (n) Senilità. (o) Morti violente e accidentali. (p) Cause di morte non determinate.

mente nei Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare (v. prospetto 52) e ciò concorda con la constatazione (*) della più vasta organizzazione ospedaliera esistente nell'Italia Settentrionale e Centrale dove affluisce un maggior numero di ammalati per sottoporsi ad intervento chirurgico. Nel 1937, la massima percentuale di morti dopo atto operatorio si è avuta nell'Emilia (31,8 su 1000 morti); la minima nella Lucania (3,3), con comportamento pressochè analogo a quello verificatosi negli anni dal 1931 al 1936.

Le più elevate percentuali di morti dopo atto operatorio si osservano nel Regno ed in genere in tutti i Compartimenti, per i gruppi costituiti dalle *malattie della gravidanza, parto e puerperio*; dalle *malattie della pelle, del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione*; dai *tumori (neoplasie)*; dalle *malattie dell'apparato digerente*.

(*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Statistica degli Ospedali e degli altri Istituti pubblici e privati di assistenza ospedaliera nell'anno 1932-XI*. Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII.

PROSPETTO 53.

**Quozienti di letalità, nel Regno, per malattie infettive soggette a denuncia,
durante gli anni dal 1888 al 1937.**

PROSPETTO 53. — Quozienti di letalità, nel Regno, per le sottoindicate

ANNI (a)	MORBILLO			SCARLATTINA			FEBBRE TIFOIDEA ED INFEZIONI PARATIFICHE (b)			DIFTERITE E CROUP		
	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.
1888	221.130	20.961	9,5	44.532	9.050	20,3	59.651	23.869	40,0	41.912	25.683	61,3
1889	133.700	13.800	10,3	30.916	6.444	20,8	55.502	23.071	41,6	28.839	19.915	69,1
1890	131.397	14.396	11,0	27.429	7.344	26,8	53.797	20.118	37,4	25.723	15.059	58,5
1891	173.968	19.551	11,2	29.826	7.294	24,5	54.480	19.207	35,3	24.985	16.747	67,0
1892	114.305	12.399	10,8	29.447	7.890	26,8	45.753	15.619	34,1	24.254	16.634	68,6
1893	132.417	12.953	9,8	25.817	6.596	25,5	46.847	15.065	32,2	26.827	17.783	66,3
1894	109.506	9.001	8,2	18.482	4.511	24,4	37.260	13.639	36,6	23.896	15.585	65,2
1895	97.880	11.322	11,6	14.643	3.814	26,0	45.208	15.590	34,5	22.106	11.466	51,9
1896	143.600	11.499	8,0	13.080	3.234	24,7	47.656	16.397	34,4	21.375	9.286	43,4
1897	88.625	6.156	6,9	13.224	3.907	29,5	44.023	15.557	35,3	22.924	8.881	38,7
1898	82.377	5.429	6,6	14.369	4.492	31,3	63.449	17.412	27,4	20.639	7.808	37,8
1899	137.291	7.433	5,4	18.639	4.487	24,1	47.531	14.963	31,5	19.987	6.893	34,5
1900	139.219	8.827	6,3	8.950	1.483	16,6	49.425	15.060	30,5	18.220	5.790	31,8
1901	101.166	5.562	5,5	7.859	1.185	15,1	39.313	11.748	29,9	18.233	5.444	29,9
1902	172.751	9.961	5,8	9.839	1.338	13,6	39.001	11.358	29,1	18.207	4.514	24,8
1903	112.191	7.283	6,5	14.103	1.991	14,1	43.849	11.671	26,6	17.820	4.064	22,8
1904	97.916	5.332	5,4	12.560	1.611	12,8	45.768	12.239	26,7	19.727	4.519	22,9
1905	133.398	6.738	5,1	10.674	1.689	15,8	45.699	10.896	23,8	18.153	4.255	23,4
1906	186.600	9.726	5,2	15.903	2.724	17,1	44.799	9.424	21,0	17.446	4.253	24,4
1907	115.412	8.184	7,1	21.542	2.940	13,6	34.647	8.614	24,9	21.951	5.634	25,7
1908	168.347	11.740	7,0	30.636	3.464	11,3	31.365	9.287	29,6	25.612	5.921	23,1
1909	158.908	11.043	6,9	32.010	2.703	8,4	34.969	9.741	27,9	25.265	5.781	22,9
1910	143.796	9.897	6,9	24.082	2.903	12,1	33.643	8.948	26,6	19.766	4.828	24,4
1911	124.031	8.573	6,9	17.052	2.515	14,7	37.474	9.537	25,4	15.498	3.682	23,8
1912	139.290	7.278	5,2	20.460	2.964	14,5	30.558	7.743	25,3	15.887	3.642	22,9
1913	179.640	10.340	5,8	30.408	5.513	18,1	34.119	7.964	23,3	15.820	3.482	22,0
1914	124.038	6.378	5,1	23.512	3.637	15,5	29.141	6.954	23,9	19.409	4.038	20,8
1921	96.725	4.311	4,5	11.079	1.759	15,9	35.527	10.116	28,5	12.081	3.027	25,1
1922	46.471	3.023	6,5	11.965	2.524	21,1	25.316	8.331	32,9	11.347	2.700	23,8
1923	75.024	5.164	6,9	13.418	2.359	17,6	27.626	8.271	29,9	11.183	2.749	24,6
1924	98.279	5.489	5,6	18.871	2.742	14,5	28.074	7.649	27,2	15.883	3.240	20,4
1925	164.484	8.665	5,3	16.733	2.752	16,4	29.300	7.476	25,5	15.383	2.893	18,8
1926	98.158	5.942	6,1	16.062	2.648	16,5	42.360	8.695	20,5	14.923	2.746	18,4
1927	100.195	4.056	4,0	19.949	2.691	13,5	44.471	8.686	19,5	18.879	3.035	16,1
1928	114.979	5.214	4,5	17.515	2.324	13,3	37.334	7.907	21,2	19.247	3.142	16,3
1929	99.609	4.533	4,6	21.114	1.721	8,2	36.349	6.933	19,1	24.035	3.318	13,8
1830	133.883	5.890	4,4	21.171	1.818	8,6	32.785	6.376	19,4	30.050	3.496	11,6
1931	84.371	3.410	4,0	19.107	1.903	10,0	29.129	6.160	21,1	24.872	3.182	12,8
1932	88.944	3.045	3,4	20.786	1.619	7,8	38.570	6.272	16,3	25.749	3.066	11,9
1933	77.956	3.090	4,0	20.064	1.340	6,7	27.758	4.721	17,0	29.016	3.243	11,2
1934	107.545	3.479	3,2	16.657	962	5,8	30.675	4.868	15,9	27.797	2.838	10,2
1935	104.350	2.420	2,3	19.300	1.220	6,3	38.710	5.228	13,5	26.061	2.916	11,2
1936	72.629	1.966	2,7	14.969	571	3,8	27.751	3.839	13,8	25.571	2.571	10,1
1937	70.412	2.137	3,0	16.302	289	1,8	37.589	5.111	13,6	28.596	2.748	9,6

(a) I dati per gli anni 1915-1920 risultano incompleti, a causa del perturbamento portato dalla guerra, e quindi sono stati omessi nel presente prospetto.
 (b) Negli anni anteriori al 1924 venivano compresi nei morti per febbre tifoidea ed infezioni paratifiche, anche i decessi dovuti a febbre miliare.
 (c) A partire dal 1932, il numero delle donne decedute per febbre puerperale, per l'adozione della nuova nomenclatura nosologica, è stato ottenuto a calcolo,

malattie infettive soggette a denuncia, durante gli anni dal 1888 al 1937.

ANNI (a)	PERTOSSE			INFLUENZA EPIDEMICA			FEBBRE PUERPERALE			MALARIA (in tutte le sue forme)		
	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.	Casi denunz.	Morti	Morti per 100 casi denunz.
1888	—	—	—	—	—	—	9.046	2.451	27,1	—	—	—
1889	—	—	—	—	—	—	7.588	2.106	27,8	—	—	—
1890	—	—	—	—	—	—	6.013	1.682	28,0	—	—	—
1891	—	—	—	—	—	—	4.884	1.633	33,4	—	—	—
1892	—	—	—	—	—	—	3.866	1.530	39,6	—	—	—
1893	—	—	—	—	—	—	4.050	1.774	43,8	—	—	—
1894	—	—	—	—	—	—	3.094	1.604	51,8	—	—	—
1895	—	—	—	—	—	—	2.963	1.514	51,1	—	—	—
1896	—	—	—	—	—	—	2.490	1.292	51,9	—	—	—
1897	—	—	—	—	—	—	2.520	1.199	47,6	—	—	—
1898	—	—	—	—	—	—	2.479	1.214	49,0	—	—	—
1899	—	—	—	—	—	—	2.603	1.302	50,0	—	—	—
1900	—	—	—	—	—	—	2.158	1.033	47,9	—	—	—
1901	—	—	—	—	—	—	2.119	994	46,9	—	—	—
1902	—	—	—	—	—	—	2.871	1.037	36,1	177.946	9.908	5,6
1903	—	—	—	—	—	—	3.023	1.112	36,8	183.802	8.517	4,6
1904	—	—	—	—	—	—	3.002	1.082	36,0	266.940	8.463	3,2
1905	—	—	—	—	—	—	2.609	977	37,4	323.312	7.845	2,4
1906	—	—	—	—	—	—	2.441	1.021	41,8	230.798	4.871	2,1
1907	—	—	—	—	—	—	2.546	1.147	45,1	197.771	4.231	2,1
1908	—	—	—	—	—	—	2.734	1.245	45,5	172.862	3.478	2,0
1909	—	—	—	—	—	—	2.518	1.242	49,3	178.028	3.533	2,0
1910	—	—	—	—	—	—	2.099	1.011	48,2	201.247	3.621	1,8
1911	—	—	—	—	—	—	1.782	929	52,1	185.747	4.420	2,4
1912	—	—	—	—	—	—	1.911	899	47,0	167.008	3.161	1,9
1913	—	—	—	—	—	—	1.888	1.037	54,9	157.152	2.664	1,7
1914	—	—	—	—	—	—	1.937	1.036	53,5	129.482	2.045	1,6
1921	—	—	—	—	—	—	1.652	1.139	68,9	267.589	4.848	1,8
1922	—	—	—	—	—	—	1.551	1.094	70,5	234.656	4.085	1,7
1923	—	—	—	—	—	—	1.820	1.170	64,3	188.937	3.307	1,8
1924	—	—	—	—	—	—	2.141	1.361	63,6	250.911	4.036	1,6
1925	23.756	3.189	13,4	64.736	8.808	13,6	2.110	1.133	53,7	283.109	3.589	1,3
1926	31.282	4.066	13,0	184.499	13.575	7,4	1.678	922	54,9	220.602	2.683	1,2
1927	34.737	3.525	10,1	119.635	8.950	7,5	1.871	995	53,2	192.738	2.562	1,3
1928	30.823	3.914	12,7	76.669	10.166	13,3	1.879	1.007	53,6	244.650	2.925	1,2
1929	19.386	2.908	15,0	279.444	19.536	7,0	1.991	957	48,1	206.590	2.706	1,3
1930	23.411	2.322	9,9	27.486	7.052	25,7	1.991	966	48,5	203.590	2.781	1,4
1931	25.331	2.972	11,7	140.344	13.287	9,5	1.748	919	52,6	202.557	3.101	1,5
1932	27.884	2.948	10,6	113.333	13.346	11,8	1.829	(c) 989	54,1	203.219	3.171	1,6
1933	29.338	2.842	9,7	175.166	12.048	6,9	1.851	(c) 937	50,6	175.213	1.956	1,1
1934	25.950	2.189	8,4	27.464	8.277	30,1	1.782	(c) 894	50,2	222.171	2.238	1,0
1935	21.938	1.922	8,8	99.157	11.704	11,8	1.969	(c) 1.065	54,1	163.668	1.693	1,0
1936	30.229	2.372	7,8	47.661	10.675	22,4	1.847	(c) 1.006	54,5	135.340	1.291	1,0
1937	30.014	2.740	9,1	132.868	12.110	9,1	1.833	(c) 894	48,8	108.480	1.032	1,0

supponendo che esso stia, a confronto del complesso delle malattie settiche puerperali, nella stessa proporzione che nel periodo 1924-31.

CAPO II.

NOTIZIE SULLE MORTI VIOLENTE
E SULLE MORTI CAUSATE DA AVVELENAMENTI CRONICI,
ACCIDENTALI O PROFESSIONALI.

§ 1. — **Morti per causa violenta, ripartiti per sesso, durante il periodo 1887-1937.** — Diamo, nel seguente prospetto, il numero dei morti nel Regno per *causa violenta accidentale*, per *omicidio e infanticidio* e per *suicidio*, distinti per sesso, nei decenni dal 1887 al 1916, nei settenni dal 1917 al 1930 e nei singoli anni dal 1931 al 1937.

PROSPETTO 54. — **Morti per causa violenta, distinti secondo il sesso.**

PERIODI	CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE (a)			OMICIDIO E INFANTICIDIO (b)			SUICIDIO		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
1887-96 (media annuale)	6.749	3.398	10.147	1.295	199	1.494	1.365	327	1.692
1897-906 »	7.104	3.634	10.738	1.192	202	1.394	1.638	443	2.081
1907-16 »	13.328	8.981	(c) 22.309	1.021	215	1.236	2.112	752	2.864
1917-23 »	8.544	3.154	11.698	1.630	284	1.914	2.005	782	2.787
1924-30 »	9.929	3.527	(d) 13.456	1.010	276	1.286	2.870	985	3.855
1931.....	10.425	3.510	13.935	799	278	1.077	3.142	999	4.141
1932.....	10.456	3.596	14.052	779	263	1.042	3.035	1.023	4.058
1933.....	10.167	3.429	(e) 13.596	712	257	969	2.795	917	3.712
1934.....	10.587	3.482	14.069	621	228	849	2.703	983	3.686
1935.....	11.287	3.780	(f) 15.067	611	210	821	2.379	888	3.267
1936.....	10.327	3.386	(g) 13.713	625	236	861	2.520	879	3.399
1937.....	10.981	3.524	(h) 14.505	552	217	769	2.420	871	3.291

(a) Compresi i decessi per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (b) Sotto questa rubrica sono compresi, oltre gli omicidi volontari, preterintenzionali, colposi e avvenuti in duello, gli omicidi dipendenti dall'esecuzione di ordini dell'Autorità competente (in conformità al Codice penale). (c) La media annuale dei morti nel periodo 1907-16 tiene conto delle vittime dei terremoti avvenuti il 28 dicembre 1908 (77283) e il 13 gennaio 1915 (30476). (d) La media annuale dei morti nel periodo 1924-30 tiene conto delle vittime dei terremoti avvenuti il 23 luglio e il 30 ottobre 1930 (1427). (e) Comprese le vittime del terremoto avvenuto il 26 settembre 1933 (12). (f) Comprese le vittime dovute ad alluvione (141). (g) Comprese le vittime del terremoto avvenuto il 18 ottobre 1936 (18) e 1 decesso dovuto a nubifragio. (h) Compresi due decessi dovuti a ciclone ed a nubifragio.

§ 2. — **Notizie sulle morti per causa violenta accidentale.** — *Regno.* Dal prospetto 55 in cui sono calcolati i numeri indici della mortalità per *causa violenta accidentale* fino al 1937, facendo uguale a 100 quella del quinquennio 1887-91, si rileva come, fatta astrazione delle vittime causate dai terremoti avvenuti negli anni 1908, 1915 e 1930, 1933 e 1936 e di quelle causate da alluvione, ciclone o nubifragio nel 1935, 1936 e 1937, la mortalità, per tutti gli anni del periodo preso in esame, ad eccezione del 1909 e del 1918, si è mantenuta ad un livello inferiore a quello del periodo base, toccando il minimo valore negli anni 1921 e 1923. Nel 1937 a mortalità è risultata di 334 morti per 1.000.000 di abitanti.

PROSPETTO 55. — Morti per causa violenta accidentale negli anni dal 1887 al 1937.

PERIODI	MORTI PER CAUSA VIOLENTE ACCIDENTALE (a)	PER 1.000.000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)	PERIODI	MORTI PER CAUSA VIOLENTE ACCIDENTALE (a)	PER 1.000.000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (Media ann.)	10.581	353	100	1921	11.247	305	86
1892-96	9.713	313	89	1922	11.172	306	87
1897-901	10.310	321	91	1923	11.252	305	86
1902-06	11.165	338	96	1924	12.827	331	94
1907	11.442	341	97	1925	13.463	344	97
1908	(b) 89.170	2.636	747	1926	12.659	321	91
	(c) 11.887	351	99	1927	12.925	325	92
1909	12.943	380	108	1928	13.513	336	95
1910	11.006	320	91	1929	13.672	337	95
1911	11.088	320	91	1930	(b) 15.137	370	105
1912	10.979	313	89	(c) 13.710	335	95	
1913	11.244	317	90	1931	13.935	338	96
1914	11.456	319	90	1932	14.052	338	96
1915	(b) 42.178	1.159	328	1933	(b) 13.596	324	92
	(c) 11.702	322	91	(c) 13.584	323	92	
1916	11.581	315	89	1934	14.069	332	94
1917	12.357	348	99	(b) 15.067	352	100	
1918	12.921	365	103	(c) 14.926	349	99	
1919	11.622	322	91	(b) 13.713	319	90	
1920	11.318	311	88	(c) 13.694	319	90	
				(b) 14.505	334	95	
				(c) 14.503	334	95	

(a) Vedi la nota (a) a pagina precedente. — (b) Compresi i morti per cataclisma. — (c) Esclusi i morti per cataclisma.

PROSPETTO 56. — Mortalità per causa violenta accidentale (1).
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932 (*)	1935-1937 (**)	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	1900-1902	1910-1912	1920-1922	1930-1932	1935-1937	
Piemonte	36,1	33,0	34,9	37,3	38,7	91	97	103	107	112	104	115	111	116	
Liguria	35,1	31,6	35,6	32,8	34,6	90	102	93	99	109	99	118	97	103	
Lombardia	32,6	34,2	32,5	38,0	38,2	105	100	117	117	101	108	107	113	114	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	50,0	55,5	—	—	—	—	—	—	—	148	166	
Veneto	29,1	30,3	33,2	32,0	33,4	104	114	110	115	90	95	110	95	100	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	42,2	46,8	—	—	—	—	—	—	—	125	140	
Emilia	29,9	31,0	31,4	34,8	34,8	104	105	117	117	92	97	104	103	104	
Toscana	28,4	27,5	29,7	30,4	31,3	97	105	107	110	88	87	98	90	94	
Marche	33,1	33,4	32,7	36,4	31,5	101	99	110	95	103	105	108	108	94	
Umbria	36,9	36,9	33,5	37,6	39,9	100	91	102	108	114	116	111	111	119	
Lazio	34,5	32,8	32,1	35,8	35,7	95	93	104	103	107	103	106	106	107	
Abruzzi e Molise	35,7	33,7	30,2	33,6	31,4	94	84	94	88	111	106	100	100	94	
Campania	34,6	36,1	30,2	31,6	29,4	104	87	91	85	107	114	100	94	88	
Puglie	29,7	29,4	25,4	27,6	26,0	99	86	93	88	92	92	84	82	78	
Lucania	46,5	42,1	36,8	40,7	32,5	91	79	88	70	144	132	121	121	97	
Calabrie	34,3	34,5	27,6	32,3	28,9	101	80	94	84	106	109	91	96	86	
Sicilia	28,7	26,4	20,9	26,5	24,7	92	73	92	86	89	83	69	78	74	
Sardegna	29,5	27,2	25,0	33,2	32,3	92	85	113	110	91	86	83	98	97	
REGNO	vecchi confini		32,3	31,8	30,3		99	94	103	101	100	100	100		
	attuali confini					33,8	33,4							100	100

(1) Cfr. la nota (a) a pagina precedente.

(*) Esclusi i morti nei terremoti avvenuti il 23 luglio e il 30 ottobre 1930. (**) Esclusi nel 1935, le vittime dovute ad alluvione, nel 1936, le vittime del terremoto avvenuto il 18 ottobre ed un morto per nubifragio e, nel 1937, due morti per ciclone e nubifragio.

(a) Cfr. la nota (a) pag. 5*.

Compartimenti. — Dall'esame del prospetto 56 si rileva che per il Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *causa violenta accidentale*, nel triennio 1935-37, ha subito il lieve aumento dell'1 % a confronto di quella del periodo base 1900-02.

Nei singoli Compartimenti si nota, nel 1935-37 a confronto del triennio base 1900-02, un aumento di detta mortalità per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna e una diminuzione per i restanti Compartimenti; hanno, nel 1935-37, superato la mortalità media del Regno, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia e Zara, l'Emilia, l'Umbria e il Lazio.

Età e sesso. — Esaminando i quozienti specifici di mortalità per età e sesso (prospetto 57) si nota che la mortalità complessiva per *causa violenta accidentale*, nei trienni considerati, è superiore nei maschi: nei singoli gruppi di età avviene lo stesso fatto, anzi la prevalenza dei maschi sulle femmine appare molto più accentuata nei gruppi di età da 15 a 59 anni in confronto agli altri gruppi, e ciò può essere messo in relazione al fatto che nell'età da 15 a 59 anni, i maschi esplicano la loro attività lavorativa che li espone a maggiori rischi, mentre le femmine attendono, generalmente, ad una attività in casa che le espone a rischi molto più limitati.

La mortalità è, in genere, più elevata, sia nei maschi sia nelle femmine, nei bambini da 1 a 4 anni e nelle età avanzate: è anche considerevole nei bambini nel primo anno di vita.

PROSPETTO 57. — Quozienti specifici di mortalità per causa violenta accidentale.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02		1910-12			1920-22			1930-32 (a)			1935-37 (b)			
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
fino a 1 anno ...	33,5	31,8	32,7	32,0	30,4	31,2	24,6	22,8	23,7	27,4	25,4	26,4	24,6	19,5	22,1
1-4 anni	73,7	69,9	71,8	81,7	69,6	75,8	68,3	53,8	61,2	65,6	53,6	59,7	63,6	52,6	58,2
5-14 »	24,7	17,3	21,1	25,6	15,8	20,8	26,2	11,5	19,0	26,2	11,1	18,8	25,0	10,2	17,7
15-29 »	28,8	7,0	17,7	32,8	5,8	18,7	38,6	6,0	21,8	42,1	5,5	23,7	45,3	6,1	25,8
30-39 »	31,3	7,2	19,0	33,3	6,0	19,0	37,8	6,3	21,1	45,8	6,2	24,5	46,6	6,4	25,8
40-49 »	38,4	9,5	23,8	39,6	9,1	23,9	43,6	8,7	25,8	53,1	8,7	29,2	56,4	8,7	30,5
50-59 »	51,5	15,6	33,2	50,4	13,0	31,4	55,2	13,3	34,1	68,7	14,2	40,5	70,3	14,2	40,7
60-69 »	74,0	30,7	52,0	75,2	24,1	49,3	75,8	24,6	49,9	87,4	27,1	56,3	84,9	24,6	53,6
70-∞	138,4	107,5	122,8	121,9	85,7	103,5	116,9	76,7	96,4	134,0	79,2	105,1	123,1	71,4	95,6
Totale (c) . . .	42,5	22,0	32,2	44,5	19,7	31,9	44,9	15,8	30,2	51,3	16,9	33,7	51,3	16,2	33,4

(a) Cfr. la nota (*) a pag. 63*. (b) Cfr. la nota (**) a pag. 63*. (c) Esclusa l'età ignota.

Cause. — Fra le cause più frequenti delle *morti accidentali*, sia nei maschi sia nelle femmine, durante gli anni 1936 e 1937, si notano le lesioni da caduta, schiacciamento e frana, gli annegamenti e le ustioni, queste ultime specialmente nel sesso femminile.

PROSPETTO 58. — Morti per causa violenta accidentale, secondo il sesso e la specie dell'infortunio.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	MORTI PER CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE				% DEL TOTALE			
	1936		1937		1936		1937	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Morsi o punture d'animali velenosi . . .	8	6	12	5	0,8	1,8	1,1	1,4
Avvelenamento da alimenti guasti . . .	51	39	67	51	5,0	11,6	6,2	14,6
Assorbimento di gas irrespirabili o tossici	95	36	106	41	9,3	10,7	9,7	11,7
Altri avvelen. acuti (esclusi quelli da gas)	79	46	69	53	7,7	13,7	6,3	15,2
Per incendio	48	27	33	20	4,7	8,0	3,0	5,7
Per ustioni (escluse quelle per incendio)	838	914	818	893	81,8	271,8	75,1	255,4
Per soffocazione meccanica	72	37	68	37	7,0	11,0	6,2	10,6
Per annegamento	1.390	399	1.397	410	135,7	118,6	128,2	117,2
Per trauma da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra)	186	30	198	37	18,2	8,9	18,2	10,6
Per trauma da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra)	37	7	33	3	3,6	2,1	3,0	0,9
Per lesioni da caduta, schiacciamento, frana	5.900	1.593	6.534	1.729	575,8	473,7	599,8	494,4
Di cui per valanga (a)	—	—	38	—	—	—	3,5	—
Per cataclisma (b)	10	9	1	1	1,0	2,7	0,1	0,3
Per violenze di animali	184	24	202	23	18,0	7,1	18,5	6,6
Per fame e sete (c)	—	—	—	2	—	—	—	0,6
Per freddo eccessivo	101	20	144	20	9,9	5,9	13,2	5,7
Per caldo eccessivo	76	31	95	31	7,4	9,2	8,7	8,9
Per fulmine	116	42	165	47	11,3	12,5	15,1	13,4
Per accidenti dovuti alla corrente elettrica	220	5	209	8	21,5	1,5	19,2	2,3
Per altri accidenti :								
a) corpi estranei	15	9	13	8	1,5	2,7	1,2	2,3
b) altri	820	89	730	78	80,0	26,5	67,0	22,3
IN COMPLESSO	10.246	3.363	10.894	3.497	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

(a) Questi dati si conoscono soltanto nel 1937. (b) Terremoto, nubifragio, ciclone. (c) Trattasi di 2 bambine di cui l' smarritasi in un bosco e l'altra morta per abbandono.

Morti per infortunio causato dall'ubbrachezza e dall'epilessia. — Dal 1924 si è ritenuto opportuno tenere distinti i casi di morte per infortunio, avvenuti in individui in istato di ubbrachezza che fino al 1923 erano classificati insieme a quelli dovuti ad alcoolismo acuto. Dal 1937 si è creduto conveniente fare un'analogha distinzione per

PROSPETTO 59. — Morti per infortunio causato dall'ubbrachezza e dall'epilessia.

SPECIE DELL'INFORTUNIO	DA UBBRIACHEZZA										DA EPILESSIA					
	1931		1932		1933		1934		1935		1936		1937		1937	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
Per soffocazione mec- canica	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	3	—	1	—
Annegamento	3	—	2	—	2	—	3	—	1	—	3	—	2	—	18	5
Freddo	13	2	7	—	9	—	2	—	8	—	3	—	10	1	1	—
Caldo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Caduta	36	3	28	—	10	—	17	2	10	—	24	3	11	1	9	2
Schiacciamento	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ustioni, escluse le morti per incendio	1	—	2	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	17	7
Per altri accidenti	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	1	1	—	—	—

i casi di morte per infortunio verificatisi durante un'attacco epilettico, che precedentemente erano compresi nella voce epilessia. Ciò consente di attribuire i casi sia all'infortunio che determinò la morte, sia ai fatti morbosi che furono causa dell'infortunio. Tali dati figurano nel prospetto 59 ed essi per il 1936 e 1937 sono, come è ovvio, compresi anche nelle cifre rispettive del prospetto 58.

Morti per infortuni sul lavoro. — A cominciare dall'anno 1926, si è fatto lo spoglio dei casi di morte per *causa violenta accidentale*, per determinare il numero delle morti che il medico denunciante ha dichiarato come dovute ad *infortunio sul lavoro*.

Tale notizia fu richiesta esplicitamente sulle schede a partire dal 1931 (a). Dallo spoglio di queste, dal 1931 al 1937, si desumono i seguenti dati. Nel 1931, le morti dichiarate come avvenute per *infortunio sul lavoro* rappresentavano, nei maschi, il 22 % dei casi di morte per *causa violenta accidentale*, nel 1932 e 1934 tale proporzione è stata del 25 %, nel 1933 del 24 %, nel 1935 del 26 %, nel 1936 del 28 % e nel 1937 del 27 %. Nelle femmine, come è ovvio, la proporzione è molto più bassa; essa, negli anni dal 1931 al 1934 e nel 1937, rappresenta soltanto il 5 %, nel 1935 il 7 % e nel 1936 il 4 %.

Le cause più frequenti delle morti per *infortuni sul lavoro*, per i maschi, sono, in genere, le lesioni da caduta, schiacciamento e frana, gli accidenti dovuti a corrente elettrica, le violenze di animali, l'annegamento, le ustioni e l'assorbimento di gas irrespirabili o tossici.

PROSPETTO 60. — *Morti per causa violenta accidentale, indicate come dipendenti da infortunio sul lavoro.*

SPECIE DELL'INFORTUNIO	1935		1936		1937	
	M	F	M	F	M	F
Morsi o punture d'animali velenosi	—	—	1	—	1	—
Assorbimento di gas irrespirabili o tossici	48	3	39	—	51	4
Altri avvelenamenti acuti (esclusi quelli da gas)	5	—	3	—	3	—
Per incendio	4	1	19	2	7	—
Per ustioni (escluse quelle per incendio)	51	12	56	2	78	9
Per soffocazione meccanica	3	—	4	—	2	—
Per annegamento	106	8	86	5	103	13
Per trauma da arma da fuoco (escluse le ferite di guerra)	8	—	17	—	11	—
Per trauma da arma da punta o da taglio (escluse le ferite di guerra)	22	5	17	1	14	1
Per lesioni da caduta, schiacciamento, frana	2.047	122	1.795	90	1.951	107
Per violenze di animali	83	6	93	6	107	5
Per freddo eccessivo	6	1	2	—	1	—
Per caldo eccessivo	64	26	12	1	19	4
Per fulmine	43	6	51	12	72	8
Per accidenti dovuti alla corrente elettrica	123	1	132	—	111	—
Per altri accidenti :						
a) corpi estranei	—	—	2	—	—	—
b) altri	322	54	511	15	456	17
IN COMPLESSO	2.935	245	2.840	134	2.987	168

(a) Per gli anni dal 1926 al 1930, sebbene la notizia non fosse richiesta sulle schede di morte, in alcune era aggiunta: si ritenne per ciò opportuno di esaminare a parte tali schede, pur riconoscendo che esse rappresentavano solo una piccola parte delle morti che possono essere considerate come dipendenti da *infortuni sul lavoro*.

Morti per cause violente accidentali avvenute in miniere o cave o causate da macchine. — Dal 1931 le *morti violente accidentali*, avvenute nelle suddette circostanze, sono state classificate distintamente, e la loro frequenza assoluta e relativa a 100 morti per il complesso delle *cause violente accidentali* risulta dal prospetto 61.

Le *morti violente accidentali in miniere o cave o causate da macchine* sono, per ragioni ovvie, rare nel sesso femminile. Nel sesso maschile le percentuali delle *morti violente accidentali avvenute in miniere o cave* sul totale delle morti violente accidentali sono andate progressivamente aumentando dal 1931 al 1937 con un minimo del 0,7 % nel 1931 e 1932 ed un massimo dell'1,8 % nel 1937; le percentuali delle *morti violente accidentali causate da macchine* si sono invece aggirate nel settennio 1931-37 intorno al 0,9 %.

PROSPETTO 61. — *Morti per cause violente accidentali.*

ANNI	IN MINIERE O CAVE						DETERMINATE DA MACCHINE					
	Cifre assolute			% morti da causa violenta accidentale (a)			Cifre assolute			% morti da causa violenta accidentale (a)		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
1931.....	70	2	72	0,7	0,1	0,5	94	10	104	0,9	0,3	0,8
1932.....	72	7	79	0,7	0,2	0,6	133	9	142	1,3	0,3	1,0
1933.....	94	—	94	0,9	—	0,7	118	13	131	1,2	0,4	1,0
1934.....	100	—	100	1,0	—	0,7	119	4	123	1,1	0,1	0,9
1935.....	140	—	140	1,3	—	0,9	146	11	157	1,3	0,3	1,1
1936.....	156	2	158	1,5	0,1	1,2	117	8	125	1,1	0,2	0,9
1937.....	198	1	199	1,8	—	1,4	118	9	127	1,1	0,3	0,9

(a) Esclusi i morti per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta, ed i morti per cataclisma.

Morti per infortuni causati da mezzi di trasporto. — Con l'anno 1911 si incominciarono le ricerche sul numero dei morti per infortuni dovuti ad automobili e biciclette, e, negli anni successivi, tali ricerche furono estese a tutti i mezzi meccanici di trasporto.

La mortalità per *infortuni derivati da mezzi meccanici di trasporto*, che è andata diminuendo dal 1919 al 1923 (da 31,11 morti per ogni milione di abitanti nel 1919 a 17,33 nel 1923), tende a risalire notevolmente dal 1924 in poi e segna il massimo nel 1934 (88,69). Nel 1935 la mortalità è stata dell'85,18 per ogni milione di abitanti e nel 1936, con una notevole diminuzione, del 61,71. Nel 1937 il quoziente di mortalità supera nuovamente gli 80 morti per ogni milione di abitanti (83,73).

Negli anni dal 1929 al 1935 si nota un forte aumento nelle morti causate dall'uso delle automobili, biciclette, motociclette e autocarri, in confronto agli anni precedenti. Nel 1936 si nota una notevole diminuzione di tali morti (1687 morti contro 2702 registrati nel 1935), probabilmente dovuta al minor impiego di questi mezzi di locomozione, causato dalle sanzioni, mentre nel 1937 questo numero raggiunge nuovamente la cifra di 2603 morti.

PROSPETTO 62. — Morti per infortunio causato da mezzi meccanici di trasporto (*).

MEZZI DI TRASPORTO	1919		1929		1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936		1937	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Automobile	249	57	762	204	962	252	1091	233	1164	287	1342	300	1525	348	1432	302	914	212	1476	340
Bicicletta	16	5	137	19	181	29	219	35	258	38	256	46	287	39	282	67	286	48	300	69
Motocicletta	16	3	176	13	236	39	220	40	282	42	360	44	465	53	419	56	284	40	395	63
Ferrovia	385	33	351	55	378	91	328	75	351	59	322	79	291	68	289	60	261	59	275	42
Tramvia	144	27	142	53	154	37	134	29	133	31	140	30	115	34	148	39	115	46	125	43
Autocarro	115	20	182	26	193	37	193	31	276	39	361	61	394	54	429	64	206	31	286	43
Ascensore	1	1	3	1	7	—	2	—	3	—	3	—	5	1	5	—	7	1	9	4
Velivolo	50	—	59	1	74	3	76	1	92	3	33	—	67	—	44	—	133	2	152	—
di cui per precipitaz.	48	—	47	—	72	1	71	—	79	3	31	—	61	—	42	—	93	1	75	—
Teleferica	—	—	8	—	10	1	5	—	4	1	4	1	14	—	7	—	5	—	7	1
Funicolare	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	1
Motoscafo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—
Sommergibile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
IN COMPLESSO	976	146	1820	372	2196	490	2269	444	2563	500	2821	561	3165	597	3059	588	2214	439	3028	606
	1.122		2.192		2.686		2.713		3.063		3.382		3.762		3.647		2.653		3.634	
Numeri indici (morti nel 1919=100)	100		195		239		242		273		301		335		325		236		324	
Morti per un milione di abitanti	31,11		54,06		65,69		65,89		73,59		80,50		88,69		85,18		61,71		83,73	
Numeri indici (morti per un milione di abit. nel 1919=100)	100		174		211		212		237		259		285		274		198		269	

(*) Per i dati riguardanti gli anni dal 1920 al 1928 vedi: *Statistica delle Cause di morte nell'anno 1933 - Parte I - Introduzione - Roma, Tipografia Operaia Romana, 1936-XIV, pag. 65**.

Avvelenamenti acuti accidentali. — Per le morti dovute ad *avvelenamento acuto accidentale*, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze che produssero la morte. Nel prospetto 63 sono riportati i casi avvenuti negli anni 1935, 1936 e 1937.

Poichè è di comune constatazione che alcuni avvelenamenti accidentali, quali, ad esempio, quelli per ossido di carbonio, per acido solfidrico, ecc., possono verificarsi in circostanze diverse, si è tenuto conto, a cominciare dall'anno 1928, negli spogli delle schede di morte, delle notizie che a tale riguardo figuravano nelle schede stesse. E per quanto tali circostanze siano state annotate solo raramente, tuttavia risulta che, nel complesso del triennio 1935-37, nel quale si verificarono 14 casi di avvelenamento per acido cianidrico, per 5 di essi venne indicato, sulle schede, che la morte fu dovuta a ingestione di mandorle amare o semi di pesche; sopra 17 avvelenamenti per acido solfidrico, durante il suddetto triennio, 7 avvennero in pozzi o fogne, 7 in miniere o cave e per 3 non venne data alcuna notizia; sopra 272 avvelenamenti per ossido di carbonio, le circostanze diverse in cui essi si verificarono vennero specificate soltanto per 147 casi, e cioè: 25 per gas esalato da braciere di carbone, da caloriferi o da combustione di legna; 97 per fughe di gas illuminante, 16 in miniere o cave, 3 in alti forni e 6 per incendio; su 262 avvelenamenti per sostanze alimentari, soltanto 27 furono dovuti a botulismo o a carne guasta, 212 a ingestione di funghi velenosi e 23 ad altre sostanze alimentari alterate.

PROSPETTO 63. — Morti per avvelenamento acuto accidentale (*), classificati per sesso e secondo la sostanza.

SOSTANZE (a)	1935		1936		1937		SOSTANZE (a)	1935		1936		1937	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Acetilene	—	—	—	—	1	—	Mercurio :	—	—	—	—	—	—
Acido acetico	1	—	—	1	—	—	<i>sublimato corrosivo</i>	2	6	2	5	2	4
Acido cianidrico :	—	—	—	—	—	—	<i>altri sali e preparati non specificati</i>	—	1	1	3	—	—
<i>acido cianidrico o cianuri (senza altra indicazione).</i>	1	—	2	1	4	1	Morfina	—	—	—	—	1	—
<i>ingestione di mandorle amare o semi di pesche</i>	—	—	2	1	2	—	Nicotina	1	—	2	—	—	—
Acido cloridrico	3	1	2	2	1	1	Oppio	—	1	1	—	1	1
Acido fenico	2	—	—	—	1	—	Ossido di carbonio :	—	—	—	—	—	—
Acido formico	—	—	—	—	—	—	<i>ossido di carbonio (senza altra indicazione)</i>	42	22	12	7	28	14
Acido nitrico	1	—	—	—	—	—	<i>bracieri di carbone, caloriferi o da combustione di legna</i>	3	—	8	4	6	4
Acido salicilico e suoi derivati	—	—	—	—	1	—	<i>gas illuminante</i>	14	16	27	14	15	11
Acido solfidrico :	—	—	—	—	—	—	<i>in miniere o cave</i>	13	—	2	—	1	—
<i>acido solfidrico (senza altra indicazione)</i>	1	—	—	—	2	—	<i>altri forni</i>	—	—	2	—	—	1
<i>in pozzi o fogne</i>	5	1	—	1	—	—	<i>incendio</i>	—	—	3	3	—	—
<i>in miniere o cave</i>	4	—	3	—	—	—	Permanganato potassico	—	—	—	1	1	—
Acido solforico	6	7	12	5	6	2	Petrolio	2	—	1	—	—	—
Adalina	—	—	—	1	—	—	Piombo e suoi derivati	—	—	—	—	—	1
Alcool	1	—	—	—	—	—	Rame :	—	—	—	—	—	—
Ammoniaca	—	1	1	—	1	—	<i>solfato</i>	2	3	4	2	1	1
Anafilassi	1	2	—	—	—	3	<i>altri preparati e sali non specificati</i>	—	—	2	1	—	3
Anafilassi da siero	2	1	—	—	—	—	Ricino (semi e ricinina)	—	2	—	—	2	—
Anidride carbonica	16	4	14	2	12	2	Soda e potassa	5	5	6	1	7	2
Anidride solforosa	—	—	2	—	—	—	Solfuro di carbonio	—	—	—	—	4	—
Anilina	3	—	1	—	—	—	Solfuro di potassio	—	—	—	1	—	—
Apiolo	—	1	—	—	—	—	Sostanze alimentari :	—	—	—	—	—	—
Arsenico e suoi preparati	6	2	4	1	6	5	<i>funghi velenosi</i>	20	25	42	27	53	45
Aspirina	—	—	—	1	—	—	<i>carne insaccata o guasta</i>	2	3	6	6	7	3
Azoto	—	—	—	—	1	—	<i>altre sostanze alimentari alterate</i>	2	2	3	6	7	3
Belladonna e atropina	2	—	1	—	—	—	Sostanze ipnotiche non specificate	—	1	—	—	—	—
Benzina	1	—	2	—	—	1	Stramonio	—	1	—	1	1	—
Bismuto	—	—	—	—	1	—	Stricnina	—	—	1	1	—	1
Calcio cianamide	1	—	1	—	—	—	Strofantio	—	1	—	—	—	—
Chenopodio	—	—	—	—	1	1	Tetracloruro di carbonio	—	—	1	—	—	—
Chininio (sali di)	26	31	16	13	17	15	Varecchina	—	—	1	—	—	—
Cicuta	—	1	2	—	—	—	Verbena	—	—	—	1	—	—
Clorato di potassio	—	—	1	—	1	—	Veronal	4	—	—	—	—	—
Cloro	3	—	—	—	—	—	Veleni non specificati :	—	—	—	—	—	—
Cloruro di bario	1	—	—	—	—	—	<i>preparati e sostanze varie non ben precisati</i>	15	1	2	3	10	6
Creolina	2	—	—	—	—	—	<i>sostanze non indicate</i>	3	3	5	1	—	—
Detersina	—	—	—	—	1	—	Morsi o punture di animali velenosi :	—	—	—	—	—	—
Dial	—	—	—	—	1	—	<i>api</i>	—	1	—	—	—	—
Digitale e suoi preparati	—	—	—	—	1	—	<i>ragno</i>	—	—	—	—	1	1
Fenilcloroarsina	1	—	—	—	—	—	<i>vespe o insetti velenosi non specificati</i>	2	1	4	1	—	—
Formalina	—	—	1	—	—	—	<i>vipera o serpenti velenosi non specificati</i>	1	4	4	5	10	4
Fosforo di zinco	—	1	3	—	—	1	<i>non specificati</i>	1	—	—	—	1	—
Fosgene	—	—	—	—	1	—	IN COMPLESSO	247	169	233	127	254	150
Gas irrespirabili o tossici (non specificati) :	—	—	—	—	—	—							
<i>gas irrespirabili o tossici (non specificati)</i>	20	16	6	2	6	6							
<i>di miniera</i>	1	—	2	—	18	8							
<i>pozzi neri, letamai e cisterne da scoppio di granata asfissiante</i>	1	—	8	2	8	3							
Infuso di foglie di oleandro	—	—	—	—	—	2							
Ipnocici barbiturici non specificati	—	—	—	—	1	1							
Iprite e gas vescicatori	—	—	4	—	—	—							
Laudano	1	1	1	—	—	—							

(*) Compresse le morti da gas irrespirabili.

(a) Sono state indicate tutte le sostanze che erano specificate nelle schede di morte.

PROSPETTO 64. — Maschi, in età da 15 anni in poi, morti per causa violenta accidentale, classificati per professione o condizione.

CLASSE (a)	CATEGORIA (a)	SOTTOCATEGORIA (a)	PROFESSIONE O CONDIZIONE	MORTI PER CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE (b)		CIFRE PROPORZIONALI A 1000 MASCHI MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI DELLA STESSA PROFESSIONE (c)	
				1936	1937	1936	1937
1	1	1 e 2	Agricoltori di ogni specie	3.059	3.184	32,7	35,8
2	1	0	Industriali, commercianti	165	186	28,1	31,8
3	1	0	Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate	75	100	23,7	32,1
3	2	0	Esercenti	24	32	22,3	30,7
3	3	0	Commissionari, rappresentanti	51	60	28,1	32,8
4	1	0	Minatori, cavaatori, ecc.	167	192	159,7	187,9
4	2	0	Falegnami, verniciatori, ecc.	221	200	40,5	39,6
4	3	1-2-3-4	Addetti alla macellazione e conservazione delle carni, ai forni, ai pastifici, alla lavorazione del latte e alle industrie alimentari	121	109	47,3	48,1
4	4	1 e 2	Conciatori, pellai, calzolai, guantai, ecc.	96	99	21,2	23,8
4	5	1 e 2	Metallurgici, meccanici, elettricisti, ecc.	503	513	79,1	82,0
4	6	0	Argentieri, orefici, ecc.	5	9	13,5	25,0
4	7	1 e 2	Asfaltisti, fornaciari, ceramisti, vetrai, ecc.	20	27	28,1	40,8
4	8	1 e 2	Muratori, imbianchini, manovali, braccianti, ecc.	961	1.106	69,1	81,7
4	9	1 e 2	Addetti all'industria tessile e a manifatture tessili	31	27	31,0	29,8
4	10	1 e 2	Addetti all'industria del vestiario e all'arredamento	44	47	22,2	25,9
4	11	1 e 2	Addetti alle industrie chimiche e manifattura tabacchi	17	15	121,4	98,7
4	12	1 e 2	Addetti alle industrie poligrafiche e della carta	29	31	48,8	49,0
4	13	0	Operai non specificati	398	360	76,3	81,9
5	1	0	Cocchieri, carrettieri, ecc.	224	200	86,3	84,9
5	2	0	Ferrovieri, tramvieri, conduttori di automobili, addetti ai trasporti aerei	206	262	107,3	127,7
5	3	0	Marinai, barcaioi, pescatori, ecc.	77	82	46,7	56,1
6	1	1 e 2	Addetti alla cura e alla acconciatura della persona	30	35	24,3	27,6
6	2 e 3	0	Addetti ai servizi domestici, garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici	109	146	39,9	48,5
6	4	1	Facchini, spazzini, cantonieri	100	108	47,9	49,2
6	4	2	Venditori ambulanti, saltimbanchi, venturieri	66	98	41,5	59,0
7	1	0	Personale subalterno dello Stato e di altri Enti pubblici	43	29	50,6	33,2
8	1 e 2	0	Esercito, marina, aeronautica, guardie di finanza e milizia (esclusi gli Ufficiali)	192	249	189,3	244,6
8	3	0	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici (esclusi gli Ufficiali)	18	29	45,9	79,7
9	1	1 e 2	Culto cattolico e altri culti	28	20	18,1	12,5
9	2	1	Insegnanti	20	14	34,3	26,1
9	2 e 4	2	Professioni liberali e arti belle	69	74	28,0	29,4
9	3	0	Arti sanitarie	20	23	21,9	22,2
10	1-2-3	1 e 2	Ufficiali delle forze armate di terra, di mare e d'aria	60	61	182,9	190,0
10	4	0	Impiegati pubblici e privati	156	168	28,3	31,1
10	5	0	Pensionati	161	199	11,0	11,6
11	1	0	Proprietari e benestanti	113	131	12,5	12,9
12	1	0	Studenti	86	115	78,0	94,3
12 e 0	3 e 4	1 e 5	Disoccupati, invalidi, ricoverati, mendicanti, professione ignota	199	284	15,4	13,6
IN COMPLESSO				7.964	8.624	37,1	39,4

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Nomenclatura professionale* - III Edizione - Roma, Tipografia I. Failli, 1937-XV. — (b) Esclusi i decessi per causa violenta, la cui natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. — (c) Escluse le morti per cause non determinate (classe XVIII) del nuovo Elenco nosologico adottato dal 1931.

È da notare la frequenza, in tutti e tre gli anni, delle morti per inalazione di ossido di carbonio, di gas irrespirabili o tossici non specificati, per avvelenamento da alimenti guasti e da funghi, da sostanze medicinali, quali i sali di chinina, i sali o preparati di mercurio e di rame e quella per sostanze largamente adoperate per uso domestico, come l'acido cloridrico, la soda e la potassa. Le sostanze e i preparati medicinali ad azione ipnotica (morfina, oppio, ecc.) non danno, invece, un numero elevato di morti *accidentali per avvelenamento*.

Professioni. — Per calcolare correttamente i quozienti di mortalità per *causa violenta accidentale* in ciascuna categoria professionale, si dovrebbe mettere in rapporto il numero dei morti per detta causa, distinti secondo la professione, al numero totale dei viventi della stessa categoria professionale ma, dati i criteri diversi coi quali sono classificati secondo le singole professioni tanto i viventi censiti quanto i morti in ciascun anno, non è possibile istituire tale rapporto.

In mancanza di tali quozienti, e con ogni riserva nei riguardi del diverso grado di esposizione al rischio degli appartenenti alle varie categorie professionali, si può avere un'idea delle pericolosità di una data professione, in maniera molto meno corretta, cercando di conoscere quanti morti per *causa violenta accidentale* vi siano in una data categoria professionale su 1000 morti per ogni causa, della stessa categoria professionale.

Nel prospetto 64 sono riportate le dette proporzioni per i maschi, in età da 15 anni in poi, morti nel Regno per *causa violenta accidentale*, dalle quali appare che gli infortuni mortali sono stati, nel 1937, molto frequenti nei sottufficiali e soldati di terra, di mare e d'aria, compresa la Regia Guardia di Finanza e le varie Milizie; negli Ufficiali delle forze armate di terra, di mare e d'aria; nei minatori e cavaatori; nei ferrovieri, tramvieri, conduttori di automobili, addetti ai trasporti aerei; negli addetti alle industrie chimiche e manifatture dei tabacchi; negli studenti; nei cocchieri e carrettieri; nei metallurgici, meccanici, elettricisti; negli operai non specificati; nei muratori, imbianchini, manovali, braccianti, ecc. Un andamento quasi analogo si è verificato anche negli anni precedenti.

A complemento delle notizie già date, circa la mortalità per *causa violenta accidentale*, aggiungiamo che essa, negli anni dal 1931 al 1937, è stata, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, superiore a quella degli altri Comuni.

§ 3. — Avvelenamenti cronici e intossicazioni. — Giova ricordare che tra le morti per malattie ordinarie sono comprese, a partire dall'anno 1924, anche quelle causate da *avvelenamento cronico* da *sostanze minerali* e da *sostanze organiche* (escluso l'*alcoolismo cronico*).

PROSPETTO 65. — Morti per avvelenamento cronico e intossicazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSELOGICO	AVVELENAMENTO CRONICO	1926-31 (Media annua)		1932		1933		1934		1935		1936		1937	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
		76	Da sostanze organ. (escluso l'alcoolismo cronico) . .	8	7	21	3	3	5	3	5	11	3	9	5
77	Da sostanze minerali . .	33	1	30	—	29	2	20	1	45	2	20	2	33	1

Per l'importanza che può avere una conoscenza più profonda della frequenza degli *avvelenamenti cronici* e delle caratteristiche che li accompagnano, si è ritenuto opportuno approfondirne l'esame, ed, a cominciare dall'anno 1926, essi sono stati classificati anche secondo l'età, la professione o condizione dei morti e la natura della sostanza tossica.

Dal prospetto 65 risulta la frequenza degli *avvelenamenti cronici*, per il sessennio 1926-31 e per gli anni dal 1932 al 1937.

Gli *avvelenamenti cronici* da *sostanze minerali*, che furono in numero di 34, come media annua nel periodo 1926-31, sono discesi a 21 nel 1934 e saliti notevolmente nel 1935 (47 casi). Nel 1936 e 1937 i casi registrati furono, rispettivamente, 22 e 34.

In quanto all'età, la maggiore frequenza assoluta dei morti per *avvelenamento cronico da sostanze minerali* appare negli anni dal 1935 al 1937, in genere, al disopra dei 39 anni, il che è facilmente spiegabile con la natura delle lesioni determinate dagli avvelenamenti per piombo, che sono compatibili con la vita, quando esse si siano limitate ad organi non vitali e cessi l'esposizione all'avvelenamento (prospetto 66).

Il piombo risulta come causa prevalente degli *avvelenamenti cronici* mortali e questi sono quasi in totalità imputabili a cause professionali.

PROSPETTO 66. — Morti per avvelenamento cronico da sostanze minerali, secondo l'età alla morte, la natura del veleno ed il sesso (*).

ETÀ ALLA MORTE (a)	1935				1936						1937																																						
	Piombo		Anidride solforosa		Piombo		Anidride solforosa		Arseno Benzolo		Piombo		Mercurio		Sostanze non specificate																																		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F																																	
Da 15 a 19 anni	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">} Totale</td> <td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>di cui indicati come profess.</td> <td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> </table>																} Totale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	di cui indicati come profess.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
} Totale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
	di cui indicati come profess.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																																	
» 25 » 29 »	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">} Totale</td> <td>3</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>di cui indicati come profess.</td> <td>3</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> </table>																} Totale	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	di cui indicati come profess.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
} Totale	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—																																		
	di cui indicati come profess.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—																																		
» 30 » 39 »	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">} Totale</td> <td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>di cui indicati come profess.</td> <td>1</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> </table>																} Totale	1	2	1	—	2	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	di cui indicati come profess.	1	—	1	—	2	—	—	—	—	5	1	—	—	—		
} Totale	1	2	1	—	2	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—																																		
	di cui indicati come profess.	1	—	1	—	2	—	—	—	—	5	1	—	—	—																																		
» 40 » 49 »	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">} Totale</td> <td>10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>4</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>di cui indicati come profess.</td> <td>9</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>4</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> </table>																} Totale	10	—	—	—	4	—	1	—	—	—	10	—	—	—	—	di cui indicati come profess.	9	—	—	—	4	—	1	—	—	10	—	—	—	—		
} Totale	10	—	—	—	4	—	1	—	—	—	10	—	—	—	—																																		
	di cui indicati come profess.	9	—	—	—	4	—	1	—	—	10	—	—	—	—																																		
» 50 » 59 »	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">} Totale</td> <td>12</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>6</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>di cui indicati come profess.</td> <td>12</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> </table>																} Totale	12	—	—	—	6	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	di cui indicati come profess.	12	—	—	—	5	1	—	—	—	5	—	—	—	—		
} Totale	12	—	—	—	6	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—																																		
	di cui indicati come profess.	12	—	—	—	5	1	—	—	—	5	—	—	—	—																																		
» 60 » 69 »	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">} Totale</td> <td>12</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>8</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>di cui indicati come profess.</td> <td>11</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td> </tr> </table>																} Totale	12	—	—	—	5	—	—	—	—	—	8	—	1	—	1	di cui indicati come profess.	11	—	—	—	5	—	—	—	—	8	—	—	—	1		
} Totale	12	—	—	—	5	—	—	—	—	—	8	—	1	—	1																																		
	di cui indicati come profess.	11	—	—	—	5	—	—	—	—	8	—	—	—	1																																		
» 70-00.....	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">} Totale</td> <td>6</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> <tr> <td>di cui indicati come profess.</td> <td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td> </tr> </table>																} Totale	6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	di cui indicati come profess.	5	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
} Totale	6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—																																		
	di cui indicati come profess.	5	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—																																		
In complesso...	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">} Totale</td> <td>44</td><td>2</td><td>1</td><td>—</td><td>19</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td><td>31</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>di cui indicati come profess.</td> <td>41</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td><td>18</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>31</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>1</td> </tr> </table>																} Totale	44	2	1	—	19	1	1	—	—	1	31	1	1	—	1	di cui indicati come profess.	41	—	1	—	18	1	1	—	—	31	1	—	—	1		
} Totale	44	2	1	—	19	1	1	—	—	1	31	1	1	—	1																																		
	di cui indicati come profess.	41	—	1	—	18	1	1	—	—	31	1	—	—	1																																		

(*) Sono state indicate tutte le sostanze che erano specificate nelle schede di morte.

(a) Nel gruppo di età da 20 a 24 anni, non si verificò alcun caso di morte.

Il numero dei morti per *avvelenamento cronico da sostanze organiche* che fu, in media, di 15 nel sessennio 1926-31 è sensibilmente aumentato nel 1932 e diminuito notevolmente nel 1933 e 1934; è risalito nel 1935 e 1936 (14 casi) rispetto agli ultimi due anni e nel 1937 ha raggiunto il numero di 18 casi.

Gli *avvelenamenti cronici da sostanze organiche* si riscontrano, generalmente, dopo il 20° o il 30° anno di età e diventano più frequenti dopo il 40° anno, presumibilmente in rapporto alla lentezza con cui queste sostanze determinano nell'organismo umano alterazioni tali da condurre a morte e alla maggior frequenza con la quale nelle età avanzate si verificano malattie a lungo decorso, che inducono gli ammalati all'uso dell'oppio e dei suoi derivati. Rari sono gli *avvelenamenti da sostanze organiche* provocati da cause professionali e nel quadriennio 1934-37 ne sono registrati tre casi, dovuti a benzolo, in una femmina nel gruppo di età da 20 a 24 anni, ed in due maschi nei gruppi di età da 15 a 19 e da 40 a 44 anni. L'avvelenamento più frequente è dovuto alla morfina (prospetto 67).

PROSPETTO 67. — **Morti per avvelenamento cronico da sostanze organiche, secondo la natura del veleno ed il sesso.**

ANNI	SOSTANZE										IN COMPLESSO			
	Morfina		Eroina		Nicotina		Benzolo		Oppio		Sostanze ipnotiche barbituriche		M	F
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
1934.....	2	3	1	—	—	—	—	(a) 1	—	—	—	1	3	5
1935.....	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3
1936.....	3	4	1	—	3	—	(a) 2	—	—	1	—	—	9	5
1937.....	7	7	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	10	8

(a) Indicati come professionali.

Gli *avvelenamenti cronici da sostanze minerali* (prospetto 68) sono rari nel sesso femminile: prevale il saturnismo che è l'avvelenamento professionale classico degli operai e specie di alcune categorie (verniciatori, tipografi, vasai, ecc.).

PROSPETTO 68. — **Morti per avvelenamento cronico da sostanze minerali, secondo il sesso e la professione o condizione.**

PROFESSIONE O CONDIZIONE	1935		1936		1937		PROFESSIONE O CONDIZIONE	1935		1936		1937	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Contadini	1	1	2	—	2	—	Meccanici	2	—	—	—	—	—
Commercianti	1	—	1	—	—	—	Elettricisti, ramai, stagnini	—	—	—	—	—	3
Magazzinieri e mediatori.	—	—	1	—	—	—	Lastricatori	—	—	—	—	—	1
Salumieri	1	—	—	—	—	—	Calzolai	—	—	1	—	—	—
Minatori	1	—	—	—	—	—	Cassisti	—	—	2	—	—	—
Braccianti	1	—	—	—	—	—	Falegnami	—	—	1	—	—	—
Fonditori	—	—	—	—	1	—	Operai non specificati	1	—	2	—	—	1
Verniciatori, calafati	10	—	—	—	5	—	Ferrovieri	—	—	1	—	—	—
Operai chimici	1	—	—	—	—	—	Autisti, fuochisti	—	—	—	—	—	2
Vasai, ceramisti e stoviglieri	5	—	3	—	4	1	Facchini	—	—	—	—	—	1
Tipografi	10	—	2	—	6	—	Sacerdoti	(b) 1	—	—	—	—	—
Pittori di stanze e decoratori	5	—	3	—	—	—	Pittori	2	—	1	—	—	2
Imbianchini, fontanieri	—	—	—	—	3	—	Pensionati	2	—	—	—	—	2
							Inabili e ricoverati	1	—	—	—	—	—
							Casalinghe	—	1	—	2	—	—
							IN COMPLESSO	45	2	20	2	33	1

(b) Era anche tipografo.

Lo scarso numero di casi per *avvelenamento cronico da sostanze organiche* non può dar luogo a nessuna considerazione.

PROSPETTO 69. — Morti per avvelenamento cronico da sostanze organiche, secondo il sesso e la professione o condizione.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	1935		1936		1937		PROFESSIONE O CONDIZIONE	1935		1936		1937	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Contadini	1	—	4	—	—	—	Barbieri	—	—	—	—	1	—
Industriali e commercianti	—	—	1	—	—	—	Architetti	1	—	—	—	—	—
Negozianti	2	—	—	—	—	—	Medici	1	—	—	—	—	—
Magazzinieri	—	—	1	—	—	—	Avvocati	—	—	—	—	2	—
Trattori	—	—	—	—	1	—	Pubblicisti	—	—	1	—	—	—
Fornai	1	—	—	—	—	—	Insegnanti	—	—	—	—	1	—
Braccianti	1	—	—	—	—	—	Monache	—	1	—	—	—	—
Calzolari	—	—	1	—	—	—	Impiegati	—	—	1	1	—	—
Elettricisti, ramai, stag- gnini	—	—	—	—	1	—	Pensionati	1	1	—	—	2	—
Operai non specificati	1	—	—	—	—	—	Proprietari e benestanti	1	—	—	1	—	—
Carrettieri	1	—	—	—	—	—	Ricoverati, invalidi	—	—	—	—	1	2
							Casalinghe	—	1	—	3	—	6
							IN COMPLESSO	11	3	9	5	(a) 9	8

(a) Non compreso il bambino di tre anni deceduto per anemia da intossicazione benzolica.

§ 4. - **Omicidi e infanticidi.** — Dal prospetto 70 si rileva che la mortalità per *omicidio ed infanticidio* (1), per tutti gli anni del periodo preso in esame, ad eccezione del quadriennio 1920-23, si è mantenuta uguale o al disotto del numero indice base, toccando i minimi nel 1935 (39) e nel 1937 (37).

PROSPETTO 70. — Morti per omicidio e infanticidio dal 1887 al 1937.

ANNI	OMICIDI E INFANTICIDI	PER 1.000.000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)	ANNI	OMICIDI E INFANTICIDI	PER 1.000.000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (*)	1.473	49	100	1921	2.750	75	153
1892-96 (*)	1.515	49	100	1922	2.459	67	137
1897-901 (*)	1.446	45	92	1923	1.851	50	102
1902-06 (*)	1.342	41	84	1924	1.786	46	94
1907	1.283	38	78	1925	1.767	45	92
1908	1.528	45	92	1926	1.252	32	65
1909	1.375	40	82	1927	1.141	29	59
1910	1.158	34	69	1928	989	25	51
1911	1.090	31	63	1929	967	24	49
1912	1.113	32	65	1930	1.099	27	55
1913	1.215	34	69	1931	1.077	26	53
1914	1.360	38	78	1932	1.042	25	51
1915	1.290	35	71	1933	969	23	47
1916	947	26	53	1934	849	20	41
1917	1.060	30	61	1935	821	19	39
1918	983	28	57	1936	861	20	41
1919	1.633	45	92	1937	769	18	37
1920	2.661	73	149				

(1) Cfr. la nota (*) a pag. 76*.
(*) Media annuale.

PROSPETTO 71. — **Mortalità per omicidio e infanticidio.**
(medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	2,7	1,8	4,2	1,8	1,4	65	153	68	53	68	55	59	71	76	
Liguria	2,2	2,6	5,1	1,6	1,1	118	233	74	50	55	80	73	62	57	
Lombardia	1,4	1,3	4,2	1,4	1,0	91	296	102	67	36	40	60	56	50	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	46	
Veneto	1,1	1,0	3,3	1,2	0,9	95	299	110	75	28	32	47	46	47	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	116	
Emilia	1,9	1,6	6,6	1,7	1,0	84	352	90	53	47	49	93	64	53	
Toscana	2,4	1,7	5,7	1,5	0,9	72	242	64	37	59	52	80	57	45	
Marche	3,2	1,5	4,6	1,7	1,1	45	143	52	34	81	45	66	65	58	
Umbria	2,8	2,5	4,8	2,1	1,6	88	169	73	55	71	78	68	79	82	
Lazio	6,5	4,9	8,1	2,8	1,6	76	125	42	25	162	153	115	105	87	
Abruzzi e Molise	5,5	3,5	4,9	3,8	2,3	64	88	70	42	138	109	69	148	123	
Campania	7,0	5,1	7,3	4,3	3,1	73	104	61	45	175	158	103	163	166	
Puglie	5,3	3,5	6,4	2,7	2,2	67	121	51	41	132	110	90	103	114	
Lucania	5,6	5,3	7,5	6,1	4,3	95	132	108	76	141	165	106	234	226	
Calabrie	8,0	6,7	10,6	7,3	5,6	84	133	92	70	200	207	150	281	295	
Sicilia	7,8	7,9	19,6	3,7	2,8	102	251	47	35	195	245	277	140	145	
Sardegna	4,8	4,7	4,4	5,1	4,5	97	92	105	93	121	145	63	195	236	
REGNO { vecchi confini	4,0	3,2	7,1			81	177	66	47	100	100	100			
REGNO { attuali confini				2,6	1,9								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Nel prospetto 71, in analogia a quanto è stato fatto per le altre principali cause di morte, è data la mortalità per *omicidio* e *infanticidio* in ciascun Compartimento e nel Regno, durante i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22, 1930-32 e 1935-37.

Nel 1935-37, nel Regno, nei vecchi confini, la mortalità è diminuita del 53 % ed anche nei singoli Compartimenti essa è diminuita, con un minimo del 7 % nella Sardegna ed un massimo del 75 % nel Lazio, a confronto del periodo base 1900-02. Nel triennio 1935-37 hanno superato la mortalità media del Regno, in ordine decrescente, i seguenti Compartimenti: Calabrie, Sardegna, Lucania, Campania, Venezia Giulia e Zara, Sicilia, Abruzzi e Molise e Puglie, cioè tutti i Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare ed un Compartimento dell'Italia Settentrionale.

Nel prospetto seguente diamo, per gli anni 1935, 1936 e 1937, il numero dei morti per *omicidio* e *infanticidio*, classificati secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione, escludendo i morti in conflitto con la forza pubblica.

Nell'anno 1937, fra i 766 (b) individui uccisi, 549 erano maschi e 217 femmine, e cioè, per ogni 100 omicidi si contarono 72 maschi e 28 femmine; nel 1936 la proporzione per sesso è risultata di 73 maschi e 27 femmine.

Le armi da fuoco, da punta o da taglio e quelle contundenti sono i mezzi più frequenti coi quali, sia nei maschi sia nelle femmine, fu procurata la morte dei colpiti, durante il suddetto triennio.

(b) Esclusi 3 omicidi avvenuti in conflitto con la forza pubblica.

PROSPETTO 72. — Morti per omicidio e infanticidio, secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione (*).

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	1935			1936			1937		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
Arma da fuoco	283	73	356	291	84	375	251	83	334
Arma da punta e da taglio	193	80	273	179	71	250	166	46	212
Arma o corpo contundente	92	21	113	93	32	125	76	30	106
Ustioni	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Assideramento	—	1	1	—	1	1	2	1	3
Abbandono sulla pubbl. strada	1	1	2	1	—	1	—	—	—
Annegamento	7	7	14	8	5	13	2	8	10
Precipitazione o caduta	8	—	8	9	—	9	9	4	13
Schiacciamento	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Avvelenamento	(a) 1	(b) 1	2	(c) 2	—	2	(d) 2	(e) 1	3
Strangolamento	14	20	34	26	33	59	23	33	56
Impiccamento	1	—	1	1	2	3	2	1	3
Violenza carnale	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Altri mezzi o modi	2	4	6	2	6	8	7	2	9
Non indicati	6	—	6	11	2	13	8	8	16
IN COMPLESSO	(f) 609	210	(f) 819	(g) 623	236	(g) 859	(h) 549	217	(h) 766

(*) La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni dei medici curanti o necroscopi, non coincide con quella che si ricava da gli atti giudiziari, la quale dà cifre più alte. Ma questa discordanza è inevitabile, stante i momenti diversi ai quali si riportano le due statistiche. Il medico rilascia la sua dichiarazione subito dopo aver constatata la morte e, specialmente quando non si tratta palesemente di un delitto, egli può soltanto dichiarare che la morte è stata determinata da una ferita o da altra lesione o da avvelenamento, ma non può attestare se la lesione o l'avvelenamento siano o no dolosi. Soltanto l'Autorità giudiziaria, spesso dopo lunghe e accurate ricerche, è in grado di riconoscere se la morte sia derivata da omicidio. Si spiega pertanto come i risultati delle due statistiche differiscano specialmente nel numero degli infanticidi e degli omicidi per avvelenamento, per i quali occorrono indagini che occupano molto tempo per scoprire se la causa della morte sia stata accidentale o dolosa.

(a) Avvelenato con caustico non specificato. (b) Avvelenata con acido acetico. (c) Di cui, uno avvelenato con sublimato corrosivo ed uno con sostanza non indicata. (d) Di cui, uno per inalazione di gas illuminante ed uno per ingestione di petrolio. (e) Avvelenata col metol.

(f), (g), (h) Esclusi, rispettivamente, 2, 2 e 3 omicidi avvenuti in conflitto con la forza pubblica.

PROSPETTO 73. — Morti per infanticidio (a), secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione.

MEZZI O MODI DI UCCISIONE	1935			1936			1937		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
Arma da fuoco	—	1	1	1	—	1	—	—	—
Arma da punta o da taglio	2	—	2	—	1	2	—	—	—
Arma o corpo contundente	1	—	1	—	—	—	2	—	2
Assideramento	—	1	1	—	1	1	2	—	2
Abbandono sulla pubbl. strada	1	1	2	1	—	1	—	—	—
Annegamento	3	2	5	1	2	3	—	4	4
Precipitazione o caduta	1	—	1	—	—	—	—	1	1
Avvelenamento	—	(b) 1	1	—	—	—	—	—	—
Strangolamento ed impiccamento	3	3	6	10	10	20	8	9	17
Altri mezzi o modi	1	2	3	1	3	4	4	1	5
Non indicati	2	—	2	4	1	5	3	4	7
IN COMPLESSO	14	11	25	19	18	37	19	19	38

(a) Nel primo anno di vita.

(b) Avvelenata con acido acetico.

Gli *infanticidi* sono stati classificati, separatamente dagli *omicidi*, secondo il sesso e il mezzo o modo di uccisione, per gli anni dal 1935 al 1937, come è indicato nel prospetto 73.

Aggiungiamo, infine, che la mortalità per *omicidio* e *infanticidio*, nel 1937, analogamente a ciò che si è verificato nel 1936, è stata, nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia del Regno, lievemente inferiore a quella degli altri Comuni.

§ 5. - **Notizie sui morti per suicidio.** — *Regno.* Le morti per *suicidio* sono aumentate dal 1887 in poi (vedi prospetto 74). Infatti, il numero indice, da 100 nel periodo base 1887-91 salì costantemente, salvo lievi oscillazioni, a 171 nel 1914. Nel periodo bellico e nel quinquennio dopo guerra, dette morti diminuirono sensibilmente rispetto all'anno 1914, e la diminuzione maggiore si osserva nei due anni 1916 e 1917, nei quali il numero indice discese a 133; ma esse risalirono notevolmente negli anni dal 1924 al 1927, nel quale ultimo anno il numero indice è il più alto fra tutti quelli osservati dal 1887 in poi. Dal 1928 al 1937 notasi nel comportamento della mortalità per *suicidio* un andamento oscillante.

PROSPETTO 74. — Morti per suicidio dal 1887 al 1937.

ANNI	SUICIDI	PER 1.000.000. DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)	ANNI	SUICIDI	PER 1.000.000 DI ABITANTI	NUMERI INDICI (quinquennio 1887-91 = 100)
1887-91 (*)	1.570	52	100	1921	2.885	78	150
1892-96 (*)	1.813	58	112	1922	3.030	83	160
1897-901(*)	2.005	62	119	1923	3.222	87	167
1902-06 (*)	2.157	65	125	1924	3.778	97	187
1907	2.445	73	140	1925	3.674	94	181
1908	2.693	80	154	1926	3.871	98	188
1909	2.969	87	167	1927	4.210	106	204
1910	2.880	84	162	1928	3.903	97	187
1911	2.754	79	152	1929	3.636	90	173
1912	2.986	85	163	1930	3.915	96	185
1913	3.107	88	169	1931	4.141	101	194
1914	3.185	89	171	1932	4.058	97	187
1915	3.092	85	163	1933	3.712	98	169
1916	2.531	69	133	1934	3.686	87	167
1917	2.439	69	133	1935	3.267	76	146
1918	2.642	75	144	1936	3.399	79	152
1919	2.630	73	140	1937	3.291	76	146
1920	2.664	73	140				

(*) Media annuale.

Compartimenti. — Nel prospetto 75, in analogia a quanto è stato fatto per le altre principali cause di morte, è data la mortalità per *suicidio*, in ciascun Compartimento e nel Regno, durante i trienni 1900-02, 1910-12, 1920-22, 1930-32 e 1935-37.

Nel Regno, nei vecchi confini, la mortalità per *suicidio* è stata, nel 1935-37, superiore del 20 % a quella del periodo base 1900-02; anche nei singoli Compartimenti la mortalità è risultata superiore a quella del periodo base, eccettuati le Marche ed il Lazio.

PROSPETTO 75. — Mortalità per suicidio.

(Medie annuali)

COMPARTIMENTI E REGNO	PER 100.000 ABITANTI					NUMERI INDICI									
	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	Triennio 1900-02 = 100				Mortalità del Regno = 100					
						1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	1900- 1902	1910- 1912	1920- 1922	1930- 1932	1935- 1937	
Piemonte	9,3	12,3	11,3	14,5	12,0	132	121	156	129	150	149	146	148	156	
Liguria	8,9	16,0	13,3	14,9	11,7	180	149	167	132	143	193	172	152	152	
Lombardia	6,5	9,3	8,4	10,4	7,8	143	129	160	120	104	112	108	106	101	
Venezia Trid. (a)	—	—	—	12,1	9,6	—	—	—	—	—	—	—	124	124	
Veneto	6,6	8,4	7,6	8,9	7,1	127	115	135	107	106	101	99	91	92	
Venezia G. e Zara (a)	—	—	—	19,6	16,3	—	—	—	—	—	—	—	200	211	
Emilia	9,6	10,9	11,2	15,3	12,3	114	116	159	128	155	132	145	156	160	
Toscana	7,7	9,4	8,7	10,1	8,2	122	112	131	106	124	114	113	103	106	
Marche	7,0	7,3	7,9	9,2	6,4	104	113	131	91	113	88	103	94	83	
Umbria	7,5	8,0	7,1	11,2	8,3	106	95	149	110	121	97	93	115	107	
Lazio	9,7	12,2	10,9	8,5	6,2	126	113	88	65	155	147	142	86	81	
Abruzzi e Moli.e	4,0	4,6	4,3	7,0	5,4	115	108	175	134	64	55	56	71	69	
Campania	3,9	6,0	6,4	6,6	5,0	156	166	169	129	62	73	84	67	65	
Puglie	3,7	4,1	4,4	5,8	4,8	113	119	158	130	59	50	57	59	62	
Lucania	3,0	4,6	5,1	6,1	5,0	153	171	204	166	48	55	66	62	64	
Calabrie	2,1	2,3	2,5	3,7	3,0	107	119	172	143	34	27	33	37	39	
Sicilia	3,6	5,9	4,9	7,0	6,1	167	137	196	170	57	72	63	71	78	
Sardegna	4,8	6,1	4,5	8,4	6,2	129	95	176	129	77	74	59	85	80	
REGNO { vecchi confini	6,2	8,3	7,7			133	124	153	120	100	100	100			
{ attuali confini				9,8	7,7								100	100	

(a) Cfr. la nota (a) a pag. 5*.

Nel 1935-37 ha segnato il massimo della mortalità la Venezia Giulia e Zara ed il minimo le Calabrie; la Toscana, l'Umbria e tutti i Compartimenti dell'Italia Settentrionale, tranne il Veneto, hanno segnato una mortalità superiore a quella media del Regno.

Età e sesso. — Esaminando i quozienti specifici di mortalità per età e sesso (prospetto 76) si rileva che la mortalità complessiva per *suicidio*, nei cinque periodi considerati, è molto più grande nei maschi che nelle femmine; e ciò si verifica, salvo un'eccezione nel 1920-22 nell'età da 15 a 19 anni, in tutti i gruppi di età.

I quozienti di mortalità nei maschi si può dire che crescano col crescere delle età. È da osservare, però, che, nei primi tre trienni considerati, la mortalità nel gruppo 20-29 è superiore a quella del gruppo immediatamente successivo. Nelle femmine non si può dire che si abbia un aumento della mortalità col crescere dell'età: si nota soltanto che, nel gruppo di età 20-29, generalmente, il quoziente è alto.

L'andamento, nel tempo, della mortalità complessiva per *suicidio*, nei primi quattro trienni considerati, sia nei maschi che nelle femmine, risulta crescente (salvo una diminuzione nel triennio 1920-22 in confronto al triennio 1910-12), in modo, però, più accentuato per le femmine; nel triennio 1935-37 invece si nota una sensibile diminuzione di mortalità a confronto del 1930-32. Nei singoli gruppi di età, tanto nei maschi quanto nelle femmine, e salvo eccezioni, si osserva un comportamento analogo a quello ora detto.

PROSPETTO 76. — Quozienti specifici di mortalità per suicidio in età da 15 anni in poi.

(Cifre proporzionali a 100.000 abitanti censiti della stessa età e sesso)

GRUPPI DI ETÀ	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
15-19 anni	6,8	2,9	4,8	8,0	7,7	7,9	6,4	6,5	6,5	6,3	5,9	6,1	4,3	4,1	4,2
20-29 »	14,5	4,1	9,2	19,5	8,5	13,7	17,0	8,3	12,5	14,4	7,2	10,8	10,8	5,6	8,2
30-39 »	11,9	3,6	7,6	16,3	5,4	10,6	13,7	5,2	9,2	17,0	5,5	10,8	12,8	5,0	8,8
40-49 »	16,7	3,7	10,1	18,5	5,3	11,7	16,0	4,7	10,3	26,7	6,5	15,8	18,1	6,1	11,6
50-59 »	19,8	4,2	11,9	24,5	5,8	15,0	22,0	5,2	13,6	37,8	7,4	22,1	26,7	6,7	16,2
60-69 »	21,9	4,3	12,9	24,6	5,4	14,9	23,1	4,9	13,8	35,8	6,7	20,8	29,2	6,4	17,3
70-79 »	20,8	5,8	13,2	26,6	5,3	15,8	25,2	5,3	15,1	36,5	7,6	21,4	35,9	6,7	20,5
80-∞	18,9	1,3	9,8	28,7	5,4	16,6	29,8	4,3	16,2	38,3	10,3	23,0	35,1	6,4	19,1
Totale (a)	15,1	3,9	9,4	18,8	6,5	12,4	16,5	6,0	11,1	21,8	6,6	13,9	16,8	5,7	11,1

(a) Compresa l'età ignota.

Sesso e stato civile. — Dal prospetto 77 si rileva che la mortalità complessiva per suicidio, nel 1935-37 a confronto del triennio 1900-02, è aumentata in misura maggiore nelle femmine, 46 % a confronto dei maschi 11 %. Tale andamento, ancora più accentuato, si osserva nelle nubili, la cui mortalità, è aumentata del 52 %, mentre nei celibi si è avuta una diminuzione dell'11 %. Invece, i vedovi mostrano un aumento maggiore negli uomini a confronto delle donne, e cioè il 56 % nei vedovi e il 52 % nelle vedove.

La mortalità dei maschi, nei primi tre periodi considerati, è più elevata nei vedovi, ai quali seguono, i celibi; ciò che non si verifica nel 1930-32 e 1935-37 in cui ai vedovi seguono i coniugati.

La mortalità delle femmine, nei trienni 1910-12 e 1920-22, è più elevata nelle nubili, alle quali seguono le vedove e le coniugate; mentre nei trienni 1900-02, 1930-1932 e 1935-37 si trovano al primo posto le vedove, seguite dalle nubili e dalle coniugate.

PROSPETTO 77. — Quozienti specifici di mortalità per suicidio in età da 15 anni in poi.

(Cifre proporzionali a 100.000 censiti da 15 anni in poi, dello stesso sesso e stato civile)

STATO CIVILE	1900-02			1910-12			1920-22			1930-32			1935-37		
	medie annuali														
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Celibi e nubili	16,8	4,6	11,3	21,6	9,8	15,9	17,6	8,3	13,1	19,1	8,1	13,8	15,0	7,0	11,2
Coniugati	11,5	3,0	7,2	14,1	4,4	9,1	12,1	4,1	8,1	20,3	5,0	12,5	15,5	4,5	9,9
Vedovi	27,6	4,8	11,8	35,5	6,4	15,2	35,3	6,2	14,9	54,8	9,1	21,6	43,0	7,3	17,0
Totale (a)	15,1	3,9	9,4	18,8	6,5	12,4	16,5	6,0	11,1	21,8	6,6	13,9	16,8	5,7	11,1

(a) Compresi lo stato civile ignoto e l'età ignota.

Mezzi o modi di suicidio. — Rispetto ai mezzi o modi adoperati per togliersi la vita, distinguiamo i *suicidi* in nove categorie.

PROSPETTO 78. — **Suicidi, secondo i mezzi o modi adoperati e il sesso.**

M E Z Z I O MODI DEL SUICIDIO	SUICIDI (*)									% DEL TOTALE					
	1935			1936			1937			1935		1936		1937	
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M	F	M	F
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive	157	161	318	149	163	312	122	159	281	66,0	181,3	59,1	185,4	50,4	182,5
Per assorbimento di gas tossici	58	27	85	60	34	94	58	33	91	24,4	30,4	23,8	38,7	24,0	37,9
Per impiccamento o strangolamento	708	195	903	746	192	938	759	181	940	297,6	219,6	296,0	218,4	313,6	207,8
Per annegamento	357	224	581	419	247	666	385	242	627	150,1	252,3	166,3	281,0	159,1	277,8
Con arma da fuoco	597	44	641	602	39	641	549	42	591	250,9	49,5	238,9	44,4	226,9	48,2
Con arma da punta o da taglio	105	17	122	130	28	158	117	27	144	44,1	19,1	51,6	31,9	48,3	31,0
Per precipitazione dall'alto	248	163	411	229	132	361	254	136	390	104,2	183,6	90,9	150,2	105,0	156,1
Per schiacciamento	134	49	183	168	39	207	161	45	206	56,3	55,2	66,7	44,4	66,5	51,7
Con altri mezzi o con mezzi non determinati	15	8	23	17	5	22	15	6	21	6,3	9,0	6,7	5,7	6,2	6,9
IN COMPLESSO	2379	888	3267	2.520	879	3.399	2.420	871	3.291	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

(*) Fra i suicidi degli anni 1935, 1936 e 1937 sono compresi, rispettivamente, 40 (maschi 23 e femmine 17), 66 (maschi 37 e femmine 29) e 38 (maschi 27 e femmine 11), compiuti in istato di malattia per *psicopatia e sindromi nevrotiche*.

Si nota che, in tutti e tre gli anni presi in esame, per i maschi, predominano i *suicidi* per impiccamento o strangolamento, con arma da fuoco e per annegamento; per le femmine, invece, predominano i *suicidi* per annegamento, mentre quelli per arma da fuoco hanno una non notevole frequenza.

Sostanze che determinarono gli avvelenamenti. — Anche per le morti dovute ad *avvelenamento acuto* volontario, si è fatta un'indagine particolareggiata circa le sostanze che produssero la morte, ed i relativi dati sono riportati nel prospetto 79 per gli anni dal 1935 al 1937.

I veleni maggiormente usati, nel 1937, sono, in ordine decrescente: l'ossido di carbonio, il mercurio, il veronal, l'acido cloridrico, la soda e potassa, il solfato ed altri sali di rame, l'acido solforico, ecc.; nel triennio 1934-36 si nota, all'incirca, lo stesso andamento.

Ciò, probabilmente, è in rapporto con la maggiore facilità con la quale tali mezzi si possono avere a disposizione.

È da notare che mentre, come si è visto, sono piuttosto rare le *morti accidentali* dovute ad avvelenamento per sostanze o preparati medicinali ad azione ipno-

tica, sono molto frequenti le morti per *suicidio* dovute a tali sostanze, il che farebbe supporre che in molti casi può trattarsi di individui ammalati, i quali in un momento di sconforto, hanno voluto porre termine alle loro sofferenze.

PROSPETTO 79. — Suicidio per avvelenamento acuto (*), classificati per sesso e secondo la sostanza.

SOSTANZE (a)	1935		1936		1937		SOSTANZE (a)	1935		1936		1937	
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
Acido acetico	—	1	—	3	—	—	Mercurio :						
» cianidrico	2	—	—	3	1	1	<i>sublimato corrosivo</i> . . .	29	29	17	27	20	17
» cloridrico	12	15	22	13	17	15	<i>altri sali</i>	1	3	—	2	1	2
» fenico	6	4	6	7	5	2	Morfina	1	—	1	—	1	1
» nitrico	2	—	1	—	1	—	Nicotina	—	1	1	—	1	1
» solforico	10	12	6	10	9	11	Nitrato di argento	—	1	—	—	—	—
Ammoniaca	—	2	—	1	—	1	Oppio	1	—	—	1	1	—
Arsenico e suoi preparati	6	3	4	6	6	5	Ossido di carbonio :						
Alcool denaturato	—	1	1	—	—	—	<i>ossido di carbonio senza</i>						
Atropina e belladonna . . .	—	1	—	—	—	—	<i>altra indicazione . . .</i>	25	13	25	13	22	10
Bicromato potassico	—	—	3	—	1	—	<i>braciere di carbone o</i>						
Chinina (sali di)	2	5	1	4	—	3	<i>stufa</i>	1	—	1	4	2	1
Cloroformio	1	—	1	—	—	—	<i>gas illuminante</i>	27	13	31	17	30	21
Creolina	—	—	1	2	1	3	Permanganato potassico . .	—	2	—	—	—	—
Dial	—	3	—	—	1	—	Petrolio	1	—	—	—	—	—
Digitale	1	1	—	1	—	—	Salicilato di metile	—	1	—	—	—	—
Etere solforica	—	—	—	—	1	—	Sedival	—	—	1	—	—	1
Fernet	1	—	—	—	—	—	Soda e potassa	18	25	17	36	7	25
Fosforo	—	1	1	—	—	—	Solfato ed altri sali di						
Gardenal	—	—	—	—	—	1	<i>rame</i>	5	9	13	9	6	18
Gas irrespirabili o tossici							Solfuro di carbonio	—	—	1	—	—	—
(non specificati)	5	1	3	—	4	1	Sommifen « Roche »	—	—	—	—	—	1
Guaiaacolo	—	—	1	—	—	—	Stricnina	12	3	4	2	7	5
Idrochinone	—	—	—	1	—	—	Strofanto	—	—	—	—	1	—
Infuso di foglie di olean-							Veronal	24	19	22	10	13	22
dro	—	1	—	—	—	—	Zinco :						
Ingestione di più sostanze							<i>fosforo di zinco</i>	1	2	2	3	2	5
velenose	1	—	—	—	1	—	<i>solfo di zinco</i>	—	—	—	2	—	—
Insulina	—	1	—	—	—	—	Veleni non specificati :						
Iodio	—	2	2	4	—	—	<i>sostanze varie non ben</i>						
Ipnotici barbiturici non							<i>precisate</i>	8	2	3	2	4	5
specificati	3	2	5	2	2	5	<i>sostanze non indicate . .</i>	8	6	9	7	6	5
Ipnotici non specificati . .	—	2	2	4	5	2	In complesso	215	188	209	197	180	192
Lysiformio	—	—	—	1	—	—							
Luminal	1	1	1	—	1	2							

(*) Comprese le morti da gas irrespirabili.

(a) Sono state indicate tutte le sostanze che erano specificate nelle schede di morte.

Mesi in cui avvennero i suicidi. — Dal prospetto 80 si rileva che il maggior numero dei *suicidi* si nota, di solito, nella primavera e nell'estate, il minore, nell'autunno e nell'inverno.

PROSPETTO 80. — Suicidi secondo il mese in cui avvennero.

MESI	SUICIDI			MEDIA GIORNA- LIERA	NUMERI INDICI	MEDIA GIORNA- LIERA	NUMERI INDICI	MEDIA GIORNA- LIERA	NUMERI INDICI
	1935	1936	1937	1935		1936		1937	
Gennaio	234	252	230	7,55	84	8,13	88	7,42	82
Febbraio	216	213	220	7,71	86	7,34	79	7,86	87
Marzo	308	298	332	9,94	111	9,61	103	10,71	119
Aprile	304	326	310	10,13	113	10,87	117	10,33	115
Maggio	336	352	401	10,84	121	11,35	122	12,94	143
Giugno	376	344	380	12,53	140	11,47	123	12,67	140
Luglio	350	391	303	11,29	126	12,61	136	9,77	108
Agosto	272	315	273	8,77	98	10,16	109	8,81	98
Settembre	238	234	234	7,93	89	7,80	84	7,80	86
Ottobre	239	234	213	7,71	86	7,55	81	6,87	76
Novembre	204	220	188	6,80	76	7,33	79	6,27	70
Dicembre	190	220	207	6,13	68	7,10	76	6,68	74
ANNO	3.267	3.399	3.291	8,95	100	9,29	100	9,02	100

Professioni. — Le cifre del prospetto 81 non possono dare un corretto criterio per giudicare sulla influenza della professione nella frequenza dei *suicidi*. Come è stato già detto, a proposito della mortalità per *cause accidentali*, i quozienti di mortalità per ciascuna categoria professionale, si dovrebbero calcolare mettendo in rapporto il numero totale dei morti, distinti secondo la professione, al totale dei viventi della stessa categoria professionale, ma, dati i criteri diversi coi quali sono classificati secondo le singole professioni tanto i viventi censiti quanto i morti in ciascun anno, non è possibile istituire tale rapporto.

Pertanto, in mancanza degli elementi necessari per il calcolo, si espone, nel citato prospetto, il per mille che i morti per *suicidio*, di una data classe professionale, rappresentano sul totale dei morti per ogni causa della stessa classe professionale.

Infine, a complemento delle notizie già date circa la mortalità per *suicidio*, aggiungiamo che essa, nel 1937, come nel quinquennio 1932-36, è stata maggiore nel complesso dei Comuni capiluoghi di Provincia in confronto a quella del complesso degli altri Comuni; e che fra i Comuni aventi una popolazione residente superiore a 100 000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, raggiunge il massimo in Trieste (2,2 su 10 000 abitanti) e il minimo in Reggio di Calabria (0,1).

PROSPETTO 81. — Maschi morti per suicidio in età da 15 anni in poi, secondo la professione o condizione.

CLASSE (a)	CATEGORIA (a)	SOTTO-CATEGORIA (a)	PROFESSIONE O CONDIZIONE	SUICIDI		CIFRE PROPORZIONALI A 1000 MASCHI MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI E DELLA STESSA PROFESSIONE (b)	
				1936	1937	1936	1937
1	1	1 e 2	Agricoltori di ogni specie	859	815	9,2	9,2
2	1	0	Industriali, commercianti	93	92	15,8	15,7
3	1	0	Venditori di derrate alimentari, merci varie e non specificate	64	63	20,2	20,2
3	2	0	Esercenti	18	20	16,8	19,2
3	3	0	Commissionari, rappresentanti	32	25	17,6	13,7
4	1	0	Minatori e cavatori	11	10	10,5	9,8
4	2	0	Falegnami, verniciatori, ecc.	78	73	14,3	14,5
4	3	1-2-3-4	Addetti alla macellazione e conservazione delle carni, ai forni, ai pastifici, alla lavorazione del latte e alle industrie alimentari	36	34	14,1	15,0
4	4	1 e 2	Conciatori, pellai, calzolari, guantai, ecc.	76	60	16,8	14,5
4	5	1 e 2	Metallurgici; meccanici, elettricisti, ecc.	118	112	18,6	17,9
4	6	0	Argentieri, orefici ecc.	2	4	5,4	11,1
4	7	1 e 2	Asfaltisti, fornaciai, ceramisti, vetrai, ecc.	15	13	21,0	19,6
4	8	1 e 2	Muratori, imbianchini, manovali, braccianti, ecc.	179	193	12,9	14,3
4	9	1 e 2	Addetti all'industria tessile e a manifatture tessili	9	11	9,0	12,1
4	10	1 e 2	Addetti all'industria del vestiario e all'arredamento	28	27	14,1	14,9
4	11	1	Addetti alle industrie chimiche	3	—	22,1	—
4	12	1 e 2	Addetti alle industrie poligrafiche e della carta	9	10	15,2	15,8
4	13	0	Operai non specificati	77	64	14,8	14,6
5	1	0	Cocchieri, carrettieri, ecc.	25	15	9,6	6,4
5	2	0	Ferrovieri, tramvieri, conduttori di automobili, addetti a trasporti aerei	44	38	22,9	18,5
5	3	0	Marinai, barcaiuoli, pescatori, ecc.	19	14	11,5	9,6
6	1	1 e 2	Addetti alla cura e alla acconciatura della persona	29	26	23,4	20,5
6	2 e 3	0	Addetti ai servizi domestici, garzoni e camerieri addetti ai servizi pubblici	39	47	14,3	15,6
6	4	1	Facchini, spazzini, cantonieri	23	31	11,0	14,1
6	4	2	Venditori ambulanti, saltimbanchi, venturieri	27	25	17,0	15,0
7	1	0	Personale subalterno dello Stato e di altri Enti pubblici	14	20	16,5	22,9
8	1 e 2	0	Esercito, marina, aeronautica, guardie di finanza e milizia (esclusi gli Ufficiali)	56	52	55,2	51,1
8	3	0	Altri Corpi armati dello Stato e di Enti pubblici (esclusi gli Ufficiali)	12	14	30,6	38,5
9	1	1 e 2	Culto cattolico e altri culti	4	1	2,6	0,6
9	2	1	Insegnanti	14	10	24,0	18,6
9	2 e 4	2	Professioni liberali e arti belle	44	39	17,8	15,5
9	3	0	Arti sanitarie	16	12	17,5	11,6
10	1-2-3	1 e 2	Ufficiali delle forze armate di terra, di mare e d'aria	14	12	42,7	37,4
10	4	0	Impiegati pubblici e privati	148	115	26,8	21,3
10	5	0	Pensionati	97	101	6,6	5,9
11	1	0	Proprietari e benestanti	86	77	9,5	7,6
12	1	0	Studenti	21	25	19,0	20,5
12 e 0	3 e 4	1 a 5	Disoccupati, invalidi, ricoverati, mendicanti, professione ignota	67	104	5,2	5,0
IN COMPLESSO				2.506	2.404	11,7	11,0

(a) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Nomenclatura professionale* - III Edizione - Roma, Tipografia I. Failli, 1937-XV.
 (b) Escluse le morti per cause non determinate (classe XVIII) del nuovo Elenco nosologico adottato dal 1931.

CAPO III.

LE CAUSE DI NATIMORTALITÀ NEL SETTENNIO 1931-37.

Nelle schede di nascita, a datare dal 1931, sono indicate le cause di natimortalità. È ovvia l'importanza dello studio delle cause di natimortalità dal punto di vista sociale, essendo alcune di esse favorevolmente influenzabili da provvedimenti assistenziali.

Nei due prospetti seguenti sono stati calcolati i quozienti di natimortalità per cause, nella media annua del settennio 1931-37, al fine di avere cifre più significative, ritratte, cioè, dall'osservazione di un maggior numero di casi.

Il sesso, la legittimità dei natali, il genere del parto (semplice o plurimo), l'ordine di generazione e l'età delle madri, sono circostanze che influiscono sulla frequenza della natimortalità.

Nei riguardi del sesso, le cause di natimortalità nel settennio 1931-37 agiscono con maggiore intensità nei maschi, e la sola eccezione a questo comportamento è data dalle *malformazioni incompatibili con la vita*.

In quanto alla filiazione, i quozienti di natimortalità sono superiori negli illegittimi, per quasi tutte le cause e principalmente per quelle del primo gruppo (nel corso della gestazione) - (Cfr. Prosp. 82). Fra queste, particolarmente alto appare, in confronto dei legittimi, il quoziente per *sifilide ed altre affezioni croniche*, mentre per le rimanenti cause la differenza è molto minore.

Nel secondo gruppo di cause (per espulsione prematura), il quoziente di natimortalità ad eccezione di quello dovuto ad infezioni acute è più alto negli illegittimi ed in specie per le *infezioni croniche in particolare la sifilide*.

Fra le cause del terzo gruppo (nel corso del parto), i quozienti negli illegittimi sono superiori a quelli dei legittimi, fatta eccezione soltanto della natimortalità per *presentazioni viziose e procidenza del cordone*, che è stata leggermente superiore nei legittimi.

Nei riguardi del genere del parto, la natimortalità nei parti semplici è molto inferiore a quella dei parti multipli, sia nel complesso, sia nei singoli gruppi di cause, sia ancora nelle singole cause di ciascun gruppo. La differenza più accentuata si riscontra per il complesso delle morti avvenute per *espulsione prematura*.

Circa l'ordine di generazione nei legittimi (Cfr. Prosp. 83), la natimortalità dei primogeniti, nei parti semplici, è superiore a quella dei non primogeniti in ciascun gruppo di cause, specialmente per quelle che determinano la morte del feto nel corso del parto, e fra queste, principalmente, per l'*ostacolo all'espulsione del feto*. Per quanto concerne i parti multipli, pure essendo nei primogeniti la natimortalità superiore a quella dei non primogeniti, si nota, in misura minore, per le cause che determinano la morte del feto nel corso del parto per *ostacolo all'espulsione del feto*, quella prevalenza che si è notata precedentemente per i parti semplici.

Nei riguardi dell'età della madre, non tenendo conto dell'ordine di generazione e dell'età inferiore a 21 anni, si nota che nei parti semplici la natimortalità è minima nella classe di età 21-29 e cresce coll'aumentare delle età: questo aumento è dovuto, in maggior proporzione, alle cause che agiscono nel corso della gestazione e del parto.

PROSPETTI 82 e 83

Le cause di natimortalità nel settennio 1931-37

PROSPETTO 82. — Nati morti secondo le cause, la specie
(Media annuale per

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	NATI MORTI DA PARTI SEMPLICI									NATI		
	legittimi			illegittimi			Totale			legittimi		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
COMPLESSO	335,9	287,5	312,4	433,8	388,8	410,9	340,7	292,4	317,2	965,4	812,7	890,2
I. - Nel corso della gestazione	73,9	73,4	73,6	116,5	116,8	116,6	76,0	75,5	75,7	189,6	171,6	180,7
1 Sifilide ed altre affez. croniche di cui per sifilide	18,4	17,0	17,7	46,9	45,1	46,0	19,8	18,4	19,1	31,7	30,5	31,1
2 Tossiemie gravidiche	14,1	13,0	13,6	41,9	40,5	41,2	15,5	14,4	14,9	21,9	21,3	21,5
3 Malform. incomp. con la vita	17,2	16,0	16,6	19,9	20,5	20,2	17,4	16,2	16,8	40,3	38,1	39,2
4 Altre cause	20,0	24,3	22,1	23,2	27,0	25,0	20,1	24,4	22,2	47,5	45,8	46,6
4bis Male indicate	13,4	11,9	12,7	17,9	16,5	17,2	13,6	12,1	12,9	52,9	43,5	48,3
4bis Male indicate	4,9	4,3	4,6	8,6	7,7	8,2	5,1	4,4	4,8	17,2	13,7	15,5
II. - Per espulsione prematura	97,7	88,2	93,1	129,8	118,6	124,3	99,3	89,7	94,7	399,5	331,1	365,8
5 Strapazzo materno	43,6	39,4	41,6	45,3	41,2	43,3	43,7	39,5	41,7	149,2	123,8	136,7
6 Trauma determ. parto premat.	6,8	6,1	6,5	8,1	6,4	7,3	6,8	6,1	6,5	17,1	15,4	16,3
7 Inserzione viziosa	7,9	6,4	7,2	7,4	7,4	7,4	7,8	6,5	7,2	27,0	22,2	24,6
8 Infezioni acute	5,3	5,1	5,2	4,9	5,1	5,0	5,3	5,1	5,2	18,7	15,3	17,0
9 Infezioni croniche di cui per sifilide	6,7	6,2	6,4	13,1	13,4	13,3	7,0	6,6	6,8	19,0	17,1	18,0
9 Infezioni croniche di cui per sifilide	2,8	2,7	2,8	9,6	9,9	9,7	3,1	3,1	3,1	6,1	5,1	6,6
10 Altre cause	9,1	8,5	8,8	14,6	14,0	14,3	9,3	8,7	9,0	42,4	32,3	37,4
10bis Male indicate	18,5	16,5	17,5	36,4	31,1	33,8	19,4	17,2	18,3	126,2	105,1	115,8
III. - Nel corso del parto	162,0	123,8	143,5	181,1	145,5	163,7	163,0	124,9	144,5	364,8	299,1	332,4
11 Present. viziose e procid. cord.	75,5	57,8	66,9	72,2	59,7	66,1	75,3	57,9	66,8	167,3	141,8	154,8
12 Ostacoli all'espulsione del feto	33,5	23,9	28,8	36,1	28,8	32,5	33,6	24,2	29,0	62,7	51,5	57,2
13 Altre cause	52,0	41,2	46,7	71,4	55,8	63,8	52,9	41,9	47,6	130,7	102,5	116,8
13bis Male indicate	1,1	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	1,1	1,0	1,1	4,0	3,3	3,7
Cause non indicate	2,2	2,1	2,1	0,4	0,0	0,2	2,4	2,3	2,3	11,6	10,8	11,2

PROSPETTO 83. — Nati morti legittimi (1931-37), da madri che presumibilmente non ebbero figli prima
(Media annuale per

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	NATI MORTI DA PARTI SEMPLICI —								
	— 21			21-29			30-39		
	Primo-geniti	Cadetti	Totale	Primo-geniti	Cadetti	Totale	Primo-geniti	Cadetti	Totale
COMPLESSO	317,5	212,9	294,4	362,8	211,6	267,2	673,2	306,8	335,7
I. - Nel corso della gestazione	71,3	54,2	67,6	78,8	51,6	61,6	145,9	73,9	79,6
1 Sifilide ed altre affez. croniche di cui per sifilide	14,5	18,8	15,5	16,7	13,0	14,4	36,7	18,5	19,9
2 Tossiemie gravidiche	11,7	16,1	12,6	13,3	10,2	11,3	28,8	13,9	15,1
3 Malform. incompat. con la vita	16,5	7,4	14,5	19,4	10,1	13,5	39,9	16,1	18,0
4 Altre cause	25,4	16,8	23,5	24,5	17,0	19,7	35,3	21,8	22,8
4bis Male indicate	10,6	8,5	10,1	12,4	8,5	10,0	24,3	13,2	14,0
4bis Male indicate	4,3	2,8	3,9	5,8	3,1	4,1	9,7	4,4	4,8
II. - Per espulsione prematura	106,9	92,3	103,7	96,4	71,6	80,7	150,2	93,0	97,5
5 Strapazzo materno	51,5	41,6	49,3	42,3	32,5	36,1	58,2	41,5	42,9
6 Trauma determ. parto premat.	7,4	6,0	7,1	6,8	4,8	5,6	10,9	6,4	6,7
7 Inserzione viziosa	6,5	5,0	6,2	6,8	5,4	6,0	12,8	7,8	8,2
8 Infezioni acute	6,4	5,6	6,2	5,7	3,7	4,4	9,8	5,1	5,4
9 Infezioni croniche di cui per sifilide	5,9	6,3	6,0	5,7	5,1	5,3	10,9	6,8	7,2
9 Infezioni croniche di cui per sifilide	2,9	3,0	2,9	2,7	2,4	2,5	4,6	2,7	2,8
10 Altre cause	7,5	8,7	7,8	9,0	6,4	7,4	15,7	8,9	9,5
10bis Male indicate	21,6	19,0	21,1	20,1	13,5	16,0	32,0	16,5	17,7
III. - Nel corso del parto	137,5	64,5	121,3	185,4	87,1	123,2	373,8	138,1	156,7
11 Presentaz. viziose e procid. cord.	64,8	33,3	57,9	79,5	44,1	57,1	138,3	67,2	72,8
12 Ostacoli all'espulsione del feto	27,7	10,2	23,9	43,6	15,4	25,8	98,2	24,6	30,4
13 Altre cause	44,0	20,3	38,8	61,1	27,0	39,5	134,7	45,2	52,3
13bis Male indicate	0,9	0,5	0,8	1,1	0,6	0,8	2,6	1,0	1,2
Cause non indicate	1,8	2,0	1,8	2,2	1,1	1,7	3,2	1,9	2,1

(*) Nomenclatura nosologica stabilita dalla IV Conferenza internazionale. — (a) Nati vivi e nati morti. — (b) Per il biennio 1931-1932 vennero esclusi

del parto, la filiazione ed il sesso, nel settennio 1931-37.
10.000 nascite (a).

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	MORTI DA PARTI MULTIPLI						IN COMPLESSO								
	illegittimi			Totale			legittimi			illegittimi			Totale		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
COMPLESSO	1249,7	1075,0	1162,0	977,1	823,8	901,5	352,7	301,9	328,0	452,0	403,0	428,1	357,6	306,9	332,9
I. - Nel corso della gestazione	295,7	261,3	278,4	193,9	175,4	184,8	77,0	70,1	76,5	120,5	120,2	120,3	79,1	78,2	78,7
1 Sifilide ed altre affez. croniche di cui per sifilide	64,6	93,7	79,2	33,1	33,2	33,1	18,7	17,4	18,1	47,3	46,3	46,8	20,1	18,8	19,5
2 Tossiemie gravidiche	59,6	86,3	73,0	23,1	24,1	23,7	14,3	13,3	13,8	42,3	41,6	42,0	15,7	14,6	15,2
3 Malform. incomp. con la vita	52,2	49,3	50,7	40,8	38,5	39,7	17,9	16,6	17,2	20,6	21,2	20,9	18,0	16,8	17,4
4 Altre cause	82,0	51,8	66,8	48,9	46,1	47,5	20,7	24,9	22,7	24,5	27,6	26,0	20,9	25,0	22,9
4bis Male indicate	69,6	61,6	65,6	53,6	44,3	49,0	14,4	12,8	13,6	19,1	17,6	18,3	14,7	13,0	13,9
4bis Male indicate	27,3	4,9	16,1	17,6	13,3	15,5	5,2	4,5	4,9	9,0	7,6	8,3	5,4	4,7	5,0
II. - Per espulsione prematura	516,8	451,2	483,9	404,3	336,2	370,7	165,8	94,9	100,5	138,4	126,4	132,6	107,4	90,4	102,1
5 Strapazzo materno	159,0	123,3	141,1	149,6	123,8	136,8	46,4	41,7	44,1	47,8	43,1	45,5	46,5	41,8	44,2
6 Trauma determ. parto premat.	37,3	22,2	29,7	17,9	15,7	16,8	7,0	6,4	6,7	8,8	6,8	7,8	7,1	6,4	6,8
7 Inserzione viziosa	49,7	32,1	40,8	27,9	22,6	25,3	8,4	6,9	7,6	8,4	8,0	8,2	8,4	6,9	7,7
8 Infezioni acute	14,9	19,7	17,3	18,5	15,5	17,0	5,7	5,3	5,5	5,1	5,4	5,2	5,6	5,3	5,5
9 Infezioni croniche di cui per sifilide	29,8	44,4	37,1	19,4	18,2	18,8	7,0	6,5	6,8	13,5	14,1	13,8	7,3	6,9	7,1
9 Infezioni croniche di cui per sifilide	9,9	24,7	17,3	6,2	6,0	6,1	2,9	2,8	2,8	9,6	10,2	9,9	3,2	3,1	3,2
10 Altre cause	39,8	39,4	39,6	42,3	32,6	37,5	9,9	9,1	9,5	15,2	14,6	14,9	10,2	9,4	9,8
10bis Male indicate	186,3	170,1	178,2	128,7	107,9	118,4	21,4	18,9	20,2	39,7	34,4	37,1	22,3	19,7	21,0
III. - Nel corso del parto	429,4	345,2	383,6	367,1	301,1	334,6	167,3	128,7	148,6	186,5	150,2	168,8	168,4	129,7	140,6
11 Present. viziose e procid. cord.	203,7	162,7	183,1	168,8	142,7	155,9	78,0	60,1	69,3	75,1	62,1	68,8	77,8	60,2	69,2
12 Ostacoli all'espulsione del feto	59,6	46,8	53,2	62,6	51,3	57,0	34,2	24,7	29,6	36,7	29,2	33,0	34,4	24,9	29,8
13 Altre cause	151,6	130,7	141,1	131,5	103,7	117,8	54,1	42,9	48,6	73,2	57,6	65,6	55,0	43,6	49,5
13bis Male indicate	7,5	4,9	6,2	4,2	3,4	3,8	1,2	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	1,2	1,1	1,1
Cause non indicate	14,9	17,3	16,1	11,7	11,1	11,4	2,5	2,3	2,4	6,6	6,2	6,4	2,7	2,5	2,6

dell'attuale matrimonio (b), per cause, età della madre al parto, ordine di generazione.
10.000 nascite (a).

CAUSE DI NATIMORTALITÀ (*)	ETÀ DELLA MADRE AL PARTO						NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI			IN COMPLESSO		
	40-49			In complesso			Primo-geniti	Cadetti	Totale	Primo-geniti	Cadetti	Totale
	Primo-geniti	Cadetti	Totale	Primo-geniti	Cadetti	Totale						
COMPLESSO	1222,6	498,5	517,1	398,0	283,0	312,4	1339,5	793,3	893,8	416,4	298,0	328,0
I. - Nel corso della gestazione	280,6	124,5	128,5	86,9	68,9 </							

ALLEGATO

MOD. B (Valido per il 1937)
(recto)

SCHEDA DI MORTE

per maschio (*)

AVVERTENZA — La presente scheda deve essere compilata per tutti gli atti di morte *formati nel Comune o ricevuti in originale* a mente dell'art. 396 C. C. — Non deve essere compilata per quelli formati in altri Comuni del Regno o all'Estero e trasmessi soltanto per copia autentica a mente dell'art. 397 C. C.

Comune di **Provincia di**

Numero d'ordine del Registro degli atti di morte **Parte** **Serie**

compilato dall'Ufficio di

Per i bambini nati vivi, ma morti prima della denuncia di nascita, indicare il numero d'ordine del Registro degli atti di nascita **Parte**

compilato dall'Ufficio di

Firma dell'Ufficiale di stato civile

Bollo

NOTE:

(*) Nelle schede per le femmine modello Bbis, stampate in inchiostro rosso, è anche richiesto nel caso di morte per *infezione puerperale*, se trattasi di primipara o pluripara e nel caso di madri morte per malattia puerperale se trattasi di parto multiplo.

(b) Si indichi chiaramente il *mezzo o modo* con cui fu procurata la morte violenta, ad es.: *arma da fuoco, caduta, investimento da treno, impiccamento, avvelenamento da...* ecc. In caso di avvelenamento, indicare il veleno usato, es.: *per avvelenamento da sublimato corrosivo, da acido fenico, ecc.*

(c) Indicare chiaramente la *professione* o la *condizione*, servendosi delle voci contenute nella « Nomenclatura professionale ».

(d) Aggiungere il numero corrispondente della « Nomenclatura professionale », tenendo presente che la stessa voce deve essere indicata con un numero diverso a seconda della diversa posizione occupata nella professione, per esempio: *Macellaio* (venditore di carni macellate) = 3/01/0/01; *Macellaio* (operaio addetto alla mattazione) = 4/03/1/01; *Fornai* (venditore di pane) = 3/01/0/01; *Fornai* (operaio addetto alla fabbricazione del pane) = 4/03/3/03; *Cappellaio* (venditore di cappelli) = 3/01/0/10; *Cappellaio* (operaio addetto alla fabbricazione dei cappelli) = 4/09/2/02; ecc.

Comune di

Provincia di

Notizie fornite dal Medico.

Notizie fornite dall'Ufficiale di stato civile.

AVVERTENZA — I quadratini e i numeri che li seguono debbono essere lasciati scoperti da scrittura; essi servono solo per le elaborazioni che l'Istituto Centrale di Statistica compie sulle schede.

Cognome e nome		
Luogo dove avvenne il decesso	<input type="checkbox"/> 1	abitazione (a)	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 2	ospedale, casa di cura (a)	<input type="checkbox"/> 6
	<input type="checkbox"/> 3	brefotrofo (a)	<input type="checkbox"/> 7
	<input type="checkbox"/> 4	ricovero, ospizio (a)	<input type="checkbox"/> 8
		luogo di pena (a)	
		orfanotrofo (a)	
		comunità religiose (a)	
		altri luoghi (indicare quali)	
<p>Dichiaro che la causa della morte del soprannominato, secondo la mia scienza e coscienza, fu la sottoindicata:</p>			
Cause della morte e circostanze in cui essa avvenne	<input type="checkbox"/> 8	Morte naturale	malattia iniziale
			successioni morbose o complicanze
			malattia terminale
Morte da causa violenta	<input type="checkbox"/> 9	Specie della morte	accidentale (a)
			suicidio (a)
			omicidio (a)
		mezzo o modo col quale la morte fu procurata o avvenne (b)	
Morte sopravvenuta dopo atto operativo	<input type="checkbox"/> 9		malattia o lesione che ha causato l'intervento chirurgico
			operazione praticata
	<input type="checkbox"/> 1		per i bambini morti nel primo mese di vita, dire se provengono da parto multiplo (a)

Data di morte	Anno	mese	giorno
Dimora del defunto	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Aveva dimora stabile nel Comune? (a)	
Luogo di nascita	Comune di		
	Provincia di		
Data di nascita	Anno	mese	giorno
Età	Indicare le età inferiori { a 1 giorno (in ore compiute)		
	a 1 mese (in giorni compiuti)		
	a 1 anno (in mesi compiuti)		
	Indicare le altre età in anni compiuti		
Fillazione (per i bambini morti nel primo anno di vita)	<input type="checkbox"/> 1	Legittimo (a)	
	<input type="checkbox"/> 2	Illegittimo riconosciuto (a)	
	<input type="checkbox"/> 3	Illegittimo non riconosciuto (a)	
Stato civile	<input type="checkbox"/> 1	Celibe (a)	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3	Vedovo (a)	<input type="checkbox"/> 4
		Coniugato (a)	Divorziato (a)
Data di matrim.	Anno	mese	giorno
	(per i soli coniugati)		
Professione o condizione del defunto	Ultima professione esercitata dal defunto (c)		
	N.ro della nomencl. profes. (d)		
Spazio riservato all'Istituto		

Firma e qualifica del Medico

NOTE : (a) Rispondere si o no a seconda del caso. — Per i note (b, c, d) vedi nel recto.



TAVOLE

TAVOLA 1 — Morti, durante l'anno 1937,

A. — Per Province

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE							LIGURIA						
		Alessandria	Aosta	Asti	Cuneo	Novara	Torino	Vercelli	TOTALE	Genova	Imperia	La Spezia	Savona	TOT	
		M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F		
	COMPLESSO	6635	3938	3220	8799	5711	16626	5110	50.039	24373	11160	2.168	2.482	2.499	18309
	I. - Malattie infettive e parassitarie	756	299	251	926	680	2.209	540	5.661	2.783	1.556	222	279	261	2.318
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi.	35	26	20	70	23	75	21	270	137	75	4	24	5	108
1	Febbre tifoidea (tifo addominale).	35	25	19	58	22	70	19	248	126	69	3	23	3	98
2	Paratifo	—	1	1	12	1	5	2	22	11	6	1	1	2	10
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Febbre ricorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Febbre ondulante	2	2	1	12	—	7	—	24	5	—	2	1	—	3
6	Vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	4	10	1	2	3	5	—	25	11	32	—	—	—	32
8	Scarlattina	2	—	5	18	3	10	5	43	25	11	—	2	2	15
9	Tosse convulsa	14	3	3	38	33	41	19	151	83	33	9	5	5	56
10	Difterite	13	9	6	42	17	45	13	145	65	58	17	14	10	99
11	Influenza	185	48	53	169	157	446	196	1.254	663	131	14	26	66	237
	a) con complicazioni respiratorie indicate	146	40	45	139	132	373	169	1.044	523	107	10	22	51	190
	b) senza complicazioni respiratorie indicate	39	8	8	30	25	73	27	210	140	24	4	4	15	47
13	Dissenteria	4	—	—	7	1	3	—	15	11	4	2	2	1	9
	a) amebica	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1
	b) bacillare	2	—	—	—	—	1	—	3	3	1	1	2	4	
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	2	—	—	7	—	2	—	11	7	3	—	—	1	4
15	Risipola	12	7	8	20	13	52	9	121	52	18	5	2	7	32
16	Poliomielite a., polioencefalite ac.	—	—	—	1	1	2	1	6	3	1	—	1	1	3
17	Encefalite letargica o epidemica	4	—	3	2	4	9	3	25	8	1	—	—	—	1
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	—	—	—	1	5	1	—	7	3	1	—	—	—	3
20	Pustola maligna e carbonchio	—	—	—	1	—	4	1	6	1	7	—	—	2	9
21	Rabbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tetano	21	1	7	16	9	16	7	77	25	9	3	5	2	19
23 a 32	Tubercolosi:	420	178	130	445	371	1.321	216	3.081	1.515	1.016	151	159	133	1.459
23	dell'apparato respiratorio (b)	334	132	107	347	304	1.067	158	2.449	1.189	815	121	127	94	1.157
24	delle meningi e sist. nerv. centr.	36	20	11	35	25	103	23	254	131	91	10	17	14	132
25	degli intestini e del peritoneo (c)	12	9	3	16	6	32	5	83	43	22	5	6	6	39
26	della colonna vertebrale	3	1	2	5	7	17	3	38	17	26	—	2	3	31
27	delle ossa e delle articolaz. (d)	6	7	—	11	9	18	3	54	27	24	5	1	6	36
28	della pelle e sottocutaneo	2	—	—	2	4	2	—	10	9	—	—	—	—	—
29	del sistema linfatico (e)	2	—	—	2	1	7	2	14	12	1	—	—	—	—
30	dell'apparato genito-urinario	3	2	1	5	4	14	4	33	16	9	2	1	6	18
31	Altre localizzazioni della tuberc.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
32	Tubercolosi disseminate	22	7	6	23	12	59	16	145	70	28	8	5	4	45
	a) acuta	16	6	4	12	7	35	10	90	42	15	5	1	1	22
	b) cronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata	6	1	2	11	5	24	6	55	28	13	3	3	3	22
33	Lebbra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3
34	Sifilide	16	4	6	16	9	44	10	105	35	46	6	8	4	64
	a) congenita	4	—	1	5	1	7	3	21	8	10	2	2	2	16
	b) acquisita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata	12	4	5	11	8	36	7	83	27	36	4	6	2	48
35	Infezione gonococcica e altre mal. ven.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	4	—	1	—	5
36	Infez. purulenta e setticem. (f)	21	11	7	51	29	111	33	263	123	89	7	20	20	136
	a) setticemia	19	8	7	46	24	104	30	238	110	78	6	17	15	116
	b) piemia	2	—	—	—	—	—	—	22	13	11	1	3	5	20
	c) gangrena gassosa	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
38	Malaria	—	—	—	3	—	5	1	9	2	7	—	1	—	8
	a) febbre malarica	—	—	—	—	—	5	—	8	—	—	—	—	—	6
	b) cachessia palustre	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
39	Altre mal. dovute a protozoi paras.	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	1	—	1	4

(a) Durante l'anno 1937, non si verificarono nel Regno casi di morte per: vaiolo (N. 6-a), dell'Elenco Nosologico, vaiolo non specificato (N. 6-c), febbre gialla (N. 37), polmonite non specificata (N. 109), per esecuzione di civili da parte di armate belligeranti (N. 197). (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (f) non puerperali.

distinti secondo 200 cause di morte.

e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	ALRE	LOMBARDIA										VENEZIA TRIDENTINA				VENEZIO					
		Bergamo	Brescia	Como	Crenona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Varese	TOTALE	Bolzano	Trento	TOTALE	Belluno	Friuli (Udine)	Padova	Rovigo			
		M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F		
	COMPLESSO	8.660	11100	12489	7.807	5.433	4.828	29319	6.608	2285	5355	85224	40833	4.142	5.736	9.878	4.832	3.103	9.008	7.571	3.865
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi.	1.079	1.488	1.658	845	669	589	4.095	708	289	638	10979	5.433	590	899	1.489	722	406	1.130	1.170	523
1	Febbre tifoidea (tifo addominale).	57	163	216	64	65	48	213	67	17	24	877	477	25	26	51	22	6	52	71	58
2	Paratifo	52	160	213	57	65	46	204	63	17	24	849	466	25	23	48	21	6	50	69	56
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Febbre ricorrente	5	3	3	7	—	2	9	4	—	—	28	11	—	3	3	1	—	2	2	2
5	Febbre ondulante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Scarlattina	12	151	151	31	16	33	119	8	4	8	521	245	—	1	1	—	5	28	7	4
9	Tosse convulsa	9	1	4	3	1	2	17	3	1	1	33	15	7	2	9	4	—	2	1	—
10	Difterite	34	93	29	15	13	95	14	28	16	16	316	183	57	17	74	43	16	40	71	35
11	Influenza	47	86	107	36	31	25	296	9	12	21	623	330	25	18	43	24	15	37	36	21
	a) con complicazioni respiratorie indicate	114	203	237	131	95	117	569	149	25	108	1.634	858	100	105	205	107	48	114	142	59
	b) senza complicazioni respiratorie indicate	84	171	176	116	72	95	466	126	23	82	1.327	684	71	87	158	81	34	93	118	53
13	Dissenteria	30	32	61	15	23	22	103	23	2	26	307	174	29	18	47	26	24	21	24	6
	a) amebica	4	11	9	3	12	2														

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno. A. — Per Province

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE (a)), provinces (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona), and total counts (TOTALE M F di cui F). Rows include categories like Anemie, Leucemie e aleucemie, Malattie della milza, etc.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

1937, secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for provinces (ALE, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese) and regions (VENEZIA TRIDENTINA, VENETO), and total counts (TOTALE M F di cui F). Rows include categories like Anemie, Leucemie e aleucemie, Malattie della milza, etc.

90 a 95

90
91
92
93
94
95
96
97

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte. A. — Per Provincie

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (ALESSANDRIA, AOSTA, ASTI, CUNEO, NOVARA, TORINO, VERCELLI, GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA, TOR). Includes sub-sections VIII, IX, and X.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali del-

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (ALESSANDRIA, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, MANTOVA, MILANO, PAVIA, SONDRIO, VARESE, BELLUNO, FRIULI (UDINE), PADOVA, ROVERETO). Includes sub-sections VIII, IX, and X.

l'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (f) e dell'apparato genitale.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno

A. — Per Province

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE							LIGURIA					Tot M F	
		Alessandria	Aosta	Asti	Cuneo	Novara	Torino	Vercelli	TOTALE		Genova	Imperia	La Spezia		Savona
									M F	di cui F					
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b)	15	2	8	15	6	39	7	92	44	33	3	4	12	52
	a) pielite	10	1	2	3	1	25	3	45	17	21	—	3	7	31
	b) altre	5	1	6	12	5	14	4	47	27	12	3	1	5	21
134	Calcolosi delle vie urinarie	7	3	1	6	7	12	1	37	10	15	2	1	3	21
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori	5	3	1	5	4	7	1	26	9	11	2	1	2	16
	b) calcolosi della vescica	2	—	—	1	3	4	—	10	—	4	—	—	1	5
	c) calcolosi senza altre indicazioni	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	17	2	5	28	16	32	18	118	29	39	6	5	5	55
	a) cistite	14	2	5	22	13	28	16	100	26	34	5	5	5	49
	b) altre	3	—	—	6	3	4	2	18	3	5	1	—	—	6
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	3	—	—	3	3	8	—	17	—	10	1	—	—	11
	a) stenosi uretrale	3	—	—	2	3	6	—	14	—	6	—	—	—	6
	b) altre	—	—	—	1	—	2	—	3	—	4	—	—	—	5
137	Malattie della prostata	39	22	22	49	30	109	45	316	—	58	19	19	21	117
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c)	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
139	Mal. organi genitali della donna (c)	2	3	1	3	7	9	6	31	6	3	1	2	12	12
	a) ovaie, trombe e parametri	2	2	1	1	4	4	2	16	16	4	1	1	7	7
	b) utero	—	1	—	2	2	4	4	13	13	2	—	—	5	5
	c) mammelle	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
	d) altre	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
	XI. - Malattie gravid., parto e puerp.	8	15	15	28	14	41	21	142	142	43	4	13	15	75
140	Aborto con condizioni settiche	3	1	1	4	1	3	4	17	17	6	1	1	1	9
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	3
142	Gestazione ectopica	1	1	1	2	1	3	1	10	10	2	—	—	1	4
143	Altri accidenti della gravidanza (e)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale	—	4	—	2	2	8	—	16	16	8	1	2	12	
	a) da placenta previa	—	2	—	—	—	1	—	3	3	4	—	—	4	
	b) altre emorragie	—	2	—	2	2	7	—	13	13	4	1	2	8	
145	Setticemia e infezioni puerperali (f)	1	6	6	12	3	17	11	56	56	13	2	5	2	22
	a) setticemia e piemia puerperali	1	6	6	12	3	17	11	56	56	13	2	5	2	22
	b) tetano puerperale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerper.	2	2	4	5	3	6	2	24	24	2	—	3	2	7
147	Altre forme di tossiemia della grav.	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g)	—	1	1	1	1	1	2	7	7	2	—	—	4	
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi	—	1	1	1	1	1	2	7	7	2	—	—	4	
	b) embolia o morte improvvisa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Altri accidenti del parto	1	—	—	2	3	2	1	9	9	9	—	1	4	14
150	Altre malattie non definite (h)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.	14	12	8	18	22	53	14	141	53	41	12	10	11	74
151	Foruncoli	—	2	3	4	4	11	2	26	8	2	3	1	—	6
152	Flemmone, ascesso caldo	12	8	3	13	14	37	7	94	36	30	6	7	9	52
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i)	2	2	2	1	4	5	5	21	9	9	3	2	2	16
	XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione	7	3	5	9	6	21	12	63	33	31	4	10	5	50
154	Osteomielite infettiva acuta	2	3	3	5	2	10	6	31	16	19	3	8	3	33
155	Altre malattie delle ossa (l)	2	—	1	1	2	4	2	12	7	7	1	2	1	11
156	Mal. articolazioni, ecc. (m)	3	—	1	3	2	7	4	20	10	5	—	—	1	6
	a) articolaz. (eccett. la tbc. e il reumatismo)	2	—	1	3	2	7	4	19	10	5	—	—	1	6
	b) altri organi della locomozione	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	XIV. - Vizi di conformazione congen.	16	10	10	42	14	50	14	156	69	44	7	11	16	78
157	Vizi di conformazione congeniti (n)	16	10	10	42	14	50	14	156	69	44	7	11	16	78
	a) idrocefalia	—	—	2	2	3	4	2	13	5	2	—	—	—	4
	b) spina bifida e meningocoele	1	—	—	9	1	9	2	22	10	6	—	—	1	11
	c) malformazioni congenite del cuore	11	8	7	21	7	24	8	84	38	26	4	6	10	48
	d) mostrosità	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	4
	e) altri	4	3	1	10	3	13	2	36	15	8	1	3	1	13
	XV. - Malattie dell'infanzia.	136	102	88	306	141	446	146	1.365	578	320	44	90	77	531
158	Debolezza congenita	25	28	20	86	27	65	31	282	129	48	14	22	14	98
159	Nascita prematura (n)	66	41	48	120	54	263	78	670	274	189	18	44	44	295

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) mata cata come settica. (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli altri

1937, distinti secondo 200 cause di morte.

e Compartimenti.

ALE	LOMBARDIA										VENEZIA TRIDENTINA				VENETO				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
	di cui F	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Varese	TOTALE		Belluno	Friuli (Udine)	Padova	Rovigo					
											M F	di cui F									
22	13	23	12	8	8	54	14	1	10	143	75	9	8	17	10	5	15	7	8	133	
14	7	16	6	4	4	34	6	1	3	80	38	5	3	8	7	3	6	4	5	a	
8	6	8	6	4	4	20	8	—	7	63	37	4	5	9	3	—	3	2	3	b	
5	3	4	8	5	3	16	8	1	1	49	16	2	1	3	—	—	2	4	6	134	
5	1	4	5	4	3	10	5	1	1	34	15	2	1	3	—	—	2	2	2	a	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	1	1	b	
14	20	20	31	19	8	45	18	3	15	179	56	6	15	21	5	8	18	17	5	c	
13	18	19	25	18	8	34	16	3	12	152	46	6	14	20	5	7	13	17	2	135	
1	2	1	6	1	—	11	3	—	3	27	10	—	1	1	—	—	1	5	—	a	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1	—	—	—	—	—	1	4	1	b	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	1	—	a	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	1	3	—	b	
—	27	26	28	21	25	110	33	13	31	314	—	29	29	58	—	21	61	37	16	137	
—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	
12	10	7	4	3	6	24	1	1	1	57	57	8	1	9	9	3	7	2	2	139	
7	9	5	3	1	3	20	—	—	1	42	42	8	1	9	9	3	3	—	—	a	
5	1	2	1	2	2	4	1	1	—	14	14	—	—	—	—	—	4	1	1	b	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
75	64	53	19	24	22	112	30	8	22	354	354	37	16	53	53	7	18	46	18	d	
9	1	10	2	1	—	15	5	—	1	35	35	4	1	5	5	—	1	4	—	140	
3	2	1	—	—	1	1	—	—	1	6	6	1	—	1	1	—	—	—	—	141	
4	1	2	1	2	2	9															

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno
A. — Per Province

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PIEMONTE							LIGURIA								
		Alessandria	Aosta	Asti	Cuneo	Novara	Torino	Vercelli	TOTALE			Genova	Imperia	La Spezia	Savona	Tot	
									M	F	di cui F					M	F
160	Conseguenze del parto (b)	16	10	5	18	22	27	13	111	46	16	4	5	4	29		
	a) con indicazione di operazione cesarea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		
	b) senza indicazione di operazione cesarea	16	10	5	18	22	27	13	111	46	15	4	5	4	28		
161	Altre malatt. speciali dell'infanzia	29	23	15	82	38	91	24	302	129	67	8	19	15	109		
	a) atelectasia	2	—	—	6	3	5	1	17	5	3	—	1	4	8		
	b) ittero dei neonati	5	5	4	12	4	12	1	43	24	8	4	6	1	19		
	c) sclerema e altre	22	18	11	64	31	74	22	242	100	56	4	12	10	82		
	XVI. - Senilità	625	415	273	429	381	782	309	3.214	1.792	337	150	121	104	712		
162	Senilità	625	415	273	429	381	782	309	3.214	1.792	337	150	121	104	712		
	a) con demenza senile	35	2	6	9	22	40	5	119	67	45	3	3	2	53		
	b) senza demenza senile	590	413	267	420	359	742	304	3.095	1.725	292	147	118	102	659		
	XVII. - Morti violente e accidentali	265	186	107	305	250	619	157	1.889	401	369	110	114	107	700		
163 a 171	Suicidi	56	32	28	65	45	152	33	411	91	89	38	26	16	169		
163	per ingestione di veleni (c)	6	1	4	2	2	16	2	33	19	5	3	1	3	12		
164	con gas tossici	—	—	—	1	—	9	1	11	3	8	2	2	—	12		
165	per impiccamento o strangol.	11	14	2	29	10	33	15	114	15	26	11	3	4	44		
166	per annegamento	15	9	11	9	20	25	4	93	34	8	4	3	1	16		
167	con arma da fuoco	13	7	7	8	6	28	3	72	4	11	11	5	3	30		
168	con arma da punta e da taglio	1	—	—	4	—	6	2	13	3	6	—	2	—	8		
169	per precipitaz. da luogo elev.	3	1	2	8	2	23	5	44	11	22	3	8	2	35		
170	per schiacciamento	7	—	2	3	5	12	1	30	2	3	3	2	3	11		
171	con altri mezzi	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1		
172 a 175	Omicidi	9	5	6	9	3	18	9	59	20	5	3	4	5	17		
172	Infanticidio (— un anno)	1	—	—	—	—	1	2	4	1	—	—	—	2	2		
	a) subito dopo la nascita	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	2	2		
	b) altri, prima d'un anno	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
173	Omicidi con arma da fuoco (d)	4	3	2	2	—	8	2	21	9	5	—	4	2	11		
174	Omicidi arma da tagl. e da punta (d)	—	2	4	4	2	6	1	19	3	—	1	—	1	2		
175	Omicidi con altri mezzi (d)	4	—	—	3	1	3	4	15	7	—	2	—	—	2		
176 a 194	Morti accidentali	197	148	73	230	199	443	115	1.405	287	268	69	84	85	506		
176	Morsi o punture d'animali velenosi	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	3		
177	Avvelenamenti da alimenti guasti	3	—	1	1	1	2	—	8	3	4	1	—	—	5		
178	Assorbimento di gas tossici	8	2	—	1	1	4	1	17	6	1	—	—	3	4		
179	Altri avvelenam. accident. acuti (e)	1	2	—	1	2	—	—	6	2	4	1	2	—	7		
180	Per incendio	1	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	4	—	7		
181	Per ustioni accidentali (f)	8	10	3	30	13	24	9	97	52	18	4	5	12	39		
182	Per soffocazione meccanica accid.	1	—	—	1	1	2	—	5	1	2	—	—	2	4		
183	Per annegamento accidentale	18	13	9	36	29	45	16	166	25	18	4	11	5	38		
184	Per trauma acc. arma da fuoco (g)	3	3	1	3	2	10	1	23	2	3	1	—	2	6		
185	Per trauma acc. arma pun. o tagl. (g)	—	2	—	3	—	2	—	7	—	1	—	—	—	1		
186	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h)	134	94	46	129	124	306	74	907	180	181	46	56	54	337		
187	Per cataclisma (i)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—		
188	Per violenze di animali	2	—	4	3	1	5	1	16	2	3	—	—	1	4		
189	Per fame o sete (l)	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—		
190	Per freddo eccessivo	1	2	3	9	3	6	—	24	5	2	1	1	1	5		
191	Per caldo eccessivo	2	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—		
192	Per fulmine	2	1	1	2	1	5	1	13	1	4	—	—	—	4		
193	Per accidenti dovuti a corr. elettr.	4	4	2	2	5	8	3	28	1	3	4	3	—	10		
194	Per altri accidenti	9	11	3	10	16	22	7	78	4	20	5	2	5	32		
	a) corpi estranei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	b) altri	9	11	3	10	16	22	7	78	4	20	5	2	5	32		
195	Morte violenta, ecc. (m)	3	1	—	1	3	6	—	14	3	7	—	—	1	8		
196	Per ferite di guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
198	Per esecuzione giudiziaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	XVIII. - Cause di morte non determ.	46	57	26	89	52	292	70	632	262	103	11	18	25	157		
199	Morte improvvisa	42	55	25	81	47	252	65	567	232	85	11	18	23	137		
200	Cause non specific. o mal definite	4	2	1	8	5	40	5	65	30	18	—	—	2	20		

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno e più. (e) eccezzuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (l) i due casi che si verificarono nel Regno si riferiscono a due bambine di cui una è deceduta per abbandono e l'altra perchè sperduta in un bosco. (m) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.

1937, distinti secondo 200 cause di morte.
e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	ALE	LOMBARDIA										VENEZIA TRIDENTINA		VENEZIO				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO				
		di cui F	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Mantova	Milano	Pavia	Sondrio	Varese	TOTALE		Belluno	Trento	TOTALE			Belluno	Friuli (Udine)	Padova	Rovigo
												M	F			M	F					
160	11	34	22	16	9	11	71	9	6	12	190	76	20	12	32	15	2	23	21	8	160	
	11	34	22	16	9	11	71	9	6	12	190	76	20	12	32	15	2	23	21	8	160	
161	38	147	155	79	56	44	251	37	28	38	835	354	63	42	105	49	32	100	98	65	161	
	1	3	7	12	2	4	8	1	1	2	40	22	4	1	5	1	2	2	2	2	161	
	8	8	30	10	9	7	44	5	3	7	123	42	5	7	12	5	1	13	21	15	161	
	29	136	118	57	45	33	199	31	24	29	672	290	54	34	88	43	29	85	75	48	161	
	388	266	414	357	324	295	863	329	132	295	3.275	1.883	257	430	687	392	258	771	406	272	162	
162	388	266	414	357	324	295	863	329	132	295	3.275	1.883	257	430	687	392	258	771	406	272	162	
	33	11	8	21	7	11	82	4	2	3	149	87	3	7	10	7	7	6	10	5	162	
	355	255	406	336	317	284	781	325	130	292	3.126	1.796	254	423	677	385	251	785	398	267	162	
	151	264	410	256	129	154	1.042	236	103	173	2.767	607	208	225	433	99	120	336	242	135	163 a 171	
163	36	19	47	53	14	38	184	48	11	37	451	111	22	41	63	14						

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno
A. — Per Provincie

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segue: VENEZIA				VENEZIA GIULIA E ZARA						Tot	
		Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	TOTALE		Carnaro (Fiume)	Gorizia	Istria (Pola)	Trieste		Zara
						M	F						
	COMPLESSO	6.369	7.253	7.377	6.937	51.483	24.827	1.473	2.890	4.235	4.627	421	13.646
	I. - Malattie infettive e parassitarie	940	1.190	931	995	7.285	3.598	212	350	596	860	67	2.085
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi	81	79	130	53	530	285	2	10	23	17	1	53
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	76	77	121	49	504	269	1	7	21	17	1	47
2	Paratifo	5	2	9	4	26	16	1	3	2	—	—	6
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Febbre ricorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Febbre ondulante	—	3	—	—	6	3	1	—	—	—	—	1
6	Vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	5	20	2	16	87	37	—	7	10	27	—	44
8	Scarlattina	1	—	7	—	11	5	1	—	1	2	—	4
9	Tosse convulsa	51	67	18	55	353	200	4	5	26	30	—	65
10	Difterite	45	57	42	53	306	148	—	7	11	38	—	56
11	Influenza	150	103	128	147	891	427	19	17	22	55	3	116
	a) con complicazioni respiratorie indicate	132	88	107	121	746	358	16	14	19	46	1	98
	b) senza complicazioni respiratorie indicate	18	15	21	26	145	69	3	3	3	9	2	20
13	Dissenteria	6	3	—	3	21	4	3	—	25	10	—	38
	a) amebica	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	b) bacillare	1	2	—	1	4	1	2	—	13	10	—	25
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	5	1	—	2	16	3	1	—	12	—	—	13
15	Risipola	17	21	20	16	114	51	3	3	4	14	3	27
16	Poliomielite a., polioencefalite ac.	4	9	4	6	36	12	—	1	2	1	—	4
17	Encefalite letargica o epidemica	2	5	6	7	48	21	—	2	—	—	—	2
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	1	7	1	4	25	7	1	6	—	3	—	10
20	Pustola maligna e carbonchio	—	1	1	—	3	1	—	—	—	1	—	1
21	Rabbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tetano	14	7	10	13	97	31	—	6	3	8	—	17
23 a 32	Tubercolosi :	482	656	495	521	4.061	2.027	161	264	430	578	54	1.487
23	dell'apparato respiratorio (b)	342	430	386	374	2.845	1.375	128	201	344	480	47	1.200
24	delle meningi e sist. nerv. centr. degli intestini e del peritoneo (c)	66	108	43	57	532	277	15	20	30	56	6	127
25	della colonna vertebrale	20	19	21	31	191	117	4	8	15	4	1	32
26	delle ossa e delle articolaz. (d)	13	38	4	7	95	54	2	5	8	4	—	19
27	della pelle e sottocutaneo	10	16	13	14	104	50	4	10	16	6	—	36
28	del sistema linfatico (e)	2	—	1	—	3	3	—	3	—	—	—	3
29	dell'apparato genito-urinario	1	1	1	2	10	7	—	2	1	—	—	3
30	Altre localizzazioni della tuberc.	8	13	10	9	84	45	2	4	3	6	—	15
31	Tubercolosi disseminata	20	31	16	26	194	99	6	13	12	21	—	52
	a) acuta	12	21	6	13	103	56	5	6	4	17	—	32
	b) cronica	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2
	c) non specificata	8	10	10	13	89	42	1	6	8	3	—	18
33	Lebbra	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
34	Sifilide	11	28	11	16	112	39	12	9	7	40	1	69
	a) congenita	3	7	2	8	31	18	2	4	2	8	1	17
	b) acquisita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata	8	20	9	8	79	21	10	5	5	32	—	52
35	Infezione gonococcica e altre mal. ven.	—	1	—	—	4	2	—	—	1	1	—	2
36	Inf. purulenta e setticemia (f)	61	102	45	66	464	241	4	8	19	28	3	62
	a) setticemia	54	95	42	59	418	226	3	7	16	25	3	54
	b) piemia	5	7	3	7	41	15	1	1	3	3	—	8
	c) gangrena gassosa	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
38	Malaria	2	4	2	—	25	7	—	1	1	—	—	2
	a) febbre malarica	1	3	2	—	18	5	—	1	1	—	—	2
	b) cachessia palustre	1	1	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—
39	Altre mal. dovute a protozoi paras.	1	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

ALE	EMILIA									TOSCANA								NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
	di cui F	Bologna	Ferrara	Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'Emilia	TOTALE		Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa e Carrara		Pisa	Pistoia
										M	F									
6.434	9.113	4.020	5.804	5.599	4.670	3.713	3.468	4.633	41.020	19.167	4.096	10.644	1.947	3.039	4.359	2.316	4.264	2.618		
955	1.342	585	738	657	485	457	453	589	5.286	2.647	503	1.413	236	474	556	311	664	373		
28	47	42	30	37	32	19	18	32	257	158	46	45	14	13	18	19	17	24	1 e 2	
24	46	40	28	37	31	18	17	27	244	148	44	41	11	12	17	19	12	22	1	
4	1	2	2	—	1	1	1	5	13	10	2	4	3	1	—	—	5	2	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	3	1	4	—	6	1	3	2	20	8	1	5	3	2	3	1	7	4	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	
23	16	10	1	26	15	8	—	15	91	45	2	1	2	6	—	2	3	2	7	
1	2	2	2	1	1	—	1	4	13	9	—	4	—	—	1	—	2	—	8	
34	52	22	54	24	19	23	31	26	251	132	13	33	7	3	20	11	25	3	9	
25	36	10	14	22	23	29	9	33	176	86	10	22	6	14	17	7	7	5	10	
62	174	88	148	93	80	61	85	80	809	403	122	215	31	52	131	22	126	49	11	
48	142	67	126	83	69	51	77	66	681	328	111	197	25	48	114	21	100	36	a	
13	32	21	22	10	11	10	8	14	128	75	11	18	6	4	17	1	26	13	b	
21	3	1	3	2	1	4	1	—	15	6	1	—	1	1	1	4	—	—	13	
15	—	—	1	2	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
6	3	1	2	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	b	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	1	1	—	2	—	—	c	
15	24	10	12	12	16	8	8	18	108	54	7	10	4	12	14	8	10	6	15	
2	4	—	5	2	3	—	3	20	20	5	3	12	—	3	1	—	3	6	16	
2	9	1	5	7	8	6	2	2	40	17	1	4	1	1	4	—	7	3	17	
4	7	3	3	—	3	7	—	3	26	12	2	4	—	—	—	—	3	1	18	
—	2	—	2	1	—	—														

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno
 A. — Per Provincie

NUMERI DELL'ELENCO NOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segue: VENEZIA				VENEZIA GIULIA E ZARA						TOT M F	NUMERI DELL'ELENCO NOLOGICO	
		Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	TOTALE		Carnaro (Fiume)	Gorizia	Istria (Pola)	Trieste			Zara
						M F	di cui F							
71	Anemie	4	6	9	7	75	43	2	1	4	6	—	13	
	a) anemia perniciosa progressiva	4	4	5	5	40	27	1	1	2	5	—	8	
	b) altre	—	2	4	2	35	16	1	—	2	1	—	5	
72	Leucemie e aleucemie	21	25	21	22	157	69	1	5	5	13	—	24	
	a) leucemie vere	7	12	14	17	82	42	—	1	1	7	—	11	
	b) aleucemie	14	13	7	5	75	27	1	4	4	6	—	13	
73	Malattie della milza	1	2	1	1	11	8	—	—	—	1	—	1	
74	Altre mal. sangue e org. ematop.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
	V. - Avvelenamenti cronici e intossic.	10	17	8	17	85	14	7	4	4	9	1	25	
75	Alcoolismo	10	17	7	17	81	13	6	4	4	9	1	24	
	a) acuto	—	3	—	2	6	1	1	1	—	1	—	4	
	b) cronico	10	14	7	15	75	12	5	3	4	8	—	20	
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	1	
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b) altri	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	1	
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
	a) professionali	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	b) altri	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	VI. - Mal. del sistema nervoso, ecc. (b)	714	746	965	850	5.866	2.825	115	262	398	259	33	1.167	
78	Encefalite (non epidemica)	8	5	6	4	52	26	2	3	4	5	—	14	
	a) accesso del cervello	1	1	1	—	11	5	—	2	2	4	—	8	
	b) altre	7	4	5	4	41	21	2	1	2	1	—	6	
79	Meningite semplice	32	25	45	43	275	115	2	9	12	13	5	41	
80	Atassia locomotrice progressiva	1	—	2	3	17	7	—	—	5	10	—	15	
81	Altre malattie del midollo spinale	14	8	14	13	86	33	2	3	9	6	—	20	
82	Emorragia, embolia e tromb. cer.	534	598	803	691	4.682	2.325	84	186	275	241	27	813	
	a) emorragia cerebrale	380	421	640	500	3.366	1.702	72	130	203	171	22	598	
	b) embolia e trombosi cerebrale	93	132	81	104	789	404	10	34	31	65	4	144	
	c) emiplegia ed altre paralisi (c)	61	45	82	87	517	219	2	22	41	5	1	71	
83	Paralisi progressiva degli alienati	4	9	7	13	60	13	—	5	3	14	—	22	
84	Demenza precoce e altre psicosi	19	16	27	15	140	70	1	7	9	6	—	23	
	a) demenza precoce	—	2	4	4	33	16	—	3	2	1	—	6	
	b) altre psicosi	19	14	23	11	107	54	1	4	7	5	—	17	
85	Epilessia	20	12	12	12	102	40	2	11	3	6	—	22	
86	Convulsioni (bambini — 5 anni)	45	40	12	27	204	84	17	32	60	35	—	144	
87	Altre malattie del sistema nervoso	20	20	25	17	156	80	—	4	12	8	—	24	
	a) corea	—	1	—	—	5	2	—	2	—	—	—	2	
	b) nevrite	1	3	4	1	14	8	—	—	1	—	—	1	
	c) paralisi agitante	7	10	5	2	47	25	—	1	4	5	—	10	
	d) sclerosi a placche	3	1	8	8	29	13	—	3	2	—	—	5	
	e) altre	9	5	8	6	61	32	—	1	4	1	—	6	
88	Malattie degli organi della vista	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
89	Mal. orecchio e del seno mastoideo	17	13	12	12	91	32	5	2	6	15	1	29	
	a) otite	9	9	8	5	49	19	4	2	3	9	1	19	
	b) altre	8	4	4	7	42	13	1	—	3	6	—	10	
	VII. - Malattie dell'appar. circolatorio	999	961	1.257	1.088	8.098	4.450	221	422	471	562	30	1.706	
90 a 95	Malattie del cuore:	608	668	1.013	903	6.313	3.591	161	376	394	431	28	1.380	
90	Pericardite	3	5	1	3	21	10	4	1	8	3	1	17	
91	Endocardite acuta	7	5	6	7	41	26	3	1	6	8	2	20	
92	Endocardite cr., comp. le aff. valv.	208	209	263	193	1.606	943	43	142	128	133	12	458	
93	Malattie del miocardio	400	300	531	498	3.147	1.834	83	172	183	187	5	630	
	a) miocardite acuta	2	3	13	4	41	25	2	—	—	8	—	4	
	b) miocardite cron. e degeneraz. del miocar.	157	90	248	231	1.387	804	27	139	91	156	—	412	
	c) non specificate	241	207	270	263	1.719	1.005	54	33	92	30	5	214	
94	Mal. arterie coronarie e angina pect.	39	41	32	40	283	99	10	13	15	65	—	103	
95	Altre malattie del cuore	151	108	180	162	1.215	679	18	47	54	35	8	162	
	a) malattie funzionali del cuore	3	5	13	10	82	46	—	2	2	1	—	5	
	b) altre e non specificate	148	103	167	152	1.133	633	18	45	52	34	8	157	
96	Aneurisma, eccet. l'aneur. del cuore	5	9	8	13	53	19	4	1	4	4	—	17	
97	Arteriosclerosi (d)	138	214	175	126	1.347	669	49	32	55	96	—	232	

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

 1937, distinti secondo 200 cause di morte.
 e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	EMILIA									TOSCANA							NUMERI DELL'ELENCO NOLOGICO			
		ALE di cui F	Bologna	Ferrara	Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'Emilia	TOTALE		Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca		Massa e Carrara	Pisa	Pistoia
											M F	di cui F									
		5	9	11	4	10	9	6	—	5	54	24	6	14	1	3	5	5	3	3	71
	a) anemia perniciosa progressiva	4	6	4	3	7	8	2	—	4	34	15	5	10	—	2	3	3	3	1	a
	b) altre	3	5	7	1	3	1	4	—	1	20	9	1	4	1	1	2	2	—	2	b
72	Leucemie e aleucemie	12	30	19	8	16	11	11	9	11	115	49	4	39	8	10	12	4	8	4	72
	a) leucemie vere	8	17	7	6	8	4	8	4	6	60	28	3	19	3	5	6	2	1	1	a
	b) aleucemie	4	13	12	2	8	7	3	5	5	55	21	1	20	5	5	6	2	7	3	b
73	Malattie della milza	1	—	1	3	2	2	1	—	4	13	7	2	—	—	1	1	—	—	—	73
74	Altre mal. sangue e org. ematop.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	74
	V. - Avvelenamenti cronici e intossic.	6	22	2	3	2	5	5	7	9	55	9	10	5	1	2	3	2	5	1	
75	Alcoolismo	6	20	2	2	2	5	5	6	8	50	8	10	4	1	2	3	1	5	1	75
	a) acuto	2	1	—	—	—	—	1	—	2	4	1	—	1	—	—	—	1	1	—	a
	b) cronico	4	19	2	2	2	5	4	6	6	46	7	10	3	1	2	3	—	4	1	b
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) altri	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	77
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
	b) altri	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
	VI. - Mal. del sistema nervoso, ecc. (b)	580	1.242	561	739	803	674	469	448	751	5.687	2.486	603	1.297	287	342	553	234	652		

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno

A. — Per Provincie

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segue: VENEZIA				VENEZIA GIULIA E ZARA								
		Treviso	Venezia	Verona	Vicenza	TOTALE			Carnaro (Fiume)	Gorizia	Istria (Pola)	Trieste	Zara	TOT
		M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	M	F			
98	Cangrena	26	40	30	29	205	83	2	8	13	11	2	36	
	a) senile	6	4	5	2	32	16	—	1	6	—	—	7	
	b) altre	20	36	25	27	173	67	—	7	7	11	2	29	
99	Altre malattie delle arterie	8	23	13	8	93	45	—	2	2	8	—	12	
100	Mal. vene: varici, emorr., fleb., ecc.	12	6	12	8	67	37	4	2	1	8	—	15	
101	Mal. sist. linfat., linfangioite, ecc.	1	—	4	—	11	3	1	1	1	—	—	3	
102	Anomalie idiopatiche press. sang.	1	1	1	—	5	2	—	—	1	—	—	1	
103	Altre mal. dell'appar. circolatorio	—	—	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	
	VIII. - Mal. dell'apparato respiratorio	1.142	1.443	1.045	1.275	8.693	3.859	207	472	692	724	111	2.206	
104	Malattie delle fosse nasali e annessi	1	2	1	—	5	4	—	—	—	1	—	1	
105	Malattie della laringe	9	6	1	8	38	14	1	2	1	2	1	7	
106	Bronchite	156	173	171	111	1.244	602	29	76	160	57	1	323	
	a) acuta	19	25	24	32	221	103	2	19	13	1	1	36	
	b) cronica	59	75	60	39	496	230	11	37	72	46	—	168	
	c) non specificata	78	73	87	40	527	269	16	20	75	10	—	121	
107 a 109	Polmonite, tutte le forme	843	1.124	741	1.022	6.358	2.874	150	341	467	547	98	1.803	
107	Broncop., compr. la bronch. capil.	626	883	559	793	4.828	2.228	95	240	334	364	47	1.080	
108	Polmonite lobare	217	241	182	229	1.530	646	55	101	133	183	51	523	
110	Pleuriti	38	41	44	26	266	94	8	10	15	21	4	58	
111	Congest., edema, ecc. del polm. (b)	19	18	8	17	114	53	3	5	7	12	4	31	
112	Asma	40	20	33	37	290	123	12	17	19	14	2	64	
113	Enfisema polmonare	7	7	11	10	70	22	1	16	15	48	—	80	
114	Altre mal. app. respiratorio (c)	29	52	35	44	308	73	3	5	8	22	1	39	
	a) polmonite interstiziale cronica (d)	—	3	3	12	30	13	—	2	—	—	—	2	
	b) altre, compresa cangrena polmonare	29	49	32	32	278	60	3	5	6	22	1	37	
	IX. - Malattie dell'apparato digerente	581	732	952	675	5.053	2.240	159	202	505	395	84	1.345	
115	Mal. della cavità boccale, ecc. (e)	7	13	19	18	117	54	2	6	5	15	—	28	
116	Malattie dell'esofago	1	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	1	
117	Ulcera dello stom. e del duodeno	48	27	45	37	297	57	11	34	24	75	1	145	
	a) stomaco	33	18	27	22	190	42	9	24	12	48	—	93	
	b) duodeno	15	9	18	15	107	15	2	10	12	27	1	52	
118	Altre mal. stomaco (cancro eccett.)	8	10	15	22	96	43	1	3	12	4	1	21	
119	Enteriti (al disotto di 2 anni)	241	362	541	294	2.404	1.097	97	72	312	117	42	640	
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni e più)	46	83	77	63	452	242	9	19	64	28	14	134	
	a) enterite	45	79	75	60	437	237	9	17	62	25	14	127	
	b) ulcera intestinale	1	4	2	3	15	5	—	2	2	3	—	7	
121	Appendicite	43	40	39	27	277	121	4	13	11	30	9	67	
122	Ernia, occlusione intestinale	62	58	53	49	387	176	13	14	24	32	8	91	
	a) ernia	16	17	28	16	145	56	7	8	12	22	6	55	
	b) occlusione intestinale	46	41	25	33	242	120	6	6	12	10	2	36	
123	Altre malattie dell'intestino	9	9	17	14	71	36	—	—	—	2	1	3	
124	Cirrosi del fegato	50	62	62	68	418	111	10	19	23	43	3	98	
	a) alcoolica	3	6	3	9	26	6	1	2	3	18	—	25	
	b) non indicata come alcoolica	47	56	59	59	392	105	9	17	20	24	3	73	
125	Altre mal. feg. (comp. atrof. gialla)	10	13	12	12	93	44	4	3	6	6	—	19	
126	Calcolosi biliare	7	18	21	8	87	74	2	4	7	23	1	37	
127	Altre m. della vescichetta e vie bil.	17	18	17	18	109	62	1	4	6	15	2	28	
128	Malattie del pancreas	2	2	—	3	13	3	—	2	—	2	—	4	
129	Peritonite senza causa indicata	30	17	34	42	228	118	4	9	11	3	2	29	
	X. - Mal. dell'app. urinario, ecc. (f)	249	293	225	258	1.822	748	78	72	94	169	14	427	
130 a 132	Nefrite:	174	222	150	174	1.266	840	54	60	68	111	9	302	
130	acuta	28	34	31	44	239	120	3	5	10	15	1	34	
131	cronica	87	94	82	66	568	285	36	29	45	87	1	198	
132	non specificata	59	94	37	64	459	235	15	26	13	9	7	70	

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali dell'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (f) e dell'apparato genitale.

1937, distinti secondo 200 cause di morte.

e Compartimenti.

ALE	EMILIA									TOSCANA								NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO			
	di cui F	Bologna	Ferrara	Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio nell'Emilia	TOTALE			Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Luca		Massa e Carrara	Pisa	Pistoia
		M	F	di cui F	M	F	M	F	M	F	M	F									
12	58	34	25	32	21	19	30	19	238	108	14	48	6	19	26	6	23	10	98		
2	8	11	5	6	1	2	12	3	48	16	5	4	—	1	2	—	—	—	104		
10	50	23	20	26	20	17	18	16	190	92	9	44	6	18	24	6	18	10	105		
6	14	6	5	21	10	8	6	7	77	40	6	17	6	7	4	3	9	1	99		
10	13	6	4	5	4	3	4	5	44	22	—	9	—	4	2	4	3	3	100		
1	1	3	1	—	3	—	—	1	9	6	2	—	—	1	1	—	—	1	101		
1	3	—	—	—	1	—	—	1	5	2	1	—	—	1	—	—	—	1	102		
—	2	—	—	—	—	—	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	103		
961	1.511	619	1.164	1.022	888	667	643	756	7.270	3.402	779	2.092	269	569	698	354	668	422			
—	1	—	—	2	1	—	—	5	4	—	1	—	—	2	—	—	—	—	104		
6	3	2	4	2	4	2	2	19	9	1	5	2	—	—	—	—	—	—	105		
133	195	92	270	120	176	115	96	107	1.171	627	111	271	69	92	131	46	161	101	106		
17	37	22	60	15	23	24	11	8	200	107	11	26	7	16	11	5	12	9	a		
54	81	37	114	47	78	36	56	37	486	274	54	100	25	38	58	20	71	48	b		
62	77	33	96	58	75	55	29	62	485	244	46	145	37	38	62	21	78	44	c		
721	1.130	474	802	797	597	494	488	578	5.360	2.472	606	1.631	169	411	487	259	434	267	107 a 109		
496	832	356	593	613	431	369	356	410	3.960	1.896	428	1.177	104	305	360	178	350	188	107		
225	298	118	209	194	166	125	132	168	1.400	576	178	454	65	106	127	81	84	79	108		
22	63	12	26	24	32	15	14	16	202	84	14	46	5	19	29	14	14	16	110		
18	21	11	6	13	16	4	5	9	85	41	12	60	4	4	13	10	19	7	111		
26	58	16	34	44	25	19	33	19	248	115	16	24	9	17	18	14	23	19	112		
30	7	—	8	4	10	3	2	3	37	15	6	15	6	9	5	1	4	2	113		
5	33	12	14	16	28	14	4	22	143	35	13	39	5	15	15	10	13	10	114		
—	1	—	1	—	1	—	—	1	4	3	1	2	1	—	—	1	1	—	a		
5	32	12	13	16	27	14	4	21	139	32	12	37	4	15	15	9	12	10	b		

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Province

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, etc.), including sub-totals and grand totals for Veneto, Venezia Giulia e Zara, and Tot.

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for causes of death and provinces (ALE, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Toscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia), including sub-totals and grand totals.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacini e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) ma specificata come settica. (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli

comprese le emorragie. (e) non comprese le emorragie. (f) non specificate come conseguenza d'aborto. (g) embolia o morte improvvisa puerperale (non altri organi della locomozione. (n) non compresi i nati morti.

Segue: TAVOLA 1. - Morti, durante l'anno

A. - Per Province

Table with columns for causes of death (CAUSE DI MORTE) and provinces (Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, etc.). It includes sub-sections like 'XVI. - Senilità' and 'XVII. - Morti violente e accidentali'.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno e un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (l) Vedi la nota (l) a pag. 12. (m) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta.

1937, distinti secondo 200 cause di morte.

e Compartimenti.

Table with columns for causes of death and compartments (EMILIA: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, etc.; TOSCANA: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, etc.). It includes a 'TOTALE' column for each region.

più. (e) ecettuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite ad

Segue : TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno
A. — Per Province

1937, distinti secondo 200 cause di morte.
e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segue : TOSCANA			MARCHE				UMBRIA					
		Siena	TOTALE		Ancona	Ascoli Piceno	Macerata	Pesaro e Urbino	TOTALE		Perugia	Terni	TOTALE	
			M	F					di cui F	M			F	di cui F
	COMPLESSO	3.452	36.735	17.342	4.459	3.769	3.765	4.660	16.653	7.977	7.234	2.412	9.646	4.479
	I. - Malattie infettive e parassitarie	421	4.951	2.470	530	391	364	551	1.836	876	915	305	1.218	604
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi	15	211	126	25	45	30	56	156	88	62	18	80	52
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	15	193	115	25	44	27	53	149	86	60	17	77	50
2	Paratifo	—	18	11	—	1	3	3	7	2	2	1	3	2
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Febbre ricorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Febbre ondulante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo	2	28	8	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	1	19	8	2	35	2	13	52	25	11	2	13	7
8	Scarlattina	—	7	4	3	—	—	1	4	1	1	3	4	1
9	Tosse convulsa	2	117	65	4	5	8	23	40	16	54	12	66	41
10	Difterite	9	97	48	26	13	22	30	91	49	43	10	53	25
11	Influenza	72	820	396	111	71	85	98	365	174	205	85	290	115
	a) con complicazioni respiratorie indicate	65	717	336	102	65	66	87	320	148	184	76	260	104
	b) senza complicazioni respiratorie indicate	7	103	60	9	6	19	11	45	26	21	9	30	11
13	Dissenteria	1	9	2	2	1	3	2	8	1	3	1	4	2
	a) amebica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) bacillare	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	1	6	1	—	1	2	1	4	1	2	—	2	1
15	Risipola	7	78	37	17	11	7	7	42	18	16	11	27	11
16	Poliomielite a., polioencefalite ac.	1	29	8	4	5	8	4	21	8	4	1	5	2
17	Encefalite letargica o epidemica	2	23	11	2	4	4	5	15	7	4	3	7	3
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	1	11	4	—	—	—	3	3	1	2	—	2	—
20	Pustola maligna e carbonchio	1	26	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Rabbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tetano	5	40	11	9	4	4	3	20	9	15	5	20	5
23 a 32	Tubercolosi :	258	2.989	1.515	282	172	159	267	880	427	440	126	566	306
23	dell'apparato respiratorio (b)	177	2.249	1.123	202	106	111	198	617	292	299	91	390	203
24	delle meningi e sist. nerv. centr. degli intestini e del peritoneo (c)	14	222	116	28	23	18	25	94	44	45	12	57	33
25	della colonna vertebrale	16	134	77	9	17	8	10	44	23	29	7	36	19
26	delle ossa e delle articolaz. (d)	4	53	20	7	2	5	5	19	10	4	2	6	4
27	della pelle e sottocutaneo	10	98	55	3	5	5	5	18	10	4	3	7	4
28	del sistema linfatico (e)	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	dell'apparato genito-urinario	—	11	4	—	1	—	1	2	1	5	1	6	3
30	Altre localizzazioni della tuberc.	3	41	17	6	4	2	5	17	7	4	2	6	4
31	Tubercolosi disseminata	33	178	100	27	14	10	18	69	40	50	8	58	36
	a) acuta	11	70	38	21	7	8	9	45	28	13	3	16	11
	b) cronica	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	c) non specificata	22	106	61	6	7	2	9	24	12	36	5	41	25
33	Lebbra	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Sifilide	6	69	26	8	2	5	6	21	5	7	10	17	7
	a) congenita	2	22	9	4	—	1	4	9	4	1	4	5	3
	b) acquisita	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata	4	46	16	4	2	4	2	12	1	6	6	12	4
35	Infezione gonococcica e altre mal. ven.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Infez. purulenta e setticemia (f)	33	321	168	30	20	22	26	98	39	35	13	48	19
	a) setticemia	30	295	159	28	17	22	23	90	37	29	13	42	15
	b) piemia	3	25	9	2	—	—	—	7	2	5	—	5	4
	c) gangrena gassosa	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
38	Malaria	1	12	3	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—
	a) febbre malarica	—	6	2	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
	b) cachessia palustre	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Altre mal. dovute a protozoi paras.	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	L A Z IO					A B R U Z Z I E M O L I S E					C A M P A N I A					NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO								
	Frosinone	Littoria	Rieti	Roma	Viterbo	TOTALE			Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Pescaia	Teramo	TOTALE			Avellino	Benevento	Napoli	Salerno	TOTALE			
						M	F	di cui F						M	F						di cui F	M	F	di cui F
	COMPLESSO	6.426	2.766	2.343	18.875	3.195	33.605	16.042	5.631	7.152	5.802	2.919	3.654	25.158	12.716	6.919	5.247	35.680	11.553	59.399	29.337			
	I. - Malattie infettive e parassitarie	505	285	217	3.217	345	4.569	2.198	644	521	596	234	445	2.440	1.256	509	412	3.895	1.206	6.022	2.882			
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi	60	35	20	138	29	282	142	90	72	72	24	29	287	177	63	48	284	113	508	274			
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	59	35	17	130	27	268	136	86	67	67	21	28	269	163	56	36	265	94	451	244			
2	Paratifo	1	—	3	8	2	14	6	4	5	5	3	1	18	14	7	12	19	19	57	30			
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
4	Febbre ricorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	Febbre ondulante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	Vaiolo	2	—	1	2	2	7	3	1	1	—	—	—	2	1	5	1	8	4	18	7			
	a) vaiolo	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
7	Morbillo	5	1	—	37	2	45	21	30	13	10	1	29	83	39	28	19	204	96	347	140			
8	Scarlattina	1	5	1	28	2	37	21	—	1	1	1	3	3	2	3	3	17	—	23	13			
9	Tosse convulsa	17	24	19	154	14	228	144	44	44	57	18	12	175	91	27	18	44	25	114	67			
10	Difterite	23	14	12	134	12	195	96	49	16	28	20	65	178	86	12	10	144	32	198	93			
11	Influenza	108	74	40	404	81	707	356	132	66	94	33	59	384	182	114	107	680	242	1.143	556			
	a) con complicazioni respiratorie indicate	93	68	28	358	71	618	310	112	44	73	28	44	301	145	85	81	547	176	889	412			
	b) senza complicazioni respiratorie indicate	15	6	12	46	10	89	46	20	22	21	5	16	83	37	29	26	133	66	264	144			
13	Dissenteria	—	1	1	3	—	5	4	5	5	11	3	—	24	8	2	2	9						

Segue : TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Provincie

Table with columns for provinces (Toscana, Marche, Umbria) and causes of death. Includes sub-sections II (Tumori) and III (Malattie reumatiche).

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for provinces (Lazio, Abruzzi e Molise, Campania) and causes of death. Includes sub-sections IV (Malattie del sangue) and V (Stati emorragici).

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari).

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Provincie

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segue: TOSCANA											MARCHE				UMBRIA				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
		Siena	TOTALE			Ancona	Ascoli Piceno	Macerata	Pesaro e Urbino	TOTALE			Perugia	Terni	TOTALE							
			M	F	di cui F					M	F	di cui F			M	F	di cui F					
98	Cangrena	9	161	59	17	12	15	10	54	18	16	5	21	11								
	a) senile	1	18	7	3	2	3	2	10	3	—	—	—	—								
	b) altre	8	143	52	14	10	12	8	44	15	16	5	21	11								
99	Altre malattie delle arterie	6	59	23	10	8	4	11	33	13	9	3	12	5								
100	Mal. vene: varici, emorr., fleb., ecc.	2	27	14	4	2	4	10	20	9	6	1	7	4								
101	Mal. sist. linfat. linfangioite, ecc.	1	9	4	—	2	1	2	5	2	2	1	3	2								
102	Anomalie idiopatiche press. sang.	2	6	1	3	1	—	2	6	2	—	1	1	1								
103	Altre mal. dell'appar. circolatorio	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1								
	VIII. - Mal. dell'apparato respiratorio	524	6.375	2.985	696	665	534	915	2.810	1.282	1.267	357	1.624	677								
104	Malattie delle fosse nasali e annessi	1	4	2	1	—	1	—	2	1	—	1	1	—								
105	Malattie della laringe	2	10	4	3	4	3	2	12	9	3	—	3	2								
106	Bronchite	101	1.083	567	140	90	121	214	565	281	238	81	319	142								
	a) acuta	14	111	53	24	18	19	34	91	44	39	18	55	27								
	b) cronica	43	457	245	71	45	65	96	277	145	110	29	139	66								
	c) non specificata	44	515	269	45	27	41	84	197	92	89	38	125	49								
107 a 109	Polmonite, tutte le forme	364	4.628	2.177	480	519	355	638	1.992	895	930	248	1.178	487								
107	Polnecop., compr. la bronch. capil.	277	3.367	1.619	339	349	270	464	1.422	653	661	160	821	360								
108	Polmonite lobare	87	1.261	558	141	170	85	174	570	242	269	88	357	127								
110	Pleuriti	18	175	63	19	12	17	15	63	37	23	11	34	16								
111	Congest., edema, ecc. del pulm. (b)	13	142	58	14	9	8	7	38	14	14	2	16	9								
112	Asma	16	156	68	24	22	17	23	86	31	33	6	39	15								
113	Enfisema polmonare	3	51	15	6	4	3	6	19	7	5	4	9	3								
114	Altre mal. app. respiratorio (c)	6	126	31	9	5	9	10	33	7	21	4	25	3								
	a) polmonite interstiziale cronica (d)	—	6	4	3	2	1	3	9	3	1	—	1	—								
	b) altre, compresa cangrena polmonare	6	120	27	6	3	8	7	24	4	20	4	24	3								
	IX. - Malattie dell'apparato digerente	282	2.905	1.205	445	357	380	477	1.659	729	716	217	933	407								
115	Mal. della cavità boccale, ecc. (e)	3	90	39	8	11	9	20	48	24	19	6	25	9								
116	Malattie dell'esofago	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
117	Ulcera dello stom. e del duodeno	27	273	55	25	11	16	14	66	13	38	18	56	8								
	a) stomaco	23	186	37	15	10	14	9	48	12	28	11	39	6								
	b) duodeno	4	87	18	10	1	2	5	18	1	10	7	17	2								
118	Altre mal. dello stomaco (cancro eccett.)	6	46	25	8	9	7	10	34	15	6	2	8	2								
119	Enteriti (al disotto di 2 anni)	56	817	367	191	209	181	246	827	388	342	82	424	210								
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni e più)	57	378	180	48	20	44	52	164	82	73	27	100	50								
	a) enterite	55	365	175	47	19	43	51	160	81	71	28	97	49								
	b) ulcera intestinale	2	13	5	1	1	1	1	4	1	2	1	3	1								
121	Appendicite	21	221	87	37	16	22	30	105	48	49	18	67	30								
122	Ernia, occlusione intestinale	28	330	133	35	19	28	25	107	43	53	21	74	20								
	a) ernia	11	139	44	20	7	12	14	53	21	22	12	34	5								
	b) occlusione intestinale	17	191	89	15	12	16	11	54	22	31	9	40	15								
123	Altre malattie dell'intestino	3	49	24	3	4	3	2	12	4	3	3	6	3								
124	Cirrosi del fegato	28	289	76	55	36	30	35	156	42	72	16	88	30								
	a) alcoolica	1	9	1	4	4	2	—	10	3	10	1	11	3								
	b) non indicata come alcoolica	27	280	75	51	32	28	35	146	39	62	15	77	27								
125	Altre mal. feg. (comp. atrof. gialla)	10	60	24	7	5	6	12	30	10	11	4	15	7								
126	Calcolosi biliare	9	76	57	5	1	8	3	17	11	17	4	21	9								
127	Altre m. della vescichetta e vie bil.	6	79	52	13	7	4	8	32	13	18	8	26	17								
128	Malattie del pancreas	—	3	1	2	1	2	1	6	3	—	1	1	1								
129	Peritonite senza causa indicata	27	191	83	8	8	20	19	55	33	15	7	22	11								
	X. - Mal. dell'app. urinario, ecc. (f)	131	1.371	578	210	142	162	149	663	284	252	99	351	157								
130 a 132	Nefrite:	82	909	463	148	93	124	108	476	233	175	85	240	130								
130	acuta	7	117	54	15	20	31	24	90	42	33	10	43	27								
131	cronica	45	408	218	76	45	62	44	227	127	72	39	111	64								
132	non specificata	30	384	191	57	33	31	38	159	64	70	16	86	39								

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali dell'appa-

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	LAZIO										ABRUZZI E MOLISE					CAMPANIA					NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
	Frosinone	Littoria	Rieti	Roma	Viterbo	TOTALE			Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Pescaia	Teramo	TOTALE			Avellino	Benevento	Napoli	Salerno		TOTALE	
						M	F	di cui F						M	F	di cui F						M	F
98	6	5	3	47	9	70	22	12	13	10	1	2	38	20	9	4	60	17	90	41	98		
	1	1	2	5	4	13	6	3	4	2	1	—	10	3	—	—	11	3	14	7	a		
	5	4	1	42	5	57	16	9	9	8	—	2	28	17	9	4	49	14	76	34	b		
	11	4	4	25	7	51	27	3	10	12	1	2	29	12	9	13	108	21	151	54	99		
	3	2	1	15	3	24	11	2	5	1	2	—	10	4	3	1	25	2	31	17	100		
	2	—	—	2	—	4	1	3	1	—	1	—	5	3	2	—	2	3	7	4	101		
	4	—	—	16	2	22	12	1	1	1	—	—	3	2	—	1	1	1	3	2	102		
	3	—	—	2	—	5	2	—	—	1	—	—	1	1	—	2	2	1	5	2	103		
	1.138	521	329	3.493	471	5.952	2.683	718	1.233	965	469	582	3.967	1.872	1.380	1.060	8.147	2.452	13.039	6.249			
104	6	1	1	9	—	8	2	—	6	4	3	3	18	9									

Segne: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Provincie

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segne: TOSCANA				MARCHE				UMBRIA								
		TOTALE			Ancona	Ascoli Piceno	Macerata	Pesaro e Urbino	TOTALE			Perugia	Terni	TOTALE				
		M	F	di cui F					M	F	di cui F			M	F	di cui F		
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b)	13	84	44	14	9	8	12	43	23	8	9	17	12				
	a) pielite	8	46	26	7	8	5	4	24	16	5	5	10	6				
	b) altre	5	38	18	7	1	3	8	19	7	3	4	7	6				
134	Calcolosi delle vie urinarie	4	37	11	3	5	7	8	23	6	17	7	24	6				
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori	2	19	9	—	5	6	6	17	6	9	4	13	6				
	b) calcolosi della vescica	2	18	2	3	—	1	2	6	—	8	3	11	—				
	c) calcolosi senza altre indicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	14	139	43	13	7	8	2	30	7	16	5	21	2				
	a) cistite	10	119	42	11	6	6	1	24	6	15	5	20	2				
	b) altre	4	20	1	2	1	2	1	6	1	1	—	1	—				
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	3	14	—	3	1	2	2	8	—	2	2	4	—				
	a) stenosi uretrale	1	9	—	1	—	1	2	4	—	1	—	3	—				
	b) altre	2	5	—	2	1	1	—	4	—	1	—	1	—				
137	Malattie della prostata	14	169	—	20	18	11	17	66	—	27	10	37	—				
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c)	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—				
139	Mal. organi genitali della donna (c)	1	17	17	8	4	1	2	15	15	6	1	7	7				
	a) ovaie, trombe e parametri	1	4	4	3	1	—	2	6	6	4	1	5	5				
	b) utero	—	10	10	5	1	1	—	7	7	1	—	1	1				
	c) mammelle	—	3	3	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1				
	d) altre	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—				
	XI. - Malattie gravid., parto e puerp.	19	164	164	20	15	13	23	71	71	39	17	56	56				
140	Aborto con condizioni settiche	3	7	7	2	—	2	2	6	6	4	—	4	4				
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d)	—	4	4	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1				
142	Gestazione ectopica	—	9	9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2				
143	Altri accidenti della gravidanza (e)	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—				
144	Emorragia puerperale	5	22	22	1	4	1	5	11	11	4	—	4	4				
	a) da placenta previa	1	3	3	1	—	—	4	5	5	1	—	1	1				
	b) altre emorragie	4	19	19	—	4	1	1	6	6	3	—	3	3				
145	Setticemia e infezioni puerperali (f)	3	56	56	7	4	2	5	18	18	10	10	20	20				
	a) setticemia e piemia puerperali	3	56	56	7	4	2	5	18	18	10	10	20	20				
	b) tetano puerperale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
146	Albuminuria e eclampsia puerper.	7	38	38	6	4	3	6	19	19	13	3	16	16				
147	Altre forme di tossiemia della grav.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g)	—	6	6	—	1	2	—	3	3	4	—	4	4				
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2				
	b) embolia o morte improvvisa	—	4	4	—	1	2	—	3	3	4	—	4	4				
149	Altri accidenti del parto	1	19	19	4	2	2	5	13	13	3	2	5	5				
150	Altre malattie non definite (h)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.	14	132	47	20	18	11	22	71	36	23	17	40	16				
151	Foruncoli	1	14	5	4	3	—	6	13	6	4	5	9	2				
152	Flemmone, ascesso caldo	10	85	32	15	11	8	15	49	22	16	12	28	12				
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i)	3	33	10	1	4	3	1	9	8	3	—	3	2				
	XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione	9	97	40	13	7	10	11	41	16	19	10	29	9				
154	Osteomielite infettiva acuta	6	57	24	8	4	8	10	30	11	12	7	19	8				
155	Altre malattie delle ossa (l)	1	17	6	3	2	1	—	6	3	3	1	4	—				
156	Mal. articolazioni, ecc. (m)	2	23	10	2	1	1	1	5	2	4	2	6	1				
	a) articolaz. (eccett. la tbc. e il reumatismo)	2	17	8	2	1	1	1	5	2	4	2	6	1				
	b) altri organi della locomozione	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	XIV. - Vizi di conformazione congen.	18	162	71	26	30	21	33	110	55	37	13	50	23				
157	Vizi di conformazione congeniti (n)	18	162	71	26	30	21	33	110	55	37	13	50	23				
	a) idrocefalia	3	14	7	3	—	—	8	13	8	5	1	6	3				
	b) spina bifida e meningocele	4	25	12	2	4	8	4	18	13	7	2	9	5				
	c) malformazioni congenite del cuore	8	78	34	7	13	6	10	36	18	14	6	20	5				
	d) mostruosità	—	7	2	1	2	4	—	7	2	1	1	2	1				
	e) altri	3	38	16	13	11	1	11	38	14	10	3	13	9				
	XV. - Malattie dell'infanzia	172	1.504	658	193	177	171	378	919	385	349	138	487	210				
158	Debolezza congenita	28	338	156	59	71	59	195	384	167	118	32	150	66				
159	Nascita prematura (n)	115	826	363	87	71	73	125	356	151	182	72	254	109				

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) ma specificata come settica. (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	L A Z IO							A BR U Z Z I E M O L I S E					C A M P A N I A					NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO				
	Frosinone	Littoria	Rieti	Roma	Viterbo	TOTALE		Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Pescara	Teramo	TOTALE		Avellino	Benevento	Napoli		Salerno	TOTALE		
						M	F						M	F						M	F	M
133	14	1	2	51	7	75	36	6	17	8	6	5	42	19	18	7	102	22	149	75	133	
	7	—	—	32	3	42	23	4	10	3	2	5	24	12	7	3	58	12	80	35	a	
	7	1	2	19	4	33	13	4	7	5	4	—	18	7	11	4	44	10	69	40	b	
134	4	—	2	20	3	29	13	5	5	1	—	5	16	6	5	3	38	3	49	20	134	
	2	—	—	15	3	22	12	2	5	—	—	3	10	6	5	1	26	3	35	20	a	
	2	—	—	5	—	7	—	3	—	1	—	2	6	—	2	—	10	—	12	—	b	
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
135	10	4	4	49	11	78	29	7	10	14	8	4	43	9	24	13	113	28	178	22	135	
	10	3	3	39	8	63	23	4	10	9	8	4	35	7	21	11	89	26	147	21	a	
	—	1	1	10	3	15	6	3	—	5	—	—	8	2	3	2	24	2	51	1	b	
136	—	1	—	14	2	17	—	2	2	4	—	—	8	—	—	—	20	3	23	—	136	
	—	1	—	11	2	14	—	1	—	4	—	—	5	—	—	—	5	2	7	—	a	
	—	1	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	15	1	16	—	b	
137	14	3	1	114	17	149	—	27	12	21	9	7	76	9	17	86	24	136	—	—	—	

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Provincie

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Segue: TOSCANA									MARCHE						UMBRIA											
		Siena			Arezzo			Livorno			Ancona			Ascoli Piceno			Macerata			Pesaro e Urbino			Perugia			Terni		
		TOTALE			TOTALE			TOTALE			TOTALE			TOTALE			TOTALE			TOTALE			TOTALE					
		M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F	M	F	di cui F			
160	Conseguenze del parto (b)	5	67	33	8	11	8	8	35	11	12	11	23	9														
	a) con indicazione di operazione cesarea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
	b) senza indicazione di operazione cesarea.	5	67	33	8	11	8	35	11	12	11	23	9															
161	Altre malatt. speciali dell'infanzia	24	273	106	39	24	31	50	144	56	37	23	60	26														
	a) atelectasia	1	7	3	1	2	—	1	4	2	1	2	1															
	b) ittero dei neonati	4	43	13	8	1	1	5	15	6	5	3	8	1														
	c) sclerema e altre.	19	223	90	30	21	30	44	125	48	31	19	50	24														
	XVI. - Senilità	159	2.071	1.142	279	342	362	298	1.281	706	537	111	648	331														
162	Senilità	159	2.071	1.142	279	342	362	298	1.281	706	537	111	648	331														
	a) con demenza senile.	—	39	19	11	6	4	4	25	12	26	—	26	13														
	b) senza demenza senile.	159	2.032	1.123	268	336	358	294	1.256	694	511	111	622	318														
	XVII. - Morti violente e accidentali.	116	1.228	264	155	115	106	111	487	130	241	109	350	76														
163 a 171	Suicidi:	32	238	59	31	10	24	19	84	25	37	21	58	16														
163	per ingestione di veleni (c)	1	25	10	2	1	1	—	4	2	—	2	1															
164	con gas tossici	—	4	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—															
165	per impiccamento o strangol.	16	78	14	7	4	14	4	29	10	10	5	15	3														
166	per annegamento	6	31	16	2	—	3	2	7	1	6	4	10	5														
167	con arma da fuoco	3	40	3	5	2	3	6	16	4	8	3	11	1														
168	con arma da punta e da taglio	—	9	1	2	—	2	2	6	1	—	2	2	1														
169	per precipitaz. da luogo elev.	5	34	8	12	2	1	3	18	7	9	2	11	3														
170	per schiacciamento	1	14	5	1	—	—	1	2	—	3	2	5	2														
171	con altri mezzi	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—														
172 a 175	Omicidi:	27	7	3	1	2	2	8	1	8	2	10	5															
172	Infanticidio (— un anno)	—	2	1	—	—	1	1	2	1	1	1	2	1														
	a) subito dopo la nascita.	—	2	1	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—														
	b) altri, prima d'un anno.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
173	Omicidi con arma da fuoco (d)	—	15	5	2	—	1	—	3	—	4	1	5	3														
174	Omicidi arma da tagl. e da punta (d)	—	5	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—														
175	Omicidi con altri mezzi (d)	—	5	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	1														
176 a 194	Morti accidentali:	83	957	196	120	103	80	90	393	103	195	86	281	55														
176	Morsi o punture d animali velenosi.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
177	Avvelenamenti da alimenti guasti	1	10	3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1														
178	Assorbimento di gas tossici	3	9	—	—	—	—	3	3	1	1	2	3	1														
179	Altri avvelenam. accident. acuti (e)	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—														
180	Per incendio	—	3	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—														
181	Per ustioni accidentali (f)	8	78	36	6	21	11	17	55	35	31	10	41	21														
182	Per soffocazione meccanica accid.	1	9	2	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—														
183	Per annegamento accidentale	8	95	17	24	9	16	7	56	20	30	15	45	11														
184	Per trauma acc. arma da fuoco (g)	3	19	3	4	2	—	2	8	1	3	3	6	1														
185	Per trauma acc. arma pun. o tagl. (g)	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—														
186	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h)	53	627	120	74	58	43	50	225	41	116	36	152	19														
187	Per cataclisma (i)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
188	Per violenze di animali	1	12	2	1	3	1	2	7	—	1	2	3	—														
189	Per fame o sete (l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
190	Per freddo eccessivo	—	6	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—														
191	Per caldo eccessivo	1	6	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—														
192	Per fulmine	1	13	5	1	1	—	—	2	1	3	2	5	—														
193	Per accidenti dovuti a corr. elettr.	1	15	1	2	3	3	1	9	1	2	3	5	—														
194	Per altri accidenti	1	50	4	7	4	5	7	23	1	5	6	11	1														
	a) corpi estranei	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
	b) altri	1	48	3	7	4	5	7	23	1	5	6	11	1														
195	Morte violenta, ecc. (m)	1	6	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—														
196	Per ferite di guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
198	Per esecuzione giudiziaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
	XVIII. - Cause di morte non determ.	12	262	96	29	44	28	33	134	58	49	12	61	22														
199	Morte improvvisa	10	236	87	26	32	25	31	114	50	41	10	51	18														
200	Cause non specific. o mal definite.	2	26	9	3	12	3	2	20	8	8	2	10	4														

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	L'AZIO											ABRUZZI E MOLISE					CAMPANIA					NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO					
	Frosinone	Litoria	Rieti	Roma	Viterbo	TOTALE			Aquila degli Abruzzi	Campobasso	Chieti	Pescara	Teramo	TOTALE			Avellino	Benevento	Napoli	Salerno	TOTALE						
						M	F	di cui F						M	F	di cui F					M		F	di cui F	M	F	di cui F
160	7	6	69	11	111	39	7	7	11	3	4	32	15	5	6	47	14	72	25	160							
	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160							
	18	7	68	11	110	39	7	7	11	3	4	32	15	5	6	47	14	72	25	160							
161	49	19	164	27	327	146	48	88	36	27	23	222	88	130	57	299	108	594	244	161							
	2	—	7	1	10	5	1	4	—	—	—	5	4	4	3	23	1	31	17	161							
	16	18	3	28	1	66	24	9	11	9	7	7	43	15	27	12	44	13	96	35	161						
	52	29																									

Segue : TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartmenti.

Table with columns for 'CAUSE DI MORTE (a)', 'PUGLIE', 'LUCANIA', and 'TOTALE'. Rows include 'COMPLESSO', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', and various specific diseases like 'Febbre tifoide e paratifi', 'Difterite', 'Influenza', etc.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale ec-

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartmenti.

Table with columns for 'CALABRIE', 'SICILIA', and 'SARDEGNA'. Rows include 'COMPLESSO', 'I. - Malattie infettive e parassitarie', and various specific diseases like 'Febbre tifoide e paratifi', 'Difterite', 'Influenza', etc.

cettuata. (e) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali. (f) non puerperali,

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno
A. — Per Province

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	PUGLIE					LUCANIA					
		Bari	Brindisi	Foggia	Jonio (Taranto)	Lecce	TOTALE		Matera	Potenza	TOTALE	
							M F	di cui F			M F	di cui F
40	Anchilostomiasi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Cisti idatica	8	3	2	2	2	17	9	1	1	2	—
	a) del fegato	5	3	1	2	1	12	7	—	1	1	—
	b) altre localizzazioni	3	—	1	—	1	5	2	1	—	1	—
42	Altre malattie dovute a elminti	12	10	6	3	38	69	34	7	15	22	6
43	Micosi	1	—	—	—	2	4	—	—	6	6	2
44	Altre mal. infettive e parassitarie	2	2	—	1	6	11	7	1	—	1	—
	II. - Tumori (neoplasie)	492	134	235	161	270	1.292	768	58	156	214	134
45 a 53	Cancro e altri tumori maligni	462	123	225	152	251	1.213	723	53	148	201	125
45	Tumori mal. della bocca e faringe	18	10	4	7	29	68	10	3	5	8	—
46	Tumori mal. tubo dig. e peritoneo	175	47	102	59	65	448	232	22	68	90	51
	a) esofago	—	1	3	—	3	7	1	1	4	5	2
	b) stomaco e duodeno	46	15	52	20	24	157	78	12	36	48	31
	c) retto	23	5	7	6	4	45	25	1	2	3	2
	d) fegato e vie biliari	80	19	21	24	21	165	94	4	19	23	14
	e) pancreas	4	—	2	4	2	12	4	—	2	2	1
	f) peritoneo	6	—	2	2	1	11	8	1	—	1	1
	g) altri organi	16	7	15	3	10	51	22	3	5	8	—
47	Tumori maligni dell'app. respirat.	18	4	9	7	9	47	14	3	5	8	3
48	— dell'utero	75	20	36	32	42	205	205	10	17	27	27
49	— degli altri org. genit. della donna	9	—	2	1	5	17	17	—	3	3	3
50	— delle mammelle	41	11	17	12	30	111	110	3	13	16	16
51	— degli org. genito-urin. dell'uomo	26	3	10	10	13	62	—	3	5	8	—
52	— della pelle	24	12	16	5	12	69	26	2	10	12	7
53	— di altri organi o di org. non spec.	76	16	29	19	46	186	109	7	22	29	18
54	Tumori non maligni	26	9	7	7	17	66	41	4	7	11	8
	a) organi genitali della donna	10	3	3	2	9	27	27	2	4	8	6
	b) altri organi	16	6	4	5	8	39	14	2	3	5	2
55	Tumori a carattere mal. non spec.	4	2	3	2	2	13	4	1	1	2	1
	a) organi genitali della donna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri organi	4	2	3	2	2	13	4	1	1	2	1
	III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b)	225	52	96	55	117	545	270	40	104	144	71
56	Reumatismo articolare acuto	61	20	26	18	32	157	77	10	29	39	20
57	Reumatismo cronico, osteo-artrite	14	2	13	7	12	48	27	9	10	19	10
58	Gotta	2	1	—	1	3	7	3	—	1	1	—
59	Diabete mellito	68	20	22	22	35	167	81	8	22	30	10
60	Scorbuto	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	1
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
	b) scorbuto	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—
61	Berberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Rachitismo	13	2	12	2	11	40	27	2	23	25	17
64	Osteomalacia	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—
65	Mal. ghiand. pituitaria (ipofisi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi	10	4	6	1	5	26	15	5	10	5	5
	a) gozzo semplice	—	2	—	—	2	2	2	—	3	2	2
	b) gozzo esoftalmico	6	—	1	1	1	9	7	2	—	2	2
	c) mixedema e cretinismo	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—
	d) tetania	4	—	4	—	3	11	4	3	1	4	1
	e) altre	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—
67	Malattie del timo	2	1	1	1	3	8	4	—	2	2	2
68	Mal. ghiand. o capsule surren. (c)	10	—	1	—	1	12	4	1	2	3	2
69	Altre malattie generali	44	2	15	2	14	77	31	5	8	13	4
	IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici	75	29	43	40	76	263	129	14	32	46	22
70	Stati emorragici	14	9	13	2	13	51	21	3	5	8	3
	a) porpora primitiva	7	6	12	2	5	32	14	3	4	7	3
	b) emofilia	7	3	1	—	8	19	7	—	1	1	—

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari).

1937, distinti secondo 200 cause di morte.
e Compartimenti.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CALABRIE										SICILIA										SARDEGNA					NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	Catanzaro	Cosenza	Reggio di Calabria	TOTALE		Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	TOTALE		Cagliari	Nuoro	Sassari	TOTALE						
				M F	di cui F										M F	di cui F										
—	—	1	3	4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	40			
41	—	2	—	2	—	3	2	6	1	3	10	3	1	5	34	18	6	2	8	16	7	7	41			
	—	—	—	—	—	2	1	4	1	2	3	—	1	15	9	5	1	2	8	8	5	5	a			
	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	7	3	1	19	9	1	1	6	8	8	2	2	b			
42	21	23	12	56	27	1	7	7	5	7	1	6	—	34	15	6	11	5	22	9	9	42				
43	7	9	2	18	7	4	3	11	3	3	2	3	—	30	16	2	—	1	3	1	3	43				
44	14	6	6	26	16	3	1	7	—	13	10	1	5	46	21	13	1	4	18	5	5	44				
	226	209	254	689	431	171	117	413	91	397	501	165	137	170	2.162	1.283	297	141	165	603	339					
45 a 53	212	186	242	650	406	157	113	390	87	382	460	159	128	157	2.033	1.198	276	133	153	562	313	45 a 53				
45	13	14	19	46	17	8	4	10	3	13	20	7	10	84	26	15	7	9	31	2	2	45				
46	78	74	101	253	131	67	52	202	49	186	172	72	53	51	904	455	119	64	85	268	140	46				
	1	1	1	3	1	3	2	2	3	5	2	2	1	20	4	3	—	4	7	—	—	a				
	39	45	48	132	64	36	20	116	28	110	75	38	25	24	472	237	58	45	46	149	77	b				
	7	3	9	19	9	3	5	16	—	10	14	5	1	56	26	7	3	5	15	5	5	c				
	26	17	31	74	46	23	20	35	15	48	62	21	18	263	152	31	10	22	63	35	8	d				
	—	—	3	3	1	1	—	7	2	3	6	—	—	1	20	8	9	1	11	8	8	e				
	2	1	1	4	1	1	—	2	3	1	1	1	—	9	2	3	—	1	4	3	3	f				
	3	7	8	18	9	1	4	24	1	7	12	5	8	64	26	8	5	6	19	12	12	g				
47	8	5	6	19	9	2	3	19	3	7	24	4	3	67	21	9	3	1	13	2	2	47				
48	42	28	35	105	105	25	14	57	7	43	53	21	24	267	267	23	8	14	45	45	48					
49	2	6	5	13	13	3	1	3	—	4	5	3	—	21	21	5	5	1	11	11	49					
50	22	13	14	49	48	12	5	23	6	27	51	24	12	178	176	30	10	12	52	52	50					
51	7	6	12	25	—	5	6	11	3	18	16	—	5	70	—	11	5	3	19	—	—	51				
52	8	15	11	34	21	6	4	13	6	25	26	9	6	101	43	16	14	7	37	17	52					
53	32	35	39	106	62	29	24	52	10	59	93	19	15	341	189	48	17	21								

Segue : TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte. A. — Per Province

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for causes of death (e.g., Anemie, Leucemie, Malattie della milza), provinces (PUGLIE, LUCANIA, CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA), and counts for males (M) and females (F). Includes a detailed list of 200 causes of death.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Province

Table with columns for Cause di morte (a), Province (PUGLIE, LUCANIA), and Mortality counts (M, F, di cui F).

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for Cause di morte (a), Regions (CALABRIE, SICILIA, SARDEGNA), and Mortality counts (M, F, di cui F).

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombotici. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali del...

l'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adeno. (f) e dell'apparato genitale.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno A. — Per Province

Table with columns for CAUSE DI MORTE (a), PUGLIE (Bari, Brindisi, Foggia, Lorio (Taranto), Lecce), LUCANIA (Matera, Potenza), and sub-columns for TOTALE (M, F, di cui F).

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) ma specificata come settica. (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli

1937, distinti secondo 200 cause di morte. e Compartimenti.

Table with columns for CALABRIE (Catanzaro, Cosenza, Reggio di Calabria), SICILIA (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani), SARDEGNA (Cagliari, Nuoro, Sassari), and sub-columns for TOTALE (M, F, di cui F).

comprese le emorragie. (e) non comprese le emorragie. (f) non specificate come conseguenza d'aborto. (g) embolia o morte improvvisa puerperale (non altri organi della locomozione. (n) non compresi i nati morti.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte.

B. — Nelle Bipartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRIONALE	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
	COMPLESSO . . .	269.599	96.639	168.217	80.965	316.551	298.869	615.420
	I. - Malattie infettive e parassitarie	35.103	12.574	17.417	9.146	37.634	36.606	74.240
1 e 2	<i>Febbre tifoide e paratifi</i>	2.146	729	1.530	706	2.295	2.816	5.111
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	2.038	687	1.390	647	2.140	2.622	4.762
2	Paratifo	108	42	140	59	155	194	349
3	Tifo petecchiale	—	—	1	1	2	—	2
4	Febbre ricorrente	—	—	1	—	1	—	1
5	Febbre ondulante	59	37	49	75	127	93	220
6	Vaiolo	—	1	—	—	—	1	1
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim	—	1	—	—	—	1	1
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	801	129	959	248	1.192	945	2.137
8	Scarlattina	128	52	80	29	139	150	289
9	Tosse convulsa	1.266	451	594	429	1.186	1.554	2.740
10	Difterite	1.448	436	592	272	1.423	1.325	2.748
11	Influenza	5.146	2.182	3.492	1.290	6.231	5.879	12.110
	a) con complicazioni respiratorie indicate	4.242	1.915	2.745	1.047	5.236	4.713	9.949
	b) senza complicazioni respiratorie indicate	904	267	747	243	995	1.166	2.161
13	Dissenteria	161	26	122	89	236	162	398
	a) amebica	11	7	8	39	44	21	65
	b) bacillare	53	6	20	8	51	36	87
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	97	13	94	42	141	105	246
15	Risipola	671	266	340	138	729	686	1.415
16	Poliomielite a., polioencefalite ac.	112	90	81	54	201	136	337
17	Encefalite letargica o epidemica	210	65	30	17	184	138	322
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	110	52	22	31	141	74	215
20	Pustola maligna e carbonchio	34	37	45	24	87	53	140
21	Rabbia	—	—	4	—	2	2	4
22	Tetano	342	98	154	47	458	183	641
23 a 32	Tubercolosi:	19.443	6.715	6.829	4.203	18.453	18.737	37.190
23	dell'apparato respiratorio (b)	14.537	4.968	4.802	3.141	13.809	13.639	27.448
24	delle meningi e sist. nerv. centr.	2.026	639	861	444	1.988	1.982	3.970
25	degli intest. e del peritoneo (c)	734	293	446	223	667	1.029	1.696
26	della colonna vertebrale	340	125	152	72	328	361	689
27	delle ossa e delle articolaz. (d)	471	159	164	107	465	436	901
28	della pelle e sottocutaneo	32	5	22	8	16	51	67
29	del sistema linfatico (e)	56	23	41	22	67	75	142
30	dell'apparato genito-urinario	265	96	54	34	241	208	449
31	Altre localizzazioni della tuberc.	8	3	7	4	16	6	22
32	Tubercolosi disseminate	974	404	280	148	856	950	1.806
	a) acuta	538	197	109	61	425	480	905
	b) cronica	10	6	2	1	12	7	19
	c) non specificata	426	201	169	86	419	463	882
33	Lebbra	5	1	12	5	19	4	23
34	Sifilide	705	322	705	179	1.226	685	1.911
	a) congenita	205	143	373	65	430	356	786
	b) acquisita	5	1	6	—	8	4	12
	c) non specificata	495	178	326	114	788	325	1.113
35	Inf. gonococcica e altre mal. ven.	19	—	19	2	12	28	40
36	Infesz. purulenta e setticemia (f)	1.873	696	847	598	2.037	1.977	4.014
	a) setticemia	1.670	625	702	535	1.750	1.783	3.533
	b) piemia	188	65	133	59	258	187	445
	c) gangrena gassosa	15	6	11	4	29	7	36
38	Malaria	72	54	479	427	636	396	1.032
	a) febbre malarica	52	39	312	277	412	268	680
	b) cachessia palustre	20	15	167	150	224	128	352
39	Altre mal. dovute a protozoi paras.	12	8	24	77	(g) 60.	(h) 61	121

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale eccettuata. (e) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali. (f) non puerperali. (g) di cui 46 morti per Leishmaniosi, 9 per morbo di Weil, 5 per protozoi non specificati. (h) di cui 52 morte per Leishmaniosi, 4 per morbo di Weil, 4 per protozoi non specificati, 1 per bronco-spirochetosi.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte.

B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRIONALE	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
40	Anchilostomiasi	3	2	4	2	6	5	11
41	Cisti idatica	26	39	25	50	77	63	140
	a) del fegato	16	22	15	23	37	39	76
	b) altre localizzazioni	10	17	10	27	40	24	64
42	Altre malattie dovute a elminti	150	42	252	56	(d) 249	(e) 251	500
43	Micosi	76	16	59	33	104	80	184
44	Altre mal. infettive e parassitarie	85	28	66	64	(f) 121	(g) 122	243
	II. - Tumori (neoplasie)	23.286	8.206	4.684	2.765	18.367	20.574	38.941
45 a 53	Cancro e altri tumori maligni	22.178	7.837	4.410	2.595	17.678	19.342	37.020
45	Tumori maligni della bocca e faringe	842	321	249	115	1.223	304	1.527
46	Tumori maligni tubo dig. e peritoneo	12.877	4.714	1.681	1.172	11.221	9.243	20.464
	a) esofago	637	178	33	27	692	183	875
	b) stomaco e duodeno	7.916	2.883	751	621	6.969	5.302	12.271
	c) retto	654	236	129	71	612	478	1.090
	d) fegato e vie biliari	2.114	743	532	326	1.799	1.988	3.715
	e) pancreas	368	100	31	31	308	222	530
	f) peritoneo	163	46	58	13	91	169	260
	g) altri organi	1.045	428	167	83	826	903	1.723
47	Tumori maligni dell'app. respirat.	918	282	162	80	1.076	366	1.442
48	— dell'utero	1.699	600	667	312	—	3.278	3.278
49	— degli altri org. genit. della donna	345	113	69	32	—	559	559
50	— delle mammelle	1.473	434	402	230	30	2.509	2.539
51	— degli org. genito-urin. dell'uomo	873	319	191	89	1.472	—	1.472
52	— della pelle	465	172	227	138	569	433	1.002
53	— di altri org. o di org. non spec.	2.666	882	762	427	2.087	2.650	4.737
54	Tumori non maligni	982	287	233	144	557	1.089	1.646
	a) organi genitali della donna	475	120	98	56	—	749	749
	b) altri organi	507	167	135	88	557	340	897
55	Tumori a carat. maligno non spec.	126	82	41	26	132	143	275
	a) organi genitali della donna	3	2	1	2	—	8	8
	b) altri organi	123	80	40	24	132	135	267
	III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b)	5.163	1.756	2.479	1.374	4.993	5.779	10.772
56	Reumatismo articolare acuto	1.297	388	694	236	1.218	1.397	2.615
57	Reumatismo cronico, osteo-artrite	670	198	336	145	465	864	1.349
58	Gotta	43	29	47	19	97	41	138
59	Diabete mellito	2.038	852	780	575	1.993	2.252	4.245
60	Scorbuto	21	3	13	6	25	18	43
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow)	7	2	5	2	10	6	16
	b) scorbuto	14	1	8	4	15	12	27
61	Berberi	—	—	—	—	—	—	—
62	Pellagra	72	2	—	—	38	36	74
63	Rachitismo	201	62	188	103	286	268	554
64	Osteomalacia	24	3	10	6	5	38	43
65	Mal. ghiand. pituitaria (ipofisi)	12	2	3	5	10	12	22
66	Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi	332	67	113	51	208	405	613
	a) gozzo semplice	56	6	20	8	23	67	90
	b) gozzo esoftalmico	176	26	33	12	31	216	247
	c) mixedema e cretinismo	18	4	9	2	15	18	33
	d) tetania	110	25	47	23	123	82	205
	e) altre	22	6	4	6	16	22	38
67	Malattie del timo	181	59	65	27	195	137	332
68	Mal. ghiand. o capsule surren. (c)	109	54	53	26	137	105	242
69	Altre malattie generali	113	37	177	175	296	206	502
	IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici	1.325	463	852	562	1.618	1.584	3.202
70	Stati emorragipari	134	61	166	71	208	224	432
	a) porpora primitiva	82	40	112	40	125	149	274
	b) emofilia	52	21	54	31	83	75	158

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari). (d) di cui 197 morti per elminti non specificati, 47 per *Ascaris lumbricoides*, 3 per *Oxyris vermicularis* e 2 per *Trichocephalus dispar*. (e) di cui 193 morte per elminti non specificati, 53 per *Ascaris lumbricoides*, 4 per *Oxyris vermicularis*, 1 per *Toenia solium*. (f) di cui 61 morti per tossinfezione, 23 per varicella, 13 per infezioni viscerali, 10 per parotite epidemica, 7 per infezione vaccinnica, 4 per infezioni non specificate, 3 per febbre ghiandola di Pfeiffer. (g) di cui 52 morte per tossinfezione, 23 per varicella, 15 per infezioni viscerali, 13 per parotite epidemica, 6 per infezioni non specificate, 4 per infezione vaccinnica, 4 per febbre miltare, 2 per febbre ghiandola di Pfeiffer, 1 per quarta malattia, 1 per febbre eruttiva del Mediterraneo, 1 per febbre ittero-ema-

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte.

B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRIONALE	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
						71	Anemie	415
	a) anemia perniciosa progressiva	285	92	169	138	298	386	684
	b) altre	130	45	201	179	236	319	555
72	Leucemie e aleucemie	707	238	280	151	788	588	1.376
	a) leucemie vere	379	139	179	104	431	370	801
	b) aleucemie	328	99	101	47	357	218	575
73	Malattie della milza	61	25	33	17	75	61	136
74	Altre mal. sangue e org. ematop.	8	2	3	6	13	6	19
	V. - Avvelenamenti cronici e intossic.	395	116	91	32	533	101	634
75	Alcoolismo	364	111	78	29	490	92	582
	a) acuto	35	7	13	3	49	7	56
	b) cronico	331	104	65	26	441	85	526
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	9	3	5	1	10	8	18
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri	9	3	5	1	10	8	18
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali	22	2	8	2	33	1	34
	a) professionali	21	2	8	2	32	1	33
	b) altri	1	—	—	—	1	—	1
	VI. - Mal. del sistema nervoso, ecc. (b)	31.923	13.889	20.176	7.934	39.001	34.921	73.922
78	Encefalite (non epidemica)	366	106	102	68	378	264	642
	a) ascesso del cervello	97	28	18	21	113	61	164
	b) altre	269	78	84	47	265	213	478
79	Meningite semplice	1.349	409	721	212	1.477	1.214	2.691
80	Atassia locomotrice progressiva	155	50	70	24	195	104	299
81	Altre malattie del midollo spinale	406	140	201	124	495	376	871
82	Emorragia, embolia e tromb. cer.	25.783	11.419	14.108	6.402	29.908	27.804	57.712
	a) emorragia cerebrale	18.771	7.855	9.523	5.188	21.724	19.613	41.337
	b) embolia e trombosi cerebrale	4.622	2.353	3.773	637	5.581	5.804	11.385
	c) emiplegia ed altre paralisi (c)	2.390	1.211	812	577	2.603	2.387	4.990
83	Paralisi progressiva degli alienati	398	130	164	77	604	165	769
84	Demenza precoce e altre psicosi	785	243	432	107	784	783	1.567
	a) demenza precoce	202	38	83	18	169	172	341
	b) altre psicosi	583	205	349	89	615	611	1.226
85	Epilessia	548	225	458	182	818	595	1.413
86	Convulsioni (bambini — 5 anni)	850	726	3.213	431	2.843	2.377	5.220
87	Altre malattie del sistema nervoso	778	267	500	204	881	868	1.749
	a) corea	37	8	11	9	27	38	65
	b) nevrite	52	14	26	15	51	56	107
	c) paralisi agitante	296	124	181	88	374	315	689
	d) sclerosi a placche	149	38	35	15	106	131	237
	e) altre	244	83	247	77	323	328	651
88	Malattie degli organi della vista	12	1	3	1	12	5	17
89	Mal. orecchio e del seno mastoideo	493	173	204	102	606	366	972
	a) otite	288	105	155	67	370	245	615
	b) altre	205	68	49	35	236	121	357
	VII. - Malattie dell'appar. circolatorio	43.774	13.458	20.733	8.786	39.447	47.304	86.751
90 a 95	Malattie del cuore :	35.824	10.584	17.321	6.852	30.788	39.793	70.581
90	Pericardite	148	22	52	19	122	119	241
91	Endocardite acuta	288	79	117	57	260	281	541
92	Endocardite cr., comp. le aff. valv.	9.354	3.697	6.945	2.462	9.050	13.408	22.458
93	Malattie del miocardio	16.215	3.521	6.006	1.576	11.937	15.381	27.318
	a) miocardite acuta	228	60	42	33	169	194	363
	b) miocardite cron. e degeneraz. del miocar.	7.484	1.760	2.749	752	5.538	7.207	12.745
	c) non specificate	8.503	1.701	3.215	791	6.230	7.980	14.210
94	Mal. arterie coron. e angina pect.	1.676	675	1.083	373	2.569	1.238	3.807
95	Altre malattie del cuore	8.143	2.590	3.118	2.365	6.850	9.366	16.216
	a) malattie funzionali del cuore	503	160	172	85	401	519	920
	b) altre e non specificate	7.640	2.430	2.946	2.280	6.449	8.847	15.296
96	Aneurisma, eccet. l'aneur. del cuore	421	79	95	48	440	203	643
97	Arteriosclerosi (d)	5.383	2.192	2.632	1.599	6.142	5.664	11.806

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte.

B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRIONALE	ITALIA CENTRALE	ITALIA MEDITERRANEA	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
98	Cangrena.	1.084	306	269	120	1.025	754	1.779
	a) senile	211	41	54	18	188	136	324
	b) altre	873	265	215	102	837	618	1.455
99	Altre malattie delle arterie	566	155	300	117	662	476	1.138
100	Mal. vene: varici, emorr., fleb., ecc.	319	78	62	28	222	265	487
101	Mal. sist. linfat., linfangioite, ecc.	65	21	31	12	68	61	129
102	Anomalie idiopatiche press. sang.	88	35	12	1	76	60	136
103	Altre mal. dell'appar. circolatorio .	24	8	11	9	24	28	52
	VIII. - Mal. dell'apparato respiratorio	47.907	16.761	35.109	16.143	62.213	53.707	115.920
104	Malattie delle fosse nasali e annessi .	42	15	14	1	39	33	72
105	Malattie della laringe	143	42	140	61	227	159	386
106	Bronchite	6.992	2.793	6.159	2.468	8.904	9.508	18.412
	a) acuta	1.006	419	1.156	487	1.528	1.540	3.068
	b) cronica	2.775	1.263	2.097	765	3.276	3.624	6.900
	c) non specificata	3.211	1.111	2.906	1.216	4.100	4.344	8.444
107 a 109	Polmonite, tutte le forme :	35.649	12.335	28.609	12.501	46.988	40.126	87.094
107	Broncop., compr. la bronch. capil. .	25.500	8.829	19.693	8.486	33.124	29.384	62.508
108	Polmonite lobare	10.149	3.506	6.916	4.015	13.844	10.742	24.586
110	Pleuriti	1.500	446	691	353	1.786	1.204	2.990
111	Congest., edema, ecc. del polm. (b)	729	282	220	122	714	639	1.353
112	Asma	1.231	431	711	400	1.544	1.229	2.773
113	Enfisema polmonare	434	127	146	46	496	257	753
114	Altre mal. app. respiratorio (c) . . .	1.187	290	419	191	1.535	552	2.087
	a) polmonite interstiziale cronica (d) .	142	24	66	18	137	113	250
	b) altre, compresa cangrena polmonare .	1.045	266	353	173	1.398	439	1.837
	IX. - Malattie dell'apparato digerente	28.241	9.728	30.090	14.278	43.944	39.393	82.337
115	Mal. della cavità boccale, ecc. (e) .	588	248	409	183	777	651	1.428
116	Malattie dell'esofago	23	6	12	1	24	18	42
117	Ulcera dello stom. e del duodeno . .	1.499	639	655	257	2.368	682	3.050
	a) stomaco	1.016	396	470	207	1.579	510	2.089
	b) duodeno	483	243	185	50	789	172	961
118	Altre mal. stomaco (cancro eccett.) .	593	129	428	199	709	640	1.349
119	Enteriti (al disotto di 2 anni) . . .	13.310	4.475	20.441	9.266	24.432	23.060	47.492
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni e più) .	2.485	1.043	4.016	2.208	4.649	5.103	9.752
	a) enterite	2.409	1.011	3.987	2.191	4.557	5.041	9.598
	b) ulcera intestinale	76	32	29	17	92	62	154
121	Appendicite	1.663	558	526	234	1.731	1.250	2.981
122	Ernia, occlusione intestinale	2.167	762	1.111	579	2.642	1.977	4.619
	a) ernia	964	354	532	334	1.337	847	2.184
	b) occlusione intestinale	1.203	408	579	245	1.305	1.130	2.435
123	Altre malattie dell'intestino	249	96	160	91	300	296	596
124	Cirrosi del fegato	2.826	777	1.092	552	3.680	1.567	5.247
	a) alcolica	189	36	23	11	218	41	259
	b) non indicata come alcolica	2.637	741	1.069	541	3.462	1.526	4.986
125	Altre mal. feg. (comp. atrof. gialla) .	551	190	276	195	684	528	1.212
126	Calcolosi biliare	498	171	138	50	201	656	857
127	Altre m. della vescichetta e vie bil. .	577	228	322	165	529	763	1.292
128	Malattie del pancreas	49	13	6	1	41	28	69
129	Peritonite senza causa indicata . . .	1.163	393	498	297	1.177	1.174	2.351
	X. - Mal. dell'app. urinario, ecc. (f)	9.498	3.790	7.691	4.050	13.623	11.406	25.029
130 a 132	Nefrite :	6.594	2.663	6.348	3.083	8.787	9.901	18.688
130	acuta	913	432	1.888	881	2.006	2.108	4.114
131	cronica	3.288	1.301	2.392	1.057	3.700	4.338	8.038
132	non specificata	2.393	930	2.068	1.145	3.081	3.455	6.536

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali dell'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (f) e dell'apparato genitale.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte.

B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELenco NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRIONALE	ITALIA CENTRALE	ITALIA MEDITERRANEA	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
133	Altre malattie dei reni, ecc. (b)	449	219	315	206	591	598	1.189
	a) pielite	239	122	181	126	328	340	668
	b) altre	210	97	134	80	263	258	521
134	Calcolosi delle vie urinarie	171	113	125	140	375	174	549
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori	118	71	87	89	202	163	365
	b) calcolosi della vescica	47	42	35	50	165	9	174
	c) calcolosi senza altre indicazioni	6	—	3	1	8	2	10
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	620	268	398	265	1.180	371	1.551
	a) cistite	534	226	334	202	974	322	1.296
	b) altre	86	42	64	63	206	49	255
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	77	43	52	27	197	2	199
	a) stenosi uretrale	41	30	21	14	106	—	106
	b) altre	36	13	31	13	91	2	93
137	Malattie della prostata	1.371	421	383	281	2.456	—	2.456
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c)	15	8	9	5	37	—	37
139	Mal. organi genitali della donna (c)	201	55	61	43	—	360	360
	a) ovaie, trombe e parametri	131	24	18	17	—	190	190
	b) utero	63	25	30	11	—	127	127
	c) mammelle	4	5	7	11	—	27	27
	d) altre	3	3	6	4	—	16	16
	XI. - Malattie gravid., parto e puerp.	1.124	458	753	390	—	2.725	2.725
140	Aborto con condizioni settiche	102	32	39	13	—	186	186
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d)	20	8	12	15	—	55	55
142	Gestazione ectopica	71	13	29	11	—	124	124
143	Altri accidenti della gravidanza (e)	6	3	1	3	—	13	13
144	Emorragia puerperale	173	73	178	88	—	512	512
	a) da placenta previa	63	24	49	30	—	166	166
	b) altre emorragie	110	49	129	58	—	346	346
145	Setticemia e infezioni puerperali (f)	344	147	234	141	—	866	866
	a) setticemia e piemia puerperali	344	147	234	140	—	865	865
	b) tetano puerperale	—	—	—	1	—	1	1
146	Albuminuria e eclampsia puerper.	207	102	133	59	—	501	501
147	Altre forme di tossiemia della grav.	8	3	12	7	—	30	30
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g)	72	18	29	12	—	131	131
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi	15	5	2	4	—	28	28
	b) embolia o morte improvvisa	57	13	27	8	—	105	105
149	Altri accidenti del parto	116	58	81	40	—	295	295
150	Altre malattie non definite (h)	5	1	5	1	—	12	12
	XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.	1.018	393	733	377	1.462	1.059	2.521
151	Foruncoli	144	54	84	59	216	125	341
152	Flemmone, ascesso caldo	659	269	549	274	1.035	716	1.751
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i)	215	70	100	44	211	218	429
	XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione	556	236	229	103	688	436	1.124
154	Osteomielite infettiva acuta	345	152	127	61	432	253	685
155	Altre malattie delle ossa (l)	103	34	44	27	109	99	208
156	Mal. articolazioni, ecc. (m)	108	50	58	15	147	84	231
	a) articolaz. (eccett. la tbc. e il reumatismo)	101	41	47	14	129	74	203
	b) altri organi della locomozione	7	9	11	1	18	10	28
	XIV. - Vizi di conformazione congen.	1.270	541	982	419	1.730	1.482	3.212
157	Vizi di conformazione congeniti (n)	1.270	541	982	419	1.730	1.482	3.212
	a) idrocefalia	99	49	106	49	181	122	303
	b) spina bifida e meningocele	173	103	233	123	284	348	632
	c) malformazioni congenite del cuore	643	227	379	113	782	600	1.382
	d) mostruosità	66	20	15	18	58	61	119
	e) altri	289	142	249	116	445	351	796
	XV. - Malattie dell'infanzia	11.826	4.574	8.414	3.635	15.789	12.660	28.449
158	Debolezza congenita	3.395	1.293	4.028	1.849	5.730	4.835	10.565
159	Nascita prematura (n)	5.435	2.241	2.254	1.003	6.040	4.893	10.933

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) ma comprese le emorragie. (e) non comprese le emorragie. (f) non specificate come conseguenza d'aborto. (g) embolia o morte improvvisa puerperale (non specificata come settica). (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli altri organi della locomozione. (n) non compresi i nati morti.

Segue: TAVOLA 1. — Morti, durante l'anno 1937, distinti secondo 200 cause di morte.

B. — Nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	ITALIA SETTENTRIONALE	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDIONALE	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
160	Conseguenze del parto (b)	604	236	184	72	678	418	1.096
	a) con indicazione di operazione cesarea	1	1	—	—	2	—	2
	b) senza indicazione di operazione cesarea	603	235	184	72	676	418	1.094
161	Altre mal. speciali dell'infanzia	2.392	804	1.948	711	3.341	2.514	5.855
	a) atelectasia	100	23	81	10	119	95	214
	b) ittero dei neonati	363	132	250	76	508	313	821
	c) sclerema e altre	1.929	649	1.617	625	2.714	2.106	4.820
	XVI. - Senilità	14.952	5.639	13.124	8.377	18.638	23.454	42.092
162	Senilità	14.952	5.639	13.124	8.377	18.638	23.454	42.092
	a) con demenza senile	478	154	168	45	396	449	845
	b) senza demenza senile	14.474	5.485	12.956	8.332	18.242	23.005	41.247
	XVII. - Morti violente e accidentali	9.918	3.211	3.601	1.851	13.969	4.612	18.581
163 a 171	Suicidi :	2.007	544	451	289	2.420	871	3.291
163	per ingestione di veleni (c)	135	50	74	22	122	159	281
164	con gas tossici	69	20	—	2	58	33	91
165	per impiccamento o strangol.	596	145	95	104	759	181	940
166	per annegamento	398	75	102	52	385	242	627
167	con arma da fuoco	331	106	84	70	549	42	591
168	con arma da punta e da taglio	93	28	19	4	117	27	144
169	per precipitaz. da luogo elev.	222	85	58	25	254	136	390
170	per schiacciamento	157	28	14	7	161	45	206
171	con altri mezzi	6	7	5	3	15	6	21
172 a 175	Omicidi :	236	88	289	156	552	217	769
172	Infanticidio (— un anno)	18	11	9	—	19	19	38
	a) subito dopo la nascita	13	7	7	—	15	12	27
	b) altri, prima d'un anno	5	4	2	—	4	7	11
173	Omicidi con arma da fuoco (d)	96	33	118	87	251	83	334
174	Omicidi arma da taglio e punta (d)	55	22	96	39	166	46	212
175	Omicidi con altri mezzi (d)	67	22	66	30	116	69	185
176 a 194	Morti accidentali :	7.592	2.567	2.839	1.383	10.894	3.497	14.391
176	Morsi o punture d'animali velenosi	9	2	6	—	12	5	17
177	Avvelenamenti da alimenti guasti	46	27	32	13	67	51	118
178	Assorbimento di gas tossici	78	28	32	9	106	41	147
179	Altri avvelenam. accident. acuti (e)	47	13	47	15	69	53	122
180	Per incendio	21	10	17	5	33	20	53
181	Per ustioni accidentali (f)	621	282	575	233	818	893	1.711
182	Per soffocazione meccanica accid.	58	16	19	12	68	37	105
183	Per annegamento accidentale	1.164	288	245	110	1.397	410	1.807
184	Per trauma acc. d'arma da fuoco (g)	99	53	55	28	198	37	235
185	Per trauma acc. arm. punt. o tagl. (g)	22	7	6	1	33	3	36
186	Per lesioni accid. da caduta, ecc. (h)	4.563	1.573	1.428	699	6.534	17.729	8.263
187	Per cataclisma (i)	2	—	—	—	1	1	2
188	Per violenze di animali	76	28	62	59	202	23	225
189	Per fame o sete	2	—	—	—	—	(m) 2	2
190	Per freddo eccessivo	83	10	41	30	144	20	164
191	Per caldo eccessivo	42	17	40	27	95	31	126
192	Per fulmine	59	46	58	49	165	47	212
193	Per accidenti dovuti a corr. elettr.	119	45	32	21	209	8	217
194	Per altri accidenti	481	122	144	82	743	96	829
	a) corpi estranei	14	5	—	2	13	8	21
	b) altri	467	117	144	80	730	78	808
195	Morte violenta, ecc. (l)	81	11	14	8	87	27	114
196	Per ferite di guerra	—	—	4	—	4	—	4
198	Per esecuzione giudiziaria	2	1	4	5	12	—	12
	XVIII. - Cause di morte non determ.	2.320	846	1.059	743	2.902	2.066	4.968
199	Morte improvvisa	2.100	682	805	462	2.413	1.636	4.049
200	Cause non specific. o mal definite	220	164	254	281	489	430	919

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno e più. (e) eccettuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (l) di cui la natura (accidente, omicidio, suicidio) è sconosciuta. (m) di cui una per abbandono e l'altra perchè sperduti in un bosco.

TAVOLA 2. — Morti, nell'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei Comuni

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA	
		capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni
	COMPLESSO	13.740	36.299	10.709	7.600	23.005	62.219	1.474	8.404
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	68	202	82	26	250	627	19	32
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo, vaioloide, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	11	14	27	5	152	369	—	1
8	Scarlattina	10	33	11	4	14	19	—	9
9	Tosse convulsa	47	104	29	27	63	253	13	61
10	Difterite	52	93	65	34	321	302	9	34
11	Influenza	368	886	86	151	414	1.220	15	190
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1.234	1.215	899	258	1.499	2.603	138	644
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi .	224	408	212	90	391	980	34	154
34	Sifilide	51	54	56	8	157	89	10	19
38	Malaria	2	7	5	3	3	15	—	1
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44, dal 45 al 53	Altre mal. infettive e parassitarie .	210	368	163	77	454	784	23	83
54, 55	Cancro ed altri tumori maligni . .	1.330	2.742	1.045	571	2.332	4.456	146	696
57, 58	Tumori non maligni (b)	101	146	86	17	108	223	4	19
59	Reumatismo cronico e gotta	32	117	42	34	38	150	2	27
75	Diabete mellito	170	275	176	97	185	306	10	42
56, dal 60 al 74, 76, 77	Alcolismo acuto e cronico	11	58	21	23	21	62	3	10
80, 83	Altre mal. gener. e avvel. cronici . .	194	491	135	95	289	785	28	144
82	Atassia locom. e paral. progr. alien.	46	90	41	19	71	113	2	10
78, 79, 81, dall'84 all'89	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	1.184	3.898	970	866	1.820	6.001	92	648
dal 90 al 95	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c)	291	671	222	170	457	1.346	20	155
dal 96 al 103	Malattie del cuore	1.611	6.456	1.554	1.376	2.712	8.204	177	1.303
106	Altre mal. dell'app. circolatorio . .	427	1.124	311	201	617	1.534	35	200
107, 108, 109	Bronchiti	363	1.171	157	214	349	1.803	26	171
104, 105, dal 110 al 114	Polmoniti	1.969	4.697	1.336	943	3.829	8.479	179	896
119, 120	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	295	628	244	170	547	1.077	32	163
121	Enteriti	399	1.327	241	271	966	7.097	52	507
dal 124 al 127	Appendicite	138	188	81	50	185	311	16	61
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Malattie del fegato e vie biliari . .	346	709	292	165	444	848	25	126
130; 131, 132	Altre mal. dell'apparato digerente . .	351	848	351	194	537	1.326	46	179
dal 133 al 139	Nefriti	352	918	346	218	724	1.362	23	197
140, 145	Altre mal. dell'app. genito-urinario .	189	423	154	115	273	500	13	95
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Setticemia e infezioni puerperali . .	24	49	20	11	57	79	4	12
dal 151 al 156	Altre mal. gravid., parto e puerp. .	28	41	33	11	75	143	10	27
dal 157 al 161	Malattie della pelle, ecc. (d)	73	131	87	37	170	344	12	50
162	Debolezza congenita, ecc. (e)	448	1.073	373	236	963	3.168	88	422
dal 163 al 171	Senilità	370	2.844	274	438	447	2.828	90	597
dal 172 al 175	Suicidio	131	280	101	68	194	257	15	48
dal 176 al 198	Omicidio	17	42	5	12	17	34	—	10
199, 200	Morte violenta e accidentale (f) . .	377	1.042	292	222	647	1.618	61	299
	Morte improv. e cause non speci- ficate o mal definite	196	436	84	73	213	514	2	62

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	VENETO		VENEZIA GIULIA E ZARA		EMILIA		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	
	11.852	39.631	6.106	7.540	12.451	28.569	12.510	24.225	2.716	13.937	2.129	7.517	
1, 2	131	399	28	25	107	150	60	151	21	135	15	65	1, 2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	24	63	17	27	44	47	5	14	18	34	3	10	8
9	6	5	3	1	6	7	1	6	—	4	2	2	9
10	64	289	30	35	51	200	30	87	4	36	19	47	10
11	71	235	39	17	79	97	33	64	22	69	17	36	11
23	168	723	73	43	199	610	206	614	61	304	88	202	11
dal 24 al 32	886	1.959	771	429	904	1.098	1.130	1.119	191	426	169	221	23
34	316	900	144	143	345	565	299	441	62	201	51	125	dal 24 al 32
38	72	40	58	11	53	27	45	24	5	16	3	14	34
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44, dal 45 al 53	3	22	1	1	2	7	3	9	—	1	1	1	38
54, 55	307	602	106	83	270	418	235	375	47	179	38	89	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
57, 58	1.064	2.715	620	431	1.416	2.614	1.430	2.629	179	840	142	421	dal 45 al 53
75	86	121	37	17	54	89	46	102	13	45	9	17	54, 55
56, dal 60 al 74, 76, 77	30	114	11	33	22	61	31	66	5	37	7	16	57, 58
80, 83	102	245	78	37	112	203	107	196	18	87	30	51	59
82	28	53	12	12	13	37	12	16	5	33	4	7	75
78, 79, 81, dall'84 all'89	200	664	68	96	203	376	135	294	20	198	24	94	56, dal 60 al 74, 76, 77
dal 90 al 95	51	26	35	2	28	19	27	43	11	13	7	3	80, 83
dal 96 al 103	989	3.693	350	463	1.282	3.527	1.122	3.014	365	2.097	264	1.171	82
106	310	797	125	192	314	517	296	418	90	364	54	160	78, 79, 81, dall'84 all'89
107, 108, 109	1.194	5.119	604	786	1.250	3.478	1.358	2.992	234	1.457	205	866	dal 90 al 95
104, 105, dal 110 al 114	498	1.287	171	145	510	890	444	735	79	381	64	193	dal 96 al 103
119, 120	198	1.046	76	247	271	900	315	768	73	492	60	259	106
121	1.525	4.833	731	872	1.571	3.789	1.736	2.892	366	1.626	283	895	107, 108, 109
dal 124 al 127	282	809	141	139	263	476	280	384	45	208	31	96	104, 105, dal 110 al 114
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	473	2.383	226	548	231	1.084	338	857	118	873	59	465	119, 120
130; 131, 132	66	211	45	22	120	169	90	131	24	81	13	54	121
dal 133 al 139	179	528	107	75	210	398	196	308	42	193	33	117	dal 124 al 127
140, 145	324	889	180	142	379	585	390	595	69	259	43	149	dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
dal 141 al 144, dal 146 al 150	354	912	150	152	314	572	348	561	76	400	63	177	130, 131, 132
dal 151 al 156	168	388	89	36	172	289	188	274	38	149	35	76	dal 133 al 139
dal 157 al 161	28	61	19	17	26	39	27	36	8	16	10	14	140, 145
162	47	88	21	25	49	80	42	59	12	35	7	25	dal 141 al 144, dal 146 al 150
dal 163 al 171	94	233	59	31	102	151	92	137	31	81	15	54	dal 151 al 156
dal 172 al 175	505	2.734	211	491	525	1.859	453	1.213	87	942	91	446	dal 157 al 161
dal 176 al 198	426	2.755	323	1.351	373	1.836	393	1.678	169	1.112	77	571	162
199, 200	106	229	93	70	130	285	100	138	14	70	12	46	dal 163 al 171
	7	24	9	17	9	33	11	16	1	7	2	8	dal 172 al 175
	379	1.083	242	227	399	787	365	598	76	319	63	219	dal 176 al 198
	91	354	3	49	43	200	91	171	17	117	16	45	199, 200

delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e . . .

Segue: TAVOLA 2. — Morti, nell'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, nel complesso dei Comuni

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	LÀZIO		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE	
		capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni
	COMPLESSO	15.846	17.759	3.195	21.963	16.964	42.435	7.405	37.587
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	114	168	25	262	178	330	136	300
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	1	—
6	Vaiolo, vaioloide, ecc.	—	1	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	34	11	6	77	76	271	19	320
8	Scarlattina	25	12	1	2	15	8	4	6
9	Tosse convulsa	125	103	23	152	16	98	25	138
10	Difterite	123	72	26	152	124	74	16	81
11	Influenza	375	332	52	332	428	715	553	653
dal 24 al 32	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1.325	387	206	456	1.003	848	435	1.085
34	Ogni altra forma di tubercolosi	346	222	55	248	261	397	135	511
38	Sifilide	179	36	14	61	183	168	48	77
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Malaria	13	26	1	22	14	50	21	122
dal 45 al 53	Altre mal. infettive e parassitarie	323	217	27	240	237	528	75	501
54, 55	Cancro ed altri tumori maligni	1.357	839	125	651	684	886	237	976
57, 58	Tumori non maligni (b)	99	38	5	27	47	64	20	59
59	Reumatismo cronico e gotta	13	52	11	89	21	106	6	49
75	Diabete mellito	244	119	25	89	174	187	45	122
56, dal 60 al 74, 76, 77	Alcoolismo acuto e cronico	13	21	4	15	6	29	—	8
80, 83	Altre mal. gener. e avvel. cronici	202	178	36	308	199	493	100	488
82	Atassia locom. e paral. progr. alien.	59	17	9	11	79	50	19	27
78, 79, 81, dall'84 all'89	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	1.297	2.089	321	2.396	1.416	3.445	510	3.211
dal 90 al 95	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c)	373	535	136	677	588	1.780	212	1.099
dal 96 al 103	Malattie del cuore	1.321	2.151	311	2.605	1.706	4.979	552	3.414
107, 108, 109	Altre mal. dell'app. circolatorio	402	586	59	548	517	920	133	573
104, 105, dal 110 al 114	Bronchiti	239	587	75	739	389	1.597	146	1.461
119, 120	Polmoniti	2.358	2.179	337	2.417	2.742	7.395	937	6.971
dal 124 al 127	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	359	230	58	341	314	602	128	417
dal 128 al 132	Enteriti	893	1.915	368	3.467	1.480	6.280	1.023	5.765
dal 133 al 139	Appendicite	113	52	23	60	115	97	50	95
140, 145	Malattie del fegato e vie biliari	255	222	37	237	228	465	76	390
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. dell'apparato digerente	443	338	91	420	437	696	164	625
dal 151 al 156	Nefriti	422	616	109	652	939	1.723	247	1.298
dal 157 al 161	Altre mal. dell'app. genito-urinario	244	123	27	169	233	324	90	224
dal 163 al 171	Setticemia e infezioni puerperali	49	19	7	28	32	58	19	45
dal 172 al 175	Altre mal. gravid., parto e puerp.	63	36	14	60	93	78	44	79
dal 176 al 198	Malattie della pelle, ecc. (d)	122	97	29	105	152	206	61	218
199, 200	Debolezza congenita, ecc. (e)	791	1.092	150	1.258	539	2.216	543	2.388
	Senilità	296	1.343	278	1.885	767	3.203	319	3.020
	Suicidio	116	48	8	84	86	90	24	79
	Omicidio	18	25	4	26	40	73	1	44
	Morte violenta e accidentale (f)	472	467	67	419	326	680	189	484
	Morte improv. e cause non specificate o mal definite	231	158	35	176	80	226	42	164

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il suo carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

capiluoghi di Provincia e nel complesso degli altri Comuni, in ciascun Compartimento e nel Regno.

LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	capiluog. di Provinc.	altri Comuni	TOTALE	
798	8.884	3.352	25.634	18.435	46.375	2.932	13.223	165.619	449.801	615.420	
6	80	28	185	272	345	26	63	1.566	3.545	5.111	1, 2
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6
7	70	33	80	71	138	11	28	558	1.579	2.137	7
1	13	2	28	9	16	—	4	110	179	289	8
2	20	7	113	89	134	29	177	666	2.074	2.740	9
2	25	17	75	81	113	12	66	1.109	1.639	2.748	10
3	150	45	561	252	649	65	324	3.451	8.659	12.110	11
17	126	188	438	1.214	882	333	712	12.542	14.906	27.448	23
21	103	51	245	294	356	63	329	3.324	6.418	9.742	dal 24 al 32
5	27	24	98	71	85	10	13	1.044	867	1.911	34
3	55	13	178	33	181	15	198	133	899	1.032	38
12	114	69	353	426	650	68	218	3.090	5.879	8.969	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
23	178	105	545	677	1.356	138	424	13.050	23.970	37.020	dal 45 al 53
4	9	9	30	48	81	19	22	795	1.126	1.921	54, 55
—	20	4	77	21	95	5	43	301	1.186	1.487	57, 58
6	24	29	79	182	315	16	62	1.709	2.536	4.245	59
—	3	1	12	1	12	1	15	156	426	582	75
6	134	54	363	172	696	46	286	2.111	6.183	8.294	56, dal 60 al 74, 76, 77
—	3	4	32	40	51	4	6	533	535	1.068	80, 83
57	661	206	1.885	1.359	4.157	156	730	13.760	43.952	57.712	82
12	331	101	898	421	737	63	210	4.085	11.057	15.142	78, 79, 81, dall'84 all'89
56	819	289	2.590	1.608	4.051	201	992	16.943	53.638	70.581	dal 90 al 95
16	129	53	464	569	1.135	61	169	4.966	11.204	16.170	dal 96 al 103
32	495	71	1.154	354	1.687	46	381	3.240	15.172	18.412	106
181	1.260	548	3.821	2.677	7.400	345	2.079	23.650	63.444	87.094	107, 108, 109
7	90	50	334	335	629	38	172	3.449	6.985	10.414	104, 105, dal 110 al 114
107	1.607	435	3.925	2.206	7.124	339	1.805	9.954	47.290	57.244	119, 120
3	19	21	43	75	116	12	31	1.190	1.791	2.981	121
6	87	35	267	218	531	54	159	2.783	5.825	8.608	dal 124 al 127
17	198	82	549	398	852	113	245	4.415	9.089	13.504	dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
28	260	131	961	661	1.928	108	386	5.395	13.293	18.688	130, 131, 132
7	60	31	178	269	540	40	118	2.260	4.081	6.341	dal 133 al 139
—	13	10	61	59	61	17	17	416	636	1.052	140, 145
7	27	14	64	77	114	15	30	651	1.022	1.673	dal 141 al 144, dal 146 al 150
2	24	27	138	156	243	25	56	1.309	2.336	3.645	dal 151 al 156
70	648	152	1.432	860	2.297	152	745	7.001	24.660	31.661	dal 157 al 161
37	749	256	2.610	1.614	5.346	134	1.283	6.643	35.449	42.092	162
9	24	6	41	63	158	16	52	1.224	2.067	3.291	dal 163 al 171
1	15	9	76	19	95	13	39	183	596	769	dal 172 al 175
20	167	79	430	307	733	85	281	4.446	10.075	14.521	dal 176 al 198
5	47	63	221	176	296	18	253	1.406	3.562	4.968	199, 200

delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre

TAVOLA 3. — Morti nel 1937, classificati per cause e classi di Comuni (*).

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE:	COMUNI CON ABITANTI:							COM- PLESSO
		meno di 2 000	da 2 000 a 4 999	da 5 000 a 9 999	da 10 000 a 19 999	da 20 000 a 49 999	da 50 000 a 99 999	da 100 000 e più	
	COMPLESSO	43.871	129.720	114.615	90.932	83.198	43.233	109.851	615 420
1, 2	Feb. tifoidea (tifo add.) e parat.	307	919	916	771	754	421	1.023	5.111
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	2	—	—	2
6	Vaiolo, vaioloide, ecc.	—	1	—	—	—	—	—	1
7	Morbillo	143	553	414	274	300	126	327	2.137
8	Scarlattina	24	56	45	33	26	18	87	289
9	Tosse convulsa	244	804	515	308	267	172	430	2.740
10	Difterite	154	470	400	387	307	231	799	2.748
11	Influenza	1.042	2.769	2.181	1.601	1.169	824	2.524	12.110
23	Tubercolosi dell'app. resp. (a)	1.185	3.816	3.721	3.350	4.203	2.957	8.216	27.448
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	583	1.790	1.664	1.369	1.295	852	2.189	9.742
34	Sifilide	69	243	172	156	294	197	780	1.911
38	Malaria	88	332	201	183	136	33	59	1.032
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre mal. infettive e parass.	476	1.682	1.445	1.307	1.224	768	2.067	8.969
dal 45 al 53	Cancri e altri tumori maligni	2.522	6.729	6.273	4.774	4.470	3.362	8.890	37.020
54, 55	Tumori non maligni (b)	103	295	292	235	264	198	534	1.921
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	164	412	328	177	126	97	183	1.487
59	Diabete mellito	208	620	671	567	609	370	1.200	4.245
75	Alcolismo acuto e cronico	50	119	109	79	80	65	80	582
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre mal. gener. e avvel. cr.	613	1.890	1.578	1.246	1.046	507	1.414	8.294
80, 83	Atassia locom. e par. prog. alien.	29	104	156	125	194	118	342	1.068
82	Emorragia, emb. e tromb. cer.	4.228	12.529	11.766	8.613	7.947	3.900	8.729	57.712
78, 79, 81, dall'84 all'89,	Altre mal. del sist. nerv., ecc. (c)	907	3.103	2.816	2.309	2.297	1.151	2.559	15.142
dal 90 al 95	Malattie del cuore	6.338	16.272	13.787	9.824	8.622	4.500	11.238	70.581
dal 96 al 103	Altre mal. dell'appar. circolat.	1.144	3.156	2.949	2.043	2.224	1.347	3.307	16.170
106	Bronchiti	1.570	4.710	3.911	2.924	2.373	1.029	1.895	18.412
107, 108, 109	Polmoniti	5.528	16.813	15.576	13.728	12.931	6.188	16.330	87.094
104, 105, dal 110 al 114	Altre mal. app. resp., escl. tbc.	716	2.036	1.834	1.338	1.291	854	2.345	10.414
119, 120	Enteriti	4.061	14.256	11.492	9.871	3.302	2.498	6.764	57.244
121	Appendicite	160	385	421	443	481	319	772	2.981
dal 124 al 127 dal 115	Mal. fegato e vie biliari	573	1.617	1.487	1.194	1.157	679	1.901	8.608
al 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. dell'appar. digerente	911	2.515	2.290	1.971	1.818	1.121	2.878	13.504
130, 131, 132	Nefriti	1.102	3.586	3.223	2.878	2.772	1.369	3.758	18.688
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urin.	430	1.078	1.039	827	860	557	1.550	6.341
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali	42	164	178	154	152	111	251	1.052
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. grav., parto e puerp.	76	237	268	246	261	192	393	1.673
dal 151 al 156	Mal. della pelle, ecc. (d)	194	536	608	548	586	322	851	3.645
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (e)	2.036	7.302	6.784	5.000	4.106	1.962	4.471	31.661
162	Senilità	4.065	10.984	9.080	6.841	5.122	2.006	3.994	42.092
dal 163 al 171	Suicidio	200	602	491	419	457	265	857	3.291
dal 172 al 175	Omicidio	39	159	150	146	111	50	114	769
dal 176 al 198 199, 200	Morte violenta e accidentale (f)	1.041	2.820	2.503	2.103	2.084	1.251	2.719	14.521
	Morte improvvisa e cause non specif. o mal definite	506	1.256	881	570	478	246	1.031	4.968

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi, (d) del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

(*) La classe: meno di 2000 comprende 2.453 Comuni con 3.025.448 abitanti

» da 2000 a 4999 » 2.921 » » 9.323.402 »

» » 5000 » 9999 » 1.257 » » 8.433.610 »

» » 10000 » 19999 » 474 » » 6.270.685 »

» » 20000 » 49999 » 185 » » 5.432.561 »

» » 50000 » 99999 » 43 » » 2.834.006 »

» » 100000 » più » 22 » » 7.673.890 »

residenti, censiti al 21 aprile 1936,

nella circoscrizione territoriale al 31 dicembre 1937, tenuto conto delle variazioni effettuate fino alla detta data.

TAVOLA 4.

Morti, durante l'anno 1937, nei Comuni con più di 100.000 abitanti al censimento del 21 aprile 1936, classificati secondo le cause di morte.

TAVOLA 4. — Morti, durante l'anno 1937, nei Comuni con più di 100.000

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	ROMA	MILANO	NAPOLI	TORINO	GENOVA	PALERMO	FIRENZE	BOLOGNA
	COMPLESSO	14.267	13.896	15.017	8.997	8.301	7.036	4.697	4.228
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	99	93	162	39	65	124	9	32
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	32	51	60	1	27	26	—	11
8	Scarlattina	25	11	14	7	8	5	—	1
9	Tosse convulsa	120	41	12	24	20	21	13	18
10	Difterite	111	207	117	31	48	43	10	22
11	Influenza	339	241	391	271	66	133	73	96
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	1.262	763	974	815	724	529	429	346
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	323	237	226	161	166	150	111	116
34	Sifilide	173	86	171	30	45	26	14	26
38	Malaria	11	1	12	2	4	6	—	—
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44, dal 45 al 53	Altre mal. infettive e parassitarie	290	245	214	130	114	163	72	118
54, 55	Cancri e altri tumori maligni	1.267	1.493	611	968	782	252	681	493
57, 58	Tumori non maligni (b)	96	78	40	74	74	25	9	11
59	Reumatismo cronico e gotta	11	23	19	22	26	7	8	5
75	Diabete mellito	229	122	162	120	138	57	36	39
56, dal 60 al 74, 76, 77, 80, 83	Altre mal. gener. e avvel. cronici	180	167	170	134	103	61	45	76
82	Atassia locom. e paralisi progr. alien.	55	30	77	23	35	16	5	4
78, 79, 81, dall'84 all'89, dal 90 al 95, dal 96 al 103, 106	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	1.063	1.090	1.264	774	752	559	333	417
107, 108, 109, 104, 105, dal 110, al 114, 119, 120	Altre malattie del sist. nervoso, ecc. (c)	331	202	535	177	175	152	88	111
121	Malattie del cuore	1.142	1.734	1.506	989	1.249	605	497	433
dal 124 al 127, dal 115	Altre mal. dell'appar. circolatorio	340	396	479	261	239	272	182	181
123, 128, 129, 130, 131, 132, dal 133 al 139, 140, 145	Bronchiti	201	189	329	226	117	59	74	80
dal 141 al 144, dal 146 al 150, dal 151 al 156, dal 157 al 161, 162	Polmoniti	2.178	2.537	2.346	1.343	1.074	992	805	508
dal 163 al 171, dal 172 al 175, dal 176 al 198, 199, 200	Altre mal. app. respir., escl. la tbc.	326	336	271	190	186	117	113	111
	Enteriti	794	465	1.306	249	171	773	39	60
	Appendicite	108	121	99	92	51	31	35	50
	Malattie del fegato e vie biliari	231	292	207	237	234	70	70	81
	Altre mal. dell'apparato digerente	407	331	383	251	266	154	148	129
	Nefriti	395	467	854	222	277	193	146	136
	Altre mal. dell'app. genito-urinario	229	161	215	126	111	107	59	70
	Setticemia e infezioni puerperali	43	23	24	13	14	17	11	4
	Altre mal. della gravid., parto e puerp.	56	34	80	17	21	32	14	11
	Malattie della pelle, ecc. (d)	105	94	130	50	62	57	30	53
	Debolezza congenita, ecc. (e)	705	552	439	288	276	361	125	117
	Senilità	230	275	685	158	218	608	172	62
	Suicidio	108	135	72	89	75	22	56	62
	Omicidio	14	14	31	10	1	10	4	3
	Morte violenta e accidentale (f)	408	376	275	217	193	109	129	131
	Morte improvvis. e cause non specificate o mal definite	219	173	51	164	74	81	49	9

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

abitanti al censimento del 21 aprile 1936, classificati secondo le cause di morte.

VENEZIA	TRIESTE	CATANIA	BARI	MESSINA	VERONA	PADOVA	TARANTO	LIVORNO	BRESCIA	FERRARA	REGGIO DI CALABRIA	LA SPEZIA	CAGLIARI	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
3.399	3.371	4.325	2.859	2.890	2.191	1.969	1.883	1.726	2.510	1.443	1.830	1.271	1.745	
33	15	48	70	48	41	18	24	6	35	15	11	15	21	1, 2
10	16	8	2	6	2	3	—	3	52	5	12	—	—	3
—	2	1	1	2	4	1	—	—	2	1	1	1	—	7
31	25	3	4	46	5	17	1	—	4	1	6	5	13	8
15	34	10	4	11	17	11	8	7	58	6	12	9	8	9
43	51	10	504	39	45	23	15	32	56	16	14	12	54	10
240	391	261	61	176	99	158	95	147	218	127	87	101	213	11
112	79	52	46	46	18	68	43	43	45	49	24	21	53	23
26	38	25	23	12	9	9	9	10	19	5	11	7	6	dal 24 al 32
—	—	8	2	2	—	—	1	—	—	2	3	1	4	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
120	53	106	31	83	36	48	16	38	63	20	39	25	43	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44, dal 45 al 53
327	396	146	97	131	165	199	47	211	213	145	59	124	93	56, dal 60 al 74, 76, 77
13	17	7	7	3	8	31	5	8	5	4	3	4	12	80, 83
7	6	6	3	2	9	2	2	4	3	4	2	10	2	82
30	45	49	15	25	17	16	10	22	17	8	16	20	7	78, 79, 81, dall'84 all'89, dal 90 al 95, dal 96 al 103, 106
9	5	—	—	—	1	3	—	—	5	1	1	2	—	107, 108, 109
50	36	54	51	24	33	43	24	19	24	26	34	22	38	104, 105, dal 110 al 114, 119, 120
7	23	10	2	2	8	8	1	2	15	9	4	2	1	121
293	178	246	212	211	218	166	114	163	187	164	107	116	102	dal 124 al 127, dal 115
60	60	88	37	87	57	55	78	29	86	41	46	26	38	al 118, 122, 123, 128, 129, 130, 131, 132, dal 133 al 139, 140, 145
331	320	336	175	382	261	133	134	204	217	154	166	150	120	dal 141 al 144, dal 146 al 150, dal 151 al 156, dal 157 al 161, 162
150	105	102	63	47	79	85	32	75	46	56	32	37	46	dal 163 al 171, dal 172 al 175, dal 176 al 198
58	36	143	32	40	51	21	62	49	32	22	32	17	25	199, 200
488	395	720	309	430	286	225	216	228	396	176	350	172	156	
75	92	83	51	57	45	65	32	41	46	24	25	34	25	
134	98	641	350	289	171	66	373	50	188	33	251	39	224	
17	19	23	16	6	13	7	14	17	10	7	15	14	7	
50	70	74	25	24	26	26	24	29	26	19	19	28	39	
62	99	94	56	52	65	40	46	48	52	47	45	40	63	
135	91	146	97	124	65	59	64	39	71	32	56	35	54	
39	55	68	41	36	33	33	29	33	25	12	20	20	28	
3	10	24	6	5	9	11	1	1	11	2	5	5	9	
6	9	19	20	4	14	13	6	4	6	10	5	3	9	
26	35	37	24	18	18	8	14	15	13	8	16	12	16	
149	118	220	221	90	91	108	159	48	126	86	63	42	87	
85	181	333	110	268	70	102	108	22	18	51	172	25	41	
27	56	15	11	10	19	21	6	13	22	12	1	18	7	
1	2	5	1	—	1	1	—	1	1	1	7	1	5	
104	110	79	65	39	60	55	50	56	82	40	32	46	63	
33	—	25	14	13	22	11	20	9	15	—	26	10	13	

delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie.

TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classificate secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		COMPLESSO . . .	37.488	16.453	70.389	32.506	33.769	16.628	9.983	4.876	5.406
I. - Malattie infettive e parassitarie											
1 e 2 Febbre tifoide e paratifi											
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	1	1	16	7	59	28	65	38	90	47
2	Paratifo	1	1	4	2	12	6	4	2	4	1
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Febbre ricorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Febbre ondulante	—	—	—	—	2	1	2	2	2	1
6	Vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	3	2	449	189	888	391	330	158	157	65
8	Scarlattina	1	—	21	10	48	18	34	18	28	14
9	Tosse convulsa	46	30	1.416	767	829	476	232	140	105	67
10	Difterite	15	8	249	103	656	303	416	180	364	172
11	Influenza	199	85	1.650	726	957	440	323	146	160	79
	a) con complicazioni respiratorie indicate	164	74	1.411	612	838	378	265	110	129	69
	b) senza complicazioni respirator. indicate	35	11	239	114	119	62	58	36	31	20
13	Dissenteria	6	3	75	28	62	27	19	7	5	3
	a) amebica	—	—	7	3	12	7	2	—	—	—
	b) bacillare	2	1	13	4	11	6	5	2	2	2
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	4	2	55	21	39	14	12	5	3	1
15	Risipola	185	84	260	134	22	14	12	7	7	5
16	Poliomielite a. polioencefalite ac.	7	2	71	24	85	39	45	20	25	9
17	Encefalite letargica o epidemica	—	—	3	1	3	1	—	—	1	1
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	1	1	63	19	29	11	10	6	12	2
20	Pustola maligna e carbonchio	—	—	4	2	3	2	—	—	3	3
21	Rabbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tetano	75	27	6	1	6	2	4	—	7	2
23 a 32	Tubercolosi :	8	3	798	370	706	314	444	208	365	167
23	dell'apparato respiratorio (b)	1	—	142	64	135	59	78	30	53	31
24	delle meningi e sist. nerv. centr.	5	2	534	248	416	175	285	141	228	96
25	degli intest. e del peritoneo (c)	1	—	51	25	81	42	37	15	35	21
26	della colonna vertebrale	—	—	4	3	8	5	12	6	10	2
27	delle ossa e delle articolaz. (d)	—	—	19	10	9	4	6	—	6	3
28	della pelle e sottocutanea	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
29	del sistema linfatico (e)	—	—	16	5	17	10	6	4	4	1
30	dell'apparato genito-urinario	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
31	Altre localizzazioni della tuberc.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
32	Tubercolosi disseminata	1	1	31	15	37	19	19	9	29	13
	a) acuta	1	1	23	8	26	14	14	6	22	9
	b) cronica	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—
	c) non specificata	—	—	7	7	9	4	5	3	7	4
33	Lebbra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Sifilide	291	132	396	182	75	29	18	9	10	3
	a) congenita	291	132	366	167	71	29	17	9	9	2
	b) acquisita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata	—	—	30	15	4	—	1	—	1	1
35	Inf. gonococcica e altre m. veneree	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—
36	Inf. purulenta e setticemia (f)	43	14	475	239	175	96	73	32	56	31
	a) setticemia	26	9	379	195	152	87	61	28	48	28
	b) piemia	17	5	96	44	23	9	12	4	8	5
	c) cangrena gassosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Malaria	2	—	100	55	77	29	49	24	23	11
	a) febbre malarica	2	—	82	46	52	18	28	18	13	7
	b) cachessia palustre	—	—	18	9	25	11	21	6	10	4
39	Altre mal. dovute a protozoi paras.	—	—	10	5	37	17	24	16	12	6

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale ecc.

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		COMPLESSO . . .	3.673	1.743	10.163	4.826	7.490	3.651	9.950	4.780	13.112	6.471	14.002	7.059	13.356	6.631	13.945
I. - Malattie infettive e parassitarie																	
1 e 2 Febbre tifoide e paratifi																	
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	101	47	573	303	630	344	857	470	632	376	569	300	441	235	287	160
2	Paratifo	94	44	535	281	590	325	820	450	593	354	531	277	421	223	277	153
3	Tifo petecchiale	7	3	38	22	40	19	37	20	39	22	38	23	20	12	10	7
4	Febbre ricorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Febbre ondulante	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	Vaiolo	2	1	7	—	7	3	12	7	19	6	22	9	21	9	22	11
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	94	42	149	63	30	18	13	8	17	7	5	1	1	1	—	
8	Scarlattina	20	6	70	41	29	22	18	9	5	3	5	5	3	2	6	2
9	Tosse convulsa	53	33	45	30	4	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
10	Difterite	300	156	551	292	114	60	32	18	9	5	10	8	7	6	5	2
11	Influenza	98	49	225	116	137	70	219	87	223	103	230	120	263	119	285	129
	a) con complicazioni respiratorie indicate	71	41	145	75	84	44	146	56	179	78	182	92	210	91	236	102
	b) senza complicazioni respirator. indicate	27	8	80	43	53	29	73	31	44	25	48	28	53	28	49	27
13	Dissenteria	12	7	32	8	13	3	6	3	8	2	9	1	11	6	11	3
	a) amebica	—	—	6	1	1	1	1	1	4	—	6	—	3	—	6	2
	b) bacillare	4	3	11	4	4	1	1	1	2	2	3	1	2	2	2	1
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	8	4	15	3	8	1	4	2	2	—	—	6	4	3	—	—
15	Risipola	1	—	9	4	14	8	15	8	28	13	17	10	33	13	42	24
16	Poliomielite a. polioencefalite ac.	14	6	42	21	25	10	8	3	7	1	1	—	1	1	2	—
17	Encefalite letargica o epidemica	1	—	7	3	4	—	6	5	15	6	31	9	31	15	32	17
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	9	3	16	5	15	6	16	10	15	1	9	3	2	—	3	—
20	Pustola maligna e carbonchio	1	1	2	1	5	1	14	6	6	3	11	6	9	4	7	4
21	Rabbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tetano	14	4	80	23	70	23	39	7	19	7	23	8	35	11	30	12
23 a 32	Tubercolosi :	291	147	1.101	557	1.320	628	3.052	1.883	5.267	2.960	4.979	2.763	3.831	1.968	3.092	1.421
23	dell'apparato respiratorio (b)	50	26	173	90	494	356	2.173	1.402	4.214	2.418	4.223	2.361	3.296	1.666	2.656	1.184
24	delle meningi e sist. nerv. centr.	177	87	652	331	466	264	370	199	306	148	174	95	91	55	70	37
25	degli intest. e del peritoneo (c)	30	15	112	50	107	67	143	92	230	148	170	97	121	78	118	87
26	della colonna vertebrale	11	7	38	18	58	30	44	14	69	31	63	26	54	27	48	28
27	delle ossa e delle articolaz. (d)	5	2	26	12	45	24	57	18	82	23	66	24	67	34	37	15
28	della pelle e sottocutanea	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	3	3	3	3	2	2
29	del sistema linfatico (e)	3	2	11	5	11	3	14	8	6	5	5	3	1	1	5	5
30	dell'apparato genito-urinario	—	—	3	2	8	5	11	5	4							

Segue : TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classi-

Table with columns for cause of death (CAUSE DI MORTE), duration (MENO DI 1 MESE, DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO, etc.), and sex (Tot., di cui F).

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns for age groups (DI 4 ANNI, DA 5 A 9 ANNI, etc.), sex (Tot., di cui F), and a final column for the number of deaths (NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO).

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari).

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
71	Anemie	—	—	173	86	163	90	41	24	25	13
	a) anemia pernicioosa progressiva.	—	—	30	14	50	30	14	9	9	5
	b) altre	—	—	143	72	113	60	27	15	16	8
72	Leucemie e aleucemie	—	—	62	26	67	30	23	6	16	8
	a) leucemie vere.	—	—	53	23	62	24	22	6	12	8
	b) aleucemie	—	—	9	3	5	6	1	—	4	—
73	Malattie della milza	—	—	5	1	8	3	4	1	2	2
74	Altre mal. sangue e org. ematop.	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—
	V. - Avvelenamenti cronici e intossic.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
75	Alcoolismo	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	a) acuto	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	b) cronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI. - Mal. del sistema nervoso, ecc. (b)	1.516	647	3.248	1.506	1.297	595	591	249	363	158
78	Encefalite (non epidemica)	1	1	61	23	42	23	25	10	13	4
	a) ascesso del cervello.	—	—	6	4	3	1	1	—	1	—
	b) altre	1	1	55	19	39	22	24	10	12	4
79	Meningite semplice	22	7	696	308	322	141	172	70	114	59
80	Atassia locomotrice progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Altre malattie del midollo spinale	2	1	9	4	12	5	7	1	2	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	1	1	13	7	6	2	6	4	4	3
	a) emorragia cerebrale.	—	—	6	2	3	2	2	1	3	2
	b) embolia e trombosi cerebrale.	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—
	c) emiplegia ed altre paralisi (c).	1	1	5	3	1	—	3	2	1	1
83	Paralisi progressiva degli alienati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Demenza precoce e altre psicosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) demenza precoce.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre psicosi.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Epilessia	4	1	16	7	14	3	16	7	8	3
86	Convulsioni (bambini — 5 anni)	1.473	630	2.304	1.103	826	389	328	138	185	76
87	Altre malattie del sistema nervoso	3	1	21	9	17	9	12	7	12	5
	a) corea	1	—	5	4	—	—	2	1	1	—
	b) nevrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) paralisi agitante.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) sclerosi a placche.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e) altre	2	1	16	5	17	9	10	6	11	5
88	Malattie degli organi della vista	1	1	4	1	—	—	—	—	1	—
89	Mal. dell'orecch. e del seno mastoid.	9	4	124	44	58	23	25	12	24	8
	a) otite	8	3	98	33	38	16	17	9	14	5
	b) altre	1	1	26	11	20	7	8	3	10	3
	VII. - Malattie dell'appar. circolatorio	26	13	174	75	110	61	73	46	53	21
90 a 95	Malattie del cuore:	17	10	132	56	72	40	53	35	42	18
90	Pericardite	1	—	5	3	2	1	1	1	2	1
91	Endocardite acuta	3	2	13	5	3	2	2	1	5	1
92	Endocard. cr., comp. le aff. valvol.	—	—	50	21	31	15	26	19	24	11
93	Malattie del miocardio	8	5	24	9	17	12	12	9	4	2
	a) miocardite acuta	6	3	5	3	1	1	3	2	1	1
	b) miocardite cr. e degeneraz. del miocardio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	c) non specificate.	2	2	19	6	15	10	9	7	3	1
94	Mal. arterie coron. e angina pect.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Altre malattie del cuore	5	3	40	18	19	10	12	5	7	3
	a) malattie funzionali del cuore.	—	—	2	1	4	3	1	—	—	—
	b) altre e non specificate.	5	3	38	17	15	7	11	5	7	3
96	Aneurisma, eccet. l'aneur. del cuore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Arteriosclerosi (d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) ecettuate le malattie delle arterie coronarie.

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
71	Anemie	20	10	51	22	30	17	18	12	27	21	38	25	41	27	54	40
	a) anemia pernicioosa progressiva.	3	—	27	10	19	12	10	7	22	17	30	20	28	20	38	28
	b) altre	17	10	24	12	11	5	8	5	5	4	8	5	13	7	16	12
72	Leucemie e aleucemie	26	12	92	32	67	27	65	23	58	28	73	34	99	37	81	44
	a) leucemie vere.	17	10	63	22	46	18	42	17	26	14	27	13	38	15	44	25
	b) aleucemie	9	2	29	10	21	9	23	6	32	14	46	21	61	22	37	19
73	Malattie della milza	—	—	4	2	7	1	2	2	9	5	16	7	7	4	4	1
74	Altre mal. sangue e org. ematop.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
	V. - Avvelenamenti cronici e intossic.	2	1	—	—	—	—	2	—	1	—	8	1	19	1	44	7
75	Alcoolismo	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	7	1	18	1	38	6
	a) acuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) cronico	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	7	1	18	1	38	6
76	Avvelenam. cronici da sost. organ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Avvelenam. cron. da sost. minerali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) professionali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI. - Mal. del sistema nervoso, ecc. (b)	257	111	656	295	488	224	489	205	473	193	584	258	674	289	914	379
78	Encefalite (non epidemica)	7	3	36	19	23	8	31	14	26	11	38	15	31	13	47	18
	a) ascesso del cervello.	1	—	6	3	10	4	10	6	11	2	8	3	7	2	17	5
	b) altre	6	3	30	16	13	4	21	8	15	9	30	12	24	11	30	13
79	Meningite semplice	103	47	264	122	192	100	139	63	91	46	89	43	72	35	68	22
80	Atassia locomotrice progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	6	2	11	3
81	Altre malattie del midollo spinale	5	2	14	6	17	7	24	7	24	5	26	14	31	16	40	21
82	Emorragia, embolia e tromb. cereb.	1	—	26	11	26	10	41	22	49	25	88	40	142	60	281	141
	a) emorragia cerebrale.	—	—	9	2	13	6	16	9	21	6	46	16	83	35	168	76
	b) embolia e trombosi cerebrale.	—	—	5	2	3	1	8	7	15	12	27	17	35	17	65	40
	c) emiplegia ed altre paralisi (c).	1	—	12	7	10	3	17	6	13	7	15	7	24	8	48	28
83	Paralisi progressiva degli alienati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Demenza precoce e altre psicosi	—	—	4	3	7	4	20	11	58	25	94	34	110	50	129	53
	a) demenza precoce.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre psicosi.	—	—	4	3	7	4	20	11	58	25	94	34	110	50	129	53
85	Epilessia	13	8	60	17	80	28	113	45	124	50	125	58	150	70	114	49
86	Convulsioni (bambini — 5 anni)	104	41	—	—												

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
98	Cangrena	3	1	7	2	22	12	11	4	9	3
	a) senile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre	3	1	7	2	22	12	11	4	9	3
99	Altre malattie delle arterie	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
100	Mal. vene: varici, emorr., fleb., ecc.	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
101	Mal. sist. linfat., linfangioite, ecc.	3	1	30	13	16	9	7	5	1	—
102	Anomalie idiopatiche press. sang.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Altre mal. dell'appar. circolatorio	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—
	VIII. - Mal. dell'apparato respiratorio	3.846	1.597	21.249	9.400	11.890	5.673	3.528	1.722	1.645	804
104	Malattie delle fosse nasali e annessi	5	3	10	6	2	2	2	2	—	—
105	Malattie della laringe	36	15	83	42	58	26	31	7	21	10
106	Bronchite	982	413	3.135	1.476	1.198	631	265	145	121	65
	a) acuta	319	132	998	488	338	183	84	50	30	14
	b) cronica	—	—	55	22	74	35	26	12	12	6
	c) non specificata	663	281	2.082	966	786	413	155	83	79	45
107 a 109	Polmonite, tutte le forme	2.790	1.149	17.788	7.787	10.343	4.882	3.082	1.497	1.409	892
107	Broncop. compr. la bronch. capil.	2.462	1.008	14.948	6.489	8.477	4.021	2.456	1.202	1.117	565
108	Polmonite lobare	328	141	2.810	1.278	1.866	841	606	295	292	127
110	Pleuriti	2	1	145	60	290	105	133	50	68	26
111	Congest., edema., ecc. del polmone (b)	28	16	51	22	30	18	7	4	7	3
112	Asma	1	—	25	10	8	3	2	—	3	1
113	Enfisema polmonare	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—
114	Altre mal. app. respiratorio (c)	2	—	40	16	60	26	25	16	7	—
	a) polmonite interstiziale cronica (d)	—	—	9	3	11	4	3	2	—	—
	b) altre, compresa cangrena polmonare	2	—	31	13	49	22	22	14	16	7
	IX. - Malattie dell'apparato digerente	2.773	1.196	33.419	15.825	13.016	6.756	2.133	1.108	780	408
115	Mal. della cavità boccale, ecc. (e)	57	16	161	71	135	70	64	32	63	32
116	Malattie dell'esofago	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
117	Ulcera dello stom. e del duodeno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) stomaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) duodeno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Altre mal. stomaco (cancro eccett.)	72	28	311	150	89	45	31	18	16	6
119	Enteriti (al disotto di 2 anni)	2.531	1.121	32.426	15.421	12.535	6.518	—	—	—	—
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni e più)	—	—	—	—	—	—	1.892	991	573	307
	a) enterite	—	—	—	—	—	—	1.889	989	572	306
	b) ulcera intestinale	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1
121	Appendicite	—	—	10	6	8	6	19	9	37	18
122	Ernia, occlusione intestinale	71	18	182	47	58	19	27	8	24	8
	a) ernia	15	2	69	1	32	3	9	1	2	—
	b) occlusione intestinale	56	16	113	46	26	16	18	7	22	8
123	Altre malattie dell'intestino	2	1	42	14	21	13	11	5	6	3
124	Cirrosi del fegato	1	1	9	5	16	9	3	2	2	1
	a) alcolica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) non indicata come alcolica	1	1	9	5	16	9	3	2	2	1
125	Altre m. fegato (comp. atrof. gialla)	8	—	57	22	36	18	16	4	9	4
126	Calcolosi biliare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Altre m. della vescich. e vie biliari	3	3	65	27	30	17	12	8	7	4
128	Malattie del pancreas	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
129	Peritonite senza causa indicata	27	7	154	61	87	41	58	31	42	25
	X. - Mal. dell'app. urinario, ecc. (f)	114	51	814	377	773	419	424	220	323	163
130 a 132	Nefrite:	93	38	887	308	894	376	400	205	305	158
130	acuta	91	37	675	302	667	363	381	194	287	148
131	cronica	—	—	11	5	26	13	18	10	16	6
132	non specificata	2	1	1	1	—	—	1	1	2	2

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombotici. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali dell'

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
98	Cangrena	5	2	15	8	6	4	2	1	4	3	9	3	10	2	12	7
	a) senile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre	5	2	15	8	6	4	2	1	4	3	9	3	10	2	12	7
99	Altre malattie delle arterie	—	—	2	2	—	—	2	1	4	3	6	4	17	10	23	7
100	Mal. vene: varici, emorr., fleb., ecc.	—	—	2	1	4	4	4	2	7	2	5	5	8	5	11	6
101	Mal. sist. linfat., linfangioite, ecc.	2	1	7	2	4	2	5	—	2	1	2	2	2	1	2	1
102	Anomalie idiopatiche press. sang.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	4
103	Altre mal. dell'appar. circolatorio	1	—	2	1	1	1	—	—	4	2	4	2	2	1	1	1
	VIII. - Mal. dell'apparato respiratorio	978	478	1.973	990	963	525	1.365	589	1.605	665	1.789	835	2.010	932	2.165	866
104	Malattie delle fosse nasali e annessi	1	—	2	1	2	—	7	2	5	2	6	2	6	2	1	—
105	Malattie della laringe	20	11	28	12	9	4	7	4	3	2	5	1	7	4	4	2
106	Bronchite	53	23	116	55	52	31	69	42	83	50	72	41	103	54	101	34
	a) acuta	14	5	29	12	8	6	13	8	8	4	5	3	15	10	3	1
	b) cronica	5	1	22	11	15	8	24	14	43	26	47	24	58	25	81	26
	c) non specificata	34	17	65	32	29	17	32	20	32	20	20	14	30	19	17	7
107 a 109	Polmonite, tutte le forme	832	412	1.673	858	811	447	1.123	477	1.263	501	1.417	662	1.611	745	1.706	728
107	Broncop. compr. la bronch. capil.	620	311	1.193	622	502	281	634	298	633	274	754	381	814	414	873	400
108	Polmonite lobare	212	101	480	234	309	166	489	179	630	227	663	281	797	331	833	326
110	Pleuriti	45	22	103	43	52	27	95	41	156	68	145	73	128	65	119	54
111	Congest., edema., ecc. del polmone (b)	8	3	13	7	13	8	7	3	16	10	18	10	30	17	26	13
112	Asma	4	—	7	3	3	1	7	5	7	5	18	8	17	9	35	7
113	Enfisema polmonare	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	4	3	7	2
114	Altre mal. app. respiratorio (c)	14	7	31	13	21	7	50	15	71	26	103	37	104	33	166	28
	a) polmonite interstiziale cronica (d)	2	—	2	1	2	1	3	2	7	6	10	6	7	2	4	2
	b) altre, compresa cangrena polmonare	12	7	29	12	19	6	47	13	64	20	93	31	97	31	162	26
	IX. - Malattie dell'apparato digerente	468	225	1.437	717	857	369	756	277	896	332	1.034	416	1.123	440	1.230	479
115	Mal. della cavità boccale, ecc. (e)	53	28	186	99	87	47	56	25	67	28	67	20	63	25	46	18
116	Malattie dell'esofago	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—
117	Ulcera dello stom. e del duodeno	1	1	4	2	6	2	44	14	96	20	198	26	259	33	306	46
	a) stomaco	—	—	3	2	5	1	32	9	55	12	118	19	158	20	183	62
	b) duodeno	—	—	1	—	1	—	12	5	41	8	80	7	101	13	123	14
118	Altre mal. stomaco (cancro eccett.)	12	5	16	6	7	3	11	7	7	3	14	2	24	10	27	11
119	Enteriti (al disotto di 2 anni)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Enteriti e ulc. intest. (2 anni e più)	294	134	583	291	220	116	125	62	139	77	155	83	125	60	128	66
	a) enterite	294	134	582	290	213	114	121	60	135	75	146	78	117			

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO		DI 1 ANNO		DI 2 ANNI		DI 3 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		133	Altre malattie dei reni, ecc. (b)	4	1	45	25	29	11	11	6
	a) pielite	1	1	32	20	18	7	4	2	6	3
	b) altre	3	—	13	5	11	4	7	4	5	2
134	Calcolosi delle vie urinarie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) calcolosi della vescica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) calcolosi senza altre indicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	6	2	71	36	42	27	10	7	2	1
	a) cistite	4	2	48	27	27	20	7	6	1	1
	b) altre	2	—	23	9	15	7	3	1	—	—
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) stenosi uretrale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Malattie della prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c)	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—
139	Mal. organi genitali della donna (c)	10	10	8	8	5	5	2	2	—	—
	a) ovaie, trombe e parametri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) utero	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) mammelle	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) altre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI. - Malattie gravid., parto e puerp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Aborto con condizioni settiche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Gestazione ectopica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Altri accidenti della gravidanza (e)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) da placenta previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre emorragie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Setticemia e infezioni puerperali (f)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) setticemia e piemia puerperali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) tetano puerperale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Altre forme di tossiemia della grav.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) embolia o morte improvvisa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Altri accidenti del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Altre malattie non definite (h)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.	96	46	372	166	158	67	49	27	32	14
151	Foruncoli	3	2	41	18	12	7	2	2	2	1
152	Flemmone, ascesso caldo	65	31	202	95	114	44	41	22	24	9
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i)	28	13	129	53	32	16	6	3	6	4
	XIII. - Malattie delle ossa e degli or- gani della locomozione	6	4	56	28	44	18	28	10	38	15
154	Osteomielite infettiva acuta	3	3	28	16	28	11	21	7	33	12
155	Altre malattie delle ossa (l)	2	—	7	2	8	6	5	2	4	3
156	Mal. articolazioni, ecc. (m)	1	1	21	10	8	1	2	1	1	—
	a) articolaz. (eccett. la tba. e il reumatismo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altri organi della locomozione	1	1	20	10	8	1	2	1	1	—
	XIV. - Vizi di conformazione congen.	1.969	888	762	375	137	64	56	19	42	26
157	Vizi di conformazione congeniti (n)	1.969	888	762	375	137	64	56	19	42	26
	a) idrocefalia	67	29	117	49	62	19	22	7	11	4
	b) spina bifida e meningocele	419	223	181	105	13	8	3	1	3	3
	c) malformazioni congenite del cuore	786	332	305	144	54	27	22	7	21	14
	d) mostrosità	112	57	3	2	—	—	2	1	1	1
	e) altri	585	247	156	75	18	10	7	3	6	4
	XV. - Malattie dell'infanzia	25.718	11.401	2.731	1.259	—	—	—	—	—	—
158	Debolezza congenita	9.145	4.150	1.420	685	—	—	—	—	—	—
159	Nascita prematura (n)	10.532	4.700	401	193	—	—	—	—	—	—

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacineti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) ma specificata come settica. (h) o condizioni non specificate del puerperio. (i) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DI 4 ANNI		DA 5 A 9 ANNI		DA 10 A 14 ANNI		DA 15 A 19 ANNI		DA 20 A 24 ANNI		DA 25 A 29 ANNI		DA 30 A 34 ANNI		DA 35 A 39 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		133	Altre malattie dei reni, ecc. (b)	7	2	18	5	8	3	16	8	35	18	54	34	54	32
	a) pielite	2	2	8	3	5	2	6	4	22	16	33	22	29	19	37	25
	b) altre	5	—	10	2	3	1	10	4	13	2	21	12	25	13	20	9
134	Calcolosi delle vie urinarie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) calcolosi della vescica	2	1	3	—	5	1	4	1	9	2	23	9	23	10	13	4
	c) calcolosi senza altre indicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	5	3	7	—	7	3	5	2	6	3	14	8	9	2	14	4
	a) cistite	3	2	6	—	6	3	4	1	5	3	12	7	9	2	12	2
	b) altre	2	1	1	—	1	—	1	1	1	—	2	1	—	—	2	2
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) stenosi uretrale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) altre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Malattie della prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Mal. organi genitali della donna (c)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) ovaie, trombe e parametri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) mammelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d) altre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI. - Malattie gravid., parto e puerp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Aborto con condizioni settiche	—	—	—	—	—	—	—	—	97	97	394	394	657	657	647	647
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d)	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	30	30	54	54	39	34
142	Gestazione ectopica	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	10	10	14	20
143	Altri accidenti della gravidanza (e)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	7	32	32	36	30
144	Emorragia puerperale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) da placenta previa	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	54	54	100	100	126	120
	b) altre emorragie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Setticemia e infezioni puerperali (f)	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	46	46	77	77	81	75
	a) setticemia e piemia puerperali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) tetano puerperale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerper.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Altre forme di tossiemia della grav.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) embolia o morte improvvisa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Altri accidenti del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Altre malattie non definite (h)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.	17	8	76	33	6											

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classi

Table with columns for cause di morte (a), duration (Meno di 1 mese, Da 1 mese a meno di 1 anno, Di 1 anno, Di 2 anni, Di 3 anni) and sub-columns for Tot. and di cui F.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) non compresi i nati morti. (c) solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive. (d) su persone di un anno...

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns for age groups (Di 4 anni, Da 5 a 9 anni, Da 10 a 14 anni, Da 15 a 19 anni, Da 20 a 24 anni, Da 25 a 29 anni, Da 30 a 34 anni, Da 35 a 39 anni) and sub-columns for Tot. and di cui F.

e più. (e) eccezzuati quelli da gas. (f) diverse da quelle per incendio. (g) escluse le ferite di guerra. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite a un...

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 40 A 44 ANNI		DA 45 A 49 ANNI		DA 50 A 54 ANNI		DA 55 A 59 ANNI		DA 60 A 64 ANNI											
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F										
		COMPLESSO												15.015	7.207	17.648	8.158	21.322	9.873	27.225	12.450
I. - Malattie infettive e parassitarie												3.690	1.662	3.401	1.437	3.065	1.250	2.963	1.215	2.744	1.189
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi	189	118	141	94	144	91	119	67	82	43										
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	172	105	121	83	132	84	106	61	82	39										
2	Paratifo	17	13	20	11	12	7	13	6	10	4										
3	Tifo petecchiale	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
4	Febbre ricorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
5	Febbre ondulante	19	7	11	3	13	6	20	12	14	4										
6	Vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
7	Morbillo	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—										
8	Scarlattina	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—										
9	Tosse convulsa	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1										
10	Difterite	5	2	5	4	2	1	4	2	2	2										
11	Influenza	291	136	384	167	453	194	592	267	765	374										
	a) con complicazioni respiratorie indicate	242	113	315	131	386	159	505	218	645	308										
	b) senza complicazioni respirator. indicate	49	23	69	36	67	35	87	49	120	66										
13	Dissenteria	11	4	5	1	6	3	11	4	17	9										
	a) amebica	5	2	—	—	2	—	2	1	2	—										
	b) bacillare	2	—	—	—	2	—	4	—	4	—										
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	4	2	3	—	2	—	5	—	11	7										
15	Risipola	47	21	49	23	62	23	89	43	86	35										
16	Poliomielite ac., polioencefalite ac.	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—										
17	Encefalite letargica o epidemica	32	15	32	10	40	17	17	14	25	7										
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	8	4	5	3	—	—	1	—	—	—										
20	Pustola maligna e carbonchio	14	5	12	3	11	5	11	3	9	—										
21	Rabbia	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—										
22	Tetano	27	5	31	4	33	10	40	10	35	11										
23 a 32	Tubercolosi:	2.718	1.228	2.355	988	1.901	754	1.648	643	1.307	559										
23	dell'apparato respiratorio (b)	2.301	984	1.978	778	1.586	602	1.369	495	1.054	434										
24	delle meningi e sist. nerv. centr.	73	50	48	28	27	9	26	9	15	4										
25	degli intest. e del peritoneo (c)	86	55	84	55	79	49	70	39	54	32										
26	della colonna vertebrale	45	25	50	33	41	22	41	30	35	22										
27	delle ossa e delle articolaz. (d)	45	24	47	22	46	20	54	28	71	36										
28	della pelle e sottocutaneo	4	3	5	4	5	5	5	3	4	2										
29	del sistema linfatico (e)	3	3	6	2	4	1	4	3	6	3										
30	dell'apparato genito-urinario	53	26	49	21	38	9	24	8	23	10										
31	Altre localizzazioni della tuberc.	2	—	—	—	1	1	—	—	4	1										
32	Tubercolosi disseminata	106	56	88	43	74	36	54	28	41	15										
	a) acuta	45	22	27	9	34	14	16	7	16	5										
	b) cronica	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—										
	c) non specificata	61	34	60	34	38	20	38	21	23	10										
33	Lebbra	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—										
34	Sifilide	114	26	143	44	164	41	139	38	109	27										
	a) congenita	1	1	—	—	2	1	1	1	1	1										
	b) acquisita	112	25	143	44	161	40	137	37	106	26										
	c) non specificata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
35	Inf. gonococcica e altre m. veneree	4	4	2	1	1	1	—	—	3	—										
36	Infesz. purulenta e setticemia (f)	136	61	135	61	172	82	186	85	195	89										
	a) setticemia	118	53	104	51	146	67	164	78	188	79										
	b) piemia	15	7	27	8	22	14	20	7	24	8										
	c) cangrena gassosa	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—										
38	Malaria	50	19	55	16	42	13	60	16	66	22										
	a) febbre malarica	28	13	46	15	25	7	34	8	26	9										
	b) cachessia palustre	22	6	9	1	17	6	26	8	40	13										
39	Altre mal. dovute a protozoi paras.	1	1	5	4	3	1	1	1	2	—										

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (c) compresi gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale ec-

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 65 A 69 ANNI		DA 70 A 74 ANNI		DA 75 A 79 ANNI		DA 80 A 84 ANNI		DA 85 A 89 ANNI		DA 90 E PIÙ		ETÀ IGNOTA		TOTALE																				
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	MF																		
	COMPLESSO																			46.966	22.525	62.045	30.733	64.107	32.294	49.353	25.731	24.799	13.455	7.249	4.313	16	5	316.551	298.869
I. - Malattie infettive e parassitarie																			2.621	1.187	2.479	1.239	2.012	1.104	1.305	704	584	328	163	92	3	1	37.634	36.606	74.240
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi	50	21	35	18	15	8	4	2	1	—	—	—	—	2.295	2.816	5.111																		
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	38	17	26	11	13	4	4	2	1	—	—	—	2.140	2.622	4.762																			
2	Paratifo	12	4	9	7	2	2	—	—	—	—	—	—	155	194	349																			
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2																			
4	Febbre ricorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1																			
5	Febbre ondulante	9	2	11	6	3	3	2	—	—	—	—	—	127	93	220																			
6	Vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1																			
	a) vaiolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1																			
	b) vaioloide, alastrim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			
	c) non specificato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			
7	Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.192	945	2.137																		
8	Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	150	289																			
9	Tosse convulsa	—	—	2	2	2	1	1	—	1	—	—	—	1.186	1.554	2.740																			
10	Difterite	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.423	1.325	2.748																			
11	Influenza	962	459	1.150	612	1.170	661	876	455	388	223	110	57	6.231	5.879	12.110																			
	a) con complicazioni respiratorie indicate	795	374	979	507	956	520	701	365	293	170	72	36	5.236	4.713	9.949																			
	b) senza complicazioni respirator. indicate	167	85	171	105	214	141	175	90	95	53	38	21	995	1.166	2.161																			
13	Dissenteria	17	6	24	12	27	17	7	3	4	2	—	—	236	162	398																			
	a) amebica	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	21	65																			
	b) bacillare	5	1	2	1	3	1	1	1	—	—	—	—	51	36	87																			
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	9	4	19	11	24	16	6	2	4	2	—	—	141	105	246																			
15	Risipola	99	41	127	53	124	71	61	39	22	9	4	4	729	686	1.415																			
16	Poliomielite ac., polioencefalite ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	136	337																			
17	Encefalite letargica o epidemica	21	7	12	5	5	4	3	1	—	—	—	—	184	138	322																			
18	Meningite cerebro-spinale epidem.	6	2	8	1	4	1	—	—	—	—	—	—	141	74	215																			
20	Pustola maligna e carbonchio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	53	140																			
21	Rabbia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4																			
22	Tetano	23	3	26	6	14	6	4	1	—	—	—	—	458	183	641																			
23 a 32	Tubercolosi:	1.008	480	812	300	282	143	76	43	26	16	2	1	1	18.453	18.737	37.190																		
23	dell'apparato respiratorio (b)	781	342	456	203	184	88	34	17	15	8	1	1	13.809	13.639	27.448																			
24	delle meningi e sist. nerv. centr.	5	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1.988	1.982	3.970																			
25	degli intest. e del peritoneo (c)	37	27	27	20	17	11	5	3	1	1	—	—	667	1.029	1.696																			
26	della colonna vertebrale	28	16	18	10	8																													

Segue: TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classi-

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	Da 40 A 44 ANNI		Da 45 A 49 ANNI		Da 50 A 54 ANNI		Da 55 A 59 ANNI		Da 60 A 64 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		40	Anchilostomiasi	1	1	—	—	—	—	1	1
41	Cisti idatica	10	4	16	6	11	6	9	3	10	5
	a) del fegato	6	3	10	5	8	5	6	1	7	4
	b) altre localizzazioni	4	1	6	1	3	1	3	2	3	1
42	Altre malattie dovute a elminti	1	1	3	3	1	—	2	1	—	—
43	Micosi	1	1	3	—	1	1	7	2	—	—
44	Altre mal. infettive e parassitarie	5	—	5	4	1	—	2	2	3	1
	II. - Tumori (neoplasie)	1.683	1.125	2.695	1.711	3.511	2.070	4.478	2.353	5.436	2.700
45 a 53	Cancro e altri tumori maligni	1.470	958	2.448	1.502	3.317	1.935	4.339	2.269	5.304	2.618
45	Tumori maligni della bocca e faringe	34	12	78	13	129	22	186	32	219	35
46	Tumori maligni tubo dig. e peritoneo	533	237	1.027	465	1.578	702	2.414	1.050	3.262	1.419
	a) esofago	13	3	38	6	83	15	129	19	151	34
	b) stomaco e duodeno	293	112	594	257	909	391	1.412	684	1.980	816
	c) retto	36	15	64	39	86	36	130	54	158	64
	d) fegato e vie biliari	112	60	205	108	302	158	441	243	692	318
	e) pancreas	16	8	28	9	42	18	64	27	84	32
	f) peritoneo	15	13	21	14	25	17	37	21	41	30
	g) altri organi	48	26	77	33	131	67	201	102	256	126
47	Tumori maligni dell'app. respirat.	88	20	119	28	156	35	223	52	209	53
48	— dell'utero	304	304	462	462	505	505	471	471	397	397
49	— degli altri org. genit. della donna	39	39	68	68	68	68	68	68	51	51
50	— delle mammelle	205	204	259	258	345	341	326	321	333	327
51	— degli organi genito-urin. dell'uomo	37	—	53	—	81	—	120	—	175	—
52	— della pelle	15	5	39	12	41	11	71	22	74	14
53	— di altri organi o di org. non spec.	215	137	343	196	414	251	460	253	584	322
54	Tumori non maligni	188	158	219	192	164	117	111	74	114	73
	a) organi genitali della donna	133	133	155	155	83	83	42	42	46	46
	b) altri organi	55	25	64	37	81	34	69	32	68	27
55	Tumori a caratt. maligno non spec.	25	9	28	17	30	18	28	10	18	9
	a) organi genitali della donna	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1
	b) altri organi	24	8	28	17	29	17	28	10	17	8
	III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b)	309	197	390	227	573	347	820	463	1.144	612
56	Reumatismo articolare acuto	119	71	101	56	118	73	135	78	168	88
57	Reumatismo cronico, osteo-artrite	14	10	34	22	57	40	79	57	146	82
58	Gotta	2	1	2	1	5	3	10	1	20	7
59	Diabete mellito	85	55	160	86	305	172	490	255	703	371
60	Scorbuto	—	—	3	3	3	1	—	—	2	2
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) scorbuto	—	—	3	3	3	1	—	—	2	2
61	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Pellagra	6	6	9	5	3	2	13	5	13	6
63	Rachitismo	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
64	Osteomalacia	2	2	5	4	3	2	3	2	4	3
65	Mal. ghiandola pituitaria (ipofisi)	—	—	2	2	2	—	3	1	1	—
66	Mal. ghiand. tiroide e paratiroidi	38	32	35	30	44	39	53	49	40	34
	a) gozzo semplice	2	1	9	7	6	4	9	8	12	9
	b) gozzo esoftalmico	32	28	21	19	29	29	40	37	27	24
	c) mixedema e cretinismo	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
	d) tetania	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
	e) altre	4	3	4	4	8	5	2	2	—	—
67	Malattie del timo	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
68	Mal. ghiand. o capsule surren. (c)	32	14	30	13	24	9	19	9	27	11
69	Altre malattie generali	10	6	9	5	9	6	13	5	20	8
	IV. - Malattie del sangue e degli organi ematopoietici	162	79	156	92	202	105	190	102	241	120
70	Stati emorragipari	15	8	16	10	15	8	11	7	19	14
	a) porpora primitiva	11	8	10	6	13	7	9	7	16	12
	b) emofilia	4	2	6	4	2	1	2	—	3	2

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari).

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	Da 65 A 69 ANNI		Da 70 A 74 ANNI		Da 75 A 79 ANNI		Da 80 A 84 ANNI		Da 85 A 89 ANNI		Da 90 e più		ETÀ IGNOTA		TOTALE		
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	MF
	40	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
41	13	5	8	2	5	2	1	1	—	—	1	1	—	—	77	63	140
	4	2	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	37	39	76
	9	3	4	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	40	24	64
	3	2	4	2	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	249	251	500
	1	—	3	1	4	2	—	—	1	1	—	—	—	—	104	80	184
	10	3	8	6	6	6	2	—	2	1	—	—	—	—	121	122	243
	5.900	2.795	5.880	2.843	4.083	2.018	1.685	889	535	307	90	65	—	—	18.367	20.574	38.941
45 a 53	5.773	2.732	5.736	2.766	3.970	1.982	1.627	871	515	304	87	64	—	—	17.678	19.342	37.020
45	236	45	270	55	183	34	83	17	38	16	5	3	—	—	1.223	304	1.527
46	3.652	1.582	3.627	1.642	2.483	1.172	898	470	247	143	34	25	—	—	11.221	9.243	20.464
	155	24	152	32	101	30	34	13	9	2	—	—	—	—	692	183	875
	2.276	972	2.257	988	1.524	686	543	264	142	80	21	15	—	—	6.969	5.302	12.271
	189	75	185	72	112	52	43	23	20	9	4	2	—	—	612	478	1.090
	636	313	621	341	457	243	161	98	40	27	4	4	—	—	1.729	1.986	3.715
	100	39	83	35	51	20	29	17	7	3	2	2	—	—	308	222	530
	27	20	34	23	19	12	5	3	1	1	—	—	—	—	91	109	260
	270	139	295	151	219	129	83	52	28	21	3	2	—	—	820	963	1.783
47	208	52	156	42	83	20	40	10	8	2	—	—	—	—	1.076	366	1.442
48	335	335	280	280	143	143	70	70	21	21	1	1	—	—	—	3.278	3.278
49	59	59	62	62	42	42	21	21	8	8	2	2	—	—	—	559	559
50	291	289	257	249	191	189	86	86	41	40	10	10	—	—	30	2.509	2.539
51	269	—	298	—	213	—	94	—	22	—	3	—	—	—	1.472	—	1.472
52	132	42	180	85	183	94	159	90	60	32	24	17	—	—	569	433	1.002
53	591	328	606	351	449	268	176	107	70	42	8	6	—	—	2.087	2.650	4.737
54	113	52	126	65	100	48	53	15	20	3	3	1	—	—	557	1.089	1.646
	32	32	44	44	32	32	9	9	3	3	—	—	—	—	—	749	749
	81	20	82	21	68	16	44	6	17	3	1	—	—	—	557	340	897
55	14	11	18	12	13	8	5	3	—	—	—	—	—	—	132	143	275
	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
	14	11	16	10	12	7	5	3	—	—	—	—	—	—	132	135	267
	1.306	714	1.236	690	960	552	408	238	135	76	21	13	—	—	4.993	5.779	10.772
56	174	101	159	97	140	81	55	30	17	7	2	1	—	—	1.218	1.397	2.615

Segue : TAVOLA 5. — Morti, durante l'anno 1937, classi

Table with columns for age groups (DA 40 A 44 ANNI, DA 45 A 49 ANNI, etc.), sex (Tot., di cui F), and various causes of death (Anemie, Leucemie e aleucemie, Malattie della milza, etc.).

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) e degli organi dei sensi. (c) senza indicazione della causa. (d) eccettuate le malattie delle arterie coronarie.

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns for age groups (DA 65 A 69 ANNI, DA 70 A 74 ANNI, etc.), sex (Tot., di cui F), causes of death, and a 'TOTALE' section with columns M, F, MF.

Segue: TAVOLA 5. — Morti durante l'anno 1937, classi

Table with columns for age groups (Da 40 a 44 anni, Da 45 a 49 anni, etc.), causes of death (CAUSE DI MORTE), and numerical data. Includes sub-categories like 'VIII. - Mal. dell'apparato respiratorio' and 'IX. - Malattie dell'apparato digerente'.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) eccettuata la tubercolosi. (d) comprese le malattie professionali

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

Table with columns for age groups (Da 65 a 69 anni, Da 70 a 74 anni, etc.), causes of death, sex (M, F, MF), and numerical data. Includes sub-categories like 'VIII. - Mal. dell'apparato respiratorio' and 'IX. - Malattie dell'apparato digerente'.

dell'apparato respiratorio. (e) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (f) e dell'apparato genitale.

Segue: TAVOLA 5. — Morti durante l'anno 1937, classi

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 40 A 44 ANNI		DA 45 A 49 ANNI		DA 50 A 54 ANNI		DA 55 A 59 ANNI		DA 60 A 64 ANNI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		133	Altre malattie dei reni, ecc. (b)	53	30	62	33	77	42	96	53
	a) pielite	36	20	35	20	41	23	60	34	57	28
	b) altre	17	10	27	13	36	19	36	19	43	20
134	Calcolosi delle vie urinarie	29	19	36	13	49	18	53	14	64	22
	a) calcolosi dei reni e vie urinarie superiori	26	18	33	13	36	15	32	12	48	21
	b) calcolosi della vescica	1	—	2	—	12	2	20	2	16	1
	c) calcolosi senza altre indicazioni	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	24	10	15	6	39	9	66	16	97	24
	a) cistite	22	9	13	5	31	7	52	13	83	22
	b) altre	2	1	2	1	8	2	14	3	14	2
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	5	1	7	—	13	—	23	—	19	—
	a) stenosi uretrale	2	—	3	—	5	—	10	—	11	—
	b) altre	3	1	4	—	8	—	13	—	8	—
137	Malattie della prostata	1	—	9	—	16	—	49	—	154	—
138	Mal. organi genitali dell'uomo (c)	1	—	1	—	2	—	—	—	4	—
139	Mal. organi genitali della donna (c)	55	55	30	30	18	18	9	9	14	14
	a) ovaie, trombe e parametri	26	26	21	21	6	6	2	2	4	4
	b) utero	28	28	8	8	9	9	6	6	9	9
	c) mammelle	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
	d) altre	1	1	—	—	3	3	—	—	1	1
	XI. - Malattie gravid., parto e puerp.	320	320	46	46	5	5	—	—	—	—
140	Aborto con condizioni settiche	20	20	1	1	1	1	—	—	—	—
141	Aborto, senza ind. di cond. sett. (d)	4	4	2	2	—	—	—	—	—	—
142	Gestazione ectopica	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Altri accidenti della gravidanza (e)	3	3	1	1	1	1	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale	92	92	11	11	1	1	—	—	—	—
	a) da placenta previa	40	40	4	4	1	1	—	—	—	—
	b) altre emorragie	52	52	7	7	—	—	—	—	—	—
145	Setticemia e infezioni puerperali (f)	64	64	12	12	2	2	—	—	—	—
	a) setticemia e piemia puerperali	64	64	12	12	2	2	—	—	—	—
	b) tetano puerperale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Albuminuria e eclampsia puerper.	55	55	12	12	—	—	—	—	—	—
147	Altre forme di tossiemia della grav.	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Phlegmasia alba dolens, ecc. (g)	15	15	3	3	—	—	—	—	—	—
	a) phlegmasia alba dolens e trombosi	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) embolia o morte improvvisa	12	12	3	3	—	—	—	—	—	—
149	Altri accidenti del parto	42	42	4	4	—	—	—	—	—	—
150	Altre malattie non definite (h)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.	109	50	137	53	103	44	138	54	150	56
151	Foruncoli	19	10	11	2	19	8	21	4	19	2
152	Flemmone, ascesso caldo	75	33	113	43	67	27	103	40	106	44
153	Altre malattie della pelle, ecc. (i)	15	7	13	8	17	9	14	10	25	10
	XIII. - Malattie delle ossa e degli organi della locomozione	34	16	36	10	38	15	43	15	43	17
154	Osteomielite infettiva acuta	14	5	17	4	13	4	20	6	11	5
155	Altre malattie delle ossa (l)	11	7	9	3	13	5	7	3	18	6
156	Mal. articolazioni, ecc. (m)	9	4	10	3	12	6	16	6	14	6
	a) articolaz. (eccett. la tbc. e il reumatismo)	9	4	8	3	10	5	14	5	13	6
	b) altri organi della locomozione	—	—	2	—	2	1	2	1	1	—
	XIV. - Vizi di conformazione congen.	1	—	4	3	2	—	1	1	2	1
157	Vizi di conformazione congeniti (n)	1	—	4	3	2	—	1	1	2	1
	a) idrocefalia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b) spina bifida e meningocele	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
	c) malformazioni congenite del cuore	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—
	d) mostrosità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e) altri	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—
	XV. - Malattie dell'infanzia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Debolezza congenita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Nascita prematura (n)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(a) Vedi la nota (a) a pag. 2. (b) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni, da gravidanza). (c) non indicate come veneree. (d) ma specificata come settica. (e) o condizioni non specificate del puerperio. (f) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (l) eccettuata la tubercolosi. (m) e degli

ficati secondo 200 cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 65 A 69 ANNI		DA 70 A 74 ANNI		DA 75 A 79 ANNI		DA 80 A 84 ANNI		DA 85 A 89 ANNI		DA 90 E PIÙ		ETÀ IGNOTA		TOTALE		
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	MF
		107	53	119	48	108	48	84	46	25	6	9	7	—	—	591	598
	65	30	70	23	54	17	39	18	6	1	2	1	—	—	328	340	668
	42	23	49	25	34	31	45	27	19	5	7	6	—	—	263	258	521
	66	17	62	18	62	13	25	9	14	2	1	—	—	—	375	174	549
	38	17	29	16	30	13	18	9	8	2	1	—	—	—	202	163	365
	26	—	32	2	20	—	7	—	6	—	—	—	—	—	165	9	174
	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10
	175	38	289	58	309	48	221	42	93	14	25	8	—	—	1.180	371	1.551
	155	37	251	53	262	42	184	38	80	13	19	7	—	—	974	322	1.296
	20	1	38	5	47	6	37	4	13	1	6	1	—	—	206	49	255
	32	—	38	—	29	—	14	1	5	—	2	—	—	—	197	2	199
	20	—	21	—	17	—	8	—	5	—	—	—	—	—	106	—	106
	12	—	17	—	12	—	6	1	—	—	2	—	—	—	91	2	93
	303	—	584	—	656	—	463	—	190	—	30	—	—	—	2.456	—	2.456
	3	—	4	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—	—	37	—	37
	8	8	12	12	7	7	6	6	—	—	—	—	—	—	—	360	360
	1	1	3	3	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	190	180	370
	6	6	8	8	6	6	4	4	—	—	—	—	—	—	127	127	254
	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27	27	54
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	32
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.725	2.725	5.450
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	186	372
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	110
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	124	248
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	26
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	512	512	1.024
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	166	332
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	346	346	692
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	866	866	1.732
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	865	865	1.730
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	501	501	1.002
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	60
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131	131	262
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	26	52
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	105	210
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295	295	590
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	24
	188	70	163	69	152	54	80	35	38	19	3	3	—	—	1.462	1.059	2.521

TAVOLA 6. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 1 MESE		DI 1 MESE		DI 2 MESI		DI 3 MESI		DI 4 MESI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	COMPLESSO	37.488	16.453	9.330	4.185	7.292	3.207	6.642	3.103	6.484	2.887
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e paratifo	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
7	Morbillo	3	2	3	2	—	—	6	1	16	5
8	Scarlattina	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
9	Tosse convulsa	46	30	168	98	119	67	124	67	128	70
10	Difterite	15	8	10	6	3	1	2	1	5	2
11	Influenza	199	85	254	111	177	70	132	66	164	71
23	Tubercolosi dell'appar. respirat. (b)	1	—	5	4	10	3	7	1	10	3
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	7	3	23	11	37	17	55	20	57	32
34	Sifilide	291	132	106	50	74	32	55	23	33	10
38	Malaria	2	—	1	—	6	3	8	4	6	2
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre mal. infettive e parassitarie	407	163	201	93	125	55	101	55	93	41
dal 45 al 53	Cancro e altri tumori maligni	3	1	3	2	2	1	4	1	2	2
54, 55	Tumori non maligni (c)	3	3	4	1	2	1	2	1	—	—
59	Diabete mellito	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre mal. gener. e avvel. cronici	168	71	92	45	80	29	81	30	81	24
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	1	1	4	1	1	1	1	1	—	—
78, 79, 81 dall'84 all'89	Altre malattie del sist. nervoso, ecc. (d)	1.515	646	511	254	407	167	349	165	301	137
dal 90 al 95	Malattie del cuore	17	10	17	10	11	5	8	3	11	2
dal 96 al 103	Altre mal. dell'apparato circolatorio	9	3	5	3	6	2	2	—	3	1
106	Bronchiti	982	413	630	308	405	180	323	148	266	119
107, 108, 109	Polmoniti	2.790	1.149	2.232	962	1.670	669	1.456	621	1.399	603
104, 105, dal 110, al 114	Altre mal. appar. resp., esclusa la tbc.	74	35	36	14	23	12	24	11	14	8
119, 120	Enteriti	2.531	1.121	2.595	1.161	2.892	1.289	3.544	1.730	3.574	1.621
121	Appendicite	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari	12	4	24	9	10	3	15	4	12	6
dal 115 al 118	Altre mal. dell'apparato digerente	230	71	123	34	111	45	91	35	84	34
122, 123, 128, 129	Nefriti	93	38	64	29	63	24	55	20	58	17
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urinario	21	13	18	9	8	3	11	4	7	4
dal 151 al 156	Malattie della pelle, ecc. (e)	102	50	67	30	53	27	42	20	42	15
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (f)	27.687	12.289	2.078	917	951	485	103	52	74	38
dal 172 al 175	Omicidio	35	17	—	—	—	—	2	1	1	1
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (g)	24	10	11	3	12	4	11	6	14	7
199, 200	Morte improvvisa e cause non specificate o mal definite	218	84	43	18	31	11	26	11	27	12

(a) In questo Elenco sono indicate quelle voci per le quali, nell'anno 1937, si verificarono casi di morte. (b) compresi i gangli tracheo-bronchiali, tubercolosi e il reumatismo. (f) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (g) escluso il

l'anno 1937, classificati secondo le cause, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DI 5 MESI		DI 6 MESI		DI 7 MESI		DI 8 MESI		DI 9 MESI		DI 10 MESI		DI 11 MESI		NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	M F	
	6.047	2.747	6.022	2.778	5.734	2.720	5.991	2.824	5.921	2.798	5.792	2.802	5.134	2.455	58.918	48.959	107.877	
1, 2	3	2	2	1	1	1	3	2	2	—	2	1	1	—	9	8	17	1, 2
7	22	10	35	16	47	21	64	26	75	32	89	32	92	44	261	191	452	7
8	5	2	—	—	4	2	3	1	3	2	3	2	1	1	12	10	22	8
9	111	53	123	60	122	73	123	56	133	83	136	72	129	68	665	797	1.462	9
10	9	3	18	7	26	11	27	16	36	13	59	20	54	23	153	111	264	10
11	112	44	131	61	145	58	146	64	134	64	133	60	122	57	1.038	811	1.849	11
dal 24 al 32	13	4	14	10	15	10	18	9	22	8	12	7	16	5	79	64	143	23
34	68	24	65	28	60	33	70	35	79	40	79	35	63	31	354	309	663	dal 24 al 32
38	25	13	21	11	12	8	16	8	17	8	24	12	13	7	373	314	687	34
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	7	5	8	2	14	9	12	7	11	5	18	12	9	7	47	55	102	38
dal 45 al 53	108	50	87	36	89	41	109	46	85	39	75	40	64	33	852	692	1.544	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
54, 55	3	2	1	—	3	1	5	2	2	1	2	1	1	1	16	15	31	dal 45 al 53
59	—	—	1	—	1	—	3	1	3	1	1	—	—	—	12	8	20	54, 55
56, dal 60 al 74, 76, 77	69	25	78	34	56	27	95	36	79	36	93	42	87	44	616	443	1.059	56, dal 60 al 74, 76, 77
82	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	6	8	14	82
78, 79, 81 dall'84 all'89	296	142	284	125	243	119	257	124	221	109	192	85	174	72	2.605	2.145	4.750	78, 79, 81 dall'84 all'89
dal 90 al 95	13	7	22	12	8	3	13	5	13	3	7	3	9	3	83	66	149	dal 90 al 95
dal 96 al 103	4	1	5	2	2	1	4	3	4	3	3	2	4	1	29	22	51	dal 96 al 103
106	227	87	242	117	204	88	196	98	249	123	202	101	191	107	2.228	1.889	4.117	106
107, 108, 109	1.412	607	1.512	693	1.539	672	1.676	718	1.621	732	1.694	790	1.547	700	11.632	8.916	20.548	107, 108, 109
104, 105, dal 110, al 114	14	6	24	10	35	15	29	16	45	15	57	30	55	20	238	192	430	104, 105, dal 110 al 114
119, 120	3.237	1.534	3.090	1.433	2.851	1.408	2.854	1.419	2.826	1.369	2.685	1.344	2.278	1.113	18.415	16.542	34.957	119, 120
121	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2	2	4	6	10	121
dal 124 al 127	11	3	11	2	9	4	11	8	7	3	9	7	12	5	85	58	143	dal 124 al 127
dal 115 al 118	81	27	69	29	73	28	71	30	51	20	45	28	53	34	667	415	1.082	dal 115 al 118
122, 123, 128, 129	51	22	53	29	62	30	79	42	73	36	60	24	69	35	434	346	780	122, 123, 128, 129
dal 133 al 139	10	6	12	8	15	9	16	10	12	6	9	3	9	7	66	82	148	dal 133 al 139
dal 151 al 156	39	19	35	17	32	15	26	13	33	13	34	14	25	11	286	244	530	dal 151 al 156
dal 157 al 161	58	33	46	22	39	21	39	19	53	24	32	14	20	9	17.257	13.923	31.180	dal 157 al 161
dal 172 al 175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	38	dal 172 al 175
dal 176 al 198	17	6	16	4	15	8	13	2	24	7	21	11	26	10	126	78	204	dal 176 al 198
199, 200	20	8	16	8	11	5	12	7	6	2	11	7	8	5	251	178	429	199, 200

(c) o il cui carattere maligno non è specificato. (d) e degli organi dei sensi. (e) del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la suicidio e l'omicidio).

TAVOLA 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 0 A 6 GIORNI			DA 7 A 13 GIORNI		
		legit- tima	illegit- tima	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	TOTALE
	COMPLESSO	19.325	1.163	20.488	6.595	409	7.004
	I. - Malattie infettive e parassitarie	162	35	197	233	22	255
1 e 2	Febbre tifoide e paratifi	—	—	—	—	—	—
1	Febbre tifoidea (tifo addominale)	—	—	—	—	—	—
2	Paratifo	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	—	—	—	1	—	1
8	Scarlattina	—	—	—	—	—	—
9	Tosse convulsa	—	—	—	1	—	1
10	Difterite	—	—	—	—	—	—
11	Influenza	—	—	—	58	1	59
	a) con complicazioni respiratorie indicate	—	—	—	47	—	47
	b) senza complicazioni respiratorie indicate	—	—	—	11	1	12
13	Dissenteria	—	—	—	—	—	—
	a) amebica	—	—	—	—	—	—
	b) bacillare	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata o dovuta ad altre cause	—	—	—	—	—	—
15	Risipola	17	—	17	35	1	36
16	Poliomielite anteriore acuta, polioencefalite acuta	3	1	4	1	—	1
17	Encefalite letargica o epidemica	—	—	—	—	—	—
18	Meningite cerebro-spinale epidemica	1	—	1	—	—	—
20	Pustola maligna e carbonchio	—	—	—	—	—	—
22	Tetano	16	2	18	54	—	54
23 a 32	Tubercolosi :	—	—	—	3	—	3
23	dell'apparato respiratorio (b)	—	—	—	—	—	—
24	delle meningi e sistema nervoso centrale	—	—	—	1	—	1
25	degli intestini e del peritoneo (c)	—	—	—	1	—	1
26	della colonna vertebrale	—	—	—	—	—	—
27	delle ossa e delle articolazioni (d)	—	—	—	—	—	—
28	della pelle e sottocutaneo	—	—	—	—	—	—
29	del sistema linfatico (e)	—	—	—	—	—	—
32	Tubercolosi disseminata	—	—	—	1	—	1
	a) acuta	—	—	—	1	—	1
	b) cronica	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata	—	—	—	—	—	—
34	Sifilide	124	31	155	39	16	55
	a) congenita	124	31	155	39	16	55
	c) non specificata	—	—	—	—	—	—
35	Infezione gonococcica e altre malattie veneree	—	—	—	1	—	1
36	Infezione purulenta e setticemia	—	1	1	8	3	11
	a) setticemia	—	1	1	6	3	9
	b) piemia	—	—	—	2	—	2
38	Malaria	—	—	—	—	—	—
	a) febbre malarica	—	—	—	—	—	—
	b) cachessia palustre	—	—	—	—	—	—
39	Altre malattie dovute a protozoi parassitari	—	—	—	—	—	—
41	Cisti idatica	—	—	—	—	—	—
	a) del fegato	—	—	—	—	—	—
42	Altre malattie dovute a elminti	—	—	—	—	—	—
43	Micosi	1	—	1	32	1	33
44	Altre malattie infettive e parassitarie	—	—	—	—	—	—
	II. - Tumori (neoplasie)	1	—	1	1	—	1
45 a 53	Cancro e altri tumori maligni :	—	—	—	1	—	1
45	Tumori maligni della bocca e faringe	—	—	—	—	—	—
46	Tumori maligni tubo digerente e peritoneo	—	—	—	—	—	—
	d) fegato e vie biliari	—	—	—	—	—	—
	f) peritoneo	—	—	—	—	—	—
	g) altri organi	—	—	—	—	—	—
47	Tumori maligni dell'app. respiratorio	—	—	—	—	—	—

(*) Compresi 893 morti nel 1° anno di vita, per i quali non venne indicata la filiazione e che dalle notizie contenute nelle schede poteva presumersi fossero bronchiali. (a) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1937, si verificarono casi di morte. (b) compresi i gangli tracheo

1937, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 14 A 29 GIORNI			A MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	legit- tima	illegit- tima	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	TOTALE	legit- tima (*)	illegit- tima (**)	TOTALE	
	9.257	739	9.996	35.177	2.311	37.488	66.396	3.993	70.389	101.573	6.304	107.877	
	455	66	521	850	123	973	5.656	576	6.232	6.506	699	7.205	
1 e 2	1	—	1	1	—	1	16	—	16	17	—	17	1 e 2
1	—	—	—	—	—	—	12	—	12	12	—	12	1
2	1	—	1	1	—	1	4	—	4	5	—	5	2
7	2	—	2	3	—	3	418	31	449	421	31	452	7
8	1	—	1	1	—	1	19	2	21	20	2	22	8
9	42	3	45	43	3	46	1.321	95	1.416	1.364	98	1.462	9
10	12	3	15	12	3	15	234	15	249	246	18	264	10
11	130	10	140	188	11	199	1.572	78	1.650	1.760	89	1.849	11
	109	8	117	156	8	164	1.341	70	1.411	1.497	78	1.575	a
	21	2	23	32	3	35	231	8	239	263	11	274	b
13	5	1	6	5	1	6	73	2	75	78	3	81	13
	—	—	—	—	—	—	6	1	7	6	1	7	a
	1	1	2	1	1	2	12	1	13	13	2	15	b
	4	—	4	4	—	4	55	—	55	59	—	59	c
15	119	13	132	171	14	185	230	30	260	401	44	445	15
16	2	—	2	6	1	7	64	7	71	70	8	78	16
17	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	1	3	17
18	—	—	—	1	—	1	61	2	63	62	2	64	18
20	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	20
22	3	—	3	73	2	75	6	—	6	79	2	81	22
23 a 32	5	—	5	8	—	8	755	43	798	763	43	806	23 a 32
23	1	—	1	1	—	1	11	132	143	132	11	143	23
24	4	—	4	5	—	5	511	23	534	516	23	539	24
25	—	—	—	1	—	1	45	6	51	46	6	52	25
26	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	26
27	—	—	—	—	—	—	17	2	19	17	2	19	27
28	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	28
29	—	—	—	—	—	—	16	—	16	16	—	16	29
32	—	—	—	1	—	1	30	1	31	31	1	32	32
	—	—	—	1	—	1	22	1	23	23	1	24	a
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	b
	—	—	—	—	—	—	7	—	7	7	—	7	c
34	54	27	81	217	74	291	243	153	396	460	227	687	34
	54	27	81	217	74	291	223	143	366	440	217	657	a
	—	—	—	—	—	—	20	10	30	20	10	30	b
35	—	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	4	35
36	26	5	31	34	9	43	380	95	475	414	104	518	36
	13	3	16	19	7	26	309	70	379	328	77	405	a
	13	2	15	15	2	17	71	25	96	86	27	113	b
38	2	—	2	2	—	2	95	5	100	97	5	102	38
	2	—	2	2	—	2	78	4	82	80	4	84	a
	—	—	—	—	—	—	17	1	18	17	1	18	b
39	—	—	—	—	—	—	10	—	10	10	—	10	39
41	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	41
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	a
42	2	—	2	2	—	2	42	3	45	44	3	47	42
43	47	3	50	80	4	84	58	2	60	138	6	144	43
44	2	—	2	2	—	2	52	10	62	54	10	64	44
	4	—	4	6	—	6	44	1	45	50	1	51	
45 a 53	2	—	2	3	—	3	28	—	28	31	—	31	45 a 53
45	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	45
46	1	—	1	1	—	1	6	—	6	7	—	7	46
	1	—	1	1	—	1	3	—	3	4	—	4	d
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	f
	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	g
47	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	47

legittimi. (**) Compresi 2248 morti nel 1° anno di vita, per i quali fu dichiarata ignota la filiazione. bronchiali. (c) compresi i gangli mesenterici e retroperitoneali. (d) colonna vertebrale eccettuata. (e) eccettuati i gangli bronchiali, mesenterici e retroperitoneali.

Segue: TAVOLA 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 0 A 6 GIORNI			DA 7 A 13 GIORNI		
		legit- tima	illegit- tima	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	TOTALE
51	Tumori maligni organi genito-urinari dell'uomo	—	—	—	—	—	—
52	— tumori maligni della pelle	—	—	—	—	—	—
53	— di altri organi o di organi non specificati	—	—	—	1	—	1
54	Tumori non maligni	1	—	1	—	—	—
	b) altri organi	1	—	1	—	—	—
55	Tumori a carattere maligno non spec.	—	—	—	—	—	—
	b) altri organi	—	—	—	—	—	—
	III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b).	58	4	62	30	1	31
56	Reumatismo articolare acuto	—	—	—	—	—	—
59	Diabete mellito	—	—	—	—	—	—
60	Scorbuto	—	—	—	—	—	—
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow)	—	—	—	—	—	—
	b) scorbuto	—	—	—	—	—	—
63	Rachitismo	—	—	—	6	—	6
66	Malattie della ghiandola tiroide e delle paratiroidi	25	1	26	13	—	13
	a) gozzo semplice	—	—	—	—	—	—
	b) gozzo esofthalmico	—	—	—	—	—	—
	c) mixedema e cretinismo	—	—	—	—	—	—
	d) tetania	25	1	26	13	—	13
	e) altre	—	—	—	—	—	—
67	Malattie del timo	33	3	36	9	1	10
68	Malattie delle ghiandole o capsule surrenali (c)	—	—	—	—	—	—
69	Altre malattie generali	—	—	—	2	—	2
	IV. Malattie del sangue e degli organi ematopoietici	2	—	2	7	—	7
70	Stati emorragipari	2	—	2	7	—	7
	a) porpora primitiva	1	—	1	4	—	4
	b) emofilia	1	—	1	3	—	3
71	Anemie	—	—	—	—	—	—
	a) anemia perniziosa progressiva	—	—	—	—	—	—
	b) altre	—	—	—	—	—	—
72	Leucemie e aleucemie	—	—	—	—	—	—
	a) leucemie vere	—	—	—	—	—	—
	b) aleucemie	—	—	—	—	—	—
73	Malattie della milza	—	—	—	—	—	—
74	Altre malattie del sangue e organi ematopoietici	—	—	—	—	—	—
	VI. - Malattie del sistema nervoso, ecc. (d)	614	30	644	364	19	383
78	Encefalite (non epidemica)	—	—	—	—	—	—
	a) ascesso del cervello	—	—	—	—	—	—
	b) altre	—	—	—	—	—	—
79	Meningite semplice	—	—	—	5	—	5
81	Altre malattie del midollo spinale	—	—	—	—	—	—
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebrale	1	—	1	—	—	—
	a) emorragia cerebrale	—	—	—	—	—	—
	b) embolia e trombosi cerebrale	1	—	1	—	—	—
	c) emiplegia ed altre paralisi (e)	—	—	—	—	—	—
85	Epilessia	—	—	—	2	—	2
86	Convulsioni	611	30	641	355	19	374
87	Altre malattie del sistema nervoso	—	—	—	1	—	1
	a) corea	—	—	—	1	—	1
	e) altre	—	—	—	—	—	—
88	Malattie degli organi della vista	1	—	1	—	—	—
89	Malattie dell'orecchio e del seno mastoideo	1	—	1	1	—	1
	a) otite	1	—	1	1	—	1
	b) altre	—	—	—	—	—	—
	VII. - Malattie dell'apparato circolatorio	1	—	1	9	1	10
90 a 95	Malattie del cuore :	—	—	—	8	1	9
90	Pericardite	—	—	—	1	—	1
91	Endocardite acuta	—	—	—	—	—	—

(*) Vedi la nota (*) a pag. 90. (**) Vedi la nota (**) a pag. 91.

(a) Vedi la nota (a) a pag. 90. (b) delle ghiandole endocrine e altre malattie generali. (c) malattia d'Addison (non indicate come tubercolari). (d) e

l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 14 A 29 GIORNI			A MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
	legit- tima	illegit- tima	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	TOTALE	legit- tima	illegit- tima	TOTALE	legit- tima (*)	illegit- tima (**)	TOTALE		
51	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	51	
52	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	52	
53	1	—	1	2	—	2	13	—	13	15	—	15	53	
54	2	—	2	3	—	3	15	1	16	18	1	19	54	
	b) altri organi	2	—	2	3	—	15	1	16	18	1	19	b	
55	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	55	
	b) altri organi	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	b	
	III. - Malattie reumatiche, della nutrizione, ecc. (b).	48	4	52	136	9	549	34	583	685	43	728		
56	Reumatismo articolare acuto	1	—	1	1	—	9	—	9	10	—	10	56	
59	Diabete mellito	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	59	
60	Scorbuto	—	—	—	—	—	12	—	12	12	—	12	60	
	a) scorbuto infantile (morbo di Barlow)	—	—	—	—	—	9	—	9	9	—	9	a	
	b) scorbuto	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	b	
63	Rachitismo	12	1	13	18	1	209	16	225	227	17	244	63	
66	Malattie della ghiandola tiroide e delle paratiroidi	14	—	14	52	1	91	6	97	143	7	150	66	
	a) gozzo semplice	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	a	
	b) gozzo esofthalmico	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	b	
	c) mixedema e cretinismo	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	c	
	d) tetania	12	—	12	50	1	86	6	92	136	7	143	d	
	e) altre	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	e	
67	Malattie del timo	18	1	19	60	5	156	9	165	216	14	230	67	
68	Malattie delle ghiandole o capsule surrenali (c)	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	68	
69	Altre malattie generali	2	2	4	4	2	70	3	73	74	5	79	69	
	IV. Malattie del sangue e degli organi ematopoietici	13	1	14	22	1	239	11	310	321	12	333		
70	Stati emorragipari	13	1	14	22	1	66	3	69	88	4	92	70	
	a) porpora primitiva	6	—	6	11	1	42	1	43	53	2	55	a	
	b) emofilia	7	—	7	11	—	24	2	26	35	2	37	b	
71	Anemie	—	—	—	—	—	169	4	173	169	4	173	71	
	a) anemia perniziosa progressiva	—	—	—	—	—	30	—	30	30	—	30	a	
	b) altre	—	—	—	—	—	139	4	143	139	4	143	b	
72	Leucemie e aleucemie	—	—	—	—	—	58	4	62	58	4	62	72	
	a) leucemie vere	—	—	—	—	—	51	2	53	51	2	53	a	
	b) aleucemie	—	—	—	—	—	7	2	9	7	2	9	b	
73	Malattie della milza	—	—	—	—	—	5	—	5	5	—	5	73	
74	Altre malattie del sangue e organi ematopoietici	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	74	
	VI. - Malattie del sistema nervoso, ecc. (d)	488	21	489	1.446	70	1.516	3.034	214	3.248	4.480	284	4.764	
78	Encefalite (non epidemica)	1	—	1	1	—	54	7	61	55	7	62	78	
	a) ascesso del cervello	—	—	—	—	—	6	—	6	6	—	6	a	
	b) altre	1	—	1	1	—	48	7	55	49	7	56	b	
79	Meningite semplice	15	2	17	20	2	645	51	696	665	53	718	79	
81	Altre malattie del midollo spinale	2	—	2	2	—	9	—	9	11	—	11	81	
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebrale	—	—	—	—	—	12	1	13	13	1	14	82	
	a) emorragia cerebrale	—	—	—	—	—	5	1	6	5	1	6	a	
	b) embolia e trombosi cerebrale	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	b	
	c) emiplegia ed altre paralisi (e)	—	—	—	—	—	5	—	5	5	—	5	c	
85	Epilessia	2	—	2	4	—	16	—	16	20	—	20	85	
86	Convulsioni	440	18	458	1.406	67	2.162	142	2.304	3.568	209	3.777	86	
87	Altre malattie del sistema nervoso	2	—	2	3	—	21	—	21	24	—	24	87	
	a) corea	—	—	—	1	—	5	—	5	6	—	6	a	
	e) altre	2	—	2	2	—	16	—	16	18	—	18	c	
88	Malattie degli organi della vista	—	—	—	1	—	4	—	4	5	—	5	88	
89	Malattie dell'orecchio e del seno mastoideo	6	1	7	8	1	111	13	124	119	14	133	89	
	a) otite	5	—	5	7	—	88	10	98	95	11	106	a	
	b) altre	1	1	2	1	1	23	3	26	24	3	27	b	
	VII. - Malattie dell'apparato circolatorio	15	—	15	25	1	26	13	174	186	14	200		
90 a 95	Malattie del cuore :	8	—	8	16	1	125	7	132	141	8	149	90 a 95	
90	Pericardite	—	—	—	1	—	5	—	5	6	—	6	90	
91	Endocardite acuta	3	—	3	3	—	13	—	13	16	—	16	91	

degli organi dei sensi. (e) senza indicazione della causa.

Segue: TAVOLA 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 0 A 6 GIORNI			DA 7 A 13 GIORNI		
		legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima	illegit-tima	TOTALE
		92	Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari . . .	—	—	—	—
93	Malattie del miocardio	—	—	—	3	1	4
	a) miocardite acuta	—	—	—	3	1	4
	c) non specificate	—	—	—	—	—	—
95	Altre malattie del cuore	—	—	—	4	—	4
	a) malattie funzionali del cuore	—	—	—	—	—	—
	b) altre e non specificate	—	—	—	4	—	4
98	Cangrena	1	—	1	—	—	—
	b) altre	1	—	1	—	—	—
99	Altre malattie delle arterie	—	—	—	—	—	—
100	Malattie vene: varici, emorroidi, flebite, ecc.	—	—	—	—	—	—
101	Malattie sistema linfatico, linfangioite, ecc.	—	—	—	1	—	1
103	Altre malattie dell'apparato circolatorio	—	—	—	—	—	—
	VIII. - Malattie dell'apparato respiratorio	627	25	652	1.005	60	1.065
104	Malattie delle fosse nasali e annessi	—	—	—	3	—	3
105	Malattie della laringe	13	—	13	9	—	9
106	Bronchite	123	2	125	285	12	297
	a) acuta	44	1	45	84	4	88
	b) cronica	—	—	—	—	—	—
	c) non specificata	79	1	80	201	8	209
107 a 109	Polmonite, tutte le forme:	485	23	508	699	47	746
107	Broncop., compresa la bronchite capillare	485	23	508	591	41	632
108	Polmonite lobare	—	—	—	108	6	114
110	Pleuriti	—	—	—	—	—	—
111	Congestione, edema, ecc. del polmone (b)	6	—	6	8	1	9
112	Asma	—	—	—	1	—	1
113	Enfisema polmonare	—	—	—	—	—	—
114	Altre mal. apparato respiratorio (eccettuata la tbc.)	—	—	—	—	—	—
	a) polmonite interstiziale cronica	—	—	—	—	—	—
	b) altre, compresa la cangrena del polmone	—	—	—	—	—	—
	IX. - Malattie dell'apparato digerente	266	18	284	613	27	640
115	Malattie della cavità boccale, ecc. (c)	3	—	3	19	—	19
116	Malattie dell'esofago	1	—	1	—	—	—
118	Altre malattie dello stomaco (cancro eccettuato)	9	—	9	23	1	24
119	Enteriti	227	18	245	537	26	563
121	Appendicite	—	—	—	—	—	—
122	Ernia, occlusione intestinale	21	—	21	20	—	20
	a) ernia	5	—	5	2	—	2
	b) occlusione intestinale	16	—	16	18	—	18
123	Altre malattie dell'intestino	—	—	—	1	—	1
124	Cirrosi del fegato	—	—	—	1	—	1
	b) non indicata come alcoolica	—	—	—	1	—	1
125	Altre malattie del fegato (comp. atrofia gialla)	—	—	—	3	—	3
127	Altre malattie della vescich. e vie biliari	—	—	—	—	—	—
129	Peritonite senza causa indicata	5	—	5	9	—	9
	X. - Malattie dell'apparato urinario e genitale.	—	—	—	34	—	34
130 a 132	Nefrite:	—	—	—	30	—	30
130	acuta	—	—	—	30	—	30
131	cronica	—	—	—	—	—	—
132	non specificata	—	—	—	—	—	—
133	Altre malattie dei reni, ecc. (d)	—	—	—	—	—	—
	a) pielite	—	—	—	—	—	—
	b) altre	—	—	—	—	—	—
135	Malattie della vescica, esclusi i tumori	—	—	—	2	—	2
	a) cistite	—	—	—	1	—	1
	b) altre	—	—	—	1	—	1

(*) Vedi la nota (*) a pag. 90. (**) Vedi la nota (**) a pag. 91.
 (a) Vedi la nota (a) a pag. 90. (b) embolia, infarto emorragico e trombosi. (c) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni

l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 14 A 29 GIORNI			A MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MANO DI 1 ANNO			NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima	illegit-tima	TOTALE	legit-tima (*)	illegit-tima (**)	TOTALE	
	—	—	—	—	—	—	—	45	5	50	45	5	
—	4	—	4	7	1	8	23	1	24	30	2	32	93
—	2	—	2	5	1	6	5	—	5	10	1	11	a
—	2	—	2	2	—	2	18	1	19	20	1	21	c
—	1	—	1	5	—	5	39	1	40	44	1	45	95
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	a
—	1	—	1	5	—	5	37	1	38	42	1	43	b
—	2	—	2	3	—	3	5	2	7	8	2	10	98
—	2	—	2	3	—	3	5	2	7	8	2	10	b
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	99
—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	2	—	2	100
—	2	—	2	3	—	3	26	4	30	29	4	33	101
—	2	—	2	2	—	2	3	—	3	5	—	5	103
—	2.007	122	2.129	3.639	207	3.846	20.150	1.099	21.249	23.789	1.306	25.095	
—	2	—	2	5	—	5	10	—	10	15	—	15	104
—	14	—	14	36	—	36	78	5	83	114	5	119	105
—	540	20	560	948	34	982	3.000	135	3.135	3.948	169	4.117	106
—	179	7	186	307	12	319	951	47	998	1.258	59	1.317	a
—	—	—	—	—	—	—	51	4	55	51	4	55	b
—	361	13	374	641	22	663	1.998	84	2.082	2.638	106	2.745	c
—	1.435	101	1.536	2.619	171	2.790	16.818	940	17.758	19.437	1.111	20.548	107 a 109
—	1.226	96	1.322	2.302	160	2.462	14.112	836	14.948	16.414	996	17.410	107
—	209	5	214	317	11	328	2.706	104	2.810	3.023	115	3.138	103
—	2	—	2	2	—	2	133	12	145	135	12	147	110
—	12	1	13	26	2	28	47	4	51	73	6	79	111
—	—	—	—	1	—	1	23	2	25	24	2	26	112
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	113
—	2	—	2	2	—	2	40	—	40	42	—	42	114
—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	9	—	9	a
—	2	—	2	2	—	2	31	—	31	33	—	33	b
—	1.671	178	1.849	2.550	223	2.773	31.742	1.677	33.419	34.292	1.900	36.192	
—	33	2	35	55	2	57	156	5	161	211	7	218	115
—	—	—	—	1	—	1	2	—	2	3	—	3	116
—	38	1	39	70	2	72	298	13	311	368	15	383	118
—	1.553	170	1.723	2.317	214	2.531	30.791	1.635	32.426	33.108	1.849	34.957	119
—	28	2	30	69	2	71	175	7	182	244	9	253	122
—	8	—	8	15	—	15	89	—	89	84	—	84	a
—	20	2	22	54	2	56	106	7	113	160	9	169	b
—	1	—	1	2	—	2	37	5	42	39	5	44	123
—	—	—	—	1	—	1	9	—	9	10	—	10	124
—	—	—	—	1	—	1	9	—	9	10	—	10	b
—	5	—	5	8	—	8	54	3	57	62	3	65	125
—	3	—	3	3	—	3	60	5	65	63	5	68	127
—	10	3	13	24	3	27	151	3	154	175	6	181	129
—	77	3	80	111	3	114	782	32	814	893	35	928	
—	62	1	63	92	1	93	667	20	687	759	21	780	130 a 132
—	60	1	61	90	1	91	655	20	675	745	21	766	130
—	2	—	2	—	—	—	11	—	11	11	—	11	131
—	4	—	4	4	—	4	39	6	45	43	6	49	133
—	1	—	1	1	—	1	26	6	32	27	6	33	a
—	3	—	3	3	—	3	13	—	13	16	—	16	b
—	3	1	4	5	1	6	66	5	71	71	6	77	135
—	2	—	2	3	—	3	44	4	48	47	5	52	a
—	1	—	1	2	—	2	22	1	23	24	1	25	b

adenoidi. (d) dei bacinetti e degli ureteri.

Segue: TAVOLA 7. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (a)	DA 0 A 6 GIORNI			DA 7 A 13 GIORNI		
		legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE
138	Malattie organi genitali dell'uomo (b)	—	—	—	2	—	2
139	Malattie organi genitali della donna (b)	—	—	—	1	—	1
	b) utero	—	—	—	1	—	1
	c) mammelle	—	—	—	—	—	—
	d) altre	—	—	—	—	—	—
	XIII. - Malattie della pelle e del tessuto cellulare	—	—	—	16	4	20
151	Foruncoli	—	—	—	—	—	—
152	Flemmone, ascesso caldo	—	—	—	11	2	13
153	Altre malattie della pelle, ecc. (c)	—	—	—	5	2	7
	XIII - Malattie delle ossa e organi della locomozione	—	—	—	1	—	1
154	Osteomielite infettiva acuta	—	—	—	—	—	—
155	Altre malattie delle ossa (eccettuata la tbc.)	—	—	—	1	—	1
156	Malattie delle articolazioni, ecc. (d)	—	—	—	1	—	1
	a) articolazioni (eccettuata la tbc. e il reumatismo)	—	—	—	—	—	—
	b) altri organi della locomozione	—	—	—	1	—	1
	XIV. - Vizi di conformazione congeniti	1.179	49	1.228	350	13	363
157	Vizi di conformazione congeniti (e)	1.179	49	1.228	350	13	363
	a) idrocefalia	55	2	57	5	—	5
	b) spina bifida e meningocele	189	8	197	111	5	116
	c) malformazioni congenite del cuore	507	24	531	119	5	124
	d) mostruosità	100	6	106	3	—	3
	e) altri	328	9	337	112	3	115
	XV. - Malattie dell'infanzia	16.250	969	17.219	3.897	260	4.157
158	Debolezza congenita	4.988	207	5.195	1.780	84	1.864
159	Nascita prematura (e)	7.370	583	7.953	1.269	122	1.391
160	Conseguenze del parto (e)	992	50	1.042	32	1	33
	a) con indicazione di operazione cesarea	2	—	2	—	—	—
	b) senza indicazione di operazione cesarea	990	50	1.040	32	1	33
161	Altre malattie speciali dell'infanzia	2.900	129	3.029	816	53	869
	a) atelektasia	168	8	176	18	—	18
	b) ittero dei neonati	350	14	364	240	10	250
	c) sclerema e altre	2.382	107	2.489	558	43	601
	XVII. - Morti violente e accidentali	25	23	48	4	1	5
172a 175	Omicidi:	18	17	35	—	—	—
172	Infanticidio (— un anno)	18	17	35	—	—	—
	a) subito dopo la nascita	14	13	27	—	—	—
	b) altri, prima di un anno	4	4	8	—	—	—
176 a 194	Morti accidentali:	7	3	10	4	1	5
177	Avvelenamenti da alimenti guasti	—	—	—	—	—	—
178	Assorbimento di gas tossici	—	—	—	—	—	—
179	Altri avvelenamenti accidentali acuti (f)	—	—	—	—	—	—
180	Per incendio	—	—	—	—	—	—
181	Per ustioni accidentali (g)	—	—	—	—	—	—
182	Per soffocazione meccanica accidentale	2	1	3	1	—	1
183	Per annegamento accidentale	—	—	—	—	—	—
184	Per trauma accid. arma da fuoco (escl. ferite guerra)	—	—	—	2	—	2
186	Per lesioni accidentali da caduta, ecc. (h)	—	—	—	—	—	—
188	Per violenze di animali	—	—	—	—	—	—
190	Per freddo eccessivo	3	2	5	—	—	—
191	Per caldo eccessivo	—	—	—	1	—	1
194	Per altri accidenti	2	—	2	1	—	1
	b) altri	—	3	3	—	—	—
195	Morte violenta, ecc. (l)	140	10	150	31	1	32
	XVIII. - Cause di morte non determinate	23	2	25	12	—	12
199	Morte improvvisa	117	8	125	19	—	20
200	Cause non specificate o mal definite	—	—	—	—	—	—

l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, l'età e la filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	DA 14 A 29 GIORNI			A MENO DI 1 MESE			DA 1 MESE A MENO DI 1 ANNO			NEL PRIMO ANNO DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE	legittima	illegittima	TOTALE	legittima (*)	illegittima (**)	TOTALE	
	1	—	1	1	—	1	3	—	3	4	—	4	138
	7	1	8	9	1	10	7	1	8	16	2	18	139
	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	b
	7	1	8	8	1	9	4	1	5	12	2	14	c
	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	d
	71	5	76	87	9	96	332	40	372	419	49	468	
	3	—	3	3	—	3	36	5	41	39	5	44	151
	50	2	52	61	4	65	183	19	202	244	23	267	152
	18	3	21	23	5	28	113	16	129	136	21	157	153
	5	—	5	6	—	6	51	5	56	57	5	62	
	3	—	3	3	—	3	27	1	28	30	1	31	154
	2	—	2	2	—	2	6	1	7	8	1	9	155
	—	—	—	1	—	1	18	3	21	19	3	22	156
	—	—	—	1	—	1	17	3	20	18	3	21	a
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	b
	357	21	378	1.886	83	1.969	733	29	762	2.619	112	2.731	
	5	—	5	6	—	6	113	4	117	178	6	184	a
	97	9	106	397	22	419	179	2	181	576	24	600	b
	127	4	131	753	33	786	290	15	305	1.043	48	1.091	c
	3	—	3	106	6	112	3	—	3	109	6	115	d
	125	8	133	565	20	585	148	8	156	713	28	741	e
	4.025	317	4.342	24.172	1.546	25.718	2.496	235	2.731	26.668	1.781	28.449	
	1.961	125	2.086	8.729	416	9.145	1.331	89	1.420	10.060	505	10.565	158
	1.077	111	1.188	9.716	816	10.532	332	69	401	10.048	885	10.933	159
	12	2	14	1.036	53	1.089	7	—	7	1.043	53	1.096	160
	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	a
	12	2	14	1.034	53	1.087	7	—	7	1.041	53	1.094	b
	975	79	1.054	4.691	261	4.952	826	77	903	5.517	338	5.855	161
	16	1	17	202	9	211	3	—	3	205	9	214	a
	139	6	145	729	30	759	59	3	62	788	33	821	b
	820	72	892	3.760	222	3.982	764	74	838	4.824	296	4.820	c
	5	1	6	34	25	59	175	8	183	209	33	242	
	—	—	—	18	17	35	3	—	3	21	17	38	172a 175
	—	—	—	18	17	35	3	—	3	21	17	38	172
	—	—	—	14	13	27	—	—	—	14	13	27	a
	—	—	—	4	4	8	3	—	3	7	4	11	b
	5	1	6	16	5	21	170	8	178	186	13	199	176 a 194
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	177
	—	—	—	—	—	—	6	1	7	6	1	7	178
	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3	179
	—	—	—	—	—	—	5	1	6	5	1	6	180
	1	—	1	1	—	1	78	2	80	79	2	81	181
	3	—	3	6	1	7	29	1	30	35	2	37	182
	—	—	—	—	—	—	6	—	6	6	—	6	183
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	184
	1	—	1	3	—	3	34	2	36	37	2	39	186
	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	188
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189
	3	2	5	—	—	—	—	—	—	3	3	6	190
	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	191
	2	—	2	1	—	1	1	1	2	4	2	6	194
	2	—	2	1	—	1	1	1	2	4	2	6	194
	—	3	3	—	—	—	2	—	2	4	2	6	b
	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	2	195
	36	—	36	207	11	218	192	19	211	399	30	429	
	14	—	14	49	2	51	87	9	96	136	11	147	199
	22	—	22	158	9	167	105	10	115	263	19	282	200

(*) Vedi la nota (*) a pag. 90. (**) Vedi la nota (**) a pag. 19.
 (a) Vedi la nota (a) a pag. 90. (b) non indicate come veneree. (c) dei suoi annessi e del tessuto cellulare. (d) e degli altri organi della locomozione non compresi i nati morti. (f) eccettuati quelli da gas. (g) diverse da quelle per incendio. (h) schiacciamento, frana. (i) tutte le morti attribuite ad un cataclisma, qualunque sia la sua natura. (l) di cui la natura (accidente, omicidio) è sconosciuta.

TAVOLA 8. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1937, nei singoli Compartimenti, distinti secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso.

CAUSE DI MORTE COMPARTIMENTI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	ANNO
COMPLESSO	11.470	9.624	7.928	6.371	6.821	11.164	13.871	10.991	7.756	7.024	6.727	8.130	107.877
PIEMONTE	482	424	354	314	277	312	413	508	367	267	245	295	4.258
LIGÙRIA	185	122	142	92	113	127	128	112	92	103	121	107	1.444
LOMBARDIA	1.412	1.128	964	865	848	1.336	2.564	2.260	1.185	830	781	866	15.039
VENEZIA TRIDENTINA	168	158	106	97	84	77	149	178	156	93	92	111	1.489
VÈNETO	1.125	855	649	502	512	592	897	823	635	528	498	682	8.298
VENEZIA GIÙLIA E ZARA	223	160	164	126	146	121	199	241	159	134	117	152	1.942
EMILIA	711	609	515	388	417	366	352	407	471	324	316	439	5.315
TOSCANA	417	347	313	232	231	277	308	297	247	222	227	270	3.388
MARCHE	309	301	215	163	135	119	181	283	264	207	139	193	2.509
ÛMBRIA	184	144	126	76	71	72	123	130	113	92	82	107	1.320
LÀZIO	739	614	394	313	293	676	867	548	359	366	347	459	5.975
ABRUZZI E MOLISE	535	389	334	286	282	541	990	683	358	314	303	400	5.415
CAMPANIA	1.164	1.052	798	649	825	1.840	1.859	1.132	736	667	724	956	12.402
PÙGLIE	1.438	1.040	790	736	966	1.667	1.220	777	634	728	743	996	11.755
LUCANIA	282	243	210	154	161	251	423	279	178	182	164	189	2.716
CALÀBRIE	697	551	499	388	355	723	1.056	693	465	461	490	513	6.891
SICILIA	1.104	1.158	1.053	772	910	1.745	1.672	1.290	1.047	1.181	1.107	1.158	14.197
SARDEGNA	275	329	302	218	175	322	470	350	290	325	231	237	3.524
Mal. dell'app. respirat. (a)	4.475	3.623	2.705	1.810	1.654	1.520	1.456	1.331	1.314	1.396	1.555	2.256	25.095
Piemonte	235	188	122	95	57	41	37	45	34	46	52	66	1.018
Liguria	86	48	34	17	19	17	14	12	9	18	19	29	322
Lombardia	659	400	338	249	186	196	214	154	165	167	210	254	3.192
Venezia Tridentina	75	56	26	27	21	7	15	18	12	10	17	20	304
Veneto	415	307	185	119	133	78	81	79	79	74	92	151	1.793
Venezia Giulia e Zara	85	48	41	32	38	9	21	26	16	26	22	39	403
Emilia	248	215	142	98	109	66	68	57	73	57	49	99	1.281
Toscana	132	107	89	54	38	35	20	28	28	29	31	40	631
Marche	99	99	70	31	30	22	20	28	34	23	17	24	497
Ûmbria	61	52	28	23	19	12	7	11	15	9	17	16	270
Lazio	279	240	131	70	69	94	91	81	54	60	79	115	1.363
Abruzzi e Molise	149	98	67	71	75	47	66	48	53	51	60	106	891
Campania	474	478	294	203	199	250	214	195	189	169	175	298	3.138
Puglie	551	361	260	204	223	242	192	184	161	190	223	359	3.150
Lucania	115	85	77	43	45	26	33	36	37	57	49	61	664
Calàbria	259	202	199	132	91	111	118	82	97	114	124	176	1.705
Sicilia	457	514	487	278	262	222	192	191	206	235	274	341	3.659
Sardegna	96	125	115	64	40	45	53	56	52	61	45	62	814

(a) dal 104 al 114.

Segue: TAVOLA 8. — Bambini, morti nel primo anno di vita, durante l'anno 1937, nei singoli Compartimenti, distinti secondo alcune cause di morte e il mese in cui avvenne il decesso.

CAUSE DI MORTE COMPARTIMENTI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	Maggio	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	ANNO
Mal. dell'app. digerente (a)	1.318	1.179	1.050	1.085	1.907	6.407	9.026	6.336	3.180	2.044	1.520	1.140	36.192
Piemonte	31	53	50	46	56	112	238	320	176	63	37	41	1.223
Liguria	10	12	12	22	13	45	60	52	32	24	23	7	312
Lombardia	146	137	116	145	210	730	1.845	1.580	615	227	144	95	5.990
Venezia Tridentina	28	25	11	17	14	26	71	100	77	32	20	23	444
Veneto	99	83	60	51	83	231	492	447	230	118	79	87	2.060
Venezia Giulia e Zara	15	12	14	16	16	38	110	138	78	29	20	11	497
Emilia	55	48	42	44	53	73	109	144	156	62	42	41	869
Toscana	30	29	18	14	26	111	158	136	71	43	28	19	683
Marche	24	29	10	21	20	27	92	144	129	61	27	17	601
Umbria	15	12	16	5	10	20	75	77	57	27	9	6	329
Lazio	63	52	33	28	61	400	576	248	126	81	67	48	1.783
Abruzzi e Molise	87	51	57	52	81	361	717	463	157	105	64	60	2.255
Campània	138	107	134	94	299	1.195	1.269	616	237	178	135	103	4.505
Puglie	220	158	149	217	413	1.056	732	324	211	186	179	164	4.009
Lucania	45	45	33	32	38	157	307	177	55	42	35	24	990
Calàbria	76	87	85	75	111	443	746	426	202	143	142	83	2.619
Sicilia	194	198	170	175	364	1.191	1.132	753	432	495	390	269	5.763
Sardegna	42	41	40	31	39	191	297	191	139	128	79	42	1.260
Restanti cause	5.677	4.822	4.173	3.476	3.260	3.237	3.389	3.324	3.262	3.584	3.652	4.734	46.580
Piemonte	216	183	182	173	164	159	138	143	157	158	156	188	2.017
Liguria	89	62	96	53	81	65	54	48	51	61	79	71	810
Lombardia	607	591	510	471	452	410	505	526	405	436	427	517	5.857
Venezia Tridentina	85	77	69	53	49	44	63	60	67	51	55	68	741
Veneto	611	465	404	332	296	283	324	297	326	336	327	444	4.445
Venezia Giulia e Zara	123	100	109	78	92	74	68	77	65	79	75	102	1.042
Emilia	408	346	331	246	255	227	175	206	242	205	225	299	3.165
Toscana	255	211	206	164	167	131	130	133	148	150	168	211	2.074
Marche	186	173	135	111	85	70	69	111	101	123	95	152	1.411
Umbria	108	80	82	48	42	40	41	42	41	56	56	85	721
Lazio	397	322	230	215	163	182	200	219	179	225	201	296	2.829
Abruzzi e Molise	299	240	210	163	126	133	207	172	148	158	179	234	2.269
Campània	552	467	370	352	327	395	376	321	310	320	414	555	4.759
Puglie	667	521	381	315	350	369	296	269	262	352	341	473	4.596
Lucania	122	113	100	79	78	68	83	66	86	83	80	104	1.062
Calàbria	362	262	215	181	153	169	192	185	166	204	224	254	2.567
Sicilia	453	446	396	319	284	332	348	346	409	451	443	548	4.775
Sardegna	137	163	147	123	96	86	120	103	99	136	107	133	1.450

(a) dal 115 al 129.

TAVOLA 9. — Bambini, nati da parti multipli, morti nel primo mese di vita, durante

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — SESSO	DA 0 A 6 GIORNI				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
		legittima	ille- gittima	non indicata	TOTALE		
	COMPLESSO	Maschi	1.947	84	4	2.035	
		Femmine	1.577	62	9	1.648	
		TOTALE	3.524	146	13	3.683	
86	Convulsioni in bambini di meno di 5 anni	Maschi	40	1	—	41	
		Femmine	28	2	—	30	
		TOTALE	68	3	—	71	86
106	Bronchiti	Maschi	7	—	—	7	
		Femmine	3	—	—	3	
		TOTALE	10	—	—	10	106
107	Broncopolmonite (compresa la bronchite capillare)	Maschi	23	—	—	23	
		Femmine	12	—	—	12	
		TOTALE	35	—	—	35	107
119	Enteriti (al disotto di 2 anni)	Maschi	15	2	—	17	
		Femmine	13	2	1	16	
		TOTALE	28	4	1	33	119
157	Vizi di conformazione congeniti (non compresi i nati morti)	Maschi	34	—	—	34	
		Femmine	23	—	—	23	
		TOTALE	57	—	—	57	157
158	Debolezza congenita	Maschi	630	18	—	648	
		Femmine	526	17	1	544	
		TOTALE	1.156	35	1	1.192	158
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	Maschi	947	57	2	1.006	
		Femmine	772	35	6	813	
		TOTALE	1.719	92	8	1.819	159
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti)	Maschi	35	2	—	37	
		Femmine	25	3	—	28	
		TOTALE	60	5	—	65	160
161	Altre malattie speciali dell'infanzia	Maschi	194	2	2	198	
		Femmine	156	1	1	158	
		TOTALE	350	3	3	356	161
199	Morte improvvisa	Maschi	1	—	—	1	
		Femmine	2	—	—	2	
		TOTALE	3	—	—	3	199
200	Cause non specificate o mal definite	Maschi	7	1	—	8	
		Femmine	4	—	—	4	
		TOTALE	11	1	—	12	200
	Rimanenti cause	Maschi	14	1	—	15	
		Femmine	13	2	—	15	
		TOTALE	27	3	—	30	

l'anno 1937, classificati per alcune cause di morte, sesso, età e filiazione.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — SESSO	DA 7 A 13 GIORNI				DA 14 A 29 GIORNI				TOTALE				NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
		legittima	ille- gittima	non indicata	TOTALE	legittima	ille- gittima	non indicata	TOTALE	legittima	ille- gittima	non indicata	TOTALE		
	COMPLESSO	Maschi	487	16	4	507	589	28	5	622	3.023	128	13	3.164	
		Femmine	422	14	4	440	509	35	7	551	2.508	111	20	2.639	
		TOTALE	909	30	8	947	1.098	63	12	1.173	5.531	239	33	5.803	
86	Convulsioni in bambini di meno di 5 anni	Maschi	19	—	—	19	27	—	—	27	86	1	—	87	
		Femmine	17	1	—	18	17	—	—	17	62	3	—	65	86
		TOTALE	36	1	—	37	44	—	—	44	148	4	—	152	
106	Bronchiti	Maschi	11	—	—	11	25	—	—	25	43	—	—	43	
		Femmine	14	—	—	14	16	—	1	17	33	—	1	34	106
		TOTALE	25	—	—	25	41	—	1	42	78	—	1	77	
107	Broncopolmonite (compresa la bronchite capillare)	Maschi	23	—	—	23	31	3	1	35	77	3	1	81	
		Femmine	15	—	—	15	16	—	1	17	43	—	1	44	107
		TOTALE	38	—	—	38	47	3	2	52	120	3	2	125	
119	Enteriti (al disotto di 2 anni)	Maschi	29	—	—	29	81	6	—	87	125	8	—	133	
		Femmine	25	1	—	26	65	8	—	73	103	11	1	115	119
		TOTALE	54	1	—	55	146	14	—	160	228	19	1	248	
157	Vizi di conformazione congeniti (non compresi i nati morti)	Maschi	8	—	1	9	6	2	—	8	48	2	1	51	
		Femmine	7	—	1	8	5	—	—	5	35	—	1	36	157
		TOTALE	15	—	2	17	11	2	—	13	83	2	2	87	
158	Debolezza congenita	Maschi	196	7	2	205	222	7	1	230	1.048	32	3	1083	
		Femmine	180	3	—	183	184	11	—	195	890	31	1	922	158
		TOTALE	376	10	2	388	406	18	1	425	1.938	63	4	2.005	
159	Nascita prematura (non compresi i nati morti)	Maschi	127	6	1	134	102	8	3	113	1.176	71	6	1.253	
		Femmine	105	6	3	114	107	13	5	125	984	54	14	1.052	159
		TOTALE	232	12	4	248	209	21	8	238	2.160	125	20	2.305	
160	Conseguenze del parto (non compresi i nati morti)	Maschi	—	—	—	—	—	—	—	—	35	2	—	37	
		Femmine	2	—	—	2	—	—	—	—	27	3	—	30	160
		TOTALE	2	—	—	2	—	—	—	—	62	5	—	67	
161	Altre malattie speciali dell'infanzia	Maschi	53	2	—	55	56	2	—	58	303	6	2	311	
		Femmine	49	3	—	52	72	1	—	73	277	5	1	283	161
		TOTALE	102	5	—	107	128	3	—	131	580	11	3	594	
199	Morte improvvisa	Maschi	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
		Femmine	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	199
		TOTALE	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	
200	Cause non specificate o mal definite	Maschi	2	—	—	2	—	—	—	—	9	1	—	10	
		Femmine	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	200
		TOTALE	2	—	—	2	—	—	—	—	13	1	—	14	
	Rimanenti cause	Maschi	19	1	—	20	39	—	—	39	72	2	—	74	
		Femmine	8	—	—	8	27	2	—	29	48	4	—	52	
		TOTALE	27	1	—	28	66	2	—	68	120	6	—	126	

TAVOLA 10. — Bambini morti nella prima settimana di vita, durante l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, l'età ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE (*)	MENO DI 1 GIORNO		1 GIORNO		2 GIORNI		3 GIORNI		4 GIORNI		5 GIORNI		6 GIORNI		MORTI NELLA PRIMA SETTIMANA DI VITA			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	M F	
		COMPLESSO		8.290	3.478	3.257	1.451	2.974	1.275	2.066	932	1.517	706	1.253	583	1.131	517	11.546	
15	Risipola	2	1	2	2	—	—	3	—	2	1	5	3	3	—	10	7	17	15
16	Poliomielite anteriore acuta e polioencefalite acuta	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	1	4	16
18	Meningite cerebro-spinale epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	18
22	Tetano	1	—	—	—	2	—	2	1	1	—	5	—	7	3	14	4	18	22
34a	Sifilide congenita	67	32	25	10	27	12	14	7	10	5	3	2	9	5	82	73	155	34a
36a	Setticemia non puerperale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	36a
43	Micosi	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	43
54b	Tumori non mal. degli altri org. (esclusi gli org. gen. della donna)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	54b
66d	Tetania	2	1	4	—	4	1	2	1	4	4	4	1	6	2	16	10	26	66d
67	Malattie del timo	8	1	9	3	7	1	3	2	1	—	6	4	2	—	25	11	36	67
70	Stati emorragipari	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	2	70
	a) porpora primitiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	a
	b) emofilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	b
82b	Embolia o trombosi cerebrale	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	82b
86	Convulsioni	91	37	102	50	120	49	106	48	80	38	69	31	73	30	358	283	641	86
88	Malattie degli organi della vista	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	88
89a	Otite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	89a
98b	Altre angrene	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	98b
105	Malattie della laringe	—	—	3	1	3	1	2	2	1	—	2	—	2	2	7	6	13	105
106	Bronchite	7	3	15	6	10	1	22	9	21	9	21	12	29	12	73	52	125	106
	a) acuta	1	1	5	2	4	1	11	3	8	3	9	5	7	3	27	18	45	a
	c) non specificata	6	2	10	4	6	—	11	6	13	6	12	7	22	9	46	34	80	c
107	Broncopolmonite, compr. la bronchite capillare	40	17	57	23	77	28	90	36	75	31	80	38	89	34	301	207	508	107
111	Congestione, edema, ecc. del polmone (a)	1	—	1	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	4	2	6	111
115	Malattie della cavità boccale, ecc. (b)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	3	115
116	Malattie dell'esofago	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	116
118	Altre mal. dello stomaco (cancro eccettuato)	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	1	3	1	7	2	9	118
119	Enteriti	14	6	10	6	35	20	29	7	55	21	56	28	46	21	136	109	245	119
122	Ernia, occlusione intestinale	1	—	1	—	3	—	6	1	2	1	3	—	5	1	18	3	21	122
	a) ernia	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—	5	a
	b) occlusione intestinale	1	—	1	—	1	—	5	1	2	1	3	—	3	1	13	3	16	b
129	Peritonite senza causa indicata	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	1	—	3	2	5	129
157	Vizi di conformazione congeniti (c)	408	190	202	92	200	79	141	63	117	61	97	37	63	30	676	552	1.228	157
	a) idrocefalia	33	13	8	3	7	2	2	1	3	1	3	3	—	—	34	23	57	a
	b) spina bifida e meningocele	47	24	16	29	15	15	28	15	31	19	24	9	15	10	89	108	197	b
	c) malformazioni congenite del cuore	161	76	112	47	96	36	61	22	38	18	39	15	24	10	307	224	531	c
	d) mostruosità	86	43	7	4	5	2	3	2	2	2	1	2	1	51	55	106	106	d
	e) altri	81	34	52	22	63	24	47	23	43	21	30	9	21	9	195	142	337	e
158	Debolezza congenita	1.622	710	905	410	856	377	664	300	449	213	372	185	327	159	2.841	2.354	5.195	158
159	Nascita prematura (non compr. i nati morti)	3.844	1.595	1.306	593	1.113	511	662	325	452	212	311	147	265	131	4.439	3.514	7.953	159
160	Conseguenze parto (non compr. i nati morti)	723	286	140	54	93	29	36	10	20	4	13	7	17	9	643	399	1.042	160
	a) con ind. di op. cesarea	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	a
	b) senza ind. di op. cesarea	722	286	140	54	93	29	36	10	19	4	13	7	17	9	641	399	1.040	b
161	Altre malattie speciali dell'infanzia	1.372	561	442	183	391	161	260	112	199	90	191	80	174	75	1.767	1.262	3.029	161
	a) atelectasia	61	22	42	14	27	16	18	7	7	3	9	3	12	8	103	73	176	a
	b) ittero dei neonati	27	9	26	9	88	24	64	20	58	20	56	25	65	29	228	136	364	b
	c) sclerema ed altre	1.284	530	374	160	296	121	178	85	134	67	126	52	97	38	1.436	1.053	2.489	c
172	Infanticidio	27	12	5	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	18	17	35	172
	a) subito dopo la nascita	27	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	27	a
	b) altri, prima di un anno	—	—	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	b
182	Per soffocazione meccanica accidentale	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	182
190	Per freddo eccessivo	2	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	3	5	190
194b	Per altri accidenti (esclusi corpi estranei)	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	194b
195	Morte violenta, ecc. (d)	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	195
199	Morte improvvisa	7	5	3	—	7	2	3	—	4	1	—	—	1	—	17	8	25	199
200	Cause non specificate o mal definite	45	18	20	11	21	2	9	4	14	9	8	3	8	2	76	49	125	200

(*) In questo Elenco sono indicate soltanto quelle voci e sottovoci per le quali, nell'anno 1937, si verificarono casi di morte.

(a) embolia, infarto emorragico e trombosi. (b) dei suoi annessi, della faringe, delle tonsille, comprese le vegetazioni adenoidi. (c) non compresi i morti. (d) di cui la natura (accidente, omicidio) è sconosciuta.

TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in poi, classificati

secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE		INDUSTRIALI, COMMERCianti		VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERCI VARIE E NON SPECIFICATE		ESERCENTI		COMMISSIONARI RAPPRESENTANTI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	COMPLESSO	111.049	21.132	6.311	369	3.637	472	1.360	306	1.863	15
	I. - Malattie infettive e parassitarie	10.540	2.083	614	28	445	56	124	21	296	4
1,2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	930	277	29	1	19	5	10	1	11	1
3	Tifo petecchiale	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	18	5	1	—	—	—	—	—	—	—
8	Scarlattina	6	1	2	—	1	—	—	—	—	—
9	Tosse convulsa	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Difterite	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza	2.318	475	155	9	60	12	29	4	37	—
13	Dissenteria	63	14	2	—	1	—	—	—	—	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	4.257	780	263	10	248	27	44	8	190	3
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	1.173	270	49	4	41	5	12	3	29	—
34	Sifilide	148	16	31	2	23	2	3	—	11	—
36	Infez. purulenta e settic. non puer.	618	98	38	2	34	4	14	3	8	—
38	Malaria	314	53	8	—	5	—	2	—	—	—
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	54	7	2	—	1	—	—	—	—	—
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	614	80	34	—	12	1	10	2	10	—
	II. - Tumori (neoplasie)	8.339	1.432	673	52	408	68	136	42	206	2
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni	8.028	1.353	647	47	392	65	131	39	203	2
54, 55	Tumori non maligni (b)	311	79	26	5	16	3	5	3	3	—
	III. - Malattie reumatiche, ecc. (c)	1.563	349	248	19	110	25	47	15	54	—
56	Reumatismo articolare acuto	518	138	26	5	21	7	7	1	11	—
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	318	90	18	3	7	3	3	3	3	—
59	Diabete mellito	487	71	191	9	81	18	35	11	37	—
dal 60 al 64	Avitaminosi	41	5	1	—	—	—	—	—	—	—
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat.	52	27	3	1	—	—	—	—	—	—
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali	147	18	9	1	1	—	2	—	3	—
	IV. - Malattie del sangue, ecc. (d)	468	116	46	5	17	4	6	1	13	—
71	Anemie perniciose ed altre	177	48	14	2	6	2	1	1	1	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e)	291	68	32	3	11	2	5	—	12	—
	V. - Avvelen. cron. e intossicazioni	170	6	11	—	22	1	9	—	4	—
75	Alcoolismo acuto e cronico	168	6	11	—	22	1	8	—	4	—
76, 77	Avvelenamenti cronici	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	VI. - Malatt. del sist. nervoso, ecc. (f)	17.642	3.059	854	60	509	67	196	44	256	1
79	Meningite semplice	218	42	12	1	9	—	4	3	5	—
80	Atassia locomotrice progressiva	54	7	8	—	4	—	—	—	2	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	15.763	2.710	738	56	438	59	180	39	214	1
83	Paralisi progressiva degli alienati	81	3	25	1	17	1	3	—	18	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi	352	79	14	—	10	—	3	1	6	—
85	Epilessia	381	83	7	1	5	1	1	—	1	—
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	639	120	42	1	25	6	4	1	7	—
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi	154	15	8	—	1	—	1	—	3	—
	VII. - Malattie dell'app. circolatorio	21.262	4.931	1.248	82	596	97	268	70	308	1
90	Pericardite	54	6	6	—	1	—	—	—	—	—
91	Endocardite acuta	93	20	17	2	6	2	1	1	2	1
92	Endocardite cr., compr. le aff. valv.	6.179	1.819	226	21	139	31	62	17	50	—
93	Malattie del miocardio	6.516	1.446	344	22	192	29	80	22	105	—
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris	678	88	179	3	52	6	26	7	47	—
95	Altre malattie del cuore	3.911	940	188	20	94	17	38	13	41	—

MINITORI, CAVATORI, ECC.	FALEGNAMI, VERNICIATORI, ECC.	ADDETTI ALLA MACELLAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARNI		ADDETTI AI FORNI E PASTIFICI	ADDETTI ALLA LAVORAZ. DEL LATTE E ALL'INDUSTR. ALIMENTARI		CONCIATORI, PELLAI		CALZOLAI, GUANTAI, ECC.		METALLURGICI		MECCANICI, ELETTRICISTI, ECC.		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
		Tot.	di cui F		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F		Tot.	di cui F
1.037	3	5.180	69	247	2	1.951	87	191	4	130	—	4.157	79	246	3	6.133	48
193	1	917	7	61	1	334	12	27	1	13	—	677	36	38	—	1.427	20
11	—	53	1	5	—	19	2	4	—	—	—	—	—	—	—	90	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	97	1	4	—	39	1	4	—	—	—	63	—	5	—	119	—
1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
148	1	574	1	40	—	188	6	14	1	7	—	422	23	22	—	920	14
10	—	94	3	6	1	41	—	2	—	2	—	84	5	3	—	152	2
—	—	22	—	2	—	12	1	—	—	—	—	17	1	3	—	47	—
—	—	34	—	—	—	17	—	1	—	1	—	27	—	—	—	49	1
5	—	9	—	—	—	3	1	—	—	—	—	9	—	—	—	6	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	29	1	4	—	14	1	2	—	1	—	19	—	2	—	37	1
66	—	514	5	20	—	166	10	26	—	11	—	370	12	27	2	501	4
63	—	492	5	19	—	156	10	24	—	11	—	352	9	24	1	477	3
3	—	22	—	1	—	10	—	2	—	—	—	18	3	3	—	24	1
13	—	75	—	6	—	46	4	4	—	2	—	78	1	6	—	161	1
5	—	22	—	2	—	17	1	—	—	1	—	18	1	2	—	35	—
3	—	7	—	1	—	6	1	1	—	—	—	9	—	—	—	14	—
2	—	37	—	2	—	22	2	3	—	—	—	44	—	3	—	44	—
3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—
5	—	27	—	1	—	15	1	1	—	—	—	22	1	—	—	43	—
2	—	10	—	—	—	4	—	—	—	—	—	7	1	—	—	10	—
3	—	17	—	1	—	11	1	1	—	—	—	15	—	—	—	33	—
2	—	19	—	1	—	5	—	1	—	—	—	18	—	—	—	9	—
2	—	14	—	1	—	5	—	1	—	—	—	18	—	—	—	4	—
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	—	702	9	19	—	266	11	31	—	23	—	641	6	29	—	672	1
1	—	19	—	1	—	10	—	—	—	1	—	8	—	1	—	17	1
1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	—
81	—	560	6	16	—	226	9	22	—	18	—	569	4	22	—	508	—
—	—	23	—	1	—	6	1	1	—	—	—	16	—	2	—	49	—
2	—	23	—	—	—	10	1	—	—	—	—	20	1	—	—	28	—
2	—	21	1	—	—	3	—	1	—	—	—	9	1	1	—	17	—
3	—	36	1	1	—	10	—	6	—	—	—	10	—	2	—	33	—
4	—	15	1	—	—	—	—										

Segue : TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in poi,

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE, AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE, INDUSTRIALI, COMMERCianti, VENDITORI DI DERRATE ALIMENTARI, MERCI VARIE E NON SPECIFICATE, ESERCENTI, COMMISSIONARI RAPPRESENTANTI. Rows include causes like Aneurisma, Bronchiti, Polmoniti, etc.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni omicidio, accidente) è sconosciuta. (h) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns: MINATORI, CAVATORI, ECC., FALEGNAMI, VERNICIATORI, ECC., ADDETTI ALLA MACELLAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARNI, ADDETTI AI FORNI E PASTIFICI, ADDETTI ALLA LAVORAZ. DEL LATTE E ALL'INDUSTR. ALIMENTARI, CONCIATORI, PELLAI, CALZOLAI, GUANTAI, ECC., METALLURGICI, MECCANICI, ELETTRICISTI, ECC., NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include professions like Minatori, Falegnami, etc.

da gravidanza. (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta.

Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	ARGENTIERI, OREFICI, ECC.		ASFALTISTI, FORNACIAI, ECC.		CERAMISTI, VETRAI, ECC.		MURATORI, IMBIANCHINI, ECC.		MANOVALI, BRACCIANI, ECC.	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
			COMPLESSO . . .	384	15	379	11	327	21	6.716	4
	I. - Malattie infettive e parassitarie	64	3	55	3	68	8	1.121		1.227	4
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	1	—	6	1	2	1	65	—	80	—
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7	Morbillo	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
8	Scarlattina	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
9	Tosse convulsa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Difterite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza	8	—	8	—	8	—	92	—	114	2
13	Dissenteria	1	—	—	—	—	—	5	—	4	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	39	3	29	2	46	7	738	—	700	1
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi . .	10	—	5	—	5	—	83	—	142	—
34	Sifilide	2	—	1	—	3	—	32	—	51	—
36	Infesz. purulenta e settic. non puer. .	1	—	2	—	1	—	43	—	56	—
38	Malaria	—	—	1	—	—	—	14	—	19	1
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti . .	—	—	—	—	—	—	6	—	5	—
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie . .	2	—	3	—	3	—	40	—	54	—
	II. - Tumori (neoplasie)	40	2	34		30		688	1	585	2
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni	37	2	34	—	29	—	673	1	561	2
54, 55	Tumori non maligni (b)	3	—	—	—	1	—	15	—	24	—
	III. - Malattie reumatiche, ecc. (c)	10		5		8	1	84		75	
56	Reumatismo articolare acuto	2	—	2	—	2	—	24	—	29	—
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	—	—	2	—	3	—	13	—	10	—
59	Diabete mellito	8	—	1	—	2	1	38	—	21	—
dal 60 al 64	Avitaminosi	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali	—	—	—	—	1	—	8	—	11	—
	IV. - Malattie del sangue, ecc. (d)			4		2		36		40	
71	Anemie perniciose ed altre	—	—	—	—	1	—	9	—	13	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e)	—	—	4	—	1	—	27	—	27	—
	V. - Avvelen. cron. e intossicazioni			2		7	1	30		26	
75	Alcoolismo acuto e cronico	—	—	2	—	2	—	27	—	25	—
76, 77	Avvelenamenti cronici	—	—	—	—	5	1	3	—	1	—
	VI. - Malatt. del sist. nervoso, ecc. (f)	53	5	49		41	1	865		783	2
79	Meningite semplice	1	1	1	—	2	—	16	—	17	—
80	Atassia locomotrice progressiva . . .	—	—	—	—	—	—	7	—	8	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	44	3	41	—	29	1	707	—	592	2
83	Paralisi progressiva degli alienati . .	3	—	1	—	—	—	34	—	29	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi . . .	2	—	—	—	2	—	24	—	40	—
85	Epilessia	—	—	2	—	1	—	22	—	38	—
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso . .	2	1	2	—	6	—	36	—	36	—
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi .	1	—	2	—	1	—	19	—	23	—
	VII. - Malattie dell'app. circolatorio	61	1	52		34		956		905	5
90	Pericardite	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—
91	Endocardite acuta	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—
92	Endocardite cr., compr. le aff. valv.	10	—	9	—	7	—	225	—	200	3
93	Malattie del miocardio	16	—	14	—	11	—	307	—	291	2
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris . .	8	—	2	—	4	—	63	—	35	—
95	Altre malattie del cuore	14	1	9	—	4	—	162	—	183	—

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE		ADDETTI A MANIFATTURE TESSILI		ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL VESTIARIO		ADDETTI ALL'ARREDAMENTO		INDUSTRIE CHIMICHE		ADDETTI AI LABORATORI E MANIFATT. TABACCHI		ADDETTI ALLE INDUSTRIE POLI-GRAFICHE		ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA CARTA		OPERAI NON SPECIFICATI		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F		
		1.888	1.073	251	144	3.063	1.441	227	15	184	29	106	102	473	16	234	48	5.252		821
	543	409	68	57	864	575	40	1	39	14	31	30	114	7	57	19	1.242	378		
1, 2	64	55	7	7	65	50	2	—	4	4	2	2	10	2	2	2	92	39	1, 2	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
7	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
10	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	
11	35	20	2	1	51	24	—	—	5	1	6	6	7	—	8	2	78	11	11	
13	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	
23	333	261	42	33	583	391	26	1	26	9	16	15	74	3	40	13	798	254	23	
dal 24 al 32	78	58	13	12	112	81	9	—	1	—	3	3	14	2	5	2	158	56	dal 24 al 32	
34	4	2	—	—	12	5	2	—	2	—	—	—	3	—	—	—	33	4	34	
36	15	5	2	2	20	11	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	33	4	36	
38	—	—	—	—	5	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	38
dal 39 al 42	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	2	dal 39 al 42
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	9	5	1	1	11	6	1	—	—	—	1	1	3	—	2	—	35	5	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	
	206	113	36	16	275	140	18	1	16	4	10	10	46	2	22	4	501	75		
dal 45 al 53	190	104	30	12	251	121	18	1	15	3	10	10	45	2	21	4	474	64	dal 45 al 53	
54, 55	16	9	6	4	24	19	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	27	11	54, 55	
	37	25	8	5	53	24	2	—	4	—	3	3	7	—	5	—	87	13		
56	19	14	6	4	14	8	—	—	2	—	1	1	1	—	2	—	37	5	56	
57, 58	3	2	—	—	7	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	8	1	57, 58	
59	7	3	2	1	24	7	2	—	2	—	—	—	4	—	3	—	25	2	59	
dal 60 al 64	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	dal 60 al 64
66	3	2	—	—	4	4	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	8	4	66	
65, 67, 68, 69	4	3	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	1	65, 67, 68, 69	
	12	6	4	2	12	9	—	—	4	1	1	1	6	—	2	—	41	10		
71	5	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	9	3	71	
70, 72, 73, 74	7	4	4	2	10	8	—	—	4	1	1	1	5	—	—	—	32	7	70, 72, 73, 74	
	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	16	1	75	
75	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	75
76, 77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	76, 77
	167	67	28	14	377	112	34	2	12	1	2	2	40	—	21	4	585	48		
79	6	5																		

Segue: TAVOLA 11. - Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in poi, classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with multiple columns: CAUSE DI MORTE, COCCHIERI, FERROVIERI, MARINAI, ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA, ADDETTI ALLA ACCONCIATURA DELLA PERSONA, ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, GARZONI E CAMERIERI, FACCHINI, VENDITORI, PERSONALE SUBALTERNO, ESERCITO, GUARDIE DI FINANZA, ALTRI CORPI ARM. DELLO STATO, CULTO CATTOLICO, NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO. Rows include various medical conditions like Aneurisma, Bronchiti, Polmoniti, etc., and professional categories.

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni... da gravidanza). (d) non indicate come veneree. (e) albuminuria e eclampsia. (f) esclusa la tubercolosi e il reumatismo. (g) di cui la natura (suicidio, omicidio, accidente) è sconosciuta. (h) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	INSEGNANTI		PROFESSIONI LIBERALI		ARTI SANITARIE		ARTI BELLE		UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE, DI TERRA, DI MARE E D'ARIA	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
	COMPLESSO	1.224	683	1.740	20	1.250	208	892	64	327	—
	I. - Malattie infettive e parassitarie	198	120	214	6	151	37	175	14	39	—
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	15	11	19	1	7	1	7	—	3	—
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Scarlattina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Tosse convulsa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Difterite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Influenza	34	19	39	—	44	9	12	—	5	—
13	Dissenteria	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	105	67	112	5	55	13	125	10	19	—
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	18	10	13	—	12	3	14	1	5	—
34	Sifilide	3	—	6	—	7	2	11	1	3	—
36	Infesz. purulenta e settic. non puer.	12	7	12	—	15	5	1	1	2	—
38	Malaria	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
dal 39 al 42	Mal. dovute a protozoi od elminti	1	—	4	—	1	—	—	—	1	—
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	Altre mal. infettive e parassitarie	8	5	7	—	10	4	5	1	1	—
	II. - Tumori (neoplasie)	158	118	167	3	135	36	83	13	28	—
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni	146	107	161	3	127	33	79	13	26	—
54, 55	Tumori non maligni (b)	12	11	6	—	8	3	4	—	2	—
	III. - Malattie reumatiche, ecc. (c)	51	24	52	—	51	10	21	5	5	—
56	Reumatismo articolare acuto	8	5	5	—	2	—	5	2	1	—
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	3	2	3	—	2	—	1	—	—	—
59	Diabete mellito	33	14	38	—	42	9	13	2	3	—
dal 60 al 64	Avitaminosi	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
66	Mal. ghiand. tiroide e ghiand. parat.	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—
65, 67, 68, 69	Altre malattie generali	5	1	4	—	2	—	2	1	1	—
	IV. - Malattie del sangue, ecc. (d)	17	9	19	—	10	1	5	—	5	—
71	Anemie perniciose ed altre	4	2	5	—	—	—	—	—	1	—
70, 72, 73, 74	Leucemie, aleucemie, ecc. (e)	13	7	14	—	10	1	5	—	4	—
	V. - Avvelen. cron. e intossicazioni	1	—	4	—	1	1	3	—	—	—
75	Alcoolismo acuto e cronico	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—
76, 77	Avvelenamenti cronici	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—
	VI. - Malatt. del sist. nervoso, ecc.(f)	142	71	222	2	188	28	123	2	30	—
79	Meningite semplice	4	2	6	1	3	—	1	—	1	—
80	Atassia locomotrice progressiva	—	—	3	—	—	—	3	—	1	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	114	52	186	—	163	25	90	1	19	—
83	Paralisi progressiva degli alienati	2	—	4	—	3	—	11	1	5	—
84	Demenza precoce ed altre psicosi	6	6	4	—	2	—	8	—	1	—
85	Epilessia	2	2	2	—	—	—	2	—	—	—
78, 81, 86, 87	Altre malattie del sistema nervoso	12	9	12	1	13	3	7	—	2	—
88, 89	Mal. dell'occhio, orecchio e annessi	2	—	5	—	4	—	1	—	1	—
	VII. - Malattie dell'app. circolatorio	186	90	328	1	231	32	147	7	42	—
90	Pericardite	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
91	Endocardite acuta	3	3	2	—	2	1	—	—	—	—
92	Endocardite cr., compr. le aff. valv.	35	24	48	1	26	5	30	1	6	—
93	Malattie del miocardio	58	31	88	—	67	11	42	3	6	—
94	Mal. art. coronarie e ang. pectoris	24	7	81	—	49	4	17	1	16	—
95	Altre malattie del cuore	30	15	38	—	34	7	27	2	8	—

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) della nutrizione, delle ghiandole endocrine e altre

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	PROFESSIONI												MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO		
	IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI		PENSIONATI E VETERANI		PROPRIETARI E BENESTANTI		STUDENTI		ATTENDENTI A CASA		DISOCCUPATI, INVALIDI, RICOVERATI, ECC.		PROFESSIONI IGNOTE		M		F	MF
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F				
	6.045	574	22.611	5.241	14.422	4.193	1.513	282	160.188	160.188	34.108	13.244	179	49	221.471	215.572	437.043	
	1.370	247	1.334	259	871	259	727	167	18.837	18.837	2.026	738	42	14	25.950	25.427	51.377	
1, 2	63	16	19	6	31	8	88	21	1.397	1.397	19	10	5	—	1.575	2.001	3.576	1, 2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3
7	—	—	—	—	—	—	1	—	11	11	1	—	—	—	20	17	37	7
8	2	—	—	—	—	—	—	—	15	15	—	—	—	—	17	21	38	8
9	—	—	—	—	1	—	—	—	6	6	—	—	—	—	3	7	10	9
10	3	—	—	—	2	1	4	1	38	38	—	—	—	—	32	51	83	10
11	131	13	431	107	379	121	16	—	3.025	3.025	480	194	3	—	4.198	4.163	8.361	11
13	1	—	3	2	5	2	—	—	50	50	9	5	—	—	98	76	174	13
dal 24 al 32	911	185	526	70	237	63	428	95	9.841	9.841	650	195	20	10	13.339	12.982	26.321	23
34	118	27	86	23	46	19	144	42	2.285	2.285	297	107	9	2	2.673	3.162	5.835	dal 24 al 32
36	39	1	70	5	27	7	3	—	239	239	66	13	1	1	778	314	1.092	34
38	51	3	113	28	79	24	32	6	1.006	1.006	321	168	1	—	1.432	1.415	2.847	36
dal 39 al 42	12	—	9	3	13	2	1	—	148	148	14	1	—	—	427	218	645	38
4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44	5	1	1	—	3	—	1	—	80	80	1	1	1	1	98	97	195	dal 39 al 42
	34	1	76	15	48	12	8	2	696	696	168	42	2	—	1.258	903	2.161	4, 5, 12, dal 15 al 22, 33, 35, 37, 43, 44
	633	76	2.295	548	1.391	499	27	8	15.966	15.966	1.579	590	10	1	18.099	20.368	38.467	
dal 45 al 53	599	65	2.234	531	1.323	457	22	6	15.079	15.079	1.528	573	8	1	17.469	19.194	36.663	dal 45 al 53
54, 55	34	11	61	17	68	42	5	2	887	887	51	17	2	—	630	1.174	1.804	54, 55
	141	17	521	159	448	143	30	6	3.633	3.633	501	230	6	1	3.847	4.838	8.685	
56	33	8	51	22	33	11	26	5	793	793	76	33	6	1	892	1.096	1.988	56
57, 58	9	1	93	34	59	17	—	—	601	601	212	121	—	—	574	895	1.469	57, 58
59	83	4	352	93	333	101	1	1	1.759	1.759	150	51	—	—	1.970	2.222	4.192	59
dal 60 al 64	1	1	4	1	1	1	—	—	64	64	16	11	—	—	56	89	145	dal 60 al 64
66	2	1	5	5	8	7	1	—	250	250	15	5	—	—	70	319	389	66
65, 67, 68, 69	13	2	16	4	14	6	2	—	166	166	32	9	—	—	285	217	502	65, 67, 68, 69
	52	4	73	13	75	33	20	4	784	784	49	25	—	—	1.010	1.066	2.076	
71	10	1	30	9	25	15	1	—	327	327	24	12	—	—	293	443	736	71
70, 72, 73, 74	42	3	43	4	50	18	19	4	457	457	25	13	—	—	717	623	1.340	70, 72, 73, 74
	9	1	28	1	18	6	—	—	73	73	60	8	—	—	530	100	630	
75	9	1	24	1	18	6	—	—	67	67	57	6	—	—	488	91	579	75
76, 77	—																	

Segue: TAVOLA 11. — Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	INSEGNANTI		PROFESSIONI LIBERALI		ARTI SANITARIE		ARTI BELLE		UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE, DI TERRA, DI MARE E D'ARIA	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
96	Aneurisma, escluso quello del cuore	2	1	7	—	4	—	6	—	1	—
97, 98	Arteriosclerosi (a) e cangrena	26	7	46	—	37	2	20	—	3	—
dal 99 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio	8	2	17	—	11	2	4	—	2	—
	VIII. - Malattie dell'app. respiratorio	169	89	266	2	191	19	141	8	43	—
106	Bronchiti	9	6	19	—	15	1	13	2	—	—
107, 108, 109	Polmoniti	128	76	182	2	147	13	101	6	31	—
110	Pleuriti	10	3	17	—	7	—	7	—	4	—
dal 104, 105, 111 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	22	4	48	—	22	5	20	—	8	—
	IX. - Malattie dell'app. digerente	91	45	151	4	97	14	66	3	36	—
117	Ulcera dello stom. e del duodeno	7	—	29	—	17	5	13	—	13	—
120	Enter. e ulcere int. (2 anni e oltre)	5	3	11	—	14	—	15	1	3	—
121	Appendicite	9	5	23	—	7	1	10	1	3	—
122	Ernia, occlusione intestinale	15	10	20	—	11	1	6	—	2	—
124	Cirrosi del fegato	19	4	27	—	25	4	13	—	2	—
125, 126, 127, 115, 116, 118, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente	17	10	20	1	12	—	3	—	7	—
	X. - Mal. dell'app. urinario e genitale	92	43	144	—	101	10	58	5	15	—
130, 131, 132	Nefriti	62	34	90	—	65	9	35	2	9	—
133	Altre malattie dei reni, ecc. (c)	12	6	8	—	3	—	4	1	2	—
134	Calcolosi delle vie urinarie	4	1	8	—	4	—	2	—	—	—
135	Mal. della vescica, esclusi i tumori	4	—	17	—	9	—	8	1	3	—
136	Mal. dell'uretra, asc. urinoso, ecc.	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—
137	Malattie della prostata	8	—	20	—	18	—	6	—	1	—
138, 139	Malattie degli organi genitali (d)	2	2	—	—	1	1	1	1	—	—
	XI. - Mal. della grav., parto e puerp.	23	23	—	—	2	2	—	—	—	—
141, 142, 143	Accidenti della gravidanza	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Emorragia puerperale	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali	12	12	—	—	1	1	—	—	—	—
146, 147	Tossiemia della gravidanza, ecc. (e)	3	3	—	—	1	1	—	—	—	—
148, 149, 150	Altre malattie puerperali	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII. - Mal. della pelle e del tess. cellul.	7	4	11	—	10	1	6	—	3	—
151, 152, 153	Mal. della pelle e del tessuto cellul.	7	4	11	—	10	1	6	—	3	—
	XIII. - Mal. delle ossa e org. della locom.	3	3	2	—	3	1	1	—	—	—
154, 155, 156	Mal. delle ossa e org. della locom. (f)	3	3	2	—	3	1	1	—	—	—
	XIV. - Vizi di conformaz. congeniti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Vizi di conformazione congeniti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVI. - Senilità	31	18	42	—	31	12	23	1	2	—
162	Senilità	31	18	42	—	31	12	23	1	2	—
	XVII. - Morti violente e accidentali	45	20	93	2	38	2	33	4	73	—
dal 163 al 171	Suicidio	18	8	34	2	13	1	10	3	12	—
dal 172 al 175	Omicidio	3	2	4	—	1	—	—	—	—	—
dal 176 al 194	Morti accidentali	23	9	53	—	24	1	22	1	61	—
195	Altre morti violente (g)	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—
196, 197	Ferite di guerra (h)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Esecuzione giudiziaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVIII. - Cause di morte non determ.	10	6	25	—	10	2	7	2	6	—
199, 200	Morte improv. e cause non specificate o mal definite	10	6	25	—	10	2	7	2	6	—

(a) eccettuate le malattie delle arterie coronarie. (b) compresi i calcoli biliari. (c) dei bacinetti e degli ureteri (non comprese le malattie dei reni omicidio, accidente) è sconosciuta. (h) compresa l'esecuzione di civili da parte di armate belligeranti.

classificati secondo le cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI		PENSIONATI E VETERANI		PROPRIETARI E BENESTANTI		STUDENTI		ATTENDENTI A CASA		DISOCCUPATI, INVALIDI, RICOVERATI, ECC.		PROFESSIONI IGNOTE		MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	MF		
96	28	1	52	11	25	4	2	—	157	157	22	6	—	—	440	200	640	96	
97, 98	95	2	1.058	249	625	156	—	—	4.619	4.619	1.843	681	—	—	7.125	6.380	13.505	97, 98	
dal 99 al 103	43	2	158	38	95	26	1	—	609	609	110	44	—	—	1.006	841	1.847	dal 99 al 103	
	821	48	3.696	862	2.314	749	162	27	23.980	23.980	5.151	1.952	25	7	37.230	32.517	69.747		
106	61	3	693	196	383	121	7	2	4.705	4.705	1.464	615	4	2	5.821	6.669	12.490	106	
107, 108, 109	601	35	2.498	588	1.618	554	124	19	16.674	16.674	3.140	1.196	17	5	25.972	22.443	48.415	107, 108, 109	
110	47	6	105	12	55	16	18	3	663	663	83	26	2	—	1.282	870	2.152	110	
dal 104, 105, 111 al 114	112	4	400	66	258	58	13	3	1.938	1.938	464	115	2	—	4.155	2.535	6.690	104, 105, 111 al 114	
	564	39	1.309	230	954	264	147	20	8.947	8.947	1.271	417	10	4	15.665	11.788	27.453		
117	131	3	114	13	77	10	6	1	493	493	57	13	1	—	2.361	677	3.038	117	
120	37	4	236	64	169	65	10	2	2.405	2.405	543	208	2	1	2.926	3.264	6.190	120	
121	92	15	47	11	62	25	7	7	659	659	19	4	2	1	1.317	923	2.240	121	
122	50	3	226	50	174	46	7	—	1.409	1.409	233	71	2	1	2.287	1.834	4.121	122	
124	122	3	408	32	226	32	3	—	1.206	1.206	188	34	1	—	3.652	1.542	5.194	124	
125, 126, 127, 115, 116, 118, 123, 128, 129	58	3	143	35	136	52	6	1	1.469	1.469	88	32	1	—	1.235	1.809	3.044	125, 126, 127, 115, 116, 118, 123, 128, 129	
	393	23	1.520	229	1.081	259	49	11	7.420	7.420	1.426	418	3	2	11.855	9.685	21.540		
130, 131, 132	277	18	917	199	663	206	38	9	6.414	6.414	939	370	3	2	7.185	8.345	15.530	130, 131, 132	
133	22	2	57	12	53	26	6	1	407	407	60	20	—	—	516	540	1.056	133	
134	28	1	36	3	34	7	3	—	135	135	20	5	—	—	362	171	533	134	
135	20	—	128	13	111	17	1	—	214	214	130	20	—	—	1.109	292	1.401	135	
136	7	—	23	—	12	1	—	—	1	1	13	—	—	—	197	2	199	136	
137	37	—	355	—	206	—	—	—	—	—	254	—	—	—	2.456	—	2.456	137	
138, 139	2	2	4	2	2	2	1	1	249	249	10	3	—	—	30	335	365	138, 139	
	7	7	3	3	8	8	2	2	2.211	2.211	—	—	—	—	—	—	2.725	2.725	
141, 142, 143	1	1	—	—	—	—	—	—	162	162	—	—	—	—	—	192	192	141, 142, 143	
144	1	1	1	1	2	2	—	—	416	416	—	—	—	—	—	512	512	144	
140, 145	3	3	—	—	1	1	2	2	830	830	—	—	—	—	—	1.052	1.052	140, 145	
146, 147	1	1	2	2	4	4	—	—	436	436	—	—	—	—	—	531	531	146, 147	
148, 149, 150	1	1	—	—	1	1	—	—	367	367	—	—	—	—	—	438	438	148, 149, 150	
	35	4	68	13	54	10	13	3	497	497	75	24	—	—	990	370	1.660		
151, 152, 153	35	4	68	13	54	10	13	3</											

TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1937, per gruppi di età da 15 anni in poi,

Table with columns: NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO, CAUSE DI MORTE - GRUPPI DI ETÀ, AGRICOLTORI, INDUSTRIALI, VENDITORI DI DERRATE ALLIMENTARI, ESERCENTI, COMMISSIONARI, MINATORI, FALEGNAMI, etc.

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns: CAUSE DI MORTE - GRUPPI DI ETÀ, ADDETTI ALLA MACELLAZIONE, ADDETTI AI FORNI, ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL LATTE, CONCIATORI, CALZOLAI, METALLURGICI, MECCANICI, etc.

Segue : TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1937, per gruppi di età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	AGRICOLTORI DI OGNI SPECIE		INDUSTRIALI, COMMERCANTI		VENDITORI DI DERRATE ALI- MENTARI, MER- CI VARIE E NON SPECIFICATE		ESERCENTI		COMMISSIONARI RAP- PRESENTANTI		MINATORI, CAVA- TORI, ECC.		FALEGNAI, VERN- CIATORI, ECC.	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
dal 107 al 109	Polmoniti	13.823	2.268	708	44	408	49	163	32	167	2	119	1	580	11
	Da 15 a 19 anni	387	87	1	—	4	—	2	1	—	—	2	—	14	1
	» 20 » 24 »	428	87	8	—	7	—	—	—	2	—	4	—	25	—
	» 25 » 29 »	452	108	15	—	12	—	3	—	4	1	3	—	20	2
	» 30 » 34 »	449	112	19	1	17	1	6	3	4	—	8	—	26	—
	» 35 » 39 »	506	103	26	2	20	2	8	3	5	—	12	—	33	—
	» 40 » 44 »	550	115	30	—	22	2	13	—	13	—	11	—	37	—
	» 45 » 49 »	596	100	45	2	28	3	6	1	7	—	13	—	36	—
	» 50 » 54 »	733	120	58	3	40	6	18	3	18	—	17	1	45	—
	» 55 » 59 »	1.052	148	68	7	37	5	9	3	19	—	10	—	42	—
	» 60 » 64 »	1.469	235	97	7	45	6	27	7	13	1	12	—	58	—
	» 65 » 69 »	1.769	286	90	7	46	6	21	5	20	—	13	—	65	—
	» 70 » 74 »	2.060	321	102	6	54	7	23	2	22	—	8	—	75	1
	» 75 » 79 »	1.904	267	75	7	41	6	13	1	28	—	3	—	53	5
	» 80 e più	1.468	169	74	2	35	6	14	3	12	—	3	—	51	1
dal 104 al 114	Malattie dell'apparato respir.	19.781	3.438	977	56	573	64	211	37	285	3	179	1	837	20
	Da 15 a 19 anni	447	106	2	—	4	—	2	1	—	—	2	—	19	1
	» 20 » 24 »	511	106	10	—	9	—	1	1	6	1	4	—	32	—
	» 25 » 29 »	537	124	19	1	15	—	4	—	6	—	4	—	25	3
	» 30 » 34 »	558	144	24	1	19	1	6	3	6	—	10	—	31	—
	» 35 » 39 »	607	116	39	2	27	1	10	3	14	—	13	—	43	—
	» 40 » 44 »	674	147	37	—	33	3	16	—	23	—	16	—	52	—
	» 45 » 49 »	771	130	62	3	48	4	9	1	15	—	20	—	51	1
	» 50 » 54 »	953	153	70	4	53	7	25	4	25	—	23	1	69	—
	» 55 » 59 »	1.429	213	100	8	49	6	12	3	26	—	14	—	65	—
	» 60 » 64 »	2.028	347	134	8	67	9	35	9	21	1	23	—	93	—
	» 65 » 69 »	2.551	430	127	10	69	9	25	5	28	—	19	—	90	2
	» 70 » 74 »	3.085	537	138	8	71	9	27	2	37	—	14	—	111	4
	» 75 » 79 »	2.965	477	111	8	63	7	21	2	37	—	13	—	77	7
	» 80 e più	2.665	408	104	3	46	8	18	3	21	—	4	—	79	2
dal 130 al 132	Nefriti	3.273	738	297	14	142	18	52	9	58	2	25	—	148	2
	Da 15 a 19 anni	80	32	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	» 20 » 24 »	66	15	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	4	—
	» 25 » 29 »	92	28	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—
	» 30 » 34 »	77	19	1	—	3	2	2	—	—	—	—	—	3	—
	» 35 » 39 »	92	34	7	—	6	1	3	—	2	—	—	—	5	—
	» 40 » 44 »	94	35	13	2	9	3	2	1	7	—	—	—	6	—
	» 45 » 49 »	119	42	18	1	15	4	4	1	6	—	—	—	13	—
	» 50 » 54 »	157	41	40	2	8	2	3	—	6	—	—	—	12	—
	» 55 » 59 »	232	61	25	—	19	2	6	1	2	—	—	—	10	—
	» 60 » 64 »	347	72	44	4	17	1	8	3	12	—	—	—	13	—
	» 65 » 69 »	455	94	40	3	22	2	10	3	3	—	—	—	12	—
	» 70 » 74 »	531	94	50	—	15	1	10	—	4	—	—	—	20	—
	» 75 » 79 »	487	90	32	2	17	2	4	1	5	—	—	—	24	—
	» 80 e più	444	81	20	—	9	1	3	—	5	—	—	—	16	—
dal 176 al 194	Morti accidentali	3.500	318	193	7	108	8	35	3	61	1	182	—	201	1
	Da 15 a 19 anni	270	21	2	—	5	—	—	—	7	—	—	—	10	—
	» 20 » 24 »	279	14	11	—	10	—	2	—	7	—	—	—	10	—
	» 25 » 29 »	264	14	22	—	7	—	—	—	7	1	—	—	27	—
	» 30 » 34 »	199	13	24	—	15	1	4	—	7	—	—	—	21	—
	» 35 » 39 »	201	24	18	1	11	2	4	—	4	—	—	—	24	—
	» 40 » 44 »	215	20	19	—	10	1	—	—	12	—	—	—	19	—
	» 45 » 49 »	213	20	16	1	8	—	3	—	1	—	—	—	20	—
	» 50 » 54 »	282	23	21	—	5	—	3	—	5	—	—	—	22	—
	» 55 » 59 »	293	26	21	3	12	2	3	1	6	—	—	—	19	—
	» 60 » 64 »	302	25	13	—	12	—	4	—	3	—	—	—	14	—
	» 65 » 69 »	298	25	10	—	5	—	5	—	2	—	—	—	6	—
	» 70 » 74 »	306	33	10	—	4	—	3	—	6	—	—	—	10	—
	» 75 » 79 »	218	28	4	—	4	—	3	—	2	—	—	—	4	—
	» 80 e più	160	30	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

ADDETTI AL- LA MACELLA- ZIONE E CON- SERVAZIONE DELLE CARNI	ADDETTI AI FORNI E PASTIFICI		ADDETTI AL- LA LAVORAZ. DEL LATTE E ALL'INDISTR. ALIMENTARI		CONCIATORI, PELLAI		CALZOLAI, GUANTAI, ECC.		METALLUR- GICI		MECCANICI, ELETTRICISTI, ECC.		CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F		
28	—	232	11	18	1	13	—	446	7	33	—	721	7	Polmoniti
—	—	8	—	—	—	—	—	15	1	—	—	44	—	Da 15 a 19 anni
1	—	5	1	—	—	1	—	15	1	—	—	43	1	» 20 » 24 »
—	—	9	1	1	—	1	—	19	1	—	—	33	1	» 25 » 29 »
1	—	11	1	1	—	1	—	24	—	3	—	56	1	» 30 » 34 »
—	—	13	—	2	—	1	—	19	2	3	—	61	1	» 35 » 39 »
—	—	12	—	2	—	1	—	14	—	4	—	68	—	» 40 » 44 »
2	—	15	1	1	—	1	—	24	—	5	—	75	2	» 45 » 49 »
3	—	22	2	2	—	1	—	26	—	3	—	63	—	» 50 » 54 »
4	—	18	—	2	—	1	—	35	—	4	—	55	—	» 55 » 59 »
3	—	26	2	1	—	1	—	54	1	5	—	59	—	» 60 » 64 »
6	—	26	1	2	—	—	—	62	1	—	—	53	—	» 65 » 69 »
4	—	32	1	—	—	1	—	59	—	1	—	48	1	» 70 » 74 »
2	—	18	—	3	—	—	—	43	—	2	—	39	—	» 75 » 79 »
1	—	17	1	1	—	3	—	37	—	1	—	24	—	» 80 e più
40	—	328	13	28	1	22	—	650	9	49	—	994	9	Malattie dell'apparato respir.
2	—	8	—	—	—	—	—	19	1	—	—	50	—	Da 15 a 19 anni
1	—	6	1	2	—	1	—	24	2	—	—	52	1	» 20 » 24 »
1	—	10	1	1	—	2	—	22	1	—	—	48	2	» 25 » 29 »
1	—	17	1	1	—	1	—	29	—	5	—	68	1	» 30 » 34 »
—	—	16	—	4	—	1	—	27	2	4	—	71	2	» 35 » 39 »
1	—	17	—	2	—	2	—	22	—	5	—	86	—	» 40 » 44 »
4	—	22	1	1	—	3	—	37	1	8	—	101	2	» 45 » 49 »
5	—	31	3	2	—	2	—	44	—	5				

Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1937, per gruppi di età da 15 anni in poi,

Table with columns for Cause di Morte, Gruppi di Età, and various professions (Argentieri, Asfaltisti, Ceramisti, Muratori, etc.). Rows include Tubercolosi, Cancro ed altri tum. maligni, Diabete mellito, Emorragia, embolia e trombi cerebrali, and Malattie dell'apparato circol.

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

Table with columns for Cause di Morte, Gruppi di Età, and professions (Addetti all'industria del vestiario, Addetti all'arredamento, Industrie chimiche, etc.). Rows include Tubercolosi, Cancro ed altri tum. maligni, Diabete mellito, Emorragia, embolia e trombi cerebrali, and Malattie dell'apparato circol.

Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1937, per gruppi di età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	ARGENTIERI, OREFICI, ECC.		ASFALTISTI, FORNACIAI, ECC.		CERAMISTI, VETRAI, ECC.		MURATORI, IMBIANCHINI, ECC.		MANOVALI, BRACCIANTI, ECC.		ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE		ADDETTI A MANIFATTURE TESSILI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
dal 107 al 109	Polmoniti	32	3	57	3	33	3	780	1	934	4	205	100	20	9
	Da 15 a 19 anni	—	—	2	1	2	2	16	—	34	—	10	8	2	2
	» 20 » 24 »	3	1	—	—	1	—	26	1	45	—	14	14	2	2
	» 25 » 29 »	—	—	5	—	2	—	35	—	54	2	18	14	1	—
	» 30 » 34 »	—	—	2	1	3	—	39	—	57	—	23	15	2	—
	» 35 » 39 »	—	—	4	—	3	—	31	—	59	—	20	6	3	—
	» 40 » 44 »	5	—	2	—	1	—	61	—	65	—	17	11	—	—
	» 45 » 49 »	1	—	5	—	1	—	51	—	68	—	12	2	—	—
	» 50 » 54 »	2	—	8	—	3	—	62	—	76	—	10	5	—	—
	» 55 » 59 »	2	1	7	—	3	—	52	—	91	1	12	4	1	1
	» 60 » 64 »	2	—	5	—	5	—	84	—	105	—	7	3	—	—
	» 65 » 69 »	2	—	7	—	3	—	87	—	88	—	21	8	3	1
	» 70 » 74 »	2	—	7	—	4	—	94	—	85	1	16	3	2	—
	» 75 » 79 »	5	—	1	—	2	—	81	—	65	—	15	4	1	1
	» 80 e più	8	—	2	—	—	—	61	—	42	—	10	3	2	—
dal 104 al 114	Malattie dell'apparato respir.	61	3	72	3	48	4	1.125	1	1.282	7	271	125	28	12
	Da 15 a 19 anni	—	—	2	1	2	2	17	—	42	1	11	9	2	2
	» 20 » 24 »	3	1	—	—	2	—	29	1	51	—	14	14	2	2
	» 25 » 29 »	2	—	5	—	3	—	46	—	65	2	24	16	2	1
	» 30 » 34 »	1	—	3	—	3	—	50	—	70	—	26	16	3	1
	» 35 » 39 »	2	—	5	—	3	—	48	—	77	—	23	6	4	—
	» 40 » 44 »	8	—	2	—	1	—	75	—	77	—	18	12	—	—
	» 45 » 49 »	5	—	7	—	1	—	71	—	96	—	13	2	—	—
	» 50 » 54 »	4	—	8	—	3	—	88	—	102	—	15	7	—	—
	» 55 » 59 »	4	1	7	—	5	—	88	—	120	1	17	5	2	1
	» 60 » 64 »	7	—	7	—	7	—	131	—	150	—	10	3	1	1
	» 65 » 69 »	4	—	9	—	8	—	133	—	117	—	27	12	5	2
	» 70 » 74 »	4	—	8	—	5	—	138	—	132	1	26	8	2	—
	» 75 » 79 »	8	—	4	—	3	—	118	—	104	—	27	7	3	1
	» 80 e più	9	—	4	—	1	—	93	—	79	2	20	8	2	—
dal 130 al 132	Netriti	24	1	10	—	16	1	203	1	192	1	59	33	5	2
	Da 15 a 19 anni	1	—	—	—	—	—	1	—	6	—	1	—	—	—
	» 20 » 24 »	1	—	—	—	—	—	8	—	8	—	8	8	—	—
	» 25 » 29 »	1	—	1	—	1	—	6	—	4	—	4	—	—	—
	» 30 » 34 »	—	—	1	—	2	—	8	—	4	—	3	2	—	—
	» 35 » 39 »	1	—	—	—	—	—	10	—	8	—	4	3	—	—
	» 40 » 44 »	1	—	2	—	3	—	8	—	13	—	8	5	—	—
	» 45 » 49 »	1	—	—	—	1	—	16	1	17	—	2	2	—	—
	» 50 » 54 »	4	—	—	—	3	—	14	—	14	—	4	1	—	—
	» 55 » 59 »	2	—	—	—	—	—	18	—	17	—	6	—	—	—
	» 60 » 64 »	1	—	2	—	—	—	19	—	18	—	4	—	—	—
	» 65 » 69 »	3	—	—	—	1	—	26	—	21	—	3	—	—	—
	» 70 » 74 »	6	—	2	—	1	—	31	—	30	—	3	—	—	—
	» 75 » 79 »	—	—	—	—	2	—	28	—	15	—	5	—	—	—
	» 80 e più	2	—	1	—	2	—	10	—	15	—	4	—	—	—
dal 176 al 194	Morti accidentali	9	—	19	1	9	—	453	—	653	—	47	22	3	1
	Da 15 a 19 anni	—	—	—	—	1	—	15	—	62	—	7	4	—	—
	» 20 » 24 »	1	—	1	—	2	—	26	—	74	—	1	1	—	—
	» 25 » 29 »	—	—	—	—	—	—	57	—	100	—	5	4	—	—
	» 30 » 34 »	—	—	3	—	—	—	44	—	69	—	6	3	—	—
	» 35 » 39 »	—	—	2	—	1	—	38	—	61	—	6	2	—	—
	» 40 » 44 »	—	—	—	—	—	—	46	—	55	—	5	—	—	—
	» 45 » 49 »	2	—	2	—	—	—	48	—	49	—	3	—	—	—
	» 50 » 54 »	—	—	1	—	3	—	56	—	50	—	4	—	—	—
	» 55 » 59 »	1	—	2	—	—	—	38	—	42	—	2	—	—	—
	» 60 » 64 »	3	—	1	—	1	—	27	—	38	—	6	—	—	—
	» 65 » 69 »	1	—	—	—	—	—	25	—	18	—	—	—	—	—
	» 70 » 74 »	—	—	—	—	1	—	20	—	16	—	1	—	—	—
	» 75 » 79 »	—	—	—	—	—	—	9	—	12	—	1	—	—	—
	» 80 e più	—	—	1	—	—	—	4	—	7	—	—	—	—	—

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL VESTIARIO	ADDETTI ALL'ARREDAMENTO	INDUSTRIE CHIMICHE		ADDETTI AI LABORATORI E MANIFATTURA TABACCHI		ADDETTI ALLE INDUSTRIE POLI-GRAFICHE		ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA CARTA		OPERAI NON SPECIFICATI		CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ		
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F			
262	119	27	2	22	3	18	18	63	2	24	2	618	54	Polmoniti
														Da 15 a 19 anni
18	11	—	—	—	—	3	3	2	—	—	—	26	7	» 20 » 24 »
24	16	—	—	—	—	3	3	5	1	—	—	38	4	» 25 » 29 »
18	9	3	1	3	2	3	3	2	—	—	—	36	9	» 30 » 34 »
14	7	3	—	2	1	2	2	2	—	—	—	51	8	» 35 » 39 »
7	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	47	6	» 40 » 44 »
13	7	1	—	3	—	3	3	7	—	—	—	53	3	» 45 » 49 »
15	7	4	—	2	—	1	1	3	—	—	—	58	2	» 50 » 54 »
18	7	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—	45	3	» 55 » 59 »
22	9	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	43	2	» 60 » 64 »
23	8	3	—	—	—	1	1	1	—	—	—	52	4	» 65 » 69 »
27	11	3	—	—	—	—	—	12	—	—	—	45	3	» 70 » 74 »
25	8	2	—	—	—	—	—	8	—	—	—	55	—	» 75 » 79 »
25	13	3	—	—	—	—	—	8	—	—	—	37	1	» 80 e più »
13	5	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	32	2	
369	164	38	2	29	4	21	20	82	2	34	4	815	64	Malattie dell'apparato respir.
														Da 15 a 19 anni
21	13	—	—	—	—	3	3	2	1	—	—	35	10	» 20 » 24 »
32	21	—	—	—	—	4	4	5	—	—	—	42	5	» 25 » 29 »
26	14	3	1	4	2	3	3	3	—	—	—	47	9	» 30 » 34 »
18	9	3	—	2	1	3	3	2	—	—	—	64	9	» 35 » 39 »
12	3	1	—	1	—	1	1	8	—	—	—	59	8	» 40 » 44 »
18	8	4	—	4	—	3	3	9	—	—	—	66	3	» 45 » 49 »
17	8	4	—	3	—	1	1	5	—	—	—	68	2	» 50 » 54 »
20	8	2	—	2	—	—	—	6	—	—	—	65	3	» 55 » 59 »
29	12	2	—	2	—	1	1	2	—	—	—	55	2	» 60 » 64 »
30	11	6	—	2	—	1	1	12	—	—	—	65	4	» 65 » 69 »
39	16	4	—											

Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1937, per gruppi di età da 15 anni in poi,

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	COCCHIERI, CARRETTIERI, ECC.		FERROVIARI, TRAMVIARI, CONDUTTORI AUTOMOBILI, ADDETTI AI TRASP. AEREI		MARINAI, BARCAIUOLI, PESCATORI, ECC.		ADDETTI ALLA CURA DELLA PERSONA		ADDETTI ALLA ACCONCIATURA DELLA PERSONA		ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI		GARZONI E CAMERIERI ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
		dal 107 al 109	Polmoniti	285		206		156	1	37	16	107		399	223
	Da 15 a 19 anni	6	—	3	—	4	—	—	—	9	—	4	3	19	—
	» 20 » 24 »	8	—	11	—	6	—	1	—	7	—	10	8	6	—
	» 25 » 29 »	6	—	19	—	7	—	—	—	3	—	15	8	6	—
	» 30 » 34 »	13	—	23	—	7	—	1	1	7	—	18	6	11	1
	» 35 » 39 »	16	—	21	—	11	—	4	2	8	—	11	6	9	—
	» 40 » 44 »	20	—	18	—	10	—	3	2	7	—	25	10	8	—
	» 45 » 49 »	25	—	45	—	9	—	2	1	7	—	26	19	18	1
	» 50 » 54 »	27	—	31	—	6	—	5	4	8	—	32	18	9	—
	» 55 » 59 »	22	—	14	—	16	—	10	3	10	—	39	19	15	—
	» 60 » 64 »	31	—	4	—	14	—	6	2	7	—	45	23	16	1
	» 65 » 69 »	24	—	6	—	17	—	3	1	11	—	52	35	25	1
	» 70 » 74 »	40	—	1	—	21	—	1	—	5	—	56	28	20	—
	» 75 » 79 »	29	—	4	—	12	—	—	—	12	—	32	19	13	—
	» 80 e più	18	—	6	—	16	—	1	—	6	—	34	21	9	—
dal 104 al 114	Malattie dell'apparato respir.	411	1	281		214	1	48	19	145		542	292	284	7
	Da 15 a 19 anni	6	—	4	—	5	—	—	—	12	—	7	5	29	—
	» 20 » 24 »	9	—	12	—	6	—	2	1	10	—	14	12	7	1
	» 25 » 29 »	7	—	21	—	10	—	1	1	8	—	18	10	7	—
	» 30 » 34 »	16	—	28	—	8	—	1	1	5	—	26	11	12	1
	» 35 » 39 »	23	—	34	—	14	—	5	3	11	—	13	6	12	—
	» 40 » 44 »	24	1	24	—	13	—	3	3	10	—	31	11	10	—
	» 45 » 49 »	30	—	59	—	11	—	4	1	7	—	33	22	27	—
	» 50 » 54 »	32	—	42	—	7	—	5	4	13	—	39	20	17	—
	» 55 » 59 »	33	—	23	—	27	—	11	3	13	—	55	26	20	—
	» 60 » 64 »	47	—	6	—	20	—	7	2	12	—	59	32	19	1
	» 65 » 69 »	45	—	11	—	23	—	3	1	13	—	70	42	34	1
	» 70 » 74 »	57	—	4	—	28	—	3	1	7	—	75	35	31	1
	» 75 » 79 »	54	—	5	—	16	—	2	—	15	—	58	33	22	—
	» 80 e più	28	—	8	—	26	—	1	—	9	—	44	27	17	—
dal 130 al 132	Nefriti	69		73		49		11	2	31	1	125	65	51	2
	Da 15 a 19 anni	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	1	5	1
	» 20 » 24 »	—	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	2	2	—
	» 25 » 29 »	3	—	3	—	3	—	—	—	7	—	7	4	4	—
	» 30 » 34 »	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	3	1	—
	» 35 » 39 »	6	—	10	—	4	—	—	—	7	—	7	5	2	—
	» 40 » 44 »	4	—	4	—	1	—	1	1	4	—	4	3	1	—
	» 45 » 49 »	1	—	13	—	5	—	—	—	11	—	6	3	3	—
	» 50 » 54 »	8	—	14	—	—	—	2	—	8	—	8	4	5	—
	» 55 » 59 »	6	—	4	—	5	—	1	—	14	—	7	7	6	—
	» 60 » 64 »	11	—	7	—	7	—	2	—	17	—	10	5	5	—
	» 65 » 69 »	11	—	5	—	3	—	2	—	11	—	11	7	6	—
	» 70 » 74 »	6	—	5	—	6	—	1	—	18	—	10	8	9	1
	» 75 » 79 »	6	—	6	—	6	—	—	—	10	—	4	4	4	—
	» 80 e più	5	—	2	—	4	—	—	—	10	—	10	1	1	—
dal 176 al 194	Morti accidentali	201	1	283	1	82		10	2	28	1	95	42	95	2
	Da 15 a 19 anni	13	—	4	—	8	—	—	—	5	—	10	6	45	1
	» 20 » 24 »	6	—	29	—	14	—	—	—	7	—	15	8	7	—
	» 25 » 29 »	21	—	44	—	9	—	—	—	11	—	11	4	5	—
	» 30 » 34 »	26	—	30	—	4	—	—	—	7	—	7	4	5	—
	» 35 » 39 »	16	—	44	—	6	—	—	—	7	—	7	3	3	—
	» 40 » 44 »	13	—	41	—	7	—	—	—	3	—	3	3	9	—
	» 45 » 49 »	22	—	33	—	6	—	—	—	7	—	7	1	8	—
	» 50 » 54 »	16	—	20	—	5	—	—	—	5	—	5	2	2	—
	» 55 » 59 »	25	—	10	—	6	—	—	—	2	—	2	2	5	—
	» 60 » 64 »	19	—	2	—	4	—	—	—	6	—	6	4	3	—
	» 65 » 69 »	11	—	3	—	4	—	—	—	10	—	10	2	3	—
	» 70 » 74 »	8	—	3	—	3	—	—	—	7	—	7	4	4	—
	» 75 » 79 »	2	—	—	—	3	—	—	—	2	—	2	1	1	—
	» 80 e più	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	FACCHINI, SPAZZINI, CANTONIERI		VENDITORI AMBULANTI, SALTIMBANCHI, VENTURIERI		PERSONALE SUBALTERNO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI		ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA (escl. gli Uffic.)		GUARDIE DI FINANZA E MILIZIA		ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI		CULTO CATTOLICO E ALTRI CULTI		CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	
		dal 107 al 109	Polmoniti	338	21	215	18	108	15	92		8		41		
	Da 15 a 19 anni	1	—	2	—	1	—	8	—	—	—	—	—	2	—	Da 15 a 19 anni
	» 20 » 24 »	7	—	5	—	1	—	54	—	—	—	—	—	8	—	» 20 » 24 »
	» 25 » 29 »	7	—	6	—	2	—	5	—	1	—	—	—	8	—	» 25 » 29 »
	» 30 » 34 »	8	—	14	—	5	—	6	—	2	—	—	—	12	—	» 30 » 34 »
	» 35 » 39 »	21	—	9	—	4	—	8	—	2	—	—	—	12	—	» 35 » 39 »
	» 40 » 44 »	30	—	15	—	10	—	7	—	—	—	—	—	10	—	» 40 » 44 »
	» 45 » 49 »	34	—	12	—	3	—	3	—	2	—	—	—	7	—	» 45 » 49 »
	» 50 » 54 »	39	—	23	—	1	—	10	—	—	—	—	—	13	—	» 50 » 54 »
	» 55 » 59 »	49	—	22	—	2	—	9	—	—	—	—	—	23	—	» 55 » 59 »
	» 60 » 64 »	37	—	23	—	2	—	12	—	—	—	—	—	41	—	» 60 » 64 »
	» 65 » 69 »	38	—	28	—	3	—	19	—	—	—	—	—	48	—	» 65 » 69 »
	» 70 » 74 »	23	—	25	—	1	—	9	—	—	—	—	—	63	—	» 70 » 74 »
	» 75 » 79 »	30	—	19	—	7	—	7	—	—	—	—	—	70	—	» 75 » 79 »
	» 80 e più	14	—	12	—	8	—	—	—	—	—	—	—	64	—	» 80 e più
dal 104 al 114	Malattie dell'apparato respir.	453	27	322	26	156	20	113		11		56		563	315	Malattie dell'apparato respir.
	Da 15 a 19 anni	4	—	4	—	1	—	9	—	—	—	—	—	2	—	Da 15 a 19 anni
	» 20 » 24 »	7	—	9	—	1	—	8	—	—	—	—	—	13	—	» 20 » 24 »
	» 25 » 29 »	10	—	7	—	2	—	6	—	2	—	—	—	17	—	» 25 » 29 »
	» 30 » 34 »	9	—	16	—	6	—	7	—	—	—	—	—	14	—	» 30 » 34 »
	» 35 » 39 »	29	—	14	—	9	—	9	—	2	—	—	—	14	—	» 35 » 39 »
	» 40 » 44 »	34	—	21	—	3	—	4	—	—	—	—	—	14	—	» 40 » 44 »
	» 45 » 49 »	47	—	21	—	3	—	16	—	—	—	—</				

Segue : TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1937, per gruppi di età da 15 anni in poi,

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	INSEGNANTI		PROFESSIONI LIBERALI		ARTI SANITARIE		ARTI BELLE		UFFICIALI DI TERRA, DI MARE E D'ARIA		IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI		PENSIONATI E VETERANI		PROPRIETARI E BENESTANTI		STUDENTI		ATTENDENTI A CASA		DISOCCUPATI, INVALIDI, RICOVERATI, ECC.		PROFESSIONI IGNOTE		IN COMPLESSO			CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	M	F	MF		
																														M
dal 23 al 32	Tubercolosi	123	77	125	5	67	16	139	11	24		1.029	212	612	93	283	82	572	137	12.126	12.126	947	302	29	12	16.012	16.144	32.156	Tubercolosi	
	Da 15 a 19 anni	1	—	—	—	3	2	24	3	1	—	52	15	5	3	5	3	335	107	1.294	1.294	113	36	15	5	1.169	1.883	3.052	Da 15 a 19 anni	
	» 20 » 24 »	28	13	16	—	10	2	24	2	2	—	213	76	13	—	12	1	194	25	2.046	2.046	122	41	4	1	2.307	2.960	5.267	» 20 » 24 »	
	» 25 » 29 »	30	21	18	4	13	2	11	2	2	—	201	56	13	—	27	7	40	4	2.010	2.010	107	38	4	2	2.216	2.763	4.979	» 25 » 29 »	
	» 30 » 34 »	20	17	21	1	9	1	17	3	2	—	141	29	13	2	21	3	2	—	1.516	1.516	85	21	4	3	1.865	1.966	3.831	» 30 » 34 »	
	» 35 » 39 »	8	3	9	—	7	—	16	—	2	—	119	18	57	5	30	6	1	—	1.107	1.107	79	15	—	—	1.671	1.421	3.092	» 35 » 39 »	
	» 40 » 44 »	15	9	10	—	7	3	11	—	2	—	108	11	31	6	27	10	—	—	999	999	57	16	1	—	1.492	1.226	2.718	» 40 » 44 »	
	» 45 » 49 »	4	3	14	—	6	—	11	—	2	—	67	3	73	9	22	8	—	—	806	806	53	15	—	—	1.369	986	2.355	» 45 » 49 »	
	» 50 » 54 »	4	4	9	—	8	2	13	—	2	—	51	2	77	13	24	5	—	—	606	606	64	18	—	—	1.147	754	1.901	» 50 » 54 »	
	» 55 » 59 »	4	2	6	—	8	—	9	—	1	—	35	1	79	9	26	5	—	—	530	530	62	19	—	—	1.005	643	1.648	» 55 » 59 »	
	» 60 » 64 »	5	3	4	—	3	2	3	—	—	—	25	1	65	11	23	3	—	—	462	462	51	20	1	1	748	559	1.307	» 60 » 64 »	
	» 65 » 69 »	1	1	2	—	4	—	3	—	—	—	9	—	59	12	27	11	—	—	376	376	53	15	—	—	528	480	1.008	» 65 » 69 »	
	» 70 » 74 »	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	7	—	47	12	22	8	—	—	232	232	49	22	—	—	312	300	612	» 70 » 74 »	
	» 75 » 79 »	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	27	7	11	6	—	—	107	107	29	12	—	—	139	143	282	» 75 » 79 »	
	» 80 e più »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	6	3	—	—	35	35	23	14	—	—	44	60	104	» 80 e più »	
dal 45 al 53	Canceri ed altri tum. maligni	146	107	161	3	127	33	79	13	26		599	65	2.234	531	1.323	457	22	6	15.079	15.079	1.528	573	8	1	17.469	19.194	36.663	Canceri ed altri tum. maligni	
	Da 15 a 19 anni	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	14	6	34	34	2	2	—	—	66	56	122	Da 15 a 19 anni	
	» 20 » 24 »	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	7	—	52	52	6	2	—	—	72	74	146	» 20 » 24 »
	» 25 » 29 »	3	2	3	—	1	—	1	—	—	—	15	4	—	—	6	—	—	—	133	133	7	7	—	—	155	181	336	» 25 » 29 »	
	» 30 » 34 »	5	4	4	—	1	—	—	—	—	—	20	4	—	—	11	3	—	—	235	235	3	2	—	—	236	292	528	» 30 » 34 »	
	» 35 » 39 »	8	8	6	—	4	3	3	2	1	—	30	7	4	4	24	4	—	—	494	494	8	3	1	—	335	610	945	» 35 » 39 »	
	» 40 » 44 »	16	13	8	—	6	3	3	3	3	—	39	11	10	4	38	17	—	—	754	754	7	4	2	—	512	958	1.470	» 40 » 44 »	
	» 45 » 49 »	14	9	9	—	8	5	5	1	3	—	70	12	54	27	38	19	—	—	1.217	1.217	25	12	—	—	946	1.502	2.448	» 45 » 49 »	
	» 50 » 54 »	12	10	16	—	9	2	7	1	2	—	85	8	104	32	66	37	—	—	1.529	1.529	43	26	—	—	1.382	1.935	3.317	» 50 » 54 »	
	» 55 » 59 »	32	26	23	—	19	4	16	3	5	—	88	7	169	41	109	39	—	—	1.829	1.829	74	23	—	—	2.070	2.269	4.339	» 55 » 59 »	
	» 60 » 64 »	22	18	27	—	22	5	12	1	2	—	101	4	242	52	178	63	—	—	2.085	2.085	125	49	—	—	2.686	2.618	5.304	» 60 » 64 »	
	» 65 » 69 »	14	11	21	—	24	3	12	1	4	—	64	1	461	82	253	76	—	—	2.184	2.184	218	71	1	1	3.041	2.732	5.773	» 65 » 69 »	
	» 70 » 74 »	11	6	32	—	16	4	12	2	3	—	46	1	527	124	285	85	—	—	2.169	2.169	366	113	—	—	2.970	2.766	5.736	» 70 » 74 »	
	» 75 » 79 »	4	3	9	—	12	3	6	—	3	—	25	3	437	98	205	62	—	—	1.480	1.480	336	130	—	—	2.008	1.962	3.970	» 75 » 79 »	
	» 80 e più »	3	2	2	—	5	1	1	—	—	—	12	2	226	67	145	52	—	—	884	884	308	137	—	—	990	1.239	2.229	» 80 e più »	
59	Diabete mellito	33	14	38		42	9	13	2	3		83	4	352	93	333	101	1	1	1.759	1.759	150	51			1.970	2.222	4.192	Diabete mellito	
	Da 15 a 19 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	9	4	1	—	—	20	13	33	Da 15 a 19 anni	
	» 20 » 24 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	10	10	3	—	—	22	14	36	» 20 » 24 »		
	» 25 » 29 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	15	15	—	—	—	28	23	51	» 25 » 29 »		
	» 30 » 34 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	17	17	2	—	—	42	24	66	» 30 » 34 »		
	» 35 » 39 »	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	3	2	—	—	31	31	4	—	—	42	32	74	» 35 » 39 »		
	» 40 » 44 »	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	—	—	—	47	47	—	—	—	30	55	85	» 40 » 44 »		
	» 45 » 49 »	3	2	—	—	—	—	2	—	—	—	9	—	10	2	13	4	—	—	70	70	2	—	—	74	86	160	» 45 » 49 »		
	» 50 » 54 »	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	16	—	33	10	30	8	—	—	135	135	10	2	—	—	133	172	305	» 50 » 54 »	
	» 55 » 59 »	6	2	3	—	—	—	1	—	—	—	17	1	43	10	49	13	—	—	208	208	5	1	—	—	235	255	490	» 55 » 59 »	
	» 60 » 64 »	9	2	10	—	12	3	1	—	—	—	7	—	76	15	80	21	—	—	302	302	18	8	—	—	332	371	703	» 60 » 64 »	
	» 65 » 69 »	6	3	6	—	7	2	2	—	—	—	7	—	87	24	66	24	—	—	349	349	20	8	—	—	377	425	802	» 65 » 69 »	
	» 70 » 74 »	1	1	6	—	7	3	3	—	—	—	9	—	70	22	45	11	—	—	306	306	25	10	—	—	327	383	710	» 70 » 74 »	
	» 75 » 79 »	3	1	4	—	4	1	1	—	—	—	7	—	70	22	66	11	—	—	177	177	34	13	—	—	210	240	450	» 75 » 79 »	
	» 80 e più »	1	1	2	—	2	—	—	—																					

Segue: TAVOLA 12. — Morti, durante l'anno 1937, per gruppi di età da 15 anni in poi,

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ	INSEGNANTI		PROFESSIONI LIBERALI		ARTI SANITARIE		ARTI BELLE		UFFICIALI DI TERRA, DI MARE E D'ARIA		IMPIEGATI PUBBLICI E PRIVATI		PENSIONATI E VETERANI	
		Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
dal 107 al 109	Polmoniti	128	78	182	2	147	13	101	6	31		601	35	2.498	588
	Da 15 a 19 anni	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—
	» 20 » 24 »	2	1	4	—	1	—	1	—	—	—	19	5	—	—
	» 25 » 29 »	6	5	2	—	6	1	6	—	3	—	20	2	2	1
	» 30 » 34 »	9	9	8	1	4	—	6	—	—	—	43	6	2	1
	» 35 » 39 »	9	6	6	—	9	—	1	—	—	—	50	3	8	1
	» 40 » 44 »	13	11	9	—	5	—	5	1	7	—	56	2	20	2
	» 45 » 49 »	14	8	9	—	3	—	3	—	5	—	45	1	29	8
	» 50 » 54 »	11	4	14	—	6	—	6	—	3	—	56	4	69	15
	» 55 » 59 »	7	5	18	—	11	—	12	—	1	—	83	5	90	16
	» 60 » 64 »	14	5	20	—	25	5	9	—	2	—	68	2	177	30
	» 65 » 69 »	9	3	24	1	18	1	18	1	4	—	52	4	382	75
	» 70 » 74 »	10	6	27	—	25	4	11	—	3	—	46	—	513	120
	» 75 » 79 »	11	5	20	—	10	1	13	—	1	—	26	—	624	155
	» 80 e più	11	6	21	—	24	1	10	2	—	—	30	—	582	164
dal 104 al 114	Malattie dell'apparato respir.	169	89	288	2	191	19	141	8	43		821	48	3.698	862
	Da 15 a 19 anni	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—
	» 20 » 24 »	4	1	7	—	1	—	3	—	2	—	26	6	—	—
	» 25 » 29 »	8	6	4	—	7	1	8	—	3	—	29	2	3	1
	» 30 » 34 »	10	10	13	1	6	—	6	—	—	—	55	9	2	1
	» 35 » 39 »	12	8	9	—	12	—	6	—	1	—	72	3	13	1
	» 40 » 44 »	15	12	12	—	6	—	9	1	10	—	80	5	28	3
	» 45 » 49 »	17	10	12	—	3	—	5	—	10	—	65	4	44	11
	» 50 » 54 »	18	5	22	—	7	—	10	—	4	—	80	4	99	17
	» 55 » 59 »	10	6	25	—	17	—	15	—	1	—	107	6	151	22
	» 60 » 64 »	23	6	31	—	29	6	13	—	3	—	96	3	250	37
	» 65 » 69 »	12	4	36	1	22	2	19	1	4	—	68	4	552	108
	» 70 » 74 »	11	6	32	—	37	6	15	1	3	—	64	—	760	167
	» 75 » 79 »	14	6	29	—	13	1	18	—	2	—	34	1	877	236
	» 80 e più	12	7	34	—	31	2	14	—	—	—	38	—	917	258
dal 130 al 132	Neftiti	62	34	90		65	9	35	2	9		277	18	917	199
	Da 15 a 19 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—
	» 20 » 24 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—
	» 25 » 29 »	6	3	2	—	—	—	2	—	—	—	10	—	3	—
	» 30 » 34 »	3	3	3	—	1	—	1	—	—	—	20	2	3	—
	» 35 » 39 »	2	2	7	—	—	—	1	—	—	—	20	3	10	2
	» 40 » 44 »	4	4	3	—	1	—	1	—	4	—	19	3	19	6
	» 45 » 49 »	6	3	4	—	1	—	2	—	2	—	31	1	30	10
	» 50 » 54 »	3	2	8	—	5	—	5	—	—	—	32	2	48	9
	» 55 » 59 »	10	6	7	—	7	—	2	—	2	—	44	—	80	13
	» 60 » 64 »	7	4	11	—	16	3	5	—	1	—	29	1	144	33
	» 65 » 69 »	6	2	11	—	8	—	4	—	—	—	26	2	211	42
	» 70 » 74 »	5	2	13	—	13	—	8	—	—	—	16	—	203	40
	» 75 » 79 »	7	2	10	—	7	—	2	—	—	—	12	—	166	43
	» 80 e più	2	1	11	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
dal 176 al 194	Morti accidentali	23	9	53		24	1	22	1	61		177	9	236	37
	Da 15 a 19 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	—	—
	» 20 » 24 »	7	3	5	—	—	—	4	—	—	—	33	2	—	—
	» 25 » 29 »	3	1	10	—	—	—	4	—	18	—	19	—	4	—
	» 30 » 34 »	3	—	5	—	—	—	—	—	6	—	18	—	1	—
	» 35 » 39 »	2	1	5	—	—	—	4	—	6	—	18	—	1	—
	» 40 » 44 »	1	—	6	—	—	—	—	—	5	—	14	—	10	—
	» 45 » 49 »	1	1	8	—	—	—	1	—	3	—	19	—	6	—
	» 50 » 54 »	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	10	—	7	—
	» 55 » 59 »	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	7	—	24	—
	» 60 » 64 »	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	22	—
	» 65 » 69 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	32	—
	» 70 » 74 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	—
	» 75 » 79 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	—
	» 80 e più	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—

classificati secondo alcune cause di morte, la professione o condizione ed il sesso.

PROPRIETARI E BENESTANTI	STUDENTI	ATTENDENTI A CASA	DISOCCUPATI, INVALIDI, RICOVERATI, ECC.	PROFESSIONI IGNOTE		IN COMPLESSO			CAUSE DI MORTE — GRUPPI DI ETÀ				
				Tot.	di cui F	M	F	MF					
1.618	554	124	19	18.674	18.674	3.140	1.198	17	5	25.972	22.443	48.415	Polmoniti
—	—	92	19	300	300	60	21	11	5	646	477	1.123	Da 15 a 19 anni
6	2	23	—	335	335	41	11	2	—	762	501	1.263	» 20 » 24 »
8	3	7	—	464	464	43	14	1	—	755	662	1.417	» 25 » 29 »
13	3	2	—	540	540	29	11	—	—	866	745	1.611	» 30 » 34 »
15	5	—	—	551	551	28	13	—	—	980	726	1.706	» 35 » 39 »
21	9	—	—	560	560	36	14	—	—	1.146	764	1.910	» 40 » 44 »
35	8	—	—	601	601	51	15	—	—	1.282	803	2.085	» 45 » 49 »
49	16	—	—	807	807	55	13	—	—	1.527	1.049	2.576	» 50 » 54 »
67	21	—	—	1.085	1.085	83	24	1	—	1.915	1.392	3.307	» 55 » 59 »
136	44	—	—	1.585	1.585	166	48	—	—	2.573	2.048	4.621	» 60 » 64 »
167	55	—	—	2.066	2.066	271	79	—	—	3.088	2.684	5.772	» 65 » 69 »
277	105	—	—	2.728	2.728	530	194	—	—	3.653	3.585	7.238	» 70 » 74 »
319	108	—	—	2.472	2.472	693	275	1	—	3.503	3.375	6.878	» 75 » 79 »
505	175	—	—	2.580	2.580	1.054	464	—	—	3.276	3.632	6.908	» 80 e più
2.314	749	162	27	23.980	23.980	5.151	1.952	25	7	37.230	32.517	69.747	Malattie dell'apparato respir.
—	—	110	24	376	376	80	24	14	5	776	589	1.365	Da 15 a 19 anni
7	2	39	2	446	446	62	21	2	—	940	665	1.605	» 20 » 24 »
8	3	10	1	599	599	60	17	1	—	954	835	1.789	» 25 » 29 »
17	5	3	—	673	673	42	14	—	—	1.078	932	2.010	» 30 » 34 »
24	5	—	—	664	664	38	17	—	—	1.299	866	2.165	» 35 » 39 »
33	10	—	—	704	704	46	18	—	—	1.472	960	2.432	» 40 » 44 »
49	10	—	—	793	793	79	19	—	—	1.758	1.052	2.810	» 45 » 49 »
63	19	—	—	1.064	1.064	86	18	—	—	2.096	1.363	3.459	» 50 » 54 »
100	34	—	—	1.459	1.459	124	36	1	—	2.693	1.889	4.582	» 55 » 59 »

TAVOLA 13. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, con distin-

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA	
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
	COMPLESSO	50.039	1.345	18.309	465	85.224	1.977
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	270	9	108	1	877	13
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo, vaioloide, ecc.	—	—	—	—	—	—
7	Morbillo	25	—	32	—	521	—
8	Scarlattina	43	—	15	—	33	—
9	Tosse convulsa	151	—	56	1	316	—
10	Difterite	145	8	99	7	623	19
11	Influenza	1.254	3	237	—	1.634	2
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a) . . .	2.449	3	1.157	1	4.102	6
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	632	22	302	9	1.371	27
34	Sifilide	105	1	64	—	246	1
38	Malaria	9	—	8	—	18	—
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22	Altre mal. infettive e parassitarie . . .	578	7	240	4	1.238	20
33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Cancro ed altri tumori maligni	4.072	293	1.616	78	6.788	356
dal 45 al 53	Tumori non maligni (b)	247	92	103	33	331	96
54, 55	Reumatismo cronico e gotta	149	—	76	1	188	—
57, 58	Diabete mellito	445	9	273	6	491	8
59	Alcoolismo acuto e cronico	69	—	44	—	83	—
75	Altre mal. gener. e avvel. cronici	685	13	230	3	1.074	21
56, dal 60 al 74, 76, 77	Atassia locom. e paral. progr. alien. . .	136	—	60	—	184	1
80, 83	Emorragia, embolia e tromb. cereb. . .	5.082	4	1.836	—	7.821	2
82	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c) . . .	962	29	392	13	1.803	46
78, 79, 81, dall'84 all'89	Malattie del cuore	8.067	1	2.930	1	10.916	2
dal 90 al 95	Altre mal. dell'app. circolatorio	1.551	25	512	5	2.151	50
dal 96 al 103	Bronchiti	1.534	—	371	—	2.152	1
106	Polmoniti	6.666	1	2.279	2	12.308	3
107, 108, 109, 104, 105, dal 110 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc. . . .	923	54	414	18	1.624	167
119, 120	Enteriti	1.726	2	512	—	8.053	3
121	Appendicite	326	136	131	50	496	254
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari	1.055	79	457	15	1.292	93
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente	1.199	295	545	121	1.863	398
130, 131, 132	Nefriti	1.270	1	564	—	2.086	2
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urinario . . .	612	86	269	31	773	99
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali	73	11	31	2	136	12
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. gravid. parto e puerp.	69	17	44	17	218	70
dal 151 al 156	Malattie della pelle, ecc. (d)	204	46	124	23	514	87
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (e)	1.521	13	609	4	4.131	25
162	Senilità	3.214	—	712	—	3.275	—
dal 163 al 171	Suicidio	411	4	169	2	451	3
dal 172 al 175	Omicidio	59	5	17	1	51	3
dal 176 al 198, 199, 200	Morte violenta e accidentale (f)	1.419	76	514	16	2.265	87
	Morte improv. e cause non specificate o mal definite	632	—	157	—	727	—

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, delle ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti e nel Regno.

VENEZIA TRIDENTINA	VENETO	VENEZIA GIULIA E ZARA	EMILIA	TOSCANA	MARCHE	NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO						
							TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
9.878	244	51.483	1.442	13.646	387	41.020	1.305	36.735	923	16.653	377	
51	—	530	6	53	—	257	3	211	1	156	1	1, 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	1	87	—	44	—	91	1	19	—	52	—	7
9	—	11	—	4	—	13	—	7	—	4	—	8
74	1	353	—	65	—	251	—	117	—	40	—	9
43	2	306	40	56	—	176	13	97	8	91	6	10
205	—	891	—	116	1	809	—	820	—	365	—	11
782	2	2.845	7	1.200	1	2.002	8	2.249	1	617	—	23
188	4	1.216	26	287	5	910	24	740	11	263	2	dal 24 al 32
29	—	112	—	69	—	80	—	69	1	21	—	34
1	—	25	1	2	—	9	—	12	—	1	—	38
106	—	909	15	189	5	688	13	610	22	226	—	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
842	39	3.779	242	1.051	76	4.030	225	4.059	169	1.019	43	dal 45 al 53
23	4	207	63	54	20	143	63	148	47	58	17	54, 55
29	—	144	—	44	—	83	—	97	—	42	—	57, 58
52	1	347	5	115	5	315	6	303	4	105	—	59
13	—	81	—	24	—	50	—	28	—	38	—	75
172	6	864	13	164	3	579	5	429	7	218	—	56, dal 60 al 74, 76, 77
12	—	77	—	37	—	47	—	70	—	24	—	80, 83
740	—	4.682	—	813	—	4.809	—	4.136	1	2.462	—	82
175	2	1.107	33	317	16	831	36	714	23	454	16	78, 79, 81, dall'84 all'89
1.480	—	6.313	—	1.390	—	4.728	1	4.350	1	1.691	—	dal 90 al 95
235	5	1.785	30	316	8	1.400	29	1.179	15	460	6	dal 96 al 103
197	—	1.244	—	323	—	1.171	—	1.083	—	565	—	106
1.075	1	6.358	1	1.603	—	5.360	1	4.628	2	1.992	—	107, 108, 109
195	10	1.091	89	280	12	739	81	664	46	253	19	104, 105, dal 110 al 114
559	1	2.856	4	774	1	1.315	3	1.195	7	991	1	119, 120
77	31	277	170	67	31	289	191	221	93	105	75	121
151	10	707	58	182	20	608	50	504	43	235	11	dal 124 al 127
225	77	1.213	356	322	96	964	330	985	237	328	94	dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
220	1	1.266	1	302	2	886	3	909	—	476	—	130, 131, 132
108	8	556	75	125	32	461	75	462	39	187	25	dal 133 al 139
16	1	89	7	36	7	65	7	63	8	24	5	140, 145
37	12	135	49	46	10	129	43	101	28	47	17	dal 141 al 144, dal 146 al 150
62	10	327	80	90	15	253	45	229	55	112	20	dal 151 al 156
510	—	3.239	11	702	2	2.384	8	1.666	9	1.029	3	dal 157 al 161
687	—	3.181	1	1.674	—	2.209	—	2.071	—	1.281	—	162
63	—	335	5	163	3	415	2	238	3	84	—	dal 163 al 171
10	3	31	2	26	3	42	4	27	2	8	1	dal 172 al 175
360	13	1.462	52	469	13	1.186	35	963	40	395	15	dal 176 al 198
64	—	445	—	52	—	243	—	262	—	134	—	199, 200

e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti).

Segue: TAVOLA 13. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo le cause di morte, con distin-

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI E MOLISE	
		TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.
	COMPLESSO	9.646	280	33.605	901	25.158	188
1, 2	Febbre tifoidea (tifo add.) e parat.	80	2	282	11	287	—
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—
6	Vaiolo, vaioloide, ecc.	—	—	1	—	—	—
7	Morbillo	13	—	45	—	83	—
8	Scarlattina	4	—	37	—	3	—
9	Tosse convulsa	66	—	228	—	175	—
10	Difterite	53	13	195	1	178	2
11	Influenza	290	—	707	—	384	—
23	Tubercolosi dell'app. respirat. (a)	390	2	1.712	2	662	—
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	176	3	568	16	303	3
34	Sifilide	17	—	215	1	75	—
38	Malaria	2	—	39	1	23	—
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre mal. infettive e parassitarie	127	2	540	10	267	1
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni	563	33	2.196	137	776	17
54, 55	Tumori non maligni (b)	26	11	137	39	32	4
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	23	—	65	—	100	1
59	Diabete mellito	81	1	363	10	114	1
75	Alcoolismo acuto e cronico	11	—	34	—	19	—
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre mal. gener. e avvel. cronici	118	2	380	8	344	2
80, 83	Atassia locom. e paral. progr. alien.	10	—	76	—	20	—
82	Emorragia, embolia e tromb. cerebr.	1.435	1	3.386	1	2.717	—
78, 79, 81, dall'84 all'89	Altre mal. del sist. nervoso, ecc. (c)	214	4	908	29	813	2
dal 90 al 95	Malattie del cuore	1.071	—	3.472	—	2.916	—
dal 96 al 103	Altre mal. dell'app. circolatorio	247	4	988	7	607	—
106	Bronchiti	319	—	826	—	814	—
107, 108, 109	Polmoniti	1.178	—	4.537	5	2.754	—
104, 105, dal 110 al 114	Altre mal. appar. resp., escl. la tbc.	127	12	589	60	399	10
119, 120	Enteriti	524	—	2.808	3	3.835	—
121	Appendicite	67	41	165	88	83	32
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari	150	17	477	50	274	7
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	Altre mal. dell'apparato digerente	192	62	781	247	511	46
130, 131, 132	Nefriti	240	1	1.038	1	761	—
dal 133 al 139	Altre mal. dell'app. genito-urinario	111	17	367	54	196	15
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali	24	4	68	6	35	1
dal 141 al 144, dal 146 al 150	Altre mal. della gravid., parto e puerp.	32	7	99	30	74	12
dal 151 al 156	Malattie della pelle, ecc. (d)	69	19	219	43	134	9
dal 157 al 161	Debolezza congenita, ecc. (e)	537	3	1.883	10	1.408	6
162	Senilità	648	—	1.639	—	2.163	—
dal 163 al 171	Suicidio	58	—	164	3	92	1
dal 172 al 175	Omicidio	10	—	43	2	30	3
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (f)	282	19	939	25	486	13
199, 200	Morte improv. e cause non specificate o mal definite	61	—	389	1	211	—

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, delle ossa e della membrana mucosa. (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

zione dei casi in cui la morte sopravvenne dopo atto operatorio, nei Compartimenti, e nel Regno.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAMPANIA		PUGLIE		LUCANIA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO		NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	TOTALE	di cui la morte sopravv. dopo atto oper.	
	59.399	633	44.992	373	9.682	32	28.986	131	64.810	559	16.155	96	615.420	11.658	
1, 2	508	—	436	3	86	—	213	—	617	4	89	—	5.111	54	1, 2
3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6
7	347	—	339	—	77	—	113	—	209	—	39	—	2.137	1	7
8	23	—	10	—	14	—	30	—	5	—	4	—	289	—	8
9	114	—	163	—	22	—	120	—	223	—	206	—	2.740	2	9
10	198	—	97	3	27	—	92	2	194	3	78	—	2.748	127	10
11	1.143	2	1.206	1	153	—	606	—	901	1	389	—	12.110	10	11
dal 24 al 32	1.851	2	1.520	1	143	—	626	—	2.096	—	1.045	—	27.448	36	23
34	658	8	646	4	124	1	296	2	650	7	412	—	9.742	174	dal 24 al 32
38	351	—	125	1	32	—	122	—	156	—	23	—	1.911	5	34
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	64	—	143	—	58	—	191	1	214	—	213	—	1.032	3	38
dal 45 al 53	765	5	576	11	126	—	422	1	1.076	17	286	3	8.969	136	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
54, 55	1.570	77	1.213	22	201	2	650	5	2.033	37	562	10	37.020	1.861	dal 45 al 53
57, 58	111	20	79	14	13	3	39	7	129	28	41	6	1.921	567	54, 55
59	127	—	55	—	20	—	81	—	116	—	48	—	1.487	2	57, 58
75	361	11	167	4	30	—	108	—	497	6	78	1	4.245	78	59
56, dal 60 al 74, 76, 77	35	—	8	—	3	—	13	—	13	—	16	—	582	—	75
80, 83	692	3	588	—	140	—	417	—	868	1	332	2	8294	89	56, dal 60 al 74, 76, 77
82	129	—	46	—	3	—	36	—	91	—	10	—	1.068	1	80, 83
78, 79, 81, dall'84 all'89	4.861	1	3.721	—	718	—	2.091	—	5.516	2	886	—	57.712	12	82
dal 90 al 95	2.368	13	1.311	11	343	—	999	1	1.158	17	273	5	15.142	296	78, 79, 81, dall'84 all'89
dal 96 al 103	6.685	—	3.966	—	875	—	2.879	—	5.659	1	1.193	—	70.581	7	dal 90 al 95
106	1.437	8	706	3	145	2	517	1	1.704	5	230	4	16.170	207	dal 96 al 103
107, 108, 109	1.986	—	1.607	—	527	—	1.225	—	2.041	—	427	—	18.412	1	106
104, 105, dal 110 al 114	10.137	—	7.908	—	1.441	—	4.369	—	10.077	1	2.424	—	87.094	17	107, 108, 109
119, 120	916	38	545	30	97	—	384	6	964	33	210	9	10.414	694	104, 105, dal 110 al 114
121	7.760	2	6.788	—	1.714	—	4.360	—	9.330	2	2.144	—	57.244	29	119, 120
dal 124 al 127	212	58	145	30	22	3	64	9	191	39	43	4	2.981	1.335	121
dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129	693	22	466	14	93	1	302	—	749	21	213	2	8.608	513	dal 124 al 127
130, 131, 132	1.133	168	789	80	215	6	631	44	1.250	140	358	30	13.504	2.827	dal 115 al 118, 122, 123, 128, 129
dal 133 al 139	2.662	2	1.545	—	288	—	1.092	—	2.589	1	494	1	18.688	16	130, 131, 132
140, 145	557	35	314	33	67	1	209	3	809	67	158	3	6.341	698	dal 133 al 139
dal 141 al 144, dal 146 al 150	90	2	64	5	13	—	71	4	120	1	34	2	1.052	85	140, 145
dal 151 al 156	171	47	123	40	34	7	78	12	191	45	45	8	1.673	471	dal 141 al 144, dal 146 al 150
dal 157 al 161	358	48	279	29	26	—	165	16	399	33	81	2	3.645	580	dal 151 al 156
162	2.755	11	2.931	4	718	—	1.584	2	3.157	9	897	—	31.661	120	dal 157 al 161
dal 163 al 171	3.970	—	3.339	1	786	—	2.866	—	6.960	—	1.417	—	42.092	2	162
dal 172 al 175	176	2	103	2	33	—	47	1	221	2	68	—	3.291	33	dal 163 al 171
dal 176 al 198	113	17	45	5	16	1	85	5	104	3	52	2	769	62	dal 172 al 175
199, 200	1.006	31	673	22	187	5	509	9	1.040	33	366	2	14.521	506	dal 176 al 198
	306	—	206	—	52	—	284	—	472	—	271	—	4.968	1	199, 200

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, delle ossa e della membrana mucosa. (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

TAVOLA 14. — Morti, durante l'anno 1937, in età da 15 anni in

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	CELIBI E NUBILI		CONIUGATI	
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F
	COMPLESSO	78.271	37.369	202.881	78.780
1, 2	Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi	1.744	882	1.675	1.007
3	Tifo petecchiale	—	—	2	—
7	Morbillo	27	12	10	5
8	Scarlattina	25	13	12	8
9	Tosse convulsa	2	2	4	3
10	Difterite	47	27	32	20
11	Influenza	1.481	725	4.066	1.606
23	Tubercolosi dell'apparato respiratorio (a)	11.949	6.073	12.419	5.722
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	2.987	1.516	2.348	1.281
34	Sifilide	246	79	688	158
38	Malaria	161	45	395	123
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre malattie infettive e parassitarie	1.429	594	2.699	1.085
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni	4.464	2.574	21.270	9.337
54, 55	Tumori non maligni (b)	392	266	1.075	665
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	222	147	634	297
59	Diabete mellito	552	259	2.411	1.092
75	Alcolismo acuto e cronico	152	18	319	47
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre malattie generali e avvelenamenti cronici	1.488	778	2.793	1.385
80, 83	Atassia locomotrice e paralisi progress. alienati	251	60	684	140
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebrale	5.852	2.879	26.431	9.172
78, 79, 81, dall'84 all'89	Altre malattie del sistema nervoso, ecc. (c)	2.790	1.247	2.955	1.193
dal 90 al 95	Malattie del cuore	9.432	5.260	30.409	13.414
dal 96 al 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio	1.762	835	5.973	1.656
106	Bronchiti	1.517	819	4.908	1.859
107, 108, 109	Polmoniti	8.313	3.743	24.268	8.670
104, 105, dal 110 al 114	Altre malattie dell'apparato respiratorio, esclusa la tbc.	1.508	618	4.899	1.434
119, 120	Enteriti	1.110	586	2.671	1.057
121	Appendicite	890	302	1.157	484
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari	999	369	5.367	1.883
dal 115	Altre malattie dell'apparato digerente	2.195	860	6.060	1.895
al 118, 122, 123, 128, 129	Nefriti	2.671	1.423	7.890	3.646
dal 133 al 139	Altre malattie dell'apparato genito-urinario	772	234	3.391	698
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali	112	112	924	924
dal 141 al 144	Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	90	90	1.572	1.572
dal 146 al 150	Malattie della pelle, ecc. (d)	600	225	1.182	415
dal 151 al 156	Debolezza congenita, ecc. (e)	62	23	10	5
162	Senilità	4.158	2.501	9.600	2.775
dal 163 al 171	Suicidio	1.153	350	1.629	364
dal 172 al 175	Omicidio	251	50	377	117
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (f)	3.610	464	5.566	894
199, 200	Morte improvvis. e cause non spec. o mal definite	805	309	2.106	672

(a) compresi i gangli tracheo-bronchiali. (b) o il cui carattere maligno non è specificato. (c) e degli organi dei sensi. (d) del tessuto cellulare, delle speciali dell'infanzia (esclusi i nati morti). (f) escluso il suicidio e l'omicidio.

poi, classificati secondo le cause di morte, lo stato civile ed il sesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE	VEDOVI		DIVORZIATI		STATO CIVILE IGNOTO		MORTI IN ETÀ DA 15 ANNI IN POI			NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO
		TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	TOTALE	di cui F	M	F	MF	
	COMPLESSO	155.597	99.320	53	25	241	78	221.471	215.572	437.043	
1, 2	Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi	156	112	—	—	1	—	1.575	2.001	3.576	1, 2
3	Tifo petecchiale	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3
7	Morbillo	—	—	—	—	—	—	20	17	37	7
8	Scarlattina	—	—	—	—	1	—	17	21	38	8
9	Tosse convulsa	4	2	—	—	—	—	3	7	10	9
10	Difterite	4	4	—	—	—	—	32	51	83	10
11	Influenza	2.807	1.831	1	—	6	1	4.198	4.163	8.361	11
23	Tubercolosi dell'apparato respiratorio (a)	1.937	1.179	2	1	14	7	13.339	12.982	26.321	23
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi	497	364	1	—	2	1	2.673	3.162	5.835	dal 24 al 32
34	Sifilide	157	76	—	—	1	1	778	314	1.092	34
38	Malaria	88	50	—	—	1	—	427	218	645	38
4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44	Altre malattie infettive e parassitarie	1.242	810	—	—	7	2	2.886	2.491	5.377	4, 5, 12, 13, dal 15 al 22, 33, 35, 36, 37, dal 39 al 44
dal 45 al 53	Cancri ed altri tumori maligni	10.916	7.275	6	4	7	4	17.469	19.194	36.663	dal 45 al 53
54, 55	Tumori non maligni (b)	334	242	—	—	3	1	630	1.174	1.804	54, 55
57, 58	Reumatismo cronico e gotta	613	451	—	—	—	—	574	895	1.469	57, 58
59	Diabete mellito	1.227	870	—	—	2	1	1.970	2.222	4.192	59
75	Alcolismo acuto e cronico	107	26	—	—	1	—	488	91	579	75
56, dal 60 al 74, 76, 77	Altre malattie generali e avvelenamenti cronici	869	633	—	—	1	—	2.355	2.796	5.151	56, dal 60 al 74, 76, 77
80, 83	Atassia locomotrice e paralisi progress. alienati	132	69	—	—	1	—	799	269	1.068	80, 83
82	Emorragia, embolia e trombosi cerebrale	25.314	15.702	9	4	21	8	29.862	27.765	57.627	82
78, 79, 81, dall'84 all'89	Altre malattie del sistema nervoso, ecc. (c)	1.055	658	—	—	8	3	3.707	3.101	6.808	78, 79, 81, dall'84 all'89
dal 90 al 95	Malattie del cuore	29.446	20.456	8	4	29	10	30.180	39.144	69.324	dal 90 al 95
dal 96 al 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio	8.249	4.926	3	1	5	3	8.571	7.421	15.992	dal 96 al 103
106	Bronchiti	6.059	3.988	2	1	4	2	5.821	6.669	12.490	106
107, 108, 109	Polmoniti	15.811	10.020	4	3	19	7	25.972	22.443	48.415	107, 108, 109
104, 105, dal 110 al 114	Altre malattie dell'apparato respiratorio, esclusa la tbc.	2.428	1.353	3	—	4	—	5.437	3.405	8.842	104, 105, dal 110 al 114
119, 120	Enteriti	2.403	1.618	1	1	5	2	2.926	3.264	6.190	119, 120
121	Appendicite	192	136	—	—	1	1	1.317	923	2.240	121
dal 124 al 127	Malattie del fegato e vie biliari	1.867	1.096	3	2	2	1	4.887	3.351	8.238	dal 124 al 127
dal 115	Altre malattie dell'apparato digerente	2.529	1.494	1	1	—	—	6.535	4.250	10.785	dal 115
al 118, 122, 123, 128, 129	Nefriti	4.966	3.274	1	1	2	1	7.185	8.345	15.530	al 118, 122, 123, 128, 129
dal 133 al 139	Altre malattie dell'apparato genito-urinario	1.844	408	2	—	1	—	4.670	1.340	6.010	dal 133 al 139
140, 145	Setticemia e infezioni puerperali	16	16	—	—	—	—	—	1.052	1.052	140, 145
dal 141 al 144	Altre malattie della gravidanza, parto e puerperio	11	11	—	—	—	—	—	1.673	1.673	dal 141 al 144
dal 146 al 150	Malattie della pelle, ecc. (d)	444	251	—	—	1	—	1.336	891	2.227	dal 146 al 150
dal 151 al 156	Debolezza congenita, ecc. (e)	4	3	—	—	—	—	45	31	76	dal 151 al 156
162	Senilità	28.318	18.168	2	1	13	9	18.637	23.454	42.091	dal 157 al 161
dal 163 al 171	Suicidio	475	151	1	1	12	—	2.404	866	3.270	dal 163 al 171
dal 172 al 175	Omicidio	47	17	—	—	—	—	491	184	675	dal 172 al 175
dal 176 al 198	Morte violenta e accidentale (f)	1.641	776	—	—	45	9	8.719	2.143	10.862	dal 176 al 198
199, 200	Morte improvvis. e cause non spec. o mal definite	1.388	804	3	—	21	4	2.534	1.789	4.323	199, 200

ossa e degli organi della locomozione (esclusa la tubercolosi e il reumatismo). (e) vizi di conformazione congeniti, nascita prematura e altre malattie

TAVOLA 16. — Madri morte durante l'anno 1937, per infezioni puerperali (*), nei singoli Compartimenti e nel Regno, con distinzione di primipare e pluripare e classificate per gruppi di età.

COMPARTIMENTI		GRUPPI DI ETÀ										TOTALE
		-15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	
REGNO	PRIMIPARE . . .	—	26	90	102	48	20	6	1	—	—	293
	PLURIPARE . . .	—	2	45	106	98	100	46	10	2	—	409
	NON IND.	—	13	54	95	82	71	82	3	1	—	350
	Totale	—	41	189	303	228	191	84	13	3	—	1.052
PIEMONTE	primipare . . .	—	—	6	7	3	1	—	—	—	—	17
	pluripare . . .	—	—	2	6	9	9	1	—	—	—	27
	non ind.	—	—	4	11	4	7	2	1	—	—	29
	Totale	—	—	12	24	16	17	3	1	—	—	73
LIGURIA	primipare . . .	—	—	3	—	1	2	—	—	—	—	6
	pluripare . . .	—	—	2	4	2	1	2	—	1	—	12
	non ind.	—	—	3	1	5	2	2	—	—	—	13
	Totale	—	—	8	5	8	5	4	—	1	—	31
LOMBARDIA	primipare . . .	—	3	16	15	6	—	—	—	—	—	40
	pluripare . . .	—	—	5	7	10	11	6	1	—	—	40
	non ind.	—	2	10	15	12	13	3	—	1	—	56
	Totale	—	5	31	37	28	24	9	1	1	—	136
VENEZIA TRIDENT.	primipare . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	pluripare . . .	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	7
	non ind.	—	—	—	2	2	1	3	—	—	—	8
	Totale	—	—	2	4	4	2	4	—	—	—	16
VENEZIO	primipare . . .	—	2	7	8	3	1	3	—	—	—	24
	pluripare . . .	—	—	5	10	12	9	5	1	—	—	42
	non ind.	—	1	2	9	3	5	3	—	—	—	23
	Totale	—	3	14	27	18	15	11	1	—	—	89
VENEZIA GIULIA E ZARA	primipare . . .	—	—	2	4	1	1	—	—	—	—	8
	pluripare . . .	—	—	1	2	6	4	—	—	—	—	13
	non ind.	—	—	1	7	5	1	1	—	—	—	15
	Totale	—	—	4	13	12	6	1	—	—	—	36
EMILIA	primipare . . .	—	1	4	7	3	2	2	—	—	—	19
	pluripare . . .	—	—	1	5	9	4	2	1	—	—	22
	non ind.	—	—	5	9	5	3	1	1	—	—	24
	Totale	—	1	10	21	17	9	5	2	—	—	65
TOSCANA	primipare . . .	—	1	7	5	7	2	—	—	—	—	22
	pluripare . . .	—	—	2	11	3	6	3	1	—	—	26
	non ind.	—	—	6	1	3	3	2	—	—	—	15
	Totale	—	1	15	17	13	11	5	1	—	—	63

(*) Numeri 140 e 145 della Nomenclatura nosologica.

Segue: TAVOLA 16. — Madri morte durante l'anno 1937, per infezioni puerperali (*), nei singoli Compartimenti e nel Regno, con distinzione di primipare e pluripare e classificate per gruppi di età.

COMPARTIMENTI		GRUPPI DI ETÀ										TOTALE
		-15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	
MARCHE	primipare	—	—	3	4	—	1	—	—	—	—	8
	pluripare	—	—	2	2	4	2	—	—	—	—	10
	non ind.	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	6
	Totale	—	1	6	8	5	4	—	—	—	—	24
UMBRIA	primipare	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	4
	pluripare	—	—	2	4	2	1	2	—	—	—	11
	non ind.	—	1	2	—	3	2	1	—	—	—	9
	Totale	—	2	4	6	6	3	3	—	—	—	24
LAZIO	primipare	—	3	7	6	2	1	—	—	—	—	19
	pluripare	—	—	3	6	1	6	2	1	1	—	20
	non ind.	—	5	3	11	4	5	1	—	—	—	29
	Totale	—	8	13	23	7	12	3	1	1	—	68
ABRUZZI E MOLISE	primipare	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3
	pluripare	—	—	6	4	3	3	2	2	—	—	20
	non ind.	—	—	3	2	1	5	1	—	—	—	12
	Totale	—	—	10	6	5	9	3	2	—	—	35
CAMPANIA	primipare	—	—	10	10	7	—	—	—	—	—	27
	pluripare	—	—	2	7	8	9	1	1	—	—	28
	non ind.	—	1	6	11	9	6	2	—	—	—	35
	Totale	—	1	18	28	24	15	3	1	—	—	80
PUGLIE	primipare	—	4	5	4	2	5	—	1	—	—	21
	pluripare	—	—	2	5	4	2	4	—	—	—	17
	non ind.	—	—	3	5	9	6	3	—	—	—	26
	Totale	—	4	10	14	15	13	7	1	—	—	64
LUCANIA	primipare	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	5
	pluripare	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
	non ind.	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	5
	Totale	—	1	1	6	5	—	—	—	—	—	13
CALABRIE	primipare	—	3	6	11	1	—	—	—	—	—	21
	pluripare	—	1	3	9	9	10	5	1	—	—	38
	non ind.	—	—	—	4	4	2	2	—	—	—	12
	Totale	—	4	9	24	14	12	7	1	—	—	71
SICILIA	primipare	—	7	8	12	7	3	—	—	—	—	37
	pluripare	—	1	5	17	12	16	6	1	—	—	58
	non ind.	—	2	4	3	6	5	5	—	—	—	25
	Totale	—	10	17	32	25	24	11	1	—	—	120
SARDEGNA	primipare	—	—	3	4	3	—	1	—	—	—	11
	pluripare	—	—	1	4	—	6	4	—	—	—	15
	non ind.	—	—	1	—	3	4	—	—	—	—	8
	Totale	—	—	5	8	6	10	5	—	—	—	34

(*) Numeri 140 e 145 della Nomenclatura nosologica.

TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERICION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
	COMPLESSO	269.599	96.639	168.217	80.965	316.551	298.869	615.420
	Gennaio	35.956	13.833	20.259	8.518	39.671	38.895	78.566
	Febbraio	25.676	8.990	14.080	7.161	28.590	27.317	55.907
	Marzo	23.719	8.126	12.841	6.801	26.917	24.570	51.487
	Aprile	20.373	7.090	11.665	5.933	23.589	21.472	45.061
	Maggio	20.634	7.037	12.475	5.681	24.051	21.776	45.827
	Giugno	18.695	6.669	15.124	6.469	24.357	22.600	46.957
	Luglio	21.739	7.783	17.445	7.102	27.847	26.222	54.069
	Agosto	20.609	7.180	13.765	6.386	24.593	23.347	47.940
	Settembre	18.671	6.776	11.170	5.912	21.847	20.682	42.529
	Ottobre	19.081	7.028	11.582	6.641	22.777	21.555	44.332
	Novembre	19.810	7.087	12.015	6.532	23.349	22.095	45.444
	Dicembre	24.636	9.040	15.796	7.829	28.963	28.338	57.301
1 2	Febbre tifoidea (tifo addominale) e paratifi	2.146	729	1.530	706	2.295	2.816	5.111
	Gennaio	65	19	63	37	87	97	184
	Febbraio	51	16	30	14	58	53	111
	Marzo	77	19	39	30	88	77	165
	Aprile	81	20	30	20	79	72	151
	Maggio	106	30	59	21	102	114	216
	Giugno	117	22	90	37	119	147	266
	Luglio	210	63	216	74	251	312	563
	Agosto	377	116	281	85	349	510	859
	Settembre	429	146	244	98	382	535	917
	Ottobre	288	118	183	104	306	387	693
	Novembre	204	101	163	108	271	305	576
	Dicembre	141	59	132	78	203	207	410
7	Morbillo	801	129	959	248	1.192	945	2.137
	Gennaio	38	8	79	12	74	63	137
	Febbraio	48	14	130	17	131	78	209
	Marzo	94	8	136	29	139	128	267
	Aprile	98	13	68	26	122	83	205
	Maggio	86	15	93	25	121	98	219
	Giugno	101	16	112	39	161	107	268
	Luglio	90	10	80	24	111	93	204
	Agosto	58	9	63	11	67	74	141
	Settembre	33	8	37	5	53	30	83
	Ottobre	22	3	30	5	26	34	60
	Novembre	50	7	47	17	64	57	121
	Dicembre	83	18	84	38	123	100	223
8	Scarlattina	128	52	80	29	139	150	289
	Gennaio	23	8	3	1	17	18	35
	Febbraio	6	3	4	—	11	2	13
	Marzo	18	1	4	5	11	17	28
	Aprile	15	5	6	8	19	15	34
	Maggio	12	3	9	1	10	15	25
	Giugno	13	1	8	2	11	13	24
	Luglio	5	2	2	3	6	6	12
	Agosto	6	4	1	2	6	7	13
	Settembre	3	4	10	1	13	5	18
	Ottobre	7	4	16	1	9	19	28
	Novembre	10	8	9	—	10	17	27
	Dicembre	10	9	8	5	16	16	32

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
9	Tosse convulsa.	1.266	451	594	429	1.186	1.554	2.740
	Gennaio	147	49	71	48	130	185	315
	Febbraio	182	47	54	71	166	188	354
	Marzo	128	49	50	49	129	147	276
	Aprile	109	40	44	49	102	140	242
	Maggio	110	43	39	34	101	125	226
	Giugno	113	48	53	32	103	143	246
	Luglio	149	58	79	42	138	190	328
	Agosto	126	47	80	38	127	164	291
	Settembre	86	29	37	19	74	97	171
	Ottobre	51	15	17	15	45	53	98
	Novembre	30	14	32	11	29	58	87
	Dicembre	35	12	38	21	42	64	106
10	Difterite	1.448	436	592	272	1.423	1.325	2.748
	Gennaio	169	60	62	29	165	155	320
	Febbraio	122	44	48	23	124	113	237
	Marzo	142	42	56	15	124	131	255
	Aprile	120	17	33	16	93	93	186
	Maggio	85	16	39	14	76	78	154
	Giugno	68	20	19	7	62	52	114
	Luglio	64	25	33	8	71	59	130
	Agosto	67	30	37	14	66	82	148
	Settembre	101	39	48	22	98	112	210
	Ottobre	147	38	59	45	159	130	289
	Novembre	162	55	79	42	185	153	338
	Dicembre	201	50	79	37	200	167	367
11	Influenza	5.146	2.182	3.492	1.290	6.231	5.879	12.110
	Gennaio	2.559	1.159	1.122	319	2.570	2.589	5.159
	Febbraio	1.188	476	615	321	1.394	1.206	2.600
	Marzo	499	190	328	193	651	559	1.210
	Aprile	167	84	222	129	323	279	602
	Maggio	125	65	209	71	257	213	470
	Giugno	58	22	123	28	128	103	231
	Luglio	39	15	122	18	95	99	194
	Agosto	24	11	111	25	86	85	171
	Settembre	45	21	99	23	92	96	188
	Ottobre	57	17	117	39	102	128	230
	Novembre	125	36	149	56	178	188	366
	Dicembre	260	86	275	68	355	334	689
23	Tubercolosi dell'apparato respiratorio (compresi i gangli tracheo-bronchiali)	14.637	4.968	4.802	3.141	13.809	13.639	27.448
	Gennaio	1.504	553	441	258	1.352	1.404	2.756
	Febbraio	1.264	410	373	250	1.166	1.131	2.297
	Marzo	1.358	459	370	300	1.322	1.165	2.487
	Aprile	1.287	406	409	306	1.252	1.156	2.408
	Maggio	1.349	450	433	248	1.308	1.172	2.480
	Giugno	1.168	396	421	251	1.090	1.146	2.236
	Luglio	1.184	436	424	267	1.131	1.180	2.311
	Agosto	1.104	376	398	254	1.026	1.106	2.132
	Settembre	1.002	329	366	220	958	959	1.917
	Ottobre	1.110	366	387	261	1.068	1.056	2.124
	Novembre	1.055	360	365	272	1.021	1.031	2.052
	Dicembre	1.152	427	415	254	1.115	1.133	2.248

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
dal 24 al 32	Ogni altra forma di tubercolosi.	4. 906	1. 747	2. 027	1. 062	4. 644	5. 088	9. 742
	Gennaio	404	166	145	74	374	415	789
	Febbraio	365	149	149	73	354	382	736
	Marzo	464	145	172	88	437	432	869
	Aprile	466	170	190	120	444	502	946
	Maggio	510	182	195	93	471	509	980
	Giugno	443	140	210	89	402	480	882
	Luglio	487	154	189	85	426	489	915
	Agosto	400	118	171	89	367	411	778
	Settembre	374	136	160	93	394	369	763
	Ottobre	335	128	151	105	333	386	719
	Novembre	326	125	150	90	334	357	691
	Dicembre	332	134	145	63	308	366	674
38	Malaria	72	54	479	427	638	396	1. 032
	Gennaio	5	3	18	25	26	25	51
	Febbraio	5	3	20	15	28	15	43
	Marzo	3	1	26	17	32	15	47
	Aprile	5	1	17	25	29	19	48
	Maggio	7	4	34	16	41	20	61
	Giugno	10	3	35	16	43	21	64
	Luglio	5	11	65	44	83	42	125
	Agosto	5	8	89	63	107	58	165
	Settembre	7	6	59	69	76	65	141
	Ottobre	4	6	52	73	81	54	135
	Novembre	10	4	39	35	53	35	88
	Dicembre	6	4	25	29	37	27	64
dal 45 al 53	Cancro ed altri tumori maligni.	22. 178	7. 837	4. 410	2. 595	17. 678	19. 342	37. 020
	Gennaio	1.972	704	377	179	1.557	1.675	3.232
	Febbraio	1.651	561	331	182	1.359	1.366	2.725
	Marzo	1.805	631	363	199	1.430	1.568	2.998
	Aprile	1.725	598	321	210	1.350	1.504	2.854
	Maggio	1.863	619	385	222	1.449	1.640	3.089
	Giugno	1.814	630	352	188	1.429	1.555	2.984
	Luglio	2.029	682	405	259	1.660	1.715	3.375
	Agosto	1.863	665	366	217	1.483	1.628	3.111
	Settembre	1.795	710	374	234	1.443	1.670	3.113
	Ottobre	1.887	711	380	245	1.535	1.688	3.223
	Novembre	1.824	644	389	221	1.445	1.633	3.078
	Dicembre	1.950	682	367	239	1.538	1.700	3.238
56	Reumatismo articolare acuto	1. 297	388	694	236	1. 218	1. 397	2. 615
	Gennaio	140	43	73	25	139	142	281
	Febbraio	121	38	72	15	118	128	246
	Marzo	146	36	59	19	109	121	230
	Aprile	115	35	46	20	106	110	216
	Maggio	112	25	45	16	92	106	198
	Giugno	106	25	55	11	98	99	197
	Luglio	107	30	48	21	96	110	206
	Agosto	81	31	49	15	71	105	176
	Settembre	88	30	70	24	95	117	212
	Ottobre	92	36	45	23	89	107	196
	Novembre	105	32	52	26	92	123	215
	Dicembre	114	27	80	21	113	129	242

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
79	Meningite semplice.	1.349	409	721	212	1.477	1.214	2.691
	Gennaio	118	46	58	12	124	110	234
	Febbraio	116	34	53	19	123	99	222
	Marzo	138	38	65	24	152	113	265
	Aprile	133	42	72	17	152	112	264
	Maggio	140	33	80	20	151	122	273
	Giugno	120	34	86	25	142	123	265
	Luglio	122	36	51	21	123	107	230
	Agosto	102	41	48	20	107	104	211
	Settembre	115	26	62	19	125	97	222
	Ottobre	84	26	52	11	84	89	173
	Novembre	78	22	42	10	100	52	152
	Dicembre	83	31	52	14	94	86	180
82	Emorragia cerebrale, embolia e trombosi cerebrale	25.783	11.419	14.108	6.402	29.908	27.804	57.712
	Gennaio	3.038	1.516	1.855	775	3.782	3.402	7.184
	Febbraio	2.440	1.033	1.264	624	2.792	2.569	5.361
	Marzo	2.394	1.037	1.303	613	2.766	2.581	5.347
	Aprile	2.031	928	1.149	514	2.507	2.115	4.622
	Maggio	2.082	894	1.136	446	2.375	2.183	4.558
	Giugno	1.783	700	951	443	1.980	1.897	3.877
	Luglio	1.782	774	987	439	1.973	2.009	3.982
	Agosto	1.686	721	867	403	1.933	1.744	3.677
	Settembre	1.740	706	856	409	1.868	1.843	3.711
	Ottobre	2.016	891	1.058	480	2.318	2.127	4.445
	Novembre	2.116	941	1.124	526	2.386	2.321	4.707
	Dicembre	2.675	1.278	1.558	730	3.228	3.013	6.241
92	Endocardite cronica, comprese le affezioni valvolari	9.354	3.697	6.945	2.462	9.050	13.408	22.458
	Gennaio	1.269	545	945	318	1.201	1.876	3.077
	Febbraio	938	329	664	236	827	1.340	2.167
	Marzo	803	344	583	222	800	1.152	1.952
	Aprile	721	289	512	189	676	1.035	1.711
	Maggio	736	260	534	173	693	1.010	1.703
	Giugno	668	237	494	169	658	910	1.568
	Luglio	668	297	511	151	645	982	1.627
	Agosto	551	238	457	173	633	786	1.419
	Settembre	605	250	406	155	619	797	1.416
	Ottobre	723	262	466	175	674	952	1.626
	Novembre	746	277	589	211	710	1.113	1.823
	Dicembre	926	369	784	290	914	1.455	2.369
90, 91, dal 93 al 95	Altre malattie del sangue.	26.470	6.887	10.376	4.390	21.738	28.385	48.123
	Gennaio	3.620	956	1.417	589	2.820	3.762	6.582
	Febbraio	2.534	628	941	401	1.941	2.563	4.504
	Marzo	2.361	585	874	370	1.894	2.296	4.190
	Aprile	2.012	537	823	331	1.671	2.032	3.703
	Maggio	1.941	559	788	322	1.688	1.922	3.610
	Giugno	1.712	415	689	276	1.368	1.724	3.092
	Luglio	1.791	453	761	295	1.577	1.723	3.300
	Agosto	1.638	445	672	269	1.410	1.614	3.024
	Settembre	1.796	438	649	299	1.492	1.690	3.182
	Ottobre	1.992	484	777	343	1.619	1.977	3.596
	Novembre	2.299	593	812	341	1.825	2.220	4.045
	Dicembre	2.774	794	1.173	554	2.433	2.862	5.295

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
dal 96 al 103	Altre malattie dell'apparato circolatorio	7.950	2.874	3.412	1.934	8.659	7.511	16.170
	Gennaio	1.213	458	495	283	1.309	1.140	2.449
	Febbraio	840	273	355	206	903	771	1.674
	Marzo	755	273	338	151	811	706	1.517
	Aprile	669	223	285	155	702	630	1.332
	Maggio	599	225	239	128	625	566	1.191
	Giugno	488	145	218	116	531	436	967
	Luglio	503	188	236	139	573	493	1.066
	Agosto	482	171	191	122	537	429	966
	Settembre	463	165	202	124	503	451	954
	Ottobre	565	208	216	160	617	532	1.149
	Novembre	577	220	249	143	622	567	1.189
	Dicembre	796	325	388	207	926	790	1.716
106	Bronchiti	6.992	2.793	6.159	2.468	8.904	9.508	18.412
	Gennaio	1.615	680	1.150	349	1.758	2.036	3.794
	Febbraio	994	391	702	366	1.186	1.267	2.453
	Marzo	733	291	618	287	961	968	1.929
	Aprile	516	176	442	194	676	652	1.328
	Maggio	410	155	385	150	550	550	1.100
	Giugno	259	106	331	122	392	426	818
	Luglio	287	142	392	137	459	499	958
	Agosto	240	113	324	119	410	386	796
	Settembre	290	117	325	138	437	433	870
	Ottobre	390	154	390	171	529	576	1.105
	Novembre	495	179	439	173	618	668	1.286
	Dicembre	763	289	661	262	928	1.047	1.975
107, 108, 109	Polmoniti	35.649	12.335	26.609	12.501.	46.968	40.126	87.094
	Gennaio	7.932	2.835	4.333	1.752	8.975	7.877	16.852
	Febbraio	4.597	1.538	2.615	1.479	5.511	4.718	10.229
	Marzo	3.710	1.160	2.221	1.427	4.801	3.717	8.518
	Aprile	2.846	930	2.104	1.105	3.877	3.108	6.985
	Maggio	2.726	917	2.139	964	3.759	2.987	6.746
	Giugno	1.608	643	1.919	761	2.689	2.242	4.931
	Luglio	1.554	563	1.860	687	2.532	2.132	4.664
	Agosto	1.330	538	1.662	672	2.188	2.014	4.202
	Settembre	1.410	592	1.474	717	2.203	1.990	4.193
	Ottobre	1.827	642	1.632	771	2.572	2.300	4.872
	Novembre	2.294	791	1.768	881	3.091	2.643	5.734
	Dicembre	3.815	1.186	2.882	1.285	4.770	4.398	9.168
110	Pleuriti	1.500	446	691	353	1.786	1.204	2.990
	Gennaio	181	52	68	26	208	119	327
	Febbraio	143	53	67	38	176	125	301
	Marzo	193	28	68	41	197	133	330
	Aprile	130	36	52	28	156	90	246
	Maggio	143	35	67	31	172	104	276
	Giugno	110	45	56	32	144	99	243
	Luglio	126	40	62	28	161	95	256
	Agosto	81	34	45	27	101	86	187
	Settembre	80	17	45	24	93	73	166
	Ottobre	96	33	46	26	116	85	201
	Novembre	89	27	56	26	114	84	198
	Dicembre	128	46	59	26	148	111	259

Segue: TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERIDION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
119	Enteriti al disotto di 2 anni . .	13.310	4.475	20.441	9.266	24.432	23.060	47.492
	Gennaio	398	165	729	296	836	752	1.588
	Febbraio	378	131	588	294	719	672	1.391
	Marzo	334	87	578	258	676	581	1.257
	Aprile	339	77	632	259	697	610	1.307
	Maggio	482	134	1.239	506	1.238	1.123	2.361
	Giugno	1.425	698	4.348	1.725	4.262	3.934	8.196
	Luglio	3.500	1.231	5.696	1.931	6.316	6.042	12.358
	Agosto	3.478	849	3.094	1.298	4.383	4.336	8.719
	Settembre	1.620	561	1.290	790	2.184	2.077	4.261
	Ottobre	649	287	902	851	1.394	1.295	2.689
	Novembre	388	156	770	660	1.021	953	1.974
	Dicembre	319	99	575	398	706	685	1.391
120	Enteriti e ulcere intestinali (2 anni e oltre)	2.485	1.043	4.016	2.208	4.649	5.103	9.752
	Gennaio	176	44	229	162	310	301	611
	Febbraio	116	45	189	97	196	251	447
	Marzo	128	39	140	96	193	210	403
	Aprile	134	54	178	95	207	254	461
	Maggio	134	37	238	109	237	281	518
	Giugno	182	73	460	202	467	450	917
	Luglio	370	192	802	327	817	874	1.691
	Agosto	402	186	606	236	682	748	1.430
	Settembre	315	148	392	221	504	572	1.076
	Ottobre	226	96	283	250	413	442	855
	Novembre	154	65	265	224	337	371	708
	Dicembre	148	64	234	189	286	349	635
130, 131, 132	Nefriti	6.594	2.663	6.348	3.083	8.787	9.901	16.688
	Gennaio	722	367	759	338	1.008	1.178	2.186
	Febbraio	608	259	539	267	747	926	1.673
	Marzo	579	238	530	274	782	839	1.621
	Aprile	527	173	469	236	668	737	1.405
	Maggio	543	187	455	209	657	737	1.394
	Giugno	468	180	407	213	611	657	1.268
	Luglio	449	163	442	206	570	690	1.260
	Agosto	447	200	467	220	622	712	1.334
	Settembre	456	194	493	250	670	723	1.393
	Ottobre	555	219	530	265	776	793	1.569
	Novembre	567	220	561	294	758	884	1.642
	Dicembre	673	263	696	311	918	1.025	1.943
dal 163 al 171	Suicidi	2.007	544	451	289	2.420	871	3.291
	Gennaio	136	45	25	24	159	71	230
	Febbraio	132	35	29	24	159	61	220
	Marzo	196	56	49	31	252	80	332
	Aprile	183	50	47	30	230	80	310
	Maggio	250	60	57	34	306	95	401
	Giugno	227	72	55	26	287	93	380
	Luglio	188	52	41	22	214	89	303
	Agosto	167	48	38	20	204	69	273
	Settembre	138	42	32	22	173	61	234
	Ottobre	128	34	29	22	147	66	213
	Novembre	126	30	18	14	143	45	188
	Dicembre	136	20	31	20	146	61	207

Segue : TAVOLA 17. — Morti, durante l'anno 1937, classificati secondo alcune cause e il mese in cui avvenne il decesso.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO	CAUSE DI MORTE — MESI	ITALIA SETTENTR.	ITALIA CENTRALE	ITALIA MERICION.	ITALIA INSULARE	REGNO		
						Maschi	Femm.	TOTALE
dal 176 al 194	Morti accidentali.	7.592	2.567	2.839	1.393	10.894	3.497	14.391
	Gennaio	510	180	232	108	718	312	1.030
	Febbraio	472	159	181	86	673	225	898
	Marzo	528	175	193	84	731	249	980
	Aprile	531	206	194	96	777	250	1.027
	Maggio	608	220	212	109	871	278	1.149
	Giugno	741	263	283	130	1.111	306	1.417
	Luglio	811	290	268	141	1.166	344	1.510
	Agosto	852	256	299	151	1.209	349	1.558
	Settembre	736	221	266	129	1.048	304	1.352
	Ottobre	654	235	263	126	985	293	1.278
	Novembre	556	174	199	126	789	266	1.055
	Dicembre	593	188	249	107	816	321	1.137
199	Morte improvvisa	2.100	682	805	482	2.413	1.636	4.049
	Gennaio	264	92	113	66	283	252	535
	Febbraio	199	54	74	49	230	146	376
	Marzo	193	61	68	49	235	136	371
	Aprile	165	64	64	32	187	138	325
	Maggio	176	40	72	38	199	127	326
	Giugno	155	40	64	33	180	112	292
	Luglio	137	50	58	28	171	102	273
	Agosto	139	51	53	28	173	98	271
	Settembre	133	43	37	34	147	100	247
	Ottobre	142	42	64	25	173	100	273
	Novembre	174	45	50	34	177	126	303
	Dicembre	223	100	88	46	258	199	457
200	Cause non specif. o mal definite	220	184	254	281	489	430	919
	Gennaio	22	31	36	32	58	63	121
	Febbraio	16	11	23	26	42	34	76
	Marzo	20	19	39	35	51	62	113
	Aprile	28	10	23	19	45	35	80
	Maggio	14	11	16	18	32	27	59
	Giugno	16	12	12	19	35	24	59
	Luglio	15	9	21	23	40	28	68
	Agosto	19	8	13	15	38	17	55
	Settembre	14	12	17	14	30	27	57
	Ottobre	20	15	16	26	34	43	77
	Novembre	16	17	15	18	36	30	66
	Dicembre	20	9	23	36	48	40	88
	Altre cause	86.319	24.668	44.383	22.826	83.526	74.870	158.196
	Gennaio	7.716	3.049	5.361	2.381	9.631	8.876	18.507
	Febbraio	6.150	2.256	3.970	1.968	7.456	6.888	14.344
	Marzo	5.950	2.114	3.571	1.895	7.143	6.387	13.530
	Aprile	5.220	1.906	3.233	1.704	6.442	5.621	12.063
	Maggio	5.285	1.818	3.278	1.663	6.470	5.574	12.044
	Giugno	4.722	1.683	3.273	1.477	5.854	5.301	11.155
	Luglio	5.067	1.817	3.594	1.682	6.442	5.718	12.160
	Agosto	4.884	1.866	3.283	1.800	6.208	5.625	11.833
	Settembre	4.797	1.786	3.120	1.759	6.073	5.389	11.462
	Ottobre	5.014	1.958	3.421	2.023	6.573	5.843	12.416
	Novembre	5.234	1.944	3.584	1.973	6.940	5.795	12.735
	Dicembre	6.280	2.471	4.695	2.501	8.294	7.653	15.947

TAVOLA 18. — Morti, durante l'anno 1937, per causa accidentale, classificati secondo la specie dell'infortunio, il sesso e il mese in cui avvenne la morte.

NUMERI DELL'ELENCO NOSOLOGICO — SESSO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
COMPLESSO	Tot. di cui F.	1.030 312	898 225	980 249	1.027 250	1.149 278	1.417 306	1.510 344	1.558 349	1.352 304	1.278 293	1.055 266	1.137 321	14.391 3.497
176.	Tot. di cui F.	—	—	—	1	—	5	4	5	1	1	—	—	17 5
177.	Tot. di cui F.	2	1	3	20	6	8	6	5	16	38	8	5	118. 51
178.	Tot. di cui F.	25	10	11	8	7	9	6	11	30	7	11	12	147 41
179.	Tot. di cui F.	5	3	6	9	11	18	12	24	13	9	8	4	122 53
180.	Tot. di cui F.	9	9	3	1	3	3	6	2	4	4	2	7	53 20
181.	Tot. di cui F.	269 146	160 96	151 81	99 61	93 50	79 39	96 53	112 46	105 43	148 70	177 87	222 121	1.711 893
182.	Tot. di cui F.	5	7	4	8	10	5	12	13	14	6	14	7	105 37
183.	Tot. di cui F.	61 14	73 16	108 21	136 41	177 47	276 57	306 70	238 49	140 40	111 24	75 16	106 15	1.807 410
184.	Tot. di cui F.	19 4	24 5	16 4	14 1	7 1	13 1	9 1	21 3	39 3	33 5	28 4	12 5	235 37
185.	Tot. di cui F.	5	1	2	1	2	—	9	2	2	6	3	3	36 3
186.	Tot. di cui F.	514 109	506 90	557 121	642 121	712 154	774 160	827 168	929 199	809 167	772 158	610 133	611 149	8.263 1.729
187.	Tot. di cui F.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2 1
188.	Tot. di cui F.	8 2	10 —	13 1	18 2	20 2	30 2	27 1	25 4	30 4	21 2	10 1	13 2	225 23
189 (a)	Tot. di cui F.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2 2
190.	Tot. di cui F.	44 9	22 1	9 —	9 3	1 —	2 —	1 —	—	3 1	3 —	14 —	56 6	164 20
191.	Tot. di cui F.	—	—	—	—	6 2	59 13	28 10	26 6	4 —	3 —	—	—	126 31
192.	Tot. di cui F.	—	—	3	1	21	49	50	19	44	13	4	8	212 47
193.	Tot. di cui F.	12	9	14	15	22	18	27	36	22	18	15	9	217 8
194-a	Tot. di cui F.	3 1	1 —	2 1	4 1	—	1 1	—	3 2	2 1	—	2 —	3 1	21 8
194-b	Tot. di cui F.	49 2	62 7	78 9	41 6	51 5	67 6	84 10	85 12	74 7	84 4	74 7	59 3	808 78

(a) Vedi la nota (f) a pag. 12.

TAVOLA 19. — Morti per suicidio, durante l'anno 1937, distinti per sesso, per mese in cui avvenne il decesso, per classi di Comuni, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE — MESI	COMUNI CON ABITANTI:														COMPLESSO	
	meno di 2.000		da 2.000 a 4.999		da 5.000 a 9.999		da 10.000 a 19.999		da 20.000 a 49.999		da 50.000 a 99.999		da 100.000 e più			
	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F	Tot.	di cui F
REGNO	200	48	602	147	491	124	419	102	457	130	265	79	857	241	3.291	871
Gennaio	13	4	38	15	34	11	26	5	43	12	17	5	59	19	230	71
Febbraio	12	4	40	11	30	9	32	8	23	7	21	8	62	14	220	61
Marzo	15	4	72	16	84	11	57	9	43	13	26	2	85	25	332	80
Aprile	21	4	65	14	48	12	31	7	38	12	22	5	85	26	310	80
Maggio	30	6	63	11	60	13	53	12	61	15	31	11	103	27	401	95
Giugno	29	9	75	19	45	6	59	14	51	9	31	7	90	29	380	93
Luglio	12	2	55	13	50	13	32	12	47	21	29	9	78	19	303	89
Agosto	13	2	45	11	57	15	29	8	41	7	26	8	62	18	273	69
Settembre	23	5	46	11	44	14	25	4	20	7	21	7	55	13	234	61
Ottobre	12	6	30	7	35	5	32	11	34	12	19	10	51	15	213	66
Novembre	10	2	35	7	23	8	20	3	32	8	12	2	56	15	188	45
Dicembre	10	—	38	12	31	7	23	9	24	7	10	5	71	21	207	61
Italia Settentrionale	155	33	394	84	310	72	218	56	220	55	174	51	536	141	2.007	492
Gennaio	8	2	21	10	21	6	14	1	25	4	14	5	33	11	136	39
Febbraio	9	3	24	4	18	5	16	3	9	2	12	5	44	12	132	34
Marzo	15	4	48	13	20	5	26	4	21	7	17	2	49	14	196	49
Aprile	12	2	46	8	30	6	14	3	16	4	16	2	49	11	183	36
Maggio	22	2	42	6	35	7	32	9	30	4	21	8	68	21	250	57
Giugno	24	8	48	13	29	5	25	7	26	4	23	5	52	16	227	58
Luglio	10	1	34	3	31	8	18	8	17	6	17	7	61	13	188	46
Agosto	10	1	32	6	39	10	17	6	23	5	14	4	32	8	167	40
Settembre	19	3	35	7	22	6	15	1	6	2	11	3	30	4	138	26
Ottobre	10	5	17	3	27	3	14	6	17	6	12	7	31	10	128	40
Novembre	9	2	19	3	17	7	12	2	16	6	11	2	42	11	126	33
Dicembre	7	—	28	8	21	4	15	6	14	5	6	1	45	10	136	34
Italia Centrale	12	3	85	16	66	18	77	14	101	30	46	14	177	50	544	145
Gennaio	1	1	6	2	7	2	2	—	12	5	2	—	15	6	45	16
Febbraio	1	—	4	—	2	—	7	1	7	1	5	1	9	1	35	4
Marzo	—	—	7	1	3	1	11	—	11	1	3	—	21	7	56	10
Aprile	2	1	3	1	8	3	10	3	9	2	1	—	17	4	50	14
Maggio	2	—	7	3	9	4	9	1	10	6	4	3	19	3	60	20
Giugno	3	—	14	3	8	1	12	1	8	1	1	—	23	5	72	12
Luglio	—	—	7	4	8	1	4	1	13	9	8	1	12	5	52	21
Agosto	2	1	4	—	4	2	4	1	7	1	7	2	20	4	48	11
Settembre	—	—	3	1	10	3	3	3	3	—	6	2	17	9	42	18
Ottobre	—	—	3	—	4	1	6	1	8	3	4	3	9	1	34	9
Novembre	—	—	6	1	1	—	6	—	10	1	1	—	6	1	30	3
Dicembre	1	—	1	—	2	—	3	2	3	—	1	1	9	4	20	7
Italia Meridionale	19	9	102	33	68	22	59	12	85	29	28	11	90	40	451	156
Gennaio	2	1	6	1	2	2	5	1	4	1	—	—	6	2	25	8
Febbraio	1	—	7	6	5	3	5	2	4	3	—	—	7	1	29	15
Marzo	—	—	15	2	7	5	8	2	5	4	4	—	10	4	49	17
Aprile	5	1	12	5	4	—	3	—	6	3	4	3	13	8	47	20
Maggio	3	3	10	1	12	2	6	1	13	3	4	—	9	2	57	12
Giugno	2	1	11	3	6	—	14	4	11	2	2	1	9	6	55	17
Luglio	1	1	9	2	7	3	4	1	13	4	4	1	3	1	41	13
Agosto	1	—	6	4	8	1	4	—	9	1	3	1	7	5	38	12
Settembre	2	2	5	2	8	4	2	—	7	4	4	2	4	—	32	14
Ottobre	—	—	8	3	2	—	6	1	5	2	—	—	8	3	29	9
Novembre	—	—	8	3	4	1	—	—	2	—	—	—	4	3	18	7
Dicembre	2	—	5	1	3	1	2	—	6	2	3	3	10	5	31	12
Italia Insulare	14	3	41	14	47	12	65	20	51	18	17	3	54	10	289	78
Gennaio	2	—	5	2	4	1	5	3	2	2	1	—	5	—	24	8
Febbraio	1	1	5	1	4	1	4	2	3	1	4	2	2	—	24	8
Marzo	—	—	2	—	4	—	12	3	6	1	2	—	5	—	31	4
Aprile	2	—	4	—	6	3	4	1	7	3	1	—	6	3	30	10
Maggio	3	1	4	1	4	—	6	1	8	2	2	—	7	1	34	6
Giugno	—	—	2	—	2	—	8	8	6	2	2	—	6	2	26	6
Luglio	1	—	5	4	4	1	6	2	4	2	—	—	2	—	22	9
Agosto	—	—	3	1	6	2	4	1	4	1	2	1	3	1	20	6
Settembre	2	—	3	1	4	1	5	—	4	1	—	—	4	—	22	3
Ottobre	2	1	2	1	2	1	6	3	4	1	3	—	3	1	22	8
Novembre	1	—	2	—	1	—	2	1	4	1	—	—	4	—	14	2
Dicembre	—	—	4	3	5	2	3	1	1	—	—	—	7	2	20	8

TAVOLA 20. — Morti per suicidio, durante l'anno 1937, classificati secondo i mezzi o modi di uccisione, lo stato civile ed il sesso.

MEZZI O MODI DI UCCISIONE.	CELIBI E NUBILI	CONIUGATI	VEDOVI	DIVORZIATI	STATO CIVILE IGNOTO	TOTALE
----------------------------	-----------------------	-----------	--------	------------	---------------------------	--------

MASCHI E FEMMINE

COMPLESSO . . .	1.173	1.629	475	1	13	3.291
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive	116	130	34	—	1	281
Per assorbimento di gas tossici . .	28	47	16	—	—	91
Per impiccamento o strangolam. . .	300	503	134	—	3	940
Per annegamento	198	308	117	1	3	627
Con arma da fuoco	250	284	52	—	5	591
Con arma da punta e da taglio . . .	38	84	22	—	—	144
Per precipitazione da un luogo elevato	141	171	77	—	1	390
Per schiacciamento	94	94	18	—	—	206
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	8	8	5	—	—	21

MASCHI

COMPLESSO . . .	818	1.265	324	—	13	2.420
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive	40	68	13	—	1	122
Per assorbimento di gas tossici . .	13	35	10	—	—	58
Per impiccamento o strangolam. . .	234	418	104	—	3	759
Per annegamento	112	205	65	—	3	385
Con arma da fuoco	230	266	48	—	5	549
Con arma da punta e da taglio . . .	33	69	15	—	—	117
Per precipitazione da un luogo elevato	80	123	50	—	1	254
Per schiacciamento	68	77	16	—	—	161
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	8	4	3	—	—	15

FEMMINE

COMPLESSO . . .	355	364	151	1	—	871
Per ingestione di veleni solidi o liquidi o per assorbimento di sostanze corrosive	76	62	21	—	—	159
Per assorbimento di gas tossici . .	15	12	6	—	—	33
Per impiccamento o strangolam. . .	66	85	30	—	—	181
Per annegamento	86	103	52	1	—	242
Con arma da fuoco	20	18	4	—	—	42
Con arma da punta e da taglio . . .	5	15	7	—	—	27
Per precipitazione da un luogo elevato	61	48	27	—	—	136
Per schiacciamento	26	17	2	—	—	45
Con altro mezzo o con mezzo non determinato	—	4	2	—	—	6

TAVOLE 21 e 22.

Le cause di natimortalità nell'anno 1937.

TAVOLA 21. — Nati morti distinti secondo le cause, la

CAUSE DI NATIMORTALITA'	NATI MORTI DA PARTI SEM.							
	CAPILUOGHI DI PROVINCIA				ALTRI COMUNI			
	Totale		di cui illegittimi		Totale		di cui illegittimi	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
COMPLESSO	8 108	3 587	816	364	22 363	10 116	877	402
I. - Nel corso della gestazione	2 270	1 056	285	137	5 449	2 730	256	122
1. Sifilide ed altre affezioni croniche	786	366	150	73	1.300	591	107	48
di cui per sifilide	720	342	144	71	983	445	94	46
2. Tossiemie gravidiche	497	202	43	22	1.266	633	53	25
3. Malformazioni incompatibili con la vita	389	210	30	13	1.793	975	61	28
4. Altre cause	468	218	47	25	897	448	25	15
4 bis Male indicate	130	60	15	4	193	83	10	6
II. - Per espulsione prematura	2 085	979	208	94	6 887	3 214	269	125
5. Strapazzo materno	437	219	34	16	3.205	1.497	118	55
6. Traumatismo determinante il parto prematuro	111	43	7	4	547	276	16	6
7. Inserzione viziosa	168	79	11	6	520	204	22	11
8. Infezioni acute	93	47	4	1	437	212	13	8
9. Infezioni croniche, in particolare sifilide di cui per sifilide	266	129	27	14	540	258	21	10
10. Altre cause	176	88	24	11	243	113	17	9
10 bis Male indicate	376	166	44	16	743	353	31	10
III. - Nel corso del parto	3 736	1 546	317	130	9 942	4 135	336	143
11. Presentazioni viziose e procidenza del cordone	1.254	527	101	37	5.242	2.177	178	73
12. Ostacoli all'espulsione del feto	690	266	70	30	1.990	778	62	23
13. Altre cause	1.766	739	144	61	2.666	1.161	95	46
13 bis Male indicate	26	14	2	2	44	19	1	1
Cause non indicate	17	6	6	3	85	37	16	12

TAVOLA 22. — Nati morti legittimi, nell'anno 1937, da madri che presumibilmente non ebbero figli

CAUSE DI NATIMORTALITA'	NATI MORTI											
	ETÀ DELLA MADRE AL PARTO											
	- 21			21-29				30-39				
	Primo-geniti	Ca-detti	Non indi-cato	Primo-geniti	Ca-detti	Non indi-cato	TOTALE	Primo-geniti	Ca-detti	Non indi-cato	TOTALE	
COMPLESSO	967	180	—	1.147	6.535	5.858	1	12.394	1.996	9.486	1	11.483
I. - Nel corso della gestazione	244	49	—	293	1.552	1.559	—	3.111	461	2.375	—	2.836
1. Sifilide ed altre affezioni croniche	62	16	—	78	354	434	—	788	113	642	—	755
di cui per sifilide	52	14	—	66	292	356	—	648	96	483	—	579
2. Tossiemie gravidiche	44	5	—	49	405	293	—	698	142	533	—	675
3. Malformazioni incompatibili con la vita	88	17	—	105	464	522	—	986	91	666	—	757
4. Altre cause	35	10	—	45	247	259	—	506	90	448	—	538
4 bis Male indicate	15	1	—	16	82	51	—	133	25	86	—	111
II. - Per espulsione prematura	315	85	—	400	1.752	1.919	1	3.672	438	2.882	1	3.321
5. Strapazzo materno	140	38	—	178	694	823	—	1.517	149	1.180	—	1.329
6. Traumatismo determinante il parto prematuro	32	7	—	39	142	139	—	281	36	187	—	223
7. Inserzione viziosa	13	3	—	16	102	163	—	265	39	260	—	299
8. Infezioni acute	19	8	—	27	107	101	—	208	25	184	—	209
9. Infezioni croniche, in particolare sifilide di cui per sifilide	22	7	—	29	154	173	—	327	52	251	—	303
10. Altre cause	14	3	—	17	86	105	—	189	24	110	—	134
10 bis Male indicate	32	9	—	41	224	223	—	447	47	372	—	419
III. - Nel corso del parto	407	46	—	453	3.217	2.368	—	5.585	1.093	4.194	—	5.287
11. Presentazioni viziose e procidenza del cordone	199	21	—	220	1.387	1.250	—	2.637	408	2.112	—	2.520
12. Ostacoli all'espulsione del feto	79	11	—	90	761	385	—	1.146	264	721	—	995
13. Altre cause	126	13	—	139	1.059	718	—	1.777	415	1.342	—	1.757
13 bis Male indicate	3	1	—	4	10	15	—	25	6	19	—	25
Cause non indicate	1	—	—	1	14	12	—	26	4	35	—	39

specie del parto, la filiazione ed il sesso, nell'anno 1937.

PLICICI	NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI								IN COMPLESSO			
	REGNO				Totale		di cui illegittimi		Totale		di cui illegittimi	
	Totale		di cui illegittimi		MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
30 471	13 703	1 693	766	2 115	938	105	36	32 586	14 641	1 798	802	
7 719	3 786	541	259	414	197	24	5	8 133	3 983	565	264	
2.086	957	257	121	91	56	8	4	2.177	1.013	265	125	
1.883	787	238	117	71	43	7	3	1.754	830	245	120	
1.763	835	96	47	72	31	5	—	1.835	866	101	47	
2.182	1.185	91	41	99	42	5	—	2.281	1.227	96	41	
1.365	666	72	40	125	55	4	1	1.470	721	76	41	
323	143	25	10	27	13	2	—	350	156	27	10	
8 972	4 193	477	219	899	370	53	19	9 871	4 563	530	238	
3 642	1 716	152	71	276	113	13	4	3 918	1 829	165	75	
658	319	23	10	31	11	5	—	689	330	28	10	
688	283	33	17	69	31	7	2	757	314	40	19	
530	259	17	9	46	15	—	—	576	274	17	9	
806	387	48	24	48	22	6	5	854	409	54	29	
419	199	41	20	19	11	4	3	438	210	45	23	
1.119	519	75	26	135	55	7	3	1.254	574	82	29	
1.529	710	129	62	294	123	15	5	1.823	833	144	67	
13 678	5 681	653	273	792	362	28	12	14 470	6 043	681	285	
6 496	2 704	279	110	367	172	11	2	6 863	2 876	290	112	
2 680	1 044	132	53	110	55	3	1	2 790	1 099	135	54	
4 432	1 900	239	107	308	133	14	9	4 740	2 033	253	116	
70	33	3	3	7	2	—	—	77	35	3	3	
102	43	22	15	10	9	—	—	112	52	22	15	

prima dell'attuale matrimonio, per cause, età della madre al parto e ordine di generazione.

DA PARTI SEMPLICI	NATI MORTI DA PARTI MULTIPLI															
	MADRE AL PARTO															
	40-60				Non indicata				IN COMPLESSO							
	Primo-geniti	Ca-detti	Non indi-cato	TOTALE	Primo-geniti	Ca-detti	Non indi-cato	TOTALE	Primo-geniti	Ca-detti	Non indi-cato	TOTALE	Primo-geniti	Ca-detti	Non indi-cato	TOTALE
210	2 943	2	3 155	2	14	4	20	9 710	18 481	8	28 199	569	1 376	—	1 945	
54	733	—	787	1	2	3	6	2 312	4 718	3	7 033	108	270	—	378	
9	164	—	173	1	2	—	3	539	1.258	—	1.797	28	54	—	82	
8	118	—	126	1	2	—	3	449	973	—	1.422	25	38	—	63	
22	186	—	208	—	—	—	—	613	1.017	—	1.630	25	40	—	65	
11	189	—	200	—	—	—	—	654	1.394	—	2.048	25	63	—	88	
10	163	—	173	—	—	3	3	382	880	3	1.265	25	93	—	118	
2	31	—	33	—	—	—	—	124	169	—	293	5	20	—	25	
41	854	2	897	—	2	—	2	2 546	5 742	4	8 292	267	552	—	819	
18	378	—	396	—	—	—	—	1.001	2.419	—	3.420	84	172	—	256	
3	71	—	74	—	—	—	—	213	404	—	617	7	17	—	24	
4	59	—	63	—	—	—	—	158	485	—	643	15	46	—	61	
1	54	—	55	—	—	—	—	152	347	—	499	15	27	—	42	
2	75	—	77	—	—	—	—	230	506	—	736	18	24	—	42	
—	26	—	26	—	—	—	—	124	242	—	366	7	8	—	15	
5	104	—	109	—	2	—	2	308	710	—	1.018	32	95	—	127	
8	113	2	123	—	—	—	—	484	871	4	1.359	96	171	—	267	
115	1 349	—	1 464	1	8	—	9	4 833	7 965	—	12 798	192	546	—	738	
45	675	—	720	1	1	—	2	2.040	4.059	—	6.099	88	256	—	344	
30	252	—	282	—	2	—	2	1.134	1.371	—	2.505	26	75	—	101	
40	412	—	452	—	5	—	5	1.640	2.490	—	4.130	77	209	—	286	
—	10	—	10	—	—	—	—	19	45	—	64	1	6	—	7	
—	7	—	7	—	2	1	3	19	55	1	76	2	8	—	10	

TAVOLA 23. — Popolazione residente calcolata alla metà dell'anno 1937 (a), nelle Provincie, nei Comuni capiluoghi di Provincia e negli altri Comuni.

PROVINCIE E COMPARTI- MENTI	NELLA PROVINCIA	NEL CAPOLUOGO	NEGLI ALTRI COMUNI	PROVINCIE E COMPARTI- MENTI	NELLA PROVINCIA	NEL CAPOLUOGO	NEGLI ALTRI COMUNI
Alessandria	490.453	80.942	409.511	Ancona	375.054	90.634	284.420
Aosta	226.715	24.760	201.955	Ascoli Piceno	306.478	39.113	267.365
Asti	242.021	49.829	192.192	Macerata	291.283	27.166	264.117
Cuneo	605.112	36.160	568.952	Pesaro e Urbino	313.507	45.342	268.165
Novara	397.353	63.825	333.528	MARCHE	1.286.322	202.255	1.084.067
Torino	1.189.249	650.179	539.070	Perugia	537.867	83.621	454.246
Vercelli	365.873	39.317	326.556	Terni	194.145	70.468	123.677
PIEMONTE	3.516.776	945.012	2.571.764	UMBRIA	732.012	154.089	577.923
Genova	876.283	644.236	232.047	Frosinone	446.421	18.830	427.591
Imperia	159.898	29.085	130.813	Littoria	243.990	21.470	222.520
La Spezia	225.286	109.416	115.870	Rieti	175.766	35.383	140.383
Savona	223.058	66.132	156.926	Roma	1.610.924	1.199.252	411.672
LIGURIA	1.484.525	848.869	635.656	Viterbo	237.736	36.601	201.135
Bergamo	605.132	88.318	516.814	LAZIO	2.714.837	1.311.536	1.403.301
Brescia	749.541	125.503	624.038	Aquila degli Abr.	365.980	55.152	310.828
Como	502.026	57.243	444.783	Campobasso	402.255	30.092	372.163
Cremona	367.211	65.056	302.155	Chieti	378.138	31.081	347.057
Mantova	406.282	40.856	365.426	Pescara	216.038	54.326	161.712
Milano	2.221.823	1.155.919	1.065.904	Teramo	251.700	34.266	217.434
Pavia	493.312	52.898	440.414	ABRUZZI E MOL.	1.614.111	204.917	1.409.194
Sondrio	143.429	11.934	131.495	Avellino	456.957	29.635	427.322
Varese	401.175	45.875	355.300	Benevento	354.565	39.199	315.366
LOMBARDIA	5.889.931	1.643.602	4.246.329	Napoli	2.218.474	887.480	1.330.994
Bolzano	286.998	50.378	236.620	Salerno	715.687	68.947	646.740
Trento	390.298	56.808	333.490	CAMPANIA	3.745.683	1.025.261	2.720.422
VENEZIA TRID.	677.286	107.186	570.110	Bari	1.019.489	203.983	815.506
Belluno	216.518	25.690	190.828	Brindisi	257.862	42.879	214.983
Friuli (Udine)	724.624	64.543	660.081	Foggia	530.592	64.616	465.976
Padova	670.240	142.204	528.036	Jonio (Taranto)	332.324	125.109	207.215
Rovigo	337.862	40.830	297.032	Lecce	531.389	45.393	485.996
Treviso	573.718	54.332	519.386	PUGLIE	2.671.656	481.980	2.189.676
Venezia	641.399	271.449	369.950	Matera	168.945	22.734	146.211
Verona	588.811	156.054	432.757	Potenza	382.082	25.878	356.204
Vicenza	562.412	69.786	492.626	LUCANIA	551.027	48.612	502.415
VENETO	4.315.584	824.888	3.490.696	Catanzaro	613.751	46.071	567.680
Carnaro (Fiume)	111.668	56.011	55.657	Cosenza	594.222	40.903	553.319
Gorizia	200.861	47.275	153.586	Reggio di Calabr.	582.858	121.756	461.102
Istria (Pola)	295.736	46.712	249.024	CALABRIE	1.790.831	208.730	1.582.101
Trieste	355.814	249.846	105.968	Agrigento	422.745	33.413	389.332
Zara	23.024	20.852	2.172	Caltanissetta	258.031	50.199	207.832
VEN. G. E Z.	987.103	420.696	566.407	Catania	716.140	247.938	468.742
Bologna	724.373	295.539	428.834	Enna	220.370	23.989	196.411
Ferrara	383.120	121.485	261.635	Messina	629.797	195.182	434.615
Forlì	448.771	67.645	381.126	Palermo	899.284	416.644	482.640
Modena	467.867	98.755	369.112	Ragusa	224.685	49.686	174.999
Parma	381.511	73.890	307.621	Siracusa	279.718	53.788	225.930
Piacenza	294.514	65.925	228.589	Trapani	379.315	64.526	314.789
Ravenna	279.547	81.317	198.230	SICILIA	4.030.085	1.134.785	2.895.290
Reggio nell'Em.	376.009	95.488	280.521	Cagliari	515.888	111.443	404.445
EMILIA	3.355.712	900.044	2.455.668	Nuoro	226.747	11.862	214.885
Arezzo	316.738	60.887	255.851	Sassari	305.929	57.398	248.531
Firenze	859.054	330.420	528.634	SARDEGNA	1.048.564	180.703	867.861
Grosseto	188.463	27.001	161.462	REGNO	43.402.265	11.509.983	31.892.282
Livorno	253.474	127.732	125.742				
Lucca	353.080	83.185	269.895				
Massa e Carrara	196.902	42.361	154.541				
Pisa	342.231	73.753	268.478				
Pistoia	211.571	72.606	138.965				
Sienna	268.697	48.863	219.834				
TOSCANA	2.990.210	866.808	2.123.402				

(a) Nella circoscrizione territoriale, quale era al 31 dicembre 1937, secondo le variazioni effettuate fino alla detta data.

* <i>Statistica delle cause di morte</i> in ciascuno degli anni dal 1919 al 1923				<i>Statistica delle cause di morte ne-</i> <i>gli anni 1931 e 1932 :</i>	
<i>Statistica delle cause di morte</i> nell'anno	1924,	L. 25		Parte I. - Introduzione,	L. 10
Id. id.	1925,	L. 25		Parte II. - Tavole,	L. 20
Id. id.	1926,	L. 30		<i>Statistica delle cause di morte nel-</i> <i>l'anno 1933 :</i>	
Id. id.	1927,	L. 30		Parte I. - Introduzione,	L. 5
Id. id.	1928,	L. 30		Parte II. - Tavole,	L. 10
<i>Statistica delle cause di morte ne-</i> <i>gli anni 1929 e 1930 :</i>				<i>Statistica delle cause di morte nel-</i> <i>l'anno 1934 :</i>	
Parte I. - Introduzione,		L. 10		Parte I. - Introduzione,	L. 5
* Parte II. - Tavole,		L. 25		Parte II. - Tavole,	L. 10
				<i>Statistica delle cause di morte nel-</i> <i>l'anno 1935,</i>	L. 15
				<i>Statistica delle cause di morte nel-</i> <i>l'anno 1936,</i>	L. 15

**ALTRE PUBBLICAZIONI DI STATISTICA SANITARIA
CURATE DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA**

<i>Nomenclature nosologiche per la statistica delle Cause di morte e dizionario delle malat-</i> <i>tie - 5ª Edizione (Roma, 1936-XIV)</i>	L. 3
<i>Indagine sulla mortalità infantile nel Governatorato di Roma, a cura di C. Gini - L. De</i> <i>Berardinis - G. D'Ormea - M. Flamini - U. Giusti - L. Maroi (Roma, 1933-XI).</i>	L. 30
<i>Le malattie mentali in Italia - Alienati presenti nei luoghi di cura al 1º gennaio 1926</i> <i>(Roma, 1928-VI)</i>	L. 15
<i>Movimento dei malati di mente negli Istituti di cura per gli anni 1929-1930-1931-1932-</i> <i>1933-1934-1935 (a) (Reggio Emilia, 1931-IX, 1932-X, 1933-XI, 1934-XII, 1935-</i> <i>XIII, 1935-XIV, 1936-XV) (b)</i>	—
* <i>Statistica degli Ospedali e degli altri Istituti pubblici e privati di assistenza sanitaria</i> <i>ospitaliera nell'anno 1932 (Roma, 1934-XII)</i>	L. 6

(a) Pubblicazione dell'Ufficio statistico delle malattie mentali del Manicomio Provinciale di Ancona; in vendita presso l'Ufficio stesso.
(b) Estratti dalla « Rivista Sperimentale di Freniatria ».